S

G

DE

E

ADJE

CA

CAROLI A LINNÉ
SPECIES PLANTARUM

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS

AD

GENERA RELATAS

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS, NOMINIBUS TRIVIALIBUS SYNONYMIS SELECTIS, LOCIS NATALIBUS

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

EDITIO QUARTA, POST REICHARDIANAM QUINTA
ADJECTIS VEGETABILIBUS HUCUSQUE COGNITIS
CURANTE

CAROLO LUDOVICO WILLDENOW.

Tomus II.

BEROLINI.
IMPENSIS G. C. NAUK.
1799.

QK91
.S7
1797
v.3

Weiſe haſt du, Natur! der Pflanzen Erzeugung geordnet,
Gütig und weiſe die Kräfte der erdeverſchönernden Pflanzen;
Nicht der Schüler allein der rettenden Göttin Hygea
Kennt ſie die heilenden Kräfte der aromatiſchen Staude,
Fern am Ganges geholt und vom Haupte der Cordilleras,
Oefter verkannt am Ufer der vaterländiſchen Bäche:
Sicherer weiſs der Wilde die ſchmerzenlindernde Wurzel
Und den geheimeren Stand der fieberheilenden Rinde:
Aber er kennt ſie auch die tödtenden Gifte der Pflanzen,
Kennt der Euphorbien Kraft und der giftigen Mancinella,
Die den geflügelten Pfeil mit ſchnellerem Tode bewaffnet,
Als das gorgoniſche Scheuſal der ſchlangenbehaarten Echidna. —

Baron von der Lühe.

QK91
S7
1797
v.3

geordnet,
Pflanzen;
a
ude,
lleras,

Vurzel
te:
nzen,
nella,
affnet,
Echidna. —

Lühe.

SPECIES PLANTARUM.

Tomus II. Pars I.

16174

602

603

604

606

607.

686.

690.

675.

684.

687.

685.

672.

671,

665.

676.

677.

644.

Lim

Claſſis VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Fl. Calyculati calyce corallaque inſtructi, absque ſpathis.*

602. BROMELIA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus, ſuperus. *Bacca.*

603. PITCAIRNIA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus, ſemiſuperus. *Capſula.*

604. TILLANDSIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-partitus, inferus. *Sem.* comoſa.

606. BURMANNIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 1-phyllus, inferus, triquetro-alatus, coloratus.

607. TRADESCANTIA. *Cor.* 3-petala. *Cal.* 3-phyllus, inferus. *Filamenta* barbata.

686. STEPHANIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-lobus. *Germ.* pedicellatum.

690. FRANKENIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 1-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

675. COSSIGNEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 3-locularis.

684. LORANTHUS. *Cor.* 6-partita. *Cal.* margo ſuperus. *Bacca* 1-ſperma.

687. HILLIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-phyllus, ſuperus. *Fructus* 2-locularis, polyſpermus.

685. SCHRADERA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* truncatus. *Bacca* polyſperma.

672. DU ROIA. *Cor.* 6-partita. *Cal.* truncatus. *Pomum.*

671. RICHARDIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-fidus, ſuperus. *Sem.* 3, nuda.

665. TACCA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-partitus. *Bacca* infera.

676. BARBACENIA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-dentatus. *Filamenta* dentata. *Capſula.*

677. BERBERIS. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* 2-ſperma.

644. LEONTICE. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* inflata, ſupera.

679. NANDINA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* polyphyllus, imbricatus. *Bacca* 2-ſperma.
674. PRINOS. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-fidus, inferus. *Bacca* 6-ſperma.
678. PSATHURA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-dentatus. *Drupa* ſicca infera.
688. ISERTIA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-dentatus. *Pomum* 6-loculare.
689. CANARINA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* 6-phyllus ſuperus. *Capſ.* 6-locularis.
673. ACHRAS. *Cor.* 12-fida. *Cal.* 6-phyllus, inferus. *Bacca* 12-ſperma.
683. CAPURA. *Cor.* 6-fida. *Cal.* nullus. *Germ.* ſuperum. *Bacca.*

† *Chlora imperfoliata, Portlandia hexandra, Lythra aliquot, Fumaria Cucullaria.*

* * *Fl. calyculati, calyce, corolla, ſpathisque inſtructi.*

666. CORYPHA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-phyllus. *Drupa.*
667. LICUALA. *Cor.* 3-partita. *Cal.* 3-partitus. *Nectar.* ſettiforme. *Drupa.*
608. MNASIUM. *Cor.* 3-dentata. *Cal.* 3-partit. *Spatha* 2-valvis. *Antherae* foliaceae.

* * * *Fl. Spathacei ſ. Glumacei.*

601. URANIA. *Cor.* ſupera 3-petala. *Spathae* alternae.
610. HAEMANTHUS. *Cor.* ſupera, 6-partita. *Involucrum* polyphyllum, maximum.
613. LEUCOJUM. *Cor.* ſupera, 6-petala, campanulata. *Stamina* aequalia.
614. STRUMARIA. Cor. 6-petala, plana. *Stylus* ſtrumoſus!
612. GALANTHUS. *Cor.* ſupera, 6-petala: *Petalis* 3 interioribus brevioribus, emarginatis.
616. NARCISSUS. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Nectarium* campanulatum, extra ſtamina.
617. PANCRATIUM. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Nectarium* campanulatum, ſtaminibus terminatum.
622. AMARYLLIS. *Cor.* ſupera, 6-petala, irregularis. *Stam.* inaequalia, declinata.
618. CRINUM. *Cor.* ſupera, 6-fida, baſi tubuloſa. *Stam.* diſtantia, fauci inſerta.

621. CYRTANTHUS. *Cor.* ſupera 6-fida clavata. *Filamenta* ſimplicia.
620. EUSTEPHIA. *Cor.* ſupera 6-fida tubuloſa. *Filamenta* tricuſpidata.
619. AGAPANTHUS. *Cor.* infera 6-fida infundibuliformis regularis.
609. PONTEDERIA. *Cor.* infera, 6-fida, ringens.
624. BULBOCODIUM. *Cor.* infera, 6-petala: unguibus longiſſimis ſtaminiferis.
615. TULBAGIA. *Cor.* infera. 6-petala: tribus inferioribus. *Nectarium* cylindricum extus petaliferum.
626. ALLIUM. *Cor.* infera, 6-petala. *Petala* ovata, ſeſſilia.
636. CURCULIGO. *Cor.* infera, 6-petala. *Styl.* 3-partitus.
625. APHYLLANTHES. *Cor.* infera, 6-petala. *Spathae* dimidiatae, glumoſae.
611. MASSONIA. *Cor.* infera 6-partita. *Stam.* nectario inſerta.
637. HYPOXIS. *Cor.* ſupera, 6-petala. *Spathae* glumaceae.

* * * * *Flores nudi.*

605. XEROPHYTA. *Cor.* 6-partita ſupera. *Stigma* clavatum.
661. ALSTROEMERIA. *Cor.* ſupera, 6-petala, unguibus 2 tubuloſis.
655. LANARIA. *Cor.* ſupera 6-fida ſubcampanulata.
662. HEMEROCALLIS. *Cor.* infera, 6-partita. *Stam.* declinata.
660. AGAVE. *Cor.* ſupera, 6-fida, limbo erecto, Filamentis brevior.
635. GETHYLLIS. *Cor.* ſupera 6-partita. *Bacca* clavata polyſperma.
659. ALOE. *Cor.* infera, 6-fida. *Filam.* receptaculo inſerta.
657. ALETRIS. *Cor.* infera: 6-fida, rugoſa. *Stamina* fauci inſerta.
656. VELTHEIMIA. *Cor.* infera 6-fida. *Stamina* corollae baſi inſerta.
650. POLYANTHES. *Cor.* infera, 6-fida, tubo curvato.
649. CONVALLARIA. *Cor.* infera, 6-fida. *Bacca* triſperma.

648. SANSEVIERA. *Cor.* infera 6 - partita. *Bacca* 1 - ſperma.

652. HYACINTHUS. *Cor.* infera, 6 - fida ſubcampanulata. *Stamina* receptaculo inſerta.

651. DRIMIA. *Cor.* infera 6 - fida campanulata. *Stamina* tubo corollae inſerta.

623. MILLEA. *Cor.* infera: 6 - fida infundibulif. *Germen* pedicellatum!

642. ASPHODELUS. *Cor.* infera: 6 - partita: nectarii valvulis 6 ſtaminiferis.

629. EUCOMIS. *Cor.* infera. 6 - partita, perſistens. *Filamenta* nectario adnata.

643. ANTHERICUM. *Cor.* infera, 6 - petala, plana.

681. ENARGEA. *Cor.* infera, 6 - petala, petalis alterne baſi biglanduloſis.

653. PHORMIUM. *Cor.* infera, 6 - petala inaequalis. *Capſ.* triquetra.

654. LACHENALIA. *Cor.* infera, 6 - petala inaequalis. *Capſ.* trialata.

639. ORNITHOGALUM. *Cor.* infera, 6 - petala. *Filam.* alternis baſi dilatatis.

638. ERIOSPERMUM. *Cor.* infera, 6 - petala. *Filam.* lanceolata. *Sem.* lanata.

640. SCILLA. *Cor.* infera, 6 - petala, decidua. *Filam.* filiformia.

641. CYANELLA. *Cor.* infera, 6 - petala: petalis exterioribus propendentibus.

682. PHILESIA. *Cor.* infera, 6 - petala, tribus interioribus duplo longioribus.

680. LINDERA. *Cor.* infera, 6 - petala. *Capſula* 2 - locularis.

647. DRACAENA. *Cor.* infera, 6 - petala. *Bacca* 3 - ſperma.

646. ASPARAGUS. *Cor.* infera, 6 - petala. *Bacca* 6 - ſperma.

645. POLLIA. *Cor.* infera, 6 - petala. *Bacca* polyſperma.

631. GLORIOSA. *Cor.* infera, 6 - petala, reflexa, caudata.

632. ERYTHRONIUM. *Cor.* infera, 6 - petala, reflexa, petalis baſi 2 callis.

630. UVULARIA. *Cor.* infera, 6 - petala, baſi fovea nectarifera; erecta.

628. **FRITILLARIA.** *Cor.* infera, 6-petala, baſi fovea nectarifera; ovata.
627. **LILIUM.** *Cor.* infera, 6-petala: petalis baſi canaliculato-tubuloſis.
633. **TULIPA.** *Cor.* infera, 6-petala, campanulata. *Stylus* o.
658. **YUCCA.** *Cor.* infera, 6-petala, patens. *Stylus* o.
634. **ALBUCA.** *Cor.* infera, 6-petala, 3 exterioribus patulis, 3 interioribus conniventibus. *Stigma* cinctum cuſpidibus 3.

* * * * * *Flores incompleti.*

664. **ORONTIUM.** *Spadix* multiflorus. *Follic.* 1-ſpermus.
663. **ACORUS.** *Spadix* multiflorus. *Capſ.* 3-locularis.
669. **CALAMUS.** *Cal.* 6-phyllus. *Peric.* retrorſum imbricatum 1-ſpermum.
670. **JUNCUS.** *Cal.* 6-phyllus. *Capſ.* 1-locularis.
668. **THRINAX.** *Cal* 6-dentatus. *Drupa.*
691. **PEPLIS.** *Cal.* 12-fidus. *Capſ.* 2-locularis.

* * * * *Gramina.*

693. **BAMBUSA.** *Cal.* o. *Cor.* 2 valvis.
692. **GAHNIA.** *Cal.* 1-valv. *Cor.* 2-valvis.
694. **EHRHARTA.** *Cal.* 2-valv. *Cor.* duplex.

D I G Y N I A

697. **FALKIA.** *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 1-petala. *Sem.* 4.
698. **ATRAPHAXIS.** *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 2-petala. *Sem.* 1, compreſſum.
696. **NECTRIS.** *Cal.* 6-partit. *Cor.* o. *Capſ.* 2, polyſpermae.
695. **ORYZA.** *Gluma* 1-flora. *Cor.* 2-glumis. *Sem.* 1, oblongum.

† *Leerſia hexandra. Ehrhartae nonnullae.*

T R I G Y N I A.

* *Fl. inferi.*

703. **WURMBEA.** *Cor.* 6-fida tubuloſa.
707. **COLCHICUM.** *Cal.* ſpatha. *Cor.* 6-petaloidea.
704. **MELANTHIUM.** *Cal.* o. *Cor.* 6-petala: petalis ſtaminiferis.

705. MEDEOLA. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Bacca* 3-cocca.
708. HELONIAS. *Cal.* o. *Cal.* 6-petala. *Capſ.* 3-locularis.
706. TRILLIUM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.
702. TRIGLOCHIN. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* tripetala. *Capſ.* baſi dehiſcens.
699. RUMEX. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Sem.* 1, triquetrum.
701 SCHEUCHZERIA. *Cal.* 6-phyllus, *Cor.* o. *Capſ.* 3, 1-ſpermae.

† *Xylophylla latifolia.*

* * *Fl. ſuperi.*

700. FLAGELLARIA. *Cal.* 6-phyllus. *Cor.* o. *Pericarpium* 1-ſpermum.

HEXAGYNIA.

710. DAMOSONIUM, Spatha. *Cal.* 5-partit. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locularis.
709. WENDLANDIA. *Cal.* 6-phyl. *Cor.* 6 petala. *Capſ.* 6, monoſpermae.

POLYGYNIA.

711. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Peric.* plura.

MONOGYNIA.

*601. URANIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 539.

Cal. o. *Cor.* tripetala. *Nectar.* 2-phyll. foliolo altero bifiuo. *Capſ.* infera trilocularis polyſperma. *Semina* biſerialia arillo tecta.

*1. URANIA *ſpecioſa.* W.

Ravenalia madagaſcarienſis. *Sonner. it. ind. ed. germ.* 2. *p.* 175. *t.* 124. 125. 126.* *Juſſ. gen. ed. Uſt. p.* 69. *Jacq. hort. ſchoenb.* 1. *p.* 47. *t.* 93.*

Prächtige Uranie. W.

Habitat in Madagaſcariae *locis paduloſis.* ♄

Arbor *facie Muſae vel Heliconiae altiſſima.* Truncus *indiviſus.* Folia *diſticha Heliconiae longe petiolata.* Petioli *bipedales.* Spadix *axillaris erecta foliis brevior.* Spathae *diſtichae ovatae concavae ut in Heliconiis multiflorae.* W.

602. BROMELIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 540.

Cal. 3-fidus, ſuperus. *Petala* 3: Squama nectarifera ad baſin petali. *Bacca* trilocularis.

1. BROMELIA *Ananas.*

B. foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Sp. pl.* 408.

B. foliis ſpinoſis, fructibus connatis caulem cingentibus. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 73. *Roy. lugdb.* 24.

Carduus braſilianus, foliis aloës. *Bauh. pin.* 384.

Ananas acoſtae. *Comm. hort.* 1. *p.* 109. *t.* 57.

Ananas aculeatus, fructu ovato carne albida. T. *Trew. ehret. t.* 2. *Blackw. t.* 567. *Knorr. del. hort.* 2. *t. A.* 1. *et* 2. *Sabbat. hort.* 1. *t.* 72.

Ananas ovata. *Mill. dict. n.* 1.

Anaſſa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 227. *t.* 81.

Kapa-Tſiakka. *Rheed. mal.* 11. *p.* 1. *t.* 1. 2.

β. Ananas aculeatus, fructu pyramidato: carne aurea. *Tournef. inſt.* 653. *Blackw. t.* 568.

Ananas aculeatus, fructu conico: carne aurea. *Pluk. ſpec.* 20.

Ananas pyramidalis. *Mill. dict. n.* 2.

γ. Ananas lucide virens, folio vix ſerrato. *Dill. elth.* 25. *t.* 21. *f.* 22.

Ananas lucida. *Mill. dict. n.* 4.

Ananas non aculeatus Pitta dictus. *Plum. ſpec.* 20.

δ. Ananas (*viridis*) aculeatus, fructu pyramidato ex viridi-flaveſcente. *Mill. dict. n.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 293.

Eſsbare Ananas. W.

Habitat in nova Hiſpania, Surinamo. ♄ (v. v)

2. BROMELIA *Pinguin.*

B. foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, racemo terminali. *Jacq. amer.* 91. *Trew. ehr. t.* 51. *Swarz obſ.* 120.*

B. foliis aculeatis, racemo laxo terminali. *Hort. cliff.* 129. *Roy. lugdb.* 25. *Brown. jam.* 193. *n.* 4.

Ananas americana ſylveſtris altera minor. *Pluk. mant.* 29. *t.* 258. *f.* 4.

Pinguin. *Dill. elth.* 320. *t.* 240. *f.* 311.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 296.

Zaun-Ananas. W.

Habitat in Jamaica, Barbados. ♄

Pro ſepibus vivis, ut poſſent fere inde moenia fieri. Jacq.

3. BROMELIA *Karatas.*

B. foliis erectis, floribus acaulibus ſeſſilibus aggregatis. *Jacq. amer.* 90. *hort.* 31. 32.

B. acaulis, floribus aggregatis ſeſſilibus ſubradicalibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 408.

Karatas foliis altiſſimis anguſtiſſimis et aculeatis. *Plum. gen.* 10?

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 297.

Wilde Ananas. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Miraculum naturae pro conſervatione fructus in maturitatem Jacq. Stolones *inter folia, peracto fructu, procumbentia ſubulato-filiformes, radicantes, propagantes plantam.*

4. BROMELIA *lingulata.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis obtuſis, ſpicis alternis. *Mill. dict. n.* 2.

B. ramoſa et racemoſa, foliis arundinaceis ſerratis. *Plum. gen.* 26. *ic.* 64. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 299.

Zungenblättrige Ananas. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

*5. BROMELIA *bracteata.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis ovato-lanceolatis, ſcapo elongato, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus ſeſſilibus. *Swartz. prod.* 56. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 583.*

Aloë americana arboribus innaſcens, foliis latis membranaceis ad margines ſpinoſis. *Houſt. reliq. p.* 7. *t.* 16.

Paraſitiſche Ananas. W:

Habitat in rupeſtribus Jamaicae *inque arboribus* Vera Cruce. ♄

Bracteae *membranaceae integerrimae coccineae.* W.

*6. BROMELIA *paniculigera.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis, racemo compoſito, racemulis ſubdiviſis, floribus pedunculatis. *Swartz. prod.* 56. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 585.*

Riſpenblütige Ananas. W.

Habitat in India *occidentali.* ♄

Scapus *erectus elongatus pedalis et ultra, bracteatus.* Bracteae *lato-lanceolatae alternae membranaceae ſemipedales coccineae.* Racemus *compoſitus bipedalis erectus pruinoſus, racemulis ſubdiviſis patentibus.* Flores *pedunculati, pedunculis pollicaribus teretibus incanis tomentoſis.* Swartz. l. c.

*7. BROMELIA *chryſantha.*

B. foliis ſerrato-ſpinoſis, bracteis lanceolatis dentatis, racemo ſubcompoſito foliis breviore, floribus pedunculatis. W.

B. (*chryſantha*) foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, racemo compoſito terminali, baccis glabris. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 28. *t.* 55.*

Gelbblütige Ananas. W.

Habitat ad Caracas. ♄

Racemus *foliis brevior pedalis baſi compoſitus.* Flores *flavi pedunculati.* Pedunculi *glabri.* Bracteae *marceſcentes lanceolatae flaveſcentes dentatae.* W.

8. BROMELIA *nudicaulis.*

B. foliis radicalibus dentato-ſpinoſis, caulinis integerrimis. *Mill. dict. n.* 1.

B. pyramidata, aculeis nigris. *Plum. gen.* 46. *ic.* 62. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 300.

Nacktſtielige Ananas. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

9. BROMELIA *humilis.*

B. ſubacaulis, floribus aggregatis ſeſſilibus, axillis ſtoloniferis. *Jacq. vind.* 306.* *Miſc.* 2. *p.* 325. * *Ic. rar.* 1. *t.* 60.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 300.
Niedrige Ananas. W.
Habitat . . . . . ♄

10. BROMELIA *Acanga.*

B. panicula diffuſa, foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis recurvatis. *Syſt. Veg.* 259. *Sp. pl.* 1. *p* 285.
B. foliis ſpinoſis oblique recurvis, fructibus diſperſis racemoſis. *Hort. upſ.* 73.
Caraguata. *Piſ. braſ.* 90. *t.* 91.
Mexocotl. ſ. Manguel. *Hern. mex.* 272. *Moriſ. hiſt.* 2. *ſ.* 4. *t.* 22. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 301.
Sparrige Ananas. W.
Habitat in Braſilia. ♄

*603. PITCAIRNIA.

Hepetis. Gen. plant. edit. Schreb. n. 1741.

Cal. 3-phyllus ſemiſuperus. *Petala* 3. Squama nectarifera ad baſin petalorum. *Stigmata* 3, contorta. *Capſ.* 3 introrſum dehiſcentes. *Sem.* alata.

*1. PITCAIRNIA *bromeliaefolia.*

P. foliis ciliato-ſpinoſis, pedunculis germinibusque glaberrimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 401. *Schneevoigt. ic. faſc.* 4. *t.* 11.
Pitcairnia bromeliaefolia. *l'Herit. ſert. angl. p.* 7. *t.* 11. *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 580.*
Hepetis anguſtifolia. *Swartz. prod.* 56.
Ananasblättrige Pitcairnie. W.
Habitat in Jamaica, *ad latera et praecipitia rupium umbroſa.* ♄

*2. PITCAIRNIA *anguſtifolia.*

P. foliis ciliato-ſpinoſis, pedunculis germinibusque tomentoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 401.
Schmalblättrige Pitcairnie. W.
Habitat in inſula St. Crucis. ♄

*3. PITCAIRNIA *latiſolia.*
P. foliis integerrimis baſi ſubſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 401.
Breitblättrige Pitcairnie. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. v.)

604. TILLANDSIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 541.

Cal. 3-fidus, perſiſtens. *Cor.* 3-fida, campanulata. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* comoſa.

1. TILLANDSIA *utriculata.*
T. culmo paniculato. *Sp. pl.* 409.
T. foliis baſi conniventibus in utriculum. *Hort. cliff.* 129.
T. paraſitica major, foliis amplioribus attenuatis baſi ventricoſis, ſpica aſſurgenti compreſſa brachiata, floribus fere ſeſſilibus. *Brown. jam.* 194. *n.* 4.
Viſcum caryophylloides maximum, flore tripetalo pallide luteo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 76. *hiſt.* 1. *p.* 88. *Raj. ſuppl.* 405.
Viſci modo arboribus indicis adnaſcens. *Bauh. pin.* 423.
Caraguata multiplici ſpica, flore albo. *Plum. gen.* 10.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 302.
Schlauchartige Tillandſie. W.
Habitat in Americae *meridionalis arboribus.* ♃

2. TILLANDSIA *ſerrata.*
T. foliis ſuperne ſerrato-ſpinoſis, ſpica comoſa. *Sp. pl.* 409.
T. paraſitica maxima, foliis amplioribus obtuſis ciliato-ſubſpinoſis, racemo pyramidato. *Brown. jam.* 195.
Caraguata clavata et ſpicata, foliis ſerratis. *Plum. gen.* 10. *ic.* 75. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 303.
Geſägte Tillandſie. W.
Habitat in America *meridionali.*

3. TILLANDSIA *lingulata.*
T. foliis lanceolato-lingulatis integerrimis: baſi ventricoſis. *Jacq. amer.* 92. *t.* 62.
T. media paraſitica, foliis oblongis obtuſis, floribus comoſis terminalibus. *Brown. jam.* 194.
Caraguata latifolia et clavata. *Plum. gen.* 10. *ic.* 74.

Viſcum caryophylloides maximum, capitulis in ſummitate conglomeratis. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 189. *t.* 110. *Rai. ſuppl.* 405.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 304.
Zungenblättrige Tillandſie. W.
Habitat in Americae *meridionalis arboribus vetuſtis, paraſitica. Colligit etiam aquam.*

4. TILLANDSIA *tenuifolia.*

T. ſpicis alternis imbricatis, floribus diſtichis, foliis lineari-filiformibus erectis, apice ſetaceis. *Swartz. fl. ind. occ.* 1. *p.* 592.*
T. foliis filiformibus integerrimis, ſpica ſimplici laxa. *Roy. lugdb.* 25.
T. paraſitica parva, foliis tenuiſſimis erectis, ſpica breviori ſimplici diſticha. *Brown. jam.* 194.
Renealmia ſpica multiplici anguſtifolia, flore caeruleo. *Plum. gen.* 37. *ic.* 238. *f.* 2.
Viſcum caryophylloides minus, foliorum imis viridibus apicibus ſubrubicundis, flore tripetalo purpureo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 190. *t.* 122. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 305.
Schmalblättrige Tillandſie. W.
Habitat in Americae *meridionalis arboribus.* ♃

*5. TILLANDSIA *flexuoſa.*

T. ſpicis laxis flexuoſis, floribus diſtichis remotiuſculis, foliis lanceolato-linearibus reclinatis, caule apice ſubdiviſo. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 590.*
T. (*tenuifolia*) foliis lineari-ſubulatis integerrimis imbricatis, ſpica ſimplici laxa. *Jacq. amer. p.* 92. *t.* 63.*
Schlaffblättrige Tillandſie. W.
Habitat in arborum ramis Jamaicae *et* Carthagenae. ♃

*6. TILLANDSIA *ſetacea.*

T. ſpica ſimplici, ſpathis diſtichis imbricatis, foliis lineari-filiformibus reclinatis glabris. *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 593.*
Borſtenblättrige Tillandſie. W.
Habitat in Jamaicae *arboribus.* ♃

Similis T. tenuifoliae, ſed omnino diſtinguenda: foliis reclinatis, nec erectis, et ſpica *ſimplici nec ſpicis pluribus alternis.* Swartz. l. c.

7. TILLANDSIA *paniculata.*

T. foliis radicalibus breviſſimis, culmo ſubnudo, ramis ſubdiviſis adſcendentibus. *Sp. pl.* 410.

T. paraſitica major, foliis attenuatis baſi ventricoſis, racemo laxo ſpatioſo aſſurgenti. *Brown. jam.* 194:

Renealmia ramoſiſſima, foliis variegatis et circinatis. *Plum. gen.* 27. *ic.* 237.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 306.

Riſpenblütige Tillandſie. W.

Habitat in America *meridionali.*

*8. TILLANDSIA *faſciculata.*

T. ſpicis lateralibus diſtichis imbricatis, foliis lanceolato-ſubulatis erectis ſtrictis. *Swartz. prod.* 56. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 586.*

T. (*clavata*) foliis radicalibus longis acutis integerrimis, caule ſimplici, ſpica ovata conica, ſquamis imbricatis et coarctatis compacta. *Lamarck. encyclop.* 1. *p.* 610? W.

Büſchlichte Tillandſie. W.

Habitat in maritimis Jamaicae, *arboribus adhaerens.* ♃

Diſtincta a T. polyſtachya, quae dignoſcitus: ſpicis *ſparſis, nec diſtichis, anguſtioribus*, foliis *reclinatis.* Swartz. l. c.

*9. TILLANDSIA *nutans.*

T. ſpicis ſubdiviſis nutantibus, floribus diſtinctis ovatis, foliis ovato-lanceolatis membranaceis, caule ſubnudo. *Swartz. prod.* 56. *Fl ind. occid.* 1. *p.* 588.*

Hängende Tillandſie. W.

Habitat in montoſis Jamaicae *ad arborum ramos.* ♃

10. TILLANDSIA *polyſtachya.*

T. culmo ſpicis imbricatis lateralibus. *Sp. pl.* 410.

Viſcum caryphylloides anguſtifolium, floribus caeruleis. *Catesb. car.* 2. *p.* 89. *t.* 89.?

Renealmia ſpica multiplici, flore albo. *Plum. gen.* 37.

β. Renealmia, ſpica multiplici, alia anguſtifolia. *Plum. gen.* 37.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 306.

Vielährige Tillandſie. W.

Habitat in America *calidiore.*

11. TILLANDSIA *monoſtachya.*

T. foliis linearibus canaliculatis reclinatis, culmo ſimplici imbricato, ſpica ſimplici. *Sp. pl.* 410.

T. paraſitica, foliis majoribus obtuſis, ſpica aſſurgenti diviſa ſquamoſa. *Brown. jam.* 194.
Renealmia non ramoſa ſquamata; et floribus niveis. *Plum. gen.* 37. *ic.* 238. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 307.
Einfachährige Tilandſie. W.
Habitat in America *meridionali.*

*12. TILLANDSIA *pruinoſa.*
T. ſpica ſimplici, ſpathis imbricatis, foliis lanceolato-linearibus reclinatis, ſpathisque ſquamuloſo-tomentoſis. *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 594.*
Bereifte Tillandſie. W.
Habitat in arborum ramis vetuſtis Jamaicae. ♃
Non confundenda cum T. recurvata, quae foliis *lineari-ſubulatis,* pedunculis *radicalibus et* ſpathis *biflorís diverſa.* Swartz. l. c.

*13. TILLANDSIA *caneſcens.*
T. ſpicis ſubternis, foliis linearibus erectis caulem aequantibus incanis. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 595.*
Graue Tillandſie. W.
Habitat ad maris littora Jamaicae *in arboribus.* ♃
Diverſa a T. polyſtachya, cui proxima, quae vero differt: caule *altiore,* foliis *reclinatis flexuoſis glabris,* ſpicis *pluribus lanceolatis ſparſis.* Swartz. l. c.

*14. TILLANDSIA *anguſtifolia.*
T. ſpicis faſciculatis, foliis lineari-lanceolatis ſuberectis glabris caulem ſuperantibus. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 596.*
Engblättrige Tillandſie. W.
Habitat in Jamaicae *et* Hiſpaniolae *truncis et ramis arborum.* ♃
Probe diſtinguenda a T. polyſtachya: foliis *caule longioribus erectioribus,* ſpicis *vaginis foliaceis interſtinctis.* Swartz. l. c.

*15. TILLANDSIA *recurvata.*
T. foliis ſubulatis ſcabris reclinatis, culmis unifloris, gluma biflora. *Roy. lugdb.* 25. *Swartz. obſ.* 121.*
T. paraſitica parva pruinoſa, ſcapo tenui bifloro. *Brown. jam.* 194.
Viſcum caryophylloides minus, foliis pruinae inſtar candicantibus, flore tripetalo purpureo, ſemine filamen-

toſo. *Sloan. jam. 77. hiſt. 1. p. 190. t. 121. f. 1. Ray. ſuppl.* 406.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 307.
Krummblättrige Tillandſie. W.
Habitat in Jamaicae *arboribus ſemimortuis.*

16. TILLANDSIA *uſneoides.*
T. filiformis ramoſa intorta ſcabra. *Hort. cliff.* 129. *Gron. virg.* 36. *Barr. aequin.* 99. *Roy. lugdb.* 25.
Renealmia paraſitica, caule filiformi ramoſo geniculato longiſſimo, foliis ſubulatis. *Brown. jam.* 192.
Viſcum caryophylloides tenuiſſimum e ramis arborum muſci in modum dependens, foliis pruinae inſtar candicantibus, flore tripetalo, ſemine filamentoſo. *Sloan. jam.* 77. *hiſt.* 1. *p.* 191. *t.* 122. *f.* 2. 3. *Raj. ſuppl.* 406.
Cuſcuta, ramis arborum innaſcens, caroliniana, filamentis lanugine tectis. *Pluk. alm.* 126. *t.* 26. *f.* 5.
Camanbaya. *Marcgr. braſ.* 40. *Pet. gaz. t.* 62. *f.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 308.
Fadenförmige Tillandſie. W.
Habitat in Virginiae, Jamaicae, Braſiliae *arboribus.* (v. ſ.)

Renealmiae *Plumieri ſolo fructu, eoque minus diverſo, differunt ab ejusdem Caraguatis, conſultius viſum haec dua genera combinare, quam difficile et tamen ambigue diſtinguere.*

*605. XEROPHYTA.

Juſſieu. Gen. ed. Uſteri. p. 57.

Cor. 6-partita aequalis, tribus laciniis exterioribus anguſtioribus. *Stigm.* clavatum. *Capſ.* infera 3-locularis polyſperma.

*1. XEROPHYTA *pinifolia.*
Xerophyta. *Lamarck. encyclop. t.* 225.
Fichtenblättriger Dürrbuſch. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

Fruticulus *ramis alternis, rudimentis foliorum praeteriti anni tectis.* Folia *alterna lineari-lanceolata acuminata ſeſſilia.* Flores *in ramulis terminales.* Pedunculi *uni-bi-vel triflori.* W.

606. BURMANNIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 542.

Cal. priſmaticus, coloratus, 3-fidus: angulis membranaceis. *Petala* 3. *Capſ.* 3-locularis, recta. *Sem.* minuta.

1. BURMANNIA *diſticha.*
B. ſpica gemina. *Burm. zeyl.* 50. *t.* 20. *f.* 1. *Fl. zeyl.* 128. *Mill. dict. n.* 1.
B. ſpica duplici. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 125.
Planta zeylanica aquatica, lato et brevi gramineo folio. *Raj. ſuppl.* 559.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 309.
Gabelährige Burmannie. W.
Habitat in Zeylonae *paludoſis.* ♃ (v. ſ.)

2. BURMANNIA *biflora.*
B. flore gemino. *Mill. dict. n.* 2.
B. flore duplici. *Hort. cliff.* 128.
B. ſcapo bifloro. *Gron. virg.* 36.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 310.
Zweyblütige Burmannie. W.
Habitat in Virginiae *paludoſis.*

607. TRADESCANTIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 543.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. *Filamenta* villis articulatis. *Capſ.* 3-locularis.

1. TRADESCANTIA *virginica.*
T. erecta, foliis lanceolatis glabris, floribus umbellato-congeſtis terminalibus. W.
T. erecta laevis, floribus congeſtis. *Mill. dict. Kniph. cent.* 6. *n.* 96.
Tradeſcantia. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 73. *Gron. virg.* 36. *Roy. lugdb.* 37.
Ephemerum phalangoides tripetalum non repens virginianum gramineum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 4.
Allium ſ. Moly virginianum. *Bauh. pin.* 506.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 311.
Virginiſche Tradeſcantie. W.
Habitat in Virginia. ♃ (v. v.)

*2. TRADESCANTIA *craſſifolia.*

T. erecta, foliis ovatis margine et ſubtus lanatis, floribus umbellato-congeſtis terminalibus. W.

T. (*craſſifolia*) foliis ovato-acutis concavis craſſis, limbo lanato. *Cavan. ic.* 1. *p.* 54. *t.* 75.*

Dickblättrige Tradeſcantie. W.

Habitat in Mexico. ♃

Caulis *lanatus, ramoſus.* Folia *craſſa ovata acuta baſi cucullata vel breviſſime vaginantia nervoſa, ſuperne glabra, ſubtus margineque lanata.* Flores *maximi hujus generis.* W.

*3. TRADESCANTIA *erecta.*

T. erecta, foliis ovatis baſi anguſtatis glabris, pedunculo terminali nudo bifido racemoſo. W.

T. (*erecta*) caule herbaceo erecto ramoſo, floribus racemoſo-umbellatis terminalibus. *Cavan. ic.* 1. *p.* 53. *t.* 74.*

T. (*erecta*) caule erecto, pedunculis terminalibus bifidis racemoſis longis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 354. *Collect.* 4. *p.* 114.*

T. (*undulata*) erecta laevis, foliis ovatis undulatis, floribus ſubracemoſis. *Vahl. Act. Soc. Hiſt. Nat. Haf.* 2. *P.* 2. *p.* 27. *t.* 3.*

Tradeſcantia bifida. *Roth. catal. bot.* 1. *p.* 42.*

Aufrechte Tradeſcantie. W.

Habitat in Mexico. ☉ (v. v.)

4. TRADESCANTIA *Zanonia.*

T. erecta, foliis lato-lanceolatis, pedunculis lateralibus ſolitariis medio geniculatis multifloris, bracteis geminis. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 604.*

Commelina (*Zanonia*) corollis aequalibus, pedunculis incraſſatis, foliis lanceolatis, vaginis laxis margine hirſutis, bracteis geminis. *Sp. pl.* 61.

Commelina erecta major ſimplex, floribus conglomeratis pedunculo longiori inſidentibus. *Brown. jam.* 125. *n.* 1.

Zanonia graminea perfoliata. *Plum. gen.* 38.

Periclymenum rectum herbaceum gentianae folio, foliis pediculo caulem ambiente. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1. *p.* 243. *t.* 147. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 123.

Scheidenblütige Tradeſcantie. W.

Habitat in nemoribus montium Jamaicae *auſtralioris, inque* Gujana. ♃ (v. ſ.)

Foliorum *vaginae latiſſimae et a caule diſtantes, margine hirſutae.* Bracteae *duae lanceolatae oppoſitae.*

*5. TRADESCANTIA *diſcolor.*

T. acaulis laevis, bracteis equitantibus compreſſis, foliis lanceolatis ſubtus coloratis. *Smith. icon. pict. p.* 10. *t.* 10.* *Swartz. fl. ind. occid.* 1. *p.* 607 *

T. (*diſcolor*) ſpatha triphylla compreſſa, floribus ſubexſertis, foliis lanceolatis ſubtus violaceis. *l'Herit. ſert. angl. p.* 8. *t.* 12.

T. (*diſcolor*) acaulis laevis, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis carnoſis diſcoloribus. *Ait. Kew* 1. *p.* 403.

T. (*ſpathacea*) acaulis foliis ſeſſilibus, ſcapis radicalibus. *Swartz. prod.* 57.

Violettblättrige Tradeſcantie. W.

Habitat in America *meridionali, in regionibus ſinu* Mexicano *proximis.* ♃ (v. v.)

6. TRADESCANTIA *malabarica.*

T. erecta laevis, pedunculis ſolitariis longiſſimis. *Sp. pl.* 412.

Ephemerum tripetalum non repens malabaricum, porraceis foliis, purpureo-coeruleum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606?

Ephemeri ſ. Phalangii virginiani ſpecies, floribus ſparſis. *Rai. ſuppl.* 564?

Tali-pulli *Rheed. mal.* 9. *p.* 123. *t.* 63.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 312.

Malabariſche Tradeſcantie. W.

Habitat in Malabaria. ♃ (v. ſ.)

7. TRADESCANTIA *nervoſa.*

T. ſcapo unifloro. *Mant.* 223.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 312.

Nervenblättrige Tradeſcantie. W.

Habitat in Suratte? *D Mutis.* ♃

Caules *palmares, diffuſi.* Folia *lanceolata, vaginantia, brevia ſ. pollicaria, conferta.* Pedunculus *terminalis, filiformis, longus, ſubuniflorus.* Bractea *obſoleta, a flore remota.* Flos *magnus.* Calyx 3-*phyllus, lanceolatus, ſcarioſus,* 5-*nervis, corolla brevior.* Petala 3, *ovata, lata, multinervia.* Stamina 6, *pilis violaceis.* Stylus *apice hamoſus.*

*8. TRADESCANTIA *divaricata.*

T. caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis glabris, va-

ginis villoſis, floribus paniculatis, filamentis glabris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 34.*

Commelina (*hexandra*) floribus racemoſis coeruleis. *Aubl. gujan.* 1. *p.* 35. *t.* 12.*

Sparrige Tradeſcantie. W.

Habitat ad fluviorum ripas Gujanae, Cajennae, *inque inſula* Trinitatis.

In hac et in ſpeciebus 10. 11. 12. Filamenta *ſunt glabra.* W.

9. TRADESCANTIA *geniculata.*

T. procumbens hirſuta. *Sp. pl.* 412.

T. caule paniculato, baſi repente. *Iacq. amer.* 94. *t.* 64.

Ranunculus ſ. Damaſonium repens, parnaſſiae foliis villoſis. *Plum. ic.* 116. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 312.

Gegliederte Tradeſcantie. W.

Habitat in America *meridionali.* ♃

*10. TRADESCANTIA *monandra.*

T. diffuſa, foliis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus multifloris, floribus monandris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 597.*

Einfädige Tradeſcantie. W.

Habitat in nemoribus montium Hiſpaniolae *occidentalis.* ☉ (v. ſ.)

*11. TRADESCANTIA *multiflora.*

T. erecta ramoſa, foliis cordatis margine vaginisque ciliatis, pedunculis confertis axillaribus, floribus triandris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 599.*

Vielblütige Tradeſcantie. W.

Habitat in umbroſis ſylvaticis montium Jamaicae.

*12. TRADESCANTIA *cordifolia.*

T. repens filiformis, foliis cordatis, pedunculis terminalibus ſolitariis multifloris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 601.*

Herzblättrige Tradeſcantie. W.

Habitat in montibus altis Jamaicae, *locis umbroſis graminoſis humidis.* ☉

*13. TRADESCANTIA *procumbens.*

T. caule procumbente radicante, foliis ovatis baſi ciliatis vaginatis, pedunculis cymoſis axillaribus, ſtaminibus inaequalibus. W.

T. (*multiflora*) caule repente glabro, ramis erectis, foliis glabris ad oras ciliatis, pedunculis congeſtis, floribus

umbellatis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 355. *Collect.* 3. *p.* 226.* (*excluſo ſynonymo.*)
Liegende Tradeſcantie. W.
Habitat ad Caracas. ♃ (v. f.)
Videtur a T. multiflora diſtincta: caule *procumbente*, floribus *hexandris*, ſtaminibus *inaequalibus, tribus longioribus barbatis*. W.

14. TRADESCANTIA *axillaris*.
T. caule ramoſo, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Syſt. Veg.* 260.
Commelina (*axillaris*) corollis aequalibus, floribus ſeſſilibus, foliis linearibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 62.
Ephemerum phalangoides maderaſpatanum minimum, ſecundum caulem quaſi ex utriculis floridum. *Pluk. alm.* 135. *t.* 174. *f.* 3.
Ephemerum malabaricum, flore tripetalo in foliorum alis ſeſſili. *Rai. ſuppl.* 567.
Nir-pulli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 28. *t.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 313.
Winkelblütige Tradeſcantie. W.
Habitat in India. ☉
Caulis *baſi repens, adſcendens, ramoſus.* Folia *linearia, acuta, patentia, vaginis coloratis longius ciliatis.* Flores *axillares, ſeſſiles, ſolitarii.* Calyx 3-*partitus, carinatus apicibus ciliatis: lacinia tertia planiuſcula.* Corolla 1-*petala, infundibuliformis.* Tubus *calyce duplo longior.* Laciniae 3, *patentes, breviores, coeruleae.* Stamina 6, *pilis articulatis.* Stylus *clavatus. König.*

15. TRADESCANTIA *formoſa*.
T. foliis oppoſitis connatis. *Linn. ſuppl.* 192.
T. (*nodiflora*) caule ſimplici flexuoſo, foliis breviſſimis margine et vagina villoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 367.*
Commelina (*ſpecioſa*) caule flexuoſo erecto, foliis amplexicaulibus lanceolatis, floribus glomeratis axillaribus. *Thunb. prod.* 59.
Schöne Tradeſcantie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Caulis *bipedalis laevis, ſub geniculis lanatus.* Verticilli *florum plures remoti.* Folia *ſub verticillis oppoſita enſiformi-lanceolata, margine parum lanata, baſi connata.* Petala *ſex*; exteriora 3 *lanceolata rigidiora*;

interiora 3 *teneriora.* Filamenta *ſex ſuperne lanata, longitudine corollae.* Antherae *erectae.* Germen *ſuperum triquetrum.* Stylus *apice barbatus longitudine corollae.* Stigma *oblongum triquetrum.*

16\. TRADESCANTIA *criſtata.*

T. repens laevis, ſpathis diphyllis imbricatis. *Jacq. Hort. t.* 137.

Commelina (*criſtata*) corollis aequalibus, involucris ſpicatim imbricatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 62. *Fl. zeyl.* 32.

Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. *Herm. parad.* 148. *Raj. hiſt.* 566.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 314.

Kammförmige Tradeſcantie. W.

Habitat in Zeylona. ⊙ (v. v.)

Radix *annua.* Caules *teretes, laeves, ramoſi, diffuſi, repentes.* Folia *lanceolata, recurvata, laevia, baſi vaginantia vaginis ſtriatis.* Spathae *imbricatae, diphyllae, biflorae floribus ſeſſilibus, lunatae, ſex parium, ſecundae.* Calyx *corolla brevior.* Petala 3, *ovata, ſeſſilia, coerulea.* Filamenta *piloſa extus, pilis coeruleis articulatis.* Stylus *clavatus.* Stigma *tubuloſum, crenatum.*

17\. TRADESCANTIA *papilionacea.*

T. repens laevis, ſpathis triphyllis imbricatis. *Mant.* 61. 513. *Burm. ind.* 17. *t.* 7. *f.* 1. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 27.

Tillandſia (*decumbens*) foliis ovato - lanceolatis. *Forſk. deſcr.* 72. *n.* 25. β

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 315.

Schmetterlingsförmige Tradeſcantie. W.

Habitat in India. ⊙ *Burmann.* (v. ſ.)

Radix *fibroſa.* Caules *tripollicares, articulati, ad genicula radicantes.* Folia *lineari-lanceolata, ſubtus piloſa, erecta, ſeſſilia, baſi ſubciliata: Vagina latiuſcula, breviſſima.* Spatha *terminalis, cordata, deorſum complicata, margine ſubciliata; ſub hac* Foliola 2, *lanceolato-lunata, ſuperiori breviore; inter quae flos; carinae loco, inter praedicta 2 foliola alia proditura Spatha, etiamnum brevis, cum ſuis foliolis nondum conſpicuis; ſic refert Spatha florem papilionaceum.* Corolla *violacea* (*non coerulea*). Filamenta 6, *pilis articulatis apice globiferis, coerulea, apice longiora.* Caulis *viridis, nec rufeſcens: Ceterum ſimillima* Tr. criſtatae, *ut qui velit pro varietate habere poterit, ſed*

Tr. papilionacea *habet Stamina corollis longiora, quod non in* T. criſtata.

*608. MNASIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 544.

Spatha 2-valvis multiflora. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 1-petala, tubo breviſſimo, tridentata. *Antherae* foliolo terminatae. *Stigmata* 3 ſpiraliter contorta.

*1. MNASIUM *paludoſum.*
Rapatea paludoſa. *Aubl. guj.* 1. *p.* 305. *t.* 118.*
Sumpf-Spathelkraut. W.
Habitat in ſylvis paludoſis Gujanae. ♃
Planta *habitu Pontederiis proxima ſed floris ſtructura aliena.* Folia *bipedalia, radicalia, lanceolata, infra medium anguſtata, baſi dilatata.* Scapi *radicales ſuperne incraſſati.* Spatha *bivalvi multiflora floribus longiore terminati.* Calyx *ſquamis imbricatis ſuffultus.* Corolla *flava.* W.

609. PONTEDERIA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 545.

Cor. 1-petala, 6-fida, bilabiata. *Stamina* 3, apici ſ. tubo corollae inſerta. *Capſ.* 3-locularis.

1. PONTEDERIA *rotundifolia.*
P. foliis orbiculato-cordatis. *Linn. ſuppl.* 192.
Rundblättrige Pontedere. W.
Habitat in Surinamo. *C. G. Dalberg.*
Folia *radicalia, petiolata, orbiculato-cordata ſ. reniformia obtuſa avenia.* Folium *caulinum unicum ex cujus petioli vagina exit pedunculus ſemiteres digitalis.* Spatha *monophylla ovata perſiſtens terminalis.* Spadix *hiſpidus.* Spica *pedunculata ovata, floribus pedicellatis, breviſſima, fere imbricata in capitulum.* Corolla *ſexfida inaequalis, facie et magnitudine floris neutri Centaureae cyani.* Stamina *ſex.* Germen *ſuperum triquetrum.* Stylus *ſimplex.*

*2. PONTEDERIA *azurea.*
P. foliis ſubrotundo-ellipticis, baſi petiolisque incraſſa-

tis, floribus ſpicatis. *Swartz. prod. p.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 609. *

P. aquatica caneſcens, foliis majoribus orbiculatis. *Brown. jam.* 195.

Himmelblaue Pontederie. W.

Habitat in foſſis Jamaicae. ♃

3. PONTEDERIA *vaginalis.*

P. foliis cordatis, racemo cernuo. *Burm. ind.* 80.

Plantaginis ſtellatae foliis, florum ſpica ex utriculo caulis erumpente. *Pluk. alm.* 215. *t.* 215. *f.* 4.

Olus paluſtre. *Rumph. amb.* 6. *p.* 178. *t.* 75. *f.* 1.

Carimgola. *Rheed. mal.* 11. *p.* 91. *t.* 44.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 316.

Scheidenblütige Pontedere. W.

Habitat in Indiae *orientalis aquoſis.* ♃ (v. ſ.)

Folia *radicalia, cordata, acuminata, nervoſa, laevia, petiolata*: Petioli *longiſſimi, ſupra medium parum dilatati ſ. vaginantes rima laterali.* Racemus *lateralis, ſimplex, folio brevior, e vagina petioli, erectus, abſoluta floreſcentia reflexus:* Flores 4 *ſ.* 5, *alterni, breviter pedicellati.* Petala 6. *Stamina* 6. Stylus *clavatus.* Germen *certe ſuperum.*

*4. PONTEDERIA *limoſa.*

P. foliis cordato-ovatis, ſcapis lateralibus unifloris, floribus triandris. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 611. *

Nymphaeae affinis planta paluſtris aquatica, flore hexapetalo ſtellato coeruleo. *Sloan. jam. hiſt.* 1. *t.* 149. *f.* 1.

Schlamm-Pontedere. W.

Habitat ad ripas limoſas fluviorum Jamaicae, Hiſpaniolae. ♃ (v. ſ.)

5. PONTEDERIA *cordata.*

P. foliis cordatis, floribus ſpicatis. *Loefl. it.* 54.* *Mill. dict. n.* 1.

P. floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 133. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 37. *Cold. noveb.* 69.

Gladiolus lacuſtris virginianus coeruleus, ſagittae folio. *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 12.

Sagittae ſimilis planta paluſtris virginiana, ſpica florum caerulea. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 8.

Plantagini aquaticae quodammodo accedens, floribus coeruleis hyacinthi ſpicatis. *Pluk. mant.* 152. *t.* 349. *f. ult.*

Houttuyn Linn. Pfl. Syſt. 6. *p.* 317.
Herzblättrige Pontedere. W.
Habitat in Virginiae *aquoſis.* ♃ (v. ſ.)

6. PONTEDERIA *haſtata.*
P. foliis haſtatis, floribus umbellatis. *Sp. pl.* 412. *Lin. ſuppl.* 192.*
P. floribus umbellatis. *Fl. zeyl.* 129. *Mill. dict. n.* 2.
Sagittae quodammodo ſimilis planta maderaſpatana, floribus medio caule quaſi ex utriculo prodeuntibus. *Pluk. alm.* 326. *t.* 220. *f.* 8. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 318.
Spontonblättrige Pontedere. W.
Habitat in India. ♃ (v. ſ.)

Huic Germen *ſuperum, ovatum.* Corolla *ſexpartita, aequalis.*

Corolla *hexapetala.* Filamenta *ſex, omnia baſi corollae inſerta, quorum unum calcaratum.* Antherae *luteae, una in filamento calcarato, reliquis major, coerulea.* Germen *ſuperum. Hanc obſervationem fecit amiciſſimus* Klein *in India orientali. In ſpecimine meo video eandem ſtructuram et ſtylum unicum longitudine antherae majoris et ſtigma obtuſum.* Linnaeus *filius perperam in ſupplemento l. c.* Stylos *tres breves indicavit, quos non obſervavi.* W.

Poſſideo varietatem e Java, foliis *ſagittatis obtuſis.* W.

610. HAEMANTHUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 546.

Involucr. polyphyllum, multiflorum. *Cor.* 6-partita, ſupera. *Bacca* 3-locularis.

1. HAEMANTHUS *coccineus.*
H. foliis linguiformibus planis laevibus humi adſpreſſis bifariis, umbella coarctata faſtigiata involucro breviori, limbo patulo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 403.
H. foliis linguiformibus planis laevibus. *Roy. lugdb.* 42. *Mill. dict. n.* 1.
H. foliis ſeſſilibus linguiformibus decumbentibus glabris. *Thunb. prod.* 59.
H. foliis obtuſis baſi truncatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 127. *t.* 64.

Narciſſus indicus puniceus. *Ferr. cult.* 137.
Narciſſus indicus ſerpentarius. *Hern. mex.* 885. *t.* 899.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 131.
Scharlachfarbige Blutblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*2. HAEMANTHUS *coarctatus.*

H. foliis linguiformi-oblongis planis laevibus apice calloſis erectis, umbella coarctata faſtigiata involucro breviori, limbo erecto. W.
H. (*coarctatus*) foliis lanceolatis glabris immaculatis, umbella coarctato-oblonga. *Iacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 30. *t.* 57. *
Gedrängtblütige Blutblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

3. HAEMANTHUS *puniceus.*

H. foliis oblongis ellipticis acutis retuſis undulatis, umbella coarctata faſtigiata, limbo ſtaminibusque erectis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 404.
H. foliis lanceolato-ovatis undulatis erectis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 88. *Roy. lugdb.* 42. *Mill. dict. n.* 3.
H. foliis petiolatis oblongis erectis undulatis glabris. *Thunb. prod.* 59.
H. colchici foliis, perianthio herbaceo. *Dill. elth.* 167. *t.* 140. *f.* 2. *Trew. ehret.* 44.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 134.
Dunkelrothe Blutblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*4. HAEMANTHUS *multiflorus.*

H. foliis elliptico-lanceolatis acutis concavis erectis, umbella multiflora involucro longiore, pedunculis articulatis, limbo patulo, ſtaminibus adſcendentibus. W.
Haemanthus multiflorus. *Martyn. monograph.*
Hyacintho affinis africana, caule maculato. *Seba. muſ.* 1. *p.* 20 *t.* 12. *f.* 1. 2. 3.
Satyrium e Guinea. *Swert. floril.* 1. *p.* 62. *f.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 491. *ſ.* 12. *t.* 12. *f.* 11. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 210. *f.* 3.
Vielblütige Blutblume. W.
Habitat in Sierra Leone. ♃

*5. HAEMANTHUS *tigrinus.*

H. foliis linguiformibus planis glabris margine ciliatis depreſſis, umbella coarctata, limbo, ſtaminibusque erectis. W.

H. (*tigrinus*) foliis oblongis ciliatis ſubtus maculatis, ſcapo maculato, umbella coarctata. *Jacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 29. *t.* 56.*
Getiegerte Blutblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*6. HAEMANTHUS *quadrivalvis.*

H. foliis oblongis baſi anguſtatis planis patulis ſuperne villoſis, margine ciliatis, involucro tetraphyllo umbella coarctata longiore, limbo ſtaminibusque erectis. W.
H. (*quadrivalvis*) foliis ſublanceolatis ciliatis ſupra villoſis ſubtus glabris, involucro campanulato quadrivalvi. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p* 30. *t.* 58.
Vierblättrige Blutblume. W.
Habitat ad Cap b. ſpei. ♃

Folia *ſuperne apicem verſus albo-villoſa, margine ciliata.* W.

7. HAEMANTHUS *pubeſcens.*

H. foliis oblongo-lanceolatis, undique hirſutis, umbella faſtigiato-rotundata, limbo ſtaminibusque erectis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 404.
H. foliis linguiformibus villoſis. *Linn. ſuppl.* 193.
H. foliis linguiformibus piloſis. *Thunb. prod.* 59.
Behaarte Blutblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*8. HAEMANTHUS *ciliaris.*

H. foliis lanceolatis glabris ciliatis, involucro lato umbella rotundata breviore, limbo reflexo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 404.
H. foliis linguiformibus ciliatis. *Sp. pl.* 413.
H. foliis oblongis ciliatis, corollae laciniis reflexis. *Thunb. prod.* 59.
Amaryllis (*ciliaris*) ſpatha multiflora, corolla ſexpartita reflexa, foliis ciliatis. *Linn. ſuppl.* 195.
Amaryllis (*ciliaris*) ſpatha multiflora, foliis ciliatis. *Sp. pl.* 422.
Amaryllis guttata. *Syſt. Veg. ed.* 13. *p.* 265.
Lilium africanum ſphaericum, floribus obſolete puniceis minoribus. *Herm. lugdb.* 357.
Bulbus oblongus aethiopicus, foliis guttatis et cilii inſtar piloſis. *Breyn. cent. t.* 39.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 133. 192.
Gefranzte Blutblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Variat figura foliorum, latitudine et longitudine, etiam ciliorum colore.

*9. HAEMANTHUS *albiflos.*

H. foliis ellipticis acutiuſculis planis glabris margine ciliatis, involucro tetraphyllo umbella rotundata breviore, limbo patulo. W.

H. (*albiflos*) foliis lanceolatis ciliatis, ſcapo hirſuto declinato. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 31. *t.* 59. *

Weiſſe Blutblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

10. HAEMANTHUS *toxicarius.*

H. foliis bifariis oblongis planiuſculis glabris, pedunculis ſpatha floreque longioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405.

H. foliis enſiformibus obliquis, limbi laciniis lanceolatis. *Thunb. prod* 59.

Amaryllis (*diſticha*) ſpatha multiflora, corollis aequalibus campanulatis, foliis diſtichis incumbenti-patentibus. *Linn. ſuppl.* 195. *Patterſ. itin. ed. germ.* 48. *t.* 1.

Giftige Blutblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. *in regione* Rogge-Veld. ♃ Flores *incarnati.*

*11. HAEMANTHUS *lanceaefolius.*

H. foliis ellipticis baſi attenuatis depreſſis planis glabris, margine ciliatis, pedunculis ſpatha floreque longioribus, limbo patente. W.

H. (*lanceaefolius*) foliis longe lanceolatis retrorſum ciliatis, ſcapo glabro, umbella faſtigiata involucro duplo longiore. *Jacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 31. *t.* 60 *

Lanzenblättrige Blutblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

12. HAEMANTHUS *carinatus.*

H. foliis linearibus carinatis. *Mill. dict. n.* 2. †

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 135.

Kielförmige Blutblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*13. HAEMANTHUS *pumilio.*

H. foliis lineari-lanceolatis erectis glabris, pedunculis ſpatharum florumque longitudine, limbo patenti. W.

H. (*pumilio*) foliis lineari-lanceolatis glabris falcatis, umbella pauciflora. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 32. *t.* 61. *

Kleine Blutblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*14. HAEMANTHUS *ſpiralis.*

H. foliis ſetaceis, ſcapo filiformi baſi ſpirali flexuoſo, involucris ſubulatis umbella uni-quadriflora brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405.

H. ſcapo filiformi ſpirali, foliis filiformibus. *Thunb. prod.* 58.

Crinum (*tenellum*) ſpatha multiflora, ſcapo inferne ſpirali, foliis filiformibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 363. *Collect. ſuppl. p.* 43.*

Fadenblättrige Blutblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

611. MASSONIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 552.

Cor. infera limbo 6-partito. *Filamenta* collo tubi impoſita. *Capſula* 3-alata 3-locularis polyſperma.

1. MASSONIA *latifolia.*

M. foliis ſubrotundis patentibus, laciniis corollae patulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405. *t.* 3.

M. foliis orbiculatis glabris. *Linn. ſuppl.* 193.

M. foliis rotundato-ovatis glabris. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl. gen.* 2. *p.* 40.*

Breitblättrige Maſſonie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in regione* Rogge-Veld. ♃

Folia *radicalia bina laevia.* Flos *aggregatus exſcapus.* Fructus *non baccatus, ſed capſula membranacea, alius Haemanthus eſſet.*

2. MASSONIA *anguſtifolia.*

M. foliis oblongo-lanceolatis erectis, laciniis corollae reflexis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 405. *t.* 4.

M. foliis lanceolato-oblongis glabris. *Linn. ſuppl.* 193.

M. (*lanceolata*) foliis lanceolatis integris glabris. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl. gen.* 2. *p.* 40.*

Schmalblättrige Maſſonie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummo monte* onderſte Rogge-Veld. ♃

*3. MASSONIA *undulata.*

M. foliis lanceolatis undulatis glabris. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl. gen.* 2. *p.* 41.*

Wellenblättrige Maſſonie. W.

Habitat in Cap. b. ſpei *interioribus regionibus.* ♃

Folia *radicalia* 3, 4 *vel* 5 *inferne valde anguſtata enſiformi-lanceolata undulata erecta glabra digitalia.* Scapus *erectus ſenſim incraſſatus glaber pollicaris.* Flores *terminales umbellati.* Pedunculi *breviſſimi uniflori.* Thunb. Diſſ. l. c.

4. MASSONIA *echinata.*

M. foliis ovatis muricatis piloſis. *Linn. ſuppl.* 193. *Thunb. prod.* 60. *Diſſ. Nov. pl. gen.* 2. *p.* 41.*

Scharfblättrige Maſſonie. W.

Habitat in Cap. b. ſpei, *ad margines montis* Bocklands-Berg. ♃

Folia *radicalia* 2 *ovata obtuſa cum acumine integra plana depreſſa tota ſupra tuberculis muricata piloſa, pilis ſparſis albis, pollicaria.* Scapus *nullus vel breviſſimus.* Flores *glomerati inter folia.* Thunb. Diſſ. l. c.

612. GALANTHUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 547.

Petala 3, concava. *Nectarium* ex petalis 3, parvis, emarginatis. *Stigma* ſimplex.

1. GALANTHUS *nivalis.*

Galanthus. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 73. *Roy. lugdb.* 35. *Mill. dict. Jacq. auſtr. t.* 330. *Kniph. cent.* 1. *n.* 34. *Knorr del.* 1. *t.* S. 15. *n.* 2. *Roth. germ. I.* 144. *II.* 378. *Hoffm. germ.* 114.

Galanthus uniflorus, petalis alternis cordatis. *Hall. helv. n.* 1254.

Leucojum bulboſum trifolium minus. *Bauh. pin.* 56. *Dod. cor.* 200.

Leucojum bulboſum praecox minus. *Cluſ. pann.* 181. 182.

Erangelia. *Reneal. ſpec.* 97. *t.* 96.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 136.

Gemeines Schneeglöckchen. W.

Habitat ad radices Montium Veronae, Tridenti, Germaniae, Carniolae, Viennae. ♃ (v. v.)

613. LEUCOIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 548.

Cor. campaniformis, 6-partita, apicibus incraſſata. *Stigma* ſimplex.

1. LEUCOIUM *vernum.*

L. ſpatha uniflora, ſtylo clavato. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. auſtr. t.* 312. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 15. *n.* 1. *Roth. germ. I.* 144. *II.* 378. *Hoffm. germ.* 114.

Galanthus uniflorus, petalis ſubaequalibus. *Hall. helv. n.* 1253.

Leucojum. *Hort. cliff.* 135. *Hort. upſ.* 74. *Roy. lugdb.* 35.

L. bulboſum vulgare. *Bauh. pin.* 55. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 95. *f.* 1.

L. bulboſum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 169.

Narciſſus VII. Matthioli. *Camer. epit.* 957. R.

L. bulboſum hexaphyllon. *Dodon. coron. p.* 202. *hiſt.* 230. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 138.

Frühlings Knotenblume. W.

Habitat in Germaniae, Helvetiae, Italiae *umbroſis pratis ad rivulos.* ♃ (v. v.)

Culmus *raro biflorus.* R.

2. LEUCOIUM *aeſtivum.*

L. ſpatha multiflora, ſtylo clavato. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. auſtr. t.* 202. *Scop. carn. n.* 393. *Hoffm. germ.* 114.

L. bulboſum majus ſ. multiflorum. *Bauh. pin.* 55.

L. bulboſum ſerotinum majus. 1. *Cluſ. hiſt. p.* 170.

Polyanthemum. *Renealm. ſpec.* 99. *t.* 100.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 139.

Sommer Knotenblume. W.

Habitat in Pannonia, Hetruria, Monſpelii, Auſtria. ♃ (v. v.)

Folia hujus lata ut in L. verno, nec filiformia ut in L. autumnali.

3. LEUCOIUM *autumnale.*

L. ſpatha multiflora, ſtylo filiformi. *Loefl. it.* 136. *Kniph. cent. n.* 39.

L. bulboſum autumnale. *Bauh. pin.* 56.

L. bulboſum autumnale tenuifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 170.

Tricophyllum. *Reneal. ſpec.* 101. *t.* 100.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 139.
Herbſt Knotenblume. W.
Habitat in Luſitania. ♃

*614. STRUMARIA.

Jacq. Collect. ſuppl. 45.

Cor. hexapetala patens. *Styl.* infra medium incraſſatus ſ. cum filamentis cohaerens. *Stigma* 3-fidum. *Capſ.* infera ſubrotunda 3-locularis.

*1. STRUMARIA *linguaefolia.*

S. foliis lineari-enſiformibus rotundato-obtuſis planis, ſcapo tereti, ſuperne compreſſo, ſtaminibus longitudine corollae. W.

S. (*linguaefolia*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque acuta, foliis linguaeformibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 356. *Collect. ſuppl.* 45.*

Zungenblättrige Kropflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Spathae *binae pedunculis duplo breviores lanceolatae rubicundae.* Corolla *candida externe apicibus vireſcens.* Stylus *triſulcato-incraſſatus, ſulcis utrinque attenuatis.* Filamenta *baſi ſtyli adnata.* W.

*2. STRUMARIA *truncata.*

S. foliis lineari-enſiformibus rotundato-obtuſis planis, ſcapo compreſſo, ſtaminibus corolla longioribus. W.

S. (*truncata*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata ſuperne truncata, foliis linguaeformibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 357. *Collect. ſuppl.* 47.*

Abgeſtutzte Kropflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Spathae *binae ovato-acuminatae pedunculis breviores rubicundae.* Corolla *candida externe baſi rubicunda.* Stylus *triſulcato-incraſſatus, ſulcis baſi attenuatis, ſuperne truncatis.* Filamenta *baſi ſtyli adnata. Simillima praecedenti, ſed* umbella *multiflora magis patula, pedunculis longioribus,* ſcapo, ſtylis, *longitudineque* ſtaminum *diſtincta.* W.

*3. STRUMARIA *rubella.*

S. foliis linearibus oblique flexis, petalis planis. W.

S. (*rubella*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata utrinque

acuta, foliis linearibus obliquis. *Jacq. ic. rar. 2. t. 358. Collect. ſuppl. 46.**
Röthliche Kropflilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃.
Spathae *binae violaceae longitudine fere pedunculorum.* Flores *ſubnutantes.* Corolla *incarnata.* Stylus *triſulcato-incraſſatus utrinque attenuatus.* Filamenta *baſi ſtyli adnata.* W.

*4. STRUMARIA *undulata.*
S. foliis linearibus oblique flexis, petalis undulatis. W.
S. (*undulata*) ſtyli ſtruma a filamentis libera, petalis undulatis, foliis late linearibus ſubobliquis. *Jacq. ic. rar. 2. t. 360. Collect. ſuppl. 50.**
Wellenförmige Kropflilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Spathae *binae ovato-acuminatae rubicundae pedunculis duplo breviores.* Corolla *alba apice rubicunda, petalis undulatis.* Stylus *triquetrus baſi incraſſatus.* Filamenta *non ſtylo adnata.* W.

*5. STRUMARIA *anguſtifolia.*
S. foliis linearibus planis, germine triglanduloſo. W.
S. (*anguſtifolia*) ſtyli ſtruma cum filamentis connata, glandulis tribus germini impoſitis, foliis linearibus. *Jacq. ic. rar. 2. t. 359. Collect. ſuppl. 48.* *
Schmalblättrige Kropflilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Spathae *binae ovato-lanceolatae rubicundae pedunculis duplo breviores.* Bracteae *capillares ad pedunculorum baſin.* Stylus *triſulcato-alatus incraſſatus, ſulcis ſuperne truncatis et dentenotatis atque cum filamentis cohaerentibus.* Corolla *candida, petalis externe linea rubicunda notatis.* Glandulae 3 *ſupra germen.* W.

6. STRUMARIA *filifolia.*
S. foliis filiformibus, petalis acutis. W.
S. (*filifolia*) ſtyli ſtruma a filamentis libera, foliis filiformibus. *Jacq. ic. rar. 2. t. 361.*
Leucoium (*ſtrumoſum*) ſpatha diphylla multiflora, floribus erectis, ſtylo baſi inflato globoſo. *Ait. Kew. 1. p. 407. t. 5.*
Leucoium (*ſtrumoſum*) ſpatha diphylla multiflora, ſtylo baſi inflato plicato, foliis lineari-filiformibus. *Thunb. prod. 58. Jacq. Collect. 3. p. 222.**

Crinum (*tenellum*) ſpatha multiflora, corollis aequalibus foliis filiformibus. *Linn. ſuppl.* 194. (*excluſo ſynonymo.*)
Fadenblättrige Kropflilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Radix *bulboſa.* Folia *omnia radicalia, baſi vagina incluſa, filiformia, parum compreſſa, glabra, ſcapo longiora.* Umbella *terminalis pauciflora.* Pedunculi *filiformes glabri inaequales unciales et biunciales.* Spatha *univerſalis bivalvis, valvulae lanceolatae membranaceae, altera ſemiuncialis, altera ter brevior.* Spatha partialis *nulla.* Petala 6 *alba oblonga lanceolata patentia, 3 lineas longa; tria* interiora *obtuſiuſcula,* exteriora *acuta carinata, carina obtuſa vireſcente.* Filamenta 6 *receptaculo inſerta ſubulata aequalia alba, petalis breviora.* Antherae *ſubrotundae parvae fuſcae.* Germen *inferum ſubgloboſum trigonum.* Stylus *baſi in corpuſculum germine majus, inferne plicatum, inflatus dein ſubulatus obtuſe trigonus longitudine ſtaminum.* Stigma *obſolete trifidum.* Capſula *ſubgloboſa glabra trigona, ſeu potius quaſi e tribus compoſita, trilocularis trivalvis.* Semina *plura.* Ait. l. c.

615. TULBAGIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 549.

Cor. Infundibulif. *Limbo* 6-fido. *Nectarium* coronans faucem, 3-phyllum: foliolis bifidis magnitudine limbi. *Capſ.* ſupera.

1. TULBAGIA *alliacea.*

T. nectario monophyllo ſexdentato. *Ait. Kew.* 1. *p.* 408
T. nectario monophyllo, foliis enſiformibus, floribus cernuis. *Thunb. prod.* 60.
T. foliis ſubfiliformibus. *Linn. ſuppl.* 193.
Tulbagia capenſis. *Mant.* 223. *Jacq. hort.* 2. *p.* 52. *t.* 115.
Knoblauchartige Tulbaghie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei, florens Auguſto. ♃

Dixi a Generoſiſſimo Dno. Tulbagh, *Capit. b. Sp. Gubernatore, qui facile omnes plantas capenſes miſit ad Burmannos.*

Statura *Galanthi.* Radix *bulboſa fibris plurimis, craſſis, ſubfuſiformibus.* Folia *radicalia, plurima, linearia,*

laevia. Scapus *foliis duplo longior.* Spatha *floribus* 5-7. Corolla *viridis, facie Hyacinthi orientalis:* Limbo *parvo acuto.* Nectarium *atro-purpureum, longitudine limbi.* Mant.

Radix *bulboſa.* Folia *radicalia plurima linearia ſubfiliformia, ſubcarnoſa.* Scapus *pedalis.* Spatha *umbellifera bivalvis.* Flores *cernui fuſco-purpurei.* Corolla *monopetala tubuloſa, baſi gibba.* Limbus 6-*partitus, laciniis linearibus obtuſis patulis longitudine tubi.* Nectarium *ori tubi impoſitum, 6-dentatum obſoletius obtuſum craſſum longitudine limbi.* Filamenta *nulla.* Antherae 6, *ſeſſiles ovatae didymae, ſuperiores* 3 *alternae, ſub apice nectarii, inferiores* 3 *in nectario, infra ſuperiores.* Germen *ſuperum.* Stylus *brevis.* Stigma *ſimplex obtuſum.* Capſula *ovata triangularis obtuſa trilocularis trivalvis.* Semina *plura compreſſa ſubtriangularia.* Folia *trita ſ. digitis fracta odorem alliaceum foetidum ſpirant, ut etiam T. cepaceae.* Suppl. l. c.

2. TULBAGIA *cepacea.*

T. nectario triphyllo. W.

T. nectario triphyllo, foliis linearibus, floribus erectis. *Thunb. prod.* 60.

T. foliis lanceolato-linearibus. *Linn. ſuppl.* 194. (*excluſis ſynonymis.*)

Zwiebelartige Tulbaghie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Radix *faſciculata.* Folia *radicalia* 2-4 *lanceolata linearia ſubcarnoſa.* Scapus *ſpithamaeus.* Spatha *umbellifera bivalvis.* Flores *erecti purpuraſcentes.* Corolla *monopetala tubuloſa baſi gibba.* Limbus 6-*partitus laciniis lanceolatis obtuſis patulis longitudine tubi.* Antherae *ſeſſiles infra os tubi, tres ſuperiores alternae. Differt a T. alliacea,* nectario *triphyllo, ſtatura minore.*

616. NARCISSUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 550.

Petala 6, aequalia: *Nectario* infundibuliformi, 1-phyllo. *Stam.* intra nectarium.

1. NARCISSUS *poëticus.*

N. ſpatha uniflora, nectario rotato breviſſimo ſcarioſo

crenulato. *Hort. upſ.* 74. *Scop. carn. n.* 394. *Mill. dict. n.* 2. *Knorr.* 1. *t. N.* 4. *Kniph. cent.* 7. *n.* 62. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 379. *Hoffm. germ.* 115.
Narciſſus anguſtifolius. *Curt. mag.* 193.
N. uniflorus, foliis enſiformibus, ſcypho breviſſimo. *Hall. helv. n.* 1250.
N. foliis enſiformibus, floris nectario rotato breviſſimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monſp.* 17.
N. albus, circulo purpureo. *Bauh. pin.* 48.
N. medio purpureus. *Dod. pempt.* 225.
β. Narciſſus medio purpureus multiplex. *Bauh. pin.* 54. *Kniph. cent.* 7. *n.* 61.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 150.
Rothrandige Narciſſe. W.
Habitat in G. Narbonenſi, Italia, Helvetia, Germania. ♃ (v. v.)

*2. NARCISSUS *incomparabilis.*

N. ſpatha uniflora, nectario campanulato plicato criſpo, petalis dimidio breviore, foliis planis. *Curt. mag.* 121.*
N. latifolius omnium maximus amplo calyce flavo ſive Nonpareille. *Park. theat.* 68.
Schöne Narciſſe. W.
Habitat in Hiſpania, Luſitania. ♃ (v. v.)
Accedit ad N. poëticum ſed folia *duplo latiora,* flores *majores,* petalis *flavis,* nectario *profunde flavo majore plicato-undulato.* W.

3. NARCISSUS *Pſeudo-Narciſſus.*

N. ſpatha uniflora, nectario campanulato erecto criſpo, aequante petala ovata. *Mill. dict. n.* 11. *Scop. carn.* 2. *p.* 295. *Grim. in Nov. Act. A. N. C. tom.* 3. *app. p.* 296. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 379. *Hoffm. germ.* 115.
N. foliis enſiformibus, ſcapo unifloro, ſcypho undulato, ſerrato, petalis aequali. *Hall. helv. n.* 1252.
N. foliis enſiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 74. *Sauv. monſp.* 17.
N. ſylveſtris pallidus, calyce luteo. *Bauh. pin.* 52.
N. luteus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 227. *f.* 12.
Bulbocodium vulgatius. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 593. R.
Narciſſus luteus. *Trag.* 757.
β. N. ſylveſtris multiplex, calyce carens. *Bauh. pin.* 54.

γ. N. luteus ſylveſtris, duplici ſ. triplici tubo aureo. *Bauh pin.* 54.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 152.
Gemeine Narciſſe. W.
Habitat in Galliae, Angliae, Hiſpaniae, Italiae *nemoribus*; *in* Germaniae *pratis*. ♃ (v. v.)

4. NARCISSUS *bicolor*.

N. ſpatha uniflora, nectario campanulato margine patulo criſpo aequante petala. *Gouan. illuſtr.* 22.
N. albus, calyce flavo, alter. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ* 2. *p.* 70. *f.* 7.
β. N. (*major*) foliis ſubtortuoſis, ſpatha uniflora, nectario campanulato patulo criſpo aequante petala. *Curt. mag.* 51. *
N. (*hiſpanicus*) ſcapo ancipiti exſtriato unifloro, nectario petalis aequali ſexfido patulo, lobulis dentatis. *Gouan. illuſtr.* 23. *
N. major totus luteus, calyce praelongo. *Bauh. pin.* 52 *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 71. *f.* 9.
N. major totus luteus, calyce praelongo alter. *Lob. ic.* 117.
N. ſylveſtris alia icon. *Dod. pempt.* 227.
Pſeudo-Narciſſus major hiſpanicus. *Cluſ. hiſt.* 165. *Swert. floril. p.* 21. *f.* 2.
Bulbocodium hiſpanicum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 594.
γ. N. Pſeudo-Narciſſus ſylveſtris multiplex calyce carens. *Bauh. pin.* 54. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 79. *f.* 10.
N. ſylveſtris multiplex involucro incluſus permanens. *Bauh. pin.* 54.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 133.
Zweyfarbige Narciſſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali*, *in* Pyrenaeis. ♃
Similis N. Pſeudo-Narciſſo, *ſed Petala alba*; *Nectarium ſaturate luteum, majus*: *limbo patulo, undulato, crenato.*

5. NARCISSUS *minor*.

N. ſpatha uniflora, nectario obconico erecto criſpo ſexfido, aequante petala lanceolata. *Sp. pl.* 415. *Curt. mag.* 6.
N. parvus totus luteus. *Bauh. pin.* 53. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 82. *f.* 11.
N. ſylveſtris pallidus minimus. *Barr. ic.* 796.

Pſeudo-Narciſſus minor hiſpanicus latifolius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 165.
Bulbocodium minus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 597.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 153.
Kleine Narciſſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♃ (v. v.)

Affinis maxime N. Pſeudo-Narciſſo, *ſed triplo omnibus partibus minor. Scapus vix ſtriatus. Spatha virens. Flos magis nutans. Petala baſi inter ſe diſtincta, lanceolata, recta, nec obliqua aut ovata. Nectarii margo ſexfidus, undulatus, criſpus.*

6. NARCISSUS *moſchatus.*

N. ſpatha uniflora, nectario cylindrico truncato ſubrepando, aequante petala oblonga. *Sp. pl.* 415.
N. totus albus, nutante flore, longa tuba. *Barr. ic.* 945. 946. 954. 953. 921. 922.
N. albus, calyce flavo, moſcari odore. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 69. *f.* 6. *et* 73. *f.* 15. 16.
N. flavus, tubo rotundo. *Bauh. pin.* 52. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 68. *f.* 3. 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 154.
Biſam Narciſſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♃

Nectarium cylindricum, ore obſolete repando, non dentato aut criſpo.

7. NARCISSUS *triandrus.*

N. ſpatha ſubuniflora nectario campanulato crenulato, dimidio breviore petalis, ſtaminibus ternis. *Sp. pl.* 416 *Curt. mag.* 48.
N. juncifolius, albo flore reflexo. *Cluſ. app. alt.*
N. albus, oblongo calyce. *Bauh. pin.* 53. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 72. *f.* 12.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 155.
Dreyfädige Narciſſe. W.
Habitat in Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Clariſſ. Curtis obſervavit ſtamina *ſex, quorum tria breviora vix longitudine tubi.* W.

Magnitudo N. poëtici, ſed folia dimidio anguſtiora, canaliculata. Spatha (mihi) uniflora. Corolla tota nivea. Petala ovato-oblonga. Nectarium campanulatum, corolla dimidio brevius margine recto inaequaliter crenulato. Stamina tri (mihi ut Cluſio), raro

ſex, quae tamen in quibusdam vidi individuis. Antherae luteae, nectario breviores.

8. NARCISSUS *orientalis.*

N. ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato trifido emarginato, petalis triplo breviore. *Mant.* 62.

N. niveus, calyce flavo, odoris fragrantiſſimi. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 52. *f.* 2. *Bauh. pin.* 50.

N. latifolius ſimplex medio luteus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 154.

β. N. orientalis, calyce rotundo aureo-luteo. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 54. *f.* 5. *Bauh. pin.* 50.

N. orientalis, medio croceus, major. *Besl. eyſt.*

γ. N. albus major odoratus. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 50. *f.* 1. *Bauh. pin.* 49.

N. latifolius major alter. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 155.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 155.

Orientaliſche Narciſſe. W.

Habitat in Oriente. ♃ (v. v.)

Species *latifolia, facie N. Tazettae.* Corolla *alba.* Nectarium *erectum, dimidio vel triplo petalis brevius, trifidum, flavum lobis emarginatis.* H. V.

Tubus *corollae ſemiteres, hinc planus, inde convexus.* W.

9. NARCISSUS *trilobus.*

N. ſpatha ſubmultiflora, nectario campanulato ſubtrifido integerrimo, petalis dimidio breviore. *Sp. pl.* 417.

N. anguſtifolius pallidus, calyce flavo. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 61. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 156.

Dreylappige Narciſſe. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

Similis N. Ionquillae, *ſed Nectarium cylindricum, longitudine plus, quam dimidiae petalorum, non criſpum, ſed obſolete trilobum.*

10. NARCISSUS *odorus.*

N. ſpatha ſubbiflora, nectario campanulato ſexfido laevi, dimidio petalis breviore, foliis ſemicylindricis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 311. *Curt. mag.* 76.

N. foliis junceis carinatis, ſcapo unifloro, ſcypho ſexies emarginato. *Hall. helv. n.* 1251. R.

N. ſcapo ancipiti unifloro exſtriato, nectario petalis duplo breviore erecto ſexfido crenulato, antheris reflexis. *Gouan illuſtr.* 23. R.

N. polyanthos, flore minore ſtellato toto luteo. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 60. *f.* 7.
N. anguſtifolius ſive juncifolius maximus amplo calyce. *Park. theat.* 89. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 156.
Wohlriechende Narciſſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃ (v. v.)
Flos luteus, triplo major flore N. Tazettae, *varians ſpatha uniflora et multiflora. Nectarium non fimbriatum, ſed ore diviſo lobis ſex obtuſis.*

*11. NARCISSUS *biflorus.*
N. ſpatha biflora, nectario breviſſimo ſcarioſo. *Curt. mag.* 197.
N. pallidus circulo luteo. *Bauh. pin.* 50.
N. medio luteus. *Dod. pempt.* 223. *f.* 2. *Gerar. herb.* 110. *f.* 6. *Park. theat.* 74. *t.* 75. *f.* 1.
N. latifolius claſſis altera. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 156. *absque icone.*
Zweyblütige Narciſſe. W.
Habitat in Hiſpania, Anglia. ♃ (v. v.)
Nectarium *ut in N. poëtico ſaturate flavum nec rubro marginatum.* Petala *pallide flaveſcentia fere albida.* Scapus *ſemper biflorus.* W.

12. NARCISSUS *calathinus.*
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato ſubaequante petala foliis planis. *Sp. pl.* 415.
N. ſpatha multiflora nectario campanulato ſubcrenato aequante petala, foliis planis. *Sp. pl.* 2. *p.* 415.
N. anguſtifolius flavus, magno caule. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 60. *f.* 5.
N. IX. anguſtifolius. 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 158.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 157.
Glockenförmige Narciſſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali,* Oriente. ♃
Simillimus N. Tazettae, *ſed Petala paulo majora et acutiora. Nectarium longitudine petalorum.*

13. NARCISSUS *Tazetta.*
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis alterne latioribus breviore, foliis planis. W.
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis breviore, foliis planis. *Mill. dict. n.* 8. *Knorr. del.* 1. *t. N.* 3.

N. foliis enſiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe breviore. *Hort. cliff.* 134.
N. medio luteus, copioſo flore: odore gravi. *Bauh. pin.* 50. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 57. *f.* 11.
N. luteus polyanthos luſitanicus. *Bauh. pin.* 50.
N. latifolius, flore prorſus albo 1, 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 155.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 157.
Tazetten Narciſſe. W.
Habitat in G. Narbonenſis, Luſitaniae, Hiſpaniae *maritimis ſubhumidis.* ♃ (v. v.)
Nectarium triplo brevius eſt petalis.
Tubus *corollae obtuſe triquetrus.* W.

*14. NARCISSUS *dubius.*
N. ſpatha multiflora, nectario campanulato truncato triplo petalis ovatis aequalibus breviore. W.
N. (*dubius*) ſpatha multiflora, petalis ovatis, nectario campanulato integerrimo petalis triplo breviore. *Gouan. illuſtr. p.* 22.
N. anguſtifolius totus albus. *Mag. bot.* 182. *Rudb. elyſ.* 2. *t.* 51. *f.* 2.
Zweifelhafte Narciſſe. W.
Habitat Monſpelii. ♃
Tazetta duplo humilior. Scapus *lineatus ſubanceps.* Folia 5-6, *linearia palmaria, ſcapo breviora, vix lineas* 3 *lata.* Flores *in loco natali ſaepius* 3, *in horto* 6-7. Spatha *longitudine pedicelli longioris, aut ipſo longior,* Petala *ovata uniformia, non vero interioribus minoribus anguſtioribusque, ut in quibusdam.* Nectarium *campanulatum album integerrimum triplo brevius petala.* Stamina 6. *In horto per plures annos colui, et ſolum florum copia variat.* Gouan. l. c.

15. NARCISSUS *Bulbocodium.*
N. ſpatha uniflora, nectario turbinato petalis majore, genitalibus declinatis. *Mill. dict. n.* 6. *Curt. mag.* 88.
N. foliis ſubulatis, nectario maximo patulo, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35.
N. montanus alter, flore fimbriato. *Bauh. pin.* 53.
N. montanus juncifolius, calyce aureo. *Bauh. pin.* 53. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 75. *f.* 5, 7.
Pſeudo-Narciſſus juncifolius 2, flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 166.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 159.

Aufrechte Narciſſe. W.
Habitat inter Ulyſſiponem *et* Hiſpalim. ♃ (v. v.)
A reliquis diſtinctiſſimus: flore *erecto*, nectario *magno turbinato integro*, ſtaminibus*que declinatis*. W.

16. NARCISSUS *ſerotinus.*

N. ſpatha uniflora, nectario ſexpartito breviſſimo, foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 417.
N. ſpatha uniflora, nectario breviſſimo ſexpartito. *Loefl. it.* 19. *Sp. pl.* 2. *p.* 417. *Mill. dict. n.* 7.
N. albus autumnalis minimus. *Bauh. pin.* 51. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 64. *f.* 8.
N. ſerotinus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 162.
N. autumnalis minor. *Cluſ. hiſt.* 251. *t.* 252.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 160.
Späte Narciſſe. W.
Habitat in Hiſpania, Italia, Barbaria. ♃

17. NARCISSUS *Ionquilla.*

N. ſpatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis ſubulatis. *Syſt. Veg.* 263. *Curt. mag.* 15.
N. ſpatha multiflora, nectario hemiſphaerico crenato, breviore petalis, foliis ſemiteretibus. *Spec.* 2. *p.* 417.
N. foliis ſubulatis, florum nectario breviſſimo. *Hort. cliff.* 134. *Roy. lugdb.* 35. *Sauv. monſp.* 19.
N. juncifolius luteus minor. *Bauh. pin.* 51.
N. juncifolius, oblongo calyce luteus major. *Bauh. pin.* 51.
N. juncifolius minor et 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 159.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 161.
Jonquillen - Narciſſe. W.
Habitat inter Hiſpalin *et* Gades, *inter* Guadaloupam *et* Toletum, *inque* Oriente *locis uliginoſis*. ♃ (v. v.)

617. PANCRATIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 551.

Petala 6: *Nectario* 12-fido. *Stam.* nectario impoſita.

1. PANCRATIUM *zeylanicum.*

P. ſpatha uniflora, petalis reflexis. *Fl. zeyl.* 126. *Mill. dict. n.* 3.
Narciſſus zeylanicus, flore albo hexagono odorato. *Herm. lugdb.* 691. *t.* 693. *Comm. hort.* 1. *p.* 75. *t.* 38. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 179. *f.* 7.

Lilium indicum. *Rumph. amb. 6. p. 161. t. 70 f. 2.*
Catulli-pola. *Rheed. mal. 11. p. - t. 40.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. p. 162.
Zeylaniſche Gilgen. W.
Habitat in India. ♃

2. PANCRATIUM *mexicanum.*
P. ſpatha biflora, foliis lanceolatis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, intermediis ſimplicibus. W.
P. ſpatha biflora. *Hort. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 34.
P. mexicanum, flore gemello candido. *Dill. elth.* 299. *t.* 222. *f.* 289.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 164.
Mexicaniſche Gilgen. W.
Habitat in Mexico. ♃

*3. PANCRATIUM *humile.*
P. ſpatha biflora, foliis filiformibus, nectarii dentibus ſex obtuſis bifido-emarginatis non ſtaminiferis. W.
P. (*humile*) ſpatha ſubbiflora, foliis ſubulatis tenuiſſimis, intus planis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 4. *t.* 207. *f.* 2.
Kleinſte Gilgen. W.
Habitat in Hiſpania. ♃
Florens absque foliis Octobri. W.

4. PANCRATIUM *caribaeum.* †
P. ſpatha multiflora, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 133. *Mill. dict. n.* 4.
P. foliis compreſſis obtuſis, ſcapo nudo, floribus umbellatis. *Brown. jam.* 194.
Narciſſus totus albus latifolius polyanthos major odoratus. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1. *p.* 244. *Mart. cent.* 27. *t.* 27.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 164.
Caraibiſche Gilgen. W.
Habitat in Iamaica, Caribaeis. ♃
Planta reſpectu dentium nectarii *formae nondum determinata.* W.

5. PANCRATIUM *maritimum.*
P. ſpatha multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus duodecim non ſtaminiferis. W.
P. ſpatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. *Sp. pl.* 418. *Mill. dict. n.* 1. *et t.* 197. *Cavan. ic.* 1. *p.* 41. *t.* 56. *
P. (*maritimum*) foliis linearibus glaucis, corollae tubo cylindraceo, ſuperne angulato, laciniis tubo brevioribus patenti-recurvis lineari-lanceolatis, baſi coronae ad-

natis, coronae ſinubus groſſe bidentatis. *Saliſb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 70. *t.* 9. *

P. (*verecundum*) ſpatha multiflora, foliis linearibus, corollae laciniis lanceolatis tubo brevioribus, ſinubus laciniarum nectarii ſtaminiferis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 412. *

P. (*carolinianum*) ſpatha multiflora, foliis linearibus, ſtaminibus nectarii longitudine. *Sp. pl.* 418.

Narciſſus maritimus. *Bauh. pin.* 5.

Lilio-Narciſſus albus maritimus minor. *Moriſ. hiſt* 2. *p.* 365. *ſ.* 4. *t.* 10. *f.* 28. *

Lilio-Narciſſus polyanthos flore albo. *Cateſb. carol.* 2. *app.* 5. *t.* 5.

Narciſſus zeylanicus flore albo hexagono odorato. *Commel. hort.* 1. *p.* 75. *t.* 38.

Lilium javanicum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 161. *t.* 70 *f.* 2.

Hemerocallis valentina. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 167.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 166. 168.

Meerſtrands Gilgen. W.

Habitat in Hiſpaniae *maritimis circa* Valentiam *et infra* Monſpelium, *inque* America *et* India *orientali.* ♃

Petala *lanceolata, ſubtus linea viridi: exteriora* 3, *apice introrſum uncinata.* Nectarium *angulis bipartitis acuminatis, longitudine filamentorum, et divaricatis ad latitudinem petalorum.* Germina *media umbellae ſeſſilia.* Stylus *declinatus.* Filamenta *inflexa.*

*6. PANCRATIUM *fragrans.*

P. ſpatha multiflora, foliis ellipticis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, intermediis nullis. W.

P. (*fragrans*) foliorum petiolis latis, corollae tubo ſexangulo eſtriato, laciniis tubo longioribus recurvis linearibus, alternis concavioribus, ſinubus repando-emarginatis. *Saliſb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 72. *t.* 11. *

P. foliis ovatis acuminatis petiolatis, ſpatha multiflora, floribus minoribus candidis fragrantibus. *Trew. ehret. t.* 28. W.

Wohlriechende Gilgen. W.

Habitat in Barbados. ♃ (v. v.)

*7. PANCRATIUM *littorale.*

P. ſpatha multiflora, foliis lineari-lanceolatis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, ſpatio intermedio repando. W.

P. foliis lineari-lanceolatis glabris, corolla tubo triangulo ſeptem ſeu octo-pollicari, laciniis tubo brevioribus

baſi coronae adnatis recurvis linearibus, coronae ſinubus repandis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 74. *t.* 13. *

P. ſpatha multiflora, foliis lanceolato-linearibus bifariis, corollae laciniis linearibus tubo brevioribus, nectario ſubintegro. *Ait. Kew.* 1. *p.* 412.

P. ſpatha multiflora, ſcapo compreſſo, ancipiti, corollae laciniis tubo duplo brevioribus, foliis enſiformibus. *Jacq. amer.* 99. *t.* 179. *f.* 94. * *Jacq. hort.* 3. *p.* 41. *t.* 75.

P. foliis enſiformibus, ſpatha multiflora, floribus magnis candidis fragrantibus. *Trew. ehret. p.* 6. *t.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 165.

Ufer-Gilgen. W.

Habitat in inſula Terra Bomba *dicta* Americes *calidioris.* ♃

*8. PANCRATIUM *ſpecioſum.*

P. ſpatha multiflora, foliis ellipticis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, intermediis ſimplicibus acutis. W.

P. foliorum petiolis anguſtis, corollae tubo triangulo raro ſtriato, laciniis tubo longioribus patenti-recurvatis linearibus, alternis concavioribus, coronae ſinubus ligula bifida. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 73. *t.* 12. *

Schöne Gilgen. W.

Habitat - - - ♃

Interdum unus dentium nectarii leviſſime bifidus. W.

*9. PANCRATIUM *amoenum.*

P. ſpatha multiflora, foliis elliptico-lanceolatis, nectarii dentibus ſex ſtaminiferis, intermediis acutis bipartitis. W.

P. (*amoenum*) foliis lanceolatis glabris, corollae tubo teretiuſculo denſe ſtriato, laciniis tubo longioribus recurvis linearibus aequaliter concavis, coronae ſinubus ligula bifida. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 71. *t.* 10. *

P. (*declinatum*) ſpatha multiflora, ſcapo compreſſo ancipiti, corollae laciniis tubum excedentibus, foliis lingulatis. *Iacq. amer.* 99. * *Iacq. hort.* 3. *p.* 11. *t.* 10.

Narciſſus americanus flore multiplici albo hexagono odorato. *Commel. hort.* 2. *p.* 173. *t.* 87.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 168.

Angenehme Gilgen. W.

Habitat in Gujana. ♃

10. PANCRATIUM *illyricum.*

P. ſpatha multiflora, foliis lanceolatis, nectarii dentibus ſex acutis bifidis non ſtaminiferis. W.

P. ſpatha multiflora, foliis enſiformibus, ſtaminibus nectario longioribus. *Roy. lugdb.* 34. *Mill. dict. n.* 2.

P. (*ſtellare*) foliis ſpathulaeformibus glaucis, corollae tubo triangulo, laciniis tubo longioribus patentiſſimis lanceolatis, coronae ſinubus profunde bifidis in ſtellam patentiſſimam. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 74. *t.* 14.

Narciſſus illyricus liliaceus. *Bauh. pin.* 55. *Seb. theſ.* 1. *p.* 17. *t.* 8. *f.* 1.

Lilionarciſſus hemerocallidis facie. *Besl. eyſt. vern.* 3. *t.* 16. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 169.

Illyriſche Gilgen. W.

Habitat in Galliae *maritimis.* ♃ (v. ſ.)

11. PANCRATIUM *amboinenſe.*

P. ſpatha multiflora, foliis cordato-ovatis acutis, nectarii dentibus ſex acutis bifidis non ſtaminiferis. W.

P. ſpatha multiflora, foliis ovatis nervoſis petiolatis. *Sp. pl.* 419. *Mill. dict. n.* 5.

Narciſſus amboinenſis, folio latiſſimo rotundo, floribus niveis inodoris. *Comm. hort.* 1. *p.* 77. *t.* 39. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 238. *f.* 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 169.

Amboiniſche Gilgen. W.

Habitat in Amboina. ♃

618. CRINUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 553.

Cor. ſupera infundibuliformis ſemiſexfida: tubo filiformi, limbo patulo recurvato: laciniis ſubulatis canaliculatis. *Filamenta* fauci tubi inſerta diſcreta.

1. CRINUM *aſiaticum.*

C. foliis linearibus acuminatis carinatis, floribus ſeſſilibus, tubo limbo longiore, ſpatha diphylla. W.

C. foliis carinatis. *Fl. zeyl.* 127. *Mill. dict. t.* 110. *Osb. it.* 94.

C. radice bulboſa, foliis carinatis. *l'Hérit. ſert. angl.* 8.
Amaryllis bulbiſperma. *Burm. prod.* 9.
Lilium zeylanicum bulbiferum et umbelliferum. *Herm. lugdb.* 682. *t.* 683. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 182. *f.* 10.
Radix toxicaria. *Rumph. amb.* 11. *p.* 155. *t.* 69.
Bellutta pola taly. *Rheed. mal. p.* 75. *t.* 38. *Rudb. elyſ.* 2. *t.* 90.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 172.
Aſiatiſche Hakenlilie. W.
Habitat in Malabaria, Zeylona, America. ♃
Folia *bifaria equitantia.* Corolla *purpuraſcens marginibus albis.* Stamina *declinata.* Bulbi *intra capſulas generantur.*

2. CRINUM *americanum.*

C. foliis oblongo-lanceolatis, margine glaberrimis, apice coarctato-unguiculato, floribus pedicellatis, tubo limbo breviore. *Ait. Kew.* 1. *p.* 413.
C. radice faſciculari. *l'Hérit. ſert. angl.* 8.
C. corollarum apicibus introrſum uncinatis. *Sp. pl.* 419. *Mill. dict. n.* 3.
Crinum. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 76. *Roy. lugdb.* 37.
Lilio-Aſphodelus americanus ſempervirens maximus polyanthus albus. *Comm. rar.* 14. *t.* 14. *Dill. elth.* 194. *t.* 161. *f.* 195.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 176.
Amerikaniſche Hakenlilie. W.
Habitat in America. ♃ (v. v)

*3. CRINUM *erubeſcens.*

C. foliis lanceolatis cartilagineo-crenatis apice producto explanato, floribus ſeſſilibus, tubo limbo longiore. *Ait. Kew.* 1. *p.* 413.
C. (*Commelini*) corollarum apicibus introrſum uncinatis, foliis linearibus canaliculatis, ſcapo ſubquadrifloro. *Jacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 40. *t.* 202.*
Crinum americanum. *Sp. pl.* 419.
Lilio-Aſphodelus americanus ſempervirens minor albus. *Commel. rar.* 15. *t.* 15.
Kleine Hakenlilie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♃ (v. v.)
Margo foliorum *interdum tenuiſſime cartilagineo-crenatus, vix absque lente viſibilis.* W.

*4. CRINUM *bracteatum.* W.

C. foliis oblongo-lanceolatis baſi attenuatis, margine cartilagineis glabris, apice ſubcalloſis; floribus pedicellatis, tubo limbo breviore, ſpathis numeroſis tubo longioribus. W.

Beblätterte Hakenlilie. W.

Habitat - - - - ♃ (v. v.)

Diſtinctum petalorum *laciniis anguſtis reflexis canaliculatis apice unguiculatis*, bracteis *ſeu* ſpathis *oblongo-lanceolatis*. Corolla *alba*. W.

*5. CRINUM *nervoſum.*

C. foliis ſubrotundis nervoſis, filamentis baſi dilatatis. *l'Herit. ſert. angl.* 8.

Caepa ſylveſtris. *Rumph. amb.* 6. *p.* 160. *t.* 70. *f.* 1.

Breitblättrige Hakenlilie. W.

Habitat in Philippinis. ♃

Folia *cordato-rotundata integra acuminata, nervis concentricis.* Scapus *multiflorus polyphyllus.* Flores *longius pedunculati.* Corollae *infundibuliformes, tubo filiformi, limbo ſexpartito, laciniis lanceolatis acutis patentibus.* Filamenta *fauci inſerta, laciniis oppoſita brevioraque, baſi ampliata lata libera, recta nec declinata mihi viſa.* l'Herit. l. c.

*619. AGAPANTHUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1742.

Corolla infera infundibuliformis regularis ſexpartita.

1. AGAPANTHUS *umbellatus.*

A. ſcapo foliis linearibus longiore, floribus umbellatis, tubo breviſſimo. W.

Agapanthus umbellatus. *l'Herit. ſert. angl.* 18. *Ait. Kew.* 1. *p.* 414.

Mauhlia africana. *Dahl. obſ.* 26.

Mauhlia (*linearis*) foliis linearibus ſcapo brevioribus. *Thunb. prod.* 60.

Crinum (*africanum*) foliis ſublanceolatis planis, corollis obtuſis. *Sp. pl.* 419. *Mill. dict. n.* 1. *Knorr. del.* 1. *t. L.* 10.

Polyanthes floribus umbellatis. *Vir. cliff.* 29. *Hort. cliff.* 126. *Roy. lugdb.* 27. *Mill. ic. t.* 210.

Tulbaghia Heiſteri. *Fabr. helmſt.* 4.

Tulbaghia. *Heiſt. Brunſw.* 10.
Hyacinthus africanus tuberoſus flore caeruleo umbellato *Breyn. prod.* 1. *p.* 39. *ic.* 23. *t.* 10. *Comm. hort.* 2. *p* 133. *t.* 67. *Seb. theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 4.
Hyacintho affinis tuberoſa radice africana, umbella coerulea inodora. *Pluk. alm.* 187. *t.* 195. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 180.
Doldenblütige Schmucklilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*2. AGAPANTHUS *enſifolius.*

A. ſcapo foliis lanceolatis breviore, floribus racemoſo-umbellatis, tubo limbo triplo breviore. W.
Mauhlia (*enſifolia*) foliis lanceolato-enſiformibus, ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 60. *t.* 3.
Schwerdblättrige Schmucklilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*620. EUSTEPHIA.

Cavan. icon. 3. *p.* 20.

Cor. ſupera tubuloſa cylindracea bifida. *Nectar.* foveae 6 in tubo corollae. *Filamenta* tricuſpidata, diſcreta.

*1. EUSTEPHIA *coccinea.*

Euſtephia coccinea. *Cavan. ic.* 3. *p.* 20. *t.* 238. *
Scharlachrothe Glockenlilie. W.
Habitat - - - - ♃

Planta habitu Cyrtanthi, ſed nectariis *et* ſtaminibus *diſtincta.* Folia *linearia obtuſa ſcapo breviora.* Flores *coccinei quatuor nutantes umbellati.* Spatha *tetraphylla colorata marceſcens.* W.

*621. CYRTANTHUS.

Ait. Kew. 1. *p.* 414.

Cor. ſupera tubuloſa clavata ſexfida: laciniae ovato-oblongae. *Filamenta* tubo inſerta apice conniventia.

1. CYRTANTHUS *anguſtifolius.*

C. foliis linearibus canaliculatis, corollis cernuis, tubo cylindraceo. W.

C. foliis obtuſe carinatis rectis, floribus cernuis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 414. *Curt. mag.* 271.
Crinum (*anguſtifolium*) foliis linearibus obtuſis, corollis cylindricis, laciniis alternis intus glanduloſis. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.
Amaryllis (*cylindracea*) ſpatha multiflora, corollis infundibuliformibus, tubo elongato cylindrico ſubincurvo, foliis linearibus. *l'Herit. ſert. angl.* 15.
Schmalblättrige Bogenlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flores *anguſtiores purpurei*, tubo *curvato*.

*2. CYRTANTHUS *ventricoſus*. W.

C. foliis linearibus planis ſtrictis, corollis cernuis, tubo ventricoſo, ſtaminibus adſcendentibus. W.
Cyrtanthus (*anguſtifolius*) foliis ſubcanaliculatis erectis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 40. *t.* 76. (*excluſis ſynonymis.*)
Bauchige Bogenlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

A praecedente diſtinctiſſimus; foliis *anguſtioribus ſtrictis nec laxe erectis*, ſcapo *colorato*, tubo *corollae ventricoſo, nec cylindraceo ſurſum ſenſim ampliato*, limbo *plano, nec recto, denique* ſtaminibus *adſcendentibus*. W.

3. CYRTANTHUS *obliquus*.

C. foliis lanceolatis obtuſis planis oblique flexis, corollis pendulis tubo obverſe conico. W.
C. foliis planis obliquis, floribus pendulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 414. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 39. *t.* 75.*
Crinum (*obliquum*) foliis lanceolatis obliquis, laciniis corollae alternis extus glanduloſis. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.
Amaryllis (*umbella*) umbella reclinata, corollis incurvis infundibulo-tubuloſis, limbo ſexfido erecto, genitalibus incluſis. *l'Herit. ſert. angl.* 15. *t.* 16.
Groſsblütige Bogenlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃.

Flos *purpureus ſingularis foliis longis obliquis*.

622. AMARYLLIS.

Gen. pl. ed. Schreb. p. 554.

Cor. hexapetaloidea irregularis. *Filamenta* fauci tubi inſerta declinata inaequalia proportione vel directione.

* *Spatha uniflora.*

1. AMARYLLIS *lutea.*

A. ſpatha indiviſa obtuſa, flore ſeſſili, corolla campanulata erecta, baſi breve tubuloſa, ſtaminibus erectis, alternis brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 415.

A. ſpatha uniflora, corolla aequali, ſtaminibus ſtrictis. *Syſt. Veg.* 329.

A. ſpatha uniflora indiviſa, corolla aequali ſeſſili, ſtigmate ſimplici. *l'Herit. ſert. angl.* 9.

A. ſpatha uniflora, corolla aequali, ſtaminibos declinatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 240. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict. n.* 1.

Narciſſus autumnalis major. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 164.

Colchicum luteum 1. majus. *Bauh. pin.* 69.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 183.

Gelbe Amaryllis. W.

Habitat in Hiſpania, Italia, Thracia. ♃ (v. v.)

*2. AMARYLLIS *pumilio.*

A. ſpatha diphylla uniflora, corolla infundibuliformi aequali, laciniis revolutis, ſtaminibus inclinatis, alternis brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 415.

Zwerg-Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folium *radicale lineare inferne anguſtatum.* Scapus *teres palmaris vireſcens.* Flos *terminalis ſolitarius.* Spatha *diphylla: foliola lineari-ſubulata, baſi invicem amplexa, tubo corollae longiora, virentia.* Corolla *tubus infundibuliformis uncialis albidus externe lineis ſex elavatis notatus, interne lineis ſex rubris cum prioribus alternantibus.* Limbi *laciniae ovato-oblongae acutae reflexae tubo longiores, extus albidae intus lateritiae.* Filamenta *filiformia tubo infra faucem inſerta, apice inflexa albida, tria alterna breviora.* Antherae *oblongae incumbentes luteae.* Germen *oblongum.* Stylus *filiformis ſtaminibus longior albidus.* Stigma *trifidum, laciniae lineares rubicundae apice albae.* Ait. l. c.

***3. AMARYLLIS** *tubiſpatha.*

A. ſpatha monophylla tubuloſa bifida uniflora, pedunculo ſpatha duplo longiore. *l'Herit. ſert. angl.* 9.
Röhrenſcheidige Amaryllis. W.
Habitat in Bonaria. ♃

Scapus *uniflorus erectus quadripollicaris.* Spatha *medium fere ſcapum occupans tubuloſa cylindracea bifida, laciniis oppoſitis.* Flos *longius pedunculatus erectus.* Filamenta *alterna 3 breviora mihi viſa.* Folia *in ſpeciminibus Commerſonianis non exſtabant.* l'Herit. l. c.

***4. AMARYLLIS** *tubiflora.*

A. ſpatha uniflora diphylla, corolla infundibuliformi, tubo longiſſimo. *l'Herit. ſert. angl.* 10.
Lilio-Narciſſus croceus monanthos. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 29. *t.* 20.
Röhrenblütige Amaryllis. W.
Habitat in Limae, Chancaae *arenoſis.* ♃

Filamenta *aequalia dicit Dombejus, ſubaequalia mihi viſa.* l'Herit. l. c.

5. AMARYLLIS *Atamaſco.*

A. ſpatha bifida acuta, flore pedicellato, corolla campanulata ſubaequali erecta, baſi breve tubuloſa, ſtaminibus declinatis aequalibus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 416.
A. ſpatha uniflora, corolla aequali, piſtillo declinato. *Hort. cliff.* 135. *Gron. virg.* 36. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 3. *n.* 11.
A. ſpatha uniflora bifida, corolla ſubaequali, genitalibus declinatis. *l'Herit. ſert. angl.* 10.
Lilio-Narciſſus virginienſis. *Catesb. car.* 3. *p.* 12. *t.* 12.
Lilio-Narciſſus vernus anguſtifolius, flore purpuraſcente. *Barr. ic.* 904.
Lilio-Narciſſus liliflorus carolinianus, flore albo ſingulari cum rubedine diluto. *Pluk. alm.* 220. *t.* 42. *f.* 3.
Lilio-Narciſſus indicus pumilus monanthos albus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 266. *ſ.* 4. *t.* 24. *f.* 4.
Lilio-Narciſſus minimus foliis gramineis. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 94. *t.* 16.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 186.
Virginiſche Amaryllis. W.
Habitat in Virginia. ♃ (v. v.)

*6. AMARYLLIS *maculata.*

A. ſpatha uniflora diphylla lineari, flore pedunculato, genitalibus declinatis. *l'Herit. ſert. angl.* 10.

Gefleckte Amaryllis. W.

Habitat in Chili. ♃

Scapus *punctis lineatis maculatus.* Corolla *campanulata.* l'Herit. l. c.

*7. AMARYLLIS *chilenſis.*

A. ſpathi uni- ſeu biflora, ſubbifolia, floribus pedunculatis, foliis linearibus. *l'Herit. ſert. angl.* 11.

Lilio-Narciſſus monanthos coccineus. *Feuill. peruv.* 3. *t.* 21.

Chiliſche Amaryllis. W.

Habitat in Chili. ♃

Flores *A. Belladonnae aut reginae purpurei.* l'Hert. l. c.

*8. AMARYLLIS *clavata.*

A. ſpatha uniflora diphylla ſubulata, corolla clavata. *l'Herit. ſert. angl.* 11. †

Keilförmige Amaryllis. W.

Habitat in Africa *auſtrali.* ♃

Flos *pedicellatus.* Tubus *baſi anguſtus non dilatatus.* Limbus *breviſſimus.* Folia *non vidi, nec ſtamina obſervare licuit.* l'Herit. l. c.

9. AMARYLLIS *formoſiſſima.*

A. ſpatha indiviſa, flore pedicellato, corolla bilabiata nutante profunde ſexpartita, genitalibus declinatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 416.

A. ſpatha uniflora, corolla inaequali, petalis tribus, genitalibusque declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Hort. upſ.* 75. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 93. *t.* 6. *Roy. lugdb.* 56. *Mill. dict.* 3. *Kniph. cent.* 10. *n.* 4. *Knorr. del.* 1. *t. N.*

A. ſpatha indiviſa uniflora, corolla bilabiata ſexpartita, petalis inferioribus genitalibusque dependentibus. *l'Herit. ſert. angl.* 11.

Lilio-Narciſſus jacobaeus, flore ſanguineo nutante. *Dill. elth.* 195. *t.* 162. *f.* 196.

Narciſſus jacobaeus major. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 89. *f.* 10.

Narciſſus indicus, flore ſanguineo. *Swert. floril.* 28.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 186.

Schönſte Amaryllis. W.

Habitat in America ~~*meridionali, innotuit europaeis*~~ 1593. ♃ (v. v.)

Squamae totidem quot filamenta, e receptaculo ortae,

filamentorum baſi arcte adſident; an ſic in reliquis? Raro biflora evadit.

** *Spatha biflora.*

*10. AMARYLLIS *reginae.*

A. ſpatha ſubbiflora, pedicellis divaricatis, corollis campanulatis breve tubuloſis nutantibus, fauce tubi hirſuta, foliis lanceolatis patulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 416.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus undulatis, genitalibus declinatis. *Sp. pl.* 421. *Mill. dict. n.* 5. *ic. p.* 16. *t.* 24.

A. ſpatha ſubbiflora, corollis baſi tubuloſis campanulatis quinquepartitis, fauce tubi hirſuta. *l'Herit. ſert. angl.* 12. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 191.

Königliche Amaryllis. W.

Habitat in Caribaeis. ♃

Differt ab A. Belladonna marginibus petalorum undulatis, nec ad ungues recurvatis.

11. AMARYLLIS *purpurea.*

A. ſpatha ſubbiflora, corollis erectiuſculis baſi tubuloſis, fauce tubi glabra, foliis lineari-lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417.

Amaryllis elata. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 32. *t.* 62.*

A. (*ſpecioſa*) ſpatha ſubbiflora, corollis erectis baſi tubuloſis campanulatis ſemiquinquefidis, fauce tubi glabra. *l'Herit. ſert. angl.* 12.

Crinum (*ſpecioſum*) foliis enſiformibus, corollis campanulatis, tribus laciniis alternis calloſo-unguiculatis. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.

Purpurfarbene Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flores *ſanguineo-purpurei magni umbellati.*

12. AMARYLLIS *linearis.* †

A. foliis linearibus, corollis campanulatis, laciniis duabus anguſtioribus.

Crinum lineare. *Linn. ſuppl.* 195. *Thunb. prod.* 59.

Linienblättrige Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flores *magni albi.*

13. AMARYLLIS *equeſtris.*

A. ſpatha ſubbiflora, pedicellis erectis ſparſis brevioribus, tubo filiformi horizontali, limbo oblique patulo ſur-

ſum curvo, fauce piloſa. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 33. *t.* 63.*
Amaryllis dubia. *Lin. amoen. acad.* 8. *p.* 254.
Lilium americanum puniceo flore Belladonna dictum. *Herm. parad.* 194. *t.* 194.
Lilium rubicundum. *Merian. ſurinam.* 22. *t.* 22.
Ritter Amaryllis. W.
Habitat in America *calidiore.* ♃

*14. AMARYLLIS *reticulata.*
A. ſpatha ſubbiflora, corollis baſi tubuloſis nutantibus, fauce tubi glabra, ſcapo compreſſo, foliis oblongis baſi attenuatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417.
A. ſpatha ſubmultiflora, corollis nutantibus, baſi tubuloſis, limbo reticulatis, foliis oblongis. *l'Herit. ſert. angl.* 12.
Netzförmige Amaryllis. W.
Habitat in Braſilia. ♃
Petalis *transverſe venoſis diſtincta.* Faux *glabra.*

*15. AMARYLLIS *tatarica.*
A. ſpatha ſubbiflora, corollis ſubcampanulatis profunde ſexpartitis, lacinia ſuprema anguſtiſſima, inferiore obovata acuminata, foliis linearibus ſcapo longioribus. W.
Amaryllis tatarica. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 85. *t. D. f.* 1.* *mala.*
Tatariſche Amaryllis. W.
Habitat in Sibiria *circum lacum Inderienſem.* ♃ (v. ſ.)
Corolla *fere hexapetala.* Filamenta *corolla breviora tria breviora.*

* * * *Spatha multiflora.*

16. AMARYLLIS *Belladonna.*
A. corollis erectiuſculis hexapetalis laciniis planis, ſcapo compreſſo, foliis acute canaliculatis obtuſe carinatis glaberrimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 417.
A. floribus umbellatis pedunculatis ſubhexapetalis, foliis canaliculatis. *l'Herit. ſert. angl.* 12.
A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declinatis. *Hort. cliff.* 135. *Roy. lugdb.* 36. *Mill. dict n.* 6. *et ic. t.* 23.
Lilio-Narciſſus polyanthos, flore incarnato: fundo ex luteo albeſcente. *Sloan. jam.* 115. *hiſt.* 1. *p.* 244. *Seb. theſ.* 1. *p.* 25. *t.* 17. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 190.

Weſtindiſche Amaryllis. W.

Habitat in Caribaeis, Barbados, Surinamo. ♃ (v. ſ.)

Bulbus *viridis.* Scapus *teres, ſubcompreſſus.* Corolla *regularis, campanulata, incarnata fundo viridi-albicante.* Petala 3 *exteriora intus apice reverſo;* Pet. 3 *interiora baſi ciliata.* Stylus *ruber.*

*17. AMARYLLIS *vittata.*

A. floribus pedicellatis, corollis cuneiformi-infundibuliformibus, petalorum exteriorum rachibus interiorum margini adnatis, ſcapo tereti, ſtigmatibus ſulcatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 418. *Curt. mag.* 129.

A. ſpatha multiflora, floribus pedunculatis ſubhexapetalis, petalis exterioribus margine liberis. *l'Herit. ſert. angl.* 13. *t.* 15.

Bandirte Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei? ♃ (v. v.)

Petala *inferne connata in tubum carnoſum, ſed margines exteriorum ad baſin liberi.* l'Herit. l. c.

*18. AMARYLLIS *falcata.*

A. corollis pedunculatis erectis hexapetalis, ſcapo compreſſo longitudine umbellae, foliis planis humi adpreſſis margine falcatis albo-cartilagineo-crenatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 418.

A. floribus umbellatis longius pedunculatis ſexpartitis, foliis falcatis, margine cartilagineo muricato diſcolore. *l'Herit. ſert. angl.* 13.

Crinum falcatum. *Iacq. hort.* 3. *p.* 34. *t.* 60.*

Haemanthus (*falcatus*) foliis linearibus falcatis, corollae laciniis erectis lanceolatis. *Thunb. prod.* 58.

Sichelblättrige Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*19. AMARYLLIS *ornata.*

A. floribus ſeſſilibus, corollis baſi tubuloſis, tubo ſpathis limboque longiore curvo, limbi laciniis oblongis ariſtatis, lacinia infima divaricata, concava. *Ait. Kew.* 1. *p.* 418.

Zierliche Amaryllis. W.

Habitat in Guinea. ♃

20. AMARYLLIS *longifolia.*

A. floribus pedicellatis, ſpatha 12-20-flora, corollis baſi tubuloſis, tubo curvo brevi, limbi laciniis lanceolatis obtuſis, foliis lato-ſubulatis canaliculatis apice flaccidis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 419.

A. floribus umbellatis pedunculatis baſi tubuloſis ſexpartitis, foliis ſcapo duplo longioribus. *l'Herit. ſert. angl.* 13.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, ſcapo compreſſo longitudine umbellae. *Sp. pl.* 421. *Roy. lugdb.* 36. *Ehret. pict. t.* 13. *Mill. dict. n.* 7. *Jacq. ic.* 2. *t.* 362. *Collect.* 4. *p.* 205.*

Lilium africanum humile longiſſimis foliis, polyanthos ſaturato colore purpuraſcens. *Herm. parad.* 195. *t.* 195.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 192.

Langblättrige Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*21. AMARYLLIS *montana.*

A. corollis campanulatis aequalibus, laciniis alternis ariſtatis, genitalibus rectis corolla duplo brevioribus, ſcapo folioſo, foliis linearibus. W.

A. ſpatha multiflora, foliis lineari-ſubulatis, petalis alternis mucronatis, genitalibus erectis. *Billard. ic. pl. ſyr.* 2. *p.* 5. *t.* 1.*

Berg-Amaryllis. W.

Habitat in altis montibus Libani. ♃

Corolla *coerulea. Singularis* ſcapo *folioſo*, ſpatha *terminali multiflora et axillaribus unifloris.* W.

22. AMARYLLIS *zeylanica.*

A. ſpatha multiflora, corollis reclinatis, tubo filiformi longiſſimo, laciniis uncinatis. *l'Herit. ſert. angl.* 13.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, ſcapo tereti-ancipiti. *Sp. pl.* 421. *Roy. luggb.* 36.

A. (*bulbiſperma*) ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus, genitalibus declinatis, pericarpio bulbigero. *Burm. prod.* 19.

Crinum (*zeylanicum*) foliis ſcabro-dentatis, ſcapo compreſſiuſculo. *Syſt. Veg.* 263.

Lilio-Narciſſus africanus ſcillae foliis, flore niveo linea purpurea ſtriato. *Ehret. pict* 5. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 13.

Lilio-Narciſſus zeylanicus latifolius, flore niveo externe linea purpurea ſtriato. *Commel. hort.* 1. *p.* 73. *t.* 73.* *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 191. *f.* 9.

Tulipa javana. *Rumph. amb.* 5. *p.* 30. *t.* 105.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 176.
Zeylaniſche Amaryllis. W.
Habitat in India *orientali.* ♃

Statura *Crini americani.* Folia *ſcillae officinalis carnoſa, margine denticulato-ſcabra.* Spatha *bivalvis praeter ramenta aliquot interiora.* Germina *ſeſſilia.* Corollae *tubus ſcapo concolor rufeſcens.* Limbus *albus petalis lanceolatis recurvis, ſubtus rubro-carinatis.* Filamenta *et* ſtylus *ſanguinea.*

*23. AMARYLLIS *revoluta.*

A. floribus pedicellatis, corollis baſi tubuloſis, tubo filiformi brevi curvo, foliis linearibus anguſtis canaliculatis longis ab ortu flaccidis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 419.
A. ſpatha multiflora, corollis breviter pedicellatis baſi tubuloſis reclinatis, laciniis corollae revolutis, foliis linearibus. *l'Herit. ſert. angl.* 14.
Zurückgebogene Amaryllis. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *bipedalia ſemunciam lata canaliculata.* Scapus *pedalis.* Umbella 4-6 *flora.* Flores *ſuaveolentes.* Tubus *trigonus vireſcens inflexus.* Laciniae *biunciales intus albae extus ſecundum medium dilute rubentes, ad medium revolutae.* Ait. l. c.

*24. AMARYLLIS *latifolia.*

A. ſpatha multiflora, floribus pedicellatis baſi tubuloſis, foliis oblongo-lanceolatis. *l'Herit. ſert. angl.* 14.
Crinum (*latifolium*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſeſſilibus planis. *Sp. pl.* 419.
Sjovanna-pola-tali. *Rheed. mal.* 11. *p.* 77. *t.* 39. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 91. *f.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 171.
Breitblättrige Amaryllis. W.
Habitat in Indiae *orientalis arenoſis.* ♃ (v. ſ.)

Folia 3 *ſ.* 4 *digitos tranſverſos lata, a baſi ſenſim attenuata.* Antherae *filiformes lineares incumbentes, longitudine dimidii filamenti ſ. corollae.*

*25. AMARYLLIS *aurea.*

A. floribus pedicellatis erectiuſculis, corollis infundibuliformi-clavatis ſubhexapetalis, laciniis lineari-lanceolatis, genitalibus rectis, foliis linearibus erectis canaliculatis margine reflexo glabro. *Ait. Kew.* 1. *p.* 419.
A. ſpatha multiflora, corollis baſi tubuloſis ſexpartitis,

laciniis linearibus undulatis, genitalibus corolla longioribus. *l'Herit. ſert angl.* 14.

A. ſpatha multiflora, floribus pedicellatis fere ad baſin usque ſexpartitis, genitalibus declinatis, ramentis lanceolatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 38. *t.* 73.

Goldene Amaryllis. W.

Habitat in China. ♃ (v. v.)

Folia *linearia carinata margine parum reflexo ſesquipedalia vix unciam lata.* Scapus *parum compreſſus vix bipedalis.* Spatha *diphylla lanceolata marceſcens triuncialis* 5-9 *flora.* Pedicelli *inaequales longiores unciales ad baſin bractea ſuffulti membranacea lanceolata pedicellorum longitudine.* Corolla *infundibuliformis lutea.* Tubus *trigonus vix ſemiuncialis.* Limbi *laciniae lineari-lanceolatae apice incraſſatae ſubuncinatae duas cum ſemiuncia longae obtuſe carinatae, carinis vireſcentibus.* Filamenta *fauci inſerta recta, tria alterna corolla longiora, alterna breviora albida.* Antherae *lineari-oblongae rectae pallide luteſcentes.* Germen *ovatum obtuſe trigonum.* Stylus *filiformis rectus ſtaminibus longior albidus.* Stigma *tripartibile coccineum.* Ait. l. c.

26. AMARYLLIS *orientalis.*

A. ſpatha multiflora, floribus pedicellatis ſexpartitis pedunculis ſeſquibrevioribus irregularibus, germinibus cuneiformibus angulatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 420.

A. umbella multiflora, floribus longiſſime pedunculatis ſexpartitis, germinibus cuneiformi-triangularibus. *l'Herit. ſert. angl.* 14.

A. ſpatha multiflora corollis inaequalibus, foliis linguiformibus. *Sp. pl.* 422. *Büttn. cunon.* 215. *Mill. dict. n.* 11. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 39. *t.* 74. *

A. ſpatha multiflora, foliis ovato-oblongis obtuſis. *Roy. lugdb.* 37.

Lilio-Narciſſus indicus maximus ſphaericus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 568. *ſ.* 4. *t.* 10. *f.* 35.

Narciſſus indicus orientalis. *Swert. floril.* 31. *f.* 1.

Narciſſus indicus flore liliaceo ſphaericus. *Ferr. flor.* 125. *t.* 129. 131. 133.

Brunſvigia. *Heiſt. monog. c. fig.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 191.

Orientaliſche Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

27. AMARYLLIS *ſarnienſis.*

A. petalis linearibus planis, genitalibus rectiuſculis corolla longioribus, ſtigmatibus patulis revolutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 420.

A. ſpatha multiflora, corollis ſubhexapetalis lineari lanceolatis, genitalibus rectiuſculis exſertis. *l'Herit. ſert. angl.* 15.

A. ſpatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus erectis. *Hort. upſ.* 75. *Mill. dict. n.* 4.

A. ſpatha multiflora, corollis aequalibus patentiſſimis revolutis, genitalibus longiſſimis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 36.

Narciſſus japonicus rutilo flore. *Corn. canadenſ.* 157. *t.* 158. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 23. *f.* 14. *Ehret. ſelect. t.* 9. *f.* 3. *Kaempf. amoen.* 872. *Seb. muſ.* 1. *t.* 17. *f.* 3.

Lilium ſarnienſe. *Dugl. monogr. t.* 1. 2.

β. A. (*ſarnienſis*) ſpatha multiflora, corollis patentiſſimis apice reflexis, genitalibus rectiuſculis corolla longioribus, foliis enſiformi-linearibus. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 34. *t.* 66.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 193.

Japaniſche Amaryllis. W.

Habitat in Japonia, *nunc in Sarnia inſula* Angliae. β. *ad* Cap. b. ſpei. ♃

*28. AMARYLLIS *marginata.*

A. petalis oblongis revolutis, genitalibus rectiuſculis corolla longioribus, foliis lingulatis humi adpreſſis cartilagineo-marginatis. W.

A. ſpatha multiflora, corollis patentiſſimis et apice reflexis, pedicellis erectis, foliis ſublinguaeformibus proſtratis, cinctis margine colorato et verſus apicem undulato. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 34. *t.* 65.*

Gerandete Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *Haemanthi coccinei.* Flores *coccinei.* W.

*29. AMARYLLIS *curvifolia.*

A. petalis oblongis undulatis revolutis, genitalibus corolla longioribus rectiuſculis, foliis ſtrictis lineari-enſiformibus canaliculatis. W.

A. ſpatha multiflora, corollis revolutis undulatis, pedicellis erectis, foliis ſublinearibus late canaliculatis ſubfalcatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 33. *t.* 64. *

Krummblättrige Amaryllis. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

30. AMARYLLIS *undulata.*

A. petalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis corolla brevioribus, ſtigmata obſoleto. *Ait. Kew.* 1. *p.* 420.

A. ſpatha multiflora, corollis ſubhexapetalis linearibus canaliculatis undulatis, genitalibus deflexis corolla brevioribus. *l'Herit. ſert. angl.* 16.

A. ſpatha multiflora, corollis patulis, petalis undulatis mucronatis baſi dilatatis. *Syſt. Veg.* 264. *Jacq. hort.* 3. *p.* 11. *t.* 13.

Wellenförmige Amaryllis. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ *Dav. Royen.* (v. v.)

Scapus *cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo Geranii Zonalis.* Spatha *profert circiter* 12 *flores purpureos, petalis anguſto - lanceolatis, apice valde mucronatis; baſi ipſa ovata.* Stamina *declinata.*

*31. AMARYLLIS *radiata.*

A. petalis lanceolatis undulatis, genitalibus deflexis divergentibus corolla duplo longioribus, ſtigmate obſoleto. *Ait. Kew.* 1. *p.* 421.

A. ſpatha multiflora corollis ſubhexapetalis linearibus undulatis revolutis, genitalibus deflexis divergentibus, corolla duplo longioribus. *l'Herit. ſert. angl.* 16.

Lilio - Narciſſus V. *Seligm. aves. t.* 35.
Schneeglöckchenblättrige Amaryllis. W.
Habitat - - - - ♃

*32. AMARYLLIS *humilis.*

A. ſpatha tri - ſeu quadriflora, petalis lanceolatis ſubringenti - patentibus, apice undulato - reflexis, infimo divaricato, genitalibus adſcendentibus petalis brevioribus, foliis linearibus obtuſis glabris nudis planis. W.

A. ſcapis paucifloris, petalis patentibus, infimo divaricato; foliis linearibus obtuſis planis. *Jacq. hort. Schönb.* 1. *p.* 36. *t.* 69.*

Niedrige Amaryllis. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Simillima ſequenti, ſed ſcapo *et* foliis *duplo minoribus et notis indicatis diverſa.* W.

*33. AMARYLLIS *flexuoſa.*

A. ſpatha multiflora, petalis lanceolatis, ſubringenti-patentibus, apice undulato - reflexis, infimo divaricato,

genitalibus adſcendentibus petalis brevioribus, foliis linearibus obtuſiuſculis concavis puſtulato-punctatis. W.

A. ſpatha multiflora, petalis patentibus, infimo divaricato, foliis linearibus punctatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 35. *t.* 67.*

Gebogene Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *juniora albo-puſtulata, adultiora punctata, exſiccatione puncta evaneſcunt.* W.

*34. AMARYLLIS *Radula.*

A. ſpatha multiflora, petalis lanceolatis ſubringenti-patentibus planis, infimo divaricato, genitalibus adſcendentibus petalorum longitudine, foliis ellipticis humi adpreſſis puſtulato-ſcabris. W.

A. ſpatha multiflora, petalis patentiſſimis, infimo divaricato, foliis facie ad oras muricato-aſperis proſtratis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 35. *t.* 68.*

Raſpelblättrige Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃.

*35. AMARYLLIS *ſtriata.*

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis breve tubuloſis, laciniis planis apice reflexis, genitalibus adſcendentibus longitudine ſtaminum, foliis elliptico-ovatis erectis marginatis. W.

A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis aequalibus apice reflexis, foliis ſubovatis, dorſo ſtriatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 36. *t* 70.*

Geſtreifte Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*36. AMARYLLIS *criſpa.*

A. ſpatha pauciflora, petalis patentiſſimis oblongis obtuſis undulatis, ſtaminibus divaricatis corolla brevioribus, ſtylo recto, foliis lineari-filiformibus laxis. W.

A. ſpatha pauciflora, petalis patentiſſimis criſpis, foliis linearibus anguſtiſſimis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 37. *t.* 72.*

Krauſe Amaryllis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flores *omnium minutiſſimi.* W.

*37. AMARYLLIS *ſtellaris.*

A. ſpatha multiflora, corollis patentibus planis, tubo breviſſimo, ſtaminibus inaequalibus divaricatis corolla brevioribus, ſtylo recto, foliis linearibus erectis. W.

A. ſpatha multiflora, petalis patentiſſimis, tribus alternis infra medium barbatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 37. *t.* 71.*
Sternförmige Amaryllis. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*38. AMARYLLIS *caſpia.*
A. ſpatha multiflora, corollis campanulatis, tubo breviſſimo, filamentis erectis corolla longioribus, foliis lanceolatis undulatis. W.
Crinum caſpium. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 105. *Tab. Q.**
Caſpiſche Amaryllis. W.
Habitat in herbidis circa mare Caſpium *primo vere.* ♃
Non eſt Crini ſpecies ob defectum tubi longiſſimi filiformis. Spatha *eſt multiflora bivalvis.* Flores *albo-incarnati erecti parvi.* W.

*623. MILLEA.

Cavan. ic. p. 76.

Cor. infundibuliformis, limbo ſexpartito plano. *Antherae* fauci inſertae. *Germen* pedicellatum. *Capſula* ſupera.

*1. MILLEA *biflora.*
Milla biflora. *Cavan. ic.* 2. *p.* 76. *t.* 196.*
Zweyblütige Mille. W.
Habitat in Mexico. ♃
Bulbus *faſciculatus.* Folia *anguſta linearia canaliculata laxa.* Scapus *erectus biflorus.* Spathae *vel* bracteae *tres minutae.* Corolla *magna alba.* Facies *floris Siſyrinchi.* W.

624. BULBOCODIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 555.

Cor. infundibulif. hexapetala: unguibus anguſtis ſtaminiferis. *Capſ.* ſupera.

1. BULBOCODIUM *vernum.*
B. foliis lanceolatis. *Roy. lugdb.* 41. *Hort. cliff.* 133. *Mill. dict. n.* 2. *Retz. obſ.* 2. *p.* 17. *t.* 1.
Colchicum vernum hiſpanicum. *Bauh. pin.* 69. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 128. *f.* 2.
Colchicum vernum. *Cluſ. hiſt.* 2. *app.* 203.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 199.
Frühlings Uchtblume. W.

Habitat in Hiſpania, Ruſſia. ♃ (v. v)
Flores *interdum tetrapetali, tetrandri.* Pall. *it.* 3. *p.* 651. R.

625. APHYLLANTHES.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 556.

Cor. hexapetala. *Filamenta* fauci corollae inſerta. *Capſ.* ſupera. *Glumae* calycinae univalves imbricatae.

1. APHYLLANTHES *monſpelienſis.*
Aphyllanthes. *Hort. cliff.* 493. *Sauv. monſp.* 8.
A. monſpelienſium. *Lob. adv.* 190. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 336.
Caryophyllus coeruleus monſpelienſium. *Bauh. pin.* 209. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 562. *ſ.* 5. *t.* 25. *f.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 210.
Zarte Nelkenlilie. W.
Habitat Monſpelii *prope Caſtelneuf locis montoſis ſaxoſis ſterilibus.*
Radix *repens. Culmi nudi, ſimplices, cincti baſi vaginis uti Iuncus. Gluma bivalvis, biflora; Gluma propria etiam bivalvis. Iuncus eſſet, ſi Corolla careret.*

626. ALLIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 557.

Cor. 6-partita, patens. *Spatha* multiflora. *Umbella* congeſta. *Capſ.* ſupera.

* *Fol. caulina plana. Umbella capſulifera.*

1. ALLIUM *Ampeloprasum.*
A. caule planifolio umbellifero, umbella globoſa ſtaminibus tricuſpidatis, petalis carina ſcabris. *Sp. pl.* 423. *Hoffm. germ.* 115.
A. radice ſobolifera, foliis gramineis, ſpica ſphaerica, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1218. R.
A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus ſphaerice congeſtis, radice laterali ſolida. *Hall. all.* 5. *opuſc.* 344.
Porrum Ampeloprasum. *Mill. dict n.* 2.
Porrum radice laterali ſolida, foliis linearibus, caule erecto, umbella ſubgloboſa. *Roy. lugdb.* 40.
Allium ſphaerico capite, folio latiore ſ. Scorodopraſum alterum. *Bauh. pin.* 74. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 151.*

Scorodopraſum latifolium ſpontaneum italicum, floribus dilute purpureis odoratis. *Mich. gen.* 25. *t.* 24. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 203.
Breitblättriges Lauch. W.
Habitat in Oriente, *inque inſula* Holms *Angliae etc.* ♃
Stamina corolla paulo longiora. Synonymon *Micheli excludere jubet Linnaeus* (Syſt. *Veg.*); *citatur tamen ab Hallero.* R.

2. ALLIUM *Porrum.*

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. *Hort. upſ.* 77. *Mat. med. p.* 92.
A. radice abeunte tunicata, foliis gramineis, ſpica ſphaerica, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1217.
A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus ſphaerice congeſtis, radice tunicata cauli circumnata. *Hall. all.* 7.
Porrum radice ambiente tunicata oblonga ſolitaria. *Hort. cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Porrum commune capitatum. *Bauh. pin.* 72. *Blackw. t.* 421.
Porrum ſativum latifolium. *Bauh. pin.* 72.
Porrum ſativum. *Mill. n.* 1.
Porrum. *Camer. epit.* 321.
β. Porrum ſectile. *Matth.* 550. *Hall.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 204.
Gemeines Lauch. W.
Habitat in vineis Helvetiae. ♂ (v. v.)
Affinis nimium praecedenti et forte ſola varietas. Petala carina ſcabra.

3. ALLIUM *lineare.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis corolla duplo longioribus. *Mill. dict. n.* 4.
A. ſtaminibus alterne trifidis, radice tunicis reticulatis obducta. *Hall. all.* 9.
Porrum caule tereti folioſo, foliis linearibus planis, umbella globoſa, ſtaminibus corolla longioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 56. *t.* 13. *et* 14. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 206.
Linienblättriges Lauch. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

*4. **ALLIUM** *ſuaveolens.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella capitata, ſtaminibus ſubulatis corolla duplo longioribus. W.

A. (*ſuaveolens*) ſcapo nudo teretiuſculo, foliis linearibus carinatis, umbella ſubrotunda, ſtaminibus ſubulatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 364. *Collect.* 2. *p.* 305. *

Wohlriechendes Lauch. W.

Habitat in Auſtria. ♃ (v. ſ.)

*5. **ALLIUM** *deflexum.* W.

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, longitudine corollae, foliis anguſto-linearibus, ſcapo declinato. W.

Schiefſtieliges Lauch. W.

Habitat - - - - ♃ (v. v.)

Hoc ſub nomine A. linearis accepi, ab hoc vero valde diſtinctum; at convenit habitu cum ſequenti, ſed valde diverſum: ſcapo *adſcendenti deflexo, folio unico inſtructo, foliis anguſtiſſimis linearibus,* umbella *non capitata,* floribus *pallidioribus et* ſtaminibus *corollae longitudine.* W.

6. **ALLIUM** *rotundum.*

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, umbella ſubgloboſa, floribus lateralibus nutantibus. *Pollich. pal. n.* 325. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 379. *Hoffm. germ.* 115.

A. radice multiplici, foliis gramineis, ſpica ſphaerica, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1219. *de all.* 350. *n.* 8.

A. ſeu Moly montanum 5. *Cluſ. pann.* 216. 218. *Haller.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 207.

Rundes Lauch. W.

Habitat in Europa *auſtraliori, in* Thuringia, Palatinatu. ♃ (v. ſ.)

Stamina *corolla longiora.* Petala *atro-ſanguinea conniventia.* W.

7. **ALLIUM** *Victorialis.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Mat. med.* 92. *Mill. dict. n.* 17. *Jacq. auſtr. t.* 216. *Blackw. t.* 544. *Roth. germ. II.* 380.

A. radice oblonga, reticulo obducta, foliis ovato-lanceo-

latis, umbella ſphaerica. *Hall. helv. n.* 1229. *de all.* 20. R.
A. foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 39.
A. montanum latifolium maculatum. *Bauh. pin.* 74.
A. anguinum. *Cam. epit.* 329. *Matth.* 559.
A. alpinum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 566. R.
Victorialis longa. *Cluſ. pann.* 223. 224. *Hall.* R.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 208.
Netzwurzliches Lauch. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Italiae, Auſtriae, Sileſiae. ♃ (v. v.)
Huic Folia in toto genere latiſſima Colchici.

8. ALLIUM *ſubhirſutum.*
A. caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirſutis, ſtaminibus ſubulatis. *Osb. it.* 49. *Mill. dict. n.* 16.
A. foliis radicalibus ſubhirſutis, caulinis glabris, floribus umbellatis. *Hall. all.* 18.
A. foliis lanceolato-linearibus, florum umbella faſtigiata. *Roy. lugdb.* 39.
Moly anguſtifolium umbellatum. *Bauh. pin.* 75.
Moly dioſcoridis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 192.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 211.
Behaartes Lauch. W.
Habitat in Africa, Italia, Hiſpania, Oriente. ♃ (v. ſ.)

9. ALLIUM *magicum.*
A. caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus. *Mill. dict. n.* 6.
A. caule tereti, propagine ex ala, *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39. *Sauv. monſp.* 18.
A. foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. *Hall. all.* 19.
Moly latifolium liliflorum. *Bauh. pin.* 75.
Moly indicum, flore purpureo. *Swert. Fl.* 61.
β. Caucaſon. *Lob. ic.* 162.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 212.
Zauber Lauch. W.
Habitat - - - - ♃
Caulis teres, nudus, pedalis, infirmus. Folia radicalia canaliculata, ampla, obtuſa. Capitulum bulbiferum. Sauv.

10. ALLIUM *obliquum.*

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus filiformibus flore triplo longioribus, foliis obliquis. *Mill. dict. n.* 7. *Kniph. cent.* 9. *n.* 4.

Allium ramoſum. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 62. *Miſc.* 2. *p.* 308.*

A. radice tunicata, foliis planis linearibus caulinis, capitulo umbellato. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 49. *t.* 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 212.

Schiefblättriges Lauch. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Caulis *bipedalis, teres.* Folia *alterna, plano-canaliculata, obliqua: Vaginis teretibus.* Umbella *globoſa;* Spatha *globoſa, purpurea, acuminata.* Petala *ovata, erecta, concava, flava carina viridi.* Filamenta *albida, corolla duplo longiora. Antherae luteae.* Germen *ſubgloboſum.*

11. ALLIUM *ramoſum.*

A. caule ſubplanifolio umbellifero, ſtaminibus ſubulatis longioribus, umbella globoſa, foliis linearibus ſubconvexis. *Mill. dict. n.* 8. *Willich. obſ. bot. p.* 17.

A. umbellatum. *Hall. in Comm. Goett.* 1752. *p.* 337. *t.* 9. *et t.* 10. *f.* 2? *Willich.* R.

A. ſcapo nudo tereti farcto, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus corolla longioribus. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 52. *t.* 11. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 213.

Aeſtiges Lauch. W.

Habitat in Sibiria. *G. Demidoff.*

Caulis *ferme bipedalis, teres.* Folia *alterna, planiuſcula, canaliculata, ſubtus convexa, margine obtuſa.* Umbella *globoſa.* Petala *ovata, purpuraſcentia carina ſaturatiore.* Filamenta *purpurea, corolla parum longiora. Antheras violaceae.* Germen *ſubrotundum: maculis* 3, *viridibus. E medio caule ex ala folio oppoſita* Ramus *nudus, longitudine caulis.*

12. ALLIUM *tataricum.*

A. caule planifolio umbellifero, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus ſimplicibus, umbella plana. *Linn. ſuppl.* 196.

Tatariſches Lauch. W.

Habitat in Sibiria. ♃

Caulis *teres laevis ſemipedalis verſus baſin folioſus.*

Folia ſemicylindrica canaliculata laevia, vix caule breviora. Spatha *bivalvis ſubrotunda marceſcens.* Umbella *plana faſtigiata.* Corolla *plana alba; petalis lanceolatis ſubcarinatis.* Filamenta *baſi coalita petalis breviora.* Antherae *fuſcae.* Stylus *ſimplex albus longitudine ſtaminum.* Capſula *ſubrotunda obtuſa lateraliter triloba.*

13. ALLIUM *roſeum.*

A. caule planifolio umbellifero, umbella faſtigiata, petalis emarginatis, ſtaminibus breviſſimis ſimplicibus. *Syſt. Veg.* 266.

A. ſcapo nudo umbellifero, pedicellis brevibus, petalis ovalibus, ſtaminibus breviſſimis, foliis linearibus. *Sp. pl.* *p.* 432. *Mill. dict. n.* 9.

A. caule planifolio umbellifero, umbella faſtigiata, filamentis ſimplicibus baſi dilatatis. *Ger. prov.* 150.* *Gouan. monſp.* 166.

A. foliis enſiformibus, radice bulbillis ſtipata, floribus amplis umbellatis. *Sauv. monſp.* 42.

A. ſylveſtre ſ. Moly minus, roſeo amplo flore. *Magn. monſp.* 11. *t.* 10. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 214.

Roſenfarbenes Lauch. W.

Habitat Monſpelii, Pedemonti *in vineis.* ♃

Folia *linearia, plana, longitudine vix Scapi.* Scapus *teres, nudus.* Spatha *obtuſa.* Umbellae *radii pedunculares floribus breviores.* Petala *obovato-oblonga, obtuſa, atropurpurea, magna.* Stamina *ſimplicia, alba, breviſſima. Bulbi ad Fructum nulli.* Flores *majores, quam in reliquis.*

* * *Fol. caulina plana. Umbella bulbifera.*

14. ALLIUM *ſativum.*

A. caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Mat. med. p.* 92. *Mill. dict. n.* 1.

A. radicis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 39.

A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. all.* 1.

A. ſativum. *Bauh. pin.* 73.

Allium. *Cam. epit.* 328.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 215.
Starkriechendes Lauch. W.
Habitat in Sicilia. ♃ (v. v.)

15. ALLIUM *Scorodopraſum.*

A. caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 77. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. n.* 396. *Pollich. pal. n.* 326. *Roth. germ. I.* 145. *II.* 381. *Hoffm. germ.* 116.

A. capitulo bulboſo erecto, foliis planis ſubcrenatis: vaginis ancipitibus. *Fl. ſuec.* 266. 278.* *It. Oel.* 60.

A. ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, ſcapo ante maturitatem contorto. *Hall. all.* 2.

Allium ſativum alterum ſ. Allioprasum caulis ſummo circumvoluto. *Bauh. pin.* 73.

Allii genus Ophioſcorodon dictum quibusdam. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 599.

Porrum radice laterali cordata ſolida, pedunculo revoluto, capite bulbifero. *Hort. eliff.* 136.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 217.
Rockenbollen Lauch. W.
Habitat in Oelandia, Dania, Pannonia, Germania. ♃ (v. v.)

16. ALLIUM *arenarium.*

A. caule planifolio bulbifero, vaginis teretibus, ſpatha mutica, ſtaminibus tricuſpidatis. *It. ſcan.* 227. *Fl. ſuec.* 2. 279.* *Oed. dan. t.* 290. *Mill. dict. n.* 10. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 381.

A. foliis ciliatis, umbella bulbifera, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1222.

A. ſtaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, foliis gramineis leviter ſerratis. *Hall. all. n.* 3.

Porrum planifolium, ſtaminibus alterne trifidis, umbella bulbifera. *Rupp. ed. Hall.* 154. *t.* 2. *f.* 2.

Allium montanum bicorne latifolium, flore dilute purpuraſcente. *Bauh. pin.* 74.

A. ſeu Moly montanum latifolium. *Cluſ. pann. p.* 212. *Hall. R.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 218.
Sand Lauch. W.
Habitat in Thuringia, Helvetia, Scania. ♃

Caulis *ante antheſin cernuus.*

Scopoli *et* Pollich *nomen Halleri ad praecedens Allium amandant; ſi recte, pleraque ſynonyma illuc re-*

ferenda. Tabula 290 *flor. dan. nomen* A. Scorodopraſi *gerit, a Linneo tamen ad A. arenarium citatur. Forſan* A. Scorodopraſum *et* arenarium *una eademque planta eſt.* R.

17. ALLIUM *carinatum.*

A. caule planifolio umbellifero, ſtaminibus ſubulatis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 281. *Mill. dict. n.* 11. *Scop. carn. n.* 397. *Pollich. pal. n.* 327. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 382. *Hoffm. germ.* 116.

A. umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. *Hall. all.* 27. *t.* 2. *f.* 2.

A. bulbo ſobolifero, foliis ſucculentis, ſpatha bicorni, umbella bulbifera. *Hall. helv. n.* 1224.

A. ſylveſtre bicorne purpureum proliferum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 561. R.

Ampelopraſum proliferum. *Lob. ic.* 156. *

β. Allium montanum bicorne anguſtifolium, flore dilute purpuraſcente. *Bauh. pin.* 74.

Allium ſ. Moly montanum 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 193.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 219.

Getraide Lauch. W.

Habitat in Germania, Helvetia, Carniolia. ♃ (v. v.) Spatha *longiſſima.*

*** *Fol. caulina teretia. Umbella capſulifera.*

18. ALLIUM *Sphaerocephalon.*

A. caule teretifolio umbellifero, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus tricuſpidatis corolla longioribus. *Mill. dict. n.* 12. *Roth. germ. I.* 146 *II.* 382. *Hoffm. germ.* 116.

A. radice gemella, foliis fiſtuloſis, capite ſphaerico, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1220. *ſecundum Pollich, quod vero ſynonymon excludere jubet Linnaeus in Syſt. Veget. ed Murray. p.* 266.

Allium ſ. Moly montanum, purpureo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 195.

Allii genus forte Scorodopraſum alterum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 564.

Scorodopraſum montanum juncifolium, capite rotundo dilute janthino, floribus paucis. *Mich. gen.* 25. *t.* 24. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 221.

Rundköpfiges Lauch. W.

Habitat in Italia, Sibiria, Helvetia, Germania. ♃

19. ALLIUM *parviflorum.*

A. caule ſubteretifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus ſimplicibus corolla longioribus, ſpatha ſubulata. *Sp. pl.* 427.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 221.

Kleinblütiges Lauch. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

Facies A. ſphaerocephali. Bulbus *oblongus, tunicatus.* Caulis *teres, ſtriatus, folioſus.* Folia *longitudine fere caulis ſubulata.* Umbella *globoſa:* Floribus *minimis.* Petalis *exterioribus ovatis, triſtioribus; interioribus duplo longioribus, lanceolatis, purpuraſcentibus.* Stamina *ſimplicia, corolla longiora, uti etiam Stylus.* Spatha *ſubulata, corolla longior, diphylla. Adeoque ſimillimum A. ſphaerocephalo, ſed ſtamina ſimplicia.*

*20. ALLIUM *Pallaſii.*

A. caule ſubteretifolio umbellifero difformi, ſtaminibus ſimplicibus corollam aequantibus, ſtylo breviſſimo. *Murr. Comm. goett.* 6. 1775. *p.* 32. *t.* 3.*

Pallaſiſches Lauch. W.

Habitat in Sibiria. ♃

Bulbus *globoſus ſolitarius tunicatus magnitudine nucis avellanae exiguae.* Caulis *teres ſeſquipedalis gracilis folioſus.* Folia *ſemitereti-ſubulata longa caule breviora alterna.* Vagina *pallide ſtriata, lineis prominentibus violaceis.* Spatha *diphylla umbella dimidio brevior, valvis ampliatis acuminatis.* Umbella *multiflora rotundata capſulifera interſperſis floribus quibusdam abortientibus.* Pedunculi *ſupra incraſſati longiſſimi pollicares purpurei.* Corolla *exigua purpurea, petalis ovato-lanceolatis aequalibus, carina profundius colorata.* Stamina *corollae aequalia,* filamentis *ſubulatis purpureis,* antheris *fuſcis.* Piſtillum *ſtylo breviſſimo.* Capſula *triquetra.* Murr. l. c.

21. ALLIUM *deſcendens.*

A. caule ſubteretifolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 78. *Mill. dict. n.* 100.

A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite ſphaerico non bulbifero atropurpureo. *Hall. all. n.* 11. *t.* 2. *f.* 1.

A. l. Moly latifolium, capite ſphaerico, flore purpureo. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 160. *f.* 20.

Moly atropurpureum. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 165. *f.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 222.
Vilolettes Lauch. W.
Habitat in Helvetia. ♃ (v. v.)

22. ALLIUM *moſchatum.*

A. caule teretifolio umbellifero, umbella faſtigiata ſubſexflora, petalis acutis, ſtaminibus ſimplicibus, foliis ſetaceis. *Sp. pl.* 427.

A. foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. *Hall. all.* 17.

Moly moſchatum, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 76. *prodr.* 28. *t.* 28. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 14.* *Sauv. monſp.* 10.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 223.
Biſam Lauch. W.
Habitat in Galloprovinciae, Narbonae, Hiſpaniae *apricis elevatis.*

23. ALLIUM *flavum.*

A. caule teretifolio umbellifero, floribus pendulis, petalis ovatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Mill. dict.* n. 13. *Jacq. auſtr. t.* 141.

A. foliis teretibus, vagina bicorni, umbella lutea pendula. *Hall. opuſc.* 24.

A. juncifolium bicorne luteum. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 157. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 223.
Gelbes Lauch. W.
Habitat Monſpelii, *in* Auſtria. ♃ (v. v.)

Caulis *folioſus, teres rore glauco.* Folia *teretia, ſupra baſin planiuſcula.* Spathae *valvula altera foliacea, umbella duplo longior.* Umbella *pedicellis pendulis, flavis.* Petala *flaviſſima, ovata, obtuſa, concava, erecta.* Stamina *ſimplicia, corollis duplo longiora.* Stylus *brevis.*

24. ALLIUM *pallens.*

A. caule ſubteretifolio umbellifero, floribus pendulis truncatis, ſtaminibus ſimplicibus corollam aequantibus. *Gouan. illuſtr.* 24.

A. umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all.* 21.

A. montanum bicorne, flore pallido odoro. *Bauh. pin.* 75.

Gethioides ſylveſtre. *Colum. ecphr.* 2, *p.* 6. *t.* 7. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 224.

Bleiches Lauch. W.

Habitat in Italia, Hiſpania, Monſpelii, Pannonia. ♃ (v. v.)

Caulis *bipedalis, teres, laevis.* Folia *alterna, ſemiteretia, fiſtuloſa, heptagona, erecta.* Spatha *ſubulata, nervoſa.* Corolla *campanulata, truncata, alba*; Petalis *obovatis, obtuſiſſimis, erectis, concauis, carina viridi.* Stamina *ſimplicia, longitudine petalorum.* Flores *mox a floreſcentia pendent.* Stylus *vix ullus, poſt antheſin excreſcens, breviſſimus.*

25. ALLIUM *paniculatum.*

A. caule ſubteretifolio umbellifero, pedunculis capillaribus effuſis, ſtaminibus ſimplicibus, ſpatha longiſſima. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 398. *Hoffm. germ.* 116.

A. radice duplici, foliis ſucculentis, ſpatha bicorni, umbellae radiis pendulis. *Hall. helv. n.* 1225.

A. foliis teretibus, vagina bicorni, umbella pendula ſuave purpurea. *Hall. opuſc.* 386. *n.* 25. *cum ic.*

A. montanum bicorne, floribus triquetris purpureis, pedunculis longis et reflexis. *Segu. ver.* 2. *p.* 70.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 225.

Rispenförmiges Lauch. W.

Habitat in Sibiria, Auſtria, Italia, Helvetia, Carniolia, Oriente. ♃ (v. ſ.)

Folia *ſubulata, canaliculata.* Flores *pedunculis capillaribus, longiſſimis, laxis.* Petala *purpurea, obovata, longitudine ſtaminum.* Spatha *apice ſubulato, longiſſimo. Cum* pallente *jungit Gerard.*

26. ALLIUM *vineale.*

A. caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis. *Pollich. pal. n.* 329. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 383. *Hoffm. germ.* 117.

A. radice multiplici, foliis fiſtuloſis, capite ſphaerico, bulbifero, ſtaminibus alterne trifidis. *Hall. helv. n.* 1221.

A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis fiſtuloſis, capite bulbifero, radice multiplici. *Hall. all.* 4.

A. ſylveſtre campeſtre purpuraſcens. *Bauh. pin.* 74.

A. campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus et minus. *Bauh. pin.* 74.

A. ſylveſtre 1. *Fuchſ.* 737. *Hall. R.*

A. ſylveſtre tenuifolium. *Dodon.* 683. *Lob. ic.* 156.

Porrum ſylveſtre vinearum. *Bauh. pin.* 72.

β. Porrum ſylveſtre, gemino capite. *Bauh. pin.* 72. *Moriſ. hiſt.* 391. *ſ.* 4. *t.* 15. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 226.
Acker Lauch. W.
Habitat in Germania, Helvetia. ♃ (v. v.)
Capitulum arctum bulbis acuminatis recurvis, ſaepe in longiora acumina crinitis. Corollae parvae, violaceae. Stamina ſetis duabus longis, extra florem eminentibus.

27. ALLIUM *oleraceum.*

A. caule teretifolio bulbifero, foliis ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis, ſtaminibus ſimplicibus. *Gort. ingr.* 49. *Schreb. ſpicil. p.* 37. *Roth. germ. I.* 146. *II.* 383. *Hoffm. germ.* 117.
A. umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all. n.* 26. *f.* 2.
A. bulbo ſimplici, foliis fiſtuloſis, ſpatha bicorni, umbella bulbifera. *Hall. helv. n.* 1223.
A. bicorne, proliferum, flore intus albeſcente, cum ſtria purpuraſcente. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 560. *Hall.* R.
A. ſylveſtre bicorne, flore viridi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 561. *Hall.* R.
A. ſ. Moly montanum 3. *Cluſ. pann.* 213. 215. *Hall.* R.
Cepa capitulo bulboſo prolifero, foliis ſemiteretibus novemangularibus ſcabris fiſtuloſis. *Fl. ſuec.* 265. 280. *
Porrum radice ſolida, caule erecto, capitulo bulbifero. *Roy. lugdb.* 40. *Gort. geldr.* 69.
Allium montanum bicorne, flore exalbido. *Bauh. pin.* 75. *Rudb. elyſ.* 156.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 227.
Gemüſe Lauch. W.
Habitat in Suecia, Germania, Helvetia, Ingria. ♃.
Folia *fiſtuloſa.*

* * * * Folia *radicalia.* Scapus *nudus.*

28. ALLIUM *nutans.*

A. ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus planis, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 80.
A. ſtaminibus alterne trifidis, foliis latiſſimis, capite ſphaerico, radice laterali ſolida. *Hall. all.* 6.
Porrum ſcapo nudo ancipiti, antequam floruerit nutante, foliis enſiformibus; hinc paullo convexioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 55. *t.* 12.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 229.
Hängendes Lauch. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Staminum *dentes in antiquo obliterantur. Variat aetate et loco prae reliquis, ut vix dignoſcatur.*

29. ALLIUM *aſcalonicum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis ſubulatis, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis. *Sp. pl.* 429.
Cepa foliis ſubulatis, radicibus oblongis conglobatis. *Hort. cliff.* 36. *Hort. upſ.* 79.
Cepa aſcalonica. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 383. *ſ.* 4. *t.* 14. *f.* 3. *Mill. dict.*
Cepa ſterilis. *Bauh. pin.* 72.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 230.
Scharlotten Lauch.
Habitat in Palaeſtina, *Haſſelquiſt.* ♃. (v. v.)

Statura fere A. Schoenopraſi. Scapus *ſubnudus, teres, ſpithamaeus et ultra.* Spatha *membranacea.* Umbella *globoſa, floribus A. Schoenopraſi minoribus.* Petala *erecta, ovato-lanceolata, coerulea, carina atro-coerulea.* Stamina *longitudine petalorum: alternis latiſſimis apice trifidis.* Antherae *flavae.* Stylus *ſtigmate obtuſo.*

30. ALLIUM *ſeneſcens.*

A. ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus ſubtus convexis laevibus, umbella ſubrotunda, ſtaminibus ſubulatis. *Hort. upſ.* 79. *Mill. dict. n.* 14. *Kniph. cent.* 8. *n.* 5. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. II.* 385.
A. caule ancipiti teretiuſculo, foliis enſiformibus: hinc paulo convexioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 53. *t.* 11. *f.* 2.
A. foliis linearibus, florum umbella ſubgloboſa. *Roy. lugdb.* 39.
A. radice bulboſa, foliis gramineis, umbella erecta non bulbifera, vaginis breviſſimis. *Hall. all.* 19. *n.* 2.
A. narciſſifolium. *Scop. carn.* 2. *n.* 400. R.
A. umbelliferum pratenſe. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 564. *Hall. R.*
A. ſeu Moly, Narciſſinis foliis. 1. *Cluſ. pann.* 220. 221. *Hall. R.*
A. montanum, foliis narciſſi, majus. *Bauh. pin.* 75.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 231.
Grauwerdendes Lauch. W.
Habitat in Sibiria, Silicia, Sileſia, Helvetia. ♃ (v. ſ.)

Petala erecta, a ſe invicem dehiſcentia ſ. diſtantia,

canaliculata, inflexa. Folia obliqua et Stamina corolla paullo longiora huic, non vero A. nigro.

Cum A. anguloſo *conjungunt Hallerus, Scopolius.* R.

* 31. ALLIUM *illyricum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis lineari-lanceolatis planis, umbella faſtigiata, ſtaminibus ſubulatis. W.

A. ſcapo nudo tereti, foliis ſublinearibus baſi canaliculatis, caeterum planis cum dorſo ſubcarinato, umbella faſtigiata. *Jacq. ic.* 2. *t.* 365. *Collect.* 3. *p.* 273.*

Allium roſeum. *Hoſt. ſynop.* 183. *deſcriptio nec ſynonyma.*

Illyriſches Lauch. W.

Habitat in vineis et olivetis Auſtriae *littoralis.* ♃ (v. ſ.)

32. ALLIUM *odorum.*

A. ſcapo nudo teretiuſculo, foliis linearibus canaliculatis ſubtus angulatis, umbella faſtigiata. *Mant.* 62.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 233.

Gutriechendes Lauch. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃ (v. v.)

Folia *baſi connexa in culmum ſ. faſciculum ſtipitatum, linearia, longa, vix carnoſa, ſubtus ſtriata, ſupra canaliculata, minime hirſuta.* Scapus *pedalis, teres, vel unico obſcuro angulo, aphyllus, erectus, pedalis.* Spatha *brevis, cum rudimentis ſpathaceis ſ. membranaceis inter omnes pedunculos.* Pedunculi *plurimi, erecti, floribus longiores.* Corollae *albae, odoratae: petalis ovato-oblongis, acutiuſculis, erectiuſculo-patulis, carina rufeſcente.* Stamina *ſubulata, ſimplicia, corolla dimidio breviora.* Germen *punctis excavatis, cinereum. Stylus albus.* H. V.

* 33. ALLIUM *inodorum.*

A. ſcapo nudo ſubtriquetro, foliis linearibus planis ſubtus carinatis, umbella faſtigiata florifera, ſtaminibus ſimplicibus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 427.

Geruchloſes Lauch. W.

Habitat in Carolina. ♃ (v. v.)

Simile ſequenti, ſed duplo major et notis indicatis diſtinctum. W.

34. ALLIUM *anguloſum.*

A. ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis ſubtus ſubangulatis, umbella faſtigiata. *Hort. upſ.* 79.* *Mill. dict. n.* 15. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 384. *Jacq. auſt.* 5. *p.* 11. *t.* 423.

Cepa ſcapo nudo ſubangulato farcto, foliis linearibus ſubtus angulofis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 58. *t.* 14. *f.* 2.

A. radice ſeneſcente lignoſa, transverſa, foliis radicalibus gramineis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1227. *var.* a.

A. radice ſeneſcente lignoſa transverſa, umbella erecta. *Hall. all.* 19.

A. petraeum umbelliferum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 564. *t.* 564.

A. montanum, foliis narciſſi, minus. *Bauh. pin.* 75.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 233.

Eckiges Lauch. W.

Habitat in Sibiriae, Germaniae *humidiuſculis.* ♃ (v. v.)

Folia *interdum ſubtus vix angulata, at* Scapus *ſuperne parum angulato-ſtriatus;* Petala *interiora apice patentia, omnia lateribus conniventia.*

Hallerus *dubitat, an ſatis ſit diverſum ab* A. ſeneſcente? *certiſſime diſtincta ſpecies, utramque ultra* 20 *annos alui.*

* 35. ALLIUM *ſtriatum.*

A. ſcapo nudo ſubtriquetro foliis linearibus ſubtus ſtriato-ſulcatis breviore, umbella faſtigiata, petalis obtuſis, ſtaminibus ſimplicibus. W.

A. ſcapo nudo obſolete triquetro, foliis linearibus obliquis ſubcanaliculatis ſubtus ſtriatis, umbella faſtigiata pauciflora. *Jacq. ic.* 2. *t.* 366. *Collect. ſuppl.* 51.*

Geſtreiftes Lauch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

* 36. ALLIUM *narciſſiflorum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis lineari-ſubulatis longiore, umbella faſtigiata, petalis mucronatis, ſtaminibus ſimplicibus. W.

A. caule nudo tereti, umbella terminali inclinata, petalis lanceolatis, ſtaminibus ſimplicibus brevioribus. *Villars. delph.* 2. *p.* 258. *t.* 6. *

Narciſſenblütiges Lauch. W.

Habitat in Galliae *auſtralis montibus.* ♃

Stamina *corolla breviora.* W.

* 37. ALLIUM *pedemontanum.* W.

A. ſcapo ſubtetragono, foliis linearibus obtuſis, umbella pauciflora. W.

Allium nigrum. *Allion. pedem. n.* 1881. *t.* 25. *f.* 1.

Piemonteſiſches Lauch. W.
Habitat in alpibus Pedemontanis. ♃ (v. ſ.)

Bulbus *oblongus.* Folia *radicalia linearia obtuſa glabra carinata ſcapo breviora.* Scapus *pedalis compreſſo-tetragonus glaber.* Spatha *bivalvis membranacea diaphana alba nervoſa, valvulis apice bifidis.* Flores *umbellati* 10-15. Petala *oblonga obtuſa apice acuta. Simile A. narciſſifloro, ſed differt:* foliis *linearibus obtuſis, nec apice ſubulatis;* ſcapo *ſubtetragono, nec tereti;* petalis *obtuſis apice acutis, nec ovato-lanceolatis mucronatis. Ab A. nigro diſtinctum:* foliis *linearibus, nec lanceolatis;* umbellis *paucifloris, nec multifloris, hemiſphaericis, denique odore Allii, quum A. nigrum plane inodorum.* W.

38. ALLIUM *nigrum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis lanceolatis, umbella hemiſphaerica, petalis patentibus, ſtaminibus ſimplicibus. W.

A. ſcapo nudo tereti, foliis linearibus, umbella hemiſphaerica, petalis erectis, ſpatha mucronata bifida. *Sp. pl.* 430. *Retz. obſ.* 1. *p.* 15. * *et* 6. *p.* 27.

A. (*multibulboſum*) ſcapo nudo tereti, foliis lanceolato-elongatis ſeſſilibus, umbella faſtigiata, petalis omnibus patentiſſimis. *Murr. ſyſt.* 323. *Jacq. auſt.* 1. *p.* 9. *t.* 10.

A. (*monſpeſſulanum*) ſcapo tereti ſolido, umbella faſtigiata, petalis linearibus, foliis lanceolatis, ſtaminibus ſubulatis. *Gouan. illuſt.* 24. *t.* 16. *

A. montanum bicorne latifolium, flore magno dilute purpuraſcente. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 160. *ſ.* 21. *Burſ.*

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 235.
Schwarzes Lauch. W.
Habitat Algiriae *inque* Galloprovincia. ♃ (v. v.)

Folia *radicalia, plana, quaterna, lanceolato-linearia.* Germen *fuſcum.* Petala *alba.* Folia *pollicem lata.*

39. ALLIUM *canadenſe.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis linearibus, capitulo bulbifero. *Kalm. it.* 3. *p.* 79. *Mill. dict. n.* 19.

A. bulbiferum virginianum. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 146.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 235.
Canadiſches Lauch. W.
Habitat in Canada. ♃

Radix *perennis.* Folia *linearia, plana, laevia, recta, ſpithamea.* Scapus *ſubnudus, teres, laevis, vix ſoliis longior.* Spatha *ovata, mucronata, acutiuſcula.* Capitulum *ex bulbis.* Floſculi *pauci, pedicellati, albidi: Petalis ovalibus.* Stamina *ſimplicia, longitudine corollae. Antherae ruſeſcentes.*

40. ALLIUM *urſinum.*

A. ſcapo nudo triquetro, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faſtigiata. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 401. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 385. *Flor. dan. t.* 757.

A. foliis radicalibus petiolatis, ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1228.

A. foliis lanceolatis, ſcapo nudo ſemicylindraceo, bulbo ſetis obvallato. *Fl. ſuec.* 163, 277. *It. gotl.* 169. *

A. foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugd.* 39. *Hall. all.* 21. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 49.

A. ſylveſtre latifolium. *Bauh. pin.* 74.

A. ſylveſtre latioris folii ſ. Allium urſinum. *Dod. pempt.* 683. *Hall. R.*

A. urſinum. *Fuchſ. hiſt.* 739. *Cam. epit.* 330. *Lob. ic.* 159.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 236.

Bären Lauch. W.

Habitat in Europae *ſeptentrionalioris nemoroſis, roridis.* ♃ (v. v.)

* 41. ALLIUM *cluſianum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis linearibus planis ciliatis, umbella pauciflora, petalis obovatis concavis. *Retz in litt.*

Moly Minus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 192. *figura bona.*

Cluſiſches Lauch. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

Bulbus *parvus piſi magnitudine, candidus ovato-turbinatus, baſi bulbillos emittens fibrasque praelongas.* Folia *graminea lucida ſcapo longiora linearia plana, ſaepe ſpiralia, flaccida, margine pilis albidis ciliata.* Scapus *ſpithamaeus teres.* Spatha *ante floreſcentiam cylindrica ſubulata, demum irregulariter fiſſa marceſcens.* Umbella *pauciflora, pedunculis inaequalibus* $\frac{1}{2}$ - 1 *pollicaribus.* Corolla *candida patens inodora.* *Petala obovata rotundata cava, extus carinata, tria alterna latiora.* Stamina *ſimpliciſſima lon-*

gitudine petalorum, candida. Germen *pallide viride.* Stylus *candidus.* Stigma *ſimplex.* Capſula *et* Semina *generis.* Bulbi *odor et ſapor cepaceus, foliorum contritorum debilior. Ab A. ciliato Cyrilli plane diverſum.* Retz. in Litt.

42. **ALLIUM** *triquetrum.*

A. ſcapo nudo, foliisque triquetris, ſtaminibus ſimplicibus. *Mill. dict. n.* 20. *Gouan. illuſtr.* 24. *Oſb. it.* 51.

A. caule triangulo. *Tournef. inſt.* 385. *Roy lugdb.* 39.

A. pratenſe, folio gramineo, flore prorſus albo, radice oblonga. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 159. *f.* 16.

Moly parvum, caule triangulo. *Bauh. pin.* 75.

Moly caule et foliis triangularibus. *Park. par.* 142. *t.* 143. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 11. *p.* 238.

Dreyeckiges Lauch. W.

Habitat in Hiſpania, circa Narbonam. *Gou.* ♃ (v. ſ.)

Folia *Sparganii, triquetra ſ. enſiformia, valde carinata.* Scapus *erectus, triqueter, foliis brevior.* Spatha *lanceolata, bivalvis.* Umbella *longitudine Spathae.* Corolla *Petalis* 6, *lanceolatis, acuminatis, erectis, albis, carina obſolete viridi.* Stamina *et* Piſtilla *petalis dimidio breviora.* Antherae *flavae.* Stigma *acutum.*

43. **ALLIUM** *Cepa.*

A. ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Mat. med.* 93. *Regn. bot.*

A. ſtaminibus alterne trifidis, caule ad terram ventricoſo. *Hall. all.* 10.

Cepa. *Mill. dict.*

Cepa ſcapo nudo ventricoſo foliis longiore, radice depreſſa. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 40.

Cepa vulgaris. *Bauh pin.* 71.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 11. *p.* 239.

Gemeines Lauch. W.

Habitat - - - - - - ♃ (v. v.)

44. **ALLIUM** *Moly.*

A. ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, umbella faſtigiata. *Hort. upſ.* 76. *Mill. dict. n.* 5.

A. foliis radicalibus ſeſſilibus lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 38. *Hall. all.* 23.

A. foliis lanceolatis, umbella laxa. *Hort. cliff.* 72.
Moly latifolium luteum, odore allii. *Bauh. pin.* 75.
Moly flavo flore. *Swert. flor.* 1. *t.* 60. *f.* 2.
Moly montanum latifolium, flavo flore. *Cluſ. app. alt.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 250.
Goldfarbenes Lauch. W.
Habitat in Hungaria, Baldo, Monſpelii, Pyrenaeis. ♃ (v. v.)

Petala *patentia, tria exteriora magis patentia, interiora erecta.*

45. **ALLIUM** *tricoccum.*

A. ſcapo nudo ſemitereti, foliis lanceolato-oblongis planis glabris, umbella globoſa, ſeminibus ſolitariis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 428.
Dreyſamiges Lauch. W.
Habitat in America boreali. ♃

46. **ALLIUM** *fiſtuloſum.*

A. ſcapo nudo adaequante folia teretia ventricoſa. *Hort. upſ.* 78.
A. ſtaminibus ſimplicibus, caule medio ventricoſo. *Hall. all.* 13.
Cepa ſcapo longitudine foliorum, foliis ventricoſis, radice oblonga. *Hort cliff.* 136. *Roy. lugdb.* 40.
Cepa oblonga. *Bauh. pin.* 71. *Dod. pempt.* 687.
β. Allium altaicum. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 108. *t. R.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 251.
Röhrenſtieliges Lauch. W.
Habitat in - - - β, in Sibiria. ♃ (v. v.)

Varietas β ſpecies vix diverſa. Nullam, praeter magnitudinem minorem, veram differentiam obſervare potui. W

47. **ALLIUM** *Schoenopraſum.*

A. ſcapo nudo adaequante folia teretia ſubulato-filiformia. *Hort. upſ.* 78. *Gort. ingr.* 49. *Hoffm. germ.* 117. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 386. *Kniph. cent.* 8. *n.* 4.
A. radice multiplici, foliis radicalibus teretibus, ſcapi longitudine, floribus umbellatis cylindricis. *Hall. helv. n.* 1226.
A. ſtaminibus ſimplicibus, foliis radicalibus teretibus ſcapi longitudine. *Hall. all.* 14.
Cepa ſcapis foliisque ſubulatis teretibus fiſtuloſis aequalibus, ſpathis globoſis. *Fl. ſuec.* 264. 282. *It. oel.* 54. 64.

Cepa ſcapo longitudine figuraque foliorum, foliis ſubulatis filiformibus, ſpathis globoſis. *Hort. cliff.* 136.
Porrum ſectivum juncifolium. *Bauh. pin.* 72.
Schoenopraſum. *Dod. pempt.* 689.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 255.
Suppen Lauch. W.
Habitat in alpeſtribus Sibiriae, Oelandiae, *locis rupeſtribus.* ♃ (v. v.)

48. ALLIUM *ſibiricum.*

A. ſcapo ſubnudo tereti, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus ſubulatis, petalis lanceolatis acutis. W.
A. ſcapo nudo tereti, foliis ſemicylindricis, ſtaminibus ſubulatis. *Mant.* 562. *Ait. Kew.* 1. *p.* 429.
Allium Schoenopraſum β. *Sp. pl.* 433. *Murr. Nov. Comment. goett.* 6. 1775. *p.* 33. *t.* 4. *
Allium roſeum. *Krock. Siles. n.* 505. *t.* 43.
Cepa ſcapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatis. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 59. *t.* 15. *f.* 1.
Cepa paluſtris altiſſima. *Buxb. cent.* 4. *p.* 27. *t.* 45.
Cepa alpina paluſtris tenuifolia. *Tournef. inſt.* 383.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 254.
Sibiriſches Lauch. W.
Habitat in Sibiria, *inque montibus* Sileſiae. ♃ (v. ſ.)

Folia *ſemicylindrica, ſubcanaliculata, minime angulata.* Scapi *teretes, foliis longiores.* Umbella *faſtigiata, florifera.* Spatha *parva, ovata, ſcarioſa.* Petala *ovata, ſinu obtuſo diſtincta, acuta, alba, carina vireſcente.* Stamina *ſubulata, corollis breviora.* Germen *cinereum.* Stigma *ſimplex.*

Petala *ſaepius acuminata. Haec et binae ſpecies praecedentes ſcapo gaudent folioſo.* W.

*49. ALLIUM *ſtellerianum.* W.

A. ſcapo nudo tereti, foliis ſemicylindricis umbellis denſis, ſtaminibus ſubulatis corolla longioribus. W.
Cepa ſcapo nudo tereti inani, foliis ſemicylindraceis, capitulis ſpiſſis multifloris. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 63. *t.* 16. *f.* 1. 2. *
Stellerſches Lauch. W.
Habitat in Sibiria *ad* Jeniſeam fluvium. ♃ (v. ſ.)

*50. ALLIUM *capillare.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis capillaceis, umbella pauciflora, petalis lanceolatis acutis. W.

A. foliis radicalibus capillaribus ſcapo brevioribus. *Cavan. ic.* 3. *p.* 4. *t.* 206. *f.* 1. *
Haarblättriges Lauch. W.
Habitat in regno Valentino. ♃ (v. ſ.)

51. ALLIUM *tenuiſſimum.*

A. ſcapo nudo tereti, foliis lineari-ſubulatis, umbella pauciflora, petalis ſubrotundo-ovatis obtuſis. W.
A. ſcapo nudo tereti inani, foliis ſubulatis filiformibus, capitulis laxis paucifloris. *Gmel ſibir.* 1. *p.* 61. *t.* 15. *f.* 2. 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 254.
Schmales Lauch. W.
Habitat in Sibiria.

Stamina *in hoc et praecedente corolla breviora.* W.

*52. ALLIUM *gracile.*

A. ſcapo nudo tereti longiſſimo, foliis linearibus canaliculatis, ſtaminibus ſubulatis baſi connatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 429.
Weſtindiſches Lauch. W.
Habitat in Jamaica. ♃

Folia *narciſſina pedalia.* Scapus *tripedalis tenuis.* Petala *erecta alba unguiculata, ungues inferne cum ſtaminibus connata in tubum viridem. Forte ſui generis planta.* Ait. Kew. l. c.

53. ALLIUM *Chamae-Moly.*

A. ſcapo nudo ſubnullo, capſulis cernuis, foliis planis ciliatis. *Sp. pl.* 433. *Cavan. ic.* 3. *p.* 4. *t.* 207. *f.* 1. *
Moly humile, folio gramineo. *Bauh. pin.* 75. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 166. *f.* 15.
Chamae Moly an Moly dioſcoridis. *Columm. ecphr.* 325. *t.* 326.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 259.
Zwerg Lauch. W.
Habitat in Italia, Hiſpania. ♃
Saturnia *Marati.*

627. LILIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 558.

Cor. 6-petala, campanulata: linea longitudinali nectarifera. *Capſ.* valvulis pilo cancellato connexis.

*1. LILIUM *cordifolium.*

L. foliis cordatis petiolatis. W.

Lililium (*cordifolium*) foliis cordatis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 332.

Hemerocallis (*cordata*) foliis cordatis venoſis. *Thunb. jap.* 143. *

Sjire rectius Sjicoi et Osjiroi. *Kaemph. amoen.* 870. *Banks. icon. Kaempf. t.* 46.

Herzblättrige Lilie. W.

Habitat in Japonia. ♃

*2. LILIUM *longiflorum.*

L. foliis ſparſis lanceolatis, corollis tubulato-campanulatis, caule glabro. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 333.

Lilium candidum. *Thunb. jap.* 135. *

Langblütige Lilie. W.

Habitat in Japonia *prope* Nagaſaki *et* Miaco. ♃

Caulis *teres nodulosus glaber inanis erectus bipedalis.* Folia *ſparſa ſeſſilia lanceolata integra glabra trinervia baſi adpreſſa, apice recurva ſesquipollicaria.* Corollae *albae tubulato-campanulatae palmares erectae. Differt a L. candido:* foliis *baſi latioribus, apice acutioribus ſtrictioribus reflexis, non undatis.* Corolla *triplo longiori cylindrica. A L. bulbifero diſtinctum:* corolla *maxima alba,* caule *laevi tereti.* Thunb. Act. l. c.

*3. LILIUM *candidum.*

L. foliis lanceolatis ſparſis baſi attenuatis, corollis campanulatis intus glabris. W.

L. foliis ſparſis, corollis campanulatis: intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 80. *Mat. med.* 93. *Roy. lugdb.* 30. *Gron. orient.* 105. *Mill. dict. n.* 1. *Ludw. ect. t.* 190. *Kniph. cent.* 7. *n.* 4. *Knorr. del.* 1. *tab. L. Blackw. t.* 11. *Hall. helv. n.* 1231.

L. album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.

L. candidum. *Dod. pempt.* 197. *Camer. epit.* 570.

β. L. album floribus dependentibus, ſ. peregrinum. *Bauh. pin.* 76.
L. (*peregrinum*) foliis ſparſis, corollis campanulatis cernuis, petalis baſi anguſtioribus. *Mill. dict. n.* 2.
γ. L. caule plano compreſſo. *Gron. orient.* 106.
Lilii albi pulchri et ignoti ſpecies. *Bauh. pin.* 76.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 261.
Weiſſe Lilie. W.
Habitat in Palaeſtina, Syria, Gades, Helvetia. ♃ (v. v.)

*4. LILIUM *japonicum.*

L. foliis ſparſis lanceolatis, corollis cernuis ſubcampanulatis. *Thunb. jap.* 133.
Japaniſche Lilie. W.
Habitat in Japonia.

Caulis *teres ſimplex laevis glaber bipedalis.* Folia *alterna petiolata lanceolata acuminata integerrima marginata glabra ſesquipalmaria, ſubtus pallidiora trinervia et quinquenervia.* Flores *terminales reflexo-cernui.* Corolla *campanulata albida palmaris. Affine L. albo, differt vero:* foliis *paucis in caule, remotis longiſſimis petiolatis nervoſis, et* caule *debiliori unifloro.* Thunb. l. c.

5. LILIUM *lancifolium.*

L. foliis ſparſis lanceolatis, corollis erectis ſubcampanulatis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 333.
Lilium bulbiferum. *Thunb. jap.* 134.
Kentan. *Kaempf. amoen.* 871.
Lanzenblättrige Lilie. W.
Habitat in Japonia. ♃

Caulis *angulatus hirſutus erectus ſimplex pedalis et ultra.* Folia *alterna ſeſſilia lanceolata glabra digitalia, ſuperiora ſenſim breviora.* Corollae *parvae unguiculares albae. Axillae foliorum ſuperiorum bulbiferae.* Thunb. Act. l. c.

6. LILIUM *bulbiferum.*

L. foliis ſparſis, corollis campanulatis erectis: intus ſcabris. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 80. *Roy. lugdb.* 31. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 41. *Gron. orient.* 104. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. auſtr. t.* 226. *Scop. carn. n.* 404. *Knorr. del.* 1. *t. I.* 4. *Hoffm. germ.* 118. *Roth. germ. I.* 152. *II.* 396. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 333. *
Lilium philadelphiacum. *Thunb. jap.* 135.

L. caule folioſo, foliis ſulcatis, floribus campanulatis, intus floccoſis. *Hall. helv n.* 1232.
L. purpureo-croceum majus. *Bauh. pin.* 76.
β. L. purpureo-croceum, flore pleno.
γ. L. purpureo-croceum minus. *Bauh. pin.* 77.
δ. L. phoeniceum. *Bauh. pin.* 77.
ε. L. bulbiferum latifolium majus. *Bauh. pin.* 77.
ζ. L. bulbiferum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 77.
η. L. bulbiferum minus. *Bauh. pin.* 77.
L. humile. *Mill. dict. n.* 4.
θ. L. bulbiferum incanum. *Bauh. pin.* 77.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 263.
Feuer Lilie. W.
Habitat in Italia, Auſtria, Sibiria, Helvetia, Carniolia, Francofurti ad Moenum. ♃ (v. v.)
Planta japonica ab Illuſt. Thunbergio deſcripta in Actis Soc. Lin. Lond. l. c. videtur a noſtra diverſa. W.

*7. LILIUM *Cateſbaei.*
L. foliis ſparſis lineari-lanceolatis, caule unifloro, corolla erecta, petalis longe unguiculatis margine undulatis, apice reflexis. W.
Lilium Cateſbaei. *Curt. mag.* 259. *
L. (*Cateſbaei*) foliis ſparſis, caule bipedali, flore unico erecto, corolla campanulata, petalis unguibus anguſtis longis. *Walt. carol.* 123.
L. (*ſpectabile*) foliis ſparſis, floribus ſolitariis erectis, petalorum unguibus anguſtis, alternis extus utrinque ſulcatis, laminis revolutis. *Salisb. Icon. rar.* 5. *t.* 5. *
L. (*carolinianum*) foliis ſparſis lineari-ſubulatis, flore unico erecto, petalis longe unguiculatis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 514. *
L. carolinianum, flore croceo punctato, petalis longioribus et anguſtioribus. *Catesb. Carol.* 2. *p.* 58. *t.* 58.
Caroliniſche Lilie. W.
Habitat in Carolinae *humidiuſculis.* ♃

*8. LILIUM *ſpecioſum.*
L. foliis ſparſis ovatis petiolatis; caule ramoſo, ramis unifloris, flore cernuo, corollis revolutis intus papilloſo-dentatis. W.
L. (*ſpecioſum*) foliis ſparſis ovato-oblongis, floribus reflexis, corollis revolutis, caule ramoſo. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 332.

Lilium ſuperbum. *Thunb. jap.* 134. *
Kasbi... *Kaempf. amoen. p.* 871. *Banks. Icon. Kaempf. tab.* 47.
Prächtige Lilie. W.
Habitat in Iaponia. ♃

9. LILIUM *pomponium.*

L. foliis ſparſis lineari-ſubulatis, floribus reflexis, corollis revolutis intus papilloſo-dentatis. W.

L. foliis ſparſis ſubulatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Roy. lugdb.* 31. *Mill. dict. n.* 5. *et ic. t.* 65. *f.* 2. *Kniph. cent.* 2. *n.* 40. *Knorr. del.* 1. T. 4.

L. foliis ſparſis lineari-ſubulatis apice caulis nudiuſculo, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 514. *

L. radice tunicata, foliis ſparſis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 42. *n.* 9.

L. reflexum, montanum, humile, anguſtifolium, aurantium. *Amm. ruth. n.* 138. *Gmel.* R.

L. rubrum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 78.

L. rubrum praecox. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 133.

β. L. miniatum odoratum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 79. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 176. *f.* 3.

γ. L. brevi et gramineo folio. *Bauh. pin.* 79.

L. (*anguſtifolium*) foliis linearibus ſparſis, pedunculis longiſſimis. *Mill. dict. n.* 6. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 266.

Pomponiſche Lilie. W.

Habitat in Pyrenaeis, Sibiria. ♃ (v. v.)

Folia *linearia, acuta, triquetra, canaliculata, ſparſa.* Nectarii *rima valde dentata.*

10. LILIUM *chalcedonicum.*

L. foliis lineari-lanceolatis ſparſis, floribus reflexis, corollis revolutis intus punctatis. W.

L. foliis ſparſis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Roy. lugdb.* 31. *Mill. dict. n.* 7. *Scop. carn. n.* 403. *Kniph. cent* 3. *n.* 54.

L. foliis ſparſis lanceolatis, caule usque ad apicem folioſo, floribus reflexis, corollis revolutis. *Lamark. encyclop.* 3. *p.* 515. *

L. byzantinum miniatum. *Bauh. pin.* 78.



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



L. rubrum ſ. miniatum byzantinum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 131.
β. L. byzantinum miniatum polyanthos. *Bauh. pin.* 78.
γ. L. purpureo-ſanguineum, flore reflexo. *Bauh. pin.* 78.
Hemerocallis chalcedonica. *Lob. ic.* 169.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 268.
Chalcedoniſche Lilie. W.
Habitat in Perſia, Carniolia. ♃ (v. v.)

Racemus *ante floreſcentiam vix incurvatus ut in* 9. 11. *et* Caulis *usque ad apicem* Foliis *veſtitus confertis.*

11. LILIUM *ſuperbum.*

L. foliis imis verticillatis, caeteris ſparſis, floribus racemoſo-pyramidatis reflexis, corollis revolutis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 515.*
L. foliis ſparſis lanceolatis, floribus ramoſo-pyramidatis reflexis, corollis revolutis. *Mill. dict. n.* 8.
L. foliis ſparſis, multiflorum, floribus reflexis fundo aureo limbo aurantio punctis nigricantibus, pedunculis ſingulis uno foliolo. *Trew. ehret.* 2. *t.* 11.
L. ſ. Martagon canadenſe, flore luteo punctato. *Cateſb. car.* 2. *p.* 56. *t.* 56.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 270.
Stolze Lilie. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

Folia *conſtanter trinervia.* *Gouan. illuſtr. p.* 25. *n.* 1. *in not.* R.

12. LILIUM *Martagon.*

L. foliis verticillatis ovato-lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. W.
L. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. cliff.* 120. *Hort. upſ.* 81. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 44. *Roy. lugd.* 31. *Mill. dict. n.* 9. *Iacq. auſtr. t.* 351. *Scop. carn. n.* 402. *Pollich. pal. n.* 331. *Hoffm. germ.* 118. *Roth. germ. I.* 152. *II.* 396. *Kniph. cent.* 3. *n.* 55. *Knorr. del.* 1. *tab. T.* 6.
L. foliis verticillatis, floribus pendulis revolutis. *Hall. helv. n.* 1233.
Martagon. *Camer. epit.* 617.
L. floribus reflexis, montanum. *Bauh. pin.* 77.
L. ſylveſtre. *Dod. pempt.* 201.
β. L. floribus reflexis, alterum hirſutum. *Bauh. pin.* 87. *Mill. dict. n.* 10.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 271.
Gelbwurzliche Lilie, W.
Habitat in Hungaria, Helvetia, Sibiria, Germania. ♃ (v. v.)

13. LILIUM *canadenſe.*

L. foliis verticillatis linearibus, floribus reflexis, corollis revoluto-campanulatis. W.
L. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revoluto-campanulatis. *Mill. dict. n.* 11.
L. anguſtifolium, flore flavo maculis nigris diſtincto. *Tournef. inſt.* 371. *Barr. rar.* 778. *t.* 125.
L. Martagon canadenſe maculatum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 408. *ſ.* 4. *t.* 20. *f.* 9. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 177. *f.* 5.
L. ſ. Martagon canadenſe, floribus magnis flavis non reflexis. *Catesb. car.* 3. *p.* 11. *t.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 273.
Canadiſche Lilie. W.
Habitat in Canada. ♃ (v. ſ.)

Folia *verticillata, trilineata.* Corollae, *aeque ac Martagon, revolutae, baſi flavae, punctis atris.*

*14. LILIUM *maculatum.*

L. foliis ſparſis et verticillatis lanceolatis glabris, corollis campanulatis intus maculatis, limbo reflexo. *Thunb. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 334.
Lilium canadenſe. *Thunb. jap.* 135.
Gefleckte Lilie. W.
Habitat in Japonia. ♃

Caulis *teres ſtriatus glaber ſimplex inanis pedalis, ſuperne ſubumbellatus.* Folia *ſparſa et verticillata ſeſſilia lanceolata glabra multinervoſa erecta digitalia.* Flores *ſubumbellati.* Pedunculi *digitales erecti.* Corolla *campanulata, limbo reflexo, incarnata, intus maculis purpureis plurimis adſperſa. Differt a L. canadenſi:* foliis *baſi latis et* corollis *minus revolutis.* Thunb. Act. l. c.

15. LILIUM *camſchatcenſe.*

L. foliis verticillatis, flore erecto, corolla campanulata, petalis ſeſſilibus. *Amoen. acad.* 2. *p.* 348.* *Mill. dict. n.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 274.
Kamtſchatiſche Lilie. W.
Habitat in Canada, Camſchatca. ♃

16. LILIUM *philadelphicum.*

L. foliis verticillatis, floribus erectis, corolla campanulata, petalis unguiculatis. *Sp. pl.* 435.

L. foliis verticillatis brevibus, corollis campanulatis, unguibus petalorum anguſtioribus, floribus erectis. *Mill. dict. n.* 13. *et ic. t.* 165. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 274.

Philadelphiſche Lilie. W.

Habitat in Canada. ♃ (v. ſ.)

Simillimum eſt L. camchatcenſi, ſed ejus petala ovata ſeſſilia; hujus unguibus oblongis diſtinctis; ſeparandum itaque ſecundum vivi autoptam Millerum.

628. FRITILLARIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 559.

Cor. 6-petala, campanulata, ſupra ungues cavitate nectarifera. *Stam.* longitudine corollae.

1. FRITILLARIA *imperalis.*

F. racemo comoſo inferne nudo, foliis integerrimis, *Hort. upſ.* 82. *Mill. dict. n.* 8. *Kniph. cent.* 3. *n.* 59. *Knorr. del.* 1. *t. K. Regn. bot. ic.*

Petilium foliis caulinis. *Hort. cliff.* 119. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium ſ. Corona imperialis: genus. *Bauh. pin.* 79.

Tuſai. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 127. 128.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 276.

Büſchlige Schachblume. W.

Habitat in Perſia? *Conſtantinopoli venit in Europam.* ♃ (v. v.)

2. FRITILLARIA *perſica.*

F. racemo nudiuſculo, foliis obliquis. *Hort. upſ.* 82. *Mill. dict. n.* 6.

F. racemo nudo terminali. *Hort. cliff.* 119.

F. radice rotunda. *Roy. lugdb.* 30.

Lilium perſicum. *Bauh. pin.* 79. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 183. *f.* 1. *Swert. floril.* 44. *f.* 1.

Lilium ſuſianum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 130.

β. Fritillaria minima. *Swert. floril.* 7. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 279.

Perſiſche Schachblume. W.

Habitat in Perſia? *e Suſis venit in Europam* 1573. ♃ (v. ſ.)

Folia infima ſunt bina, ſ. terna, ſ. quaterna verticillatim oppoſita.

*3. FRITILLARIA *verticillata*. W.

F. foliis verticillatis lineari-lanceolatis, caule unifloro. W.

Wirtelblättrige Schachblume. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Ab omnibus ſpeciebus abunde diſtincta caule *pedali erecto*, foliis *quaternis quinisve verticillatis ſeſſilibus linearibus apice valde attenuatis*, flore *ſolitario terminali.* Folia *exſiccata apice criſpantur ac ſi cirrho eſſent inſtructa.* W.

4. FRITILLARIA *pyrenaica.*

F. foliis infimis oppoſitis, floribus nonnullis folio interjectis. *Sp. pl.* 436.

*F. caule multifloro, foliis infimis oppoſitis. *Hort. cliff.* 81. *Sp. pl.* 2. *p.* 436. *Pall. it.* 1. *p.* 147.

F. flore minore. *Bauh. pin.* 64.

F. pyrenaea. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 256. *poſth.* 10.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 280.

Pyrenäiſche Schachblume. W.

Habitat in Pyrenaeis, Ruſſia. ♃ (v. v.)

5. FRITILLARIA *Meleagris.*

F. foliis alternis linearibus canaliculatis, caule unifloro. W.

F. foliis omnibus alternis, caule unifloro. *Hort. upſ.* 31. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 283. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 405. *Gouan. illuſtr.* 25. *Knorr.* 1. *t.* F 2. *Kniph. cent.* 6. *n.* 40.

F. caule paucifloro, foliis caulinis gramineis alternis. *Hall. helv. n.* 1235.

F. e foliorum alis florens. *Hort. cliff.* 119.

F. radice depreſſa. *Roy. lugdb.* 30.

F. praecox purpurea variegata. *Bauh. pin.* 64.

Meleagris. [illegible]*neal. ſpec.* 147. *t.* 146.

β. F. alba variegata. *Bauh. pin.* 64.

γ. F. alba praecox. *Bauh. pin.* 64.

δ. F. ſerotina atropurpurea. *Bauh. pin.* 64.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 281.

Gemeine Schachblume. W.

Habitat in Gallia, Italia, Auſtria, Upſaliae, Sibiria, Helvetia, Carniolia. ♃ (v. v.)

Caulis *in ſpontaneis ſaepe 4 - imo 5 - florus. Pall. it.* 3. *p.* 653. R.

*6. FRITILLARIA *latifolia*. W.

F. foliis alternis oblongo - lanceolatis planis, caule unifloro. W.

Breitblättrige Schachblume.

Habitat - - - - - - ♃ (v. v.)

Diſtinguo hanc plantam in hortis noſtris non raram, quum facies a praecedente aliena, folia *viridia nec glaucescentia, latiora plana, nunquam canaliculata,* corollae *obſcuriores,* ſtigmata *obtuſa canaliculata, nunquam acuta. Nec faciem cultura mutat et praecocius floret.* W.

*629. EUCOMIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1743.

Cor. infera 6 - partita perſiſtens patens. *Filamenta* baſi in nectarium adnatum connata.

1. EUCOMIS *nana*.

E. ſcapo clavato, foliis lato - lanceolatis acutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 432. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 47. *t.* 92. *Collect.* 4. *p.* 213. *

Fritillaria (*nana*) racemo comoſo, foliis bifariis amplexicaulibus lanceolatis. *Mant.* 223. *Burm. prod.* 9.

Ornithogalum nanum. *Thunb. prod.* 62.

Orchidea capenſis Tulipae flore roſeo. *Petiv. gaz. t.* 85. *f.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 278.

Zwerg Schopflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *acutiuſcula, baſi attenuata, plura, recurvato-patentia.* W.

*2. EUCOMIS *bifolia*.

E. ſcapo clavato, foliis ellipticis acutis geminis humi adpreſſis. W.

E. ſcapo clavato, foliis geminis lanceolato - ovatis acutis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 449. *Collect.* 4. *p.* 215. *

Zweyblättrige Schopflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Differt a praecedente: foliis *geminis humi adpreſſis, bracteis acuminatis,* floribus *erectis nec nutantibus.* W.

3. EUCOMIS *regia.*

E. ſcapo cylindrico, foliis linguiformibus obtuſis humi adpreſſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 433.

Fritillaria (*regia*) racemo comoſo inferne nudo, foliis crenatis. *Sp. pl.* 435. *Mill. dict. n.* 9.

Corona regalis lilii folio crenato. *Dill. elth.* 110. *t.* 92. *f.* 109.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 277.

Königliche Schopflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

4. EUCOMIS *undulata.*

E. ſcapo cylindrico, foliis ovato-oblongis undulatis patentibus, comae foliis longitudine fere racemi. *Ait. Kew.* 1. *p.* 433.

Ornithogalum undulatum. *Thunb. prod.* 62.

Wellenförmige Schopflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

5. EUCOMIS *punctata.*

E. ſcapo cylindrico, foliis oblongo-lanceolatis canaliculatis patentibus, comae foliis brevibus, racemis longiſſimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 433.

Eucomis punctata. *l'Herit. ſert. angl.* 18. *tab.* 18.

Aſphodelus comoſus. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 381. *t.* 83. *

Ornithogalum punctatum. *Thunb. prod.* 62.

Punctirte Schopflilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

630. UVULARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 560.

Cor. 6-petala, erecta. *Nectarii* fovea baſeos petali. *Filamenta* breviſſima.

1. UVULARIA *amplexifolia.*

U. foliis amplexicaulibus cauleque glabris. W.

U. foliis amplexicaulibus. *Mill. dict. n.* 1. *Hall. helv. n.* 1237. *Mattuſch. ſil. n.* 237. *Hoffm. germ.* 118.

U. foliis cordato-oblongis. *Roy. lugdb.* 29.

Smilax perfoliata ramoſa, flore albo. *Barr. rar.* 58. *t.* 720. *et t.* 719.

Polygonatum latifolium ramoſum. *Bauh. pin.* 303. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 531. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 537. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 11. *Rai. hiſt.* 665.

Polygonatum latifolium 4, ramoſum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 276.
Laurus alexandrina. *Cam. ep. t.* 936.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 284.
Stengelumfaſſendes Zäpfchenkraut. W
Habitat in Bohemiae, Sileſiae, Saxoniae, Helvetiae, Delphinatus *montibus.* ♃ (v. ſ.)
Pedunculus *geniculo flexo.* Corolla *Medeolae aſparagoidis.*

*2. UVULARIA *hirta.* †
U. foliis amplexicaulibus hirtis, caule villoſo. *Thunb. fl. jap.* 36.
Häariges Zäpfchenkraut. W.
Habitat in Japonia *juxta* Jedo. ♃
Caulis *teres pilis longis denſis valde hirſutus erectus, craſſitie calami, pedalis.* Folia *alterna amplexicaulia cordata oblonga acuminata ſeptemnervia, patentia villoſa, pilis breviſſimis, bipollicaria.* Flores *non vidi*: Thunb. l. c.

*3. UVULARIA *lanceolata.*
U. foliis perfoliatis ovato-lanceolatis acuminatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 434.
Polygonatum ramoſum flore luteo minus. *Corn. canad.* 40. *t.* 41.
Lanzettenblättriges Zäpfchenkraut. W.
Habitat in America *boreali.* ♃

4. UVULARIA *perfoliata.*
U. foliis perfoliatis ovatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 434.
U. foliis perfoliatis. *Amoen. Acad.* 2. *p.* 337. *Mill. dict. n.* 2.
U. caule perfoliato. *Gron. virg.* 37. *Cold. noveb.* 74.
U. folio integerrimo. *Roy. lugdb.* 29.
Uvularia. *Hort. cliff.* 121.
Polygonum ramoſum, flore luteo, majus. *Corn. canad.* 38. *Moriſ. hiſt.* 3 *p.* 538. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 12.
Polygonatum latifolium perfoliatum braſilianum. *Bauh. pin.* 303. *prodr.* 139. *Burſ. XVII.* 61.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 286.
Eyförmiges Zäpfchenkraut. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)
Plantae Burſeri *ex Toupinambault Braſiliae* a *pharmacopaeo allatae, et C. B. communicatae, videntur mihi omnes ex Canada fuiſſe.*

5. UVULARIA *ſeſſilifolia.*
U. foliis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 437.
U. foliis ſeſſilibus, flore unico. *Cold. noveb.* 73.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 287.
Sitzendes Zäpfchenkraut. W.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♃ (v. ſ.)

Habitus *praecedentis;* Caulis *bifidus, uniflorus.* Folia *lanceolato-ovata, alterna, at ubi Flos ex altero ramo exit, folia bina adſunt. Pedunculus nudus.*

*6. UVULARIA *cirrhoſa.*
U. foliis ſeſſilibus cirrhoſis. *Thunb. jap.* 136.
Rankiges Zäpfchenkraut. W.
Habitat in Japonia. ♃

Caulis *teres articulatus ſtriatus glaber ſimplex erectus.* Folia *ex eadem gemma duo ſeſſilia linearia apice cirrhoſa integerrima glabra digitalia.* Flores *ex gemma foliorum pedunculati cernui.* Pedunculus *reflexus uniflorus unguicularis.* Petala 6 *oblonga lutea ſubpollicaria.* Filamenta 6 *germini inſerta alba corolla duplo breviora.* Antherae *oblongae didymae incluſae.* Stylus *unicus corolla paulo brevior ſtaminibus longior.* Stigmata *tria reflexa.* Thunb. l. c.

631. GLORIOSA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 561.

Cor. 6-petala, undulata, reflexa. *Stylus* obliquus.

1. GLORIOSA *ſuperba.*
G. foliis cirrhiferis. *Hort. cliff.* 121. *Fl. zeyl.* 122. * *Roy. lugdb.* 29. *Mill. dict. n.* 1.
Methonica malabarorum. *Herm. lugd.* 688. *t.* 689. *Pluk. alm.* 249. *t.* 116. *f.* 3.
Lilium zeylanicum ſuperbum. *Comm. hort.* 1. *p.* 69. *t.* 35. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 178. *f.* 7.
Mendoni. *Rheed. mal.* 7. *t.* 107. *f.* 57.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 287.
Rankenblättrige Prachtlilie. W.
Habitat in Malabaria. ♃ (v. v.)

Caulis *orgyalis, teres: ramis duobus, oppoſitis, lateralibus. Caulis poſtquam ramos emiſit, pedunculum e ſingulis foliorum alis exſerit.* Folia *alterna, at ſub*

ramis terna. Flos *cernuus, figura Flammae ſupra crateres, ſpectatiſſimus, coccineus, baſi flavus, demum totus coccineus. Petala flava, lanceolata, longa, lateribus undulata, coccinea, prope baſin reflexa.* Radix *rectangula, decumbens, venenata.*

2. GLORIOSA *ſimplex.*
G. foliis acuminatis. *Maut.* 62.
G. foliis ovato-lanceolatis acutis. *Mill. dict.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 290.
Einfache Prachtlilie. W.
Habitat in Senegal.
Folia *non cirrhoſa.* Flores *coerulei.*

632. ERYTHRONIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 562.

Cor. 6-petala, campanulata: *Nectario* tuberculis 2, petalorum alternorum baſi adnatis.

1. ERYTHRONIUM *Dens canis.*
Erythronium. *Hort. cliff.* 119. *Hall. helv. n.* 1234. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 39. *t.* 7. *Roy. lugdb.* 30. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 406. *Gouan. illuſtr.* 25. *Kniph. cent.* 6. *n.* 39. *Knorr. del.* 1. *t. H.* 8.
E. foliis ovatis. *Mill. dict. n.* 1.
Dens canis latiore rotundioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
Dens caninus. *Dod. pempt.* 203.
β. Dens canis anguſtiore longioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
Erythronium (*longifolium*) foliis lanceolatis. *Mill. dict.* 2.
γ. E. foliis ovato-oblongis glabris nigro-maculatis. *Gron. virg.* 151. *flore flavo.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 291.
Gemeiner Hundszahn. W.
Habitat in Liguria, Allobrogibus, *Auguſtae* Taurinorum, Sibiria, Virginia, Monſpelii. ♃ (v. v.)
Variat *flore purpureo, carneo, albo et pleno. Gmel. l. c.*

633. TULIPA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 563.

Cor. 6-petala, campanulata. *Stylus* nullus.

1. TULIPA *ſylveſtris.*
T. caule unifloro glabro, flore ſubnutante, petalis acutis apice barbatis, foliis lanceolatis. W.

T. flore ſubnutante, foliis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 284.* *Hall. helv. n.* 1236. *Scop. carn. n.* 407. *Gouan. illuſtr.* 25. *Pall. it.* 3. *p.* 562. *Hoffm. germ.* 118. *Oed. dan. t.* 375. *Kniph. cent.* 8. *n.* 96. *Roth. germ. I.* 152. *II.* 397.

T. minor lutea italica. *Bauh. pin.* 63.

β. T. (*turcica*) flore erecto petalis lanceolato-acuminatis, foliis lanceolato-linearibus. *Roth. catal.* 1. *p.* 45.*

T. minor lutea gallica. *Bauh. pin.* 63. *Sauv. monſp.* 306.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 249.

Wilde Tulpe. W.

Habitat Monſpelii, *inque* Apenninis, Germania, Sibiria, Helvetia. ♃ (v. v.)

Diſtinguitur *a T. geſneriana*: Caule *altiore*, Foliis *anguſtioribus*, Scapo *verſus florem inflexo et ante floreſcentiam nutante. Sed praeprimis ſtaminum filamentis baſi valde attenuatis, et ſupra baſin hirſutis.* Petala *interiora margine hirſuta ſunt, et flos odorus.*

Petala *omnia apice, tria interiora etiam baſi villoſa. Leers. herb. n.* 259.

*2. TULIPA *ſuaveolens.*

T. caule unifloro pubeſcente, flore erecto, petalis obtuſis glabris, foliis ovato-lanceolatis. W.

T. flore erecto, ſcapo longitudine foliorum villoſo. *Roth. catal. bot.* 1. *p.* 45.*

T. pumilio. *Lobel. ic.* 127.

Wohlriechende Tulpe. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃ (v. v.)

Scapo *pubeſcente*, corolla *patula odorata*, praecocitate *floris ab omnibus et exigua* magnitudine *diſtincta.* W.

3. TULIPA *Geſneriana.*

T. caule unifloro glabro, flore erecto, petalis obtuſis glabris, foliis ovato-lanceolatis. W.

T. flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. *Mill. dict.* 2. *Pall. it.* 3. *p.* 652. *Kniph. cent.* 2. *n.* 95. 96. *Knorr. del.* 1. *t. T. et T.* 1. 2. 3.

T. ſcapo triphyllo, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. upſ.* 82.

T. *Hort. cliff.* 118. *Roy. lugdb.* 31. *Fl. ſuec.* 262.

T. (genus fere totum.) *Bauh. pin.* 57.

T. turcarum. *Cord. hiſt.* 213.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 295.

Gemeine Tulpe. W.

Habitat in Cappadocia, *unde in Europam* 1559. *Geſnero authore; in* Ruſſia. ♃ (v. v.)

4. TULIPA *biflora.*

T. floribus erectis planiuſculis, caule diphyllo bi-ſ. trifloro, foliis lineari-ſubulatis. *Lin. ſuppl.* 196.

Tulipa biflora. *Pall. it.* 3. *app. n.* 86. *t. D. f.* 3.

Zweyblütige Tulpe. W.

Habitat ad Wolgam *locis deſertis maxime argilloſis, imo ſalſaginoſis.* ♃ (v. ſ.)

Planta *magnitudine Ornithogali lutei.* Caulis *palmaris glaberrimus.* Folia *bina alterna linearia utrinque attenuata recurva canaliculata, inferius caulem vaginans.* Pedunculi *foliis breviores bini ſ. terni quaſi in umbella.* Flores *Ornithogali lutei aliquoties majores patentes.* Petala *tria exteriora lanceolata dilute cyanea ſ. vireſcentia, interiora alba baſi macula magna fulva.* Filamenta *baſi barbata.* Bulbus *quotannis poſt defloreſcentiam perpendiculariter demittit bulbillum, qui ſuccedit poſt floreſcentiam exſucco.*

5. TULIPA *breyniana.*

T. caule multifloro polyphyllo, foliis linearibus. *Sp. pl.* 438. *Thunb. prod.* 65.

Siſyrinchium, ex phoeniceo ſuaverubente flore aethiopicum. *Breyn. cent. t.* 36. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 18. *f.* 11.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 328.

Capiſche Tulpe. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia caulina 6. *ſ.* 7, *alterna, lineari-lanceolata: ſuprema ſenſim breviora. Flores ad apicem* 3 *ſ.* 4 *minores quam plantae Breynii cultae. Petala baſi anguſtata. Stylus nullus.*

634. ALBUCA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 564.

Cor. 6-petala, interioribus conniventibus, exterioribus patulis. *Stylus* triqueter.

* *Staminibus tribus fertilibus.*

1. ALBUCA *altiſſima.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis

ſubulatis canaliculato-convoluti. *Dryander. Act. holm.* 1784. *p.* 292. *

A. petalis interioribus apice glanduloſis et inflexis, foliis canaliculato-convolutis et ſic ſubulatis. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 36. *Collect.* 2. *p.* 264.*

Höchſte Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

Scapus *quadripedalis*. Pedunculi *recurvato-patentes*. Petala *alba linea lata viridi notata*. Folia *lata lineari-lanceolata convoluta flaccida, ut fere ſubulata.* W.

2. ALBUCA *major*.

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, pedunculis patentibus, foliis lineari-lanceolatis planis reflexis. W.

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis lineari-lanceolatis, planiuſculis. *Dryander. Act.holm.* 1784. *p.* 293. *

A. foliis lineari-lanceolatis planiuſculis reclinatis, racemo longiſſimo, pedunculis patentiſſimis, floribus nutantibus, filamentis alternis ſterilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 443. *Collect. ſuppl.* 96. *

A. foliis lanceolatis. *Berg. cap.* 87. *Thunb. prod.* 65. *Mill. dict. n.* 1.

Ornithogalum (*canadenſe*) petalis patentibus: interioribus erectis. *Sp. pl.* 1. *p.* 308.

Ornithogalum luteo-virens indicum. *Corn. canad.* 160. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 140. *f.* 7. *Raï. hiſt.* 1154. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 423. *ſ.* 4. *t.* 24. *f.* 7. *Barr. ic.* 1118.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 330.

Groſse Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

Scapus *tripedalis*. Pedunculi *ſub angulo acuto patentes*. Petala *exteriora externe flava, apice et baſi macula viridi notata, interne viridia flavo-marginata, interiora albido-flaveſcentia.* W.

*3. ALBUCA *flaccida*.

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, pedunculis rectangule patentibus, foliis lanceolato-linearibus oblique flexis. W.

A. foliis lanceolato-linearibus flaccidis, racemo brevi, pedunculis patentiſſimis, floribus nutantibus, filamentis alternis ſterilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 444. *Collect.* 4. *p.* 291. *

Welke Stiftblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *duplo anguſtiora.* Scapus *bipedalis et ultra.* Pedunculi *ſub angulo recto patentes.* Petala *luteo-alba tria exteriora externe apice et baſi viridia, interiora albo-luteſcentia.* W.

4. ALBUCA *minor.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, ſcapo erecto, floribus nutantibus, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis glabris. W.

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 294. *

A. foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 438. *Mill. dict. n.* 2. *Thunb. prod.* 65.

Ornithogalum africanum flore viridi altero alteri innato. *Herm. parad.* 209. *t.* 209.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 331.

Kleine Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *lineari-ſubulata pedalia vel ultra, baſi ſemiunciam lata.* Scapus *ſemipedalis diametro vix lineari.* Racemus *ſemipedalis et ultra.* Pedunculi *ſesquiunciales.* Bracteae *virides marginibus hyalinis cito marceſcentes ſemiunciales.* Flores *lutei.* Petala *uncia breviora,* exteriora *apice incraſſata,* interiora *apice aucta glandula uniformi inflexa alba.* Filamenta *ſterilia linearia, apice filiformi-inflexo.* Antherae *nullae.* Stylus *obverſe pyramidalis longitudine germinis tectus ramentis glanduloſis.* Stigma *pyramidale inter petala interiora conniventia prominens.* Dryand. l. c.

*5. ALBUCA *viridiflora.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, ſcapo erecto flexuoſo, floribus cernuis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis, externe hirtis. W.

A. foliis linearibus canaliculatis foris villoſis, racemo paucifloro, pedunculis patentibus, floribus nutantibus, filamentis alternis ſterilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 446. *Collect. ſuppl.* 98. *

Grünblütige Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *pedalis erectus baſi hirtus ſuperne glaber flexuoſus quadriflorus.* Pedunculi *patentiſſimi.* Flo-

res *cernui.* Petala *exteriora laete-viridia, interiora luteo-vireſcentia.* W.

*6. ALBUCA *coarctata.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculis longitudine bractearum. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 295. *Ait. Kew.* 1. *p.* 36.

Gedrängtblütige Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *lineari-ſubulata profunde canaliculata bipedalia et ultra, baſi ſemi uncia fere anguſtiora.* Scapus *foliis paulo brevior, penna anſerina anguſtior.* Racemus *coarctatus ſemipedalis.* Pedunculi *patentes uncia paulo longiores.* Bracteae *fere longitudine pedunculi.* Flores *lutei.* Petala *exteriora oblonga apice incraſſata, uncia longiores, interiora ovalia apice fornicata, exterioribus paulo breviora.* Filamenta *ſterilia fertilibus paulo breviora extus convexa, intus canaliculata.* Antherae *ſagittatae effoetae.* Stylus *priſmaticus longitudine germinis, terminatus* ſtigmate *ex angulis ſtyli apice rotundatis.* Dryand. l. c.

** *Staminibus omnibus fertilibus.*

*7. ALBUCA *faſtigiata.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis linearibus planiuſculis, ſcapo foliis breviore, pedunculis longiſſimis patentibus. W.

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, pedunculis longiſſimis. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 296.

A. foliis lanceolato-enſiformibus, floribus erectis, panicula faſtigiata. *Thunb. prod.* 65.

Gipfelblütige Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *linearia, primum canaliculata, dein planiuſcula ſesquipedalia, unciam lata.* Scapus *foliis dimidio brevior craſſitie pennae anſerinae.* Racemus *faſtigiatus longitudine ſcapi.* Pedunculi *ſub antheſi patentes, poſt floreſcentiam erecti tri- vel quadriunciales.* Bracteae *membranaceae hyalinae dorſo rufeſcentes ſemiunciales.* Flores *albi.* Petala *exteriora lineari-oblonga apice incraſſata uncia breviora, interiora ovali-oblonga apice fornicata, exterioribus paulo breviora.* Filamenta *omnia fertilia, tria alterna paulo breviora. extus con-*

vexa intus canaliculata. Stylus *priſmaticus ſulcatus germine paulo longior, ſtaminibus paulo altior, tectus ramentis breviſſimis praecipue verſus apicem, viridis ſulcis luteis, terminatus* ſtigmate *ex angulis ſtyli apice rotundatis.* Dryand. l. c.

*8. ALBUCA *caudata.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis lineari-lanceolatis margine convolutis ſtrictis ſcapo duplo brevioribus, pedunculis rectangule-patentibus longiſſimis, floribus rectis. W.

A. foliis lanceolato-linearibus canaliculatis ſtricte erectis, pedunculis patentiſſimis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 442. *Collect.* 4. *p.* 203. *

Geſchwänzte Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *ultra bipedalis arcuatim erectus.* Pedunculi *triunciales ſub angulo recto patentes.* Flores *in apice pedunculi recti vel quod idem horizontaliter ſiti, nec nutantes.* Petala *tria exteriora alba ab apice ad medium usque macula viridi notata, interiora alba linea* patenti *lata viridi picta apice flava.* W.

*9. ALBUCA *ſetoſa.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis lineari-lanceolatis planiuſculis, pedunculis rectangule-patentibus, floribus erectis. W.

A. foliis lanceolato-linearibus, pedunculis patentiſſimis, floribus erectis, ſquamis bulbi apice ſetoſis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 440. *Collect. ſuppl.* 100. *

Borſtige Stiftblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Squamae *bulbi apice ſetis terminati.* Folia *fere longitudine ſcapi laxa reflexa.* Pedunculi *interiores triunciales ſuperiores ſenſim breviores ſub angulo recto patentes.* Flores *erecti nec recti, nec nutantes.* Petala *exteriora viridia albo marginata, interiora flaveſcentia linea lata dorſali viridi. An varietas A. faſtigiatae?* W.

*10. ALBUCA *aurea.*

A. petalis interioribus apice glanduloſis inflexis, foliis lineari-lanceolatis planis, pedunculis longiſſimis erectis patentiuſculis, floribus erectis. W.

A. foliis lanceolato-linearibus, pedunculis floribusque erectis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 441. *Collect.* 4. *p.* 202. *

Goldfarbene Stiftblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Scapus *ſesquipedalis.* Pedunculi *triunciales erecti fere adpreſſi.* Flores *erecti.* Petala *aurea linea longitudinali viridi notata.* Filamenta *exteriora ſub apice gibba.* W.

*11. ALBUCA *abyſſinica.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis ſtrictis, pedunculis flore cernuo brevioribus, bracteis lineari-ſubulatis flore longioribus. W.

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis glabris, bracteis flore longioribus. *Dryand. Act. holm.* 1784. *p.* 297. *Jacq. ic.* 1. *t.* 64. *Collect.* 1. *p.* 55.

Abyſſiniſche Stiftblume. W.
Habitat in Abyſſinia? ♃
Petala *flavo-viridia.* W.

*12. ALBUCA *fragrans.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, pedunculis patentibus longitudine floris nutantis, bracteis breviſſimis. W.

A. foliis lineari-lanceolatis canaliculatis glabris, pedunculis patentiſſimis, floribus cernuis, filamentis omnibus fertilibus, bulbo depreſſo. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 44. *t.* 84. *

Wohlriechende Stiftblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Habitus fere Antherici. Petala *flavo-viridia, linea dorſali lata viridi notata.* W.

13. ALBUCA *viſcoſa.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis piloſo-viſcoſis, pedunculis patentibus flore nutante duplo longioribus. W.

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis piloſo-glanduloſis. *Dryander. Act. holm.* 1784. *p.* 297. *Jacq. ic.* 2. *t.* 445. *Collect. ſuppl.* 99. *

A. floribus erectis; foliis linearibus villoſo viſcoſis. *Lin. ſuppl.* 196.

A. foliis linearibus villoſo-viſcoſis. *Thunb. prod.* 65. *Act. holm.* 1786. *p.* 58. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 332.
Klebrige Stiftblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus, Bracteae, *et* Folia *piloſo-viſcoſi*, pedunculi *vero glabriuſculi.* Petala *alba linea dorſali viridi lata notata, interiora apice flaveſcentia.* W.

14. ALBUCA *ſpiralis.*

A. petalis interioribus apice fornicatis, foliis lineari-ſubulatis convolutis, apice ſpiraliter tortis villoſo-ſcabris, ſcapo longioribus. W.

A. floribus nutantibus, foliis ſpiralibus. *Lin. ſuppl.* 196. *Thunb. prod.* 65. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 499. *Collect. ſuppl.* 100.* *Thunb. Act. holm.* 1786. *p.* 58. *t.* 2. *f.* 1.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 332.
Spiralblättrige Stiftblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Ribecks Caſtel. ♃

Petala *ſordide flaveſcentia linea dorſali lata viridi notata.* W.

635. GETHYLLIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 184.

Cor. 6-partita, tubo filiformi longiſſimo. *Cal.* o. *Bacca* clavata radicalis unilocularis.

1. GETHYLLIS *ſpiralis.*

G. foliis linearibus ſpiralibus glabris, limbi laciniis ovato-oblongis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod* 59.
Gethyllis afra. *Sp. pl.* 633.
Papiria ſpiralis. *Thunb. Act. lund.* 1. *ſect* 2. *p.* 111.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 662.
Spiralblättrige Papierlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

2. GETHYLLIS *ciliaris.*

G. foliis linearibus ſpiralibus ciliatis, limbi laciniis ovato-oblongis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod.* 59. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 41. *t.* 70.*
Papiria ciliaris. *Thunb. Act. lund.* 1. *ſect.* 2. *p.* 111.*
Gefranzte Papierlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

3. GETHYLLIS *villoſa.*

G. foliis lineari-filiformibus ſpiralibus villoſis, limbi la-

ciniis ovato-oblongis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod.* 59.
Papiria villoſa. *Thunb. Act. lund.* 1. *ſect.* 2. *p.* 111.
Haarige Papierlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

4. GETHYLLIS *plicata.*

G. foliis linearibus utrinque attenuatis plicato-nervoſis piloſo-ciliatis, laciniis limbi lanceolatis. W.
G. (*plicata*) foliis lineari-enſiformibus plicatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 42. *t.* 80. *
Hypoxis (*plicata*) ſcapo unifloro triquetro, foliis lanceolatis plicatis villoſis. *Linn. ſuppl.* 197.
Hypoxis (*plicata*) foliis plicatis ciliatis, ſcapis ſimplicibus. *Thunb. prod.* 60.
Fabricia plicata. *Thunb. in Fabricii iter norveg.* 29.
Faltenblättrige Papierlilie. W.
Habitat in Cap. b. ſpei *collibus arenoſis.* ♃

Bulbus *globoſus.* Folia *enſiformia plicata ſubciliata, baſi carina et margine denticulata.* Corolla *flava extus vireſcens*, Antherae *baſi bifidae.*

5. GETHYLLIS *lanceolata.*

G. foliis lanceolatis planis, limbi laciniis lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. gen. p.* 14. *Thunb. prod.* 59.
Papiria lanceolata. *Thunb. Act. lund.* 1. *ſect.* 2. *p.* 112.
Lanzettenförmige Papierlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Faciem *Colchici habent Gethyllides omnes, ſed* corolla *monopetala et* bacca *bene dignoſcuntur.* Flores *fructum proferunt absque foliis.* Bacca *gratiſſimi odoris et bene ſapit.*

*636. CURCULIGO.

Roxb. corom. p. 14.

Cor. 6-petala plana. *Spatha* 1-valvis. *Stylus* breviſſimus. *Stigmata* 3 divergentia. *Capſ.* 1-locul. 4-ſperma ſpongioſa roſtrata.

*1. CURCULIGO *orchioides.*

C. orchioides. *Roxb. corom.* 1. *p.* 14. *t.* 13.* *Gaert. ſem.* 1. *p.* 63. *t.* 16.

Orchis amboinica major. *Rumph. amb.* 6. *p.* 116. *t.* 54. *f.* 1.
Ragwurzartige Rüſſellilie. W.
Habitat in Indiae locis umbroſis incultis, prope Samulcotah. ♃
Radix *tuberoſa ovata ſulcis circularibus notata.* Folia *lineari-enſiformia ſcapo triplo longiora trinervia.* Racemus *multiflorus.* Flores *flavi longe pedunculati.* Germen *triloculare, loculis* 6-8 *ſpermis, ſed loculamentum unicum cum quatuor ſeminibus tantum ad maturitatem pervenit.* W.

637. HYPOXIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 565.

Cor. 6-partita perſiſtens, ſupera. *Capſ.* baſi anguſtior. *Spatha* 2-valvis.

1. HYPOXIS *erecta.*
H. piloſa, ſcapo ſubquadrifloro foliis lineari-lanceolatis breviore, pedunculis flore duplo longioribus. W.
H. piloſa capſulis ovatis. *Sp. pl.* 439.
Ornithogalum *hirſutum* ſcapo angulato, pedunculis umbellatis villoſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 306.
Ornithogalum ſcapo bifloro. *Roy. lugdb.* 31.
Ornithogalum vernum luteum, foliis anguſtis hirſutis. *Gron. virg.* 37.
Ornithogalum virginianum luteum. *Pet. gaz.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Ornithogalum herbaceum luteum parvum virginianum, foliis gramineis hirſutis. *Pluk. alm.* 272. *t.* 350. *f.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 333.
Aufrechtſtehender Härtling. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)
Folia *Caricis ſ. Iunci piloſi.* Scapus *foliis brevior, erectus piloſus.* Bracteae 2, *ſubulatae, erectae, inter quas flos* 1. *ſ.* 2. *ſeſſilis, longitudine bractearum.*

*2. HYPOXIS *ſobolifera.*
H. piloſa, ſcapo ſubquadrifloro, foliis lineari-lanceolatis patentibus longitudine ſcapi, pedunculis flore duplo longioribus. W.
H. ſcapis racemoſis hirſutis, floribus longe pedicellatis, foliis lanceolato-linearibus hirſutis ſtriatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 372. *Collect. ſuppl.* 53. *

Wuchernder Härtling. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Vix praecedente diſtincta, niſi foliis *brevioribus magis villoſis, minus incurvatis, et* petalis *obtuſioribus.* W.

3. HYPOXIS *villoſa.*

H. villoſa, ſcapo ſubquadrifloro foliis lineari-lanceolatis breviore, pedunculis flore brevioribus, fructibus cylindraceis. W.

H. foliis lineari-enſiformibus villoſis, ſtigmate ſimplici trigono acuto. *Lin. ſuppl.* 198.

H. foliis lineari-enſiformibus, ſcapis diviſis. *Thunb. prod.* 60.

H. ſcapis ſubracemoſis, foliis lineari-enſiformibus villoſis, petalis tribus ſubtus ad apicem barbatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 370. *Collect. ſuppl.* 51.*

Fabricia villoſa. *Thunb. in Fabric. it. norv.* 31.

Haariger Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Variat magnitudine.

4. HYPOXIS *decumbens.*

H. piloſa, ſcapo ſubbifloro decumbente foliis lineari-lanceolatis breviore. W.

H. piloſa, capſulis clavatis *Sp. pl.* 439. *Amoen. acad.* 5. *p.* 396.* *Swartz. obſ.* 126.*

Ornithogalum foliis gramineis, floribus geminatis, pedunculis longiſſimis alaribus. *Brown. jam.* 195.

Anthericum ſeſſile, foliis linearibus planis, caule decumbente. *Mill. dict. t.* 39. *f.* 2.

Crocus foliis et radice ſcorzonerae. *Plum. ic.* 108. *f.* 1?

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 334.

Liegender Härtling. W.

Habitat in campis arenoſis montium Jamaicae. ♃

5. HYPOXIS *obliqua.*

H. ſcapo ſubtrifloro piloſo longitudine foliorum, pedunculis flore triplo-longioribus, foliis lanceolatis oblique flexis glabris, margine nervoque medio lanatis. W.

H. ſcapis bifidis vel trifidis hirſutis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis ad oras lanatis ſubobliquis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 371. *Collect. ſuppl.* 54.*

Gedrehtblättriger Härtling.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

6. HYPOXIS *aquatica.*

H. foliis linearibus, ſcapis umbelliferis ſ. unifloris. *Lin. ſuppl.* 197. *Ait. Kew.* 1. *p.* 439.

Waſſer Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in foſſis aqua repletis.* ♃

Folia *radicalia linearia laxa apice nutantia.* Scapi *filiformes altitudine aquae.* Flores *in aliis ſolitarii hermaphroditi, in aliis umbellati mares.*

7. HYPOXIS *minuta.* †

H. foliis triquetris carnoſis glabris, ſcapis bifidis. *Lin. ſuppl.* 197. *Thunb. prod.* 59.

Helonias (*minuta*) foliis linearibus ſcapis ramoſis. *Mant.* 225.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 521.

Kleiner Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *juxta urbem locis glareoſis.*

Planta *puſilla.* Bulbus *conicus ratione herbae magnus ſubtus truncatus et marginatus apice ſquamis linearibus conniventibus.* Folia *radicalia linearia ſubcarnoſa acuta ſcapis longiora digitalia.* Scapi *plures breviſſimi teretiuſculi baſi ſquamis involuti ramoſi;* Ramis *ſ. pedicellis unifloris.* Corolla *hexapetala patens nivea.* Filamenta 6, *corolla breviora.* Antherae *haſtatae erectae filamentis longiores.* Germen *oblongum.* Styli 3, *membranacei germini adhaerentes in figuram pyramidalem.* Koenig.

8. HYPOXIS *alba.*

H. ſcapo unifloro foliis filiformibus teretibus glabris breviore. W.

H. foliis teretibus glabris, ſcapis ſubbifidis, petalis immaculatis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. prod.* 60. *Jacq. Collect.* 4. *p.* 135. *t.* 2. *f.* 1.

Weiſser Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Planta *parvula.*

9. HYPOXIS *ovata.*

H. foliis ovato-lanceolatis integris glabris, ſcapis unifloris. *Lin. ſuppl.* 197. *Thunb prod.* 60.

Eyförmiger Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flos *pulchellus albus.*

*10. HYPOXIS *veratrifolia.* W.

H. ſcapo unifloro foliis oblongo-ellipticis glabris plicato-nervoſis breviore. W.

Hypoxis plicata. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 367. *Collect. ſuppl.* 55. * (*excluſis ſynonymis.*)

Germerblättriges Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *fere Veratri ſed minora.* Scapi *filiformes.* Flores *magni lutei, externe vireſcentes fere magnitudine H. ſtellatae.* W.

11. HYPOXIS *ſtellata.*

H. ſcapo unifloro foliis lineari-lanceolatis laxis carinatis glabris breviore. W.

H. ſcapo unifloro, foliis linearibus ſtriatis, petalis maculatis. *Lin. ſuppl.* 197. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 368. *Collect.* 4. *p.* 134. *

H. foliis planis integris glabris, ſcapis ſimplicibus unifloris, petalis baſi fuſco-maculatis. *Thunb. prod.* 60.

Fabricia ſtellata. *Thunb. in Fabr. it. norv.* 27.

Amaryllis (*capenſis*) ſpatha uniflora remotiſſima, corolla aequali, ſtaminibus piſtilloque rectis. *Sp. pl.* 420. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 11. *

Amaryllis vernalis. *Mill. dict. n.* 10

Siſyrinchium indicum. *Cornut. canad.* 168. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 421. *ſ.* 4. *t.* 23. *f.* 9. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 236. *f.* 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 184.

Sternförmiger Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Liliacea pulchella. Macula *nigricans ad ungues petalorum.*

12. HYPOXIS *ſerrata.*

H. ſcapo unifloro foliis linearibus ciliato-ſerratis carinatis breviore, corollis defloratis reflexis. W.

H. foliis canaliculatis glabris ciliato-ſerratis, ſcapis unifloris. *Lin. ſuppl.* 197. *Thunb. prod.* 60.

H. ſcapis unifloris, foliis linearibus canaliculatis glabris aculeato-ciliatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 369. *Collect.* 4. *p.* 134. *

Fabricia ſerrata. *Thunb. in Fabr. it. norv.* 29.

Geſägter Härtling. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*13. HYPOXIS *juncea.*
H. foliis canaliculatis piloſis integerrimis ſcapis unifloris. *Smith. ſpicil. tab.* 16. *
Binſenartiger Härtling. W.
Habitat in Carolinae *turfoſis.* ♃

14. HYPOXIS *faſcicularis.*
H. tubis florum longiſſimis. *Sp. pl.* 439. †
Allium ſylveſtre ſ. Moly minus, amplo flore. *Ruſſel. alep.* 34. *t.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 335.
Büſchelblütiger Härtling. W.
Habitat ad Aleppo. ♃
Corollae *tubus in icone Ruſſelii longiſſimus, oſtendit plantam a genere Hypoxidis diſtinctam, forte Gethyllidis ſpeciem.* W.

15. HYPOXIS *ſeſſilis.*
H. piloſa, acaulis, fructificationibus ſubradicalibus. *Sp. pl.* 439. †
Ornithogali virginici facie herba tuberoſa carolinenſis. *Dill. elth.* 298. *t.* 220. *f.* 287.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 335.
Sitzender Härtling. W.
Habitat in Carolina. ♃

*638. ERIOSPERMUM.
Jacq. Collect. ſuppl. 72.

Cor. 6-petala campanulata perſiſtens. *Filamenta* baſi dilatata. *Capſ.* 3-locularis *Semina* lana involuta.

1. ERIOSPERMUM *latifolium.*
E. foliis ſubrotundis acuminatis baſi cucullatis. W.
E. foliis ex ovato-ſubrotundis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 420. *Collect. ſuppl.* 73. *
Ornithogalum (*capenſe*) foliis cordato-ovatis. *Sp.* 441. *Roy. lugdb.* 31. *It. ſcan.* 73. * *Mill. dict. n.* 9.
Ornithogalum (*capenſe*) foliis cordatis petiolatis. *Thunb. prod.* 62.
Ornithogalum capenſe plantaginis roſeae foliis, radice tuberoſa. *Comm. hort.* 2. *p.* 175. *t.* 88.
Ornithogalo affinis radice tuberoſa cyclaminis folio, flore

pallide caeruleo. *Breyn. Cent. t.* 41. *Rudb. elyſ.* 1. *p. f.* 14.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 352.
Breitblättriger Wollenſame. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Racemus *longus, pedunculis longiſſimis arcuatim patulis plus quam decies flore longioribus.* W.

*2. ERIOSPERMUM *lanceaefolium.*
E. foliis ovato-lanceolatis margine ſubundulato involuto. W.
E. foliis lanceolatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 421. *Collect. ſuppl.* 72. *
Lanzenblättriger Wollenſame. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei ♃ (v. ſ.)
Racemus *anguſtus elongatus, pedunculis triplo flore longioribus erecto-patentibus.* W.

*3. ERIOSPERMUM *parvifolium.*
E. foliis ellipticis obtuſis planis. W.
E. foliis oblongis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 422. *Collect. ſuppl.* 74. *
Kleinblättriger Wollenſame. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Folium *ſesquiunciale omnium minutiſſimum.* Scapus *pedalis.* Pedunculi *rectangule-patentes flore quadruplo longiores.* W.

639. ORNITHOGALUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 566.

Cor. 6-petala, erecta, perſiſtens, ſupra medium patens. *Filamenta* baſi dilatata. *Capſula* 3-locularis. *Sem.* ſubrotunda nuda.

* *Staminibus omnibus ſubulatis.*

1. ORNITHOGALUM *uniflorum.*
O. ſcapo diphyllo, foliis oppoſitis, pedunculo unifloro, petalis exterioribus lanceolatis retuſis, interioribus ellipticis duplo latioribus. W.
O. ſcapo diphyllo, pedunculo unifloro. *Mant.* 62.
O. foliis caulinis alternis vaginantibus, pedunculo unifloro. *Laxman. Nov. Act. Petropol. vol.* XVIII. *t.* 6. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. p. 336.

Einblütige Vogelmilch. W.

Habitat in Sibiriae *montium Sinie Sopka et Maloi Altai ſummo apice.* ♃ *Eric. Laxmann.* (v. ſ.)

Planta refert omnino O. luteum, ſed Pedunculus *indiviſus, uniflorus.* Flos *dimidio minor Tulipae ſylveſtris, ſed triplo major O. lutei.* Petala *lanceolata, obtuſiuſcula, lutea, ſubtus viridia.* Filamenta *et* Antherae *luteae, petalis breviores.* Germen *oblongum.* Stylus *longitudine ſtaminum.* Stigmata *tria, obtuſa, omnia lutea.* Folia *caulis 2, altero ſuperiore, longitudine ambo floris ſ. plantae; Or. lutei duplo latiora.* H. V.

*2. ORNITHOGALUM *ſtriatum.* W.

O. ſcapo folioſo unifloro, foliis alternis oblongo-lanceolatis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus obtuſis nervoſis. W.

Geſtreifte Vogelmilch. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Folia *radicalia lineari-filiformia ſtricta.* Scapus *tri-ſ. quadriuncialis foliis tribus oblongo-lanceolatis canaliculatis inſtructus uniflorus. Flos magnitudine A. lutei,* petalis *obtuſiſſimis nervoſis, nervis coloratis.* W.

3. ORNITHOGALUM *bulbiferum.*

O. ſcapo folioſo unfloro, foliis alternis lineari-ſubulatis baſi bulbiferis, radicalibus filiformibus, petalis aequalibus acutis. W.

O. bulbis axillaribus, caule polyphyllo unifloro. *Lin. ſuppl.* 199.

Ornithogalum bulbiferum. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 106. *tab. Q.**

Zwiebeltragende Vogelmilch. W.

Habitat in aridis limoſis ad Wolgam *et* Jaicum. ♃ (v. ſ.)

Diſtinctiſſima planta caule *ſimplici unifloro,* foliis *alternis filiformibus,* bulbulo *in axillis omnibus,* floribus O. *minimi luteis,* petalis *ſubulatis.*

*4. ORNITHOGALUM *ſpathaceum.*

O. ſcapo ſubtereti monophyllo, pedunculis ſubternis, umbellatis involucro triphyllo, foliis lineari-filiformibus ſtrictis. W.

O. (*ſpathaceum*) ſcapo ſubtereti, ſpatha univalvi, umbella pedunculata ſubtriflora. *Hayne in Uſteri Neue Annalen* 15. *Stück. p.* 11. *t.* 1.*

O. (*Haynii*) foliis filiformibus ſtrictis, ſcapo ſubtereti monophyllo, umbella pedunculata ſubtriflora. *Roth. in Roem. Archiv.* 3. *p.* 42. *
Ornithogalum minimum. *Fl. dan. t.* 612.
α. umbella triflora, involucro pentaphyllo.
β. umbella biflora, involucro tetraphyllo.
γ. umbella uniflora, involucro triphyllo.
Scheidenartige Vogelmilch. W.
Habitat in nemoroſis humidiuſculis prope Hamburgum *inque ducatu* Oldenburgenſi. ♃ (v. ſ.)

Planta *ab O. minimo diſtinctiſſima*: foliis *radicalibus ſtrictis*, ſcapo *folio a floribus remoto lanceolato ſpathiformi inſtructo*, involucris *margine ſubciliatis*, pedunculis *nunquam ultra tribus*, *ſemper glabris.* W.

*5. ORNITHOGALUM *bohemicum.*

O. ſcapo folioſo ſubunifloro, foliis alternis lanceolatis, radicalibus filiformibus, pedunculis piloſiuſculis, petalis aequalibus lanceolatis obtuſiuſculis. W.
O. caule ſubunifloro, foliis radicalibus filiformibus, caulinis alternis lanceolatis. *Schmidt. bohem. n.* 336. *
Ornithogalum bohemicum. *Zeuſchm. Act. bohem.* 2. *p.* 121. *cum icone.* *
Böhmiſche Vogelmilch. W.
Habitat in ſaxoſis udis Bohemiae. ♃ (v. ſ.)

Floris *ſtructura ſimillimum ſequenti*, *ſed notis indicatis diſtinctiſſimum.* W.

6. ORNITHOGALUM *luteum.*

O. ſcapo anguloſo baſi monophyllo, foliis radicalibus linearibus, pedunculis umbellatis glabris, petalis lanceolatis. W.
O. ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. *Fl. ſuec.* 270. 285. *Mill. dict. n.* 5. *Scop. carn. n.* 410. *Pollich. pal. n.* 332. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 293. *Hoffm. germ.* 119.
O. (*pratenſe*) ſcapo polyphyllo, pedunculis ſimplicibus triquetris glabris. *Perſoon in Uſteri Neue Annalen* 5. *Stück. p.* 8. *t.* 2. *f.* 1. *
Phalangium radice bulboſa, ſtipulis maximis hirſutis, floribus umbellatis, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 1213.
Ornithogalum ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus terminalibus, filamentis omnibus ſubulatis. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 31.

O. pumilum graminifolium. *Amm. ruth. n.* 140. *Gmel.* R.
O. luteum. *Bauh. pin.* 71.
Pyrrochiton. *Reneal. ſpec.* 91. *t.* 90.
β, O. (*ſylvaticum*) ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus triquetris glabris. *Perſoon in Uſteri Neue Annalen* 5. *Stück. p.* 7. *t.* 1. *f.* 1. *
Ornithogalum luteum. *Fl. dan. t.* 612.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 337.
Gelbblütige Vogelmilch. W.
Habitat in Europae *cultis, macellis.* ♃ (v. v.)

Clariſſimus Linnaeus folia *bina baſi plerumque ſcapum vaginantia intelligere videtur, ſi ſcapum dixit diphyllum. Celeber. Perſoon vero ſub* ſcapo *diphyllo et polyphyllo involucra autumat.* W.

7. ORNITHOGALUM *minimum.*

O. ſcapo angulato nudo, pedunculis umbellatis ſubramoſis pubeſcentibus, petalis aequalibus lanceolatis acutis. W.
O. ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. *Fl. ſuec.* 271. 286. * *Mill. dict. n.* 6. *Gunn. norv. n.* 1114. *Gouan. monſ.* 309. *illuſtr.* 26. *Leers. herb. n.* 254. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 394. *Hoffm. germ.* 119.
O. (*arvenſe*) ſcapo polyphyllo, pedunculis ramoſis teretiuſculis tomentoſis. *Perſoon in Uſteri Neue Annalen* 5. *Stück. p.* 8. *t.* 1. *f.* 2. *
Phalangium radice bulboſa, ſtipulis maximis hirſutis, floribus umbellatis, petiolis multifloris. *Hall. helv. n.* 1214.
Ornithogalum pannonicum minus flore luteo. *Cluſ. pann.* 190. 391. *Hall.* R.
O. luteum minus. *Bauh. pin.* 71.
Ornithogalum pallido flore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 624.
O. luteum. *Tabernaem.* 633. *Hall.* R.
Hypoxis *Reneal. ſpec.* 92.
β. Ornithogalum bulbiferum minimum. *Colum. ecphr.* 323. 324. *Rudb. elyſ.* 139. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 338.
Kleinſte Vogelmilch. W.
Habitat in Europae *cultis oleraceis.* ♃ (v. v.)

Simillimum praecedenti, ſed petala *acutiora.*

8. ORNITHOGALUM *circinatum.*

O. ſcapo nudo, pedunculis ſubternis umbellatis pubeſcentibus, petalis tribus exterioribus longioribus acuminatis, foliis filiformibus. W.

O. hirſutie caneſcens, foliis linearibus recurvatis canaliculatis, radicali ſolitario, caulinis tribus, caule tri-ſ. quadrifloro. *Lin. ſuppl.* 199.

Ornithogalum reticulatum. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 85. *t. D. f.* 2. *

Netzhäutige Vogelmilch. W.

Habitat in ſiccis limoſis nitroſis verſus Aſtrachan. ♃ (v. ſ.)

Simillimum O. minimo, at diſtinctiſſimum. Vagina *laxa fibroſa reticulata ferruginea folium et ſcapum quaſi cucullo circumdans.* Folium *radicale unicum gracile recurvatum lineare canaliculatum ſcapo et cyma longius.* Folia *caulina tria ſ. quatuor, tot ac flores quibus adſident, figura radicalis.* Cyma *diviſione et numero florum ut in O. minimo.* Flores *majores et ſpecioſiores quam in O. luteo.* Petala *exteriora valde ſubulata. Tota planta, flore excepto, hirſutie minima caneſcente tecta.*

*9. ORNITHOGALUM *paradoxum.*

O. cauleſcens foliis multifidis ciliatis, ſcapo racemoſo pauciſloro, corollis campanulatis, filamentis lanceolatis. W.

Ornithogalum paradoxum. *Jacq. Collect. ſuppl.* 81. *t.* 1. *

Schiltzblättrige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Radix *tuberoſa.* Planta *florifera aphylla.* Scapus *biuncialis ſexflorus.* Flores *erecti ſubſeſſiles bractea lanceolata ſuffulti.* Corolla *hexapetala campanulata.* Petala *lanceolata obtuſa viridia margine alba.* Filamenta *lanceolata petalis breviora.* Planta *ſterilis emittit caules quadriunciales folioſos.* Folia *conferta linearia anguſta tri-ſeu quadrifida ciliata.* Fructus *ignotus. Forte proprii generis planta?* W.

*10. ORNITHOGALUM *niveum.*

O. racemo paucifloro, petalis lanceolatis, foliis filiformibus canaliculatis, filamentis ſubulatis. *Ait. Kew.* 1. p. 440.

Schneeweiſse Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *glabra vix digitalia.* Scapus *foliis brevior.*

Pedunculi *vix ſemiunciales.* Bracteae *oblongae acuminatae breviſſimae.* Petala *quadri-linearia alba, tria exteriora carina vireſcente.* Filamenta *petalis dimidio breviora, alterna ſesquilatiora.* Antherae *flavae.* Ait. l. c.

11. ORNITHOGALUM *umbellatum.*

O. corymbo paucifloro, pedunculis bracteis longioribus, filamentis ſubulatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 440.

O. floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis baſi dilatatis. *Syſt. veg.* 271. *Pollich. pal. n.* 333. *Hoffm. germ.* 119. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 395.

O. floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis emarginatis. *Sp. pl.* 441. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upſ.* 84. *Roy. lugdb.* 22. *Gron. orient.* 111. *Scop. carn. n.* 403. *Mill. dict. n.* 7. *Lepech. it.* 1. *p.* 196. *Iacq. auſt.* 4. *p.* 22. *t.* 343.

O. ſtipulis maximis, petiolis lateralibus longiſſimis. *Hall. helv. n.* 1215.

O. umbellatum medium anguſtifolium. *Bauh. pin.* 70.

Bulbus leucanthemos minor, ſ. Ornithogalum. *Dod. cor.* 183. *hiſt.* 221.

Eliocarmos. *Reneal. ſpec.* 88. *t.* 87.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 348.

Doldenblütige Vogelmilch. W.

Habitat in Germania, Gallia, Oriente. ♃ (v. v.)
Stercus columbinum. *Bibliis.*

*12. ORNITHOGALUM *pyrenaicum.*

O. racemo longiſſimo, petalis linearibus obtuſis, filamentis lanceolatis aequalibus, ſtylo longitudine ſtaminum. *Ait. Kew.* 1. *p.* 441.

Ornithogalum pyrenaicum. *Hudſ. angl.* 143. *Iacq. auſt.* 2. *p.* 2. *t.* 103. *Hoffm. germ.* 119. *Scop. carn. n.* 409.

Phalangium longiſſime ſpicatum, filamentis latis lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1210.

O. majus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 187.

O. pyrenaicum. *Cluſ. cur.* 21.

Pyrenäiſche Vogelmilch. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Carnioliae, *inque pratis* Germaniae, Angliae. ♃

13. ORNITHOGALUM *ſtachyoides.*

O. racemo longiſſimo, petalis lanceolato-oblongis, filamentis late lanceolatis, alternis dimidio brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 441.

O. (*pyrenaicum*) racemo longiſſimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aequalibus: fructiferis ſcapo approximatis. *Sp. pl.* 440. *Gouan. monſp.* 309. *illuſtr.* 26.

O. racemo longiſſimo, filamentis dilatato-linearibus capſulis erectis. *It. ſcan.* 220.

O. ſpica longiſſima, filamentis triangularibus. *Gron. orient.* 110.

O. anguſtifolium majus, floribus ex albo vireſcentibus. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 134. *f.* 3.

Stachyoides. *Reneal. ſpec.* 93. *t.* 90.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 340.

Aehrenförmige Vogelmilch. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

Altitudo *tripedalis ferme.* Stipulae *ſolitariae, non amplexicaules, pedicellorum longitudine.* Stamina *alterna breviora.* Gouan. l. c. R.

*14. ORNITHOGALUM *lacteum.*

O. racemo longo, filamentis ſubulatis alternis ſublanceolatis, bracteis membranaceis ovatis pedunculo duplo brevioribus, foliis lanceolatis acutis margine ciliatis. W.

O. filamentis alternis ad baſin leviter marginatis, racemo pyramidato denſo longo, foliis lanceolatis planis ad apicem conniventibus, ad oras villoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 434. *Collect. ſuppl.* 76. *

Milchweiſſe Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*15. ORNITHOGALUM *ovatum.* †

O. foliis ovatis integris glabris, racemo ovato. *Thunb. prod.* 62.

Eyförmige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

16. ORNITHOGALUM *ciliatum.* †

O. foliis ovatis acutis ciliatis, floribus racemoſis. *Lin. ſuppl.* 199.

O. foliis ovatis acutis ciliatis, racemo erecto. *Thunb. prod.* 62.

Gefranzte Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

17. ORNITHOGALUM *crenulatum.*

O. foliis oblongis obtuſis ciliatis, floribus racemoſis erectis. *Lin. ſuppl.* 198. *Thunb. prod.* 62.

O. (*unifolium*) folio radicali ſolitario carnoſo oblongo ciliato, ſcapo nudo, racemo brevi. *Retz. obſ.* 2. *p.* 17.*
Gekerbte Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

18. ORNITHOGALUM *piloſum.* †
O. foliis lineari-enſiformibus ciliatis, floribus racemoſis, pedunculis incurvis. *Lin. ſuppl.* 199. *Thunb. prod.* 61.
Haarige Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*19. ORNITHOGALUM *revolutum.*
O. racemo paucifloro, petalis lineari-oblongis oblique flexis emarginatis, filamentis lanceolato-ſubulatis, foliis linearibus. W.
O. filamentis ſubulatis, foliis ſublinearibus planiuſculis glabris, ſcapo flexuoſo racemoſo, petalis ad oras revolutis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 46. *t.* 89. *
Zurückgebogene Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*20. ORNITHOGALUM *conicum.*
O. racemo conico, filamentis ſubulatis, bracteis membranaceis longitudine pedunculorum, foliis lanceolatis planis margine villoſis. W.
O. filamentis ſubulatis, racemo conico, foliis lineari-lanceolatis utrinque acuminatis ad oras villoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 428. *Collect.* 3. *p.* 232. *
Kegelförmige Vogelmilch. W.
Habitat ad. Cap. b. ſpei. ♃

21. ORNITHOGALUM *narbonenſe.*
O. racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. *Amoen acad.* 4. *p.* 312. * *Pall. it.* 3. *p.* 654. *Gouan. illuſtr.* 26. *Hoffm. germ. I.* 151. *II.* 394.
O. majus ſpicatum, flore albo. *Bauh. pin.* 70.
O. narbonenſe. *Dod. pempt.* 222.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 342.
Franzöſiſche Vogelmilch. W.
Habitat in Galliae *auſtralis et* Italiae, Sibiriae, Germaniae *agris.* ♃

Minus quam O. pyrenaicum; pro varietate habent Gerard, *Mygind.*

Folia *ſesquipedalia, pollicem lata, in O. ſtachyoide vix palmaria, anguſtiſſima. Gou. l. c. R.*

22. ORNITHOGALUM *latifolium.*

O. racemo longiſſimo, filamentis ſubulatis, pedunculis flore multoties longioribus, foliis lanceolatis. W.

O. racemo longiſſimo, foliis lanceolato-enſiformibus, *Sp. pl.* 440. *Lin. ſuppl.* 202. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 424. *Collect.* 2. *p.* 318. *

O. latifolium et maximum. *Bauh. pin.* 70.

O. vel Lilium alexandrinum, floribus albis innumerabilibus. *Swert. floril.* 58.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 243.

Breitblättrige Vogelmilch. W.

Habitat in Arabia, Aegypto, ♃ (v. v.)

Folia *radicalia pedalia pollicis transverſi latitudine.* Scapus *ſesquipedalis teres viridis.* Racemus *longiſſimus.* Pedunculi *pollicis transverſi longitudine ſeu bracteis vix longiores.* Flos *utrinque albiſſimus.* Petala *lanceolata patentia.* Filamenta *erecta lanceolata petalis dimidio breviora alba.* Antherae *flavae.* Germen *vireſcens.* Stylus *ſimplex albus.* Stigma *ſimplex.*

23. ORNITHOGALUM *altiſſimum.*

O. racemo longiſſimo, filamentis ſubulatis, pedunculis flore duplo longioribus, foliis oblongis apice convoluto-cuſpidatis. W.

O. foliis oblongis obtuſis glabris, racemo quadripedali. *Lin. ſuppl.* 199.

O. foliis oblongo-ellipticis, racemo longiſſimo, bracteis ſetaceis. *Thunb. prod.* 62.

O. (*giganteum*) filamentis ſublanceolatis, foliis lineari-lanceolatis apice conniveute mucronatis, ſcapo racemoque longiſſimis, bracteis ſubulatis brevibus. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 45. *t.* 87. *

Höchſte Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*24. ORNITHOGALUM *ſcilloides.*

O. racemo longiſſimo, filamentis ſubulatis, pedunculis longitudine florum, bracteis pedunculorum longitudine, foliis lineari-lanceolatis laxis, apice convolutis. W.

O. filamentis ſubulatis, foliis ſubenſiformibus apice caudatis, racemis longiſſimis cylindricis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 46. *t.* 88. *

Meerzwiebelartige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*25. ORNITHOGALUM *longebracteatum.*

O. racemo longiſſimo, bracteis pedunculis fere duplo longioribus, foliis lanceolato-enſiformibus. *Murr. Syſt.* 327. *Jacq. hort. t.* 29. *

O. (*bracteatum*) foliis enſiformibus acuminatis, bracteis floribus longioribus. *Thunb. prod.* 62.

Langbeblätterte Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*26. ORNITHOGALUM *japonicum.*

O. racemo ſpicato cylindrico longiſſimo, ſcapo ſtriato. *Thunb. jap.* 137.

Japaniſche Vogelmich. W.

Habitat in Japonia *juxta* Jedo et Nagaſaki. ♃

Radix *bulboſa.* Bulbus *conicus carnoſus albus nuce avellana paulo major.* Folia *radicalia linearia plana glabra erecta digitalia ſcapo breviora.* Scapus *teres ſtriatus glaber erectus pedalis vel longior.* Flores *racemoſi erecti.* Racemus *ſpicatus cylindricus ſenſim florens digitalis vel ultra.* Bractea *ſub pedunculis linearis marceſcens perſiſtens, pedunculo brevior.* Pedunculi *capillares erecti uniflori longi.* Corolla *hexapetala purpureo-coerulea patens perſiſtens.* Petala *lanceolata lineam longa.* Filamenta 6, *ſubulata erecta alba corollae longitudine, alterne baſi latiora.* Antherae *ovatae didymae.* Germen *ſuperum.* Stylus *ſubulatus erectus albus longitudine corollae.* Stigma *ſimplex obtuſum album.* Capſula *ovata acuta triquetra ſex ſtriata, ſubvilloſa trivalvis trilocularis.* Thunb. l. c.

27. ORNITHOGALUM *comoſum.*

O. racemo breviſſimo, bracteis lanceolatis longitudine florum, petalis obtuſis, filamentis ſubulatis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 312.

O. filamentis lanceolatis, racemo breviſſimo, bracteis lanceolatis longitudine pedunculorum, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 426. *Collect* 2. *p.* 313. * *Hoſt. ſynop.* 189.

O. pannonicum albo flore ſive quartum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 187.

O. ſpicatum flore viridi lacteſcente. *Bauh. pin.* 70.

O. ſpicatum ſ. comoſum, flore lacteo. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 135. *f.* 1.

Ornithogali lactei ſpecies major. *Besl. eyſt. vern. O. 8. fol. 14. f. 3.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 342.
Schopfartige Vogelmilch. W.
Habitat in Auſtria *ad thermas* Badenſes. ♃

28. ORNITHOGALUM *pyramidale.*

O. racemo conico, floribus numeroſis adſcendentibus, petalis elliptico-oblongis planis, ſtaminibus lanceolatis aequalibus, ſtylo breviſſimo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 441.
O. racemo conico, floribus numeroſis adſcendentibus. *Roy. lugdb.* 32. *Mill. dict. n.* 2. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 425. *Collect.* 2. *p.* 317. *
O. anguſtifolium ſpicatum maximum. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 134. *f.* 4.
O. lacteum maximum. *Besl. eyſt. vern.* 5. *t.* 14. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 344.
Pyramidenförmige Vogelmilch. W.
Habitat in collibus Luſitaniae. ♃

*29. ORNITHOGALUM *tenellum.*

O. racemo brevi, filamentis ſubulatis, petalis lanceolatis, bracteis pedunculo duplo brevioribus, foliis linearibus acuminatis canaliculatis. W.
O. filamentis ſubulatis, ſcapo filiformi laxe racemoſo, bracteis pedunculo duplo brevioribus, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 427. *Collect.* 2. *p.* 316. *
O. (*graminifolium*) foliis linearibus integris glabris, racemo ſpicato erecto. *Thunb. prod.* 61?
Zarte Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Petala *lactea lanceolata acuta externe linea lata flaveſcenti colorata.* W.

*30. ORNITHOGALUM *odoratum.*

O. racemo elongato, filamentis ſubulatis, petalis lanceolatis obtuſis apice calloſo-inflexis, foliis linearibus depreſſis planis. W.
O. filamentis lanceolatis, racemo longo, foliis lanceolato-linearibus ſuperne planis humi proſtratis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 432. *Collect. ſuppl.* 78. *
Riechende Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Racemus *elongatus multiflorus floribus diſtantibus.*

Pedunculus *flore duplo longior.* Petala *luteſcentia linea medio viridi notata.* W.

***31. ORNITHOGALUM** *ſuaveolens.*

O. racemo paucifloro, filamentis ſubulatis, petalis obtuſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. W.

O. filamentis lanceolatis racemo brevi, foliis linearibus canaliculatis longitudine ſcapi. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 431. *Collect.* 2. *p.* 316. *

O. (*albucoides*) foliis linearibus canaliculatis glabris, racemo erecto. *Thunb. prod.* 62?

Sſiftblumenartige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flos *praecedentis ſed diſtinctum:* foliorum *forma,* racemo *paucifloro quatuor duntaxat floribus ornato,* pedunculisque *longitudine corollae.* W.

***32. ORNITHOGALUM** *ſecundum.*

O. racemo paucifloro ſecundo, filamentis ſubulatis, foliis linearibus ciliatis. W.

O. filamentis lanceolatis, racemo brevi ſecundo, foliis ſublinearibus ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis erectis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 433. *Collect. ſuppl.* 79. *

O. (*maculatum*) foliis lanceolatis, floribus ſecundis, petalis tribus exterioribus brevioribus fuſco-maculatis. *Thunb. prod.* 62?

Einſeitigblütige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

***33. ORNITHOGALUM** *fuſcatum.*

O. racemo multifloro, filamentis ſubulatis tribus latioribus, petalis linearibus obtuſis, foliis lineari-enſiformibus, apice convoluto-cuſpidatis ſcapo triplo brevioribus planis. W.

O. filamentis lanceolatis tribus latioribus, racemo oblongo, foliis paucis lineari-cuneiformibus, ſcapo triplo brevioribus, capſulis alato-trilobis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 429. *Collect. ſuppl.* 80. *

Bräunliche Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

***34. ORNITHOGALUM** *barbatum.*

O. racemo paucifloro, filamentis ſubulatis, petalis linearibus obtuſis, tribus exterioribus apice barbatis, interioribus mucronatis, foliis filiformibus. W.

O. filamentis ſubulatis, foliis ſubgeminis ſubulatis, petalis tribus alternis ad apicem barbatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 47. *t.* 91. *

Bärtige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*35. ORNITHOGALUM *polyphyllum.*

O. racemo paucifloro, filamentis ſubulatis, petalis linearibus obtuſis, apice calloſo-inflexis, foliis lineari-ſubulatis ſemiteretibus. W.

O. filamentis lanceolatis, racemo brevi, foliis plurimis ſubulatis ſemiteretibus. *Jacq. ic.* 2. *t.* 430. *Collect. ſuppl.* 79. *

Vielblättrige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*36. ORNITHOGALUM *juncifolium.*

O. racemo elongato multifloro, filamentis ſubulatis, petalis lanceolatis acutis, foliis filiformi-ſubulatis. W.

O. filamentis ſublanceolatis, racemo longiſſimo, foliis ſubulatis plurimis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 46. *t.* 90. *

Binſenblättrige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

37. ORNITHOGALUM *rupeſtre.*

O. foliis filiformibus carnoſis, ſcapo paucifloro. *Lin. ſuppl.* 199.

O. foliis filiformibus carnoſis, floribus reflexis. *Thunb. prod.* 61.

Felſen Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

38. O[illegible]THOGALUM *arabicum.*

O. cory[illegible]tifloro, filamentis ſubulatis, corolla late[illegible] campan[illegible]talis exterioribus obſolete tridentatis. *Ait. Kew.* [illegible] 412.

O. floribus corymboſis, pedunculis ſcapo humilioribus, filamentis ſubemarginatis. *Roy. lugdb.* 32. *Mill. dict. n.* 8.

O. umbellatum maximum. *Bauh. pin.* 69. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 130. *f.* 1.

O. arabicum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 186. *Besl. eyſt. vern.* 5. *t.* 12. *f.* 1.

Melanomphale. *Reneal. ſpec.* 89. *t.* 90.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 344.

Arabiſche Vogelmilch. W.

Habitat Aexandriae Aegypti, *inque* Madera. ♃

Stamina connata. Hall. goett. 81. Bracteae *amplexicaules, cordatae.*

*39. ORNITHOGALUM *thyrſoides.*

O. corymbis multifloris racemiformibus, filamentis alternis furcatis, foliis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 442.

α. floribus luteis, bracteis pedunculo brevioribus.

Ornithogalum dubium. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 347. *t.* 82. *f.* 3.

β. floribus albis, bracteis longitudine pedunculi.

O. (*thyrſoides*) floribus racemoſis confertiſſimis, filamentis emarginatis. *Murr. Syſt.* 328. *Jacq. hort.* 3. *p.* 17. *t.* 28. *Thunb. prod.* 62.

O. racemo conico laxo, pedunculis longiſſimis, floribus erectis. *Mill. ic.* 128. *t.* 192.

Thyrſisblütige Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*40. ORNITHOGALUM *aureum.*

O. racemo coarctato ſubcorymboſo, filamentis alternis emarginatis, foliis lanceolatis cartilagineo-denticulatis. W.

α. floribus rubris, bracteis lanceolatis, pedunculo duplo brevioribus. W.

Ornithogalum miniatum. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 438. *Collect.* 3. *p.* 233. *

β. floribus aurantiis, bracteis lanceolatis pedunculo duplo brevioribus. W.

[illegible] ovato-lanceolatis albo-marginatis, floribus racemoſis confertis, filamentis nectario emarginato inſidentibus. *Curt. mag.* 190. *

γ. floribus inapertis aurantiis, apertis albo-flaveſcentibus, bracteis lanceolatis, pedunculo duplo brevioribus. W.

Ornithogalum flaveſcens. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 437. *Collect.* 3. *p.* 233. *

δ. floribus flavis, bracteis anguſto-lanceolatis fere longitudine pedunculi. W.

Ornithogalum flaviſſimum. *Jacq. ic.* 2. *t.* 436. *Collect. ſuppl.* 65. *

Goldene Vogelmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Affine praecedenti. W.

*41. ORNITHOGALUM *coarctatum.*
O. racemo multifloro coarctato, filamentis alternis emarginatis, foliis linearibus canaliculatis. W.
O. filamenris alternis emarginatis, racemo oblongo ob pedunculos valde approximatos coarctato, foliis linearibus canaliculatis. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 435. *Collect. ſuppl.* 77. *
Gedrängtblütige Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*42. ORNITHOGALUM *caudatum.*
O. racemo longiſſimo, foliis lanceolato-linearibus, corollis patentibus, ſtaminibus dilatatis, alternis cuneiformibus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 442.
O. filamentis tribus baſi ovatis, tribus lanceolatis, racemo longiſſimo, foliis lanceolatò-linearibus apice longe ſubulatis et teretibus. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 423. *Collect.* 2. *p.* 315. *
Geſchwänzte Vogelmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

43. ORNITHOGALUM *nutans.*
O. floribus ſecundis pendulis, nectario ſtamineo campaniformi. *Mill. dict. n.* 4. *Jacq. auſtr. t.* 301. *Hoffm. germ.* 119. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 395.
O. floribus ſpicatis, ſeneſcentibus pendulis, filamentis ſtaminum alternis majoribus, bicornibus. *Hall. helv. n.* 1216.
O. floribus ſecundis pendulis, filamentis latis emarginatis. *Hort. cliff.* 124. *Hort. upſ.* 84. *Roy. lugdb.* 32.
O. exoticum, magno flore minori innato. *Bauh. pin.* 70. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 137. *f.* 12.
O. neapolitanum. *Cluſ. app.* 2. *p.* 9. *t.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 350.
Hängendblütige Vogelmilch. W.
Habitat in Italia; *Neapoli innotuit circa* 1570; in Helvetia, Germania. ♃ (v. v.)

640. SCILLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 567.

Cor. 6-petala, patens, decidua. *Filamenta* filiformia.

1. SCILLA *maritima.*
S. nudiflora, bracteis refractis. *Mat. med. p.* 94. *Mill. dict. n.* 1. *Blackw. t.* 591.

S. radice tunicata. *Hort. cliff.* 123. *Hort. upſ.* 89. *Roy. lugdb.* 32.
S. vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.
S. hiſpanica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 171.
β. Scilla radice alba. *Bauh. pin.* 73. *Seb. muſ.* 1. *t.* 44. *f.* 4. 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 354.
Gemeine Meerzwiebel. W.
Habitat ad Hiſpaniae, Siciliae, Syriae *litora arenoſa.* ♃ (v. v.)

Folia *lanceolata*, *ſtricta.* Scapus *ante folia, longiſſimus*, *multiflorus.* Flores *albi*: Bracteae *lineari-lanceolatae*, *refractae genu in medio*, *ſurſum flexae*, *ſubtus calcaratae.*

2. SCILLA *Lilio-Hyacinthus.*

S. racemo paucifloro, pedunculis ebracteatis, foliis lanceolatis humi adpreſſis, bulbo ſquamato. W.
S. radice ſquamata. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 32. *Mill. dict. n.* 2.
Hyacinthus ſtellaris, folio et radice lilii. *Bauh. pin.* 46. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 375. *t.* 12. *f.* 21.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p* 363.
Lilienartige Meerzwiebel. W.
Habitat in Biſcaja, Aquitania, Hiſpania, Pyrenaeis. N

3. SCILLA *italica.*

S. racemo conico oblongo. *Syſt. veg.* 328. *Retz. obſ.* 1. *p.* 15. *
S. corymbo conferto hemiſphaerico. *Sp. pl.* 2. *p.* 447. *Mill. dict. n.* 3.
S. radice ſolida, floribus corymboſis confertiſſimis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 32.
Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus. *Bauh. pin.* 46.
Hyacinthus ſtellaris italicus. *Beſl. eyſt. vern.* 42. *f.* 1.
Hyacinthus ſtellatus cinerei coloris. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 364.
Italiäniſche Meerzwiebel. W.
Habitat - - - - ♃ (v. ſ.)

Racemus *conico-oblongus pedicellis erectiuſculis, longitudine floris.* Flos *patens petalis lateribus reflexis, apice obtuſis, albis aut coeruleis.* Bracteae *longitudine pedicellorum.*

4. SCILLA *tetraphylla.*

S. acaulis, floribus faſciculatis, foliis quaternis ovato-lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 200.

Vierblättrige Meerzwiebel. W.
Habitat in Africa. *D. D. Fabricius Prof. Havn.*

Radix *bulboſa.* Folia *quatuor radicalia patentia cruciata cordato-lanceolata ſeſſilia nervoſa laevia.* Scapus *nullus.* Flores *foliis dimidio breviores, pedunculis filiformi-ſetaceis unifloris copioſiſſimis.* Petala *lanceolata margine membranacea.* Filamenta 6, *ſetacea petalis breviora.* Antherae *oblongae.* Germen *ſubrotundum ſexangulare obtuſum.* Stylus *filiformis.* Stigma *obtuſum.*

5. SCILLA *peruviana.*

S. corymbo conferto conico. *Mill. dict. n.* 4.
Hyacinthus indicus bulboſus ſtellatus. *Bauh. pin* 47. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 37. *f.* 1.
Hyacinthus ſtellatus peruanus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 182.
Eriophorus peruvianus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 173.
β. flore albo.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 364.
Peruvianiſche Meerzwiebel. W.
Habitat in Luſitania. ♃ (v. v.)

Radix *tunicata, lanuginoſa. Sauv.* Scapus *teres.* Corollae *ſeneſcentes recurvatae, petalorum marginibus recurvatis.*

*6. SCILLA *japonica.*

S. florum umbella terminali faſtigiata. *Thunb. jap.* 137.
Japaniſche Meerzwiebel. W.
Habitat in Japonia. ♃

Scapus *erectus ſimplex glaber palmaris.* Bracteae *in ſcapo et ſub floribus alternae membranaceae lanceolatae erecto-adpreſſae unguiculares, interſtitiis longiores.* Flores *terminales ſubumbellati.* Pedunculi *ſemiunguiculares.* Corolla *patens albo-purpurea.* Petala *in ungues attenuata oblonga obtuſa unguicularia.* Filamenta *infima baſi petalorum inſerta corolla paulo breviora.* Antherae *oblongae coeruleſcentes.* Stylus *corolla paulo longior.* Folia *nunquam vidi in planta florente.* Thunb. l. c.

7. SCILLA *amoena.*

S. ſcapo angulato, pedunculis alternis flore brevioribus, bracteis obtuſis breviſſimis. W.
S. floribus lateralibus alternis ſubnutantibus, ſcapo angulato. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *Iacq. auſtr. t.* 218. *Mill. dict. n.* 5. *Kniph. cent.* 11. *n.* 91. *Hoffm. germ.* 120. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 396.

Hyacinthus ſtellaris caeruleus amoenus. *Bauh. pin.* 46. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 34. *t.* 7.
Hyacinthus ſtellaris bizantinus. *Beſl. eyſt. vern.* 43. *f.* 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184.
β. corolla campanulata. W.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 366.
Schöne Meerzwiebel.
Habitat forte Byzantii, *unde venit in Europam* 1590; *in* Auſtria, Ruſſia, Germania. ♃ (v. v.)
Germen *flavum.* Petalorum *baſis lineolis* 2 *albidis.*

*8. SCILLA *praecox.* W.
S. ſcapo angulato, racemo ſubcorymboſo, pedunculis flore duplo longioribus, bracteis obſcuris. W.
Frühe Meerzwiebel. W.
Habitat - - - - ♃ (v. v.)
A praecedente habitu, parvitate et praecocitate floris jam primo intuitu diſtincta; differt vero: pedunculis *inferioribus longiſſimis triplo et ultra flore longioribus, ſuperioribus duplo flore longioribus;* bracteis *obtuſis minutiſſimis vix conſpicuis;* corolla *campanulata triplo praecedentis minore;* foliis *linearibus obtuſiuſculis nunquam, ut in praecedente, baſi attenuatis.* W.

*9. SCILLA *campanulata.*
S. bulbo ſolido, racemo multifloro oblongo-ſubconico corollis campanulatis erectis, bracteis bipartitis pedunculo longioribus foliis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 444.
Scilla hyacinthoides. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 65. *Collect.* 1. *p.* 61. *
Scilla hiſpanica. *Mill. dict.*
Hyacinthus ſtellaris ſaturate coeruleus. *Bauh. pin.* 46.
Hyacinthus hiſpanicus ſtellato flore. *Cluſ. cur.* 20.
Glockenblütige Meerzwiebel. W.
Habitat in Hiſpania, Luſitania. ♃ (v. ſ.)

10. SCILLA *bifolia.*
S. floribus racemoſis, foliis lanceolato-linearibus ſubbinis in ſcapo elevatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 444.
S. radice ſolida, floribus erectiuſculis paucioribus. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33. *Sauv. monſp.* 18. *Iacq. auſt.* 2. *p.* 11. *t.* 117. *Oed. dan. t.* 568. *Mill. dict. n.* 6. *Hoffm. germ.* 120. *Retz. obſ.* 6. *p.* 27. *
Phalangium radice bulboſa, foliis latiſſimis obtuſis, ſpica pauciflora, ſtipulis minimis. *Hall. helv. n.* 1211.

Anthericum bifolium. *Scop. carn. n.* 414.
Ornithogalum bifolium. *Necker in Act. pal. vol.* 2. *p.* 46.
Hyacinthus ſtellaris bifolius germanicus. *Bauh. pin.* 45.
Hyacinthus ſtellatus, bifolius vernus dumetorum, flore coeruleo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 679. R.
Hyacinthus Fuchſii. *Dodon. cor.* 181. *hiſt.* 219. R.
Hyacinthus coeruleus mas minor. *Fuchſ. hiſt.* 837.
β. Hyacinthus ſtellatus, albo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 184.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 367.
Zweyblättrige Meerzwiebel. W.
Habitat in Gallia, Germania. ♃ (v. v.)
Flores ſaepe 4, *altitudine aequales.*

*11. SCILLA *verna.*

S. bulbo tunicato, racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis, foliis linearibus canaliculatis, radicalibus pluribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 445.
S. corymbo hemiſphaerico paucifloro bracteato, foliis ſubulato-linearibus canaliculatis. *Hudſ. angl.* 142.
Ornithogalum hiſpanicum minus. *Cluſ. hiſt.* 188. *Ger. emac.* 166. *Park. par.* 139. *Raj. hiſt.* 1153.
Ornithogalum umbellatum floſculis ex albo ſubcoeruleis. *Bauh. pin.* 70.
Frühlings Meerzwiebel. W.
Habitat in Hiſpaniae *et* Cambriae *pratis atque paſcuis, inque maritimis inſulae* Monae. ♃ (v. ſ.)
Bracteae *membranaceae longitudine pedunculi.* W.

12. SCILLA *luſitanica.*

S. racemo oblongo conico, petalis lineatis. *Syſt veg. p.* 271.
Hyacinthus ſtellaris coeruleus, ſtaminibus e viridi luteis. *Bauh. pin.* 46. *Rud. elyſ.* 2. *p.* 34. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 369.
Portugiſiſche Meerzwiebel. W.
Habitat in Luſitania. ♃
Similis *Sc. amoenae.* Scapus *teres.* Racemus *oblongus, ſubconicus*, Floribus *diſtantibus, petiolo fere brevioribus.* Petala *elliptica, obtuſiuſcula, ſulcato-lineata, patentia.* Stamina *petalis paulo breviora; Antheris flavis.*

*13. SCILLA *orientalis.*

S. floribus erectis racemoſis, foliis elliptico-enſiformibus. *Thunb. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 334.

Scilla bifolia. *Thunb. jap.* 138.
Orientaliſche Meerzwiebel. W.
Habitat in Japonia. ♃

Folia *radicalia plura inferne attenuata enſiformia glabra ſpithamaea.* Scapus *erectus glaber bipedalis, ſquamis alternis ſpathaceis.* Flores *racemoſi.* Thunb. l. c.

14. **SCILLA** *hyacinthoides.*

S. racemo cylindraceo multifloro petalis germine ſesquilongioribus, pedunculis coloratis, foliis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 445.
S. racemo longiſſimo, floribus pedunculo colorato brevioribus. *Syſt. veg.* 329.
S. racemo longiſſimo, floribus ſubverticillatis, pedunculis patentibus. *Gouan. illuſtr. p.* 26.
Bulbus eriophorus orientalis. *Bauh. pin.* 47.
Ornithogalum eriophorum orientale. *Tournef. inſt.* 381.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 364.
Hyacinthenartige Meerzwiebel. W.
Habitat in Madera. ♃ (v. ſ.)

Flores *coerulei, numeroſi, parvi. Pedicelli ſparſi, filiformes, coerulei, floribus triplo longiores.*

Probe notat Dodonaeus, quod, niſi ſaepius a bulbo principe avellantur bulbilli, per annos ſaepe viginti non florebit. Gouan. l. c.

15. **SCILLA** *autumnalis.*

S. foliis filiformibus linearibus, floribus corymboſis, pedunculis nudis adſcendentibus longitudine floris. *Sp. pl.* 443. *Mill. dict. n.* 7. *Cavan. ic.* 3. *p.* 38. *t.* 274. *f.* 2.*
Anthericum autumnale. *Scop. n.* 415.
S. radice ſolida foliis ſetaceis, floribus faſtigiatis, pedunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaris. *Guett. ſtamp.* 131. *Dalib. pariſ.* 102.
S. radice ſolida, ſcapo multifloro, floribus capitatis. *Sauv. monſp.* 19.
Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor. *Bauh. pin.* 47.
Hyacinthus autumnalis minor. *Cluſ.* 1. *p.* 185.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 370.
Herbſt Meerzwiebel. W.
Habitat in Hiſpania, Gallia, Veronae, *ſolo glareoſo.* ♃

Corolla *magnitudine piſi, longitudine pedicelli.*

16. SCILLA *unifolia.*
S. folio teretiuſculo latere ſubſpicato. *Sp. pl.* 443.
Ornithogalum ſpicatum unifolium, flore niveo odorato. *Griſl. luſit.*
Bulbus monophyllus, flore albo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 622.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 372.
Einblättrige Meerzwiebel. W.
Habitat in Luſitania.

641. CYANELLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 568.

Cor. hexapetala: petalis 3 inferioribus propendentibus. *Stamen* infimum declinatum, longius.

1. CYANELLA *capenſis.*
C. caule folioſo paniculato, racemis divaricatis, foliis lanceolatis undulatis. W.
C. foliis undulatis, caule patentiſſimo. *Lin. ſuppl.* 201.
C. foliis lanceolatis undatis, ramis divaricatis. *Thunb. Act. holm.* 1794. *p.* 196. * *Thunb. prod.* 65.
Cyanella capenſis. *Syſt. veg.* 13. *p.* 272. *Iacq. hort.* 3. *p.* 21. *t.* 35.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 374.
Blaue Caplilie. W.
Habitat ad radices montis Tabularis *in* Cap. b. Spei. ♃
Statura *Scillae.* Flores *irregulares.*

2. CYANELLA *orchidiformis.*
C. caule ramoſo, racemis erectis, foliis caulinis enſiformibus ſtrictis, radicalibus ovatis. W.
C. foliis lanceolatis baſi canaliculato-amplexicaulibus ſuperne planis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 447. *Collect.* 4. *p.* 211. *
Ragwurzartige Caplilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)
Folia *glauca margine cartilagineo-denticulata.* Corolla *violaceo-purpurea.* Stamina *diſtantia tria cum petalis tribus erecta, tria cum tribus petalis deflexa.* W.

3. CYANELLA *lutea.*
C. ſcapo nudo ſubramoſo: racemis erectis, foliis lineari-lanceolatis planis. W.

C. foliis enſiformibus, ramis erectis. *Lin. ſuppl.* 201.
C. foliis enſiformibus planis, ramis erectis. *Thunb. Act. holm.* 1794. *p.* 195. *t.* 7. *f.* 1. * *Thunb prod.* 65.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 375.
Gelbe Caplilie. W.
Habitat in campis inundatis arenoſis Cap. b. ſpei. ♃

Convenit cum C. capenſi: Filamentis *baſi in urceolum natis.* Anthera *una majori.* Stigmate *ſimplici.* *Differt ab illa:* Foliis *radicalibus lanceolatis nec linearibus.* Pedunculis *minus divaricatis.* Petalis *majoribus luteis.*

Filamenta *tria erecta, tria deflexa cum majori.* W.

4. CYANELLA *alba.*
C. ſcapo nudo unifloro, foliis filiformibus. W.
C. foliis lineari-filiformibus. *Lin. ſuppl.* 201. *Thunb. Act. holm.* 1794. *p.* 195. *t.* 7. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 65.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 375.
Weiſſe Caplilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Bockland. ♃

Bractea *filiformis in medio ſcapi.* Stamina *erecta, majus tantum deflexum.* W.

642. ASPHODELUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 569.

Cor. 6-partita. *Nectarium* ex valvulis ſex germen tegentibus.

1. ASPHODELUS *luteus.*
A. caule folioſo, foliis triquetris ſtriatis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 83. *Roy. lugdb.* 33. *Blackw. t.* 233. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. hort. t.* 77. *Kniph. cent.* 8. *n.* 9.
A. caule folioſo, foliis angulatis, ſtriatis, ſtipulis maximis. *Hall. helv. n.* 1206.
A. luteus. *Dodon. coron. p.* 142. 143. R.
A. luteus flore et radice. *Bauh. pin.* 28.
A. femina. *Cam. epit.* 372.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 375.
Gelber Affodil. W.
Habitat in Sicilia. ♂ (v. v.)

Bracteae *membranaceae, albae, majuſculae.* Corollae *ſexpartitae: petalis 4 in crucem diſpoſitis: duobus intra ſuperiora tria petala poſitis.* Stamina *declinata, quorum tria breviora.*

*2. **ASPHODELUS** *creticus.*

A. caule folioſo ſuperne nudo ramoſo, foliis filiformibus ſtriatis denticulatis ſubciliatis. *Lamarck. encyclop.* 1. *p.* 297. *

A. creticus luteus ſerotinus patulus, folio aſpero. *Tournef. cor.* 25.

Cretiſcher Affodil. W.

Habitat in Creta.

3. **ASPHODELUS** *ramoſus.*

A. caule nudo ramoſo, pedunculis alternis bractea longioribus, foliis enſiformibus carinatis laevibus. W.

A. caule nudo, foliis enſiformibus carinatis laevibus. *Mat. med.* 94. *Mill. dict. n.* 2. *Oſb. it.* 47.

A. caule nudo, foliis laxis. *Hort. cliff.* 127. *Roy. lugdb.* 24. *Sauv. monſp.* 20.

A. albus ramoſus mas. *Bauh. pin.* 28.

Aſphodelus primus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 196.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 377.

Aeſtiger Affodil. W.

Habitat in Narbona, Luſitania, Hiſpania, Italia, Carniolia. ♃ (v. ſ.)

*4. **ASPHODELUS** *albus.* W.

A. caule nudo ſimplici, pedunculis confertis longitudine bractearum, foliis linearibus carinatis laevibus. W.

Aſphodelus ramoſus. *Murr. Comment. nov. Goett.* 1776. *p.* 37. *tab.* 7. *

A. verus albus. *Blackw. t.* 238.

Aſphodelus ſecundus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 197.

Weiſſer Affodil. W.

Habitat in ſaxoſis editioribus Luſitaniae, Hiſpaniae, Narbonae, Croatiae. ♃ (v. v.)

Diſtinguo hanc plantam a praecedente, quacum conjuncta erat, ob habitum et characteres conſtantes. Differt: foliis *anguſtioribus*, caule *ſemper indiviſo*, bracteis *pedunculorum longitudine*, floribus *minoribus non alternis remotis ſed multo confertioribus*. W.

5. **ASPHODELUS** *fiſtuloſus.*

A. caule nudo, foliis ſtrictis ſubulatis ſtriatis ſubfiſtuloſis. *Hort. cliff.* 83. * *Mill. dict. n.* 4. *Fabric. helmſt. p.* 5. *Gouan. monſp.* 174. *illuſtr.* 26. *Cavan. ic.* 3. *p.* 1. *t.* 202. *

A. caule nudo, foliis ſtrictis. *Roy. lugdb.* 34.

A. foliis fiſtuloſis. *Bauh. pin.* 29.

A. minor. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 197.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 379.
Röhriger Affodil. W.
Habitat in Gallo-Provincia, Hiſpania, Creta. ♃ (v. v.)

*6. ASPHODELUS *altaicus.*
A. caule nudo ſimplici, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis linearibus canaliculatis. W.
A. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis triquetro-carinatis laevibus. *Pall. Act. Petrop.* 1779, *p.* 260. *tab.* 10. *
Altaiſcher Affodil. W.
Habitat ad radices montium Altaicoru. ♃ (v. f.)

*7. ASPHODELUS *liburnicus.* †
A. caule ſimplici baſi folioſo, corollis cernuis monopetalis, foliis ſetaceis.
A. (*liburnicus*) foliis ſetaceis. *Scop. carn. n.* 411. *t.* 12. *
Hyazinthenartiger Affodil. W.
Habitat in Iſtria.
Planta adhuc obſcura ob corollas campanulatas ſexdentatas, habitu tantum Aſphodelis proxima. Diſtinguant autoptae. W.

643. ANTHERICUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 570.

Cor. 6-petala, patens. *Capſ.* ovata.

* Phalangium *foliis canaliculatis. Filamentis ſaepius glabris.*

1. ANTHERICUM *ſerotinum.*
A. foliis planiuſculis, ſcapo unifloro.
Phalangium foliis craſſulis, ſcapo unifloro. *Hall. helv. n.* 1209.
Bulbocodium foliis ſubulato-linearibus. *Roy. lugdb.* 41. *Sp. pl.* 1. *p.* 294.
Bulbocodium alpinum juncifolium, flore unico intus albo extus ſqualide rubente. *Raj. angl.* 3. *p.* 374. *t.* 17. *f.* 1.
Narciſſus ſerotinus. *Cluſ. pan.* 162.
Narciſſus autumnalis minor. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 662.
Pſeudo-Narciſſus gramineo folio. *Bauh. pin.* 51. *prodr.* 27. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 64. *f.* 9. *Burſ. III.* 41.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 326.
Späte Zaunblume. W.
Habitat in alpibus Angliae, Helvetiae, Taureri *raſtadienſis*, Wallaeſiae, Sibiriae. ♃ (v. f.)

Radix *oblonga, obducta ſquamis ramentaceis.* Scapus *bracteis ſ. foliis* 3. *ſ.* 4, *lanceolatis, alternis, minutis, vaginantibus absque Spatha.* Flos *inferus.* Petala *lineis rufis, unguibus luteis.* Filamenta *non lanata.*

*2. ANTHERICUM *fragrans.*

A. foliis tereti-filiformibus ſtrictis ſcapo brevioribus, ſcapo ſimplici. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis ſemifiliformibus ſemiteretibus rectis, ſcapo erecto duplo brevioribus. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 45. *t.* 86. *

Wohlriechende Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *albida, petalis obtuſis externe purpuraſcentibus coſta media viridi notatis.* W.

*3. ANTHERICUM *filifolium.*

A. foliis filiformibus flexuoſis reflexis ſcapo longioribus, ſcapo ſimplici filiformi, racemo paucifloro. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis filiformibus flexuoſis glabris, ſcapo ſimplici flexuoſo. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 414. *Collect. ſuppl.* 93. *

Fadenblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in regione* Namaquas. ♃

Petala *obtuſa nivea coſta media viridi.* W.

Anthericum filifolium a Clariſſ. Thunbergio prod. 62. *indicatum, eſt forte praecedens vel haec ſpecies, nam ex diagnoſi ſequenti:* foliis filiformibus ſcapo erecto brevioribus, *non auſim quid certi determinare.* W.

4. ANTHERICUM *flexifolium.*

A. foliis lineari-filiformibus flexuoſis reflexis, baſi ciliatis, ſcapi ramoſi longitudine. W.

A. filamentis glabris, radice tuberoſa fuſiformi ſaepe bifida, foliis ſubulatis flexuoſis, ſcapo ramoſo. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 412. *Collect. ſuppl.* 93. *

A. foliis ſubulatis glabris flexuoſis, caule ramoſo. *Lin. ſuppl.* 201.

A. foliis linearibus ſpiralibus ſcapo ramoſo longioribus. *Thunb. prod.* 62.

Schlankblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*5. ANTHERICUM *filiforme.*

A. foliis filiformi-teretiuſculis ſcabridis, filamentis glabris, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 451.

Fadenförmige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *filiformis pedalis, foliis brevior baſi rufeſcens maculis pallidis.* Petala *tria exteriora intus alba, extus viridia, tria interiora alba, extus linea viridi.* Ait. l. c.

*6. ANTHERICUM *exuviatum.*

A. foliis lineari-ſubulatis canaliculatis, ſcapo ſimplici foliis breviore, ſquamis radicalibus transverſim rugoſis. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis ſubulatis foris convexis, intus concavis, erectis, baſi incluſis vaginae ſcarioſae et transverſim ſtriatae, ſcapo ſimplici. *Iacq. ic. rar. 2. t. 415. Collect. ſuppl.* 89. *

Häutige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*7. ANTHERICUM *elongatum.* †

A. foliis lineari-filiformibus ſcapo ramoſo brevioribus, racemis elongatis.

Anthericum filiforme. *Thunb. prod.* 62.
Langährige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

Mutavi nomen, quum mihi diverſum videatur. W.

8. ANTHERICUM *graecum.*

A. foliis planis, ſcapo ſimplici, floribus corymboſis, filamentis lanatis. *Syſt. Veg.* 272.

Bulbocodium graecum, myoſotidis flore. *Tournef. cor.* 50.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 387.
Griechiſche Zaunblume. W.
Habitat in Oriente. *Burmannus.* ♃ (v. ſ.)

Bulbus, Folia *linearia, glabra, longitudine fere ſcapi.* Scapus *ſimplex Foliis* 3 *ſ.* 4, *brevioribus.* Corymbus *terminalis, ſubquinqueflorus: pedunculo intermedio unifloro; lateralibus bifloris.* Corolla *alba A. ramoſi. Stamina corolla breviora et Stylus ſtaminibus brevior.*

Filamenta *non lanata. Mant* 365.

9. ANTHERICUM *planifolium.*

A. foliis planis, ſcapo filamentisque lanatis. *Vandell. mſ.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 388.
Flachblättrige Zaunblume. W.
Habitat in Luſitania *trans Tagum, prope Capo de Spizel, florens Aprili. D. Vandelli.* ♃

Radices *oblongae, craſſae flaveſcentes.* Folia *radicalia, linearia, planiuſcula, ſtriata, ſubcarinata, extremitate involuto-ſubulata.* Scapus *ramoſus:* Bracteis *lanceolatis.* Pedunculis *ſubracemoſis.* Flores *rubri, magnitudine Anth. ramoſi.* Filamenta *lanata.* Antherae *flavae.* Stylus *ſtaminibus brevior.*

Statura *Anth. graeci, ſed flores minores,* Filamentis *non laevibus.*

10. ANTHERICUM *ſquameum.*

A. ſcapo ſquamis membranaceis tumidis imbricato. *Lin. ſuppl.* 202.

A. (*brevifolium*) foliis lanceolatis breviſſimis, floribus remotiſſimis. *Thunb. prod.* 62?

Schuppige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Radix *tuberoſa, tuberibus oblongis tomentoſis pluribus, filo pendulis.* Folia *tria radicalia graminea palmaria in quibusdam transverſe plicata.* Scapus *pollicaris brevis baſi undique cinctus paleis membranaceis diaphanis amplexicaulibus ſublanceolatis laxis.* Racemus *terminalis e paleis ſcarioſis hyalinis acutiſſimis.* Pedunculi *inter ſingulas paleas ſolitarii pubeſcentes filiformes longitudine palearum uniflori.* Corolla *infundibuliformis extus ſubpubeſcens ſexpartita.* Tubus *cylindricus.* Limbus *acutus carinatus longitudine pedunculi carina nudi.* Stamina *ſex limbo dimidio breviora.* Stigma *ſimplex.* Capſulae *globoſae cernuae. Media planta inter Hyacinthos, Ornithogala et Antherica.* Radix *tuberoſa, ideo non Hyacinthus, Ornithogalum ſive Scilla. Variat foliis hirſutis et glabris.*

*11. ANTHERICUM *comoſum.* †

A. foliis enſiformibus glabris, ſcapo ramoſo comoſo. *Thunb. prod.* 63.

Schopftragende Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*12. ANTHERICUM *floribundum.*

A. foliis planis glabris lineari-lanceolatis acutis, ſcapo ſimplici, racemo multifloro cylindrico compacto, petalis patentibus, ſtaminibus glabris. *Ait. Kew.* 1. *p.* 447.

A. (*Lagopus*) foliis lineari-enſiformibus ſcapo ſimplici brevioribus, racemo erecto longiſſimo. *Thunb. prod.* 63?

Vielblütige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

13. ANTHERICUM *revolutum.*

A. foliis trigonis ſcabris, ſcapo ramoſo, corollis revolutis. *Mill. dict. n.* 1.

A. foliis linearibus ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 62.

Phalangium aethiopicum ramoſum, floribus albis, petalis reflexis. *Comm. hort.* 1. *p.* 67. *t.* 34. *Murray. prodr.* 214.

Aſphodelus foliis compreſſis aſperis, caule patulo. *Tournef. inſt.* 343.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 389.

Zurückgebogene Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

14. ANTHERICUM *ramoſum.*

A. foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis planis, piſtillo recto. *Pollich. pal. n.* 334. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. n.* 413. *Iacq. auſtr. t.* 161. *Kniph. cent.* 12. *n.* 12. *Hoffm. germ.* 120. *Roth. germ. I.* 149. *II.* 319.

Phalangium radicibus teretibus, foliis gramineis, caule ramoſo, laxe paniculato. *Hall. helv. n.* 1208.

Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. *It. gotl.* 178. * *Fl. ſuec.* 267, 289.

A. caulibus ramoſis, foliis planis. *Guett. ſtamp. p.* 129.

Phalangium, parvo flore, ramoſum. *Bauh. pin.* 29. *Lob. ic.* 47.

Phalangium majus. *Cam. epit.* 580.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 390.

Aeſtige Zaunblume. W.

Habitat in Europae *auſtralioris rupibus calcareis.* ♃ (v. v.)

Horologium florae. *Act. bernenſ.* 1766. *t.* 6.

*15. ANTHERICUM *elatum.*

A. foliis planis ſcapo ramoſo, pedunculis aggregatis, corollis planis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 448.

Aſphodelus foliis planis, caule ramoſo, floribus ſparſis. *Mill. ic.* 38. *t.* 56.

Hohe Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

16. ANTHERICUM *falcatum.*

A. foliis carnoſis enſiformibus falcatis glabris, caule ramoſo racemoſo. *Lin. ſuppl.* 202.

A. foliis enſiformibus falcatis glabris, ſcapo ramoſo. *Thunb. prod.* 63.

Sichelblättrige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Folia *depreſſa terrae incumbentia et latere falcata.*

17. ANTHERICUM *contortum.*
A. foliis planis enſiformibus, caule ramoſo, floribus remotiſſimis. *Lin. ſuppl.* 202.
A. foliis enſiformibus caule ramoſo brevioribus, floribus remotiſſimis. *Thunb. prod.* 63.
Gedrehte Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Corolla *contorta.*

*18. ANTHERICUM *veſpertinum.*
A. foliis lineari-enſiformibus carinato-triquetris ſcapo ramoſo brevioribus. W.
A. filamentis muricatulis acaule, foliis triquetris integerrimis rectis, ſcapo tereti ramoſo. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 44. *t.* 85.
Abend Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*19. ANTHERICUM *graminifolium.* W.
A. foliis linearibus planis depreſſis ſcapo ramoſo brevioribus, petalis alternis undulatis. W.
A. (*undulatum*) filamentis glabris, radice faſciculata, foliis linearibus carinatis proſtratis, ſcapo ramoſo, petalis alternis undulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 411. *Collect. ſuppl.* 87.*
Grasblättrige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*20. ANTHERICUM *japonicum.*
A. foliis enſiformibus convolutis glabris, ſcapo ramoſo angulato, floribus racemoſis cernuis. *Thunb. jap.* 138.*
Japaniſche Zaunblume. W.
Habitat in Japonia, China *et* Java.

*21. ANTHERICUM *longifolium.*
A. foliis linearibus decumbentibus margine ciliatis ſcapo ramoſo longioribus. W.
A. filamentis glabris, radice faſciculata, foliis ſubtriquetris linearibus utrinque glabris ad oras ciliatis proſtratis, ſcapis axillaribus ramoſis flexuoſis proſtratis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 413. *Collect. ſuppl.* 92.*
Langblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Anthericum fimbriatum Thunb. prod. 63. *forte eadem?* W.

*22. ANTHERICUM *hirſutum.* †

A. foliis linearibus hirſutis ſcapo ramoſo brevioribus, racemo longiſſimo. *Thunb. prod.* 63.

Haarige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*23. ANTHERICUM *Adenanthera.*

A. foliis lineari-enſiformibus baſi connatis, glandula inter filamentum et antheram. *Forſt. prod. n.* 149.

Drüſige Zaunblume. W.

Habitat in Nova Caledonia.

*24. ANTHERICUM *reflexum.*

A. foliis lanceolato-enſiformibus, ſcapo ſimplici baſi folioſo, petalis tribus exterioribus anguſtiſſimis, filamentis glanduloſis, antheris cohaerentibus. W.

A. antheris coalitis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 21. *t.* 241. *

Zurückgedrehte Zaunblume. W.

Habitat - - - - ♃

Corolla *lutea, petalis tribus exterioribus triplo anguſtioribus apice reflexis, tribus interioribus ovatis.* W.

*25. ANTHERICUM *piloſum.*

A. ſcapo ſimplici folioſo glabro, foliis lanceolatis vaginantibus utrinque piloſis. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis ſublanceolatis planis utrinque piloſis ciliatis, ſcapo ſimplici glabro, *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 416. *Collect. ſuppl.* 87. *

Scheidenblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*26. ANTHERICUM *undulatum.* †

A. foliis enſiformibus falcatis undulatis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 63.

Wellenblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*27. ANTHERICUM *triflorum.*

A. foliis canaliculato-enſiformibus, ſcapo ſimplici, bracteis remotis trifloris. *Ait. Kew.* 1. *p.* 448.

A. (*bipedunculatum*) filamentis glabris, radice faſciculata, foliis lanceolato-linearibus carinatis, ſcapo racemoſo ſimplici, bracteis ſubbifloris. *Iacq. ic.* 2. *t.* 410. *Collect. ſuppl.* 88. *

Dreyblütige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*28. ANTHERICUM *canaliculatum.*

A. foliis ſubcarnoſis piloſis enſiformi-triquetris latere anguſtiori canaliculatis, ſcapo ſimplici. *Ait. Kew.* 1. *p.* 448.

Rinnenblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *teres piloſus.* Racemus *multiflorus*, pedunculi *teretes glabri vix unciales.* Bracteae *lanceolatae acuminatae ſub antheſi pedunculo breviores glabrae.* Petala *patula alba dorſo ſordide vireſcentia ſemiuncialia.* Filamenta *ſubulata alba petalis breviora hiſpidiuſcula, tria alterna minus hiſpida.* Stylus *longitudine ſtaminum.* Ait. l. c.

*29. ANTHERICUM *Albucoides.*

A. foliis linearibus canaliculatis glabris, margine cartilagineis, ſcapo ſimplici. *Ait. Kew.* 1. *p.* 449.

Stiftblumenartige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Petalis *luteis, carina viridi, apice fornicatis, refert Albucam, ſed differt* petalis *interioribus patulis et* filamentis *ſupra baſin non complicatis.* Ait. l. c.

30. ANTHERICUM *Liliago.*

A. foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo, corollis planis, piſtillo declinato. *Hort. upſ.* 83. *It. ſcan.* 104. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 290. *Mill. dict. n.* 3. *Iacq. hort.* 83. *Pollich. pal. n.* 335. *Fl. dan. t.* 616. *Kniph. cent.* 12. *n.* 11. *Hoffm. germ.* 121. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 392.

Phalangium radicibus teretibus, foliis radicalibus carinatis, enſiformibus, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 1207.

Phalangium Liliago. *Schreb. ſpicil.* 36.

Anthericum caulibus non ramoſis, foliis planis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 128.

Phalangium parvo flore, non ramoſum. *Bauh. pin.* 29. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 333. *ſ.* 4. *t.* 1. *f.* 10.

Phalangium non ramoſum. *Dod.* 106.

Liliago. *Cord. hiſt.* 2. *c.* 106. *p.* 190. *b.*

Liliago Cordi. *Lob. ic. p.* 48. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 391.

Gemeine Zaunblume. W.

Habitat in Helvetia, Germania, Gallia, ♃ (v. v.)

Folia *radicalia carinata. A planta Halleri n.* 1207.

differt, quod petala non ſint petiolata, uno ordine omnia ſita, non extus virente linea inſcripta, ſed Capſula *ovata, trilocularis et trivalvis.* Iacq. l. c. R.

31. ANTHERICUM *Liliaſtrum.*

A. foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo, corollis campanulatis, ſtaminibus declinatis. *Lepech. it.* 1. *p.* 197. *Kniph. cent.* 7. *n.* 30.

Hemerocallis floribus ſpicatis ſecundis. *Hall. helv. n.* 1230.

Hemerocallis (*Liliaſtrum*) ſcapo ſimplici, corollis hexapetalis campanulatis. *Hort. cliff.* 128. *Sp. pl.* 1. *p.* 324. *Mill. dict. n.* 4.

Liliaſtrum alpinum majus et minus. *Tournef. Scheuchz. alp.* 1. *p.* 48. *et* 7. *p.* 514. *Hall.* R.

Phalangium magno flore. *Bauh. pin.* 29.

Phalangium allobrogicum majus. *Cluſ. cur. app. alt.*

Phalangium. *Dalech. hiſt.* 852.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 392.

Lilienartige Zaunblume. W.

Habitat in alpibus Helveticis, Allobrogicis. ♃ (v. v.)

Radix *faſciculata fibris carnoſis.* Corolla *Lilii candidi, ſed minor.*

32. ANTHERICUM *ſpirale.*

A. ſcapo ſpirali. *Mant.* 224.

A. (*ſpiratum*) foliis tereti-filiformibus flexuoſis ſcapo flexuoſo brevioribus. *Thunb. prod.* 62.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 394.

Spiralförmige Zaunblume. W.

Habitat ſub monte Leonis Cap. b. ſpei, *locis glareoſis. König.* ♃

Planta *aphylla.* Foliorum *rudimenta inferne ſcapum vaginantia.* Radix *bulboſa.* Scapus *palmaris, filiformis, ſpiralis contrarius, aphyllus, ſubquadriflorus, nonnihil ſcandens.* Pedunculi *proprii, recti, floribus triplo longiores.* Bracteae *minutae, ovatae.* Flores 3 *ſ.* 4, *magnitudine Polygoni avicularis, ex apice caulis, quos vivos nondum videram.*

** Bulbine *foliis carnoſis, Filamentis barbatis.*

33. ANTHERICUM *fruteſcens.*

A. foliis carnoſis teretibus, caule fruticoſo erecto ramoſo. W.

A. foliis carnoſis teretibus, caule fruticoſo. *Mill. dict. n.* 4.

A. cauleſcens, foliis pulpoſis teretibus ſubulatis ſupine convexo-planis. *Wach. ultr.* 305.

Bulbine cauleſcens. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 122.

Phalangium capenſe cauleſcens, foliis cepitiis ſuccoſis. *Dill. elth.* 310. *t.* 231. *f.* 298.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 394.

Strauchartige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*34. ANTHERICUM *roſtratum.*

A. foliis carnoſis teretibus glaucis, caule fruticoſo breviſſimo radicante. W.

A. antheris barbatis, caulibus fruticoſis radicantibus breviſſimis, foliis ſubulatis teretibus pulpoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 403. *Collect. ſuppl.* 82. *

Schnabelblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

35. ANTHERICUM *Alooides.*

A. foliis carnoſis linguiformi-lanceolatis utrinque planiuſculis. W.

A. foliis carnoſis ſubulatis planiuſculis. *Hort. upſ.* 83. *Mill. dict. n.* 5.

A. foliis pulpoſis lanceolato-ſubulatis ſupine excavatis. *Wach. ultr.* 304.

Bulbine acaulis. *Hort. cliff.* 123. *Roy. lugdb.* 33.

Phalangium capenſe ſeſſile, foliis aloeformibus pulpoſis. *Dill. elth.* 312. *t.* 232. *f.* 300.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 396.

Aloëblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*36. ANTHERICUM *nutans.*

A. foliis carnoſis lanceolatis planis baſi concavis, apice reflexis, racemo apice nutante. W.

A. filamentis barbatis, acaule radice perenni diviſa incrura longa, foliis ſubenſiformibus planis pulpoſis patulis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 407. *Collect. ſuppl.* 86. *

A. foliis lineari-enſiformibus ſcapo brevioribus, racemo ovato cernuo. *Thunb. prod.* 63.

Hängende Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*37. ANTHERICUM *incurvum.* †

A. foliis carnoſis trigonis incurvis breviſſimis, racemo elongato cernuo. *Thunb. prod.* 62.

Krummblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

38. ANTHERICUM *latifolium.*

A. foliis carnoſis oblongo-lanceolatis acuminatis nervoſis rectis ſcapo quadruplo brevioribus. W.

A. foliis carnoſis lato-enſiformibus glabris, racemo longiſſimo, caule ſimplici. *Lin. ſuppl.* 202.

A. filamentis barbatis, acaule, radice ſubrotunda perenni, foliis enſiformibus acuminatis ſubnervoſis pulpoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 408. *Collect.* 249. *

A. foliis lato-enſiformibus glabris ſcapo brevioribus, racemo longiſſimo. *Thunb. prod.* 63.

Breitblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*39. ANTHERICUM *pugoniforme.*

A. foliis carnoſis linearibus acuminatis canaliculatis, ſcapo foliis duplo longiore. W.

A. filamentis barbatis acaule, radice ſubrotunda perenni, foliis craſſo-ſubulatis antice ſulcatis apice teretibus pulpoſis erectis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 405. *Collect. ſuppl.* 83.

Fauſtförmige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*40. ANTHERICUM *praemorſum.*

A. foliis carnoſis linearibus canaliculatis diſtichis erectis ſcapo brevioribus. W.

A. filamentis barbatis, acaule, radice perenni difformi praemorſa, foliis ſubtriquetris antice ſulcatis erectis, baſi vaginante mutuo imbricatis amplexicaulibus diſtichis pulpoſis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 406. *Collect. ſuppl.* 85. *

Abgebiſſene Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

41. ANTHERICUM *Aſphodeloides.*

A. foliis carnoſis lineari-ſubulatis ſemiteretibus ſtrictis. W.

A. foliis carnoſis ſubulatis ſemiteretibus ſtrictis. *Hort. upſ.* 83. *Mill. dict. n.* 6. *Iacq. hort. t.* 181.

A. caule foliis pulpoſis teretibus ſubulatis ſupine convexoplanis. *Wach. ult.* 305.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 397.

Aſſodilartige Zaunblume. W.
Habitat in Aethiopia. ⊙ (v. v.)

Folia *vix ſtriata, ſed ſtricta, margine aſpera, dorſo verſus alterum latus gibboſiora.*

*42. ANTHERICUM *longiſcapum.*

A. foliis carnoſis ſubulatis ſemiteretibus flexuoſis glaucis, ſcapo triplo brevioribus. W.

A. filamentis barbatis, caulibus fruticoſis breviſſimis, foliis ſubulatis ſemiteretibus pulpoſis. *Iacq. ic. rar. 2. t.* 404. *Collect. ſuppl.* 84. *

A. (*favoſum*) foliis carnoſis ſemiteretibus ſcapo brevioribus, racemo erecto longiſſimo. *Thunb. prod.* 63?

Langſchaftige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

43. ANTHERICUM *annuum.*

A. foliis carnoſis ſubulatis teretiuſculis, ſcapo ſubracemoſo. *Hort. upſ.* 83. * *Mill. dict. n.* 7.

A. acaule, foliis ſetaceis caule anguſtioribus. *Wach. ultr.* 305.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 397.
Jährige Zaunblume. W.
Habitat in Aethiopia. ⊙ (v. v.)

44. ANTHERICUM *hiſpidum.*

A. foliis carnoſis compreſſis hiſpidis. *Sp. pl.* 446.

A. filamentis muricatis, acaule, foliis hiſpidis pulpoſis, ſcapo hiſpido. *Iacq. ic.* 2. *t.* 409. *Collect. ſuppl. p.* 91. *

A. foliis carnoſis lineari-enſiformibus hiſpidis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 63.

Aſphodelus caule ſeminudo ramoſo, foliis planis lanceolatis. *Mill. dict. t.* 56?

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 398.
Vielhaarige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Radix *fibroſa.* Folia *ſubcarnoſa, compreſſa, ſtriata, ſemipedalia, recurvata, hiſpida undique pilis patulis.* Scapus *ſimplex, hiſpidus.* Racemus *bracteis lanceolatis, longitudine pedicellorum hiſpidis, uti Pedicelli.* Flores *albi carina viridi.* *Antherae luteae.*

45. ANTHERICUM *muricatum.*

A. foliis carnoſis compreſſis muricatis ſtriatis. *Lin. ſuppl.* 202.

A. foliis linearibus muricatis ſtriatis, ſcapo ramoſo inferne muricato. *Thunb. prod.* 63.

Stachliche Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Folia *longa ſcaberrima.* Scapus *bipedalis baſi hirſutus, poſtea ramoſus.*

46. ANTHERICUM *ciliatum.*
A. foliis enſiformibus carnoſo - ſubtriquetris ciliatis, ſcapo ſimplici, racemo longiſſimo. *Suppl.* 202.
A. foliis enſiformibus carnoſis ciliatis ſcapo ſimplici aequalibus, racemo longiſſimo. *Thunb. prod.* 63.
Gefranzte Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Folia *longiſſima carnoſa.*

47. ANTHERICUM *Cauda felis.*
A. foliis canaliculato - enſiformibus, ſcapo ſimplici, racemo oblongo. *Lin. ſuppl.* 202.
A. (*caudatum*) foliis canaliculato - enſiformibus ſcapo longioribus, racemo oblongo erecto. *Thunb. prod.* 63.
Geſchwänzte Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

48. ANTHERICUM *triquetrum.*
A. foliis filiformibus triquetris ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ovato. *Lin. ſuppl.* 202.
A. foliis filiformibus trigonis racemo ovato brevioribus. *Thunb. prod.* 62.
Dreyeckige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

49. ANTHERICUM *ſcabrum.*
A. foliis triquetris ſerrulatis, caule ramoſo ſcabro, pedunculis fructiferis recurvis. *Lin. ſuppl.* 202.
A. foliis trigonis ſerrulatis ſcapo ramoſo ſcabro longioribus, pedunculis fructiferis recurvis. *Thunb. prod.* 63.
Scharfblättrige Zaunblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

*50. ANTHERICUM *cirrhatum.*
A. foliis lanceolatis planiuſculis, ſcapo paniculato, filamentis barbatis bicirrhatis. *Forſt. prod. n.* 148.
Rankenfädige Zaunblume. W.
Habitat in Nova Zeelandia.

*51. ANTHERICUM *criſpum.* †
A. foliis ellipticis criſpis ciliatis, ſcapo ramoſo. *Thunb. prod.* 63.
Krausblättrige Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

*** Narthecium *foliis enſiformibus.*

52. ANTHERICUM *oſſifragum.*

A. foliis enſiformibus, filamentis lanatis. *Fl. ſuec.* 268. 287. *Oed. dan. t.* 42. *Mill. dict. n.* 9. *Gunn. norv. n.* 136. *Weber ſpicil. fl. goett. p.* 11. *Hoffm. germ.* 121. *Roth. germ. I.* 150. *II.* 392.

A. ſcapo folioſo laxe ſpicato, filamentis villoſis. *Fl. lapp.* 136. *Roy. lugdb.* 45.

Narthecium. *Moehr. E. N. C.* 1742. *p.* 389. *t.* 5. *f.* 1. *Wach. ultr.* 303. *Gort. gelr* 69.

Pſeudo-Aſphodelus paluſtris anglicus. *Bauh. pin.* 29.

Aſphodelus luteus paluſtris. *Dod. pempt.* 208.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 399.

Sumpf Zaunblume. W.

Habitat in Europae *borealis uliginoſis.* ♃ (v. ſ.)

*** Scilloides *ſtaminibus medio ventricoſis, radice bulboſa.*

*53. ANTHERICUM *phyſodes.*

A. foliis oblongis, racemo ſubcorymboſo, ſtaminibus medio dilatatis papilloſis. W.

A. filamentis glabris, radice bulboſa, foliis oblongis planis lucidis erectis, ſcapo ſimplici, racemo corymboſo. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 418. *Collect. ſuppl.* 94. *

A. (*marginatum*) foliis oblongis obtuſis marginatis, ſcapo ſimplici brevioribus, racemo ſubumbellato. *Thunb. prod.* 63.

Aufgeblaſene Zaunblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Floret ante foliorum explicationem; facies ceterum Scillae. W.

*54. ANTHERICUM *puſillum.*

A. foliis linearibus, racemo ſubcorymboſo, ſtaminibus medio dilatatis glabris. W.

A. filamentis lanceolatis glabris, radice bulboſa, foliis lanceolato-linearibus planis nitidis, in orbem proſtratis, ſcapo ſimplici, racemo corymboſo. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 417. *Collect. ſuppl.* 95. *

Anthericum pauciflorum. *Thunb. prod.* 63?

Kleinſte Zaunblume. W.

Habitat ad. Cap. b. ſpei. ♃

Facies Scillae, floret ante explicationum foliorum. Scapus *vix triuncialis.* W.

644. LEONTICE.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 571.

Cor. 6-petala. *Nectarium* 6-phyllum, unguibus corollae inſidens, limbo patens. *Cal.* 6-phyllus, deciduus.

1. LEONTICE *Chryſogonum.*
L. foliis pinnatis: foliis verticillatis lanceolatis acutis tricuſpidatis. W.
L. foliis pinnatis: petiolo communi ſimplici. *Hort. cliff.* 122. *Gron. orient.* 113. *Mill. dict. n.* 1.
Leontopetalum foliis coſtae ſimplici innaſcentibus. *Tournef. cor.* 49.
Leontopetalo affinis, foliis quernis. *Bauh. pin.* 324. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 285. *ſ.* 3. *t.* 15. *f.* 7.
Chryſogonum dioſcoridis. *Rauv. itin.* 119. *Rai. hiſt.* 1326.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 407.
Gefiedertes Löwenblatt. W.
Habitat inter Graeciae *ſegetes.* ♃

2. LEONTICE *Leontopetalum*
L. foliis radicalibus biternatis, caulinis ternatis, fructu ovato. W.
L. foliis decompoſitis: petiolo communi trifido. *Hort. cliff.* 122. *Gron. orient.* 114. *Mill. dict. n.* 2.
Leontopetalon foliis coſtae ramoſae innaſcentibus. *Tournef. cor.* 49.
Leontopetalon. *Bauh. pin.* 324. *Cam. epit.* 565. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 285. *ſ.* 3. *t.* 15. *f.* 6. *Raj. hiſt.* 1326.
Leontopodium vulgare. *Barr. ic.* 1030.
β. Leontopodium ramoſum polyanthes. *Barr. ic.* 1029.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 467.
Aechtes Löwenblatt. W.
Habitat in Apulia, Hetruria, Creta. ♃
Rumicis veſicariae fructus, ideoque fructificatio ulterius deſcribenda.

*3. LEONTICE *veſicaria.*
L. foliis biternatis, fructibus obovatis inflatis. W.
Leontice incerta. *Pall. it.* 3. *app. n.* 84. *t. V. f.* 2.*

Aufgeblaſenes Löwenblatt. W.

Habitat in Sibiria *ad lacum* Inderienſem *primo vere.* ♃

Simillima praecedenti ſed fructibus *diverſiſſima.* W.

*4. LEONTICE *altaica.*

L. foliis radicalibus decompoſitis, caulinis quinatis, foliolis lanceolatis. W.

L. foliis caulinis ternis quinatis, radicalibus ternato-quinatis, racemo laxo ſeſſili. *Pall. Act. Petrop.* 1779. *p.* 257. *t.* 8. *f.* 1. 2. 3. *

Altaiſches Löwenblatt. W.

Habitat in apricis montium Altaicorum. ♃ (v. f.)

Folia *radicalia decompoſita, petiolus enim eſt trifidus et in quolibet apice annectit foliola quinque alliptico-lanceolata integerrima.* Folia *caulina quinata, plerumque tria certicillatim poſita.* Bracteae *ellipticae obtuſae.* W.

5. LEONTICE *thalictroides.*

L. folio caulino triternato (27), florali biternato (9). *Sp. pl.* 448.

L. foliis ſupradecompoſitis. *Gron. virg.* 151. * *Cold. noveb.* 75.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 409.

Thalictrumartiges Löwenblatt. W.

Habitat in Virginia. ♃

Modus creſcendi Epimedii. Caulis *nudus, terminatus* Foliis *tribus, patentibus, petiolatis:* Petiolus *ſingulus trifidus, adnatis novem foliolis, quorum lateralia duo, ſeſſilia, biloba; intermedium petiolatum, trilobum; infra diviſuram primam caulis exſerit e latere Petiolos tres ſimplice triphyllos, infra quos Racemus ſimplex cum duobus lateralibus.*

*645. POLLIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 572.

Cor. hexapetala infera, tria exteriora majora, tria interiora reflexa. *Bacca* polyſperma.

*1. POLLIA *japonica.*

P. Japonica. *Thunb. Diſſ.* 1. *Nov. pl. gen. p.* 11. * *Fl. jap.* 138. *

Japaniſche Pollie. W.

Habitat in Japonia *et* Java. ♃

Caulis *bipedalis erectus angulatus articulatus parum ramoſus villoſo-aſperatus.* Rami *alterni breves.* Folia *in infimo caule approximata in ſupremo valde remota, alterna amplexicaulia enſiformia nervoſa glabra, ſed tamen retrorſum aſpera, ſubtus albida.* Flores *albi verticillato-corymboſi.* Pedunculi *verticillati* 4-6, *villoſi.* Thunb. l. c.

646. ASPARAGUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 573.

Cor. 6-partita, erecta: petalis tribus interioribus apice reflexis. *Bacca* 3-locularis, 2-ſperma.

1. ASPARAGUS *officinalis.*

A. caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Mat. med.* 94. *Pollich. pal. n.* 336. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 37. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 416. *Leers. herb. n.* 257. *Ludw. ect. t.* 78. *Hoffm. germ.* 121.

A. caule herbaceo erecto paniculato, floribus dioicis, pedunculis in medio articulatis. *Lamarck encyclop.* 1. *p.* 291. *

A. foliis filiformibus ſtipulatis. *Hall. helv. n.* 1239.

A. caule herbaceo erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis duabus interioribus, una exteriore. *Fl. ſuec.* 272, 291. *Hort. cliff.* 121. *Roy. lugdb.* 28.

α. Aſparagus *maritimus.*

A. maritimus, craſſiore folio. *Bauh. pin.* 490. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 38.

A. marinus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 179.

β. A. ſylveſtris tenuiſſimo folio. *Bauh. pin.* 490. *Tournef. inſt.* 300.

A. (*tenuifolius*) humilis, caule herbaceo ramoſiſſimo folioſo, floribus hermaphroditis, pedunculis longis ſub flore nodoſis. *Lamarck. encyclop.* 1. *p.* 291. *

Aſparagus ſylveſtris. *Matth.* 478.

γ. Aſparagus *altilis.*

A. ſativa. *Bauh. pin.* 489. *Mill. t.* 55. *Blackw. t.* 332. *Kniph. cent.* 6. *n.* 12. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 22. *Regn. bot.*

Aſparagus. *Camer. epit.* 259.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 320.

Gemeiner Spargel. W.

Habitat in Europae *arenoſis.* ♃ (v. v.)

Caules *herbacei, erecti, paniculati.* Stipulae *ſolitariae exteriores et binae interiores minores, inter quas Folia terna, raro* 4 *ſ.* 5, *linearia, ſed in ſummis ramis, ubi nulli flores; at in infimis ramulus.* Pedunculi *gemini, laxi, uniflori, penduli, geniculo articulato.* Corolla *campanulata, petalis interioribus longioribus.*

Var. *β. dioicam eſſe. Ger. prov.* 134; *certe hortenſis non eſt dioica; hujus* Stipulae *baſi ſpina recumbente molli, ut in A. declinato, unde affinitas;* Aſpar. *β. ſpina reverſa nonihil rigidior;* Folia *apice ſetacea.* Rami *ſtriato-angulati, qui in ſativo teretes laeves.*

Culta *et* ſpontanea *noſtra planta ſemper dioica.* Leers *l. c. It quod etiam obſervavi.* W.

2. ASPARAGUS *declinatus.*

A. caule inermi tereti, ramis declinatis, foliis ſetaceis. *Roy. lugdb.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 322.
Gebogener Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

Similis *A. officinali, ſed altior,* Foliis *pluribus, duploque longioribus.* Caulis *annuus.* Stipulae *ſolitariae, lanceolato-ſubulatae, baſi deorſum mucrone membranaceo.* Folia 7 *ſ.* 10, *filiformia, patentia.*

Planta *mea mas eſt e Cap. b. ſpei.*

*3. ASPARAGUS *decumbens.*

A. caule herbaceo inermi decumbente ramoſiſſimo, ramis flexuoſis, foliis ſetaceis, pedunculis ſolitariis terminalibus. W.
A. herbaceus inermis decumbens, ramis ſubreflexis, foliis ſubſetaceis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 71. *t.* 97.*
Liegender Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Simillis A. officinali, ſed folia minora, caulis *decumbens ramoſiſſimus,* pedunculi *ſolitarii uniflori ſub ramulorum apice,* corollaque *reflexa.* W.

*4. ASPARAGUS *flexuoſus.*

A. herbaceus inermis, caule flexuoſo, foliis lanceolatis. *Thunb. prod.* 66.
Bogiger Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

*5. ASPARAGUS *ſcandens.* †
A. herbaceus inermis volubilis, foliis lanceolatis falcatis. *Thunb prod.* 63.
Kletternder Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

6. ASPARAGUS *falcatus.*
A. aculeis ſolitariis reverſis, ramis teretibus, foliis faſciculatis linearibus falcatis, pedunculis axillaribus unifloris aggregatis. W.
A. aculeis ſolitariis reverſis, ramis teretibus, foliis enſiformibus falcatis. *Syſt. veg.* 274.
A. aculeis ſolitariis, foliis enſiformibus falcatis. *Fl. zeyl.* 123. * *Sp. pl.* 2. *p.* 449.
A. foliis falcatis ex uno puncto numeroſis. *Burm. zeyl.* 36. *t.* 13. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 322.
Sichelblättriger Spargel. W.
Habitat in Zeylona. ♄

*7. ASPARAGUS *racemoſus.* W.
A. aculeis ſolitariis, ramis ſtriatis, foliis faſciculatis lineari-ſubulatis falcatis, racemis multifloris axillaribus. W.
Traubenblütiger Spargel. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
A. praecedente diſtinctiſſimus: foliis *decies brevioribus*, *quadruplo anguſtioribus*, racemis *ſeſquiuncialibus multifloris.* Flores *ceterum parvi et* pedunculi *bracteis oblongis minutiſſimis ſuffulti.* W.

8. ASPARAGUS *retrofractus.*
A. aculeis ſolitariis, ramis teretibus reflexis retrofractisque, foliis ſetaceis faſciculatis. *Mill. dict. n.* 5.
A. fruteſcens, foliis faſciculatis ſetaceis terminalibus, ramis reflexis retroflexis. *Hort. cliff.* 121. * *Roy. lugdb.* 28.
A. africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis laricis adinſtar ex uno puncto numeroſis ſtellatim poſitis. *Pluk. amalth.* 40. *t.* 375. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 322.
Lerchenbaumblättriger Spargel. W.
Habitat in Africa. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)
Rami *teretes, dichotomi, dichotomiis verrucoſis aculeo minuto nutante.*

9. ASPARAGUS *aethiopicus.*
A. aculeis ſolitariis reverſis, ramis angulatis, foliis lanceolato-linearibus. *Mant.* 63.
A. aculeatus africanus, corrudae 3. Cluſii ſimilis. *Rai. ſuppl.* 359. *n.* 5. *et* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 323.
Aethiopiſcher Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ. ſ. fl.)
Similis *A. falcato, ſed* Folia *minora* 7 *circiter, nec* 3. Stipulae *emittunt ſpinam retro ſpectantem.* Rami *flexuoſi, angulati, quaſi fruticoſi, virides.* H. V.

10. ASPARAGUS *aſiaticus.*
A. aculeis ſolitariis, caule erecto, ramis filiformibus, foliis faſciculatis ſetaceis. *Mill. dict. n.* 8.
A. aculeis alternis, ramis ſolitariis filiformibus, foliis ſetaceis faſciculatis lateralibns. *Hort. cliff.* 122. * *Roy. lugdb.* 28.
A. aculeatus minor ſarmentoſus. *Pluk. alm.* 54. *t.* 15. *f.* 4. *Burm.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 324.
Aſiatiſcher Spargel. W.
Habitat in Aſia. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

11. ASPARAGUS *albus.*
A. aculeis ſolitariis, ramis angulatis flexuoſis, foliis faſciculatis triquetris muticis deciduis. *Mill. dict. n.* 4.
A. aculeis ſolitariis, ramulis flexuoſis binis oppoſitis ſpinoſis folioſis, foliis faſciculatis. *Roy lugdb.* 29.
A. aculeatus, ſpinis horridus. *Bauh. pin.* 490.
Corruda tertia. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 178.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 324.
Weiſſer Spargel. W.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ♄ (v. v. ſ. fl.)
Caulis *albus.* Spinae *rectae patentes ſ. reflexae.*

12. ASPARAGUS *acutifolius.*
A. caule inermi angulato fruticoſo, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. *Mill. dict. n.* 3.
A. foliis aciformibus pungentibus, caule fruticoſo inermi. *Sauv. monſp.* 45.
A. foliis acutis. *Bauh. pin.* 490.
A. ſylveſtris. *Cam. epit.* 260.
Corruda prior. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 77.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 325.

Spitzblättriger Spargel. W.
Habitat in Luſitania, Hiſpania, Oriente. ♄ (v. ſ.)

Similis *A. aphyllo, ſed folia ſeptena ſaepius, filo vix craſſiora; at illi ſaepius terna triplo craſſiora valdeque ſubulata.*

*13. ASPARAGUS *ſubulatus.* †

A. fruteſcens inermis, ramis retroflexis, foliis tereti-ſubulatis. *Thunb. prod.* 66.
Pfriemförmiger Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*14. ASPARAGUS *dependens.* †

A. fruticoſus aculeatus, ramis reflexis, foliis ſubulatis. *Thunb. prod.* 66.
Hängender Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

15. ASPARAGUS *horridus.*

A. aphyllus fruticoſus pentagonus, aculeis tetragonis compreſſis ſtriatis. *Lin. ſuppl.* 203. *Cavan. ic.* 2. *p.* 30. *t.* 136. *
A. hiſpanicus, aculeis craſſioribus horridus. *Tournef. inſt.* 300.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 326.
Fürchterlicher Spargel. W.
Habitat in Hiſpania. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Caules *lignoſi pentagoni aphylli.* Aculei *alterni ſolitarii remoti lignoſi robuſti interſtitiis longiores ſ. longitudine digiti tetragoni compreſſi ſtriati.* Folia *vix ulla.*

16. ASPARAGUS *aphyllus.*

A. caule inermi angulato fruticoſo, foliis ſubulatis ſtriatis inaequalibus divergentibus. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 29. *Mill. dict. n.* 6.
A. aculeatus alter tribus aut quatuor ſpinis ad eundem exortum. *Bauh. pin.* 490.
Corruda altera. *Cluſ. hiſt.* 2, *p.* 178.
β. Aſparagus creticus fruticoſus, craſſioribus et brevioribus aculeis, magno fructu. *Tournef. inſt.* 91. *t.* 15.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 326.
Blattloſer Spargel. W.
Habitat in Sicilia, Hiſpania, Luſitania. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*17. ASPARAGUS *lanceus.*

A. aculeis ſolitariis, foliis lanceolatis ſubfalcatis, pedunculis axillaribus ſolitariis. *Thunb. prod.* 66.

Lanzenblättriger Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

18. ASPARAGUS *capenſis.*
A. ſpinis quaternis, ramis aggregatis teretibus, foliis ſetaceis. *Sp. pl.* 450.
A. rubicundus. *Berg. cap.* 58. *Pluk. alm. t.* 78. *f.* 3.
A. foliis quinis ſetaceis, ſpinis terminalibus lateralibusque, ramulis ternis quaternisque. *Hort. cliff.* 121.
Corruda africana, ſpinis brevibus aduncis. *Raj. ſuppl.* 359.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 327.
Capiſcher Spargel. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Radix *tuberoſa.* Caules *fruticoſi, filiformes, flexuoſi.* Spinae 4, *patentes, ſubrecurvae, acutiſſimae.* Ramuli *ex axillis ſpinarum filiformes, laxi, inermes, decidui:* Foliolis *ſetaceis; acutis, inermibus, brevibus.* Rami, *inter ramulos, ſolitarii, rigidi.*

19. ASPARAGUS *ſarmentoſus.*
A. foliis ſolitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoſo, aculeis recurvis. *Fl. zeyl.* 124. * *Mill. dict. n.* 11.
A. aculeatus zeylanicus maximus ſarmentoſus. *Herm. lugdb.* 62. *t.* 650. 63. *Raj. hiſt.* 1877.
Schadaveli Kelangu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 19.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 328.
Rankender Spargel. W.
Habitat in Zeylona. ♄

Affinis maxime Medeolae aſparagoidi.

20. ASPARAGUS *verticillaris.*
A. foliis verticillatis. *Sp. pl.* 450. †
A. orientalis, foliis gallii. *Tournef. cor.* 21. *Buxb. cent.* 5. *app.* 47. *t.* 37.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 328.
Wirtelblättriger Spargel. W.
Habitat in Oriente, *circa* Derbentum *et alibi.*

647. DRACAENA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 574.

Cor. 6-partita, erecta. *Filam.* medio ſubcraſſiora. *Bacca* 3-locularis, 1-ſperma.

1. DRACAENA *Draco.*
D. arborea, foliis ſubcarnoſis apice ſpinoſis. *Syſt. Veg.* 275.

Aſparagus Draco. *Sp. pl.* 2. *p.* 451. *Vandell. monogr. Ulyſs.* 1768. *Behrens diſs. Goett.* 1770.
Palma Draco. *Mill. dict. n.* 11.
Stoerkia Draco. *Cranz. Diſſ. p.* 30. *f.* 1. 2. *
Oedera dragonalis. *Cranz. Diſſ. p.* 30. *f.* 3. *
Cordyline foliis inermibus integerrimis flaccidis. *Roy. lugdb.* 22.
Palma foliis longiſſimis pendulis, absque pedunculis e caudice glabro enatis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 169.
Draco arbor. *Bauh. pin.* 503. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 1. *Blackw. t.* 358.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 414.
Gemeiner Drachenbaum. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Pedunculi *geniculo inſtructi.*

*2. DRACAENA *indiviſa.*
D. arborea, foliis enſiformibus acutis, racemo laterali compoſito. *Forſt. eſcul. n.* 33. * *Forſt. prod. n.* 150.
Ungetheilter Drachenbaum. W.
Habitat ad portum obſcurum Novae Zeelandiae. ♄
Caulis *arboreus bi-ſeu triorgyalis.* Folia *terminalia ſeſſilia ſemiamplexicaulia baſi imbricata late enſiformia membranacea acuta integerrima patentia bipedalia, palmum lata.* Racemus *lateralis compoſitus ex alis foliorum (ſed ſorſan folia jam ſeriora ſeu ſecundi anni prodierant), ovatus nutans, racemis partialibus in formam cylindricam thyrſoideam digeſtis.* Forſt. l. c.

*3. DRACAENA *umbraculifera.*
D. arborea, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, corymbo breviſſimo terminali multifloro. W.
D. arborea, foliis enſiformibus acuminatis, panicula terminali denſiſſima ſubſeſſili. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 50. *t.* 95. *
Schattenreicher Drachenbaum. W.
Habitat culta in inſula Mauritii. ♄
Corolla *infundibuliformis, tubo limbo duplo longiore.* W.

*4. DRACAENA *auſtralis.*
D. arborea, foliis enſiformibus acutis, racemo terminali erecto ſupradecompoſito. *Forſt. prod. n.* 151.
Südlicher Drachenbaum. W.
Habitat in Nova Zeelandia *ad aeſtuarium* Reginae Charlottae. ♄

*5. DRACAENA *cernua.*

D. arborea, foliis lanceolatis ſuboblique-flexis, panicula dependente divaricata. W.

D. caule arboreo, foliis lineari-lanceolatis acutis, panicula cernua. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 50. *t.* 96. *

Hängender Drachenbaum. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

6. DRACAENA *ferrea.*

D. arborea, foliis lanceolatis acutis. *Syſt. Veg.* 275.

Convallaria fruticoſa. *Syſt. nat.* 10. *p.* 984.

Arbor ferrea. *Obſ. it.* 251.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 417.

Eiſenfeſter Drachenbaum. W.

Habitat in China. ♄

7. DRACAENA *terminalis.*

D. herbacea cauleſcens, foliis lanceolatis. *Syſt. veg.* 275. *Jacq. ic.* 2. *t.* 448. *Collect.* 2. *p.* 354. *

Aſparagus terminalis. *Sp. pl.* 2. *p.* 450.

Terminalis. *Rumph. amb.* 4. *p.* 79. *t.* 34.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 420.

Gränzen Drachenbaum. W.

Habitat in India. ♄ (v. v.)

Folia *fere Cannae.* Racemus *terminalis ex aliquot racemis ramoſis.* Pedicelli *alterni, ſolitarii, flore breviores, cincti ad baſin* gluma *obtuſa.* Arbor *dura.*

*8. DRACAENA *marginata.*

D. fruticoſa, foliis dentato-ſpinoſis, racemis axillaribus, baccis polyſpermis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 454.

Aloë purpurea. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 85. *

Aloëblättriger Drachenbaum. W.

Habitat in inſula Bourbon. ♄

9. DRACAENA *ſtriata.*

D. fruteſcens cauleſcens erecta, foliis lanceolatis oblique falcatis ſtriatis, caule flexuoſo. *Lin. ſuppl.* 204.

Aſparagus (*ſtriatus*) cauleſcens erectus, foliis linearibus ſubfalcatis obtuſis. *Thunb. prod.* 65.

Geſtreifter Drachenbaum. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

10. DRACAENA *undulata.*

D. herbacea caulefcens erecta, foliis ovatis acutis multinerviis, floribus axillaribus pedunculatis. *Lin. ſuppl.* 203.

Aſparagus (*undulatus*) cauleſcens erectus, foliis ovatis acutis multinerviis, floribus axillaribus pedunculatis. *Thunb. prod.* 66.
Wellenblättriger Drachenbaum. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

11. DRACAENA *erecta.*
D. herbacea caulefcens erecta, foliis lanceolatis ſubulatis ſubſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 204.
Aſparagus (*erectus*) caulefcens erectus, foliis lanceolatis acuminatis ſeſſilibus, floribus lateralibus. *Thunb. prod.* 65.
Aufrechter Drachenbaum. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

12. DRACAENA *enſifolia.*
D. herbacea ſubcauleſcens, foliis enſiformibus. *Syſt. veg.* 275.
Dianella nemoroſa. *Lamarck encyclop.* 2. *p.* 273.* *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 49. *t.* 94.*
Gladiolus odoratus indicus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 145. *t.* 73.
Schwerdtblättriger Drachenbaum. W.
Habitat in India. ♃ (v. v.)
Folia *enſiformi-lanceolata, enervia, ſubtus carinata, petiolata.* Scapus *ſ. Caulis ramoſus, paniculatus, ad exortum ramorum* Foliolis *duobus, parvis, coloratis.*
Omnes fere ſpecies bacca gaudent polyſperma, exceptis tantum n. 1. *et* 5. W.

*13. DRACAENA *borealis.*
D. herbacea ſubcauleſcens, foliis ellipticis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 454. *t.* 5.
Nördlicher Drachenbaum. W.
Habitat in Terra nova, *ſinu* Hudſonis *et* Canada. ♃ (v. ſ.)

14. DRACAENA *graminifolia.*
D. herbacea acaulis, foliis linearibus. *Syſt. veg.* 275. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 322.*
Aſpargus graminifolius. *Sp. pl.* 2. *p.* 450.
Grasblättriger Drachenbaum. W.
Habitat in Aſia.
Statura *Antherici phalangii.* Folia *graminea, valde ſtriata, ſpithamaea.* Scapus *vix foliis longior.* Flores *ad ſingulos dentes racemi* 4 *ſ.* 5, *pedicellis flore ipſo brevioribus, quaſi e gluma obtuſa prodeuntibus. Sp. pl.* 2.

648. SANSEVIERA.

Thunb. prod. praef. 29.

Cor. infera monopetala tubo filiformi limbo 6-partito revoluto. *Stam.* limbo inſerta. *Bacca* 1-ſperma.

1. SANSEVIERA *guineenſis.*

S. foliis lanceolatis uniformibus, ſtylo ſtaminibus duplo longiore, bracteis tubo corollae triplo brevioribus, floribus ſeſſilibus. W.

Sanſeviera (*thyrſiflora*) acaulis, foliis lanceolatis carnoſis, floribus geminatis. *Thunb. prod.* 65.

Aletris hyacinthoides β. guineenſis. *Sp. pl.* 456.

Aletris guineenſis. *Iacq. hort.* 1. *p.* 63. *t.* 84.

Aloë guineenſis, radice geniculata, foliis ex viridi et atro undulatim variegatis. *Comm. hort.* 2. *p.* 39. *t.* 20. *prael.* 84. *t.* 33.

Guineenſiſche Sanſeviere. W.

Habitat in Guinea. ♃ (v. v.)

2. SANSEVIERA *zeylanica.*

S. foliis glabris oblongis acutis planis et lineari-lanceolatis canaliculatis, ſtylo longitudine ſtaminum, bracteis pedunculi longitudine. W.

Sanſeviera (*aethiopica*) acaulis, foliis linguiformibus convolutis, racemo oblongo, floribus erectis. *Thunb. prod.* 65?

Salmia (*ſpicata*) foliis rigidis canaliculatis maculatis, floribus ſpicatis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 24. *t.* 264. *

Liriope (*ſpicata*) foliis enſiformibus glabris, ſpica tereti. *Loureiro cochin. p.* 248.

Aletris (*hyacinthoides*) acaulis, foliis lanceolatis carnoſis, floribus geminatis. *Sp. pl.* 456.

Aloë (*hyacinthoides*) floribus ſeſſilibus horizontalibus infundibuliformibus aequalibus, limbo revoluto. *Sp. pl.* 1. *p.* 321.

Aloë foliis lanceolatis planis rectis radicalibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 85. *Fl. zeyl.* 130.

Aloë zeylanica pumila, foliis variegatis. *Com. hort.* 2. *p.* 41. *t.* 21. *Pluck. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 5.

Aloë foliis exterioribus lanceolatis planis erectis radicalibus, interioribus longiſſimis. *Roy. lugdb.* 23.

Zeyloniſche Sanſeviere. W.

Habitat in Zeylona. ♃

*3. SANSEVIERA *lanuginoſa.* W. †

S. foliis nervoſis, nervis lanuginoſis, inferioribus oblongis, reliquis linearibus, ſtylo ſtaminum longitudine, pedunculis ebracteatis. W.

Katu Kapel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 83. *t.* 42.

Wollige Sanſeviere. W.

Habitat in Indiae *arenoſis.* ♃

Diſtinxi hanc ex diſcriptione et icone Clariſſ. Rheede, quum multis notis diverſa videatur. W.

649. CONVALLARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 575.

Cor. 6-fida. *Bacca* maculoſa, 3-locularis.

* Lilium convallium T. *corollis campanulatis.*

1. CONVALLARIA *majalis.*

C. ſcapo nudo laevi, foliis ovatis. W.

C. ſcapo nudo. *Fl. lapp.* 113. *Fl. ſuec.* 283. 292. *Mat. med.* 95. *Blackw. t.* 70. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 34. *Pollich. pal. n.* 337. *Mill. dict. n.* 1. *Ludw. ect. t.* 87. *Kniph. cent.* 10. *n.* 23. *Sabb. hort.* 1. *t.* 5. *Knorr. del.* 2. *t. C.* 3. *Hoffm. germ.* 121. *Roth. germ. I.* 147. *II.* 386.

Polygonatum ſcapo diphyllo, floribus ſpicatis, nutantibus, campaniformibus. *Hall. helv. n.* 1241.

Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304. *Camer. epit.* 618. *Dodon. cor.* 137.

Lilium convallium alpinum. *Bauh. pin.* 304.

Lilium convallium latifolium. *Bauh. pin.* 304.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 333.

Gemeines Mayblümchen. W.

Habitat in Europa *ſeptentrionali.* ♃ (v. v.)

2. CONVALLARIA *japonica.*

C. ſcapo nudo ancipiti, floribus racemoſis ſecundis, foliis linearibus ſcapo triplolongioribus. *Lin. ſuppl.* 204.

C. ſcapo nudo ancipiti, racemo cernuo. *Thunb. jap.* 139.*

α. *major* foliis bipedalibus, ſcapo ſpithamaeo.

β. *minor* foliis palmaribus ſcapo duplo longioribus.

Mondo. *Kaempf. amoen.* 823. *cum. icone.*

Japaniſches Mayblümchen. W.

Habitat in Japonia. ♃ (β. v. v.)

*3. CONVALLARIA *ſpicata.* †

C. ſcapo nudo, racemo ſpicato, floribus aggregatis. *Thunb. jap.* 141.

Aehrenblütiges Mayblümchen. W.

Habitat in Japonia. ♃

Radix *fibroſa.* Folia *radicalia linearia, inferne attenuata obtuſiuſcula multiſtriata glabra ſcapo longiora.* Scapus *ſtriato-angulatus ſimplex erectus glaber palmaris usque pedalis.* Racemus *digitalis floſculis ſparſim aggregatis.* Pedunculi *teretes patentes glabri uniflori lineam longi.* Corolla *hexapetala ſubgloboſa glabra violacea.* Petala *ovata obtuſa concava.* Filamenta 6, *germini inſerta breviſſima erecta.* Antherae *ovatae didymae erectae.* Germen *ſuperum ſexſtriatum glabrum.* Stylus *unicus erectus albus ſtaminibus brevior.* Stigma *ſimplex.* Fructus *obſcurus, ſed bacca videtur globoſa. In alio ſpecimine videbatur capſula trilocularis ſeminibus in ſingulo loculamento duobus.* Thunb. l. c.

** Polygonatum T. *corollis infundibuliformibus.*

4. CONVALLARIA *verticillata.*

C. foliis verticillatis. *Fl. lapp.* 114. *Fl. ſuec.* 275. 293. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *Oed. dan. t.* 86. *Pollich. pal. n.* 338. *Scop. carn. n.* 419. *Roth. germ. I.* 148. *II.* 387. *Hoffm. germ.* 122.

Polygonatum caule ſimplici erecto, foliis ellipticis et verticillatis. *Hall. helv. n.* 1244.

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. *Bauh. pin.* 303.

Polygonatum alterum. *Dod. pempt.* 345.

β. Polygonatum anguſtifolium ramoſum. *Bauh. pin.* 304. *Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 333.

Wirtelblättriges Mayblümchen. W.

Habitat in Europae *ſeptentrionalis ſaltibus, praecipitiis.* ♃ (v. v.)

5. CONVALLARIA *Polygonatum.*

C. foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Mat. med.* 95. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 34. *Phil. bot.* 218. *Mill. dict.* 5. *Scop. carn.* 240. *Pollich. pal. n.* 339. *Flor. dan. t.* 377. *Knorr.*

del. 2. *t. P.* 4. *Hoffm. germ.* 122. *Roth. germ. I.* 148. *II.* 388.
C. foliis alternis, floribus axillaribus. *Fl. ſuec.* 274. 294. *Hort. cliff.* 124. *Gron. virg.* 37. *Roy. lugdb.* 26.
C. foliis alternis, pedunculis pendulis unifloris. *Sauv. monſp.* 42.
Polygonatum caule ſimplici, anguloſo, cernuo, foliis ovato-lanceolatis, rigidis, alis unifloris. *Hall. helv. n.* 1242.
Polygonatum flore odoro. *Cluſ. pan.* 263. 264.
Polygonatum floribus ex ſingularibus pedunculis. *Bauh. pin.* 3. *p.* 350.
Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Bauh. pin.* 303. *Barrel. ic.* 711. *Kniph. cent.* 3. *n.* 32.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 333.
Weiſswurz Mayblümchen. W.
Habitat in Europae *ſeptentrionalis praecipitiis, rupibus.* ♃ (v. v.)
Variat *flore pleno.* R.

6. CONVALLARIA *multiflora.*
C. foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Phil. bot.* 218. *Fl. ſuec.* 2. *p.* 295. *Mill. dict. n.* 3. *et. ic. t.* 101. *Scop. carn. n.* 421. *Pollich. pal. n.* 340. *Fl. dan. t.* 152. *Blackw. t.* 251. *Hoffm. germ.* 122. *Roth. germ. I.* 148. *II.* 388.
C. foliis alternis, pedunculis pendulis multifloris. *Sauv. monſp.* 4.
Polygonatum caule ſimplici cernuo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis multifloris. *Hall. helv. n.* 1243.
Polygonatum. *Dod. purg.* 77. *Camer. epit.* 692.
Polygonatum latifolium maximum. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum latifolium 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 275.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 334.
Vielblütiges Mayblümchen. W.
Habitat in Europae *ſeptentrionalis praecipitiis, rupibus.* ♃ (v. v.)
Variat *pleno flore.*

*7. CONVALLARIA *latifolia.*
C. foliis alternis amplexicaulibus acuminatis, caule angulato, pedunculis axillaribus multifloris. *Murr. Syſt. veg.* 334. *Iacq. auſtr.* 3. *t.* 232. *Hoſt. ſyn.* 194.
Polygonatum tertium latiore folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 276. *absque. icone.*

Breitblättriges Mayblümchen. W:
Habitat in Auſtriae, Pannoniae *ſylvis.* ♃
Habitum habet C. multiflorae, flores C. Polygonati et folia C. majalis. Iacq. l. c.

*** Smilaces T. *corollis rotatis.*

8. CONVALLARIA *racemoſa.*
C. foliis alternis ſeſſilibus ovatis acuminatis, panicula terminali nuda. W.
C. foliis ſeſſilibus, racemo terminali compoſito. *Mill. dict. n.* 8.
C. racemo compoſito. *Roy. lugdb.* 26.
C. foliis alternis, racemo terminali. *Hort. cliff.* 125. *Gron. virg.* 38.
Polygonatum racemoſum. *Corn. canad.* 36. *t.* 37.
Polygonatum racemoſum et racemoſum ſpicatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 537. *ſ.* 13. *t.* 4. *f.* 9.
Polygonatum racemoſum americanum, ellebori albi foliis ampliſſimis. *Pluk. alm.* 301. *t.* 311. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 335.
Traubenblütiges Mayblümchen. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)

9. CONVALLARIA *ſtellata.*
C. foliis alternis amplexicaulibus ellipticis acutiuſculis, racemo terminali ſimplici. W.
C. foliis amplexicaulibus plurimis. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 2. *n.* 18.
Polygonatum virginianum erectum ſpicatum, flore ſtellato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 536. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 7.
Polygonatum canadenſe ſpicatum fertile. *Corn. canad.* 33. *t.* 33.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 336.
Sternförmiges Mayblümchen. W.
Habitat in Canada. ♃ (v. v.)
Flores *hujus ut in C. bifolia ſaepius tetrandri.* W.

10. CONVALLARIA *trifolia.*
C. foliis amplexicaulibus ternis, racemo terminali ſimplici. *Sp. pl.* 452.
C. floribus racemoſis, foliis ovatis oblongis caulinis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 36. *t.* 6.
Phalangium veratri foliis. *Amm. ruth.* 137.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 336.
Dreyblättriges Mayblümchen. W.

Habitat in Sibiriae *ſylvis.* ♃

11\. CONVALLARIA *bifolia.*

C. foliis cordatis, floribus tetrandris. *Fl. lapp.* 113. *Fl. ſuec.* 276. 296. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb* 26. *Oed. dan. t.* 291. *Mill. ic. t.* 105. *Pollich. pal. n.* 341. *Scop. carn. n.* 422. *Kniph. cent.* 7. *n.* 12. *Hoffm. germ.* 122.

Majanthemum Convallaria. *Roth. germ. I.* 70. *II.* 196.

C. foliis cordatis petiolulatis: floribus quadrifidis tetrandris. *Neck. gallob. p.* 164.

Unifolium. *Hall. helv. n.* 1240. *Dodon. coron. p.* 138. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 35.

Lilium convallium minus. *Bauh. pin.* 304. *Barrel. ic.* 1212.

Gramen parnaſſi. *Cam. epit.* 744.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 337.

Zweyblättriges Mayblümchen. W.

Habitat in Europae *borealis pratis depreſſis aſperis.* ♃ (v. v.)

Flores 4-*fidi.*

650. POLYANTHES.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 576.

Cor. infundibulif. incurva, aequalis. *Filam.* corollae fauci inſerta. *Germen.* in fundo corollae.

1\. POLYANTHES *tuberoſa.*

P. foliis linearibus ſcapo brevioribus. W.

P. floribus alternis. *Hort. cliff.* 127. *Hort. upſ.* 76. *Fl. zeyl.* 225. *Mill. dict. Kniph. cent.* 12. *n.* 76. *Knorr. del.* 1. *t. T.* 12.

Hyacinthus indicus tuberoſus, flore narciſſi. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 39. *f.* 4.

β. Hyacinthus indicus tuberoſus flore hyacinthi orientalis. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 39. *f.* 2.

Hyacinthus indicus, tuberoſa radice. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 176.

Amica nocturna. *Rumph. amb.* 5. *p.* 285. *t.* 98.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 411.

Gemeine Tuberoſe. W.

Habitat in Iava, Zeylona. ♃ (v. v.)

*2. POLYANTHES *pygmaea.*

P. foliis oblongo-ovatis ſcapo longioribus. W.

P. ſcapo racemoſo foliis radicalibus geminis breviore. *Jacq. ic. rar. 2. t. 380. Collect. ſuppl. 56.* *

Zwerg Tuberoſe. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Planta *ſimillima Agapantho enſifolio, quocum forte proprium formet genus. Differt a dicto Agapantho:* foliis *oblongo-ovatis*, ſtaminibus *tribus corolla longioribus. Binas has plantas diſtinctis ſub generibus propoſui, quae iis auctores citati aſſignavere, quum vivas examinare occaſio mihi deerat.* W.

*651. DRIMIA.

Jacq. Collect. ſuppl. 39.

Cor. infera campanulata 6-fida, laciniis revolutis. *Stam.* corollae inſerta. *Stigma* capitatum.

*1. DRIMIA *ciliaris.*

D. foliis linearibus carinatis ciliatis. W.

D. foliis ſublinearibus ciliatis. *Iacq. ic. rar. 2. t. 377. Collect. ſuppl. 41.* *

Gefranzte Giftlilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *ſesquipedalis foliis duplo altior.* Flores *albi ſubnutantes.* W.

*2. DRIMIA *elata.*

D. foliis lineari-lanceolatis oblique flexis glabris, floribus nutantibus. W.

D. foliis lanceolato-linearibus glabris glauceſcentibus ſcapo duplo brevioribus. *Iacq. ic. rar. 2. t. 373. Collect. ſuppl.* 38. *

Hohe Giftlilie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *bipedalis foliis duplo altior.* Corolla *externe vireſcens, interne alba linea viridi in laciniarum medio.* W.

*3. DRIMIA *puſilla.*

D. foliis lanceolatis glabris baſi canaliculatis, floribus erectis. W.

D. foliis lanceolato-linearibus glabris, ſcapum aequantibus. *Jacq. ic. rar. 2. t. 374. Collect. ſuppl. 42.* *
Niedrige Giftlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Scapus *biuncialis altitudine foliorum.* Corollae *vireſcentes.* W.

*4. DRIMIA *undulata.*
D. foliis lanceolatis glabris undulatis, pedunculis horizontalibus. W.
D. foliis lineari-lanceolatis glabris undulatis. *Jacq. ic. rar. 2. t. 376. Collect. ſuppl. 41.* *
Hyacinthus (*revolutus*) corollis ſexpartitis campanulatis revolutis, foliis oblongis undulatis. *Lin. ſuppl.* 204?
Hyacinthus (*revolutus*) corollis ovatis campanulatis reflexis, foliis lanceolatis ſubundulatis. *Thunb. prod.* 64?
Wellenblättrige Giftlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Scapus *biuncialis longitudine foliorum.* Corollae *vireſcentes.* W.

*5. DRIMIA *media.*
D. foliis lineari-ſubulatis ſemiteretibus. W.
D. foliis ſubulatis antice ſubcanaliculatis glabris. *Jacq. ic. rar. 2. t. 375. Collect. ſuppl. 40.* *
Mittlere Giftlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Scapus *bipedalis foliis duplo altior.* Flores *albi.* W.
Totum genus vix ab Hyacinthis ſatis diſtinctum; inſertio ſtaminum enim in diverſis ſpeciebus Hyacinthi non eadem. W.

652. HYACINTHUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 577.

Cor. campanulata 6-fida; pori 3 melliferi Germinis.

1. HYACINTHUS *nonſcriptus.*
H. corollis campanulatis ſexpartitis apice revolutis. *Hort. cliff.* 125. *Roy lugdb.* 27. *Sauv. monſp.* 17. *Mill. dict. n.* 1. *Blackw. t.* 61. *Kniph. cent.* 2. *n.* 33. *Knorr. del.* 2. *t. H.*
H. floribus tubuloſis, baſi globoſis, apice ſexpartito revoluto. *Hall. helv. n.* 1248.

H. non ſcriptus. *Dod. cer.* 172. *ex Hall.* R.
H. oblongo flore, caeruleus major. *Bauh. pin.* 43.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 415.
Engliſche Hyacinthe. W.
Habitat in Angliae, Galliae, Hiſpaniae, Italiae *nemoribus, in* Helvetia, Perſia. *Gmel. it.* 3. *p.* 309. ♃ (v. v.)

Bracteae *ſunt ſaepius floribus longiores, et binae.* Petala *apice revoluta.* Stigma *guttula madidum.* Flore *albo variat.*

2. HYACINTHUS *cernuus.*

H. corollis campanulatis ſexpartitis, racemo cernuo. *Mill. dict. n.* 4.
H. hiſpanicus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 177.
H. oblongo flore ſuaviter rubente, minor. *Bauh. pin.* 64?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 417.
Hängende Hyacinthe. W.
Habitat in Hiſpania. ♃ (v. v.)

Convenit cum H. non ſcripto *habitu et facie, quamvis minor; differt vero Foliis magis linearibus minus lanceolatis, erectioribus; Racemo magis nutante; Corollis incarnatis nec coeruleis, teretioribus, cum petalorum lateribus ad baſin minus plano-patentibus, nec dorſo linea elevata notatis, minusque revolutis (quamvis reflexa) quam in illo,* Piſtillum *demum* ſtaminibus *brevius eſt.* Bracteae *binae ſaturatius incarnatae.*

Corolla *huic baſi ventricoſior, praecedenti vero minime.*

3. HYACINTHUS *amethyſtinus.*

H. corollis campanulatis ſemiſexfidis baſi cylindricis. *Hort. upſ.* 85. *Mill. dict. n.* 5. *Pall. it.* 3. *p.* 589.
H. oblongo caeruleo flore, minor. *Bauh. pin.* 44. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 27. *f.* 8.
H. minor hiſpanicus anguſtifolius. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 587. *Cluſ. cur. app. alt.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 419.
Amethyſtfarbene Hyacinthe. W.
Habitat in Hiſpania? Ruſſia. ♃ (v. v.)

4. HYACINTHUS *orientalis.*

H. corollis infundibuliformibus ſemiſexfidis baſi ventricoſis. *Hort. upſ.* 85. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.*

27. *Gron. orient.* 115. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 1. *n.* 43.
H. orientalis (ſpec. 1-15.) et plenus (1-3.) *Bauh. pin.* 44.
H. orientalis major et minor. *Dod. pempt.* 216.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 420.
Gemeine Hyacinthe. W.
Habitat in Aſia, Africa. ♃ (v. v.)
Floribus *luteis ac purpureis in Ruſſia legit* Lepechin. *It. p.* 231. R.

*5. HYACINTHUS *flexuoſus.* †
H. corollis campanulatis, racemo erecto, foliis linearibus ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 64.
Gebogene Hyacinthe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

6. HYACINTHUS *corymboſus.*
H. corollis infundibuliformibus corymboſis erectis, ſcapo foliis breviore. *Mant.* 223. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 230. *t.* 19. *f.* 2.*
H. corollis infundibuliformibus, racemo erecto foliis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 64.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 465.
Doldentraubige Hyacinthe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *paſcuis. Koenig.* ♃ (v. ſ.)
Radix *bulboſa.* Folia *radicalia, linearia, anguſtiſſima, ſaepius tria, digito breviora.* Scapus *breviſſimus, foliis brevior, corymbo terminali.* Flores *infundibuliformes, ſemiſexfidi, purpurei.* Stamina 3 *longitudine corollae;* 3 *corollae dimidio breviora.* *Stylus ſimplex, longitudine corollae.*

7. HYACINTHUS *convallarioides.*
H. corollis campanulatis ſexpartitis, foliis ſubulatis. W.
H. corollis pendulis ovatis, ſcapo capillari. *Lin. ſuppl.* 204. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 42. *t.* 81.*
H. corollis campanulatis ovatis pendulis, ſcapo filiformi. *Thunb. prod.* 64.
Mayblümchenartige Hyacinthe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Flores *absque foliis lutei.*

*8. HYACINTHUS *brevifolius.*
H. corollis ſexpartitis, racemo cernuo, foliis ſcapo brevioribus. *Thunb. prod.* 63.
Kurzblättrige Hyacinthe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

9. HYACINTHUS *romanus.*
H. corollis campanulatis ſemiſexfidis racemoſis, ſtaminibus membranaceis. *Mant.* 224.
H. comoſus albus belgicus. *Bauh. pin.* 42.
H. comoſus albus cum coeruleis ſtaminibus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 584. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 465.
Römiſche Hyacinthe. W.
Habitat Romae *in cultis et hortis ſponte. D. Capeller.* Folia *latitudine digiti, longiſſima.* Racemus *longus, teres, floribus numeroſiſſimis.* Pedicelli *longitudine florum.* Bracteae *minutae, membranaceae, muticae.* Corollae *campanulatae (cylindrico-ovatae. Capell.) ultra medium ſexfidae, albae.* Filamenta *membranacea, lato-lanceolata laciniis corollae oppoſita.* Antherae *coeruleae.*

10. HYACINTHUS *Muſcari.*
H. corollis ovatis omnibus aequalibus. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upſ.* 85. *Roy. lugdb.* 28. *Kniph. cent.* 10. *n.* 52.
H. racemoſus moſchatus. *Bauh. pin.* 43.
Muſcari obſoletiore flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 178.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 466.
Muſcaten Hyacinthe. W.
Habitat in Aſia, *ultra Boſphorum, inde in Europam ante* 1554. ♃ (v. v.)

11. HYACINTHUS *comoſus.*
H. corollis angulato-cylindricis: ſummis ſterilibus longius pedicellatis. *Scop. carn. n.* 423. *Pollich. pal. n.* 342. *Iacq. auſtr. t.* 126. *Kniph. cent.* 2. *n.* 34. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ. I.* 149. *II.* 389.
H. ſpica longiſſima, floribus ſupremis ſterilibus erectis, inferioribus ſecundis patulis. *Hall. helv. n.* 1247.
H. corollis globoſis: ſummis pedunculatis, foliis enſiformibus. *Sauv. monſp.* 17.
H. comoſus major purpureus. *Bauh. pin.* 42.
H. maximus, botryoides caeruleus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 371.
Muſcari comoſum. *Mill. dict. n.* 2.
Hyacinthus. *Cam. epit.* 798.
β. H. (*monſtroſus*) corollis ſubovatis. *Sp. pl.* 454. *Vir. cliff.* 28. *Roy. lugdb.* 28.
Muſcari monſtroſum. *Mill. dict. n.* 4.
γ. H. floribus paniculatis monſtroſis. *Hort. cliff.* 126.
H. panicula coerulea. *Bauh. pin.* 42.

H. ſanneſius panicula comoſa, *Col. ecphr. 2. p. 10. t. 10.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 467. 468.
Schopfblütige Hyacinthe. W.
Habitat in Galliae et Europae *auſtralis agris, in* Helvetia, Germania, Perſia. *Gmel. it.* 3. *p.* 309. ♃ (v. v.)
Corollae *decolores, triſtes fere Muſcari, horizontaliter exſtantes ſub et poſt antheſin; ante antheſin erectae, coeruleae, pedicellis viridibus longitudine florum.* Corollae ſuperiores *minutae, ſteriles, vix dehiſcentes, violaceae; pedicellis longiſſimis coeruleis laetis, corymbum formantibus.* Mant. 366.

12. HYACINTHUS *botryoides.*

H. corollis globoſis uniformibus, inferioribus remotioribus, foliis ſtrictis linearibus baſi anguſtatis canaliculatis. W.
H. corollis globoſis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis ſtrictis. *Scop. carn. n.* 424. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ. I.* 149. *II.* 391.
H. foliis gramineis, ſpica ovata, floribus globoſis, fecundis. *Hall. helv. n.* 1246.
Muſcari botryoides. *Mill. dict. n.* 1.
H. corollis globoſis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. monſp.* 19. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upſ.* 85. *Roy. lugdb.* 28.
H. botryoides vernus minor latifolius coeruleus inodorus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 572.
H. racemoſus caeruleus major. *Bauh. pin.* 42.
H. botryoides purpureus III. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 181.
H. botryoides caeruleus amoenus. *Lob. ic.* 108.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 469.
Steifblättrige Hyacinthe. W.
Habitat in Italia, Helvetia, Carniolia, Perſia. *Gmel. it.* 3. *p.* 309. ♃ (v. v.)
Flores *inodori.* Folia *lineas* 3 *lata, ob breves petiolos recta.* Spica *floribus* 20-30. Corollae *dentibus candidis, ſupremis exiguis.* Mant. 366.

13. HYACINTHUS *racemoſus.*

H. corollis ovatis uniformibus confertis, ſummis ſeſſilibus, foliis laxis dependentibus linearibus. W.
H. corollis ovatis: ſummis ſeſſilibus, foliis laxis. *Sauv. monſp.* 17. *Iacq. auſtr. t.* 187. *Knorr. del.* 1. *tab. T.* 8. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ.* 149. *II.* 390.

H. foliis carinatis, ſpica ovata, floribus globoſis. *Hall. helv. n.* 1245.
Muſcari racemoſum. *Mill. dict. n.* 3.
H. racemoſus caeruleus minor juncifolius. *Bauh. pin.* 43.
H. botryoides 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 181.
H. recentiorum 1. *Dod. cor.* 176.
Allium caninum exiguum. *Trag.* 750. *licet inodorum dixerit. ex Hall.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 471.
Trauben Hyacinthe. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃ (v. v.)
Folia *carinata, lineam* 1 *lata, ob debiles petiolos laxa, decumbentia.* Spica *floribus* 40-50: *ſummis ſterilibus.* Flores *odori.* Albo *flore variat. Hall.*

653. PHORMIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 578.

Cor. 6-petala infera; petalis 3 interioribus longioribus. *Stamina* adſcendentia exſerta. *Capſula* oblonga triquetra. *Semina* compreſſa.

1. PHORMIUM *tenax.*

P. tenax. *Forſt. gen. n.* 24. *prod.* 153. *Cook. it. v.* 2. *p.* 96. *t.* 96. *figura bona. Mill. faſc.* 1. *figura optima.*
P. foliis plurimis, inflorefcentia ramoſa. *Lin. ſuppl.* 204.
Zähe Flachslilie. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♃
Incolae Novae Zeelandiae ex hac planta Lini ſpeciem fabricant, ex qua mulieres ſtoreas pro variis veſtimentis plectunt, in quem uſum plures ſpecies Liliaceorum adhiberi poſſent.

*645. LACHENALIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1744.

Cor. 6-petala infera: petalis 3 interioribus longioribus. *Stamina* erecta. *Capſula* ſubovata trialata. *Semina* globoſa.

*1. LACHENALIA *glaucina.*

L. corollis campanulatis ſeſſilibus, petalis interioribus

longioribus patulis obtuſis, ſtylo ſtaminibus longiore, foliis lineari-lanceolatis glabris. W.

L. foliis geminis lineari-oblongis integerrimis immaculatis, ſcapo tereti immaculato, floribus ſeſſilibus patulis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 391. *Collect. ſuppl.* 39. *

Graugrüne Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Petala *exteriora glauco viridia apicibus rubicundis, interiora albido-incarnata.* W.

2. LACHENALIA *orchioides.*

L. corollis campanulatis ſeſſilibus, petalis interioribus longioribus patulis obtuſis, ſtylo longitudine ſtaminum foliis oblongo-lanceolatis margine cartilagineo-crenatis. W.

L. corollis campanulatis, petalis tribus interioribus longioribus, floribus ſeſſilibus, foliis lanceolatis ſcapo brevioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 460. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 390. *Collect.* 3. *p.* 241. *

L. corollis campanulatis ſubſeſſilibus, foliis lanceolatis ſcapo brevioribus. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*Hyacinthoides*) foliis radicalibus binis baſi maculatis, ſcapo racemoſo ſimplici, corollis campanulato-patentibus. *Lin. ſuppl.* 204.

Hyacinthus (*orchioides*) corollis ſexpartitis, petalis tribus exterioribus brevioribus. *Sp. pl.* 455.

Muſcari orchioides. *Mill. dict. n.* 5.

α. petalis exterioribus albidis apice viridibus, interioribus ochroleucis. W.

Hyacinthus orchioides aphyllus ſerpentarius major. *Breyn. prod.* 24. *t.* 11. *f.* 3.

β. petalis coeruleis, apice ſaturatioribus. W.

Hyacinthus orchioides africanus major bifolius, flore coeruleo majore. *Breyn. prod.* 23. *t.* 11. *f.* 1.

Orchis anguſtifolia maculata. *Buxb. cent.* 3. *p.* 10. *t.* 16. *Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 471.

Ragwurzartige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *maculatus.* Folia *baſi maculata margine tenuiſſime cartilagineo-crenata.* W.

*3. LACHENALIA *pallida.*

L. corollis campanulatis breviſſime pedunculatis, petalis interioribus longioribus patulis obtuſis, ſcapo apice angulato foliis lineari-oblongis breviore. W.

L. (*pallida*) corollis campanulatis, petalis tribus interioribus longioribus, floribus breviſſime pedunculatis horizontalibus, foliis lineari-oblongis ſcapo longioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 460.

L. (*pallida*) corollis campanulatis, pedunculis horizontalibus, foliis lanceolatis ſcapum aequantibus. *Thunb. prod.* 64.

L. (*mediana*) foliis geminis oblongo-linearibus integerrimis immaculatis, ſcapo tereti immaculato, floribus breviter pedunculatis patentiſſimis, corollis ſubcylindricis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 392. *Collect.* 3. *p.* 242. *

Bleiche Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Petala *exteriora baſi in tubum extus gibbum coerulescentem connata oblonga obtuſa alba, infra apicem gibbo viridi notata*; interiora *obovata apice patentia alba, carina verſus apicem pallide viridi.* Ait. l. c.

Scapus *teres inter flores angulatus foliorum longitudine, vel paulo brevior.* W.

*4. LACHENALIA *hyacinthoides.*

L. corollis campanulatis breviſſime pedunculatis, petalis interioribus longioribus patulis emarginatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo duplo longioribus. W.

L. foliis plurimis ſubulato-linearibus canaliculatis immaculatis, racemo oblongo, corollis campanulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 382. *Collect. ſuppl.* 58. *

Hyacinthus orchioides. *Iacq. hort. vind.* 2. *t.* 178.

Hyacinthenartige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Petala *tria exteriora alba externe apice rubicunda et macula viridi notata, interiora alba emarginata.* W.

*5. LACHENALIA *anguſtifolia.*

L. corollis campanulatis breviſſime pedunculatis, petalis interioribus longioribus patulis obovatis obtuſis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. W.

L. foliis ſubulatis ſemiteretibus facie planiuſculis immaculatis, racemo digitiformi, corollis campanulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 381. *Collect. ſuppl.* 47. *

Schmalblättrige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *rubro-maculatus.* Folia *ut in binis praece-*

dentibus immaculata. Racemus *cylindraceus.* Petala *alba patentia, apice interne macula flaveſcenti notata.* W.

*6. LACHENALIA *contaminata.*

L. corollis campanulato-cylindraceis, breviſſime pedunculatis erectis, petalis interioribus longioribus lanceolatis obtuſis erectis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis laxis ſcapo longioribus. W.

L. (*contaminata*) corollis campanulatis, petalis tribus ſuperioribus longioribus, floribus pedunculatis, foliis lineari-ſubulatis canaliculatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 460.

L. (*orthopetala*) foliis plurimis ſubulato-linearibus canaliculatis maculatis, floribus cuneiformibus rectis. *Jacq. ic.* 2. *t.* 383. *Collect.* 3. *p.* 240.*

Gefleckte Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *glabra, ſupra maculis obſcure rubentibus adſperſa, ſcapo longiora.* Scapus *erectus ſemiteres vix ſpithamaeus maculis ſordide rubris.* Racemus *multiflorus.* Pedunculi *erecti filiformes albi ſesquilineares.* Bractea *ad baſin ſinguli pedunculi, e lata baſi ovata acuminata concava patentiſſima albida pedunculo brevior.* Petala *exteriora baſi in tubum extus gibbum connata oblonga obtuſa alba, ſuperne rubentia, infra apicem gibbo retuſo, ſupremum (ſcapo proximum) trilineare, duo inferiora breviora.* Petala *interiora oblonga minus obtuſa prope apicem carinata, carina rubra, duo ſuperiora longitudine ſupremi exterioris, infimum longitudine breviorum exteriorum.* Ait. l. c.

7. LACHENALIA *viridis.*

L. corollis campanulato-cylindraceis pedunculatis, petalis exterioribus longiſſimis filiformibus recurvatis, foliis linearibus canaliculatis ſcapo longioribus. W.

L. corollis cylindraceis, petalis tribus exterioribus longiſſimis ſubulatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 462.

L. corollis cylindricis, laciniis exterioribus ſetaceo-acuminatis, foliis linearibus brevioribus. *Thunb. prod.* 64.

Hyacinthus (*viridis*) corollarum exterioribus laciniis ſubulatis longiſſimis. *Sp. pl.* 454. *Murr. comment. goett.* 1781. *p.* 44. *t.* 5.* *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 66. *Miſc.* 2. *p.* 331.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 418. *t.* 84. *f.* 1.

Grüne Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

8. LACHENALIA *ſerotina.*

L. corollis campanulatis pedunculatis ſecundis, petalis exterioribus longioribus patulis, interioribus connatis, foliis linearibus canaliculatis. W.

Hyacinthus (*ſerotinus*) petalis exterioribus ſubdiſtinctis, interioribus coadunatis. *Sp. pl.* 453. *Cavan. ic. p.* 18. *t.* 30. *

Albuca minor. *Gleditſch. Act. Berol.* 1796. *p.* 61.

Hyacinthus obſoleto flore. *Bauh. pin.* 44.

Hyacinthus obſoleti coloris hiſpanicus ſerotinus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 177. 178.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 418.

Spätblühende Lachenalie. W.

Habitat in Hiſpania. ♃ (v. v.)

*9. LACHENALIA *puſilla.*

L. corollis cylindricis, petalis interioribus longioribus erectis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis elliptico-linearibus baſi attenuatis ſcapo longioribus patulis. W.

L. foliis pluſculis, infra terram anguſte et longe canaliculatis dein oblongis et planis, racemo in ſinu foliorum, floribus cylindricis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 385. *Collect. ſuppl.* 71. *

L. (*reflexa*) corollis ventricoſis ſubſeſſilibus erectis, foliis enſiformibus reflexis ſcapo longioribus. *Thunb. prod.* 64. ?

Kleinſte Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *rubro-maculata.* Scapus *breviſſimus vix ullus.* Flores *albidi ſtricti adpreſſi.* W.

*10. LACHENALIA *patula.*

L. corollis campanulatis pedunculatis, petalis interioribus longioribus obovatis patentibus, foliis lanceolatis canaliculatis ſcapo brevioribus. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis canaliculatis pulpoſo-carnoſis, ad medietatem erectis, dein reflexis, corollis campanulatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 384. *Collect.* 4. *p.* 149. *

Sperrblättrige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *immaculata ſubcarnoſa.* Scapus *teres punctatus.* Corolla [illegible], *petalis exterioribus ſub apice ex-*

terne macula viridi et interioribus ad apicem linea rubicunda notatis. W.

*11. LACHENALIA *fragrans.*

L. corollis campanulatis pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus longioribus obtuſis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſcapo duplo brevioribus. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis planis maculatis glabris, ſcapo erecto, corollis pedicellatis ſubcampanulatis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 43. *t.* 82. *

Wohlriechende Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *candida, petalis exterioribus ſub apice externe macula rubra pictis.* W.

*12. LACHENALIA *liliiflora.*

L. corollis ſubcampanulatis patentibus pedunculatis, petalis linearibus, tribus interioribus longioribus ſubretuſis, ſcapo apice maculato, foliis lanceolatis puſtulatis. W.

L. foliis geminis ex oblongo lanceolatis denſe facie puſtulatis, ſcapo erecto tereti, corollis patenti-reflexis, petalis ſublinearibus. *Jacq. ic.* 2. *t.* 387. *Collect. ſuppl.* 66. *

Lilienartige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *teres inter flores angulatus*, Corollae *albae.* W.

*13. LACHENALIA *puſtulata.*

L. corollis campanulatis breviſſimis pedunculatis, petalis interioribus longioribus obtuſis, ſcapo triquetro reclinato, foliis lanceolatis puſtulatis. W.

L. foliis geminis lanceolato-linearibus, foliis facie puſtulatis, ſcapo triquetro reclinato, floribus ſubcampanulatis ſubſeſſilibus. *Jacq. ic. rar.* 2. 386. *Collect.* 3. *p.* 244.

Blaſige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *longitudine ſcapi.* Corolla *alba, petalis exterioribus ſubtus apice viridibus, interioribus linea viridi brevi ad apicem coloratis.* W.

*14. LACHENALIA *purpureo-coerulea.*

L. corollis campanulatis pedunculatis, petalis interioribus longioribus obtuſis revolutis, ſtaminibus corolla

longioribus, ſcapo apice angulato, foliis lanceolatis puſtulatis. W.

α. corollis coeruleis apice violaceis, foliis erectiuſculis. W.
L. (*purpureo-coerulea*) foliis geminis ex oblongo-linearibus facie puſtulatis, ſcapo erecto tereti, corollis campanulatis, limbo patentiſſimo. *Iacq. ic.* 2. *t.* 388. *Collect. ſuppl.* 63. *

β. corollis violaceis, petalis exterioribus apice ſubtus macula viridi, petalis interioribus macula atro-violacea notatis, foliis depreſſis. W.
L. (*unicolor*) foliis geminis lineari-lanceolatis, facie rariter puſtulatis, ſcapo erecto tereti, corollis ſubcylindricis, petalis interioribus apice patulis, genitalibus declinatis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 389. *Collect. ſuppl.* 61. *

Bunte Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *teres inter flores vero angulatus.* W.

*15. LACHENALIA *violacea.*

L. corollis campanulatis baſi planis longitudine pedunculi, petalis interioribus longioribus obtuſis, ſtaminibus corolla longioribus, ſcapo apice angulato, foliis oblongis. W.

L. foliis geminis oblongis maculatis, ſcapo tereti adſcendente, racemo erecto pedunculis patentiſſimis longitudine florum, floribus baſi planis propendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 394. *Collect.* 4. *p.* 147. *

Violette Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *teres inter flores angulatus.* Folia *oblonga baſi ſenſim anguſtata, apice rotundata cum acumine brevi, ſuperne maculis ſparſis inferne vero denſiſſimis pallidioribus obſita.* Petala *exteriora viridia, interiora violacea. Singularis corollis baſi planis.* W.

*16. LACHENALIA *purpurea.*

L. corollis cylindraceo-campanulatis pedunculatis horizontalibus, petalis interioribus longioribus obtuſis rectis, ſtaminibus corolla duplo longioribus, foliis lanceolatis tenuiſſime cartilagineo-crenatis. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis immaculatis ad oras ſubtiliſſime cartilagineo-crenulatis, floribus pedunculatis patentiſſimis, corollis ſubcylindricis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 393. *Collect. ſuppl.* 65. *

Purpurfarbene Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Petala *exteriora alba apice viridia, interiora atro-ſanguinea.* Filamenta *coerulea.* W.

*17. LACHENALIA *lanceaefolia.*

L. corollis ſubcampanulatis patentibus, pedunculis corolla triplo longioribus, petalis linearibus obtuſis ſubaequalibus, foliis ovatis acuminatis. W.

L. foliis pluribus lanceolato-acuminatis maculatis in orbem proſtratis, ſcapis axillaribus racemoſis proſtratis, petalis patentiſſimis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 402. *Collect. ſuppl.* 69. *

Lanzenblättrige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *variegata omnium latiſſima.* Scapi *proſtrati.* Corolla *variat colore flavo-virenti, fuſceſcente, purpureo.* W.

*18. LACHENALIA *unifolia.*

L. corollis cylindraceis, pedunculis longitudine corollae, petalis interioribus longioribus obtuſis inaequalibus, folio ſolitario lineari-lanceolato. W.

L. folio unico canaliculato, racemo laxo. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 43. *t.* 83. *

Einblättrige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *punctatus teres.* Folium *unicum baſin ſcapi vaginans margine convolutum immaculatum et baſi tantum ſtriis transverſalibus purpureis variegatum.* Petala *exteriora, alba baſi coerulea apice purpureo-punctata, interiora alba, quorum unicum reliquis majus.* W.

*19. LACHENALIA *hirta.*

L. corollis campanulatis pedunculatis, foliis linearibus hirtis. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*hirtum*) ſcapo ſimplici, floribus cernuis ovatis, foliis hirſutis. *Thunb. Diſſ. Nov. Pl. Gen.* 5. *p.* 96.

Haarige Lachenalie. W.

Habitat in Cap. b. ſpei *aquoſis.* ♃

Scapus *ſimplex flexuoſo-erectus glaber purpureo-maculatus ſpithamaeus.* Folium *unicum baſi lata vaginans, lineare hirſutum.* Flores *racemoſi cernui ovati albo-coeruleſcentes.* Thunb. Diſſ. l. c.

*20. **LACHENALIA** *iſopetala.*

L. corollis cylindraceis pedunculatis, petalis linearibus obtuſis ſubaequalibus, ſcapo apice angulato, foliis lanceolatis deflexis. W.

L. foliis geminis, ſcapo ſuberecto, floribus cylindricis erectis, petalis longitudine ſubaequalibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 401. *Collect. ſuppl.* 68. *

Gleichblättrige Lachenalie. W.

Habitat ad. Cap. b. ſpei. ♃

Corollae *albae magnitudine ſequentis, erectae apice atro-purpureae.* W.

21. **LACHENALIA** *tricolor.*

L. corollis cylindraceis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus emarginatis, bracteis acutis, foliis lanceolatis. W.

L. corollis cylindraceis, petalis tribus interioribus duplo longioribus emarginatis, floribus pedunculatis pendulis. *Ait. Kew.* 1 *p.* 461.

L. corollis cylindricis pedunculatis pendulis, laciniis interioribus excifis, foliis lanceolatis ſcapo brevioribus. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*Aloides*) foliis binis radicalibus ſupra fuſcomaculatis, ſcapo racemoſo ſimplici, floribus nutantibus cylindrico-infundibuliformibus. *Lin. ſuppl.* 205.

α. foliis lineari-lanceolatis, petalis interioribus apice rubris. *Ait. l. c.*

Lachenalia tricolor. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 61.

β. foliis oblongo-lanceolatis, corollis flavis baſi rubentibus, apice viridibus. *Ait. l. c.*

Lachenalia tricolor. *Curt. mag.* 82.

L. (*luteola*) foliis geminis elongato-lanceolatis, plerumque immaculatis, ſcapo erecto, corollis propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum patentiſſimis. *Iacq. ic.* 2. *t* 395. *Collect.* 4. *p.* 148. *

Dreyfarbige Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*22. **LACHENALIA** *rubida.*

L. corollis cylindraceis breviſſime pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus, ſtylo ſtaminibus longiore, foliis oblongis. W.

α. foliis patulis, ſcapo inferne maculato, corollis rubris, petalis exterioribus apice viridibus punctatis. W.

L. (*rubida*) foliis geminis ſublanceolatis facie maculatis

ſuperne planis, ſcapo erecto ad medietatem usque maculato, floribus cylindricis incurvatulis punctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 398. *Collect. ſuppl.* 60.*

β. foliis latioribus baſi ſcapum vaginantibus, ſcapo maculato, petalis exterioribus rubris apice punctatis, interioribus rubris baſi flaveſcentibus. W.

L. (*tigrina*) foliis ſubgeminis, baſi ad medietatem uſque mutuo amplexantibus et convolutis, dein lanceolatis et patulis acutis maculatis, ſcapo erecto maculato, floribus cylindricis punctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 399. *Collect. ſuppl.* 67. *

Röthliche Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Confer. Buxb. cent. 3. *t.* 20. W.

***23. LACHENALIA** *punctata.*

L. corollis cylindraceis pedunculatis nutantibus, petalis interioribus longioribus inaequalibus obtuſis, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſtrictis. W.

L. foliis geminis lineari-lanceolatis canaliculatis utrinque maculatis erectis, ſcapo erecto maculato paucifloro, floribus cylindricis incurvulis punctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 397. *Collect.* 2. *p.* 323. *

Punctirte Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapus *rubro-maculatus foliis altior pauciflorus.* Petala *exteriora incarnata ſanguineo-punctata, interiora ut in plerisque exterioribus longiora, ſed uno reliquis longiore, omnia albida rubro-punctata apice flaveſcentia.* W.

***24. LACHENALIA** *pendula.*

L. corollis cylindricis pedunculatis pendulis, petalis interioribus longioribus cuneiformibus obtuſis, bracteis obtuſis, foliis oblongo-lanceolatis. W.

L. corollis cylindraceis, petalis tribus interioribus longioribus integris, floribus pedunculatis pendulis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 461. *Thunb. prod.* 64.

Phormium (*bulbiferum*) ſcapo racemoſo ſimplici, floribus nutantibus. *Cyrill. Neap. faſc.* 1. *t.* 12.

α. foliis immaculatis, petalis exterioribus rubris, interioribus flaveſcentibus apice violaceis. W.

L. (*pendula*) foliis geminis oblongis immaculatis, ſcapo erecto immaculato, corollis cylindricis impunctatis pendulis. *Iacq. ic.* 2. *t.* 400. *Collect.* 3. *p.* 239. *

β. foliis anguſtioribus ſuperne maculatis, petalis exterioribus coccineis apice viridibus, interioribus flaveſcentibus apice atro-ſanguineis. W.

L. (*quadricolor*) foliis geminis lineari-lanceolatis maculatis, ſcapo erecto, corollis propendulis cylindricis cum limbo petalorum interiorum pat... *Jacq. ic.* 2. *t.* 396. *Collect. ſuppl.* 62.*

Hängende Lachenalie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

*655. LANARIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1745.

Cor. ſupera lanata filamentis longior: limbo 6-partito patulo. *Peric.* 3-loculare.

1. LANARIA *plumoſa*.

L. plumoſa. *Ait. Kew.* 1. *p.* 462. *Thunb. prod.* 63.
Argolaſia. *Juſſ. gen. ed Uſt.* 67.
Hyacinthus (*lanatus*) corollis lanatis, caule ramoſo. *Sp. pl.* 455. *Roy. lugdb.* 27.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 477.
Capiſche Filzlilie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *linearia carinata canaliculata glabra, margine ſcabra.* Scapus *angulatus corymboſus.* Corymbi, pedunculi, bracteae, germina *et* corollae *denſe pilis albis plumoſis tecti.* W.

*656. VELTHEIMIA.

Gleditſch. Act. Berol. 1771.

Cor. tubuloſa 6-dentata. *Stam.* tubo inſerta. *Capſ.* membranacea trialata, loculis monoſpermis.

1. VELTHEIMIA *viridifolia*.

V. foliis lanceolatis plicato-undulatis obtuſis, dentibus limbi rotundatis rectis. W.
V. foliis viridibus. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 41. *t.* 78.*
Aletris (*capenſis*) acaulis, foliis lanceolatis undulatis, ſpica ovata, floribus nutantibus. *Sp. pl.* 456. *Burm. prod.* 10. *Murr. prod.* 205. *Act. holm.* 1770. *p.* 229. *t.* 5.*

[redacted]




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

Scilla radice ſolida corymbo contorto conico. *Fabr. helmſt.* 23.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 474.
Grünblättrige Veltheimie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

*2. VELTHEIMIA *glauca.*

V. foliis lanceolatis glaucis margine ſubcriſpatis apice mucronato, limbo patenti. W.
V. foliis glaucis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 40. *t.* 77. *
Aletris (*glauca*) acaulis, foliis lanceolatis glaucis, floribus nutantibus, limbo patente. *Ait. Kew.* 1. *p.* 463.
Graue Veltheimie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Differt a praecedenti: foliis *glaucis vix undulatis, quae in V. viridifolia maxime undulata ſuperne laete viridia.* Limbus *corollae patens, laciniis longioribus, quam in praecedente, obtuſis quidem ſed non rotundis ut in illa.* Flores *minores anguſtiores.* Ait. l. c.

3. VETHEIMIA *Uvaria.*

V. ſcapo longiore foliis enſiformibus carinatis.
Aletris (*Uvaria*) acaulis foliis enſiformibus canaliculatis carinatis. *Syſt. veg.* 277.
Aloë Uvaria. *Sp. pl.* 2. *p.* 460. *Mill. dict. n.* 23. *Kniph. cent.* 9. *n.* 5. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 13.
Aloë foliis linearibus radicalibus membranaceis. *Hort. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 23.
Aloë africana folio triangulari longiſſimo et anguſtiſſimo, floribus luteis foetidis. *Commel. hort.* 2. *p.* 29. *t.* 15. *Seb. theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 478.
Traubenblütige Veltheimie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*4. VELTHEIMIA *pumila.*

V. ſcapo breviore foliis linearibus acute carinatis.
Aletris pumila. *Ait. Kew.* 1. *p.* 464.
Niedrige Veltheimie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

657. ALETRIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 579.

Cor. infundibuliformis, rugoſa. *Stam.* inſerta laciniarum baſi. *Capſ.* 3-locularis, loculis polyſpermis.

1. ALETRIS *farinoſa.*

A. acaulis, foliis lanceolatis membranaceis, floribus alternis. *Sp. pl.* 456. *Mill. dict. n.* 1.
Aletris. *Amoen. acad.* 3. *p.* 11. *
Hyacinthus caule nudo, foliis linguiformibus acuminatis dentatis. *Gron. virg.* 38.
Hyacinthus floridanus ſpicatus. *Pluk. amalt.* 119. *t.* 437. *f.* 2.
Mehlige Aletris. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃

2. ALETRIS *fragrans.*

A. cauleſcens, foliis lanceolatis laxis. *Iacq. vind.* 309.
A. caulescens, foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Mill. dict. n.* 5.
Aloë africana arboreſcens, floribus albicantibus fragrantiſſimis. *Comm. hort.* 2. *p.* 7. *t.* 4 *et* 1. *p.* 93. *t.* 49.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 484.
Wohlriechende Aletris. W.
Habitat in Africa. ♄ (v. v.)

658. YUCCA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 580.

Cor. campanulato-patens. *Stylus* nullus. *Capſ.* 3-locularis.

1. YUCCA *glorioſa.*

Y. foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 29. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 1. *n.* 100.
Y. foliis margine integerrimis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 88. *Roy. lugdb.* 29.
Y. foliis aloës. *Bauh. pin.* 91.
Y. indica foliis aloës. *Barr. rar.* 70. *t.* 1194.
Cordyline foliis pungentibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 22.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 378.

Prächtige Yukke. W.
Habitat in Canada, Peru. ♄ (v. v.)

2. YUCCA *aloifolia.*
Y. foliis crenulatis ſtrictis. *Mill. dict. n.* 2.
Y. foliis crenulatis. *Vir. cliff.* 29.
Y. foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *α.*
Y. arboreſcens, foliis rigidioribus rectis ſerratis. *Dill. elth.* 435. *t.* 323. *f.* 416.
Aloë yuccae foliis, cauleſcens. *Pluk. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 4.
Aloë americana, yuccae folio arboreſcens. *Comm. prael.* 64. *t.* 14.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 380.
Aloëblättrige Yukke. W.
Habitat in Jamaica, Vera Cruce. ♄ (v. v.)

3. YUCCA *draconis.*
Y. foliis crenatis nutantibus. *Mill. dict. n.* 3.
Y. foliorum margine crenulato. *Hort. cliff.* 130. *β. Hort. upſ.* 88.
Y. draconis folio ſerrato. *Dill. elth.* 437. *t.* 324. *f.* 417. *Comm. prael.* 42. 67. *t.* 16.
Draconi arbori affinis americana. *Bauh. pin.* 506.
Cordyline foliis pungentibus crenatis. *Roy. lugdb.* 22.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 381.
Drachenbaumartige Yukke. W.
Habitat in America. ♄ (v. v. ſ. fl.)

4. YUCCA *filamentoſa.*
Y. foliis ſerrato-filiferis. *Mill. dict. n.* 4.
Y. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margine filamentoſis. *Gron. virg.* 152. *Trew. ehret. t.* 37.
Y. foliis filamentoſis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 419.
V. virginiana, foliis per marginem apprime filatis. *Pluk. alm.* 396.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 381.
Fadige Yukke. W.
Habitat in Virginia. ♄

659. ALOË.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 581.

Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. *Filam.* receptaculo inſerta.

1. ALOË *dichotoma.*
A. caule dichotomo, foliis enſiformibus ſerratis, floribus paniculatis, ſtaminibus corolla ovata longioribus. W.

A. ramoſa, ramis dichotomis, foliis enſiformibus ſerratis. *Lin. ſuppl.* 206. *Patterſ. it. ed. germ. p.* 55. *t.* 3. 4. 5.

A. ramis dichotomis, foliis enſiformibus ſerratis. *Thunb. Diſſ. de Aloë n.* 1. * *Thunb. prod.* 61.

Gabelaſtige Aloë.

Habitat in fronte montis Bockland Cap. b. ſpei. ♄

2. ALOË *ſpicata.*

A. cauleſcens, foliis planis enſiformibus dentatis, floribus ſpicatis campanulatis horizontalibus. *Thunb. Diſſ. n.* 2. * *Thunb. prod.* 61.

A. floribus ſpicatis horizontalibus campanulatis, foliis caulinis planis amplexicaulibus dentatis. *Lin. ſuppl.* 205.

Aehrentragende Aloë.

Habitat in Cap. b. ſpei *interioribus regionibus.* ♄

Simillima A. perfoliatae at ſpica *et* figura *florum valde diverſa.*

Ex hujus ſucco optima Gummi-reſina Aloës paratur, ex reliquis ſpeciebus vilior.

3. ALOË *perfoliata.*

A. cauleſcens, foliis enſiformibus dentatis erectis, floribus racemoſis reflexis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 3. * *Thunb. prod.* 61.

A. foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus, floribus corymboſis cernuis pedunculatis ſubcylindricis. *Syſt. veg.* 337. *Ait. Kew.* 1. *p.* 466. *

A. floribus corymboſis cernuis ſubcylindricis. *Mat. med.* 95.

A. foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

α. A. africana cauleſcens, foliis magis glaucis caulem amplectentibus et in mucronem obtuſiorem deſinentibus. *Comm. prael.* 68. *t.* 17. *rar.* 44. *t.* 44.

β. A. africana cauleſcens, foliis minus glaucis, dorſi parte ſuprema ſpinoſa. *Comm. prael.* 69. *t.* 18.

A. (*africana*) foliis latioribus amplexicaulibus, margine et dorſo ſpinoſis, floribus ſpicatis, caule fruticoſo. *Mill. dict. n.* 4. R.

γ. A. africana cauleſcens, foliis glaucis latioribus et undique ſpinoſis. *Comm. prael.* 70. *t.* 19.

δ. A. africana cauleſcens, foliis glaucis breviſſimis, foliorum ſummitate interna et externa nonnihil ſpinoſa.

Comm. prael. 73. *t.* 22. *rar.* 45. *t.* 45. *Mill. dict. n.* 8.

ε. A. caulefcens foliis glaucis: dorſo integro ſpinoſo. *Comm. prael.* 71. *t.* 20. *hort.* 2. *t.* 13. *Hall. goett.* 71.*

ζ. A. africana caulefcens, foliis glaucis brevioribus: foliorum parte interna et externa nonnihil ſpinoſa. *Comm. prael.* 71. *t.* 21.

Aloë *glauca*. *Mill. dict. n.* 16.

A. africana caulefcens; foliis glaucis caulem amplectentibus. *Comm. hort.* 2. *p.* 27. *t.* 14.

Aloë *arboreſcens*. *Mill. dict. n.* 3.

ϑ. A. africana caulefcens perfoliata glauca et non ſpinoſa. *Comm. prael.* 74. *t.* 23.

ι. A. africana, foliis glaucis: margine et dorſi parte ſuperiore ſpinoſis, flore rubro. *Comm. prael.* 75. *t.* 24. *hort.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

κ. A. africana mitriformis ſpinoſa. *Dill. elth.* 21. *t.* 17. *f.* 19.

A. mitriformis. *Mill. dict. n.* 1.

λ. Aloë *vera*.

A. foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 86. *Mat. med. p.* 95. *Roy. lugdb.* 22. *Brown. jam.* 197. *Regn. bot. ic.*

A. vulgaris. *Bauh. pin.* 386.

Kadanaku ſ. Catevala. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 338.

Durchwachſene Aloë. W.

Habitat in Indiis, Africa, *at* λ in Italiae, Siciliae, Melitae *tectis, muris.* ♄ (v. v.)

A. verae *infloreſcentia et* Flores *omnino A. perfoliatae ejusque genuina varietas, quamvis* Corolla *fere minus diviſa mihi apparuit.* Caulis *ſaepe radicans, licet erectus.*

Numeroſas varietates enumerat et Aiton l. c. Sub hisce varietatibus vero latent ſine dubio ſpecies nonnullae diſtinctae, quas diſtinguere amplius haud auſim. W.

*4. ALOË *picta*.

A. caulefcens, foliis enſiformibus dentatis pictis patentibus, floribus racemoſis reflexis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 4. *Thunb. prod.* 61.

α. major.

Aloë perfoliata ϑ et λ. *Sp. pl.* 458.

A. africana cauleſcens foliis ſpinoſis maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Commel. hort.* 2. *p.* 9. *t.* 5.
A. africana maculata ſpinoſa major. *Dill. elth.* 17. *t.* 14. *f.* 15.
β. minor.
Aloë perfoliata μ. *Sp. pl.* 458.
Aloë perfoliata ι. ſaponaria. *Ait. Kew.* 1. *p.* 467.
A. africana maculata ſpinoſa minor. *Dill. elth.* 18. *t.* 15. *f.* 16.
Bunte Aloë. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Caulis *flexuoſo-erectus ſpithamaeus vel paulo ultra.* Folia *enſiformia plana patentia dentata ſaepius faſciata maculis interruptis, pedalia.* Thunb. Diſſ. l. c.

*5. ALOË *ſinuata.*

A. cauleſcens, foliis enſiformibus ſinuato-ſerratis reflexis, floribus racemoſis erectis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 5. *Thunb. prod.* 61.
Aloë perfoliata ξ. *Sp. pl.* 458.
Aloë perfoliata γ. barbadenſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 466? W.
A. barbadenſis mitior laete virens et ſplendens. *Dill. elth. p.* 23. *t.* 19. *f.* 20.
A. ſuccotrina anguſtifolia ſpinoſa, flore purpureo. *Comm. hort.* 1. *p.* 91. *t.* 48.
A. americana ananae floribus ſuave rubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.
Schmalblättrige Aloë. W.
Habitat in Barbados *et* Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Caulis *ſpithamaeus flexuoſo-erectus inaequalis.* Folia *enſiformia verſus apicem valde attenuata ſinuato-ſerrata reflexa plana pedalia et ultra.* Thunb. Diſſ. l. c.

*6. ALOË *humilis.*

A. acaulis, foliis trigonis ſubulatis aculeatis, floribus racemoſis reflexis, cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 6.* *Thunb. prod.* 61.
Aloë perfoliata ο. humilis. *Sp. pl.* 458.
Aloë perfoliata ξ. humilis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 467.
A. foliis erectis ſubulatis radicatis undique inerme ſpinoſis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24.
α. A. africana humilis, ſpinis inermibus et verrucis obſita. *Commel. praelud.* 77. *t.* 26. *rar.* 46. *t.* 46.
β. A. (*elongata*) floribus ſpicatis tubuloſo-triquetris ſub-

ringentibus oblique dependentibus, foliis aggregatis dentato-ſpinoſis. *Murr. Comment. goett.* 9. *p.* 191. *t.* 2.*
Niedrige Aloë. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*7. ALOË *arachnoides.*
A. acaulis, foliis trigonis cuſpidatis ciliatis, floribus ſubſpicatis erectis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 7. *Thunb. prod.* 61.
α. communis.
Aloë pumila γ. arachnoides. *Sp. pl.* 460.
A. (*arachnoides*) ſeſſilis foliis brevioribus planis carnoſis, apice triquetris, marginibus inerme ſpinoſis. *Mill. dict. n.* 17.
A. africana humilis archnoidea. *Comm. prael.* 78. *t.* 27. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* 11.
β. pumila.
Aloë pumila ε. *Sp. pl.* 460.
A. foliis ovato-lanceolatis carnoſis apice triquetris, angulis inerme dentatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 24.
Aloë herbacea. *Mill. dict. n.* 18.
A. africana minima atro-viridis, ſpinis herbaceis numeroſis ornata. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 131. *t.* 131.
Weichſtachliche Aloë. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Carro *juxta* Svartkops Zoutpan. ♄ (v. v.)

8. ALOË *margaritifera.*
A. acaulis, foliis trigonis cuſpidatis papilloſis, floribus racemoſis cernuis cylindricis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 468.
Aloë pumila. *Thunb. Diſſ. n.* 8. *Thunb. prod.* 61.
A. (*pumila*) floribus ſeſſilibus bilabiatis, labio ſuperiore erectiore, inferiore recurvato. *Sp. pl.* 460.
α. major.
A. foliis ovato-ſubulatis acuminatis tuberculis cartilagineis undique adſperſis. *Hort. cliff.* 131. *Roy. lugdb.* 24. *Mill. dict. n.* 14. *Kniph. cent.* 4. *n.* 3.
A. africana folio in ſummitate triangulari margaritifera, flore ſubviridi. *Comm. hort.* 2. *p.* 19. *t.* 10.
A. africana margaritifera, folio undique verrucis numeroſiſſimis. *Bradl. ſucc.* 3. *p.* 1. *t.* 21.
β. minor.
A. africana magaritifera minor. *Comm. hort.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *Dill. elth.* 19. *t.* 16. *f.* 17.

γ. minima.
A. africana margaritifera minima. *Comm. prael.* 43. *Dill. elth.* 20. *t.* 16. *f.* 18.
Perlen Aloë. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*9. ALOË *verrucoſa.*
A. acaulis, foliis enſiformibus acutis papilloſis diſtichis, floribus racemoſis reflexis clavatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 468.
Aloë diſticha. *Thunb. Diſſ. n.* 9.* *Thunb. prod.* 61.
Aloë diſticha β. *Sp. pl.* 459.
A. africana flore rubro, folio triangulari et verrucis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 17. *t.* 9.
Warzige Aloë. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Simillima ſequenti, ſed folia *ſuperne planiuscula.* W.

*10. ALOË *carinata.*
A. acaulis, foliis acinaciformibus papilloſis, floribus racemoſis cernuis curvatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 469.
Aloë carinata. *Mill. dict. n.* 21.
Aloë diſticha γ. *Sp. pl.* 459.
A. africana foliis planis conjugatis carinatis verrucoſis, caule et flore corallii colore. *Mart. cent* 11. *t.* 11.
A. africana ſeſſilis, foliis carinatis verrucoſis. *Dill. elth.* 22. *t.* 18. *f.* 20.
Hohlblättrige Aloë. W.
Habitat in Africa. ♄ (v. v.)
Differt a praecedente; foliis *ſuperne excavatis.* W.

*11. ALOË *maculata.*
A. acaulis, foliis linguaeformibus glabris pictis, floribus racemoſis cernuis curvatis. *Thunb. Diſſ. n.* 10.* *Thunb. prod.* 61.
α. *pulchra*, foliis acutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 469.
A. foliis linguiformibus variegatis, floribus pedunculatis cernuis ore inaequali. *Mill. ic.* 195. *t.* 292.
β. *obliqua*, foliis obtuſis cum acumine. *Ait. l. c.*
Gefleckte Aloë. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Hautniquas *montibus.* ♄

12. ALOË *Lingua.*
A. ſubacaulis, foliis linguaeformibus denticulatis glabris diſtichis, floribus racemoſis erectis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 11. *Thunb. prod.* 61. *Ait. Kew.* 1. *p.* 469.
A. (*linguaeformis*) floribus racemoſis erectis, corollis

cylindricis, foliis linguaeformibus diſticho-patulis. *Lin. ſuppl.* 206.

α. *anguſtifolia*, foliis anguſtioribus longioribus. *Ait. l. c.*

A. (*linguiformis*) ſeſſilis foliis linguiformibus maculatis, floribus pedunculatis cernuis. *Mill. dict. n.* 13.

A. (*diſticha*) floribus racemoſis pendulis, ovato-cylindricis curvis. *Sp. pl.* 459. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 12. *et A.* 14.

A. foliis linguiformibus diſtichis patulis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 86. *Roy. lugdb.* 23.

A. africana, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort.* 2. *p.* 15. *t.* 8.

β. *craſſifolia*, foliis latioribus brevioribus. *Ait. l. c.*

Zungenblättrige Aloë. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummis montibus ad* Roodeſand *prope* Waterfall. ♄

*13. ALOË *plicatilis.*

A. ſubacaulis, foliis linguaeformibus laevibus diſtichis, floribus racemoſis pendulis cylindricis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 470.

Aloë diſticha ι. plicatilis. *Sp. pl.* 459.

A. africana arboreſcens montana non ſpinoſa, folio longiſſimo plicatili, flore rubro. *Comm. hort.* 2. *p.* 5. *t.* 3.

Kumara diſticha. *Medic. Theodora p.* 74. *tab.* 4.

Zweyzeilige Aloë. W.

Habitat in Africa. ♄ (v. v. ſ. fl.)

14. ALOË *variegata.*

A. ſubacaulis, foliis trifariis pictis canaliculatis, angulis cartilagineis, floribus racemoſis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 12.* *Thunb. prod.* 61.

A. floribus racemoſis cernuis ſubcylindricis, ore patulo aequali. *Mill. dict. n.* 9. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 7. *Kniph. cent.* 3. *n.* 10.

A. foliis caulinis trifariis imbricatis erectis, angulis ternis cartilagineis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 24.

A. africana humilis, foliis ex albo viridi variegatis. *Comm. prael.* 79. *t.* 28. *rar.* 27. *t.* 27. *Till. piſ.* 7. *t.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 342.

Schäckige Aloë. W.

Habitat in Aethiopiae *argilloſis.* ♄ (v. v.)

Corolla *incarnata ore* 6-*fido*: *laciniis tribus interio-*

ribus alternis patulis. Stamina *declinata. Stigma ſimplex.* Mant. 367.

15. ALOË *viſcoſa.*

A. ſubcauleſcens, foliis imbricatis trifariis ovatis, floribus racemoſis cernuis cylindricis. *Thunb. Diſſ. n.* 13. *Thunb. prod.* 61.

A. floribus ſpicatis infundibuliformibus bilabiatis, laciniis quinque revolutis, ſumma erecta. *Sp. pl.* 460. *Mill. dict. n.* 11. *Kniph. cent.* 4. *n.* 4. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 10.

A. foliis canaliculatis trifariam imbricatis, caulinis apice reflexo-patulis. *Hort. cliff.* 132. *Hort upſ.* 87. *Roy. lugd.* 23.

A. africana erecta triangularis et triangulari folio viſcoſo. *Com. prael.* 82. *t.* 31. *Till. piſ.* 6. *t.* 7. *Dill. elth.* 15. *t.* 13. *f.* 13.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 346.

Klebrige Aloe. W.

Habitat in Cap. b. ſpei *campeſtribus.* ♄ (v. v.)

16. ALOË *ſpiralis.*

A. ſubcauleſcens, foliis imbricatis octofariis ovatis, floribus racemoſis recurvis. *Thunb. Diſſ. n.* 14. * *Thunb. prod* 61.

A. floribus ſpicatis ovatis muricatis crenatis: ſegmentis interioribus conniventibus. *Mill. dict. n.* 12. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* 6.

α. *imbricata* foliis ſpiraliter imbricatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 471.

A. foliis caulinis ſexfariis ovatis mucronatis. *Syſt. Veg.* 278.

A. foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam imbricatis. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 23.

A. africana erecta rotunda, folio parvo et in acumen acutiſſimum exeunte. *Dill. elth.* 16. *t.* 13. *f.* 14. *Comm. prael.* 83. *t.* 32.

β. *pentagona*, foliis quinquefariam imbricatis. *Ait. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 344.

Spiralförmige Aloë. W.

Habitat in Africae *campeſtribus.* ♄ (v. v.)

Folia *ovato-ſubulata, mucronato-ſpinoſa, apice tricarinata, ſexfariam imbricata.* Mant. 368.

17. ALOË *retuſa.*

A. acaulis, foliis quinquefariis deltoideis. *Thunb. Diſſ. n.* 15. *Thunb. prod.* 61.

A. floribus ſpicatis triquetris bilabiatis: labio inferiore, revoluto. *Mill. dict. n.* 19. *Kniph. cent.* 3. *n.* 9. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* 10.
A. foliis caulinis quinquefariis rhomboidalibus ventricoſis, triquetris plano exſtantibus. *Hort. cliff.* 132. *Hort. upſ.* 87. *Roy. lugdb.* 24.
A. africana, breviſſimo craſſiſſimoque folio, flore viridi. *Comm. hort.* 2. *p.* 11. *t.* 6. *Till. piſ.* 6. *t.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 345.
Abgeſturzte Aloë. W.
Habitat in Africae *argilloſis.* ♄ (v. v.)
Flores *ſimillimi A. margaritiferae.*

660. AGAVE.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 582.

Cor. erecta ſupera. *Filam.* corolla longiora, erecta.

* *Acaules.*

1. AGAVE *americana.*
A. acaulis, foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo, tubo corollae medio anguſtato, ſtaminibus corolla longioribus, ſtylo ſtaminibus longiore. W.
A. acaulis, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 471.
A. foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22. *Oſb. it.* 43.
A. ſcapo arboreo ramoſo. *Hall. helv. n.* 1249.
A. foliis ſpinoſo-dentatis mucronatisque. *Hort. upſ.* 81.
A. foliis ſubcompreſſis mucronatis ad margines ſpinoſo-dentatis, ſcapo valido aſſurgenti, racemo ſpatioſo ramoſo. *Brown. jam.* 199.
Aloë foliis lanceolatis dentatis ſpina terminatis radicalibus. *Hort. cliff.* 130. *Roy. lugdb.* 22.
Aloë folio in oblongum mucronem abeunte. *Bauh. pin.* 286.
β. Aloë americana muricata, foliorum margine luteo. *Riſl. carlsr. p.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 348.
Americaniſche Agave. W.
Habitat in America *calidiore. Cortuſus plantam primus in Europa habuit* 1561. (*Cam. hort.* 11.) *hodie ab ea ſepes in Luſitania; in* Helvetia. ♄ (v. ſ.)

2. AGAVE *vivipara.*

A. acaulis, foliis dentatis, ſcapo ramoſo, tubo corollae medio anguſtato, ſtaminibus corollam aequantibus. W.

A. foliis dentatis, ſtaminibus corollam aequantibus. *Syſt. veg.* 278.

A. acaulis, foliis dentatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 471.

A. foliis reflexis, marginibus dentatis. *Mill. dict. n.* 5.

Aloë americana ſobolifera. *Herm. lugdb.* 16. *t.* 17?

Aloë americana polygona. *Comm. prael.* 65. *t.* 15.

Aloë americana. *Rumph. amb.* 5. *p.* 273. *t.* 94.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 351.

Lebendiggebärende Agave. W.

Habitat in America. ♄

Hermanni ſynonymum pertinet ad aliam, forte non determinatam ſpeciem, et Rumphii citatum etiam dubium videtur. W.

3. AGAVE *virginica.*

A. acaulis herbacea, foliis cartilagineo-ſerratis, ſcapo ſimpliciſſimo. W.

A. acaulis herbacea, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 472.

A. foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ſimpliciſſimo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 378. *Collect.* 2. *p.* 261. *

Aloë foliis lanceolatis ſpina cartilaginea terminatis, floribus alternis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 152.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 352.

Virginiſche Agave. W.

Habitat in Virginia. ♃

*4. AGAVE *cubenſis.*

A. corollis hexapetalis, foliis ciliato-ſpinoſis. *Iacq. amer.* 100. *t.* 175. *f.* 28. *

Nequametl. *Marg. braſ.* 2. *p.* 16.

Cubaſche Agave. W.

Habitat frequens in inſula Cuba. ♄

** *Cauleſcentes.*

*5. AGAVE *lurida.*

A. ſubcauleſcens, foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo, ſtaminibus corolla cylindrica longioribus, ſtylo ſtaminibus breviore. W.

A. ſubcauleſcens, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 472. *Iacq. Collect.* 4. *p.* 94. *t.* 1. *

α. foliis latioribus.
Agave Vera Cruz. *Mill. dict.*
β. foliis anguſtioribus.
Dunkle Agave. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Simillima A. americanae ſed notis indicatis diſtincta, corolla *etiam in hac vireſcens nec lutea ut in A. americana.* W.

*6. AGAVE *tuberoſa.* †
A. cauleſcens, foliis dentato-ſpinoſis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 472.
α. ſpinis ſolitariis.
Agave tuberoſa. *Mill. dict. n.* 4.
β. ſpinis duplicibus.
Knollige Agave. W.
Habitat in America. ♄

7. AGAVE *foetida.*
A. cauleſcens, foliis integerrimis, ſcapo ramoſo, corollis hexapetalis. W.
A. cauleſcens, foliis integerrimis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 473. *Jacq. ic. rar.* 2. *t.* 379. *Collect.* 2. *p.* 312. *
A. foliis integerrimis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22. *Mill. dict. n.* 3.
Aloë foliis integerrimis patentiuſculis aculeo terminatis, radice cauleſcente. *Hort. cliff.* 132.
Aloë americana, viridi rigidiſſimo et foetido folio Piet. dicta indigenis. *Comm. hort.* 2. *p.* 55. *t.* 18.
Aloë americana, radice tuberoſa, minor. *Pluk. alm.* 19. *t.* 258. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 353.
Stinckende Agave. W.
Habitat in Curaſſao. ♄
Plantam *Plukenetii ſeparat Millerus, eamque* Agaven (*tuberoſam*) *radice tuberoſa, foliis longiſſimis, marginibus ſpinoſis, appellat.* (*dict. n.* 4.) A. foetida *folia non dentata habet;* A. tuberoſa *vero dentata ac ſpinoſa folia gerit.* Mill. *l. c.* R.

661. ALSTROEMERIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 583.

Cor. 6-petala, ſubbilabiata: petalis 2 inferioribus baſi tubuloſis. *Stam.* declinata.

1. ALSTROEMERIA *Pelegrina.*
A. caule erecto, corollis patentibus, petalis tribus exte-

rioribus cuneiformibus tridentatis, reliquis mucronatis, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus. W.

A. caule erecto. *Amoen. acad.* 6. *p.* 247. *t.* 247. *Jacq. hort. t.* 50. *Curt. mag.* 139.

Hemerocallis floribus purpuraſcentibus maculatis vulgo Pelegrina. *Fewill. peruv.* 2. *p.* 711. *t.* 5.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 487.

Bunte Alſtroemerie. W.

Habitat in Peru *et* Lima. ♃ (v. v.)

Folia reſupinata. Flores pulcherrime variegati. Vox Pelegrina ab Hiſpanis in reguo Peruviano uſitata, ſignificat flos ſuperbus. W.

2. ASTROEMERIA *pulchella.*

A. caule erecto, corollis reflexo-patentibus omnibus acutis, foliis ſeſſilibus, pedicellis involucro brevioribus. *Lin. ſuppl.* 206.

Schöne Alſtroemerie. W.

Habitat in America *meridionali.*

Planta *habitu et ſtructura ſimillima A. Pelegrinae, niſi folia anguſtiora et caulis hujus terminatus involucro irregulari, ex foliis majoribus exacte petiolatis reſupinatis.* Pedunculi *nudi ſimpliciſſimi uniflori.* Flores *quatuor ſ. ſex ſubcernui magnitudine A. Pelegrinae irregulares.* Petala *a baſi patentia recurvata acuta, alterna minora albida, apice rubra, baſi ſtriata, ſive rubro-punctata.* Stamina *declinata lutea aequalia.* Piſtillum *rubrum adſcendens.* Stigma *trifidum.*

3. ALSTROEMERIA *Ligtu.*

A. caule erecto, foliis ſpathulato-oblongis, pedunculis umbellae involucro longioribus, corolla bilabiata. *Lin. ſuppl.* 207.

A. caule adſcendente. *Sp. pl.* 462. *Curt. mag.* 125.

Hemerocallis floribus purpuraſcentibus ſtriatis vulgo Ligtu. *Fewill. peruv.* 2. *p.* 710. *t.* 4. *mala.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 489.

Rachenförmige Alſtroemerie. W.

Habitat in Lima. ♃ (v. v.)

Caules *ſteriles veſtiti foliis ſubulatis appreſſis, terminati foliis ſpathulatis oblongis reſupinatis, in roſam fere poſitis.* Caulis *floriferus veſtitus foliis ſubulatis appreſſis, terminatis involucro breviori.* Pedunculi *pauciores ſimpliciſſimi nudi involucro longiores.* Corolla *hexapetala bilabiata.* Petala *tria ſuperiora*

majora alba baſi punctata, apice rubro-maculata. Petala *tria inferiora breviora, imprimis infimum, fere ſubulata rubra.* Filamenta *petalis inferioribus longiora deflexa ſcabra.* Antherae *didymae luteae.* Piſtillum *rubrum.* *Spectabilis floribus magnis.*

4. ALSTROEMERIA *Salſilla.*

A. caule volubili, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella ramoſa, pedunculis involucro longioribus bracteatis laxis. *Lin. ſuppl.* 206.

A. caule volubili. *Sp. pl.* 462.

Hemerocallis ſcandens, floribus purpureis vulgo Salſilla. *Fewill. peruv.* 2. *p.* 713. *t.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 492.

Windende Alſtroemerie. W.

Habitat in Lima.

Caulis *volubilis.* Folia *petiolata nervoſa acuminata reſupinata.* Petioli *nulli.* Involucrum *polyphyllum ſubulatum reflexum.* Pedunculi *pauciores elongati, apice ſubbiflori.* Folium *florale ad ramificationes pedunculorum.* Petala *erecto-patentia obtuſiuſcula, exteriora rubicunda, interiora vireſcentia.*

*5. ALSTROEMERIA *ovata.*

A. caule volubili, foliis petiolatis ellipticis acuminatis ſuperne villoſis, umbella ramoſa, pedunculis involucro longioribus bracteatis laxis, corolla campanulata. W.

A. caule volubili, foliis lanceolatis, ſuperiori pagina lanuginoſis, inferiori lucidis, floribus umbellatis, corollis tubuloſis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 54. *t.* 76. *

Eyförmige Alſtroemerie. W.

Habitat in Peru. ♃

Corollae *petala ſex in tubum approximata ovato-oblonga; tria exteriora coccinea apice viridia; interiora viridia verſus ſummitatem planiuſcula, punctisque nigris variegata.* Cavan. l. c.

6. ALSTROEMERIA *multiflora.*

A. caule volubili, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis, umbella ſimplici, pedunculis bracteis brevioribus, petalis alternis truncatis. *Lin. ſuppl.* 207.

Vielblütige Alſtroemerie. W.

Habitat in America *meridionali. Mutis.*

Habitus *et* ſtructura *herbae eſt A. Salſillae, at* petioli *margine rugoſi, nec* umbella *pedunculata ut in A. Sal-*

ſilla, involucrum *multiflorum conſtat foliolis latiori-bus*, pedunculi *involucro et flore breviores*, *ſimpliciſſimi nudi.* Flores *magnitudine A. Salſillae.* Petala *tria exteriora breviora anguſtiora, integra; interiora truncata ſ. emarginata cum acumine.* Colorem *hujus ignoro, nam ſiccam miſit Cl. Mutis. A reliquis diſtinctiſſima eſt.*

Folia *Alſtroemeriarum ſunt reſupinata et corollae petalis alternis minoribus.*

662. HEMEROCALLIS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 585.

Cor. campanulata: tubo cylindrico. *Stamina* declinata.

1. HEMEROCALLIS *flava.*

H. foliis linearibus carinatis, petalis planis acutis, nervisque petalorum indiviſis. W.

H. corollis flavis. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. hort. t.* 139. *Knorr. del.* 1. *t. L.* 5. *Kniph. cent.* 10. *n.* 51. *Hoffm. germ.* 123.

H. foliis enſiformibus, ſcapo pauciſloro, petiolis lineatis. *Hall. helv. in Addendis. p.* 188.

H. ſcapo ramoſo, corollis monopetalis. *Hort. upſ.* 88.

H. radice tuberoſa, corollis monopetalis. *Hort. cliff.* 128. *Roy. lugdb.* 26.

H. radice tuberoſa, corollis monopetalis luteis. *Gmel. ſibir.* 1. *p.* 37.

Lilio-Aſphodelus luteo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 137.

Lilium luteum, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.

β. Lilio-Aſphodelus luteus minor. *Tournef. inſt.* 334. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 494.

Gelbe Tagblume. W.

Habitat in Helvetiae, Sibiriae, Hungariae *campis.* ♃ (v. v.)

2. HEMEROCALLIS *fulva.*

H. foliis linearibus carinatis, petalis tribus interioribus obtuſis undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramoſis. W.

H. corollis fulvis. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent* 7. *n.* 31.

Lilio-Aſphodelus puniceus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 137.

Lilium rubrum, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.

Phalangium allobrogum majus. *Cluſ. app. ult. Hort. aich. vern. ord. 9. t. 6. f. 1.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 496.
Braunrothe Tagblume. W.
Habitat in China. ♃ (v. v.)

Specie diverſa haec eſſe videtur, nec tamen differentiam reperi: haec major, illa minor; haec floribus fulvis, illa flavis, haec Maturationis, illa Groſſificationis menſe floret.

Hemerocallis fulva cultura mutatur in H. flavam, (*Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 353.) *quod mihi haud credibile videtur; ſi etiam mutetur color H. fulvae in pallidiorem, remanent tamen characteres conſtantes.* W.

*3. HEMEROCALLIS *lancifolia.*

H. foliis oblongis utrinque attenuatis. W.
H. (*lancifolia*) foliis lanceolatis ſeptemnerviis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
H. (*japonica*) foliis ovato-lanceolatis ſeptemnerviis. *Thunb. jap.* 142. *
Aletris (*japonica*) acaulis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ſeptemnerviis, floribus ſpicatis. *Thunb. Act. Upſ.* 3. *p.* 208.
Aletris japonica. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 486. *t.* 84. *f.* 2.
Lanzenblättrige Tagblume. W.
Habitat in Japonia. ♃

*4. HEMEROCALLIS *japonica.*

H. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis W.
H. (*japonica*) foliis ovatis undulatis multinerviis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
Jakſan. *Kaempf. amoen.* 863. *Banks Ic. Kaempf. t.* 11.
β. H. (*caerulea*) foliis cordatis petiolatis, corollis coeruleis. *Andrews repoſ. bot. tab.* 6. *
Japaniſche Tagblume. W.
Habitat in Japonia. ♃

Folia *radicalia petiolata ovata acuminata undulata, coſta media multinervia, transverſim tenuiſſime venoſa glabra palmaria.* Petioli *alati membranacei palmares vel paulo ultra.* Flores *ut H. lancifolia.* Thunb. Act. l. c.

663. ACORUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 586.

Spadix cylindricus, tectus floſculis. *Cor.* 6-petalae, nudae. *Stylus* o. *Capſ.* 3-locularis.

1. ACORUS *Calamus.*

A. ſcapi mucrone longiſſimo foliaceo. *Ait. Kew.* 1. *p.* 474.
Acorus. *Roy. lugdb.* 6. *Fl. ſuec.* 277. 297. *Mat. med. p.* 96. *Hall. helv. n.* 1307. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 1. *Scop. carn. n.* 426. *Pollich. pal. n.* 343. *Ludw. ect. t.* 34. *Kniph. cent.* 9. *n.* 3. *Hoffm. germ.* 123. *Roth. germ. I.* 153. *II.* 398.
α. Acorus *vulgaris.*
A. verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34. *Hort. cliff.* 137. *Blackw. t.* 466.
Typha aromatica, clava rugoſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 246. *ſ.* 8. *t.* 13. *f.* 4.
Acorum legitimum. *Tabern.* 642.
β. Acorus *verus.*
A. aſiaticus, radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9. *Fl. zeyl.* 132.
Calamus aromaticus. *Garz.* 288. *c. fig.*
Acorum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 178. *t.* 72. *f.* 1.
Waembu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 99. *t.* 60.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 354.
Gemeiner Calmus. W.
Habitat α. *in* Europae, β. *in* Indiae *foſſis paludoſis.* ♃ (v. v.)

*2. ACORUS *gramineus.*

A. ſcapi mucrone ſpadicem vix excedente. *Ait. Kew.* 1. *p.* 474.
Grasartiger Calmus. W.
Habitat cultus in China. ♃

664. ORONTIUM.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 587.

Spadix cylindricus, tectus floſculis. *Cor.* 6-petalae, nudae. *Stylus* nullus. *Folliculi* 1-ſpermi.

1. ORONTIUM *aquaticum.*

O. foliis lanceolato-ovatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 474.

Orontium. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *t.* 1. *f.* 3. * *Kalm. it.* 3. *p.* 54. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 6.
Arum folio enervi ovato. *Gron. virg.* 113.
Arum fluitans, pene nudo. *Baniſt. virg.* 1924.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 356.
Virginiſche Waſſerähre. W.
Habitat in Virginiae, Canadae *paludibus, ſcaturiginibus.* ♃

Radix *alte deſcendens.* Scapus *teres longus glaberrimus pallidus punctis fuſcis.* Folia *lanceolato-ovata acuminata integerrima glaberrima petiolata.* Pedunculus *ſub ſpica ſ. ſpadice lacteae albedinis.* Amoen. acad.

Folia *ſunt venoſa ſecundum iconem in Amoenitatibus a Linnaeo datam.* W.

*2. ORONTIUM *japonicum.*

O. foliis enſiformibus. W.
O. foliis enſiformibus venoſis. *Thunb. jap.* 144.
Kiro. *Kaempf. amoen.* 785. *Banks. Ic. Kaempf. t.* 12.
Japaniſche Waſſerähre. W.
Habitat in Japonia. ♃

Folia *ſunt nervoſa nec venoſa.* W.

665. TACCA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 588.

Cal. 6-partitus. *Cor.* 6-petala calyci inſerta antherifera. *Stigma* ſtellatum. *Bacca* ſicca 6-angul. polyſperma infera.

1. TACCA *pinnatifida.*

T. pinnatifida. *Lin. ſuppl.* 251. *Forſt. pl. eſculent. n.* 28. * *Forſt. prod. n.* 209.
Leontice (*Leontopetaloides*) foliis ſimplicibus tripartito-multifidis, corollis monopetalis calyculatis. *Sp. pl.* 448.
Leontopetaloides. *Ammann Act. petrop.* 8. *p.* 211. *t.* 113.
Tacca littorea. *Rumph. amb.* 5. *p.* 328. *t.* 114.
Tacca ſativa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 324. *t.* 112.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 408.
Halbgefiederte Tacca. W.

Habitat in India *orientali et* Taheiti. ♃
Foliis *ſimilis Dracontio polyphyllo.*

666. CORYPHA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1690.

Cal. 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 1-ſperma. *Sem.* globoſum magnum oſſeum.

1. CORYPHA *umbraculifera.*
C. frondibus pinnato-palmatis, filo laciniis interjecto, ſpadice erecto. W.
C. frondibus pinnato-palmatis plicatis, petiolis ciliato-ſpinoſis, ſpadice erecta. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 130.
C. frondibus pinnato-palmatis plicatis filoque interjectis. *Hort. cliff.* 482. *Fl. zeyl.* 394. *Roy. lugdb.* 4.
Palma montana, folio plicatili flabelliformi maximo ſemel tantum frugifera. *Raj. hiſt.* 1363.
Codda-pana. *Rheed. mal.* 3. *p.* 1. *t.* 1-12.
Groſsblättrige Schirmpalme. W.
Habitat in India. ♄
Vix floret ante 30 *ſ.* 40, *aetatis annum.* Rheed. l. c.
Folium *ampliſſimum et maximum in rerum natura.* W.

*2. CORYPHA *rotundifolia.*
C. frondibus palmatis orbiculatis peltatis, ſpadice nutante. W.
C. frondibus orbiculatis palmato-peltatis radiatim plicatilibus, petiolis ciliato-ſpinoſis, ſpadice pendulo. *Lamarck. encyclop.* 2. *p.* 131.
Saribus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 42. *t.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 63. *t.* 2. *f.* 1. 2.
Rundblättrige Schirmpalme. W.
Habitat in Moluccis. ♄

667. LICUALA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1691.

Cal. 3-partitus. *Cor.* 3-partita. *Nect.* truncatum ſertiforme. *Drupa* 1-ſperma.

*1. LICUALA *ſpinoſa.*
L. ſpinoſa. *Wurmb. Act. Batav.* 2. *p.* 469. * *Thunb. Act. holm.* 1782. *p.* 284. * *Thunb. Nov. pl. Gen* 3. *p.* 70.

Licuala arbor. *Rumph. amb.* 1. *p.* 44. *t.* 9. *
Stachliche Strauchpalme. W.
Habitat in Moluccis. ♄
Palma *pumila orgyalis vix ultra.* Frons *palmata, laciniis linearibus apice truncatis dentatis.* Stipes *triquetrus ſpinoſus.* Spadix *erectus ramoſus.* W.

*688. THRINAX.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1686.

Cal. 6-dentatus. *Cor.* o. *Stigma* infundibuliforme obliquum. *Bacca* monoſperma.

*1. THRINAX *parviflora.*
T. parviflora. *Swartz. prod.* 57. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 614.*
Corypha palmacea, foliis flabelliformibus cum appendiculo ad imum, petiolis tenuioribus flexilibus compreſſis. *Brown. jam.* 190.
Kleinblütige Schilfpalme. W.
Habitat in maritimis et aridis Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄
Palma *caudice* 10-20 *pedali.* Frondes *flabelliformes palmatae plicatae, laciniis lanceolatis rigidis.* Stipites *foliis longiores compreſſi glabri inermes.* Spadix *erectiuſculus* 2-3 *pedalis ramoſus.* Swartz. l. c.

669. CALAMUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 589.

Cal. 6-phyllus. *Cor.* o. *Bacca* exarida, 1-ſperma, retrorſum imbricata.

1. CALAMUS *Rotang.*
C. caudice denſiſſime aculeato, aculeis erectis, ſpadice erecto. W.
C. *(petraeus)* caule craſſiſſimo ſulcato, ſpinis longis erectis. *Loureiro cochin. p.* 260.*
Arundo zeylanica ſpinoſiſſima major, fructibus rotundis ſcabris acidis. *Burm. zeyl.* 36. *Fl. zeyl.* 468.
Arundo nucifera Rotang dicta, fructu ſpadicei coloris ſtriis purpureis venuſte teſſulato. *Pluk. alm.* 53. *t.* 106. *f.* 1. 2.
Arundo Rotang dicta. *Fiſ. mant.* 188.
Fructus cannae de Benghala. *Bauh. pin.* 405.
Tſieru Tſiurel. *Rheed. mal.* 12. *p.* 121. *t.* 64. 65.

Palmijuncus Calapparius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 88. 151. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 383.
Stein Rotang. W.
Habitat in Indiae *ſylvis juxta fluenta.* ♄
Folia *ſetis fuſcis tecta.* Rumph.

*2. CALAMUS *verus.*
C. aculeis caudicis horizontalibus, ſpadice erecto, tribus foliolis calycinis longioribus. W.
C. (*verus*) frondibus longiſſimis, ſpinis confertis longis, ſpadice brevi, corolla tripetala. *Loureiro cochin. p.* 261.
Palmijuncus verus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 105. *t.* 54.
Aechter Rotang. W.
Habitat ad fluviorum ripas Indiae *orientalis.* ♄
E. radice hujus creſcit caudex *ſolitarius nec plures ut in reliquis.* Rumph. l. c.

*3. CALAMUS *Draco.* W.
C. aculeis caudicis adpreſſis, frondium patentibus, ſpadice erecto. W.
Palmijuncus Draco. *Rumph. amb.* 5. *p.* 114. *t.* 58. *f.* 1.
Drachenblutgebender Rotang. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

*4. CALAMUS *niger.* W.
C. aculeis caudicis et frondium horizontalibus, ſpadice coarctato pendulo. W.
Palmijuncus niger. *Rumph. amb.* 5. *p.* 101. *t.* 52.
Schwarzer Rotang. W.
Habitat in littoribus Indiae *orientalis.* ♄
Aculei *fuſco-nigricantes.* Rumph. l. c.

*5. CALAMUS *viminalis.* W.
C. aculeis caudicis patentibus, frondium diſtantibus reflexis, ſpadice nutante. W.
Palmijuncus viminalis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 108. *t.* 55.
Schlanker Rotang. W.
Habitat in ſylvis humentibus Javae *et* Celebis. ♄.

*6. CALAMUS *rudentum.*
C. aculeis caudicis reflexis, ſpadice divaricato recto. W.
C. (*rudentum*) caule longiſſimo aequali, ſpinis inverſis. *Loureiro cochin. p.* 260.
Palmijuncus albus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 102. *t.* 52.
Weiſſer Rotang. W.
Habitat in littoribus arenoſis Indiae *orientalis.* ♄
Haec *eſt vulgatiſſima ſpecies et per totam Indiam creſcens.* Rumph. l. c.

*7. CALAMUS *equeſtris.* W.

C. aculeis caudicis erecto-patentibus, frondium uncinatis, foliolis ellipticis utrinque attenuatis, ſpadice erecto. W.
Palmijuncus equeſtris. *Rumph. amb.* 5. *p.* 110. *t.* 56. *et. t.* 57. *f.* 1.
Ritter Rotang. W.
Habitat in humidis ſaxoſis Amboinae. ♄

*8. CALAMUS *Zalacca.*

C. aculeis patentibus, ſpadice radicali. W.
Calamus Zalacca. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 267. *t.* 139. *f.* 1.
Palmijuncus Zalacca. *Rumph. amb.* 5. *p.* 115. *t.* 57. *f.* 2.
Fructus Baly inſulae pyriformis aſper. *Bauh. hiſt.* 1. *l.* 3. *p.* 401.
Wurzelblütiger Rotang. W.
Habitat in ſylvis humentibus Javae *orientalis*, Balegae *et* Bandae. ♄

Fructus *hujus triſpermus.* W.

Periculum feci in diſtinguendis Calami ſpeciebus a Rumphio delineatis, an characteres ſufficiant, diſtinguent autoptae. Calamum ſcipionum, amarum et dioicum Loureiri non aſſumpſi ob notas harum ſpecierum incertas. W.

670. IUNCUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 590.

Cal. 6-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 1-locularis.

* *Culmis nudis.*

1. IUNCUS *acutus.*

I. culmo ſubnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo ſpinoſo. *Scop. carn. n.* 430. *Mill. dict. n.* 1.
I. (*maritimus*) culmo nudo mucronato pungente, panicula involucrata laterali, capſula longitudine calycis. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 253. *
I. culmo pungente, panicula ex folii ſolitarii axilla. *Sauv. monſp.* 9.
I. panicula univerſali culmo breviore infime coarcta, ſecundariis paululum laxis, capſulis triquetro-ſubovatis nitentibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 412.

I. acutus, capitulis ſorghi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 520. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 232. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 15. *Scheuchz. gram.* 338.
β. Iuncus panicula univerſali culmo longiore, ſecundariis laxis longe pedunculatis: media praecipue. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 412.
I. (*acutus*) culmo nudo apice bivalvi, panicula terminali ſubumbellata, capſula calyce duplo longiore. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 253.
I. acutus maritimus anglicus. *Raj. hiſt.* 1303. *Moriſ. ibid. f.* 14. *Scheuchz. gram.* 340.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 601.
Spitzige Simſe. W.
Habitat in Angliae, Galliae, Italiae, Carnioliae *maritimis paludoſis.* ♃ (v. ſ.)

2. IUNCUS *conglomeratus.*
I. culmo nudo ſtricto, panicula laterali coarctato-capitata. W.
I. culmo nudo ſtricto, capitulo laterali *Roy. lugdb.* 44. *Fl. ſuec.* 278, 298. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 70. *Pollich. pal. n.* 344. *Leers. herb. n.* 261. *t.* 13. *f.* 1. *Fl. dan. t.* 1094. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 153. *II.* 398.
I. caule nudo, foliis teretibus mollibus, panicula conglomerata. *Hall. helv. n.* 1312.
I. culmo nudo, tereti; panicula laterali, denſa, globoſa, ſeſſili. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 224. *n.* 2. *ed.* 2. *n.* 427.
I. laevis panicula non ſparſa. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183.
I. laevis, panicula conglomerata. *Scheuch, gram.* 343.
Iuncus. *Cam. epit.* 780. *Matthiol. ic.* 1036. laevis *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 520. alter. *Bauh. pin.* 182.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 602.
Kugelriſpige Simſe. W.
Habitat in Europae *borealis uliginoſis.* ♃

3. IUNCUS *effuſus.*
I. culmo nudo ſtricto, panicula laterali effuſa, floribus oblongis. W.
I. culmo nudo ſtricto, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Fl. ſuec.* 279, 299. *Fl. dan. t.* 1096. *Pollich. pal. n.* 345. *Leers. herb. n.* 262. *t.* 13. *f.* 2. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 153. *II.* 399.
I. culmo nudo tereti, panicula laterali ſparſa. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 223. *n.* 1. *ed.* 2. *n.* 428.

I. culmo nudo acuminato ad baſin ſquamato, floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 117. *Gron. virg.* 38.
I. panicula arundinacea. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 520.
I. laevis panicula ſparſa, major. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 182. *Scheuch. gram.* 241.
Iuncus laevis. *Dod. pempt.* 606. *Tabern.* 249.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 603.
Weitriſpige Simſe. W.
Habitat in Europae *et* Americae *borealis uliginoſis.* ♃ (v. v.)

*4. IUNCUS *glaucus.*
I. culmo nudo glauco apice inflexo, panicula laterali effuſa, ramis elongatis, floribus acuminatis. W.
I. (*glaucus*) culmo ſtriato glauco, baſi ſtipulis fuſcis, panicula laterali ſparſa. *Sibthorp. oxon. p.* 113. *Fl. dan. t.* 1159
Iuncus inflexus. *Leers. herb. n.* 263. *t.* 13. *f.* 3. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 154. *II.* 400.
Iuncus acutus. *Raj. ſynop.* 432.
Graue Simſe. W.
Habitat in Germaniae, Angliae *udis.* ♃ (v. v.)

5. IUNCUS *inflexus.*
I. culmo nudo: apice membranaceo incurvo, panicula laterali. *Sp. pl.* 464. *Scop. carn.* 2. *n.* 429.
I. culmo nudo, paniculam arcuatim tegente. *Sauv. monſp.* 9.
I. acumine reflexo, major. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 134. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 25. *Barr. ic.* 204.
I. foliaceus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 221.
Iuncus 3. *Dod. cer.* 265.
β. I. acumine reflexo, alter. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *Scheuch. gram.* 345. *n.* 5. 6.
γ. I. panicula univerſali laterali culmo longiore, ſecundariis ſparſis. *Guett. ſtamp.* 412.
I. acutus panicula ſparſa. *Bauh. pin.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 604.
Gebogene Simſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃.
Culmi ſuprema pars non eſt teres, ſed folii ad inſtar compreſſus. W.

*6. IUNCUS *arcticus.* W.
I. culmo nudo ſtricto, umbella laterali, pedunculis multifloris, floribus ſeſſilibus. W.

I. culmo nudo acuminato ad baſin ſquamato, floribus ſeſſilibus. *Fl. lapp.* 116. *Fl. dan. t.* 1095.
Nördliche Simſe. W.
Habitat in alpibus Norvegiae, Lapponiae. ♃
Abunde diſtinctus a I. Iacquini, cui ſimillimus, culmo nudo nunquam folioſo. W.

7. IUNCUS *filiformis.*

I. culmo nudo filiformi nutante, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44. *Gron. virg.* 152. *Fl. ſuec.* 280, 300. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 71. *Gort. ingr.* 51. *Mill. dict. n.* 2. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 401. *Leers. herb. n.* 264. *t.* 13. *f.* 4. *Hoffm. germ.* 124.
I. culmo nudo, foliis teretibus mollibus, panicula laterali pauciflora. *Hall. helv. n.* 1313.
I. parvus, calamo ſupra paniculam longius producto. *Raj. angl.* 3. *p.* 452. *Fl. lapp.* 118. *Pluk.* 200. *t.* 40. *f.* 8.
I. laevis, panicula ſparſa, minor. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183. *Scheuch. gram.* 347. *t.* 7. *f.* 11.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 605.
Fadenförmige Simſe. W.
Habitat in Europae *uliginoſo-paludoſis turfoſis.* ♃ (v. ſ.)

*8. IUNCUS *capillaceus.*

I. culmo nudo capillaceo, panicula laterali breviſſima, capſulis calyce majoribus. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 255. *
Haarförmige Simſe. W.
Habitat in Braſilia *prope* Monte-Video.
Culmus *capillaris ut in Scirpo aciculari ſed multo longior, ceſpitoſus, nudus debilis,* 6-10 *uncias longus.* Panicula *parva lateralis ſeſſilis dichotoma* 5 *ſ.* 6 *linearis.* Flores 7-10, *in binis paniculae ramis ſeſſiles.* Capſula *ovata valde obtuſa calyce parum longior.* Lamarck. l. c.

9. IUNCUS *grandiflorus.*

I. culmo nudo unifloro, foliis teretibus, foliolis calycinis lineari-ſubulatis longiſſimis inaequalibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 255.*
I. folio tereti, culmo unifloro, flore erecto ſingulari nudo. *Lin. ſuppl.* 209.
I. folio tereti, flore ſolitario terminali ſubnudo. *Forſt. Comment. Goett.* 9. *p.* 27. *t.* 5. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 624.
Groſsblütige Simſe. W.
Habitat in freto Magellanico *inque* Tierra del Fuego. ♃ (v. ſ.)

Gramen *vix pedale glaberrimum.* Culmus *teres baſi vaginis tectus.* Folium *unicum teres ſubulatum rectum culmo longius.* Flos *culmum terminans unicus magnus erectus.* Valvulae *calycinae erectae acutae, alternae breviores, pollicares.* Stamina *et* Piſtilla *valvulis calycinis breviora.*

*10. IUNCUS *magellanicus.*

I. culmo nudo unifloro, foliis planiuſculis anguſtiſſimis culmo longioribus, flore laterali. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 255. *
Magellaniſche Simſe. W.
Habitat in freto Magellanico.

Radix *non repens.* Culmi *filiformes anguloſi nudi uniflori ſex vel octo-pollicares.* Folia *radicalia plana ſubcarinata ſtricta glabra culmo longiora. Infra culmi apicem eſt* flos *unicus ſeſſilis* 6 *lineas longus ſquama parva lineari-ſubulata ſuffultus.* Foliola *calycina atra albo-marginata.* Filamenta 6 *breviſſima.* Antherae *lineares calyce breviores.* Germen *ſubrotundum atrum.* Stylus *filiformis.* Stigmata 3 *capillacea.* Lamarck. l. c.

*11. IUNCUS *rubens.* †

I. culmo nudo baſi vaginis veſtito, involucro ſpathaceo multifloro terminali. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 255.
Rothe Simſe. W.
Habitat in Braſilia *prope* Monte-Video.

Culmus *ſesquipedalis teres nudus baſi ſquamis vaginantibus alternis numeroſis tectus, apice foliis binis uncialibus rubicundis ſpathaceis inſtructus. Inter folia dicta eſt* faſciculus *capitulorum, unilateralis.* Capitula *ſunt e floribus binis vel tribus compoſita, et ſquamis totidem longitudine fere florum munita.* Flores *non examinavi.* Lamarck. l. c.

12. IUNCUS *trifidus.*

I. culmo nudo, foliis floribusque tribus terminalibus. *Fl. lapp.* 119. *Fl. ſuec.* 281, 301. *Roy. lugdb.* 43. *Oed. dan.* 107. *Scop. carn. n.* 432. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ.* 159. *II.* 401.
I. monanthos. *Iacq. obſ. n.* 33. *t.* 4. *f.* 1.
I. acumine reflexo trifidus. *Hall. helv. n.* 1315.

I. acumine reflexo, minor et trifidus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *t.* 22. *theatr.* 186.
Iuncoides alpinum trifidum. *Scheuch. gram.* 325.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 606.
Dreytheilige Simſe. W.
Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

13. IUNCUS *ſquarroſus.*

I. culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. *Fl. ſuec.* 282, 302. *Pollich. pal. n.* 346. *Oed. dan. t.* 430. *Hoffm. germ.* 124. *Roth. germ. I.* 154. *II.* 402.
I. (*Sprengelii*) culmo ſubtriquetro canaliculato, foliis lineari-canaliculatis, corollis acutis, capſulis obtuſis, bractea panicula multo minori. *Willd. prod. n.* 394. *t.* 4. *f.* 8. *
I. rigidus, panicula ſpicata, floribus cartilagineis. *Hall. helv. n.* 1317.
I. foliis ſetaceis, culmo nudo, capitulis glomeratis terminalibus. *Roy. lugdb.* 44.
I. montanus paluſtris. *Raj. hiſt.* 1303. *Fl. lapp.* 121.
Iunco adfinis panicula laxa, ſeu longioribus pediculis inſidente. *Scheuchz. agroſt.* 350. R.
Gramen junceum, foliis et ſpica junci. *Bauh. pin.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 226. *t.* 9. *f.* 13.
Gramen junceum, ſemine acuminato. *Loeſ. pruſſ.* 15. *t.* 29.
Gramen junceum maritimum. *Lob. ic. p.* 18. *Hall.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 601.
Sparrige Simſe. W.
Habitat in Europae *borealis ceſpitoſis.* ♃ (v. v.)
Totus *rigens foliis patentibus.*

*14. IUNCUS *capitatus.*

I. culmo nudo filiformi, capitulo terminali ſeſſili ſubſolitario involucrato. W.
I. (*gracilis*) culmo nudo erecto filiformi ſimpliciſſimo, foliis filiformibus ſemicylindricis canaliculatis, capitulo terminali, involucro ſubpentaphyllo. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 402.*
I. (*ericetorum*) culmo nudo filiformi, foliis linearibus canaliculatis, capitulo ſubrotundo ſeſſili terminali triphyllo. *Pollich. pal. n.* 350.
I. (*mutabilis*) humilis ceſpitoſus, culmis ſubfolioſis, fo-

liis canaliculatis, floribus congeſtis ſeſſilibus. *Cavan ic.* 3. *p.* 49. *t.* 296. *f.* 2. (*excluſis ſynonymis.*)
I. foliatus minimus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 523. *Rupp. Jen* 146

β. I. (*capitatus*) foliis ſetaceis, capitulis terminali alari que ſubfolioſis, petalis acutis integris pericarpio aequalibus. *Weigel obſ.* 28. *t.* 2. *f.* 5.* (*excluſis ſynonymis Halleri, Scheuchzeri et Dillenii.*)
Kopfförmige Simſe. W.
Habitat in glareoſis ſubudis Germaniae, Hiſpaniae. ⊙ (v. v.)

*15. IUNCUS *capenſis.*

I. culmo aphyllo compreſſo, capitulis ſeſſilibus pedunculatisque. *Thunb. prod.* 66.
I. (*cymoſus*) culmo nudo, foliis planis, panicula terminali cymoſa, involucro bivalvi. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 256?
Capiſche Simſe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

** *Culmis folioſis.*

16. IUNCUS *punctorius.*

I. culmo nudo tereti, folio tereti articulato mucronato, panicula glomerata. *Lin. ſuppl.* 208.
I. culmo aphyllo tereti, folio ſubulato, panicula compoſita coarctata. *Thunb. prod.* 66.
Stechende Simſe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

Culmus *bipedalis et ultra teres laevis.* Folia *radicalia nulla, ſed membranae duae, rudimenta foliorum.* Folium *caulinum unicum culmo ſimile ſed paulo longius ſtrictum mucronatum pungens intus articulatum.* Panicula *terminalis arcte conglomerata in aliquot glomeres e gluma exortos. Affinitas I. articulati ſed omnia robuſtiora ut reliqua taceam.*

17. IUNCUS *nodoſus.*

I. foliis nodoſo-articulatis, petalis mucronatis. *Sp. pl.* 466.
I. folioſus minor, pericarpiis ovatis, americanus. *Gron. virg.* 15.
Gramen junceum elatius, pericarpiis ovatis. *Pluk. alm.* 179. *t.* 92. *f.* 9.
Gramen junceum virginianum, calyculis paleaceis, bicorne. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 15.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 608.
Knotige Simſe. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃ (v. ſ.)
Simillimus I. articulato, ſed Flores *magis capitati: capitulis rarioribus, majoribus et paniculae rami ſimplices, nec ſupradecompoſiti; imprimis diſtinguitur petalis in acumen ſubulatum protractis.*

18. IUNCUS *articulatus.*

I. culmo adſcendente, foliis nodoſo-articulatis compreſſo-teretiuſculis, panicula compoſita, foliolis calycinis aequalibus obtuſiuſculis. W.
I. foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. *Fl. ſuec.* 285, 303. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 69. *Scop. carn. n.* 431. *Leers. herb. n.* 265. *t.* 13. *f.* 6. *Fl. dan. t.* 1097.
α. Iuncus *aquaticus.*
I. foliis articulatis compreſſis, panicula ſemel ramoſa. *Hall. helv. n.* 1322. *Pollich. pal. n.* 347.
I. (*aquaticus*) culmo folioſo decumbente, foliis articulato-nodoſis ſubcompreſſis linearibus, panicula terminali compoſita. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 403.
I. (*obtuſiflorus*) foliis nodoſo-articulatis, floribus obtuſis. *Hoffm. germ.* 125. *Ehrh. gram.* 76.
I. foliis articuloſis, panicula inaequali, capitulis ſeſſilibus, capſulis ſubulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.
I. foliis articuloſis, floribus umbellatis. *Tournef. inſt.* 247. *Fl. lapp.* 120.
Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76. *Scheuch. gram.* 331.
β. Iuncus alpinus. *Villars. delph.* 2. p. 233.
I. foliis ſeſſilibus articulatis, panicula ſimplici, glumis ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1321.
Iuncus alpinus, folio articuloſo. *Scheuch. gram.* 333.
γ. Iunci folioſi, foliis per ſiccitatem nodoſis. *Mich. gen.* 38. *n.* 1. 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 609.
Gegliederte Simſe. W.
Habitat in Europae *aquoſis.* ♃ (v. v.)

19. IUNCUS *ſylvaticus.*

I. culmo erecto, foliis nodoſo-articulatis teretibus, panicula ſupradecompoſita, foliolis calycinis ariſtatis interioribus longioribus. W.
I. (*ſylvaticus*) culmo folioſo erecto, foliis teretibus ar-

ticulato-nodoſis, panicula terminali ſupradecompoſita diffuſa. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 405.
I. (*acutiflorus*) foliis nodoſo-articulatis, floribus acutis. *Hoffm. germ.* 125. *Ehrh. gram.* 66.
I. foliis articulatis teretibus panicula repetito-ramoſa. *Hall. helv. n.* 1323.
Iuncus articulatus γ. *Sp. pl.* 465.
Gramen junceum folio articuloſo, ſylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75.
Gramen junceum articulatum paluſtre erectum et elatius. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 1.
β. Gramen junceum folio articuloſo cum utriculis. *Bauh. prod.* 12. *Scheuch. gram.* 333.
Wald Simſe. W.
Habitat in Europae *nemoribus humidis.* ♃ (v. v.)

*20. IUNCUS *ſubverticillatus.*

I. culmo decumbente, foliis ſetaceis, floribus glomeratis verticillatis, glomerulis folioſis. W.
α. culmo decumbente radicante.
I. (*uliginoſus*) culmo folioſo repente, ad florum glomerulos prolifero, foliis ſetaceis ſubarticulato-nodoſis. *Roth. germ. I.* 155 *II.* 405. *Fl. dan. t.* 817.
I. (*ſubverticillatus*) culmo ſubdichotomo, foliis ſubulato-ſubſetaceis, floribus faſciculato-ſubverticillatis. *Wulffen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 51. *
I. caule brachiato, foliis ſetaceis, floribus faſciculatis ad ramos ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 1320.
Iuncoides cauliculis paleaceis glomeratis, folio varians. *Scheuch. agroſt.* 330. *t.* 7. *f.* 10.
Gramen junceum minimum paniculis foliaceis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 4.
Gramen junceum aquaticum, capitulis cum foliis capillaceis ſimul ortis proliferum. *Pluk. almag.* 179. *t.* 32. *f.* 3.
β. culmo erecto humiliore.
I. (*ſupinus*) culmo dichotomo, foliis canaliculatis filiformibus, capitulo triphyllo. *Moench haſſ. n.* 296. *t.* 5.* *Roth. germ. I.* 156. *II.* 409. *Hoffm. germ.* 125. *Fl. dan. t.* 1099. *excluſis ſynonymis.*
Wirtelblütige Simſe. W.
Habitat in Europa *boreali* α. *locis uliginoſis*, β *in ſiccioribus.* ♃ (v. v.)
Iuncus ſupinus Moenchii haud diverſus videtur; differt tantum culmo erecto et foliis minoribus. W.

21. IUNCUS *Tenageja.*

I. culmo ramoſo paniculato, floribus ſolitariis ſeſſilibus, petalis ovato-oblongis, capſula ſubgloboſa. *Lin. ſuppl.* 208. *Fl. dan. t.* 1160. *Roth. germ. I.* 156. *II.* 409. *Hoffm. germ.* 125.

I. foliaceus humilior paleaceis calyculis. *Dill. giſſ.* 111.

I. annuus, floribus per ramulos ſparſis. *Vaill. pariſ. t.* 20. *f.* 1.

Jährige Simſe. W.

Habitat in Germaniae, Galliae *paludibus exſiccatis.* ☉ (v. ſ.)

22. IUNCUS *bulboſus.*

I. culmo compreſſo indiviſo, foliis linearibus canaliculatis, corymbo terminali, calycinis foliolis obtuſis capſula ſubrotunda obtuſa brevioribus. W.

I. foliis linearibus canaliculatis, capſulis obtuſis. *Fl. ſuec.* 284, 304. *Meeſ. friſ.* 160. *Oed. dan.* 431. *Pollich. pal. n.* 348. *Leers. herb. n.* 266. *t.* 13. *f.* 7. *Hoffm. germ.* 12. *Roth. germ. I.* 155. *II.* 406.

I. *compreſſus* foliis linearibus canaliculato-concavis, capſulis ovatis, culmo compreſſo. *Iacq. vind.* 235.

I. foliis carinatis, panicula ſparſa, fructu globoſo. *Hall. helv. n.* 1318.

I. culmo indiviſo, floribus corymboſis, foliis linearibus canaliculatis. *Weig. obſ. bot. p.* 29.

I. foliis linearibus canaliculato-concavis, capſulis triangularibus. *Guett. ſtamp.* 134.

I. foliis angulatis, culmo ſubnudo, panicula terminali prolifera, capſulis ovatis. *Roy. lugdb.* 43.

I. parvus cum pericarpiis rotundis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 522.

I. repens apocarpos minor. *Barr. ic.* 114.

I. ſorghi capitulis et Milii capitulis. *Barrel. ic.* 747. *n.* 11. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 67. *t.* 17. *f.* 2. *ſec. Hall.* R.

Gramen junceum, junci ſparſa panicula. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 227. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 11.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 611.

Knollige Simſe. W.

Habitat in Europae *paſcuis ſterilibus et ad vias.* ♃ (v. v.)

Radix *repens, denſa.* Culmi *filiformes, ſubcompreſſi.* Folia *linearia, laevia, ſubtus convexa et ſtriata, ſupra canaliculata.* *Folium florale longitudine corymbi.*

Corymbus *communis et partiales inaequales.* Capſulae *ovatae, fuſcae, nitidae.*

*23. IUNCUS *tenuis.* W.

I. culmo teretiuſculo indiviſo, foliis linearibus canaliculatis, corymbo terminali, calycinis foliolis acuminatis capſula triquetra obtuſa longioribus. W.

Schlanke Simſe. W.

Habitat in America boreali. ♃ (v. ſ.)

Culmus *dodrantalis teretiuſculus ſubcompreſſus baſi folioſus.* Folia *ut in praecedente.* Flores *ut in praecedente ſed duplo majores et rami laterales corymbi magis elongati.* Foliola *calycina lanceolata acuminata capſula paulo longiora.* Capſula *triquetra truncato-obtuſa.* W.

24. IUNCUS *bufonius.*

I. culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 43. *Fl. ſuec.* 283, 305. *Gort. ingr.* 52. *Pollich. pal. n.* 349. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 67. *n.* 30. *Leers. herb.* 267. *t.* 13. *f.* 8. *Scopol. carn. n.* 433. *Hoffm.* 125. *Roth. germ. I.* 156. *II.* 408.

I. caule brachiato, foliis ſetaceis, floribus ſolitariis ad ramum ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 1319.

I. paluſtris humilior, panicula laxiſſima. *Rupp. jen.* 130. *Flor. lapp.* 122.

I. culmo dichotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus, petalis mucronatis margine ſcarioſis pericarpio longioribus. *Weig. obſ. bot. p.* 29.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, erectum. *Scheuch. gram.* 327.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100.

Gramen junceum bufonium. *Tabern.* 225.

Gramen erectum latifolium. *Barrel. ic.* 263.

Holoſteum. *Lob. ic.* 18.

β. Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuch. gram.* 329. *Bauh. pin.* 99.

γ. Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, ſpecies altera procerior. *Scheuch. gram.* 328.

δ. Gramen bufonium erectum anguſtifolium majus. *Barr. ic.* 264. minus. *Ej. ic.* 263.

ε. Gramen holoſteum alpinum minimum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 64. *theatr.* 101. *hiſt.* 2. *p.* 510.

Gramen juncoides minimum anglo-britannicum. *Raj. angl.* 3. *p.* 434.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 613.
Kröten Simſe. W.
Habitat in Europae *inundatis.* ⊙ (v. v.)
Pinheaded cobweb mushroon. Pet. gaz. 51. f. 7. *hujus infans, paucis lecta.*

*25. IUNCUS *cephalotes.* †
I. culmo aphyllo tereti, foliis canaliculatis, capitulis ſubumbellatis. *Thunb. prod.* 66.
Knopfblütige Simſe. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

26. IUNCUS *ſtygius.*
I. foliis ſetaceis depreſſiuſculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis ſolitariis ſubbifloris. *Sp. pl.* 467. *Smith. ic. ined.* 3. *p.* 55. *t.* 55.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 614.
Schwediſche Simſe. W.
Habitat in Sueciae *paludibus, caeſpitoſis ſylvaticis profundis.* ♃ (v. ſ.)

Culmi *ſpithamei, ſimplices.* Folia *lineari-ſubulata, altitudine culmi, erecta, depreſſa, laevia, tria: α. ad radicem. β. in medio culmi. γ. culmum inſtar ſpathae terminans.* Pedunculi *duo, terminales:* Gluma *biflora floſculis duobus, ſeſſilibus, gluma longioribus.* Petala *exteriora anguſtiora, acutiora, concava, extus purpuraſcentia; interiora pallida.* Stamina *filiformia.* Antherae *flavae.* Germen *majuſculum.* Stylus *albus.* Stigmata *tria, reflexa.*

27. IUNCUS *Iacquini.*
I. (*biglumis*) folio ſubulato, capitulo ſubquadrifloro terminali. *Mant.* 63. *Iacq. vind.* 237. *t.* 4. *f.* 2. *auſtr.* 3. *t.* 221.
I. (*nigricans*) culmo ſimplici unifolio, floribus glomerato-faſciculatis atro-fuſcis terminalibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 260.*
I. caule unifolio, petiolis bifloris, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1316.
I. alpinus capitulo glomerato et nigro ſplendente. *Scheuch. it.* 1. *p.* 40. *t. f.* 2.
Iuncoides alpinum, floſculis junci glomeratis atrofuſcis. *Scheuchz. gram.* 323. *t.* 7. *f.* 9. *bene. Hall.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 615.

Jacquinſche Simſe. W.
Habitat in Schneeberg *Auſtriae*, Alpibus *Helvetiae*. ♃ (v. ſ.)
Caulis *folio unico*, *ſaepius elongato*. Flores *in capitulum*, *fuſco-purpurei*, *4-7*, *glumis communibus propriisque fuſcis excepti*, *ſextuplo majores quam in* I. biglumi, *a quo diverſiſſimus*.

28. IUNCUS *biglumis*.
I. folio ſubulato, gluma biflora terminali. *Amoen. acad.* 2. *p.* 266. *t.* 3. *f.* 3. * *Fl. ſuec.* 2. *n.* 307. *Oed. dan. t.* 120.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 616.
Zweyblütige Simſe. W.
Habitat in Alpibus Lapponicis. *D. Montin.* ♃ (v. ſ.)
Planta faciem gerit Schoeni ferruginei.

29. IUNCUS *triglumis*.
I. foliis planis, gluma triflora terminali. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 67. *n.* 29. *Oed. dan. t.* 132. *Fl. ſuec.* 286, 306.
I. caule bifolio, foliis teretibus, floribus terminalibus ternis. *Hall. helv. n.* 1314.
I. gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp.* 115. *t.* 10. *f.* 5.
I. exiguus montanus mucrone carens. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *theatr.* 183. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 103. *f.* 8.
Scirpus minimus capitulo ſquamoſo breviore et craſſiore fuſco. *Scheuchz. gram.* 366. *ex ſuſpicione Hall.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 616.
Dreyblütige Simſe. W.
Habitat frequens in Alpibus Lapponicis, Tauro Raſtadienſi. ♃ (v. ſ.)

30. IUNCUS *piloſus*.
I. foliis planis piloſis, corymbo ſubſimplici, pedunculis unifloris nutantibus, calycinis foliolis capſula brevioribus ovatis acutis. W.
I. foliis planis piloſis, corymbo ramoſo. *Fl. ſuec.* 287, 308. *Pollich. pal. n.* 351. *Leers. herb. n.* 268. *t.* 13. *f.* 10. *Roth. germ. I.* 156. *II.* 410.
I. (*vernalis*) foliis planis piloſis, pedunculis ſimplicibus, inferioribus reflexis. *Hoffm. germ.* 126.
I. (*vernalis*) foliis planis piloſis apice calloſis, panicula ſubduplicata, floribus ſolitariis longe pedicellatis, perigonii foliolis ſubaequalibus ariſtulatis, capſula triſperma vix longitudine perigonii. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 137.

I. (*luzulinus*) foliis piloſis ſtrictis floribus rotundis ſolitariis. *Villars. delph.* 2. *p.* 235.

I. foliis gramineis hirſutis, floribus umbellatis, ſolitariis, petiolatis, ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1325.

I. foliis planis, panicula diffuſa, pedunculis proliferis: floſculis intermediis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 43.

Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *

Gramen rore lucidum nemorenſe ſ. Luzulae. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 492.

Gramen hirſutum nemoroſum. *Lob. ic.* 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 617.

Haarige Simſe. W.

Habitat in ſylvis Europae *verno tempore.* ♃ (v. v.)

*31. IUNCUS *maximus.*

I. foliis planis piloſis, corymbo decompoſito, pedunculis elongatis divaricatis ſubtrifloris, calycinis foliolis ariſtatis longitudine capſulae. W.

I. (*maximus* foliis planis piloſis, paniculae ramoſae floribus ſubternis ſubſeſſilibus. *Retz. prod. Fl. Scand. ed* 2. *n.* 434. *Fl. dan.* 441.

I. (*maximus*) foliis planis piloſis, panicula terminali ramoſiſſima, floribus faſciculatis. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 411. *Hoffm. germ.* 126.

I. (*maximus*) foliis planis piloſis, panicula triplicata diffuſa, floribus binis ſ. ternis ſubſeſſilibus, perigonii valvulis ſubaequalibus ariſtatis, capſula triſperma perigonio paulo longiore. *Ehrh. Beit.* 6. *p.* 139.

I. (*latifolius*) foliis planis lanceolatis piloſis, culmeis ſenſim m[illegible] paniculis ſupradecompoſitis cymoſo-corymbo[illegible] longioribus, pedunculis umbellato-ſubtrifloris, [illegible] calycum aequalibus. *Wulffen. in Iacq. Collect.* 3. *p.* 59. *

Iuncus ſylvaticus. *Curt. lond.*

Iuncus piloſus. *Villars. delph.* 2. *p.* 234.

I. foliis planis hirſutis, floribus paniculatis faſciculatis. *Hall. helv. n.* 1324.

Iuncus piloſus δ. *Sp. pl.* 468.

Gramen nemoroſum hirſutum latifolium majus. *Scheuch. gram.* 317.

Gramen hirſutum latifolium maximum juncea panicula. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *f.* 8. *t.* 9. *f.* 2.

Gramen Luzulae maximum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 293.

Gröſte Simſe. W.
Habitat in montoſis ſylvaticis Germaniae, Bohemiae, Carinthiae, Helvetiae, Galliae, Angliae, Daniae. ♃ (v. ſ.)

*32. IUNCUS *ſpadiceus.*
I. foliis planis glabris, vaginis piloſis, corymbo decompoſito divaricato, pedunculis ſubquadrifloris, calycinis foliolis mucronatis capſula acuta brevioribus. W.
I. (*ſpadiceus*) foliis planis ex vagina piloſis, floribus minimis corymboſis ſolitariis ſubariſtatis. *Villars. delph.* 2. *p.* 236. *t.* 6. *Allion. pedem. n.* 2083.
Iuncus piloſus β. *Sp. pl.* 468.
I. foliis gramineis panicula laxa, petalis mollibus breviter ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1326.
Gramen hirſutum nemoroſum anguſtifolium alpinum paniculis obſcure rufeſcentibus. *Scheuch. gram.* 312. *t.* 6. *optima. Scheuch. it.* 6. *p.* 458.
Gramen hirſutum anguſtifolium perenne, lini utriculis. *Barr. ic.* 748?
Braunblütige Simſe. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Delphinatus. ♃ (v. ſ.)
Pedunculi *tri ſ. quadriflori, ſed* flores *breviſſime pedicellati, nec ſeſſiles in pedunculo communi ut in praecedente.* W.

*33. IUNCUS *luteus.*
I. foliis planis, vaginisque glabris, corymbo compoſito conferto, pedunculis multifloris, calycinis foliolis acutiuſculis ſplendentibus. W.
Iuncus luteus. *Allion. ped. n.* 2085. *Villars. delph.* 2. *p.* 235. *t.* 6. *
Iuncus campeſtris ε. *Sp. pl.* 469.
I. foliis planis glabris, ſpicis oblongis pluribus. *Ger. prov.* 140. *n.* 11.
I. foliis planis laevibus, panicula nuda umbellata flava. *Hall. enum* 257.
I. planifolius glaber, panicula nitente, floribus obtuſis. *Hall. helv. n.* 1329.
Iuncoides latifolium alpinum glabrum panicula lutea ſplendente. *Scheuch. gram.* 314.
Gelbe Simſe. W.
Habitat in ſummis alpibus Helvetiae, Sabaudiae, Galliae. ♃ (v. ſ.)

Diſtinctiſſimus jam floribus egregie flavis. Capſulas *non vidi.* W.

*34. IUNCUS *parviflorus.*

I. foliis planis vaginisqne glabris, corymbo decompoſito erecto, pedunculis unifloris, calycinis foliolis acutis muticis. W.

I. (*parviflorus*) foliis planis nudis, paniculae ramoſae floribus ſolitariis pedicellatis. *Retz. prod. Fl. Scand. ed.* 2. *n.* 434. *excluſo ſynonymo Scheuchzeri.*

I. (*parviflorus*) foliis planis nudis, panicula triplicata diffuſa, floribus ſolitariis pedicellatis, perigonii valvulis ſubaequalibus ariſtulatis, capſula triſperma perigonio paulo longiore. *Ehrh. Beit.* 6. *p.* 139. *excluſis ſynonymis.*

Iuncus pilloſus γ. *Sp. pl.* 468.

I. foliis planis, culmo paniculato, floribus ſparſis. *Fl. lapp.* 124.

Iuncus piloſus β. *Fl. ſuec. ed.* 2. *n.* 308.

Kleinblütige Simſe. W.

Habitat in alpibus Lapponiae. ♃ (v. ſ.)

Planta *diſtinctiſſima a I. ſpadiceo:* foliis *latioribus,* vaginis *glabris,* corymbo *non divaricato,* floribus *minoribus pedunculatis,* calycibus *acutis nec mucronatis, totoque habitu. Clariſſmi Viri Linnaeus, Retzius et Ehrhart hunc cum I. ſpadiceo confuderunt.* W.

35. IUNCUS *ſerratus.*

I. foliis enſiformibus planis ſerratis ſubtus canis, paniculae vaginis ſubulatis perfoliatis. *Lin. ſuppl.* 208.

I. foliis enſiformibus ſerratis, paniculae vaginis perfoliatis. *Thunb. prod.* 66.

Geſägte Simſe. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Culmi *folioſi teretes craſſitie digiti minoris, longitudine quadri-ſ. ſexpedales.* Folia *alterna graminea duriora laevia ſubnervoſa ſerrata longitudine vix culmi.* Panicula *conglomerata minus patula, floribus ſparſis conglomeratis. Affinitas I. piloſi, ſed I. acuto longe major.*

*36. IUNCUS *albidus.*

I. foliis planis piloſis, corymbo decompoſito, pedunculis ſubquadrifloris, calycinis foliolis mucronatis, interioribus paulo longioribus, radice fibroſa. W.

I. (*albidus*) foliis piloſis acuminatis planis, corymbis fo-

lio brevioribus, pedunculis ſubtrifloris. *Hoffm. germ.* 126.

I. (*anguſtifolius*) foliis planis piloſis, paniculis ſupradecompoſitis cymoſis folio brevioribus, floribus umbellato-ſubtrifloris, foliolis calycum ſubaequalibus. *Wulffen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 56. *

I. (*nemoroſus*) foliis planis piloſis, floribus faſciculatis. *Pollich. pal. n.* 352.

I. (*leucophobus*) foliis planis piloſis, panicula triplicata diffuſa, floribus binis, ternis, ſ. quaternis ſubſeſſilibus, perigonii valvulis ſubaequalibus lanceolatis acutis non ariſtatis, capſula triſperma perigonio paulo breviore. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 141.

Iuncus niveus. *Leers. herb. n.* 269. *t.* 13. *f.* 6. *Moench. haſſ. n.* 299. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 413.

Iuncus piloſus ε. *Sp. pl.* 468.

I. foliis gramineis, floribus umbellatis, petalis aequalibus. *Hall. helv. n.* 1327.

Gramen hirſutum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *prod.* 16. *theatr.* 105. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 225. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 3. *Scheuch. gram.* 318.

Gramen luzulae medium. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 493.

Weiſsliche Simſe. W.

Habitat in montoſis nemoroſis Germaniae, Helvetiae. ♃. (v. v.)

37. IUNCUS *niveus.*

I. foliis planis piloſis, corymbo compoſito, pedunculis ſubquinquefloris, calycinis foliolis acutis, interioribus duplo longioribus, radice repente. W.

I. foliis planis ſubpiloſis, corymbis folio brevioribus, floribus faſciculatis. *Sp. pl.* 468.

I. foliis gramineis, paniculis umbellatis, petalis interioribus duplo longioribus. *Hall. helv. n.* 1328.

Iuncoides montanum nemoroſum, flore niveo. *Scheuch. gram.* 320. *t.* 7. *f.* 7.

Gramini Luzulae affine, flore albo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 492. *Hall.* R.

Gramen hirſutum anguſtifolium minus, paniculis albis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 106. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 39.

Schneeweiſse Simſe. W.

Habitat in Alpibus Bohemicis, Helveticis, Rhaeticis, Monſpelii. ♃ (v. ſ.)

38. **IUNCUS** *campeſtris.*

I. foliis planis pilolis, ſpicis pedunculatis umbellatis, intermedia ſeſſili, calycinis foliolis mucronatis capſula longioribus. W.

I. foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. *Fl. ſuec.* 288, 309. *Pollich. pal. n.* 353. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 64. *Scop. carn. n.* 434. *Leers herb.* 270. *t.* 13. *f.* 5. *Hoffm. germ.* 126. *Kniph. cent.* 12. *n.* 66. *Roth. germ.* *I.* 157. *II.* 414.

I. foliis gramineis hirſutis, ſpicis petiolatis nutantibus, petalis ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1330.

I. foliis planis, panicula rara, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42. *Gron. virg.* 38.

I. villoſus, capitulis pſyllii. *Tournef. inſt.* 246. *Fl. lapp.* 126.

Iuncoides villoſum, capitulis pſyllii. *Scheuch. gram.* 310.

Gramen hirſutum, capitulis pſyllii. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 103.

Gramen exile hirſutum cyperoides. *Lob. ic.* 15. R.

β. Iuncus foliis planis, culmo paniculato, ſpicis ovatis. *Fl. lapp.* 127. *t.* 10. *f.* 2.

γ. Iuncoides hirſutum, capitulo glomerato. *Scheuch. gram.* 312.

Gramen hirſutum, capitulo globoſo. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 104.

δ. Iuncoides montanum nemoroſum villoſum latifolium elatius, capitulis florum candidis et ſplendentibus. *Mich. gen.* 42.

ε. Gramen hirſutum elatius, panicula juncea compacta. *Raj. angl.* 3. *p.* 416.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 620.

Feld Simſe. W.

Habitat in Europae *paſcuis ſiccioribus.* ♃ (v. v.)

*39. **IUNCUS** *ſudeticus.* W.

I. foliis planis glabris vaginis piloſis, ſpicis pedunculatis umbellatis, intermedia ſeſſili, calycinis foliolis mucronatis longitudine capſulae. W.

Iuncus ſpicatus. *Krocker. ſileſ. n.* 559. *t.* 52. *

Iuncus campeſtris η. *Sp. pl.* 469.

Iuncoides bohemicum, panicula minore nigricante, ſcapo ſupra eandem erecto et longius producto. *Mich. gen.* 42.

Schwarze Simſe. W.
Habitat in ſudetis Sileſiae *ſummis humidis.* ♃ (v. ſ.)
Affinis praecedenti, a quo tamen diverſus. W.

40. IUNCUS *ſpicatus.*
I. foliis planis, ſpica racemoſa nutante. *Fl. lapp.* 125. *t.* 10. *f.* 4. *Fl. ſuec.* 289, 310. *Oed. dan t.* 270.
I. alpinus latifolius, panicula racemoſa nigricante pendula. *Till. piſ.* 91. *Mich. nov. gen. p.* 42. *n.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 622.
Aehrentragende Simſe. W.
Habitat in Lapponiae *alpibus.* ♃ (v. ſ.)
Iuncus pediformis Villars delph. 2. *p.* 238. *t.* 6. *mihi ignotus; videtur vix ab hoc differre.* W.

671. RICHARDIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 591.

Cal. 6-partitus. *Cor.* 1-petala, ſubcylindrica. *Sem.* 3.

1. RICHARDIA *ſcabra.*
R. ſcabra. *Sp. pl.* 470.
Richardia. *Houſt. mſs.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 358.
Scharfe Richardie. W.
Habitat in Vera Cruce. ♃
Planta ex ſtellatis XLIV. Caulis *altus, brachiatus ſubarticulatus, obſolete tetragonus, hiſpidus: Pilis rigidiuſculis, ſparſis, reflexis.* Folia *lanceolato-ovata, alternatim nervoſa, integerrima, ſubpetiolata, ſcabra.* Flores *in capitula terminalia, paſſim etiam in verticillos congeſti; capitula terminalia, radiata Foliis 4 vel pluribus, ſcilicet alternis minoribus.* Corollulae *ut in Aſperulis,* tenues, longae, *ſed ſexfidae et fructus ex 3 ſeminibus; ſic differt a Spermacoce numero et caeteris.*

672. DUROIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 592.

Cal. ſuperus cylindricus truncatus. *Cor.* tubus cylindricus; *Limbo* 6-partito tubi longitudine. *Pomum* hiſpidum.

1. DUROIA *Eriopila.*
D. Eriopila. *Lin. ſuppl.* 209.

Anonyma *Merian. ſurin. t.* 43?
Marmolade dooſees boom *Surinam.*
Rauchfrüchtige Duroie. W.
Habitat in Surinamo. *Dalberg.* ♄

Arbor *ramis craſſis inaequalibus, apice hirſutis.* Folia *terminalia oppoſita approximata plura ſubpetiolata ſpithamaea obovata integerrima obtuſiuſcula coſtata, ſupra pubeſcentia, ſubtus reticulata.* Petioli *breviſſimi hirſuti.* Flores *terminales ramorum ſeſſiles congeſti plures multi abortientes.* Corollae *ſimiles Iaſmini Sambac albae.* Fructus *magnitudine ovi Gallopavonis paulo major ſphaericus denſiſſime piloſus, pilis erectis brunneis, calyce excavato umbilicatus.* Fructus *bene ſapidus et pro menſis Surinamenſium gratus.*

673. ACHRAS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 593.

Cal. 6-phyllus. *Cor.* ovata, 6-fida: ſquamis totidem alternis interioribus. *Pomum* 10-loculare. *Sem.* ſolitaria hilo marginali, apiceque unguiculato.

1. ACHRAS *diſſecta.*

A. floribus confertis, corollis octodecimfidis, foliis obovatis emarginato-retuſis. *Forſt. pl. eſcul. n.* 13.* *Forſt. prod. n.* 155.
A. floribus ſolitariis, foliis cuneiformibus emarginato-retuſis. *Lin. ſuppl.* 210.
A. (*Balata*) foliis ovato-oblongis ſubtus cinereis, fructu viridi olivaeformi. *Aubl. guj.* 1. *p.* 308.
Manil-Kara. *Rheed. mal.* 4. *p.* 53. *t.* 25.
Ausgerandeter Breyapfel. W.
Habitat in inſulis Philippinis *et* Amicorum *praecipue in* Tonga-Tabu, *nunc etiam in* Malabaria, Gujana *et in inſula* Mauritii. ♄

Habitus *ſimilis congeneribus.* Ramuli *craſſi teretes et tuberculati cicatricibus pedunculorum petiolorumque apice foliiferi et floriferi.* Folia *ſparſa approximata petiolata glaberrima integerrima, ſubtus rachide coſtata erecta.* Pedunculi *ex omnibus foliorum axillis ſolitarii dependentes uniflori.*

2. ACHRAS *mammoſa.*

A. floribus ſolitariis, foliis cuneiformi-lanceolatis. *Sp. pl.* 469.

Achras (*Zepota major*) floribus pentandris. *Iacq. amer.* 56. *t.* 182. *f.* 19.

A. fructu maximo ovato, ſeminibus paucioribus oblongis turgidis. *Brown. jam.* 5. *p.* 201.

Malus Perſica maxima, foliis magnis integris longis, fructu maximo oblongo ſcabro: oſſiculo partim rugoſo partim glabro. *Sloan. jam.* 2. *p.* 124. *t.* 218.

Arbor americana pomifera, frondoſis ramulis, foliis amplis longioribus obtuſis duris et venoſis margine aequali. *Pluk. alm.* 39. *t.* 268. *f.* 2.

Fructus oblongus utrinque acuminatus ſ. conicus laevis ſplendens ſpadiceus. *Raj. hiſt.* 1800.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 423.

Brüſtenförmiger Breyapfel. W.

Habitat in America *meridionali*, Cuba, Iamaica, Carthagenae. ♄

3. ACHRAS *Sapota.*

A. floribus ſolitariis, foliis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 470. *Swartz. obſ.* 128. *

A. (*Zapota*) floribus hexandris. *Iacq. amer.* 57. *t.* 41.

Achras. *Loefl. ic.* 186.

Sapota fructu ovato majore. *Plum. gen.* 43.

Achras fructu elliptico ſcabro majore. *Brown. jam.* 200. *t.* 19. *f.* 3.

β. Achras (*Zapotilla*) brachiatus diffuſus, fructu ſubrotundo, cicatricula mucrone breviori. *Brown. jam.* 2. *p.* 200. *Iacq. l. c.*

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuſcis, fructu minore. *Sloan. jam.* 206. *hiſt.* 2. *p.* 171. *t.* 230. *Raj. dendr.* 78. *Cateſb. car.* 2. *p.* 87. *t.* 87.

Sapota fructu turbinato minori. *Plum. gen.* 43.

Anona maxima, foliis laurinis glabris viridi-fuſcis, fructu minimo. *Sloan. jam.* 206. *hiſt.* 2. *p.* 172. *t.* 169. *f.* 2. *Raj. dendr.* 79.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 425.

Gemeiner Breyapfel. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Fructus *putreſcere incipiens praefertur Bromeliae Ananas. Iacq.*

674. PRINOS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 594.

Cal. 6-fidus. *Cor.* 1-petala, rotata. *Bacca* 6-ſperma.

1. PRINOS *verticillatus.*

P. foliis obovato-lanceolatis acuminatis duplicato-ſerratis, venis ſubtus piloſiuſculis. W.

P. foliis longitudinaliter ſerratis. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 157. *Wangenh. amer.* 97. * *Willd. arb.* 236.*

Prinos. *Gron. virg.* 39.*

Alcanna major latifolia dentata. *Munt. phyt.* 213. *t.* 51.

Aquifolium foliis deciduis. *Duham. arb.* 1. *p.* 62. *t.* 23.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 430.

Virginiſche Winterbeere. W.

Habitat in Virginiae *paludibus.* ♄ (v. v.)

An *dioica, ut Gron. virg.* 2. *p.* 54?

Variat *flore 7-raro* 8*-fido cum ſtaminibus* 7 *vel* 8. *Du Roi.*

*2. PRINOS *montanus.*

P. foliis ovatis ſerratis utrinque nitidis. *Swartz. Fl. ind. occid.* 1. *p.* 622.*

P. foliis ovatis margine ſerratis, floribus hexandris, pedunculis axillaribus. *Swarz. prod.* 58.

Berg Winterbeere. W.

Habitat in fruticetis montium altiſſimorum Jamaicae. ♄

*3. PRINOS *dioicus.*

P. foliis oblongo-ovatis ſubſerratis glabris coriaceis, pedunculis axillaribus ſubunifloris, floribus dioicis tetrandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 25. *t.* 14.*

Getrennte Winterbeere. W.

Habitat in inſula Montſerrat. ♄

*4. PRINOS *nitidus.*

P. foliis oblongo-ovatis ſerratis nitidis membranaceis, pedunculis axillaribus unifloris, floribus tetrandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 26.*

Vierſädige Winterbeere. W.

Habitat in inſula Montſerrat. ♄

Affinis P. dioicae, differt: ramis *floriferis tenuioribus fuſcis nec albidis,* foliis *tenuioribus magis lucidis, baſin verſus plerumque anguſtatis et acutis,* peduncu-

lis *paucioribus*, *omnibus unifloris*, floribus *duplo majoribus hermaphroditis*. Vahl. l. c.

5. PRINOS *glaber*.
P. foliis lanceolatis obtuſiuſculis glabris apice ſerratis. *Ait. Kew*. 1. *p*. 478.
P. foliis apice ſerratis. *Sp. pl*. 471. *Wangenh. amer*. 97.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p*. 431.
Canadiſche Winterbeere. W.
Habitat in Canada, *Kalm*. ♄ (v. ſ.)
Arbor. Foliis *alternis*, *petiolatis*, *oblongis*, *conſiſtentibus glabris*, *verſus apicem ſerraturis utrinque ſaepius binis*, *acutis*, *facie ferme Myricae*. Pedunculi *axillares*, *parvi*, *ſaepius triflori*. Flores *non vidi*.
Pedunculi *uniflori axillares ſolitarii gemini vel terni*. Calyx *et* Corolla *ut in praecedentibus*. W.

*6. PRINOS *lucidus*.
P. foliis ellipticis acuminatis laevibus apice ſubſerratis. *Ait. Kew*. 1. *p*. 478.
Glänzende Winterbeere. W.
Habitat - - - - ♄.

*7. PRINOS *Sideroxyloides*.
P. foliis ſubrotudis integerrimis. *Swartz. prod*. 58. *Fl. ind. occid*. 1. *p*. 624.*
Rundblättrige Winterbeere. W.
Habitat in inſulis Caribaeis: St. Chriſtophori, *et* Montſerrat *in monte ſulphuris*. ♄

*675. COSSIGNEA.

Juſſ. Gen. ed. Uſteri. 275.

Cal. inferus, 5-partitus. *Cor*. 4-ſ. 5-petala. *Capſ*. 3-locul. apice dehiſcens, loculis ſubtriſpermis.

*1. COSSIGNEA *triphylla*.
C. foliis ternatis, foliolis oblongis obtuſis. W.
Coſſinia (*triphylla*) foliis ternatis ſubtus tomentoſis, foliolis oblongis obtuſis. *Lamarck. encyclop*. 2. *p*. 132. *t*. 256.*
Dreyblättrige Coſſignie. W.
Habitat in inſula Borbonia. ♄

*2. COSSIGNEA *pinnata.*

C. foliis pinnatis, foliolis quinis lanceolatis emarginatis. W.

Coſſinia (*pinnata*) foliis pinnatis, foliolis quinis lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Lamarck encyclop.* 2. *p.* 132. *t.* 256. *

Gefiederte Coſſignie. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

Infloreſcentia *binarum ſpecierum eſt* panicula *terminalis e racemis ſimplicibus compoſita.* W.

*676. BARBACENIA.

Vandelli. in Roemer pl. hiſp. 98.

Cal. ſuperus 6-dentatus. *Cor.* 6-petala. *Filam.* petaliformia dentata. *Capſ.* glanduloſa trivalvis polyſperma.

*1. BARBACENIA *braſilienſis.*

Barbacenia. *Vandelli in Roem. pl. hiſp.* 1. *p.* 98. *t.* 6. *f.* 9.

Braſiliſche Barbaceno. W.

Habitat in Braſilia.

Planta *minus nota Juſſiaeis affinis.* W.

677. BERBERIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 595.

Cal. 6-phyllus. *Pet.* 6: ad ungues glandulis 2. *Stylus* 0. *Bacca* 2-ſperma.

1. BERBERIS *vulgaris.*

B. racemis ſimplicibus pendulis, foliis obovatis ciliato-dentatis. *Willd. arb. p.* 34. *

B. pedunculis racemoſis. *Mat. med.* 97. *Gron. orient.* 120. *Mill. t.* 63. *Blackw. t.* 163. *Pollich. pal. n.* 354. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 75. *Scop. carn. n.* 437. *Hoffm. germ.* 127. *Knorr. del.* 2. *t. B. Roth. germ I.* 144. *II.* 377.

α. *rubra* aculeis triplicibus, baccis rubris.

B. floribus racemoſis, foliis ciliatis. *Hall. helv. n.* 828.

B. ſpinis triplicibus. *Hort. cliff.* 122. *Fl. ſuec.* 290, 311. *Roy. lugdb.* 428.

B. dumetorum. *Bauh. pin.* 454.

B. vulgaris ſ. Creſpinus. *Cam. epit.* 86.

Oxyacantha Galeni. *Tabern. p.* 1035. R.
β. violacea aculeis multiplicibus, baccis violaceis.
γ. aſperma aculeis multiplicibus, baccis aſpermis.
δ. canadenſis aculeis triplicibus, ſerraturis foliorum remotis.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 385.
Gemeine Berberitze. W.
Habitat in Europae *ſylvis, inque* Oriente, Libano, *atque in* America *boreali.* ♄ (v. v.)

Folia *prima obovata, ſerrato-ciliata,* ... *ulata: ſtipulae utrinque dente capillari terminat*... Caulina *alterna: horum infimum ſubpinnatifidum dentibus ſpinoſis: reliqua mutata in ſpinas tripartitas.* Folia ſecundaria *bina, oblonga, ſerrata, inter folia infima et ſpinas intra ſe occultant minora folia. Ergo* Foliis, *anni praeſentis, mutatis in ſpinas; inſequentis anticipantia prodibunt. An ſimile in ulla alia?*

Varietas *absque arillis; altera ſpinis ſimplicibus in Syria. Rauwolf. Fl.* 23. *alia albo flore. Mill.*

2. BERBERIS *ilicifolia.*

B. racemis ſimplicibus corymboſis, foliis obovatis coriaceis ſpinoſo-dentatis. W.
B. foliis obovatis ſpinoſo-ſerratis, pedicellis elongatis cymoſis, ſpinis digitato-ſpinoſis. *Lin. ſuppl.* 210.
B. pedunculis elongatis cymoſis, ſpinis palmatis. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 28. *
Hülſenblättrige Berberitze. W.
Habitat in Tierra del Fuego *in rupium fiſſuris.* ♄ (v. ſ.)

Folia *ut in Ilice rigida obovata breviſſime petiolata, baſi integerrima, verſus medium ſerraturis utrinque duabus ſ. tribus ſpinis terminatis uti apex folii, glaberrima ſubtus glauciora.* Stipulae *palmatae.* Racemi *terminales breviſſimi, at pedicelli valde elongati.* Lignum *incolis in Tierra del Fuego ob magnam elaſticitatem ad arcus in uſu eſt.*

*3. BERBERIS *microphylla.*

B. pedunculis trifloris, foliis obovatis integerrimis ſubmucronatis. W.
B. pedunculis trifloris, ſpinis trifurcis. *Forſt. Comm. goett.* 9. *p.* 29. *
Kleinblättrige Berberitze. W.
Habitat in Tierra del Fuego. ♄

4. BERBERIS *cretica.*

B. pedunculis ſubbifloris, foliis lanceolato-obovatis integerrimis ſubmucronatis. W.
B. pedunculis unifloris. *Mill. dict. n.* 3.
B. cretica, buxifolio. *Tournef. cor.* 42.
B. alpina cretica. *Bauh. pin.* 454.
Lycium creticum. *Alp. exot.* 21. *t.* 20.
Lycium e Candia. *Pon. ital.* 137.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 387.
Cretiſche Berberitze. W.
Habitat in Creta. ♄

Folia *integerrima.* Racemi *ſubumbellati.* Sem. 3.
Illuſt. Thunberg ſub hoc nomine in Flora japonica pag. 146. *plantam forte diverſam deſcripſit.* W.

5. BERBERIS *ſibirica.*

B. pedunculis unifloris folitariis, foliis obovatis ciliato-dentatis. *Willd. arb.* 35. *
B. pedunculis axillaribus nudis unifloris, foliis ovatis ciliato-ſpinoſis, ſpinis ſubquinis. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 41. *t.* 67. *
B. pedunculis unifloris ſolitariis cernuis, ſpinis palmatis. *Murr. comm. goett.* 1784. *t.* 6. *
Berberis ſibirica. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 108. *tab. P. fig.* 2.
Sibiriſche Berberitze. W.
Habitat in alpibus Altaicis Sibiriae. ♄ (v. v.)

Tres ſpecies novas adhuc depinxit Clariſſ. Lamarck. t. 253, *quas ob deſcriptionis defectum non indicavi.* W.

*678. PSATHURA.

Juſſ. gen. ed. Uſteri p. 229.

Cal. ſuperus 6-dentatus. *Cor.* campanulata 6-fida intus barbata. *Stigma* lamellatum. *Drupa* ſicca ſtriata 6-locularis, loculis monoſpermis.

*1. PSATHURA *borbonica.*

Pſathura. *Lamarck. ill. gen. t.* 260.
Burbonſches Bruchholz. W.
Habitat in inſula Borbonia. ♄

Arbuſcula *Erithali affinis, ramis nodoſis fragili-*

bus. Folia *oppoſita petiolata oblonga utrinque attenuata integerrima.* Panicula *terminalis.* W.

*679. NANDINA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 596.

Cal. inferus polyphyllus imbricatus. *Cor.* 6-petala. *Baccâ* exſucca diſperma.

*1. NANDINA *domeſtica.*

N. domeſtica: *Thunb. jap.* 147. * *Thunb. Diſſ. Nov. plant. gen.* 1. *p.* 14. * *Banks ic. Kaempf. t.* 13. 14.
Nandsjokf. *Kaempf. amoen.* 776.
Garten Nandine. W.
Habitat in Japonia. ♄

Frutex *orgyalis.* Folia *ſupradecompoſita, foliolis lanceolatis integerrimis.* Panicula *terminalis.* W.

*680. LINDERA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 597.

Cal. 0. *Cor.* 6-petala infera. *Stigmata* 2. *Capſ.* 2-locularis.

*1. LINDERA *umbellata.*

L. umbellata. *Thunb. jap.* 145. *t.* 21.*
Kuro Nosji. *Kaempf. amoen.* 908.
Doldenblütige Lindere. W.
Habitat in Japonia. ♄

Frutex *ramis alternis.* Folia *in ramorum apice conferta lanceolata integerrima venoſa petiolata.* Flores *in umbella ſimplici pedunculata terminali collecti, parvi.* W.

*681. ENARGEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 598.

Cal. 0. *Cor.* 6-petala petalis alternis baſi biglandulofis. *Stigma* ſimplex. *Bacca* 3-locul. polyſperma ſupera.

*1. ENARGEA *marginata.*

E. marginata. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 283. *t.* 59. *f.* 3.

Callixene. *Juſſ. gen. ed. Uſt p. 47. Lamarck ill. gen. t.* 248.
Gerandete Glanzmyrte. ♄
Habitat in freto Magellanico. ♄

Frutex *parvus, ramis alternis erectis flexuoſis, baſi aphyllis ſtipulatis.* Folia *alterna ſeſſilia elliptica acuta integerrima.* Flos *magnitudine Hyperici perforati terminalis ſolitarius pedunculatus.* W.

*682. PHILESIA.

Juſſieu gen. ed. Uſt. p. 47.

Cal. o. *Cor.* 6-petala, petalis tribus interioribus duplo longioribus. *Stigma* trilobum. *Bacca* ſupera polyſperma.

*1. PHILESIA *buxifolia.*

Phileſia. *Lamarck ill. gen. t.* 248.
Buchsbaumblättriger Lilienſtrauch. W.
Habitat in freto Magellanico. ♄

Frutex *parvus ramis flexuoſis alternis erectis, baſi nudis ſtipulatis.* Folia *alterna petiolata lineari-elliptica utrinque acuta ſemiuncialia integerrima.* Corolla *campanulata magna ſesquiuncialis breviſſime pedunculata axillaris.* W.

683. CAPURA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 599.

Germen ſuperum. *Cal.* o. *Cor.* 6-fida. *Stam.* intra tubum. *Stigma* globoſum. *Bacca.*

1. CAPURA *purpurata.*

C. purpurata. *Mant.* 225.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 422.
Purpurfarbige Capura. W.
Habitat in India. ♄

Arbor *ramis brachiatis, purpuraſcentibus.* Folia *oppoſita, ſubpetiolata, ovata (Lonicerae Xyloſtei,) integerrima, acutiuſcula, annua.* Florum *faſciculi axillares foliorum, foliis breviores, purpurei.*

684. LORANTHUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 600.

Germen inferum. *Cal.* 0. *Cor.* 6-fida, revoluta. *Stam.* ad apices petalorum. *Bacca* 1-ſperma.

1. LORANTHUS *Scurrula.*

L. pedunculis unifloris congeſtis, foliis obovatis. *Sp. pl. ed.* 2. *p.* 472.

Scurrula. *Sp. pl. ed.* 1. *p.* 110.

Viſcum vitice innaſcens. *Camell. luz.* 3. *n.* 36. *Pet. gaz. t.* 63. *f.* 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 388.

Chineſiſche Riemenblume. W.

Habitat in China, ♄

Frutex *paraſiticus.* Folia *oppoſita, petiolata, ovata, integerrima, glabra, altero latere paulo latiora.* Flores *axillares,* 3-6, *propriis pedicellis. Germina inferne attenuata.*

2. LORANTHUS *tetrapetalus.*

L. floribus ad articulos quatuor verticillatis tetrapetalis, foliis oblongis oppoſitis ſubſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 211.

L. pedunculis unifloris ſubſolitariis, foliis ovatis obtuſis ſubſeſſilibus *Forſt. prod. n.* 156.

Vierblättrige Riemenblume. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄ (v. ſ.)

Folia *oppoſita ſubpetiolata oblonga integerrima.* Flos *utrinque ad latus foliorum unus, eoque ad ſingulum articulum quatuor, ſic per totum caulem.*

Folia *elliptica obtuſa coriacea ſemiuncialia.* Flores *foliis longiores.* W.

*3. LORANTHUS *glaucus.* †

L. pedunculis axillaribus unifloris, foliis ovatis glaucis. *Thunb prod.* 58.

Meergrüne Riemenblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*4. LORANTHUS *biflorus.*

L. foliis ovato-ſubrotundis, pedunculis axillaribus bifloris, corolla tubuloſa arcuata. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 574.

Zweyblütige Riemenblume. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

*5. LORANTHUS *parvifolius.*

L. pedunculis axillaribus trifidis, pedicellis unifloris, foliis ovatis integris. *Swartz. prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 628. *

Kleinblättrige Riemenblume. W.

Habitat in altiſſimis montibus Jamaicae *ſupra ramos arborum.* ♄

Diſtinguitur a L. paucifloro: foliis *ſemper parvis,* pedunculis *trifidis nec racemoſis.* Swartz l. c.

6. LORANTHUS *falcatus.*

L. racemis paucifloris axillaribus, foliis linearibus obtuſis lateraliter falcatis glaucis. *Lin. ſuppl.* 211.

Sichelblättrige Riemenblume. W.

Habitat in Madras *arboribus paraſitica.* ♄

Folia *margine deorſum vergente falcata integerrima avenia cana.* Racemi *axillares pauciflori.* Flores *falcati fulvi.*

7. LORANTHUS *uniflorus.*

L. racemis ſimpliciſſimis longitudine foliorum, pedunculis unifloris elongatis, foliis obovato-obtuſis mucronatis. W.

L. racemis ſimpliciſſimis. *Sp. pl.* 1672. *Iacq. amer.* 98. *t.* 69.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 389.

Einfachtraubige Riemenblume. W.

Habitat in Domingo *ſylvaticis.* ♄

8. LORANTHUS *europaeus.*

L. racemis ſimplicibus terminalibus, floribus dioicis. *Sp. pl.* 1672. *Iacq. vind.* 230. *auſt. t.* 30. *Hoffm. germ.* 127. *Hoſt ſynop.* 201.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 390.

Europäiſche Riemenblume. W.

Habitat in Auſtriae *quercubus, paraſiticus.* ♄ In Sibiria. Pall. it. 1. p. 372. (v. ſ.)

Statura *Viſci albi.* Calyx *obſolete ſexdentatus.* Petala *et* ſtamina 6. Germen *inferum.* Flores *dioici.* Bacca 1-*ſperma, flaveſcens.*

*9. LORANTHUS *longibracteatus.*

L. pentandrus, foliis lanceolatis enerviis ſubſeſſilibus, ſpicis terminalibus, bracteis floriferis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 573. *

Langbeblätterte Riemenblume. W.

Habitat in Peru. ♄

Spica *terminalis; bracteis lineari-lanceolatis tecta.* Bracteae *ſupra baſin habeat foveam, cui flos eſt inſertus.* Lam. l. c.

*10. LORANTHUS *Buddlejoides.*

L. foliis ovatis, floribus congeſtis axillaribus quadrifidis, calyce truncato, fructibus turbinatis. *Lamarck. encyclop. 3. p. 574.* *

Buddlejaartige Riemenblume. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Rami *teretes griſei, juniores pubeſcentes.* Folia *elliptica integerrima nervoſa petiolata ſuperne glabra, inferne pubeſcentia.* Flores *axillares pedunculati, pedunculis indiviſis, et ramoſis faſciculatis.* Bractea *ovalis ad baſin germinis.* Calyx *truncatus.* Corolla *quadrifida laciniis erectis, tubo arcuato.* Stamina 4. Stigma *capitatum.* Inflorefcentia *ſimillima Buddlejae diverſifoliae, ut primo intuitu nova hujus generis videatur ſpecies, ſed diſtinguitur facillimo negotio a Buddleja* germine *infero,* corollae *tubo incurvo, et laciniis profunde diviſis inaequalibus.* Lamarck l. c.

*11. LORANTHUS *nodoſus.*

L. foliis ovato-rotundatis, pedunculis axillaribus faſciculatis, corollae tubo longiſſimo, articulis nodoſis. *Lamarck encycl. 3. p. 575.* *

Knotige Riemenblume. W.

Habitat in Peru. ♄

Rami *teretes griſei nodoſi dichotomi.* Folia *magna utrinque viridia petiolata ſeptemnervia, nervis oblique ad marginem excurrentibus.* Pedunculi *in dichotomia caulis uni-ſ. biflori faſciculati.* Lamarck l. c.

*12. LORANTHUS *clavatus.*

L. foliis ovatis obtuſis, floribus congeſtis lateralibus ſubſeſſilibus longe tubuloſis. *Lamarck encycl. 3. p. 572.* *

Keulförmige Riemenblume. W.

Habitat in inſula Madagaſcar. ♄

Rami *teretes dichotomi cinerei.* Folia *avenia inferne ferruginea interdum violacea petiolata.* Flores *axillares:, vel in ramis nudis circumarticulos.* Pedunculi *uniflori breviſſimi aggregati.* Calyx *quinquedentatus.* Corolla *ſesquiuncialis, tubo arcuato, limbo trifido, laciniis binis latioribus interdum bifidis.* Stamina *quinque.* Stigma *capitatum.* Fructus *parvus ovatus.* Lamarck l. c.

*13. LORANTHUS *longiflorus.*
L. corymbis axillaribus, floribus pentandris nutantibus, foliis ovato-lanceolatis obtuſis venoſis. W.
L. pentander, corollae tubo praelongo ſuperne incraſſato, laciniis brevibus apice reflexis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 572. *
Valli-itti-canni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 5. *t.* 4.
Langblütige Riemenblume. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Diſtinctus a plerisque foliis venoſis. W.

*14. LORANTHUS *elaſticus.*
L. corymbis axillaribus, floribus pentandris nutantibus, foliis oblongis utrinque attenuatis nervoſis. W.
L. pentander, foliis ſeſſilibus ovato-acutis nervoſis, corollis junioribus medio feneſtratis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 573. *
Velutta-itti-canni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 7. *t.* 3.
Elaſtiſche Riemenblume. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

15. LORANTHUS *americanus.*
L. racemis ſubramoſis cymoſis, floribus nutantibus, foliis ovatis difformibus. *Swartz. obſ.* 132. *
L. racemis ſubramoſis aequalibus, foliis ovatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. *
L. cymis ramoſis. *Iacq. amer.* 97. *t.* 67.
L. racemis, flore coccineo, baccis nigris. *Plum. gen.* 17. *ic.* 166. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 390.
Doldentraubige Riemenblume. W.
Habitat in Americae *arboribus maritimis.* ♄
Folia *oppoſita, avenia, coriacea.*

*16. LORANTHUS *emarginatus.*
L. ſpicis axillaribus, foliis cuneato-ovatis emarginatis. *Swartz prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 625. *
Ausgerandete Riemenblume. W.
Habitat in arboribus montium Hiſpaniolae. ♄

17. LORANTHUS *occidentalis.*
L. racemis ſimplicibus, floribus irregularibus. *Loefl. it.* 187. * *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. *n.* 38. * *Swartz obſ.* 133. *
Scurrula paraſitica, foliis majoribus ſubrotundis, ſpicis florum ſimplicibus alaribus. *Brown. jam.* 197.
Viſcum latioribus et ſubrotundis foliis, flore purpureo. *Sloan. jam.* 168. *hiſt.* 2. *p.* 92. *t.* 200. *f.* 2. *Raj. dendr.* 52?

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. p. 392.
Weſtindiſche Riemenblume. W.
Habitat in Americae *arboribus.* ♄

18. LORANTHUS *Loniceroides.*
L. floribus aggregato-capitatis. *Sp. pl.* 473.
Lonicera pedunculis multifloris, involucris pentaphyllis foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 83. * *Sp pl.* 1. *p.* 1.
Periclymenum ſurrectum, perſicae foliis, maderaſpatanum. *Pluk. alm.* 287. *t.* 212. *f.* 5.
Itti Canni. *Rheed. mal.* 7. *p.* 55. *t.* 29.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 392.
Loniceraartige Riemenblume. W.
Habitat in Aſiae *arboribus.* ♄
Flores *huic ſaepius pentandri.*

*19. LORANTHUS *pedunculatus.*
L. racemis ſimplicibus ſolitariis, floribus ternis pedunculatis. *Iacq. amer.* 98. *
Geſtielte Riemenblume. W.
Habitat in Carthagenae *arboribus maritimis inundatis.* ♄
Rami *nitidi longi reclinati ſaepius radicantes.* Folia *cordato-ovata integerrima acumine brevi inſtructa bipollicaria venoſa.* Racemi *axillares foliis breviores ſolitarii ſimplices flores circiter* 21 *ſuſtinent, pedunculo principali compreſſo plano latoque, partialibus trifloris, propriis unifloris.* Flores *inodori parvi, calyce ovato concavo integro.* Filamenta *duplo petalis breviora, quorum* 3 *alterna augentur ſuperne duobus appendiculis ſubrotundis.* Iacq. l. c.

*20. LORANTHUS *ſeſſilis.*
L. racemis ſimplicibus ſolitariis, floribus ternis ſeſſilibus. *Iacq. amer.* 99. *
Sitzende Riemenblume. W.
Habitat in ſylvis Carthagenae. ♄.
Habitus *omnino praecedentis, at rami diffuſi fragiles.* Folia *ovata ſesquipollicaria.* Flores *absque pedunculis propriis inſident pedunculi partialis incraſſato apici.* Iacq. l. c.

*21. LORANTHUS *marginatus.*
L. foliis ovatis ſubacuminatis margine ſcarioſis, racemis ſolitariis axillaribus, pedicellis trifloris. *Lamarck encyclop.* 3. *p.* 571.
Gerandete Riemenblume. W.

Habitat in Braſilia. ♄.

Folia *ovata integerrima breviſſime acuminata petiolata margine fuſca ſcarioſa diaphana.* Lamarck. l. c.

22. LORANTHUS *Stelis.*

L. racemis trichotomis, pedunculis trigonis, floribus aequalibus. *Loeſl. it.* 87.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 393.

Cumaniſche Riemenblume. W.

Habitat in Cumanae *arboribus.* ♄

*23. LORANTHUS *pauciflorus.*

L. racemis tripartitis foliis brevioribus, foliis obovatis. *Swartz. prod.* 58. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 627. *

Loranthus occidentalis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 310.

Sparſamblütige Riemenblume. W.

Habitat in arboribus Jamaicae *interioris.* ♄

*24. LORANTHUS *braſilienſis.*

L. hexapetalus, foliis lanceolato-ovatis, corollis ante floreſcentiam longe tubuloſis rectis clavatis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 570. *

Braſiliſche Riemenblume. W.

Habitat in Braſilia. ♄

Folia *iis Avicenniae tomentoſae ſimillima, ſed ut omnes partes totius plantae glaberrima.* Pedunculus *terminalis biternatus, et ſimplices in axillis foliorum ſuperiorum.* Lamarck l. c.

25. LORANTHUS *pentandrus.*

L. racemis ſimplicibus, floribus quinquefidis, foliis alternis petiolatis. *Mant.* 63.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 393.

Fünffädige Riemenblume. W.

Habitat in India. ♄

Frutex *Ramis ad folia dilatatis.* Folia *alterna, petiolata, ſubenervia, figura Lauri.* Racemi *axillares, ſolitarii ſ. bini, petiolis paulo longiores.* Corollae *ſemiquinquefidae.* Filamenta *quinque, e medio laciniarum corollae, antheris breviora.* Antherae *erectae, longitudine corollae.*

26. LORANTHUS *ſpicatus.*

L. ſpicis quadrangularibus. *Mant.* 63. *Iacq. amer.* 97. *t.* 68.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 394.

Aehrentragende Riemenblume. W.

Habitat Carthagenae, *paraſiticus.* ♄

Folia *oppoſita, obtuſa, nervoſa.*

*685. SCHRADERA.

Vahl eclog. 1. *p.* 35.

Involucr. univerſale multiflorum. *Cal.* ſuperus urceolatus. *Cor.* 5-6 fida campanulata, fauce hirſuta. *Bacca* polyſperma.

*1. SCHRADERA *capitata.*

S. involucro dentato, calyce integerrimo, foliis obtuſis. W.

Schradera capitata. *Vahl eclog.* 1. *p.* 35. *t.* 5. * *excluſo ſynonymo.*

Urceolaria. *Coth. diſp. veg. p.* 10. *n.* 74.

Kopfblütige Schradere. W.

Habitat in inſula Montſerrat. ♄ (v. ſ.)

Frutex *ſcandens paraſiticus, ramis tetragonis cortice cinereo tectis.* Folia *oppoſita ſubrotundo-elliptica integerrima coriacea obtuſiuſcula petiolata.* Pedunculus *ſesquiuncialis terminalis.* Flores *capitati.* Involucrum *coriaceum monophyllum quinquefidum circiter* 15-*florum, laciniis ſubrotundis obtuſis.* Calyx *campanulatus coriaceus perſiſtens, margine truncato integerrimo.* Numerus *laciniarum corollae et ſtaminum variat a* 5-6. W.

*2. SCHRADERA *cephalotes.* W.

S. involucro integerrimo, calyce dentato, foliis acuminatis. W.

Fuchſia (*involucrata*) floribus involucratis. *Swartz prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 674. *

Knopfblütige Schradere. W.

Habitat in ſylvis et montibus Jamaicae *interioris.* ♄.

Involucrum *flores aggregatos* 4-8 *continens monophyllum truncatum tetragonum glabrum craſſum.* Perianthium *monophyllum ovato-campanulatum erectum involucro paulo longius indiviſum ſubtruncatum, denticulis minutiſſimis octo.* Swartz. l. c.

Annuente Clariſſ. Swartz in litteris, hanc a praecedente diſtinxi. Deſcriptio auctoris citati diverſam eſſe plantam abunde demonſtrat. Vidi tantum hujus folia, quae tenuiora et multo acutiora. Ceterum in hac numerus octonarius frequentiſſimus eſt, rarius denarius vel 5-7-9 *rius.* W.

*686. STEPHANIA. W.

Capparis Iacq. hort. Schoenb. 1. p. 58.

Cal. campanulatus bilobus. *Cor.* 4-petala. *Stam.* bina inferiora longiora. *Germen* pedicellatum. *Stylus* o. *Stigma* capitatum. *Capſula?*

*1. STEPHANIA *Cleomoides.* W.

Capparis (*paradoxa*) foliis lanceolatis acuminatis perennantibus, calycibus bipartitis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 58. *t.* 111.*

Cleomeartige Stephanie. W.

Habitat ad Caraccas Americes. ♄

Frutex 6-*pedalis ramis teretibus glabris.* Folia *alterna lanceolata acuminata integerrima undulata venoſa nitida, juniora ſtellato-pubeſcentia.* Petioli *longiſſimi, longitudine fere foliorum pubeſcentes.* Flores *axillares ſolitarii cernui in ramorum apice formant racemum folioſum comoſum.* Pedunculi *longitudine calycis.* Calyx *aurantius bilobus campanulatus ventricoſus.* Corolla *flava calyce paulo longior, petalis rectis.* Stamina *recta calyce quadruplo longiora.* Antherae *incumbentes.* Pedicellus *germinis longitudine filamentorum breviorum.* W.

Facies floris eſt ut in Cleome, cum Capparidibus nil commune habet, praeter germen pedicellatum. Iure proprium format genus, quod in honorem Clariſſ. F. Stephan Profeſſoris Mosquenſis dixi. W.

687. HILLIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 601.

Cal. duplex, inferus, 6-phyllus, ſuperus 2-4 phyllus. *Cor.* longiſſima contorta. *Capſ.* infera, 2-locularis, polyſperma. *Sem.* comoſa.

1. HILLIA *longiflora.*

H. corollis ſexfidis, laciniis lanceolatis revolutis, foliis ovatis acutis. *Swartz. prod.* 58. *Swarz. obſ.* 135. *t.* 5. *f.* 1.*

Hillia paraſitica. *Sp. pl.* 1662. *Iacq. amer.* 96. *t.* 66.

Fereiria. *Vandelli in Roemer pl. hiſp. 1. p. 98. t. 6. f. 8.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. p. 395.
Langblütige Hillie. W.
Habitat in fruticetis humidis montium Jamaicae, *atque in* Braſilia. ♄

Frutex *repens.* Folia *oppoſita, ovalia.* Flores *ſemipedales.*

Non eſt paraſitica, licet radicibus inter ligna muſcoſa et vetuſta repentibus obſervetur. Swartz obſ. l. c.

*2. HILLIA *tetrandra.*

H. corollis quadrifidis, laciniis ovatis, foliis obovatis. *Swartz prod. 58. Fl. ind. occid. 1. p. 630.* *
Vierfädige Hillie. W.
Habitat in montibus altis Jamaicae *inter radices fruticum.* ♄

*688. ISERTIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 602.

Cal. ſuperus 6-dentatus. *Cor.* infundibuliformis 6-fida. *Stigma* 6-fidum. *Pomum* 6-loculare polyſpermum.

*1. ISERTIA *coccinea.*

I. foliis lanceolato-ellipticis ſubtus villoſo-incanis acuminatis utrinque acutis, pedunculis racemoſis bifidis. *Vahl. eclog. 2. p. 27.* *
Guettarda (*coccinea*) folio ampliſſimo ovato acuto, florum racemis erectis terminalibus, fructu coccineo. *Aubl. guj. 1. p. 317. t. 123.* *
Scharlachfarbene Iſertie. W.
Habitat in ſylvis Cajennae, Gujanae. ♄

Arbor *trunco decem vel-duodecim-pedali, ramis tetragonis.* Folia *oppoſita oblonga utrinque attenuata integerrima venoſa petiolata.* Panicula *terminalis.* Corolla *coccinea limbo flavo.* W.

*2. ISERTIA *parviflora.*

I. foliis oblongis, inferioribus baſi ſubcordatis, thyrſo ovato. *Vahl. eclog. 2. p. 28. t. 15.* *
Kleinblütige Iſertie. W.
Habitat in inſula Trinitatis. ♄

Folia *plerumque glabra interdum ſubtus ſubvilloſa.* Vahl. l. c.

689. CANARINA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 603.

Cal. 6-phyllus. *Cor.* 6-fida, campanulata. *Stigmata* 6. *Capſ.* infera; 6-locularis, polyſperma.

1. CANARINA *Campanula.*

C. Campanula. *Mant.* 225.

Campanula (*canarienſis*) capſulis quinquelocularibus, foliis oppoſitis haſtatis dentatis petiolatis. *Spec. pl.* 2. *p.* 238. *Mill. dict. n.* 14.

Campanula foliis haſtatis dentatis, caule determinate folioſo. *Hort. cliff.* 65. *t.* 8. *Roy. lugdb.* 247.

Campanula canarienſis regia ſ. Medium radice tuberoſa, foliis ſinuatis caeſiis atriplicis aemulis ternis circum caulem ambientibus, flore amplo pendulo: colore flammeo rutilante. *Pluk. alm.* 76. *t.* 276. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 5. *p.* 593.

Glockenblütige Canarine. W.

Habitat in Inſulis Canariis. ♃ (v. v.)

Campanulis *maxime affinis. Ob* Herbae *ſtaturam et fructificationis numerum plurium votis ſatisfacturus diſtinguo.*

Radix *tuberoſo-fuſiformis.* Caulis *tripedalis, erectus, ſolitarius, teres, laevis, articulatus.* Rami *terni e ſingulis caulis geniculis: ſuperioribus longioribus apice dichotomis.* Ramuli *alterni.* Folia (*caulina terna, ramea oppoſita,*) *petiolata, haſtata, denticulata, laevia, venoſa.* Flores *e dichotomia ramorum ſuperiorum, pedunculati, cernui.* Corolla *rufa, intus laetior fundo flaveſcente: laciniis nervis tribus purpureis.* Antherae *flavae.*

An Canarina zanguebarenſis Loureiro. Fl. cochin. p. 240. *hujus generis?* W.

690. FRANKENIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 604.

Cal. 5-fidus, infundibulif. *Petala* 5. *Stigma* 6-partitum. *Capſula* 1-locularis, 3-valvis.

1. FRANKENIA *laevis.*

F. floribus ſolitariis, petalis ſubrepandis obtuſis, foliis linearibus baſi ciliatis. W.

F. foliis linearibus confertis baſi ciliatis. *Roy. lugdb.* 452.
F. foliis aciformibus congeſtis. *Sauv. monſp.* 46.
Franca floribus ſolitariis ſeſſilibus, foliis priſmaticis triangularibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 459.
França maritima ſupina ſaxatilis glauca ericoides ſempervirens, flore purpureo. *Mich. gen.* 23. *t.* 22. *f.* 1.
Lychnis ſupina maritima, ericae facie. *Raj. angl.* 3. *p.* 38.
Anthyllis repens italica, thymi foliis, rubente flore, polygoni facie. *Till piſ.* 46.
Kali ſ. Vermiculari marinae non diſſimilis planta. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 703.
Polygonum fruticoſum ſupinum ericoides cinereum, thymi folio hiſpanicum. *Barr. ic.* 714. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 7. *t.* 11.
Polygonum maritimum minus, foliis ſerpylli. *Bauh. pin.* 281.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 360.
Glatte Frankenie. W.
Habitat in Europae *auſtralis maritimis, circa* Aſtracan. *Lepech. it.* 1. *p.* 255. ♃ (v. ſ.)

*2. FRANKENIA *Nothria.*
F. floribus faſciculatis, petalis acutis, foliis linearibus baſi ciliatis. W.
F. caule decumbente glabro, vaginis foliorum ciliatis. *Thunb. prod.* 58.
Nothria repens. *Berg. cap.* 171. *t.* 1. *f.* 2. *
Capiſche Frankenie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

3. FRANKENIA *hirſuta.*
F. floribus faſciculatis, petalis ſubrepandis obtuſis, foliis linearibus oblongis, caule hirſuto. W.
F. caulibus hirſutis, floribus faſciculatis terminalibus. *Gouan. illuſtr.* 26.
Franca maritima ſupina multiflora candida, caulibus hirſutis, foliis quaſi vermiculatis. *Mich. gen.* 23. *t.* 22. *f.* 2.
Polygonum creticum, thymi folio. *Bauh. pin* 281. *prodr.* 131.
Alſine cretica maritima ſupina, caule hirſuto, foliis quaſi vermiculatis. *Tournef. cor.* 45.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 361.
Haarige Frankenie. W.

Habitat in Apulia, Creta, *in* Sibiria. *Pallas. it.* 2. *p.* 465 ♃ (v. ſ.)
Flores *violacei.*

4. FRANKENIA *pulverulenta.*
F. floribus ſolitariis, petalis ſubrepandis, foliis ſubrotundo-obovatis ſubtus pulverulentis. W.
F. foliis obovatis retuſis ſubtus pulveratis. *Sp. pl.* 474.
F. foliis ovalibus. *Sauv. monſp.* 168.
Franca maritima quadrifolia ſupina, chamaeſyces folio et facie. *Mich. gen.* 23.
Anthyllis valentiana. *Cluſ. hiſp.* 2. *p.* 186.
Anthyllis marina, chamaeſyces ſimilis. *Bauh. pin.* 282.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt 6. *p.* 361.
Beſtäubte Frankenie. W.
Habitat in Suſexiae, Narbonae, Italiae, Apuliae *litoribus.* ⊙ (v. v.)
In ordine Naturali ad XL. referatur.

691. PEPLIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 605.

Perianth. campanulatum: ore 12-fido. *Petala* 6, calyci inſerta. *Capſ.* 2-locularis.

1. PEPLIS *Portula.*
P. floribus hexandris axillaribus ſolitariis, foliis petiolatis ſubrotundo-ovatis. W.
P. floribus apetalis. *Fl. lapp.* 178. *Fl. ſuec.* 291, 312. *Oed. dan. t.* 64. *Hoffm. germ.* 127. *Roth. germ. I.* 157. *II.* 415.
P. petalis ſenis plerumque apetala. *Hall. helv. n.* 856. *Pollich. pal. n.* 355.
Glaucoides paluſtre, portulacae folio, flore purpureo. *Mich. gen.* 21. *t.* 18.
Glaux paluſtris, flore ſtriato clauſo, foliis portulacae. T. *Petit. gen.* 43. *t.* 43.
Glaux aquatica, folio ſubrotundo. *Loeſ. pruſ.* 106. *t.* 20.
Glaux altera ſubrotundo folio. *Vaill. pariſ.* 80. *t.* 15. *f.* 5. *Bocc. muſ. t.* 84.
Anagallis ſerpillifolia aquatica. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 372.
Alſine fluviatilis. *Tabern.* 713.
Alſine paluſtris minor ſerpillifolia. *Bauh. pin.* 251.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 363.
Gemeine Peplis. W.

Habitat in Europae *inundatis.* ⊙ (v. v.)

Rarius Petala *habet, et tunc non omnia, ſed tantum* 1, 2, 3. *Scholl. barb. n.* 288.

*2. PEPLIS *indica.* W.

P. floribus tetrandris ſpicatis bracteatis, foliis oblongo-obovatis ſeſſilibus. W.

Indiſche Peplis. W.

Habitat in India *orientali.* (v. ſ.)

Caulis *adſcendens ſemipedalis et ultra tetragonus glaber.* Folia *oppoſita oblonga obovata ſubretuſa integerrima venoſa glabra.* Spicae *ſimplices foliis longiores ex omnibus axillis.* Flores *ſeſſiles oppoſiti bractea lanceolata flore duplo longiore ſuffulti.* Calyx *campanulatus octodentatus, dentibus alternis minoribus.* Petala *nulla vidi.* Stamina *quatuor.* Stylus *filiformis.* Stigma *capitatum.* W.

Peplis tetrandra Linnaei eſt Hedyotis tuberoſa, vide appendicem noſtram. W.

692. GAHNIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 606.

Cal. gluma 1-valvis 2-5 flora. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* dichotomus. *Sem.* 1.

1. GAHNIA *procera.*

G. paniculis ſpicatis pluribus elongatis, floſculis hexandris. *Forſt. prod. n.* 158.

Gahnia procera. *Lin. ſuppl.* 211. *Forſt. gen. n.* 26. *Forſt. Act. upſ.* 3. *p.* 178. *

Hohe Gahnie. W.

Habitat in Novae Zeelandiae *collibus.*

Gramen *ſemiorgyale et ultra. Schoenis africanis ſimillima et forte jure illius generis.*

*2. GAHNIA *ſchoenoides.*

G. culmis flexuoſis, paniculis compoſitis ſpicatis rigidis ſubſolitariis. *Forſt. prod. n.* 159.

Knopfgrasartige Gahnie. W.

Habitat in inſula Taheiti.

*693. BAMBUSA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 607.

Squamae tres ſpiculas ſubquinqueſloras tegentes. *Cal.* o. *Cor.* gluma 2-valvis. *Stylus* 2-fidus. *Semen.* 1.

1. BAMBUSA *arundinacea.*

B. panicula ramoſa divaricata. W.
Bambos arundinacea. *Retz. obſ.* 5. *p.* 24.*
Naſtus. *Juſſ. gen. ed. Uſteri p.* 39.
Arundo (*Bambos*) calycibus multifloris, ſpicis ternis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 120.
Arundo arbor. *Bauh. pin.* 18. *Hort. cliff.* 25. *Fl. zeyl.* 47. *Roy. lugdb.* 67.
Arundarbor vaſaria. *Rumph. amb.* 4. *p.* 8.
Tabaxir ſ. Mombu arbor. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 222.
Illy. *Rheed. mal.* 1. *p.* 25. *t.* 16.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 229.
Gemeiner Bambos. W.
Habitat in India *utraque.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

Paniculae *ſcapus erectus rigidus, gerens ad alternos dentes ſaepius flores tres, alternatim ſ. diſtiche poſitos ſeſſiles rigidulos lineares longos.*

*2. BAMBUSA *verticillata.* W.

B. ſpica terminali ſimplici verticillata. W.
Arundo (*multiplex*) floribus hexandris, ſpicis interruptis verticillatis, culmo diviſo, calycibus unifloris. *Loureiro cochin. p.* 73.*
Arundo arbor tenuis Leleba dicta. *Rumph. amb.* 4. *p.* 1. *t.* 1.
Wirtelblütiger Bambos. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

Infloreſcentia *et* foliis *baſi attenuatis, nec rotundatis, ut in praecedente, diverſiſſima. Diſtinxi tantum binas mihi notas Bambuſae ſpecies, plures alit India, quorum mentionem fecerunt Rumphius et Loureiro, ſed eas hic enumerare non auſim. Binas ſpecies depinxit Clariſſ. Lamarck. tab.* 264. *f.* 1. 2, *ſed ob deſcriptionis defectum et has omiſi.*

694. EHRHARTA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 608.

Cal. gluma 2-valvis abbreviata uniflora. *Cor.* gluma duplex, utraque bivalvis, exterior compreſſa acinaciformis.

* *Floribus monogynis.*

1. EHRHARTA *cartilaginea.*
E. culmo indiviſo, panicula ſimplici, corolla exteriori retuſa ſubmutica, foliorum margine cartilagineo criſpo. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 33.
E. (*Mnemateja*) foliis vaginatis criſpis, corolla rugoſa obtuſa. *Thunb. prod.* 66.
Ehrharta Mnemateja. *Lin. ſuppl.* 209.
Ehrharta capenſis. *Thunb. Act. holm.* 1779. *p.* 216. *t.* 8.*
Ehrharta nutans. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 343.
Wellenblättrige Ehrharte W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Gramen *omnium pulcherrimum glabrum.* Radix *fibroſa.* Culmus *erectus indiviſus articulatus ſesqui-ad bipedalis.* Articuli *circiter quinque.* Folia *vaginantia enſiformia marginata criſpa, inferiora palmaria, ſuperiora multo breviora; diſcus glaber; margo cartilagineo-crenulatus ſcaber.* Panicula *ſimplex oblonga* 15-20 *flora.* Pedunculi *capillares laxi flexuoſi terni gemini, aut ſolitarii, ſimplices, interdum ramoſiuſculi apice incraſſati.* Flores *cernui.* Gluma *calycina baſi colorata, corollina exterior violacea, interior palleſcens.* Faſciculi *villorum albiſſimi ſplendidi.* Nectarium *et* Filamenta *alba.* Antherae *luteae.*

*2. EHRHARTA *bulboſa.*
E. culmo indiviſo, panicula ramoſa multiflora, corolla exteriori ariſtata. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 33.
E. (*ariſtata*) foliis planis, corolla rugoſa ariſtata. *Thunb. prod.* 66.
Trochera ſtriata. *Richard in Iournal de Roſier* 13. *p.* 225. *t.* 3.*
Knollige Ehrharte. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

** *Floribus digynis.*

*3. EHRHARTA *longiflora.*
E. culmo ſimplici, panicula ramoſa multiflora, corolla

exteriori mucronata tuberculato-hiſpida, floribus triandris. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 32. *t.* 32. *
Langblütige Ehrharte. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

*4. EHRHARTA *panicea.*
E. culmo diviſo, panicula ſubramoſa, floribus erectis digynis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 9. *t.* 9. *
E. (*erecta*) panicula ramoſa, floribus omnibus erectis, glumis corollinis glaberrimis albicantibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 344. *
Fennichartige Ehrharte. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

5. EHRHARTA *calycina.*
E. culmo ramoſo, panicula ſubſimplici, calyce colorato corollam aequante. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 33. *t.* 33. *
E. (*digyna*) foliis planis, corollis laevibus obtuſis coſtatis. *Thunb. prod.* 66.
Aira (*capenſis*) culmo ramoſo, floribus racemoſis, corollis piloſis. *Lin. ſuppl.* 108. *
Schmelenartige Ehrharte. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

D I G Y N I A.

695. O R Y Z A.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 609.

Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. *Cor.* 2-valvis, ſubaequalis, ſemini adnaſcens.

1. ORYZA *ſativa.*
Oryza. *Bauh. pin.* 24. *theatr.* 479. *Cam. epit.* 192. *Dod. pempt.* 509. *Catesb. car.* 1. *p.* 14. *t.* 14. *Hort. cliff.* 137. *Mat. med.* 97. *Roy. lugdb.* 58. *Mill. dict. et illuſtr.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 625.
Gemeiner Reiſs. W.
Habitat forte in Aethiopia, *colitur in* Indiae *paludoſis.* ⊙ (v. v.)

Poſſideo 18 *varietates hujus graminis, ſeminibus ovatis, ellipticis, oblongis, ſubrotundis, brevibus, ſulcatis, albis, nigris, fuſcis, muticis, ariſtatis etc. quae*

ſenſim una in alteram tranſeunt, ut limites nulli obſerventur. W.

*696. NECTRIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 610.

Cal. 6-partitus, laciniis 3 interioribus minoribus obtuſis. *Cor.* 0. *Capſ.* 2, ſubcarnoſae ſtylis coronatae uniloculares polyſpermae.

*1. NECTRIS *aquatica.*
Cabomba aquatica. *Aubl. guj.* 1. *p.* 321. *t.* 124.
Gelbes Schwimmblatt. W.
Habitat in ſtagnis et rivulis Cajennae Gujanae.
Folia *inferiora oppoſita demerſa capillaceo-multifida ut in Ranunculo aquatili.* Folia *ſuperiora natantia peltata integerrima orbiculata alterna.* Pedunculi *axillares longi uniflori ſolitarii.* Flos *flavus.* W.

697. FALKIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 611.

Cal. 1-phyllus. *Cor.* 1-petala. *Styl.* 2. *Sem.* 4.

1. FALKIA *repens.*
F. repens. *Lin. ſuppl.* 211. *Thunb. Diſſ. Nov. pl. gen. I. p.* 17.
Convolvulus (*Falkia*) foliis cordatis exciſis caule ſarmentoſo. *Thunb. prod.* 35.
Kriechende Falkie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Convolvulus Falkia Iacq. hort. Schoenb. 2. *p.* 38. *t.* 198. *eſt longe alia planta, nam in Falkia repente folia ſunt integerrima baſi exciſa.* W.

698. ATRAPHAXIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 612.

Cal. 2-phyllus. *Petala* 2, ſinuata. *Stigmata* capitata. *Sem.* 1.

1. ATRAPHAXIS *ſpinoſa.*
A. ramis ſpinoſis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 409. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 28. *Mill. dict. n.* 1. *l'Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 27. *t.* 14. *

Atriplex orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro. *Tournef. cor.* 83. *Buxb. cent.* 1. *p.* 19. *t.* 30. *Dill. elt.* 47. *t.* 40. *f.* 47.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 396.
Dornige Atraphaxis. W.
Habitat in Media *ad urbem* Hanſen *locis glareoſis juxta fluvios*; *in* Sibiria. ♄ (v. ſ.)

Cal. 2-*phyllus*. Pet. 2. Stam. 6. Stigma 2. Sem. *compreſſum*.

Cum Polygono fruticante *conjungi debere judicat* Willich *illuſtr. n.* 8. R.

2. ATRAPHAXIS *undulata*.
A. inermis. *Mill. dict. n.* 2.
Polygonum undulatum. *Berg. cap.* 135.
Polygonum (*atraphaxoides*) floribus hexandris digynis, foliis ovatis undulatis. *Thunb. prod.* 77.
Atraphaxis inermis, foliis undulatis. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 409.
Arbuſcula africana repens, folio ad latera criſpo, ad polygona relata. *Dill. elth.* 36. *t.* 32. *f.* 36.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 397.
Wellenblättrige Atraphaxis. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Cal. 4-*partitus*, *aequalis laciniis ovatis concavis*. Pet. 0. Stam. 6, *lanceolata*. Stylus *bifidus*. Sem. *ſubrotundum*.

TRIGYNIA.

699. RUMEX.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 613.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3, conniventia. *Sem.* 1, triquetrum.

* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

1. RUMEX *Patientia*.
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis; unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Mill. dict. n.* 1. *Blakw. t.* 489. *Hoffm. germ.* 128. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 420.
Lapathum hortenſe, folio oblongo. *Bauh. pin.* 114.

Lapathum ſativum. *Dod. pempt.* 648.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 365.
Gemüſe Ampfer. W.
Habitat in Italia, *in M.* Meiſsner *Haſſiae*, *Moench. haſs. n.* 304. *et alibi in* Germania. ♃ (v. v.)
Confer. Lapathum hortenſe latifolium. *Bauh. pin.* 115.
Folia *ſeminalia ſagittata, ut R. Acetoſae.* Caulis *ſulcatus.*

2. RUMEX *ſanguineus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upſ.* 89. *Mat. Med.* 98. *Roy. lugdb.* 229. *Mill. dict. n.* 6. *Blackw. t.* 492. *Hoffm. germ.* 128. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 421.
Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum rubens. *Dod. pempt.* 650. *Cam. epit.* 229.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 367.
Blutadriger Ampfer. W.
Habitat in Virginia; *in* Germania *quaſi ſponte. Leers. herb. n.* 274. ♃ (v. v.)
Folia *venis rubris ſucco ſanguineo.* Valvula *exterior floris grano magno globoſo rubro notata, rarius et altera grano minimo. Migravit Angliae Hemſtedium.*

*3. RUMEX *ſpathulatus.* †
R. foliis obovatis obtuſis, valvulis graniferis. *Thunb. prod.* 67.
Spathelblättriger Ampfer. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

4. RUMEX *verticillatus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis cylindricis. *Sp. pl.* 476.
Lapathum aquaticum, foliis longis anguſtis acutis, floribus ad genicula verticillatim congeſtis. *Gron. virg.* 39.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 367.
Wirtelblütiger Ampfer. W.
Habitat in Virginia. ♃.

5. RUMEX *Britannica.*
R. floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis: vaginis obſoletis. *Sp. pl.* 476.
R. aquatica, calycis foliolis omnibus aeqnalibus, radice exterius nigra vel flava. *Cold. noveb.* 83.

Lapathum foliis longis latis vix acuminatis coſtis caulibusque rubentibus, radice intus crocea. *Gron. virg.* 39.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 368.
Virginiſcher Ampfer. W.
Habitat in Virginia. ♃

In praecedenti ſtipula cylindrica membranacea fere ad dimidium vaginans internodium, in hac vero non item, ſed ut in Europaeis. Pedicelli in priori craſſiores, in hac capillares; prior magis ſpicata, haec magis paniculata. Plantam Gron. in. Fl. virginica habui a Cl. Authore, quae non rubra erat caule aut coſtis.

*6. RUMEX *Hydrolapathum.*

R. floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis graniferis, foliis lanceolatis glabris acutis integerrimis baſi attenuatis. *Ait Kew.* 1. *p.* 483. *Hudſ.* 154.
Rumex Britannica. *Willd. prod. n.* 402. *Hoffm. germ.* 128 *Roth. germ. I.* 160. *II.* 421.
Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis denſiſſimis. *Hall. hiſt. n.* 1588.
Lapathum maximum aquaticum ſ. Hydrolapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 986.
Lapathum aquaticum folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
Fluſs Ampfer.
Habitat in foſſis profundis et ad fluviorum ripas Germaniae, Helvetiae, Angliae. ♃ (v. v.)

7. RUMEX *criſpus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Gme. ſib* 3. *p.* 112. *Mill. dict. n.* 5. *Gunn. norv. n.* 35. *Pollich. pal. n.* 356. *Hoffm. germ.* 128. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 421.
R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis planis, foliis cordato-oblongis. *Hort. cliff.* 138. *Fl. ſuec.* 294. 314. *Roy. lugdb.* 229.
R. foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *Fl. lapp.* 129.
Lapathum foliis criſpis, imis ovatis, ſupremis lanceolatis, calycibus verrucoſis. *Hall. helv. n.* 1589.
Lapathum longifolium criſpum. *Munting. brit.* 104. *t.* 190. R.
Lapathum folio acuto criſpo. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum acutum criſpum. *Tabern. ic.* 436. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 988.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 368.

Krauſer Ampfer. W.
Habitat in Europae *humoſis.* ♃ (v. v.)

8. RUMEX *Nemolapathum.*

R. floribus hermaphroditis, valvulis linearibus obtuſis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato-lanceolatis, ſuperioribus lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 212. *Hoffm. germ.* 128.

R. (*conglomeratus*) floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis oblongis graniferis, foliis lanceolatis ſubundulatis. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 422. *Murr. prod.* 52. *Leers. herb.* 257.

Rumex criſpus β. *Pollich. pal. n.* 356.

R. (*paludoſus*) floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis cordato-lanceolatis obtuſiuſculis, verticillis diſtinctis foliolo ſubjectis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 482.

Lapathum petiolis lateſcentibus, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucoſis. *Hall. helv. n.* 1590.

Lapathum acutum minimum. *Lob. ic.* 284. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 985.

Wald Ampfer. W.
Habitat in nemoribus humidis, inque paludibus Germaniae, Helvetiae, Angliae. ♃ (v. v.)

9. RUMEX *perſicarioides.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: omnibus graniferis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 477.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 369.
Wellenblättriger Ampfer. W.
Habitat in Virginia. ⊙ (v. v.)

Planta *ſpithamaea, ramoſiſſima.* Folia *lanceolata, petiolata, laevia, undata, integra:* Floris *valvulae dentibus utrinque tribus longis, omnes tectae granis pallidis magnis.*

10. RUMEX *aegyptiacus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis trifido-ſetaceis: unica granifera. *Hort. upſ.* 89. *Mill. dict. n.* 12.

R. floribus hermaphroditis, foliis oblongis, valvulis dentato-ſetaceis longiſſimis. *Wach. ultr.* 391.

Lapathum aegyptiacum annuum, parietariae foliis, capſula ſeminis longius barbata. *Till. piſ.* 43. *t.* 37. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 370.
Aegyptiſcher Ampfer. W.
Habitat in Aegypto. ⊙ (v. v.)

11. RUMEX *dentatus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis, omnibus graniferis, foliis lanceolatis. *Syſt. Veg.* 284.
Lapathum aegyptiacum, capſula ſeminis alba et crenata. *Dill. elth.* 191. *t.* 158. *f.* 191.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 370.
Gezähnter Ampfer. W.
Habitat in Aegypto. ⊙
Caulis *erectiuſculus, ſpithamaeus, teretiuſculus, baſi ramoſus.* Folia *lanceolata, petiolata, obliqua.* Flores *conferti, laterales.* Calyx *patens.* Valvulae *floris omnes grano ovato albo. et margine dentibus utrinque duobus lanceolatis, minime valvula longioribus aut ſetaceis.*

12. RUMEX *maritimus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Lech. ſcan.* 26. *It. ſcan.* 248. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 313. *Mill. dict. n.* 10. *Kniph. cent.* 7. *n.* 78. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 160. *II.* 423.
Lapathum aquaticum, luteolae folio. *Tournef. inſt.* 504.
Lapathum minimum. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum aquaticum, anguſtiſſimo acuminato folio. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 142. *t.* 104.
Anthoxanthon. *Bauh. pin.* 2. *p.* 987.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 371.
Schmalblättriger Ampfer. W.
Habitat in Europae *littoribus maritimis.* ⊙ (v. v.)
Radix rubra . .

13. RUMEX *divaricatus.*
R. floribus hermaphroditis; valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſis pubeſcentibus. *Sp. pl.* 478.
Lapathum arvenſe ſubhirſutum, folio retuſo, caule longius brachiato, capſula ſeminis crenata. *Till. piſ.* 93. *t.* 37. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 372.
Ausgebreiteter Ampfer. W.
Habitat in Italia. ⊙
Cum R. pulchro *conjungit. Haller.*

14. RUMEX *acutus.*
R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis foliis cordato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 138. *Mat. med.* 98. *Fl. ſuec.* 293, 316. *Roy. lugdb.* 229.

Mill. dict. n. 4. *Scop. carn. n.* 443. *Pollich. pal. n.* 357. *Kniph. cent.* 3. *n.* 78. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 161. *II.* 424.

Lapathum petiolo lateſcente, foliis longe lanceolatis, calyce ſerrato. *Hall. helv. n.* 1591.

Lapathum folio acuto. *Bauh. pin.* 115. *Blackw. t.* 491. *Munting. brit. t.* 189.

Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 983. *Lob. ic.* 284.

Lapathum acutum. *Raj. hiſt.* 175.

Oxylapathum. *Fuchs* 491.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 372.

Spitzblättriger Ampfer. W.

Habitat in Europae *ſucculentis.* ♃ (v. v.)

Valvularum *dentes utrinque plures, inaequales longitudine diametri ipſius valvulae.*

15. RUMEX *obtuſifolius.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis. *Gmel. ſib.* 3. *p* 115. *n.* 9. *Mill. dict. n.* 8. *Hoffm. germ.* 129. *Pollich. pal. n.* 358. *Roth germ. I.* 161. *II.* 423.

Lapathum foliis ovatis, circa petiolum emarginatis, floribus denſe paniculatis, ſerratis, verrucoſis. *Hall. helv. n.* 1592.

Lapathum ſylveſtre, folio ſubrotundo, ſeminis involucris dentatis. *Moriſ hiſt.* 2. *p.* 580.

Lapathum folio minus acuto. *Bauh. pin.* 111. *Lob. ic.* 284.

Lapathum vulgare, folio obtuſo. I. B. *Raj. hiſt.* 175.

Lapathum. *Cam. epit.* 228.

Hippolapathum vulgare album, folio ſubrotundo. *Munt. brit.* 68. *t.* 187. *Hall.* R.

Hippolapathum ſylveſtre. *Tabern.* 436. *Hall.* R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 373.

Stumpfblättriger Ampfer. W.

Habitat in Germania, Sudermannia, Helvetia, Gallia, Anglia. ♃ (v. v.)

16. RUMEX *pulcher.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis: ſubunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Mill. dict. n.* 9.

Lapathum foliis radicalibus utrinque emarginatis, calycibus reticulatis, ciliatis, verrucoſis. *Hall. helv. n.* 1593.

Lapathum arvenſe ſubhirſutum, folio retuſo, caule longi:s brachiato. *Till. piſ.* 93. *t.* 37. *f.* 2. *Willich. illuſtr.* 5. *obſerv.* 17.
Rumex floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 7.
Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus inſtar fidium. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 580. *ſ.* 5. *t.* 27. *f.* 13.
Lapathum pulchrum bononienſe ſinuatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 988. *Raj. hiſt.* 174.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 374.
Schöner Ampfer. W.
Habitat in Anglia, Gallia, Italia, Helvetia. ♃ (v. v.)
Folia Caulina *lateribus non ſinuata, ovato-oblonga, integra.* Rami *floriferi recurvati.* Calycis *valvulae dentatae, apice obtuſae; harum exterior granulum gerit; reliquae vero granulum obſoletum habent.*

*** Hermaphroditi: valvulis granulo deſtitutis, ſ. nudis.*

17. RUMEX *bucephalophorus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis dentatis nudis; pedicellis planis reflexis, incraſſatis. *Hort. upſ.* 90. *Mill. dict. n.* 14.
R. fructibus dentatis calyce reflexis, caput bovinum referentibus. *Hort. cliff.* 139.
Acetoſa, ocymi folio, neapolitana. *Bauh. pin.* 114.
Acetoſa, ocymi folio, bucephalophoros. *Col. ecphr.* 1. *p.* 151. *t.* 150.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 375.
Ochſenkopffrüchtiger Ampfer. W.
Habitat in Italia. ☉ (v. v.)
Flores ſemper terni.

18. RUMEX *aquaticus.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 315. *Mat. med.* 98. *Mill. dict. n.* 3. *Pollich. pal. n.* 359. *Blackw. t.* 490. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 161. *II.* 425.
Lapathum foliis longe lanceolatis, paniculis denſiſſimis. *Hall. helv. n.* 1588.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
Lapathum paluſtre. *Tabern. ic.* 437.
Hippolapathum. *Dalech. hiſt.* 604. *Cam. epit.* 232.

Rumex paluſtris. *Trag.* 317, 318.
Herba britannica. *Munt. brit. t.* 1.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 376.
Waſſer Ampfer. W.
Habitat in Europa *ad ripas fluviorum et paludum.* ♃ (v. v.)

19. RUMEX *Lunaria.*

R. floribus hermaphroditis: valvulis laevibus, caule arboreo, foliis ſubcordatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 320. *Mill. dict. n.* 12.
Acetoſa arboreſcens; ſubrotundo folio. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 3.
Lunaria magorum arabum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 994?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 377.
Baumartiger Ampfer. W.
Habitat in Canariis. ♄ (v. v.)
Flos tripartitus, nec ſexpartitus eſt. Panicula *oppoſitifolia.*

20. RUMEX *veſicarius.*

R. floribus hermaphroditis geminatis: valvulis omnibus maximis membranaceis reflexis, foliis indiviſis. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 90. *Roy. lugdb.* 230. *Mill. dict. n.* 15.
Acetoſa americana, foliis longiſſimis pediculis donatis. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 54. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 378.
Blaſenfrüchtiger Ampfer. W.
Habitat in Africa. ⊙ (v. v.)

21. RUMEX *roſeus.*

R. floribus hermaphroditis diſtinctis: valvulae alterius ala maxima membranacea reticulata, foliis eroſis. *Roy. lugdb.* 230.
Acetoſa (*roſea*) foliis eroſis, valvulae alterius ala maxima membranacea declinata *Mill. dict. n.* 16.
Acetoſa aegyptia, roſeo ſeminis involucro. *Schau. afr.* 5. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 379.
Groſsfrüchtiger Ampfer. W.
Habitat in Aegypto. ⊙ (v. ſ.)
Seminum valvulae maximae, unciales, orbiculatae, reticulatae, margine apice denticulatae, et baſi bifidae, quod non in R. tingitano.

22. RUMEX *tingitanus.*
R. floribus hermaphroditis diſtinctis, valvulis cordatis obtuſis integerrimis, foliis haſtato-ovatis. *Sp. pl.* 479.
Acetoſa dentata perennis. *Zanon. hiſt.* 14.
Acetoſa veſicaria tingitana perennis repens, foliis longis ſinuatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 8.
Lapathum maritimum foetidum. *Bauh. pin.* 116. *prodr.* 56.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 379.
Stinkender Ampfer. W.
Habitat in Barbaria, Hiſpania. *Alſtroemer.* ♃
Caules *ramoſi.* Folia *petiolata, ovata, acuminata, ſubſcabra, baſi ſubhaſtata, juxta baſin eroſa, margine ſcaberrima et fere inaequalia.* Racemi *longi, floribus* 5 *ſ.* 3 *propriis pedicellis ad ſingulos dentes racemi.* Calycis *valvulae cordatae, integerrimae, nudae.*

23. RUMEX *ſcutatus.*
R. floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Virid. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 138. *Hort. upſ.* 89. *Roy. lugdb.* 230. *Mat. med.* 99. *Pollich. pal. n.* 360. *Kniph. cent.* 8. *n.* 79. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 161. *II.* 426.
Lapathum foliis ſagittatis, cis mucronem latiſſimis, hamis reflexis divergentibus. *Hall. helv. n.* 1594.
Acetoſa romana. *Blackw. t.* 306.
Acetoſa ſcutata. *Mill. dict. n.* 3.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Bauh. pin.* 114. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 9.
Oxalis rotundifolia. *Dod. pempt.* 649.
β. Acetoſa ſcutata repens. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55.
Acetoſa cambobritannica montana. *Scheuch. alp.* 2. *p.* 128.
γ. Rumex (*glaucus*) floribus hermaphroditis, valvulis nudis, foliis cordato-haſtatis, caule ſuffruticoſo. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 67. *Collect.* 1. *p.* 64. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 382.
Grauer Ampfer. W.
Habitat in Helvetia, Galloprovincia, *inter acervos lapidum; ad muros* Germaniae. ♃ (v. v.)

*24. RUMEX *nervoſus.*
R. floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis oblongis trinerviis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 27.
R. (*perſicarioides*) floribus hermaphroditis, valvulis in-

tegris nudis, foliis oblongo-lanceolatis. *Forſk deſcr* 76. *n.* 41.
Nervenblättriger Ampfer. W.
Habitat in montibus Hadienſibus. ♄

Caulis *ſuffruticoſus.* Rami *teretes ſtriati, articulis apice fuſcis pollicaribus.* Folia *petiolata oblonga, ſuprema lanceolata, omnia acuta integerrima glaberrima craſſa avenia trinervia glauca pollicaria et ultra.* Petiolus *longitudine foliorum.* Stipulae *membranaceae vaginantes truncatae.* Panicula *terminalis.* Pedicelli *capillares ſub flore incraſſati fructu longiores.* Calyx *reflexus.* Semen *valvulis orbiculatis glabris integerrimis nudis.* Vahl. l. c.

25. RUMEX *digynus.*

R. floribus hermaphroditis digynis. *Hort. cliff.* 138. *Fl. ſuec.* 294, 317. *Roy. lugdb.* 230. *Oed. dan. t.* 14. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 111. *n.* 89. *Gunn. norv. n.* 36. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 30. *
Lapathum foliis antice emarginatis. *Hall. helv. n.* 1595.
Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp.* 132.
Acetoſa (*digyna*) humilis repens, folio rotundo emarginato. *Mill. dict. n.* 4.
Acetoſa rotundifolia repens eboracenſis, folio in medio deliquium patiente. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 36. *f. penult.*
Acetoſa rotundifolia alpina. *Bauh. pin.* 55. *prodr.* 114.
Acetoſa repens veſtmorlandia, cochleariae foliis nonnihil ſinuatis. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 2.
Acetoſa britannica rotundifolia, fructu compreſſo. *Blair. obſ.* 67. *t.* 67.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 381.
Zweygriffliger Ampfer. W.
Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Wallicis. ♃ (v. v.)

Flos quadrifidus: Calyce diphyllo, Corolla dipetala, Staminibus 6, Stylis 2.

*26. RUMEX *lanceolatus.* †

R. foliis lanceolatis reflexo-marginatis, caule angulato. *Thunb. prod.* 67.
Lanzenblättriger Ampfer. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

**** *Floribus diclinis.*

27. RUMEX *alpinus.*

R. floribus hermaphroditis ſterilibus femineiſque: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. *Mat. med.* 99. *Mill. dict. n.* 2. *Pall. it. p.* 195. *Blackw. t.* 262.

Lapathum foliis obtuſis, circa petiolum emarginatis, paniculis denſe ſpicatis, vaginis maximis. *Hall. helv. n.* 1587.

Lapathum floribus ſuperioribus maſculis, inferioribus femineis, foliis cordatis. *Zinn. goett.* 38.

Rumex folio pedali cordato, radice repente. *Monnier. obſ.* 165. *Sauv. monſp.* 111.

Lapathum folio rotundo alpinum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 987. *Hall.* R.

Lapathum hortenſe rotundifolium ſ. montanum. *Bauh. pin.* 115.

Lapathum rotundifolium. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 69.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 382.

Alpen Ampfer. W.

Habitat in Helvetia, Gallia *auſtrali.* ♂

Folia *magnitudine Rhei*, *rugoſa.*

Cum R. criſpo *male jungit Gmelin. ſib.* 3. *p.* 112. R.

28. RUMEX *ſpinoſus.*

R. floribus androgynis: calycibus femineis monophyllis: valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Hort. upſ* 89. *Willich. obſ.* 16. *Murray prodr.* 152.

R. floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis. *Hort. cliff.* 139. *Roy. lugdb.* 230.

Beta cretica, ſemine aculeato. *Bauh. pin.* 118. *prodr.* 57.

Beta cretica, ſemine ſpinoſo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 962.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 383.

Stachelſaamiger Ampfer. W.

Habitat in Creta. ⊙ (v. v.)

29. RUMEX *tuberoſus.*

R. floribus dioicis, foliis lanceolato-ſagittatis; hamis patentibus. *Sp. pl.* 481.

Acetoſa tuberoſa radice. *Bauh. pin.* 114.

Oxalis tuberoſa. *Dod. pempt.* 649.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 384.

Knolliger Ampfer. W.

Habitat in Italia. ♃

Affinis nimium R. Acetoſae ac ſi ejus hybrida; ſed Folia *hamis poſtice magis hiantia et Stipulae longio-*

res. Radix omnino Filipendulae. Caulis *erectus, ſimplex.*

30. RUMEX *multifidus.*

R. floribus dioicis, foliis haſtatis: auriculis palmatis. *Sp. pl.* 482. †

Acetoſa minor erecta lobis multifidis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 164. *t.* 126.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 384.

Vielſpaltiger Ampfer. W.

Habitat in alpibus Calabriae, Hetruriae, Orientis. ♃

31. RUMEX *Acetoſa.*

R. floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 130. *Hort. upſ.* 89. *Fl. ſuec.* 295, 318. *Fl. lapp.* 130. *Mat. med.* 99. *Roy. lugdb.* 231. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 111. *Pollich. pal. n.* 361. *Blackw. t.* 230. *Knorr. del.* 2. *t. A.* 13. *Hoffm. germ.* 129. *Roth. germ. I.* 162. *II.* 426.

Lapathum ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis retrorſum porrectis. *Hall. helv. n.* 1597.

Lapathum acetoſa. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 438.

Acetoſa pratenſis. *Bauh. pin.* 14. *Mill. dict. n.* 1.

β. Acetoſa pratenſis, flore albo. *Tournef. inſt.* 502.

γ. Oxalis criſpa. *Bauh. hiſt* 2. *p.* 990. *Tabern. ic.* 440.

δ. Acetoſa montana maxima. *Bauh. pin.* 114. *Scheuch. alp.* 129. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 890.

ε. Acetoſa montana, lato ari folio rotundo. *Bocc. muſ.* 165. *t.* 125. *et.* 126.

Lapathum ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis breviſſimis, recta divergentibus. *Hall. helv.* 1598. *ſeparata ſpecies.*

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 384.

Gemeiner Ampfer. W.

Habitat in Europae *paſcuis.* δ. ε. *in alpinis.* ♃ (v. v.)

32. RUMEX *Acetoſella.*

R. floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. *Vir. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Fl. lapp.* 131. *Fl. ſuec.* 296, 319. *Roy. lugdb.* 231. *Gron. virg.* 153. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 110. *Pollich. pal. n.* 362. *Kniph. cent.* 3. *n.* 77. *Knorr. del.* 2. *t. A.* 14. *Blackw. t.* 307. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 162. *II.* 427.

Lapathum ſexubus ſeparatis, foliis ſagittatis, hamis acutis, recurvis. *Hall. helv. n.* 1596.

Oxalis ſ. Acetoſa minor. *Matth.* 448. *Hall.*

Oxalis minor. *Camer. epit.* 231.
Acetoſa ſagittata alpina. *Zanon. t.* 5. *Hall.*
Oxalis parva auriculata repens. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 292.
Acetoſa arvenſis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis ovina. *Tabern. ic.* 440.
β. Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens. *Bauh. pin.* 14. *prodr.* 55.
Oxalis minima repens 1. *Tabern. ic.* 441. *Gmel. l. c.*
γ. Acetoſa arvenſis minima non lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Oxalis minima repens 2. *Tabern. ic.* 441. *Gmel.*
δ. Acetoſa minor erecta, lobis multifidis. *Bocc. muſ.* 164. *t.* 26.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 386.
Kleiner Ampfer. W.
Habitat in Europae *paſcuis et arvis arenoſis.* ♃ (v. v.)

33. RUMEX *aculeatus.*

R. floribus dioicis, foliis lanceolatis petiolatis, fructibus reflexis: valvulis ciliatis. *Sp. pl.* 482.
Acetoſa cretica, ſemine aculeato. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55. *t.* 55.
Oxalis minor aculeata candiae. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 991.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 387.
Gefranzter Ampfer. W.
Habitat in Creta, Hiſpania. ♃

Similis R. Acetoſellae, ſed Folia *baſi attenuata absque hamis.* Florum *femineorum interiores valvulae ciliatae aculeis minimis.*

34. RUMEX *luxurians.*

R. floribus dioicis, foliis cordato-haſtatis, caulibus angulatis diffuſis, valvulis exterioribus ſubulatis, interioribus orbiculatis. *Lin. ſuppl.* 212.
R. floribus dioicis foliis cordato-haſtatis, caulibus decumbentibus angulatis. *Mant.* 64.
Acetoſa fagopyri folio. *Bocc. muſ.* 165. *t.* 126.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 387.
Wuchernder Ampfer. W.
Habitat in alpibus Bononienſibus. ♃

Conf. *Pluk. Phyt.* 331. *f.* 2.

Radix *Filipendulae, tuberoſa.* Caules *(in horto) pedales, ſesquipedalesve, proſtrati, copioſi, ramoſi, pentagoni, ſtriati.* Folia *Acetoſae longiora, ambitu cordata haſtata (figura Ari maculati), acidiſſima, mar-*

gine purpuraſcenti, undulato, vix crenulato. Mihi non floruit.

Differt a R. ſcutato *caule angulato, nec tereti; foliis cordato-haſtatis, nec lanceolato-ſagittatis.* H. V.

Caulis *ramoſiſſimus pedalis angulatus laevis diffuſus.* Folia *alterna petiolata cordata haſtata acuminata.* Bracteae *intrafoliaceae ferrugineae.* Panicula *maxima terminalis divaricata decompoſita, e racemis alternis.* Pedicelli *capillacei longitudine fructus.* Fructus *valvulis exterioribus ſubulatis brevioribus, interioribus orbiculatis laevibus.* Lin. ſuppl.

Rumex ſpinoſus Thunb. prod. 67. pertinet forte ad hanc ſpeciem. W.

35. RUMEX *ariſolius.*

R. floribus dioicis, foliis omnibus petiolatis haſtatis, auriculis ſimplicibus divaricatis, caule erecto. *Ait. Kew.* 1. *p.* 487.

R. caule laevi ſuffruteſcente foliis cordato-haſtatis ſerrulatis acutis, valvulis nudis integerrimis. *Lin. ſuppl.* 212.

Rumex abyſſinicus. *Iacq. hort.* 3. *p.* 48. *t.* 98.

Aronblättriger Ampfer. W.

Habitat in Abyſſinia. ♄

Caules *teretes fiſtuloſi glaberrimi glauci parum ramoſi.* Folia *longe petiolata triangularia baſi cordata et ſubhaſtata ſerrulata acuta ſeptemnervia venoſa glaberrima ſapore Rumicum.* Stipulae *vaginaceae lanceolatae glabrae oppoſitifoliae membranaceae.* Paniculae *terminales.* Semina *valvulis cordatis glaberrimis nudis integerrimis, calyce reflexo. In libera terra cultus ſuborgyalis evadit, foliis magnitudine R. alpini, in ollá vero coarctatus et fruticoſus.*

36. RUMEX *bipinnatus.*

R. floribus dioicis, foliis bipinnatis. *Lin. ſuppl.* 211.

Doppeltgefiederter Ampfer. W.

Habitat in Marocco. ♃

Caules *ſpithamaei adſcendentes laeves.* Folia *cordata bipinnatifida, laciniis fere ad coſtam diſtinctis, ſingulis pinnatis ſ. dichotomis.* Stipulae *membranaceae diaphanae albae.* Racemus *terminalis compoſitus, racemulis ſimplicibus.* Calyx *obtuſus.*

700. FLAGELLARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 614.

Cal. 6-partitus. *Cor.* o. *Bacca* 1-ſperma.

1. FLAGELLARIA *indica.*

Flagellaria. *Fl. zeyl.* 133.* *Amoen. acad.* 1. *p.* 398. *Oſb. it.* 276.
Palmiuncus laevis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 120. *t.* 59. *f.* 2.
Panambu-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 99. *t.* 53. *Raj. ſuppl.* 573.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 398.
Indiſcher Peitſchenſtrauch. W.
Habitat in Iava, Malabaria, Zeylona, Guinea ♄ (v. ſ.)

Frutex *humanam altitudinem ſuperans.* Rami *diſtichi. Affinitas proxima Calami.* Folia *terminata cirrho ut in Glorioſa.*

701. SCHEUCHZERIA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 615.

Cal. 6-partitus. *Cor.* o. *Styli* o. *Capſ.* 3, inflatae, 1-ſpermae.

1. SCHEUCHZERIA *paluſtris.*

Scheuchzeria. *Fl. lapp.* 133. *t.* 10. *f.* 1. *Fl. ſuec.* 297, 320. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv. n.* 1310. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 73. *Berg. viadr.* 67. *Fl. dan. t.* 76. *Pollich. pal. n.* 363. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 419.
Iuncus floridus minor. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 43. *theatr.* 190. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 110. *f.* 2.
Iuncoidi affinis paluſtris. *Scheuch. gram.* 336.
Gramen junceum aquaticum, ſemine racemoſo. *Loeſ. pruſſ.* 114. *t.* 28.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 631.
Sumpf Scheuchzeria. W.
Habitat in Lapponiae, Helvetiae, Germaniae, Sueciae *paludoſis.* ♃ (v. v.)

Capſulae 3, 5, 6, *in quolibet flore; Semina* 1, 2, *rarius* 3 *in qualibet capſula reperiuntur. Pollich. l. c.*

702. TRIGLOCHIN.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 616.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3, calyciformia. *Stylus* o. *Capſ.* baſi dehiſcens.

1. TRIGLOCHIN *paluſtre.*

T. capſulis trilocularibus laevibus linearibus baſi attenuatis. W.

T. capſulis trilocularibus ſublinearibus. *Fl. ſuec.* 298. 321. *Act. ſtockh* 1742. *p.* 147. *t.* 6. *f.* 1. 2. 3. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 72. *Hall. helv. n.* 1308. *Scop. carn. n.* 446. *Pollich. pal. n.* 364. *Leers. herb. n.* 272. *t.* 12. *f.* 5. *Flor. dan. t.* 490. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 158. *II.* 417.

T. fructu tenui. *Fl. lapp.* 134. *Roy. lugdb.* 44.

Gramen junceum ſpicatum ſ. Triglochin. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 80. *Tabernaem.* 224.

Calamagroſtis IV. *Dalech. hiſt.* 1006.

β. Iuncago maritima perennis, bulboſa radice. *Mich. gen.* 44. *Pollich. l. c. var.* β.

Iuncago maritima. *Barr. rar.* 55. *t.* 271.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 633.

Gemeiner Dreyzack. W.

Habitat in Europae *inundatis uliginoſis.* ♂ (v. v.)

Radix *fibroſa.*

2. TRIGLOCHIN *bulboſum.*

T. capſulis trilocularibus laevibus linearibus apice attenuatis. W.

T. radice bulboſa fibris obtecta. *Mant.* 226. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 454. *Collect. ſuppl.* 102. *

Gramen triglochin bulboſum monomotapenſe. *Brey. faſc.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 634.

Capiſcher Dreyzack. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Radix *bulboſa, undique obnubilata ſetis in faſciculum caeſpitoſum congeſtis.* Scapus *vix ſemipedalis, nudus, hinc ſubcanaliculatus.* Folia *radicalia, filiformia, hinc ſubcanaliculata.*

Flores et tota planta Tr. paluſtri ſimillima, ſed tota Herba, Flores et fructus minores. Styli 3, *protracti et patentes, qui in T. paluſtri erecti et obſoleti.*

3. **TRIGLOCHIN** *maritimum.*
T. capſulis ſexlocularibus ſulcatis ovatis. W.
T. capſulis ſexlocularibus ovatis. *Fl. ſuec.* 299, 322. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 147. *t.* 6. *f.* 4. 5. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 72. *Scop. carn. n.* 447. *Pollich. pal. n.* 365. *Oed. dan. t.* 306. 238. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 418.
T. fructu ſubrotundo. *Fl. lapp.* 135. *Roy. lugdb.* 45. *Gort. gelr.* 76.
Iuncago paluſtris et maritima perennis, fructu breviore quinquecapſulari. *Mich. gen.* 44.
Gramen ſpicatum alterum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 82.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 12. *p.* 635.
Groſser Dreyzack. W.
Habitat in Europae *maritimis.* ♃ (v. v.)

*703. WURMBEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 617.

Cal. 0. *Cor.* 6-partita tubo hexangulato. *Filam.* fauci inſerta.

*1. **WURMBEA** *pumila.* W.
W. ſpica tri-ſ. quadriflora, tubo longitudine limbi. W.
Wurmbea capenſis α. *Thunb. Diſſ. nov. pl. gen.* 1. *p.* 19. *tab. fig.* γ.
Kleinſte Wurmbea. W.
Habitat in arenoſis Cap. b. ſpei. ♃
Planta *uncialis.* Spica *foliis vix longior.* W.

*2. **WURMBEA** *campanulata.* W.
W. ſpica multiflora foliorum longitudine, tubo longitudine limbi campanulato. W.
Wurmbea capenſis γ. *Thunb. Diſſ. Nov. pl. gen.* 1. *p.* 19. *tab. fig.* β.
Wurmbea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 270. *f.* 1.
β. Melanthium ſpicatum. *Burm. cap.* 11. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 11. *p.* 503. *t.* 85. *f.* 2.
Glockenblütige Wurmbea. W.
Habitat in collibus arenoſis Cap. b. ſpei. ♃
Planta *digitalis et ultra.* Folia *ut in omnibus ſpeciebus tria lanceolata cucullata baſi ventricoſa, at anguſtiora quam in ſequenti et ſpicae longitudine.* Spica *floribus numeroſis obſita.* W.

3. **WURMBEA** *longiflora.* W.

W. ſpica multiflora foliis longiore, tubo limbo duplo longiore. W.

Wurmbea capenſis β. *Thunb. Diſſ. Nov. pl. gen.* 1. *p.* 19. *tab. fig. a.*

Wurmbea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 270. *f.* 2.

Melanthium (*monopetalum*) corolla monopetala, foliis cucullatis lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 231.*

Melanthium (*Wurmbeum*) foliis enſiformibus diſtichis, corolla connato-tubuloſa. *Thunb. prod.* 67.

Langblütige Wurmbea. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis prope* Groene Kloof *et alibi.* ♃

Folia *multo latiora quam in praecedente.* Spica *baſi magis flexuoſa, floribus numeroſis magis diſtantibus.* Corollae *tubus longus anguſtus.* W.

Illuſt. Thunberg olim pro novo genere Wurmbeam noſtram habuit, poſtea vero cum Melanthiis conjunxit; at praeſentia tubi corollae et corollae monopetalae in Liliaceis ſeparat genera affinia et optimum praebet characterem; hinc denuo Wurmbeam diſtinxi. Varietates hujus plantae a Thunbergio indicatae, ſunt ſpecies re vera diſtinctae. Varietatem β. *ſpica ovata et floribus purpureis ob iconis defectum omiſi.* W.

704. MELANTHIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 618.

Cal. 0. *Cor.* 6-petala. *Filam.* ex elongatis unguibus corollae.

1. **MELANTHIUM** *virginicum.*

M. floribus paniculatis, petalis unguiculatis extus hirſutis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 488.

M. petalis unguiculatis. *Mill. dict. n.* 1.

M. foliis linearibus integerrimis longiſſimis, floribus paniculatis. *Gron. virg.* 59.

Aſphodelo affinis floridana, ramoſo caule, floribus ornithogali obſoletis. *Pluk. amalth.* 40. *t.* 434. *f.* 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 500.

Virginiſches Melanthium. W.

Habitat in Virginia. ♃

An *dioica*? *Gron. virg.* 2. *p.* 55.

Tres ſpecies affines deſcripſit Desrouſſeaux in Lam. encycl. 4. p. 26, quas ob characteres vacillantes omittere coactus ſum. W.

2. MELANTHIUM *ſibiricum.*

M. floribus paniculatis, petalis ſeſſilibus acutis, foliis linearibus. W.

M. petalis ſeſſilibus. *Amoen. acad.* 2. *p.* 349. *t.* 11. * *Mill. dict. n.* 2.

Ornithogalum ſpicis florum longiſſimis ramoſis. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 45. *t.* 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 501.

Sibiriſches Melanthium. W.

Habitat in Sibiria. ♃

*3. MELANTHIUM *laetum.*

M. racemo oblongo, petalis ſeſſilibus, foliis glabris lanceolato-linearibus, caulinis remotis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 488.

Lanzettenblättriges Melanthium. W.

Habitat in America *boreali.* ♃

4. MELANTHIUM *capenſe.*

M. floribus racemoſis, petalis punctatis, foliis lanceolatis cucullatis. W.

M. foliis lanceolatis cucullatis. *Thunb. prod.* 67.

M. petalis punctatis, foliis cucullatis. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 12.

M. punctatum. *Mill. dict. n.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 502.

Capſches Melanthium. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Caulis *ſimpliciſſimus palmaris.* Folia *lanceolata vaginantia, vagina ſuperne dilatata, ſunt haec in caule quatuor, ſupremo et infimo minimo.* Racemus *terminalis.* Petala *ovalia ſubunguiculata punctata.* Stamina *receptaculo fere inſerta.* Styli *tres.* Amoen. acad.

5. MELANTHIUM *triquetrum.*

M. foliis triquetris glabris caule longioribus, floribus ſpicatis. *Lin ſuppl.* 213. *Thunb. prod.* 67.

Hyacinthus ſtellatus ſpicatus, floribus incarnatis caule et folio orchidis. *Pluk. alm. p.* 186. *t.* 195. *f.* 4? W.

Dreyeckiges Melanthium. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

6. MELANTHIUM *ciliatum.*

M. petalis unguiculatis, foliis baſi cucullatis, enſifor-

mibus cartilagineo-ciliatis, floribus ſpicatis. *Lin. ſuppl.* 213.
M. foliis enſiformibus cucullatis, floribus ſpicatis, petalis unguiculatis. *Thunb. prod.* 67.
Gefranztes Melanthium. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.
Folia *caule breviora.* Petala *alba lanceolata.*

*7. MELANTHIUM *junceum.*
M. foliis lineari-ſubulatis, ſuperioribus baſi dilatatis, ſpica flexuoſa, petalis unguiculatis. W.
M. foliis ſubulatis, radicali unica, ſcapo ad ſummitatem diphyllo, floribus ſpicatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 451. *Collect. ſuppl.* 105. *
Simſenartiges Melanthium.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Variat floribus coeruleis, roſeis at albis. W.

*8. MELANTHIUM *ſecundum.*
M. foliis linearibus, ſpica ſecunda, petalis unguiculatis. W.
M. (*ſecundum*) punctatum, foliis gramineis, floribus ſecundis ſeſſilibus ſpicatis, petalis unguiculatis. *Lamarck. encycl.* 4. *p.* 29. *t.* 269. *f.* 2. *
Einſeitigblütiges Melanthium. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

*9. MELANTHIUM *phalangioides.*
M. foliis linearibus canaliculatis, racemo multifloro, pedunculis flore longioribus, petalis ſeſſilibus. W.
M. (*phalangioides*) foliis linearibus, floribus pedicellatis racemoſis, petalis ovatis concavis ſeſſilibus. *Lamarck. encycl.* 4. *p.* 28. *
Anthericum (*ſubtrigynum*) filamentis glabris, ſcapo ſimplici folioſo. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 419. *Collect.* 3. *p.* 273. *
Zaunkrautartiges Melanthium. W.
Habitat in Carolina. ♃

10. MELANTHIUM *indicum.*
M. petalis lineari-lanceolatis, foliis linearibus. *Mant.* 226.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 503.
Indiſches Melanthium. W.
Habitat in Tranquebaria. *Koenig.* ♃ (v. ſ.)
Radix *bulboſa.* Herba *ſtatura Ornithogali lutei.* Caulis *ſimplex, palmaris, erectus, laevis.* Folia *caulina* 3, *linearia, caule longiora.* Pedunculi *terminales ſae-*

pius duo: altero unifloro, altero bifloro: Foliis floralibus duobus, latioribus, brevioribus. Flores *foliis breviores, atropurpurei.* Petala *anguſto-lanceolata.* Stamina *et* Piſtilla *corollis breviora.* Capſula *triangularis laevis, magnitudine ſeminis Coffeae.*

Obſ. *De filamentorum inſertione nil novi.*

Folia *anguſto-linearia.* Caulis *folioſus apice biflorus pedunculis longiſſimis.* Petala *anguſtiſſima linearia.* Antherae *ſubrotundae reniformes magnae.* Filamenta *breviſſima baſi petalorum inſerta.* *Poſſideo varietatem vel forte ſpeciem,* foliis *multo latioribus,* caule *unifloro,* petalis *lanceolatis convoluto-cuſpidatis* antheris *minoribus.* W.

11. MELANTHIUM *viride.*

M. pedunculis unifloris cernuis. *Lin. ſuppl.* 213.

M. foliis ovato-lanceolatis, corollis reflexis. *Thunb. prod.* 67.

Grünes Melanthium. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Caulis *ſemipedalis folioſus ſubpubeſcens.* Folia *alterna ſeſſilia lanceolata palmaria erecta.* Pedunculi *alterni lateriflori filiformes uniflori longitudine foliorum.* Flores *cernui.* Petala 6 *anguſto-lanceolata patentia purpuraſcentia, baſi anguſtiore ex margine connivente flavo.* Stamina *brevia.* Styli *tres.*

*12. MELANTHIUM *uniflorum.*

M. foliis lineari-lanceolatis caule ſubunifloro longioribus, petalis lanceolatis ſubunguiculatis. W.

M. floribus patulis pedunculatis, foliis lanceolato-linearibus. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 450. *Collect.* 4. *p.* 100. *

Einblütiges Melanthium. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *intermedia caule longiora, infima et ſumma breviora.* Petala *externe rubicunda, interne flava ungue fuſceſcente.* W.

*13. MELANTHIUM *eucomoides.*

M. foliis oblongo-lanceolatis cucullatis, caule trifloro, petalis ſubhaſtatis unguiculatis. W.

M. foliis cucullatis, petalis impunctatis. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 452. *Collect. ſuppl.* 104. *

Schopflilienartiges Melanthium. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Caulis *digitalis.* F[illegible] *pedalia oblongo lanceolata*

baſi cucullata circiter quinque in caule. Flores *tres pedunculati terminales magni foliorum vaginis paulo longiores.* Corolla *viridis.* Antherae *fuſcae.* W.

*14. MELANTHIUM *pumilum.*

M. foliis lanceolatis baſi barbatis, caule ſubtrifloro, petalis ſeſſilibus. W.

M. pedunculis unifloris erectis, caule nullo. *Forſt. Comm. goett. 9. p. 36. t. 6.* *

Kleinſtes Melanthium. W.

Habitat in Tierra del Fuego. ♃

Caulis *ceſpitoſus brevis, foliis rigidis lanceolatis baſi barbatis tectus.* Pedunculi 3 *ſ.* 4. Corolla *alba, petalis lanceolatis apice inflexo-cucullatis.* Styli *nulli.* Stigmata 3 *rarius* 6. W.

Melanthium luteum Thunb. jap. 152. eſt planta dubia a Veratro luteo forte diſtincta, ſed mihi ignota. W.

705. MEDEOLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 619.

Cal. 0. *Cor.* 6-partita, revoluta. *Bacca* 3-ſperma.

1. MEDEOLA *virginica.*

M. foliis verticillatis, ramis inermibus. *Sp. pl.* 483. *Mill. dict. n.* 3.

M. foliis ſtellatis lanceolatis, fructu baccato. *Gron. virg.* 39. *

Lilium ſ. Martagon puſillum, floribus minutiſſimis herbaceis. *Pluk. alm.* 401. *t.* 328. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 389.

Virginiſche Medeola. W.

Habitat in Virginia. ♃

2. MEDEOLA *aſparagoides.*

M. foliis alternis ovatis, baſi ſubcordatis obliquis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 489.

M. foliis pinnatis: foliolis alternis. *Mant.* 370. *Mill. dict. n.* 1.

Dracaena (*medeoloides*) herbacea volubilis, foliis ovatis nervoſis. *Lin. ſuppl.* 203.

Aſparagus (*medeoloides*) herbaceus volubilis, foliis ovatis nervoſis. *Thunb. prod.* 66.

Aſparagus foliis ovato-lanceolatis ſolitariis. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 29.

Aſparagus africanus ſcandens, myrti folio. *Till. piſ.* 16. *t.* 12. *f.* 1.
Laurus alexandrina ramoſa, foliis e ſummitate caulium prodeuntibus. *Herm. lugdb.* 679. *t.* 631.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 390.
Spargelärtige Medeola. W.
Habitat in Aethiopia. ♄ (v. ſ.)

Folia *pinnata, aut* ramulos *dicas, multis dubium.* Folia *alterna pinnata ſunt, alioquin ſi ramulus eſſet folii, veſtigium ſub ramo exſtaret.* Flores *penduli e pedicello unifloro ſub baſi ſinguli folioli.* Corolla *extus vireſcens* Petalis *linearibus, a medio totaliter reflexis.* Filamenta *baſi contracta, petalis ſupra baſin inſerta, ſubulata, longitudine corollae.*

*3. MEDEOLA *anguſtifolia.*

M. foliis alternis ovato-lanceolatis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 490.
Medeola anguſtifolia. *Mill. dict. n.* 2.
Dracaena (*volubilis*) herbacea volubilis, foliis lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 204?
Aſparagus (*volubilis*) caule volubili, foliis lanceolatis. *Thunb. prod.* 66?
Aſparagus africanus ſcandens myrti folio anguſtiore. *Till. piſ.* 17. *t.* 12. *f.* 2.
Schmalblättrige Medeola. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

706. TRILLIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 620.

Cal. 3-phyllus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 3-locularis.

1. TRILLIUM *cernuum.*

T. flore pedunculato cernuo. *Mill. dict. n.* 1.
Paris foliis ternis, flore pedunculato nutante. *Cold. noveb.* 81.
Solanum triphyllum, flore hexapetalo carneo. *Cateſb. carol.* 1. *p.* 45.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 508.
Hängendes Dreyblatt. W.
Habitat in Carolina. ♃

2. TRILLIUM *erectum.*

T. flore pedunculato erecto. *Mill. dict. n.* 2.

Paris foliis ternis, flore pedunculato erecto. *Amoen. acad.* 1. *p.* 154. *
Solanum triphyllum braſilianum. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 91. *Burſ.* IX. 12.
Solanum triphyllum canadenſe. *Corn. canad.* 166. *t.* 167.
Solano congener triphyllum canadenſe. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 532. *ſ.* 13. *t.* 3. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 509.
Aufrechtes Dreyblatt. W.
Habitat in Virginia. ♃

3. TRILLIUM *ſeſſile.*
T. flore ſeſſili erecto. *Mill. dict. n.* 3.
Paris foliis ternatis, flore ſeſſili erecto. *Gron virg.* 44.
Solanum virginianum triphyllum, flore tripetalo atropurpureo in foliorum ſinu, abſque pediculo, ſeſſili. *Pluk. alm.* 352. *t.* 111. *f.* 6.
Solanum triphyllum, flore hexapetalo: tribus petalis purpureis, caeteris viridibus reflexis. *Cateſb. car.* 1. *p.* 50. *t.* 50.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 510.
Sitzendes Dreyblatt. W.
Habitat in Virginia, Carolina. ♃

707. COLCHICUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 621.

Spatha. Cor. 6-partita: tubo radicato. *Capſ.* 3, connexae, inflatae.

1. COLCHICUM *autumnale.*
C. foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upſ.* 90. *Roy. lugdb.* 41. *Sauv. monſp.* 18. 19. *Mat. med.* 100. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 448. *Pollich. pal. n.* 366. *Blackw. t.* 566. *Kniph. cent.* 12. *n.* 30. *Knorr. del.* 1. *tab. Z.* 1. *Hoffm. germ.* 130. *Roth. germ.* 158. *II.* 416.
C. flore folia longe praecedente, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 1255.
C. commune. *Bauh. pin.* 67.
Colchicum. *Fuch. hiſt.* 356. 357. *Camer. epit.* 845. *Dodon. purg.* 371.
β. Colchium flore pleno. *Bauh. pin.* 67.
γ. C. vernum. *Bauh. pin.* R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. p. 511.
Herbſt Zeitloſe. W.
Habitat in Europae *ſucculentis.* ♃ (v. v.)
Colch. *vernum petala et folia habet paulo anguſtiora, Hall.*

2. COLCHICUM *montanum.*
C. foliis linearibus patentiſſimis. *Sp. pl.* 485. *Mill. dict. n.* 2. *Allion. pedem.* 1. *n.* 434. *t.* 74. *f.* 2.*
C. foliis florem attingentibus, petalis linearibus. *Hall. helv. n.* 1256.
C. montanum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 68.
C. montanum. *Cluſ. hiſp.* 266. *t.* 267. *hiſt.* 1, *p.* 200.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 517.
Berg Zeitloſe. W.
Habitat in Hiſpania, Helvetia. ♃
Folia *una cum floribus autumno erumpunt.*

3. COLCHICUM *variegatum.*
C. foliis undulatis patentibus. *Hort. cliff.* 140. *Roy. lugdb.* 42. *Mill. dict. n.* 3.
C. chionenſe, floribus fritillariae inſtar teſſulatis, foliis undulatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 341. *ſ.* 4. *t.* 3. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 518.
Bunte Zeitloſe. W.
Habitat in Chio *inſula.* ♃ (v. v.)

708. HELONIAS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 622.

Cor. 6-petala. *Cal.* 0. *Capſ.* 3-locularis.

1. HELONIAS *bullata.*
H. foliis lanceolato-enſiformibus nervoſis, bracteis lineari-lanceolatis. W.
H. foliis lanceolatis nervoſis. *Syſt. veg.* 349.
Veratrum racemo ſimpliciſſimo, corollis patentibus, ſtaminibus longioribus. *Mill. ic.* 181. *t.* 272.
Helonias, foliis radicalibus lanceolatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 12. *t.* 1.*
Ephemerum phalangoides virginianum, floſculis arbuteis bullatis in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 135. *t.* 174. *f.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 606. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 520.
Glockenblütige Schwindblume. W.

Habitat in Penſylvaniae *paludoſis*. ♃ (v. ſ.)

2. HELONIAS *borealis*. W.

H. foliis lineari-enſiformibus nervoſis, bracteis duplicatis membranaceis. W.

Anthericum (*calyculatum*) foliis enſiformibus, perianthiis trilobis, filamentis glabris, floribus trigynis. *Fl. ſuec.* 269, 288. *It. gotl.* 194, 221. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 75. *t.* 18. *f.* 2. *Mill. dict. n.* 10. *Oed. t.* 36. *Hoffm. germ.* 121.

Anthericum filamentis glabris. *Hall. helv. n.* 1205.

Anthericum Pſeudo-aſphodelus. *Iacq. vindb.* 233. *

Anthericum filamentis laevibus, perianthio trifido. *Hort. cliff.* 140. *Gron. virg.* 39.

Anthericum ſcapo nudo capitato, filamentis glabris. *Fl. lapp.* 139. *t.* 10. *f.* 3.

Scheuchzeria Pſeudo-Aſphodelus. *Scop. carn. n.* 445. *Roth. germ. I.* 159. *II.* 419.

Tofieldia paluſtris. *Hudſ. angl.* 157.

Heritieria anthericoides. *Schrank bavar. n.* 580.

Phalangium alpinum paluſtre iridis folio. *Segu. veron.* 2. *p.* 61. *t.* 14.

Pſeudo-aſphodelus alpinus. *Bauh. pin.* 29.

Pſeudaſphodelus. *Cluſ. pann.* 262.

Pſeudaſphodelus ſecundus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 198.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 402.

Nördliche Schwindblume. W.

Habitat in alpibus Lapponiae, Norvegiae, Helvetiae, Salisburgi, Sibiriae *inque paludibus profundis* Germaniae, Angliae. ♃ (v. v.)

Eſt re vera hujus generis, convenit et habitu cum praecedente, a qua petalis erectis nec baſi ventricoſis, ſtylis *non cohaerentibus*, bractea *duplici, denique* foliis *longioribus et anguſtioribus differt. In alpibus Europae auſtralis et in paludibus flores ſunt racemoſi, in Lapponia et Norvegia vero tota planta eſt quadruplo minor, floribus capitatis.* W.

3. HELONIAS *aſphodeloides*.

H. foliis caulinis ſetaceis. *Sp. pl.* 485.

Aſphodelus minor albus. *Pluk. mant.* 29. *t.* 342. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 521.

Affodilartige Schwindblume. W.

Habitat in Penſylvania. *Barthram.*

Caulis *ſimpliciſſimus, bipedalis.* Folia *alternata ſ.*

ſparſa, lineari-ſetacea, erecta, laevia, margine ſcabra. Racemus terminalis, ſimplex, pedunculis flore longioribus. Flores albi. Simillima Aſphodelo, ſed Styli tres recurvati.

*4. HELONIAS pumila. †

H. foliis lanceolatis enerviis, ſpica capitata. W.

H. foliis lanceolatis enerviis. *Iacq. ic. rar. 2. t. 453. Collect. 2. p. 260.* *

Niedrige Schwindblume. W.

Habitat in Carolina. ♃

Caulis *digitalis valde folioſus.* Flores *albi parvi in ſpica denſa ovata. Eſt proprii forte generis planta quum germen inferum.* W.

HEXAGYNIA.

*709. WENDLANDIA. W.

Androphylax Wendl. obſ. 37.

Cal. 6-phyll. *Cor.* 6-petala. *Capſ.* 6, uniloculares monoſpermae.

*1. WENDLANDIA populifolia. W.

Androphylax ſcandens. *Wendl. obſ.* 38. *

Pappelblättrige Wendlandie. W.

Habitat in Carolina. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus ſcandens, ramis teretibus, junioribus ſubpubeſcentibus ſtriatis.* Folia *alterna petiolata cordato-ovata, glanduloſo-mucronata, integerrima, nervoſo-venoſa, ſuperne glabra, ſubtus pubeſcentia.* Petioli *longi pubeſcentes.* Racemi *ſimplices petiolo dimidio breviores ſupra axillares.* Pedunculi, Bracteae *et* Calyx *externe pubeſcentes.* Flores *parvi albi.* W.

Hoc genus in memoriam Clariſſimi J. C. Wendland, botanici acutiſſimi et autoris meritiſſimi dixi. W.

[redacted]





IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)



Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



2.8
2.5
3.2
2.2
3.6
2.0
1.8
1.1
1.0

*710. DAMASONIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 624.

Spatha 1-phylla 5-alata. *Cal.* ſuperus 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* 10-locul. polyſperma.

1. DAMASONIUM *indicum.* W.

Stratiotes (*aliſmoides*) foliis cordatis. *Sp. pl.* 754. *Fl. zeyl.* 223. *Forſk. deſcr.* 101.
Ottel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 95. *t.* 46.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 279.
Indiſches Damaſonium. W.
Habitat in aquis Indiae *orientalis.* ♃ (v. ſ.)

Planta *acaulis.* Folia *omnia radicalia cordata petiolata integerrima nervoſa.* Scapus *uniflorus.* W.

POLYGYNIA.

711. ALISMA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 625.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 3. *Capſ.* plures monoſpermae.

1. ALISMA *Plantago.*

A. foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. *Oed. dan. t.* 561. *Scop. carn. n.* 449. *Pollich. pal. n.* 367. *Roth. germ. I.* 163. *II.* 428. *Hoffm. germ.* 131. *Kniph. cent.* 12. *n.* 4.
Damaſonium foliis ellipticis, lanceolatis, capitulo rotunde triquetro. *Hall. helv. n.* 1184.
Aliſma fructu obtuſo trigono. *Fl. lapp.* 138. *Fl. ſuec.* 300, 323. *Hort. cliff.* 241. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 77.
Plantago aquatica latifolia. *Bauh. pin.* 190.
Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264. *Tabernaem.* 754. *Dodon. cer.* 267. *hiſt.* 606.
β. Plantago aquatica anguſtifolia. *Bauh. pin.* 190. *Hall.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 391.
Gemeiner Froſchlöffel. W.
Habitat in Europae *aquoſis et ad ripas fluviorum, lacuum.* ♃ (v. v.)

Variat in paludibus exſiccatis foliis minoribus anguſtioribus, et in aquis profundis fluentibus foliis linearibus. W.

2. ALISMA *flava.*

A. foliis ovatis acutis, pedunculis umbellatis, fructibus globoſis. *Sp. pl.* 486.
Damaſonium maximum, plantaginis folio, flore flaveſcente, fructu globoſo. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 115.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 393.
Gelber Froſchlöffel. W.
Habitat in America *meridionali.* ♃

*3. ALISMA *ſagittifolia.* W.

A. foliis ſagittatis, fructibus obovatis obtuſis. W.
Pfeilblättriger Froſchlöffel. W.
Habitat in Guinea. ♃ (v. ſ.)

Folia *ſubrotundo-ovata baſi ſagittata, lobis acutis.* Scapus *foliis brevior floribus verticillatis.* Bracteae *lanceolatae.* Capſulae *obovatae obtuſiſſimae glabrae.* Planta *ab omnibus hujus generis ſpeciebus, et a Sagittaria obtuſifolia diſtinctiſſima.* W.

4. ALISMA *Damaſonium.*

A. foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capſulis ſubulatis. *Sp. pl.* 486. *Pall. it.* 1. *p.* 16.
Aliſma fructu ſexcorni. *Hort. cliff.* 14?. *Roy. lugdb.* 46. *Sauv. monſp.* 14.
Plantago aquatica ſtellata. *Bauh. pin.* 190.
Plantago aquatica minor altera. *Lob. ic.* 301.
Damaſonium ſtellatum. *Dalech. hiſt.* 1058.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 393.
Sternförmiger Froſchlöffel. W.
Habitat in Angliae, Galliae *aquoſis; in* Sibiria. ♃

5. ALISMA *cordifolia.*

A. foliis cordatis obtuſis, floribus dodecandris, ſeminibus uncinato-muricatis. *Sp. pl.* 487. *Swartz. obſ.* 139.*
A. foliis lunato-ſagittatis venoſis. *Brown. jam.* 204.
Damaſonium ramoſum, folio cordiformi. *Vaill. act.* 1719. *p.* 28.
Sagittaria virginiana, obtuſiore lato folio, floribus minoribus albis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 6.
Ranunculus aquaticus, aſari foliis, ad nodos umbelliferus. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 234. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 394.
Herzblättriger Froſchlöffel. W.
Habitat in America *auſtrali et ſeptentrionali.* ♃
Media inter Aliſmas et Sagittarias.

6. ALISMA *parnaſſifolia.*
A. foliis cordatis ſubrotundis acutis, capſulis ariſtatis. W.
A. foliis cordatis acutis, petiolis articulatis. *Mant.* 371. *Baſſ. Act. bonon.* 1768. *Hoffm. germ.* 131.
A. peltata, foliis patulo-cordatis. *Tourell. pilat.* 140.
Ranunculus paluſtris flore albo, graminis parnaſſi folio. *Till. piſan.* 145. *t.* 46. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 396.
Parnaſſienblättriger Froſchlöffel. W.
Habitat in paludibus Apenninorum *inque* Germania. ♃ (v. v.)
Folia *longe petiolata ut in Parnaſſia paluſtri ſed majora acutiuſcula et nervoſa.* W.

*7. ALISMA *repens.*
A. foliis lanceolatis acutis trinerviis, petalis crenatis, caule decumbente radicante. W.
A. caulibus ſubrepentibus adſcendentibus, ad nodos inferiores radicoſis et folioſis, foliis lanceolatis petiolatis, verticillis ſimplicibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 510.*
A. caulibus repentibus, foliis lanceolatis petiolatis acutis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 41. *t.* 55.*
Kriechender Froſchlöffel. W.
Habitat in humidis Hiſpaniae *et* Africae *borealis.*
Simillima ſequenti, ſed foliis *lanceolatis acutis* et petalis *crenatis diſtincta.* W.

8. ALISMA *natans.*
A. foliis ovatis obtuſis, pedunculis ſolitariis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 324. *Hoffm. germ.* 131. *Roth. germ. I.* 163. *II.* 429.*
A. foliis gramineis et ovatis, caule repente, umbella pauciflora. *Zinn. goett.* 112.
Damaſonium repens, potamogetonis rotundifolii folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 29. *t.* 4. *f.* 8.
Damoſonium radiculas emittens ex geniculis. *Vaill. pariſ.* 46.
Ranunculus paluſtris, foliis gramineis et ſubrotundis. *Petit. gen.* 47.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 394.
Schwimmender Froſchlöffel. W.

Habitat in Galliae, Sueciae, Germaniae, Sibiriae (*Pall. it.* 1. *p.* 7.) *foſſis.* ♃ (v. v.)

Capſulae, *ſaepius* 8. Flores *nonnulli ex eadem ſpatha. Secunda planta, quam ad A. plantaginem memoravit cl. Pollich, huc pertinet. Vid. ej. flor. pal. tom.* 3. *app. p.* 319. R.

9. ALISMA *ranunculoides.*

A. foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoſo-ſquarroſis. *Flor. dan. t.* 122. *Weber. ſpicil. p.* 12. *Hoffm. germ.* 131. *Roth. germ. I.* 163. *II.* 430.

A. fructu globoſo undique echinato. *Hort. cliff.* 141. *It. gotl.* 298. *Fl. ſuec.* 301, 325. *Roy. lugdb.* 46. *Gort. gelr.* 77. *Sau. monſp.* 14.

Damaſonium anguſtiſſimo plantaginis folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 35.

Plantago aquatica humilis anguſtifolia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 738. *Lob. ic.* 300.

Ranunculus aquaticus, plantaginis folio anguſtiſſimo. *T. Pet. gaz.* 41. *t.* 26. *f.* 12.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 395.

Ranunkelartiger Froſchlöffel. W.

Habitat in Gotlandiae, Belgii, Angliae, Galliae, Germaniae, *foſſis.* ♃ (v. ſ.)

10. ALISMA *ſubulata.*

A. foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 487. *Gron. virg.* 153.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 395.

Pfriemförmiger Froſchlöffel. W.

Habitat in Virginia.

Claſſis VII.

HEPTANDRIA:

MONOGYNIA.

* *Flores completi.*

712. TRIENTALIS. *Cal.* 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, plana. *Bacca* 1-locularis ſicca.
713. DISANDRA. *Cal.* ſubſeptempartita. *Cor.* rotata, ſubſeptempartita. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.
717. AESCULUS. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, inaequalis. *Capſ.* 3-locularis, 2-ſperma.
718. PETROCARYA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* carnoſa. *Nux.* 2-locul.
716. PANCOVIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-petala criſpata. *Stam.* adſcendentia.
719. IONESIA. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis. *Legumen.*

† *Pelargonium.*

* * *Flores incompleti.*

714. PISONIA. *Cal.* campanulatus 5-fidus. *Cor.* o. *Bacca* 1-ſperma.
715. PETIVERIA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Stylus* lateralis. *Sem.* 1.
720. DRACONTIUM. *Spatha* cymbiformis. *Spadix* tectus. *Cal.* o. *Cor.* 5-petala. *Bacca.*
721. CALLA. *Spatha* ovata. *Spadix* tectus. *Cal.* o. *Cor.* o. *Bacca.*

Circumſciſſam *Capſulam diximus, quae maturo fructu horizontaliter diſcedit.*

Superus *Flos ſ. Calyx, cui germen ſub receptaculo, vel cujus calyx abit in fructum ſecundum Tournefortium.*

Inferus *Flos ſ. Calyx, cui germen ſupra receptaculum, vel cujus Piſtillum abit in fructum; ex mente Tournefortii.*

Ergo Fructus *inferus et* Flos *ſuperus idem ſunt; ut ex oppoſito* Fructus *ſuperus et* Flos *inferus.*

722. HOUTTUYNIA. *Spatha* 4-phylla. *Spadix* tectus. *Cal.* o. *Cor.* o. *Capſ.* 3-locul?

D I G Y N I A.

723. LIMEUM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, aequalis. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

T E T R A G Y N I A.

724. ASTRANTHUS. *Cal.* o. *Cor.* hypocrateriformis 14-fida. *Sem.* 1.

725. SAURURUS. *Cal.* amentum. *Cor.* nulla. *Piſt.* 4. *Baccae* 4, monoſpermae.

H E P T A G Y N I A.

726. SEPTAS. *Cal.* 7-partitus. *Cor.* 7-petala. *Germina* 7. *Capſ.* 7.

† *Phytolacca ſtricta.*

MONOGYNIA.

712. TRIENTALIS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 626.

Cal. 7-phyllus. *Cor.* 7-partita, aequalis, plana. *Bacca* exſucca.

1. TRIENTALIS *europaea.*
T. foliis lanceolatis integerrimis. *Kalm. canad.* 2. *p.* 263. *Oed. dan.* 86. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 116. *Pall. it.* 2. *p.* 192. *Kniph. cent.* 4. *n.* 94.
T. foliis ſummis verticillatis. *Moench. haſſ. n.* 314.
Trientalis, *Fl. lapp.* 139. *Fl. ſuec.* 302, 326. *Roy. lugdb.* 438. *Hall. opuſc.* 123. *Kalm. it.* 2. *p.* 263.
Alſine alpina. *Swenkf. ſileſ.* 117.
Pyrola, alſines flore, europaea. *Bauh. pin.* 191. *prodr.* 101.
Pyrola, alſines flore, minor braſiliana. *Bauh. prodr.* 101. *t.* (*ſub Hermodactyli nomine*) 99. *Burſ.* X. 107.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 397.
Europäiſche Trientalis. W.
Habitat in Europae *borealis ſylvis et juniperetis.* ♃ (v. ſ.)
Stamina 5, 7, *ſaepius* 6 *cum totidem calycis laciniis.* Pall. *l. c.* R.

713. DISANDRA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 627.

Cal. ſubſeptempartitus. *Cor.* rotata, ſeptempartita. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

1. DISANDRA *proſtrata.*
D. proſtrata. *Lin. ſuppl.* 214.
Sibthorpia (*peregrina*) foliis reniformibus crenatis, pedunculis geminis. *Sp. pl.* 2. *p.* 880. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22.
Planta. *Pluk. phyt.* 257.
β. Sibthorpia (*africana*) foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis ſolitariis. *Sp. pl.* 2. *p.* 880. *Amoen. acad.* 3. *p.* 22.
Chryſoplenii foliis planta aquatica, flore flavo pentapetalo. *Schaw. afr.* 149. *f.* 149.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 399.
Liegende Diſandra. W.
Habitat in Oriente *et inſula* Madera. ♃ (v. v.)

Caules *pedales ſ. bipedales, proſtrati, teretes, pubeſcentes.* Folia *alterna, petiolata, reniformi-orbiculata, 30-crenata, pubeſcentia.* Pedunculi *axillares, bini, rarius* 1 *ſ.* 3, *erecti, filiformes, uniflori, petiolis altiores.* Corollae *luteae.*

An Sibthorpia africana *vere diſtincta* ſpecies? *Floris partes omnium maxime numero inconſtantes: ſeptenarius numerus frequentiſſimus eſt; quinarius naturaliſſimus, ſed rariſſimus, certe in culta.*

714. PISONIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1603.

Cal. campanulatus quinquefidus. *Cor.* o. *Bacca* 1-locularis monoſperma.

1. PISONIA *aculeata.*

P. ſpinis axillaribus horizontalibus, foliis ovatis utrinque attenuatis, corymbis axillaribus. W.

P. ſpinis axillaribus patentiſſimis. *Sp. pl.* 1511. *Iacq. amer.* 274. *

Piſonia. *Hort. cliff.* 457.

P. aſſurgens, ſarmento valido, foliis ovatis utrinque productis, ſpinis validis recurvis, recemis lateralibus. *Brown. jam.* 258.

P. aculeata, fructu glutinoſo et racemoſo. *Plum. gen.* 7. *ic.* 227. *f.* 1.

Rhamnus ſ. Lycium Fringego jamaicenſibus dictum. *Pluk. alm.* 318. *t.* 108. *f.* 2.

Paliuro affinis arbor ſpinoſa, flore herbaceo pentapetaloide, fructu ſicco nudo canaliculato lappaceo. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 25. *t.* 167. *Raj. dendr.* 95.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 524.

Stachliche Piſonie. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*2. PISONIA *ſubcordata.*

P. inermis, foliis cordato-ſubrotundis, fructibus ſiccis ſubclavatis pentagonis, angulis apice muricatis. *Swartz. prod.* 60. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 641. *

Herzblättrige Piſonie. W.

Habitat in Antigua, *inſulisque* St. Chriſtophori *et* Bartholomaei. ♄

*3. PISONIA *nigricans.*

P. inermis, foliis ovatis acuminatis, floribus cymoſis

erectis, fructibus baccatis. *Swartz. prod.* 60. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 643. *

Piſonia (*inermis*) caule inermi. *Iacq. amer.* 275. *

Schwärzliche Piſonie. W.

Habitat in Iamaicae *et* Hiſpaniolae *ſylveſtribus montium.* ♄

*4. PISONIA *coccinea.*

P. inermis, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis terminalibus laxis, floribus nutantibus, fructibus baccatis. *Swartz. prod.* 60. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 645. *

Rothbeerige Piſonie. W.

Habitat in fruticetis Hiſpaniolae. ♄

5. PISONIA *mitis.* †

P. inermis, foliis ovatis, floribus axillaribus. W.

P. caule inermi. *Sp. pl.* 1511.

P. malabarica non ſpinoſa. *Amm. herb.* 582.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 522.

Wehrloſe Piſonie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄.

Planta *valde obſcura.* W.

715. PETIVERIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 623.

Cal. tetraphyllus. *Cor.* 0. *Stylus* lateralis. *Stigma* penicilliforme. *Sem.* 1, ariſtis quatuor reflexis apice inſtructum.

1. PETIVERIA *alliacea.*

P. floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *Hort. upſ.* 91. *Act. holm.* 1744. *p.* 287. *t.* 7. *Trew. Ehr.* 33. *t.* 67. *Mat. med.* 106. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 2. *n.* 53. *Swartz. obſ.* 138. *

P. foliis oblongo-ovatis, ſpicis longioribus terminalibus. *Brown. jam.* 274.

Verbenae aut Scorodoniae affinis anomala, flore albido, calyce aſpero allii odore. *Sloan. jam.* 64. *hiſt.* 1. *p.* 172. *Raj. ſuppl.* 287.

β. P. (*octandra*) floribus octandris. *Iacq. amer.* 201. *Mill. dict. n.* 2.

P. ſolani foliis, loculis ſpinoſis. *Plum. gen.* 50. *ic.* 219.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 400, 401.

Knoblauchduftige Petiverie. W.

Habitat in Jamaicae *nemoroſis aridis.* ♄ (v. v.)

*716. PANCOVIA. W.

Cal. campanulatus 4-partitus. *Pet.* 4, unguiculata plicato-criſpa dentata cucullata. *Stam.* adſcendentia calyce longiora.

*1. PANCOVIA *bijuga.* W.
Geſiederte Pancovie. W.
Habitat in Guinea. ♄ (v. f.)

Arbor *ramis teretibus, ramulis ferrugineo-pubeſcentibus.* Folia *alterna pari-pinnata, foliolis bijugis petiolatis coriaceis ellipticis apice, attenuatis, obtuſis, integerrimis venoſis glabris.* Petioli *juniorum pubeſcentes, adultiorum transverſim rugoſi.* Racemi *interfoliacei in ramis praeteriti anni breves ſimplices multiflori.* Flores *pedunculati cum pedunculis pubeſcentes.* Bracteae *ovatae obtuſae pedunculis breviores denſe pubeſcentes.* Calyx *campanulatus externe valde pubeſcens, ad baſin usque quadripartitus, laciniis ovatis, binis parum longioribus.* Corolla *tetrapetala, petalis calyce parum brevicribus, receptaculo ad baſin cujusque laciniae inſertis unguiculatis;* lamina *dentata cucullata criſpato-plicata.* Filamenta *ſeptem ſubulata receptaculo inter binas lacinias calycis longiores inſerta, calyce duplo longiora adſcendentia a baſi ad medium piloſa.* Antherae *oblongae incumbentes.* Neque piſtillum *neeque fructum vidi, loco piſtilli obſervavi corpus depreſſo-planum ut videtur glanduloſum. Celeberrimus Iſert, detector hujus plantae, ſtamina ſeptem et piſtillum unicum adnotavit in ſchedula ſpecimini meo affixa; ſed in floribus quatuor a me examinatis nullum aderat piſtillum, forte arbor polygama. Dixi hoc genus in memoriam botanici ſuo tempore celebri D. Thomae Pancovii.* W.

717. AESCULUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 628.

Cal. 1-phyllus, 4 f. 5-dentatus, ventricoſus. *Cor.* 4 f. 5-petala, inaequaliter colorata, calyci inſerta. *Capſ.* 3-locularis.

1. AESCULUS *Hippocaſtanum.*
A. foliis digitatis ſeptenis: corollis pentapetalis patulis. *Willd. arb.* 12. *

A. foliolis ſeptenis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 493.
A. floribus heptandris. *Hort. upſ.* 29. *Mill. dict. n.* 1. *et illuſtr. Du Roi. harbk.* 1. *p.* 34. *Kniph. cent.* 3. *n.* 3. *Roth. germ.* 353.
Aeſculus. *Hort. cliff.* 142. *Roy. lugdb.* 463.
Hippocaſtanum. *Hall. helv. n.* 1029. * * *
Caſtanea folio multifido. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 7. *Bauh. pin.* 419.
Caſtanea equina. *Raj. hiſt.* 683.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 438.
Gemeine Roſskaſtanie. W.
Habitat in Aſia *ſeptentrionaliore, unde in Europam* 1550. ♄ (v. v.)

2. AESCULUS *Pavia.*

A. foliis quinatis glabris inaequaliter dentatis, corollis tetrapetalis, petalorum conniventium unguibus longitudine calycis. *Willd. arb.* 12. *
A. foliis quinis, corollae laminis obovatis, unguibus longitudine calycis. *Ait. Kew.* 1. *p.* 494.
A. floribus octandris. *Willich. obſ.* 73. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 41. *Wangenh. amer.* 56. * *Swartz. obſ.* 140. *
Pavia. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 260. *t.* 260. *Hort. angl.* 54. *t.* 19. *Hort. cliff.* 143. *Roy. lugdb.* 463. *Trew. ehret. t.* 15. *Mill. ic.* 198. *Duham. arb.* 2. *p.* 98.
Saamouna piſonis ſ. ſiliquifera braſilienſis arbor, digitatis foliis ſerratis, floribus teucrii purpureis. *Pluk. alm.* 326. *t.* 56. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 444.
Rothe Roſskaſtanie. W.
Habitat in Carolina, Florida, Braſilia. ♄ (v. v.)
Flores *in utraque Hermaphroditos et Maſculos obſervarunt D. von Royen, Millerus. Huic calyx et* Corolla *ſanguinea.* Flores *umbellati.* Corolla 4-*petala, clauſa.*

*3. AESCULUS *flava.*

A. foliis quinatis ſubtus ad coſtam pubeſcentibus aequaliter ſerrulatis, corollis tetrapetalis, petalorum conniventium unguibus calyce longioribus. *Willd. arb.* 13. *
A. (*flava*) foliolis quinis, corollae laminis cordato-ſubrotundis, unguibus calyce duplo longioribus. *Ait. Kew.* 1. *p.* 494.

A. (*lutea*) corollis heptandris luteis viſcoſis clauſis, foliis digitatis ovato-lanceolatis ſerratis. *Wangenh. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol.* 8. *p.* 133. *t.* 6. *
Gelbe Roſskaſtanie. W.
Habitat in Carolina *boreali.* ♄ (v. v.)

*718. PETROCARYA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 629.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 14, quorum 7 ſterilia. *Drupa* carnoſa fibroſa. *Nux* bilocularis, loculis monoſpermis.

*1. PETROCARYA *montana.*
P. foliis ovatis acuminatis. W.
Parinari (*montana*) foliis ovatis acuminatis, magno fructu *Aubl. guj.* 1. *p.* 514. *t.* 204, 205. *
Berg Steinnuſs. W.
Habitat in ſylvis interioris Gujanae. ♄

*2. PETROCARYA *campeſtris.*
P. foliis cordatis acuminatis. W.
Parinari (*campeſtris*) foliis cordatis acutis, fructu parvo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 517. *t.* 206. *
Feld Steinnuſs. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄
In binis hisce ſpeciebus ſunt folia *alterna petiolata ſubtus albo-tomentoſa,* ſtipulae *lanceolatae oppoſitae caducae.* W.

719. IONESIA.

Roxburgh Aſiat. Reſearch. 4. *p.* 355.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* infundibuliformis tubo clauſo carnoſo, limbo 4-fido. *Nectar.* annulus fauci tubi corollae inſertus ſtaminiferus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* acinaciforme 4-8 ſpermum.

*1. IONESIA *pinnata.*
Ioneſia. *Roxb. Aſiat. Reſearches* 4. *p.* 355. *
Asjogam. *Rheed. malab.* 5. *p.* 117. *t.* 59.
Gefiederte Ioneſie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

Arbor *mediocris.* Folia *alterna impari-pinnata, foliolis quadri-ſ. ſexjugis oblongo-lanceolatis glabris nitidis firmis.* Flores *aurantii coloris cymoſi breviſſime pedunculati terminales et axillares.* Roxb.

720. DRACONTIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 630.

Spatha cymbiformis. *Spadix* floribus denſe tectus. *Cal.* o. *Cor.* 5-petala. *Bacca* polyſperma.

1. DRACONTIUM *polyphyllum.*

D. foliis ſupradecompoſite-pedatis, laciniis pinnatifidis, ſcapo petiolis multo breviore. W.

D. ſcapo breviſſimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis, laciniis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 434.* *Roy. lugdb.* 6. *Mill. dict. n.* 2.

Arum polyphyllum caule ſcabro punicante. *Herm. parad.* 93. *t.* 93.

Arum polyphyllum ſurinamenſe, caule atrorubente glabro et eleganter variegato. *Pluk. alm.* 52. *t.* 149. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 150.

Vielblättrige Zehrwurz. W.

Habitat Surinami *et paſſim inter tropicos* Aſiae. ♃

2. DRACONTIUM *ſpinoſum.*

D. foliis ſagittatis, pedunculis petiolisque aculeatis. *Fl. zeyl.* 328. *Mill. dict. n.* 3.

Arum zeylanicum ſpinoſum ſagittae foliis. *Herm. prod.* 75.

Arum minus zeylanicum ſagittae foliis. *Raj. ſuppl.* 575.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 150.

Stachliche Zehrwurz. W.

Habitat in Zeylona. ♃

3. DRACONTIUM *foetidum.*

D. foliis ſubrotundis concavis. *Cold. noveb.* 214.* *Kalm. it.* 3. *p.* 47. *Gron. virg.* 141.

Calla aquatilis, odore allii vehemente praedita. *Gron. virg.* 1. *p.* 136.*

Arum americanum betae folio. *Cateſb. car.* 2. *p.* 71. *t.* 71.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 151.

Stinkende Zehrwurz. W.

Habitat in Virginiae, Carolinae *aquis.* ♃

An Pothos *potius ſpecies?*

4. DRACONTIUM *camtchatcenſe.*
D. foliis lanceolatis, ſpatha membranacea colorata baſi convoluta. W.
D. foliis lanceolatis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 360. *Mill. dict. n.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 152.
Camtſchatiſche Zehrwurz. W.
Habitat in Sibiria. ♃
Folia *ſpithamaea inferne attenuata in petiolos baſi dilatatos.* Spatha *lanceolata membranacea colorata, inferne convoluta.* Spadix *nudus.* Spica *ovata denſiſſima.*

*5. DRACONTIUM *lanceaefolium.*
D. foliis ovato-lanceolatis, ſpatha viridi plana. W.
D. foliis lanceolatis, ſpatha viridi ſpadicem multoties ſuperante. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 612. *Collect.* 4. *p.* 118. *
Lanzenblättrige Zehrwurz. W.
Habitat ad Caraccas *in arboribus paraſiticum.* ♃

6. DRACONTIUM *pertuſum.*
D. caule ſcandente, foliis cordato-ovatis pertuſis. W.
D. foliis pertuſis caule ſcandente. *Mill. dict. n.* 1. *ic. t.* 296. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 29. *t.* 184. 185. *
Arum hederaceum amplis foliis perforatis. *Plum. amer.* 40. *t.* 56. 57.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 152.
Durchlöcherte Zehrwurz. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

721. CALLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1388.

Spatha plana. *Spadix* tectus floſculis. *Cal.* o. *Cor.* o. *Bacca* polyſperma.

1. CALLA *aethiopica.*
C. foliis ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo. *Hort. cliff.* 435. *Mill. dict. n.* 1. *Lederm. microſc.* 57. *t.* 18. 19.
Arum aethiopicum flore albo odorato moſchum olente. *Comm. hort.* 1. *p.* 95. *t.* 50.
Arum americanum ari vulgaris facie, foliis carnoſis. *Mich. flor.* 9. *t.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 153.

Capſches Schlangenkraut. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

2. CALLA *paluſtris.*

C. foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito. *Hort. cliff.* 436. *Fl. ſuec.* 744. 822. *Mill dict. n.* 2. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 1. *Fabr. helmſt.* 42. *Pollich. pal. n.* 865. *Fl. dan.* 422. *Hoffm. germ.* 321. *Roth germ. I.* 384.
C. foliis cordatis. *Fl. lapp.* 320.
Dracunculus paluſtris ſ. radice arundinacea. *Bauh. pin.* 195.
Dracunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 530.
Provenzalia paluſtris. *Petit. gen.* 45.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 10. *p.* 154.
Gemeines Schlangenkraut. W.
Habitat in Europae *borealis paludibus.* ♃ (v. v.)

3. CALLA *orientalis.* †

C. foliis ovatis. *Gron. orient.* 282. † *Mill. dict. n.* 3.
Arum minus orientale rotundioribus foliis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 544.
Arum Carſaami. *Rauw. it.* 115.
Orientaliſches Schlangenkraut. W.
Habitat Halepi *in montoſis.* ♃

Dubiam hanc plantam iterum propono, licet in noviſſimis ſyſtematis vegetabilium editionibus ſit omiſſa. W.

*722. HOUTTUYNIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1389.

Spatha tetraphylla. *Spadix* floſcalis tectus. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Capſula?*

*1. HOUTTUYNIA *cordata.*

H. cordata. *Thunb. jap.* 234. *t.* 26. *
Herzblättrige Houttuynie. W.
Habitat in Japonia *inter* Miaco *et* Jedo *ubique in foſſis viarum et juxta villas vulgatiſſima.* ♃

Caulis *ſimpliciſſimus erectus.* Folia *alterna petiolata cordata acuminata integerrima venoſa.* Stipula *ad petioli baſin lanceolata.* Pedunculus *petiolaris.* Spatha *inaequalis ſpadice longiore.* W.

D I G Y N I A.

723. L I M E U M.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 631.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, aequalia. *Capſ.* globoſa, 2-locularis.

1. LIMEUM *africanum.*

L. foliis oblongis petiolatis. *Lin. ſuppl.* 214.
L. foliis ovato-lanceolatis ſubpetiolatis. *Thunb. prod.* 68.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 400.
Längliches Limeum. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Statura *Corrigiolae ſ. Telephii.* Caules *proſtrati debiles, ſpithamaei, angulati, nudi, baſi perennantes.* Folia *alterna, remota, lineari-lanceolata, parva, ſubpetiolata.* Corymbi *terminales, ſolitarii, compoſiti, nudi, longius pedunculati.*

2. LIMEUM *capenſe.*

L. foliis ovatis ſeſſilibus. *Thunb. prod.* 68.
L. (*aphyllum*) foliis ovatis ſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 214.
Eyförmiges Limeum. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

Videtur eſſe aphyllum.

*3. LIMEUM *aethiopicum.*

L. foliis lineari-lanceolatis. *Thunb. prod.* 68.
Linienblättriges Limeum. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

T E T R A G Y N I A.

*724. A S T R A N T H U S.

Loureiro cochin. p. 273.

Cal. o. *Cor.* hypocrateriformis, limbo 14-fido. *Sem.* 1, parvum ſuperum.

*1. ASTRANTHUS *cochinchinenſis.*

A. cochinchinenſis. *Loureiro cochin.* 1. *p.* 274.
Cochinchineſiſche Sternblüte. W.
Habitat in Cochinchina. ♄

Arbor *mediocris, ramis paucis adſcendentibus.* Folia *ovata ſerrata lanuginoſa petiolata alterna.* Flos *pallidus duriuſculus, ſpicis longis ſimplicibus axillaribus.* Lour. l. c.

Auctoritate Clariſſ. Swartz hoc genus aſſumſi, qui ſpecimen a Loureiro miſſum poſſidet, et diſtinctum genus eſſe, mihi in litteris ſcripſit. W.

725. SAURURUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 632.

Cal. amentum ſquamis 1-floris. *Cor.* 0, *Germ.* 4. *Baccae* 4, 1-ſpermae.

1. SAURURUS *cernuus.*
S. caule folioſo polyſtachio. *Syſt. veg.* 291.
S. foliis cordatis petiolatis, amentis ſolitariis recurvis. *Hort. upſ.* 91. *Sp. pl.* 2. *p.* 489. *Mill. dict. et illuſtr. Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 7.
S. foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, ſpicis ſolitariis. *Hort. cliff.* 139. *Gron. virg.* 40. *Roy. lugdb.* 8.
Serpentaria repens, floribus ſtamineis ſpicatis, bryoniae nigrae folio ampliore pingui. *Pluk. alm.* 343. *t.* 117. *f.* 3. 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 402.
Hängender Eydexenſchwanz. W.
Habitat in Virginia. ♃ (v. v.)
Amenti *Squamae petiolatae, albae; at defloratae viresſcentes, pedicellis incurvatis ad rachin, germini incumbentibus.* Stamina *vix numerantur, niſi deflorato amento perſiſtentia.*

HEPTAGYNIA.

726. SEPTAS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 633.

Cal. 7-partitus. *Petala* 7. *Germina* 7. *Capſ.* 7, polyſpermae.

1. SEPTAS *capenſis.*
Septas. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 13. *
Craſſula (*Septas*) foliis connatis crenatis ſubrotundis, caule ſubaphyllo umbellifero. *Thunb. prod.* 57.
Doronici? ſpecies pumila, auriculae urſi folio glabro. *Pluk. mant.* 65. *t.* 340. *f.* 9.
Trientalis foliis ſubrotundis crenatis. *Roy. lugdb.* 538.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 404.
Capſcher Siebenling. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ *Dav. v. Royen.* (v. ſ.)

Claſſis VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

* *Flores completi.*

743. MIMUSOPS. *Cor.* 8-petala. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Drupa.*

745. CUPANIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis, loculis monoſpermis. *Sem.* arillatum.

765. DIMOCARPUS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-dentatus. *Baccae* 2, monoſpermae.

727. TROPAEOLUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, inferus, calcaratus. *Nuces* 3.

779. BAECKEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Capſ.* 4-locularis.

747. EPHIELIS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus, *Capſ.* 1-locul. 2-ſperma.

748. MOLINAEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 3-locul. 3-valvis.

742. HONCKENYA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Nectar.* ſtaminiformia! *Capſ.* echinata.

751. HAGENIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-phyll. *Nectar.* 5-phyllum.

766. MEMECYLON. *Cor.* 4-petala. *Cal.* integerrimus, ſuperus.

734. COMBRETUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-dentatus, ſuperus. *Sem.* 4.

738. ROXBURGHIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Antherae* nectario inſertae. *Capſ.* 2-valvis.

732. EPILOBIUM. *Cor* 4-petala. *Cal.* 4-fidus tubuloſus ſuperus. *Capſ.* 4-locularis. *Sem.* comoſa.

731. GAURA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus tubuloſus ſuperus. *Nux* 1-ſperma.

Coma *dicitur lana pappiformis in ſeminibus pericarpio incluſis.*

Pappus *ergo tantum in plantis gymnoſpermis adeſt, eſt calycis ſpecies.* W.

730. OENOTHERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus tubuloſus ſuperus. *Capſ.* 4-locul. *Anther.* lineares.

735. VITMANNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus inferus. *Nux* 1-ſperma.

729. RHEXIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 4-locularis ſupera. *Anth.* arcuatae.

728. OSBECKIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 4-locularis infera. *Anth.* roſtratae.

737. TETRATHECA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Antherae* 4-loculares! *Capſ.* 2-locularis.

736. GRISLEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Capſ.* 1-locularis.

750. KOELREUTERIA. *Cor.* 4-petala nectario cylindrico. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis.

752. PERSOONIA. *Cor.* 4-petala nectario cylindrico. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 1-locul. polyſperma.

753. GUAREA. *Cor.* 4-petala nectario cylindrico. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Capſ.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* ſolitaria.

741. CORREA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus. *Capſ.* 4-locul. loculis 1-ſpermis.

733. ANTICHORUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Capſ.* 4-locul. 4-valvis polyſperma.

740. ALLOPHYLUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Stigma* 4-fidum.

739. ORNITROPHE. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus inferus. *Styl.* 2-fidus. *Baccae* 2, monoſpermae.

744. IAMBOLIFERA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Filamenta* planiuſcula. *Drupa.*

746. XYLOCARPUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus inferus. *Nect.* 8-fidum. *Drupa* ſicca.

757. XIMENIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Nect.* 0. *Drupa* 1-ſperma.

763. LAWSONIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Bacca* 4-locularis.

749. MELICOCCA. *Cor.* 4-petala, refracta. *Cal.* 4-partitus. *Drupa* corticoſa. *Stigm.* peltatum, anceps.

755. AMYRIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-dentatus, inferus. *Bacca* 1-ſperma.

764. MELICOPE. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 4, monoſpermae.

775. GNIDIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus corollifer. *Nux* monoſperma.

758. FUCHSIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus corollif. *Bacca* 4-locularis, polyſperma.

754. HEDWIGIA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* 4-dentatus. *Capſ.* tricocca.

760. MICHAUXIA. *Cor.* 8-partita. *Cal.* 16-partitus. *Capſ.* 8-locularis.

759. CHLORA. *Cor.* 8-fida. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locul. 2-valvis, polyſperma.

768. VACCINIUM. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-dentatus, ſuperus. *Filam.* receptaculi. *Bacca.*

769. MENZIESIA. *Cal.* repandus inferus. *Cor.* 1-petala. *Filam.* receptaculi. *Capſula.*

770. ERICA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Filam.* receptaculi. *Capſula.*

† *Rizophora Mangle. Aeſculus Pavia. Monotropa Hypopithys Ruta graveolens. Juſſiaeae nonnullae ſpecies. Portulaca quadrifida. Portulaca meridiana. Capparides duas. Dais octandra. Ammannia octandra. Fagara octandra. Melaſtomae nonnullae ſpecies. Trichilia pallida, acuminata. Gilibertia ovata, heterophylla. Elais. Cleome juncea.*

* * *Flores incompleti.*

771. OPHIRA. *Cal.* o. *Involucr.* 2-valve triflorum. *Cor.* 4-petala ſupera. *Bacca* 1-locularis.

772. GRUBBIA. *Cal.* o. *Involucr.* 2-phyll. triflorum. *Cor.* 4-petala infera.

767. BUGINVILLAEA. *Cal.* o. *Cor.* tubuloſa ſubintegra. *Stam.* incluſa.

778. LACHNAEA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, inaequalis. *Stam.* exſerta.

774. DIRCA. *Cal.* elimbis, corollinus, inaequalis. *Stam.* exſerta.

773. DAPHNE. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* incluſa. *Drupa* pulpoſa monoſperma.

777. PASSERINA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* ſupra corollam.

776. STELLERA. *Cal.* 4-fidus, corollinus, aequalis. *Stam.* incluſa. *Nux.*

761. DODONAEA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *Capſ.* 3-locularis.

762. VALENTINIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Capſ.* baccata 4-ſperma.

756. CEDROTA. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o.

† *Rivina octandra. Samyda nitida. Caſearia ſpinoſa, tomentoſa.*

DIGYNIA.

783. CODIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Involucrum* 4-phyllum.
782. WEINMANNIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris.
784. MOEHRINGIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 1-locularis.
780. SCHMIEDELIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Pericarp.* 2, pedicellata.
781. GALENIA. *Cor.* o. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 2-locularis, 2-ſperma.

† *Chryſoſplenium. Polygonum penſylvanicum.*

TRIGYNIA.

788. SERIANA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Samarae* 3.
787. PAULLINIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 3-locularis, 1-ſperma.
789. CARDIOSPERMUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 3-locul. 1-ſperma.
791. PONAEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Capſ.* 3-locul. 3-ſperma.
790. SAPINDUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca 3-cocca*, 1-ſperma.
786. COCCOLOBA. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* calycina, 1-ſperma.
785. POLYGONUM. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus. *Sem.* 1, nudum.

TETRAGYNIA.

794. ADOXA. *Cor.* 4 ſ. 5-fida, ſupera. *Cal.* 2-phyllus. *Bacca* 4 ſ. 5-ſperma.
792. VEREA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 4, polyſpermae.
796. HALORAGIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Drupa* ſicca 4-locularis.

795. **ELATINE.** *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 4-locularis.

793. **PARIS.** *Cor.* 4-petala, ſubulata. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 4-locularis.

797. **FORSKOLEA.** *Cor.* 8-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Sem.* 4.

† *Petiveria alliacea. Myriophyllum verticillatum.*

PENTAGYNIA.

† *Cotyledon laciniata.*

OCTOGYNIA.

† *Phytolacca octandra, ſtricta.*

Samara *eſt pericarpium mono-vel diſpermum, non dehiſcens, apice vel margine ala membranacea inſtructum.* W.

MONOGYNIA.

727. TROPAEOLUM.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 634.

Cal. 1-phyllus, calcaratus. *Petala* 4, inaequalia. *Nuces* 3, coriaceae.

1. TROPAEOLUM *minus.*

T. foliis peltatis ſubrepandis mucronatis, petalis acutis. W.
T. foliis integris, petalis acuminato-ſetaceis. *Hort. upſ.* 93. *Mill. dict. n.* 1. *Curt. mag.* 98.
T. foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 145.
Cardamindum minus et vulgare T. *Fewill. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Naſturtium indicum minus. *Bauh. pin.* 306.
Naſturtium indicum. *Lob. ic.* 516. *f.* 2, 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 406.
Kleine Capucinerkreſſe. W.
Habitat in Peru, Limae *innotuit* 1580. *per Dodonaeum.* ⊙ ♃ (v. v.)

2. TROPAEOLUM *majus.*

T. foliis peltatis repandis, petalis obtuſis. W.
T. foliis peltatis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *Hort. upſ.* 93. *Mat. med.* 101. *Mill. dict. n.* 2. *Knorr. del.* 1. *tab. R.* 18. *Regn. bot.*
T. foliis peltatis orbiculatis. *Hort. cliff.* 143.
Cardamindum ampliori folio et majori flore. *T. Few. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Acriviola maxima odorata. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 244.
Viola inodora ſcandens, naſturtii ſapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628. *t.* 629.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 407.
Groſse Capucinerkreſſe. W.
Habitat in Peru, *unde in Europam venit* 1684. *cura Bewerningii.* ⊙ ♃ (v. v.)

Flores ante crepuſculum fulminant, obſervante E. C. *Linnaea.*

3. TROPAEOLUM *hybridum.*

T. foliis ſubpeltatis quinquelobis, lobis obtuſis ſubrepandis, petalis cuneatis apice dentatis. W.
T. foliis ſubpeltatis quinquelobis integerrimis, petalis

variantibus. *Mant.* 64. *Berg. act. holm.* 1765. *p.* 32. *t.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 408.
Baſtard Capucinerkreſſe.
Habitat nullibi, a praecedente noviter orta Holmiae in Horto Ehrenreich, *ſemine rarius, ſed ramis propaganda planta.* H. V.

Statura *Tropaeolorum reliquorum magnitudine reliquisque.* Folia *differunt, quae non peltata, ſed latius cuneata, nutantia, fere quinqueloba: lobis acutiuſculis, nuda, nervoſa, venoſa, petiolis triplo breviora, margine omni adſcendente, praeprimis laterali, qui cum oppoſita baſi coadunatus, uti ibi fere cucullatum euadat folium et omnium laeviſſime peltatum.* Nectarium *obtuſum.* Corolla *vix unquam determinata.*

4. TROPAEOLUM *peregrinum.*

T. foliis ſubpeltatis quinquelobo-palmatis ſubdentatis, petalis laciniatis. W.
T. foliis ſubpeltatis quinquelobis dentatis, petalis ciliato-laceris. *Mant.* 371.
T. petalis ſerrato-inciſis duobus maximis, tribus minimis. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 51. *t.* 68. *
Cardamindum quinquefolii folio, vulgo Malla. *Few. peruv.* 2. *p.* 756. *t.* 42.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 409.
Fremde Capucinerkreſſe. W.
Habitat in Peru. ⊙ (v. v.)

Folia *leviter peltata, profunde* 5 *fida: lacinia media* 3*-loba; proximis lobo unico exteriore.* Petala *vix calyce longiora, ciliato-multifida.* Calycis *tubulus craſſiuſculus, corolla multo longior.*

Petala ſunt calyce longiora laciniata ciliata pallide flava. W.

*5. TROPAEOLUM *pentaphyllum.*

T. foliis quinatis, foliolis integerrimis acutis, petalis calyce brevioribus integerrimis acutis. W.
T. foliis digitato-quinatis foliolis ovalibus integris ſubpetiolatis, petalis omnibus ſeſſilibus brevibus acutis integerrimis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 605. *t.* 277. *f.* 2. *
Fünfblättrige Capucinerkreſſe. W.
Habitat ad Monte Video *in* Bonaria.

728. OSBECKIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 635.

Cal. 4-fidus: Lobis ſquama ciliari interſtinctis. *Cor.* 4-petala. *Antherae* roſtratae. *Capſ.* 4-locularis, calycis tubo truncato cincta.

1. OSBECKIA *chinenſis.*

O. foliis ſeſſilibus, calycibus glabris. W.

O. foliis ſeſſilibus, pedunculis axillaribus trifloris bracteatis. *Lin. ſuppl.* 215.

Oſbeckia. *Oſb. it.* 213. *t.* 2.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 413.

Chineſiſche Oſbeckie. W.

Habitat in China; *in honorem* Petr. Oſbeck, *Sueci, qui* 1751. *plantas* Chinae *et* Iavae *periculoſo itinere adiit, legit, examinavit, deſcripſit, communicavit.*

Habitus Melaſtomae. Caulis *erectus, brachiatus, acute tetragonus.* Folia *anguſto-lanceolata, trinervia, oppoſita, ſcabra, ſubſeſſilia.* Flores *terminales aliquot ſeſſiles, cincti foliis* 4 *flore longioribus patentibus.*

2. OSBECKIA *zeylanica.*

O. foliis petiolatis calycibus hiſpidis. W.

O. foliis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris nudis. *Lin. ſuppl.* 215.

Echinophora maderaſpatana, ſideritis non ſerratis nervoſis foliis, fructu capſulari caucalidis aemulo. *Pluk. alm.* 142. *t.* 173. *f.* 4.

Kadali maderaſpatanum minus, capſulis piloſis. *Raj. ſuppl. app.* 236.

Zeylaniſche Oſbeckie. W.

Habitat in Zeylona. (v. ſ.)

Facies O. chinenſis.

Folia *petiolata lineari-lanceolata acuta tenuiſſime apice ſerrata, ut tota planta ſtrigoſa.* Flores *terminales tres vel quatuor pedunculati, et in axillis ſolitarii pedunculati.* Calyx *ſetis longis tectus.* W.

Oſbeckiae a Rhexiis differre videntur germine infero, quum capſula libera ac calyce incluſa. W.

729. RHEXIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 636.

Cal. 5-fidus. *Pet.* 4, calyci inſerta. *Antherae* declinatae. *Capſ.* 4-locularis, intra ventrem calycis.

* *Foliis ſeſſilibus.*

1. RHEXIA *virginica.*

R. foliis ſeſſilibus lanceolatis trinerviis ſerrato-ciliatis, calycibus glanduloſo-ciliatis. W.

R. foliis ſeſſilibus ſerratis, calycibus glabris. *Gron. virg.* 41. *Mill. dict. n.* 1.

Aliſanus vegetabilis carolinianus. *Pluk. amalth.* 8.

Lyſimachia non pappoſa virginiana, tuberariae foliis hirſutis, flore tetrapetalo rubello. *Pluk. alm.* 235. *t.* 202. *f.* 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 410.

Virginiſche Rhexie. W.

Habitat in Virginia. ♃ (v. ſ.)

Caulis *tetragonus angulis membranaceis.* Folia *oppoſita, ſublanceolata, internodiis longiora, ſeſſilia, trinervia, pilis vagis hiſpidiuſcula, ſubſerrata ſerraturis ſetaceis.* Pedunculus *terminalis, dichotomus.* Flores *ſolitarii ex dichotomia, ſubſeſſiles, petalis rubris; Antheris falcatis, luteis.*

2. RHEXIA *mariana.*

R. foliis ſeſſilibus lanceolatis trinerviis villoſo-ciliatis, calycibus ſtellato-piloſis. W.

R. foliis ciliatis. *Mill dict. n.* 2.

Lyſimachia non pappoſa, terrae marianae, leptoneuros, flore tetrapetalo rubello, folio et caule hirſutie ferruginea hiſpidis. *Pluk. mant.* 123. *t.* 428. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 411.

Mariäniſche Rhexie. W.

Habitat in Marilandiae *pratis.* ♃

Calyx adſperſus ſetis apice ſtellatis.

*3. RHEXIA *trichotoma.* †

R. foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis trinerviis villoſo-ciliatis, pilis calycinis faſciculatis glanduloſis. W.

R. floribus ſolitariis axillaribus terminalibusque, foliis ſeſſilibus oppoſitis lanceolatis hirſutis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 48.*

R. caule inferne trichotomo, apicibus dichotomis filiformibus, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Rottb. pl. ſurinamenſ. p. 9. tab. 5.* *

Aeſtige Rhexie. W.

Habitat Surinami. ♄

*4. RHEXIA *bivalvis.*

R. decandra, foliis ſeſſilibus glabris ovatis obtuſis trinerviis, capſula bivalvi. W.

R. glabra, decandra, foliis oblongis ſeſſilibus obſcure crenatis obtuſis, pedunculis terminalibus unifloris. *Vahl. eclog. 1. p. 38.* *

Melaſtoma (*bivalvis*) caule alato, foliis ovatis obtuſis trinerviis ſeſſilibus. *Aubl. guj. 1. p. 404. t. 155. f. 4.* *

Zweyklappige Rhexie. W.

Habitat in pratis paludoſis Gujanae. ☉

*5. RHEXIA *trivalvis.*

R. decandra, foliis ſeſſilibus glabris lineari-lanceolatis acutis, obſolete trinerviis, capſula trivalvi. W.

R. glabra, decandra, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus ſupra punctatis integerrimis, pedunculis unifloris. *Vahl. eclog. 1. p. 39.* *

Melaſtoma (*trivalvis*) foliis linearibus acutis, capſula trivalvi. *Aubl. guj. 1. p. 406. t. 155. f. 6.* *

Dreyklappige Rhexie. W.

Habitat in pratis paludoſis Gujanae. ☉

6. RHEXIA *Juſſiaeoides.*

R. foliis alternis coſtatis margine ſcabris. *Lin. ſuppl. 215.*

Juſſieuaartige Rhexie. W.

Habitat in Surinamo. *C. G. Dalberg.* ♄

Frutex *pubeſcens uti pedunculi et fructus quadripedalis.* Folia *alterna ſubſeſſilia confertiuscula lanceolata vix digitalia, magis ſecunda, margine ſcabra ex minutiſſimis ſerraturis coſtata, nervis ſubtus prominulis.* Flores *axillares ſolitarii pedunculati vix foliorum longitudine flavi.* Perianthium *medium fere ſuperum quadripartitum lanceolatum acutum patens perſiſtens.* Petala *quatuor ſubovata calyce duplo longiora ſeſſilia.* Filamenta *octo breviora.* Antherae *incumbentes lineares longitudine calycis ſ. filamentis longiores.* Germen *inferum longitudine calycis prominulum.* Stylus *cylindricus longitudine ſtaminum.* Stigma *recutitum verrucoſum.* Capſula *obovata tetragona longitudine caly-*

cis, apice inter calycem laminulis quatuor, quadrilocularis. Semina *numeroſa parva. Singulare quod ſtigma nudum verrucoſum indiviſum ovatum, quaſi margine quadridentato cinctum, quodque capſula intra calycem prominens, quaſi quatuor laminis adglutinatis notata. Affinis Epilobiis et Oenotheris, ſed absque calyce tubuloſo.*

* * *Foliis petiolatis.*

*7. RHEXIA *hypericoides.* W.

R. decandra, villoſiſſima, foliis ovatis acutis integerrimis breviſſimis petiolatis, ſeptemnerviis, panicula terminali. W.

Melaſtoma (*villoſa*) foliis ſeſſilibus ovatis acutis, floribus corymboſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 428. *t.* 168.

Wollige Rhexie. W.

Habitat in pratis humidis Cajennae. ⊙

Facies Hyperici montani. W.

8. RHEXIA *glutinoſa.*

R. foliis oppoſitis trinerviis laevibus, floribus thyrſoideis. *Lin. ſuppl.* 216.

Icon. *Mutis. amer. v.* 1. *t.* 6.

Klebrige Rhexie. W.

Habitat in Nova Granada. ♄

Arbuſcula *frondoſa Melaſtomis ſimilis, ramulis articulatis alternatim canaliculatis.* Folia *oppoſita petiolata confertiuſcula elliptica integerrima trinervia pollicaria laevia.* Flores *ſubthyrſoidei, vix foliis longiores pedunculati.* Calyx *monophyllus campanulatus quadrifidus patulus.* Capſula *infera quadripartita ſ. quadrilocularis calyce brevior obtuſa, loculis ſe diſtinguentibus, polyſperma. Summitates ramulorum et calyces glutinoſi.*

9. RHEXIA *Aciſanthera.*

R. foliis petiolatis ellipticis obtuſis crenatis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis alternis. W.

R. floribus alternis axillaribus pedunculatis quinquefidis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 396. *

Aciſanthera erecta ramoſa, ramulis quadratis, foliolis trinerviis ovatis crenatis oppoſitis, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 217. *t.* 22. *f.* 1.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 412.

Winkelblütige Rhexie. W.
Habitat in Jamaica.

*10. RHEXIA *glomerata.*

R. foliis petiolatis ovatis integerrimis trinerviis villoſis, floribus terminalibus glomeratis. W.
R. caule ramoſiſſimo hirſuto, floribus glomeratis pedunculatis, calycibus hirſutiſſimis. *Roettb. pl. ſurinamenſ. p.* 8. *t.* 4.*
Gedrengtblütige Rhexie. W.
Habitat in Surinami *pratis depreſſis.*

*11. RHEXIA *longifolia.*

R. piloſa, decandra, foliis lanceolatis integerrimis quinquenerviis, pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis foliis brevioribus. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 39.*
Langblättrige Rhexie.
Habitat in America *meridionali.*

*12. RHEXIA *aſpera.*

R. decandra, foliis petiolatis ovatis quinquenerviis, calyce ſquamoſo-bracteato. W.
Tibouchina aſpera. *Aubl. guj.* 1. *p.* 446. *t.* 177.*
Scharfe Rhexie. W.
Habitat in aridis Gujanae. ♄

Rami, petioli *foliorum* nervi *et* margines *ſunt muricati aſperi.* Calyx *ſquamis adpreſſis imbricatis tectus.* Pedunculi *uniflori axillares ſolitarii, et terni in ramorum apice.* W.

*13. RHEXIA *inconſtans.*

R. foliis ovatis hiſpidis, ſetis adpreſſis, ſubtus incanis trinerviis, pedunculis terminalibus ſubunifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 37.*
Oſbeckia (*ornata*) foliis petiolatis, floribus terminalibus umbellulatis decandris. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 647.*
Melaſtoma (*ornata*) foliis trinerviis integris rigidis ſupra hiſpidis, ſetis adpreſſis ſubtus incanis, umbellis quadrifidis terminalibus paucifloris, capſulis hiſpidis. *Swartz prod.* 69.
Unbeſtändige Rhexie. W.
Habitat in ſummo monte Montanſery *inſulae* St. Chriſtophori, *inque cacumine vulcani ſupra lavam muſcis obtectam inſulae* Montſerrat. ♄

Numerus ſtaminum valde inconſtans. W.

*14. RHEXIA *latifolia.*

R. foliis petiolatis ſubrotundis acutis quinquenerviis hirſutis, pedunculis terminalibus unifloris. W.
R. folio amplo ſubrotundo villoſo, flore violaceo. *Aubl. gujan.* 1. *p.* 336. *t.* 129. *f.* 2.
Breitblättrige Rhexie. W.
Habitat in pratis Gujanae.

*15. RHEXIA *villoſa.*

R. foliis petiolatis ſubrotundo-ovatis acutis quinquenerviis villoſis, floribus geminis terminalibus ſubſeſſilibus. W.
R. foliis ſubrotundis, caulibus decumbentibus. *Aubl. gujan.* 1. *p.* 334. *t.* 129. *f.* 1.*
Haarige Rhexie. W.
Habitat in pratis Gujanae.

*16. RHEXIA *aquatica.*

R. foliis oppoſitis cordatis crenulatis hirſutiuſculis, paniculis terminalibus trichotomis, ramulis filiformibus patentiſſimis. *Swartz. Fl. ind. occid.* 2. *p.* 650. *
Melaſtoma (*aquatica*) foliis quinquenerviis cordatis acutis crenulatis ſuperne hirtis ſubtus laevibus, paniculis terminalibus trichotomis diffuſis. *Swartz. prod.* 37.
Melaſtoma (*aquatica*) foliis cordatis crenatis ſupra hirſutis ferrugineis ſubtus laevibus, floribus albis paniculatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 430. *tab.* 169. *
Waſſer-Rhexie. W.
Habitat in inundatis Cajennae, Surinami, Jamaicae, Dominicae. ♄

*17. RHEXIA *uniflora.*

R. foliis petiolatis ovatis ſerratis, floribus axillaribus ſolitariis decandris, caule dichotomo. *Vahl. ſymbol.* 2. *p.* 48. *
Einblütige Rhexie. W.
Habitat in Cajenna.

Caulis *herbaceus ex quatuor alis decurrentibus tetragonus pilis apice glanduloſis adſperſus, viſcoſus.* Folia *ſemiunguicularia obſcure trinervia, margine e pilis glanduloſis ciliata ſerrata, ſuprema anguſtiora ſublanceolata.* Calyces *piloſi.* Petala *lanceolata.* Capſulae *bilobae magnitudine ſeminis Coriandri.* Vahl. l. c.

730. OENOTHERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 637.

Cal. 4-fidus tubuloſus. *Petala* 4. *Capſ.* 4-locularis 4-valvis cylindrica, infera. *Sem.* nuda.

1. OENOTHERA *biennis.*

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoſo, ſtaminibus corolla brevioribus. W.

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoſo, *Virid. cliff.* 33. *Hort upſ.* 94. *Gron. virg.* 254. *Roy. lugdb.* 251. *Gort. geld.* 78. *Kalm. it.* 3. *p.* 509 *Hall. helv. n.* 994. *Mill. ic. t.* 89. *f.* 2. *Oed. dan.* 446. *Pollich. pal. n.* 368. *Kniph. cent.* 1. *n.* 67. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 439. *Hoffm. germ.* 132.

O. foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in ſummo caulis. *Hort. cliff.* 144.

Onagra biennis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 451.

Lyſimachia lutea corniculata. *Bauh. pin.* 245. 516* *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 7.

Hyoſcyamus virginianus. *Alp. exot.* 325. *t.* 324.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 413.

Gemeine Nachtkerze. W.

Habitat in Virginia, *unde* 1614, *nunc vulgaris Europae.* ♂ (v. v.)

*2. OENOTHERA *grandiflora.*

O. foliis ovato-lanceolatis, ſtaminibus declinatis, caule fruticoſo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 2.

Groſsblütige Nachtkerze. W.

Habitat in America *boreali.* ♂ (v. v.)

Caulis, folia *et* germina *glabra.* Corolla *flava maxima petalis vix retuſis.* Stamina *declinata.* W.

3. OENOTHERA *parviflora.*

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi ſubvilloſo, ſtaminibus corolla longioribus. W.

O. foliis ovato-lanceolatis planis, caule laevi ſubvilloſo. *Sp. pl.* 492.

O. foliis lanceolatis dentatis, caule hiſpido. *Mill. ic.* 189. *f.* 1.

O. foliis lanceolatis, capſulis ventricoſo-conicis. *Zinn. goett.* 199.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 414.

Kleinblütige Nachtkerze. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♂ (v. v.)

Fructus apex coronatus margine octifido, nec quadrifido, uti O. biennis, cui ſimillima. Caulis *ruber, ſcaber.* Folia *repando-ſubdentata, minus mollia.* Calyx *tubo ſuo quadruplo brevior, infra apicem denticulo notatus, hinc ante explicationem mucrones in hac diſtantes.* Petalorum *latera diſtantia, dimidio minora praecedentis petalis.* Capſulae *quadrivalves.*

4. OENOTHERA *muricata.*

O. foliis lanceolatis planis, caule purpuraſcente muricato, ſtaminibus longitudine corollae. W.

O. foliis lanceolatis planis, caule purpuraſcente muricato. *Syſt. Veg.* 296. *Murray. nov. Comment. Goett. VI. p.* 24. *t.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 415.
Weichſtachliche Nachtkerze. W.
Habitat in Canada. ⊙ ♂ (v. v.)

Similis *parviflorae, ſed* Fructus *os non* 8-*fidum.* Caulis *puncta rubra ſparſa.*

5. OENOTHERA *longiflora.*

O. foliis denticulatis, caulibus ſimplicibus piloſis, petalis diſtantibus bilobis. *Iacq. hort. t.* 172. *Curt. mag.* 365.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 415.
Langblütige Nachtkerze. W.
Habitat in agro Bonarienſi. ⊙ ♂. H. V. (v. v.)

Folia radicalia *numeroſa, lato-lanceolata, denticulata, pubeſcentia coſta alba, oblique nervoſa.* Caules *ſaepius* 5, *enati infra folia radicalia, ſimpliciſſimi, adſcendentes, hirti, virides pilis longis patulis albis.* Caulis *centralis ſerius excreſcit.* Folia caulina *ovato-oblonga, denticulata, ſeſſilia, radicalibus ſimilia.* Flores *axillares ſuperiorum foliorum, germine calyceque piloſis.* Calyx *tubo inſigniter elongato, limbo ſuo triplo longior.* Petala 4, *flava, obcordata, biloba, magnitudine* O. biennis, *ſi non majora, lateribus diſtantia: altero die rubra.* Fructus *ſimiles* O. biennis, *ſed longior, inferne anguſtior, ore connivente minus ſcabro.*

Differt ab O. bienni, *quae foliis caulinis ſubnudis, ſubpetiolatis; Caule erecto; Ramis lateralibus, vix manifeſte piloſis; Petalis approximatis, vix emar-*

ginatis nec bifidis; Calycis tubo vix laciniis duplo longiore.

- - - - *ab* O. molliſſima *Caule non ramoſo; Foliis latioribus, nec molliter pubeſcentibus.*

- - - - *ab* O. parviflora *Caule non rubro; Floribus majoribus.*

6. OENOTHERA *molliſſima.*

O. foliis lanceolatis undulatis. *Vir. cliff.* 33. *Gron. virg.* 42. *Roy. lugdb.* 251. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 4. *n.* 57.

O. foliis lineari-lanceolatis dentatis, floribus e medio caule. *Hort. upſ.* 144.

Onagra bonarienſis villoſa, flore mutabili. *Dill. elth.* 297. *t.* 219. *f.* 286.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 417.

Weichblättrige Nachtkerze. W.

Habitat in agro Bonarienſi. ☉ (v. v.)

*7. OENOTHERA *nocturna.*

O. foliis lanceolatis repando-dentatis pubeſcentibus, caule tereti pubeſcente. W.

O. foliis lanceolatis dentato-ſerratis planis, caule laevi ſubvilloſo ramoſo. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 455. *Collect.* 3. *p.* 205. *

Capiſche Nachtkerze. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ☉ (v. v.)

Caulis *teres ramoſus pubeſcens.* Folia *lanceolata utrinque attenuata, remote denticulata pubeſcentia.* Corolla *magnitudine praecedentis, petalis rotundatis obtuſis flavis,* Petala *marceſcentia ſunt rubicunda.* W.

*8. OENOTHERA *villoſa.* †

O. foliis lanceolatis villoſis, caule angulato hirſuto. *Thunb. prod.* 75.

Haarige Nachtkerze. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Neſcio an ſit a praecedente diverſa, ſed folia in O. noctura ſunt pubeſcentia nec villoſa, caulis laevis nec ſulcatus. W.

*9. OENOTHERA *odorata.*

O. foliis lineari-lanceolatis denticulatis undulatis pubeſcentibus glaucis, caule hirto. W.

O. foliis lineari-lanceolatis ſubdentatis undulatis, caule villoſo ſuffruticoſo. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 456. *Collect. ſuppl.* 107. *

Wohlriechende Nachtkerze. W.
Habitat ad Champion river *in* Patagonia. ♃ (v. v.)
Caulis *teres hirtus.* Folia *breviſſime petiolata ſubſeſſilia lineari-lanceolata glauca rigida undulata utrinque pubeſcentia.* Flores *magnitudine O. longiflorae flavi.* Calycis *tubus petalorum longitudine, laciniae obtuſae ſub apice mucronatae.* Petala *obcordata.* W.

10. OENOTHERA *ſinuata.*
O. foliis dentato-ſinuatis, capſulis priſmaticis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 3.
O. foliis dentato-ſinuatis, caulis apice nutante. *Syſt. Veg.* 296. *Murray. in Nov. Comm. Goett. V. p.* 44. *t.* 9. *
Oenothera repanda. *Medicus in Act. palat.* 3. *p.* 198. *tab.* 8.
O. (*laciniata*): Caulis ſeſquipedalis, glabra: folia pinnatifido-laciniata; flores flavi; annua; caroliniana. *Hill. hort. Kewenſ.* 172. *Veget. Syſt. vol.* 12. *append. t.* 10.
Lyſimachia corniculata maritima, ſinuatis et pubeſcentibus foliis, virginiana. *Pluk. alm.* 235. *t.* 203. *f.* 33.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 418.
Ausgeſchweifte Nachtkerze. W.
Habitat in Virginia. ☉ (v. v.)
Caulis *ſimplex, teres, pedalis, erectus, apice nutans, junior piloſus, ſenior glabriuſculus:* Rami *alterni.* Folia *alterna, ſeſſilia, lato-lanceolata, nuda, obliqua, dentato-ſinuata lateribus magis baſin propius.* Flores *axillares, ſeſſiles, ſolitarii, piloſi calyce et germine.* Calyx *acutus, ſub apice mucronatus, tubo adſcendens.* Germen *ante antheſin declinatum.* Corolla *Petalis* 4, *flavis, obcordatis, longitudine foliorum calycis.* Capſula *cylindrica, quadrangularis angulis planis, truncata, apice profunde excavato quadrifido: lobis emarginatis; quadrivalvis.*
Dormit *noctu foliis ſuperioribus excavatis.*

*11. OENOTHERA *tetraptera.*
O. foliis lanceolatis baſi pinnatifido-dentatis, capſulis pedicellatis obovatis quadrialatis. W.
O. foliis alternis ſubpinnatis criſpis, flore mutabili, fructu tetraptero. *Cavan. ic.* 3. *p.* 40. *t.* 279. *
Vierflügliche Nachtkerze. W.
Habitat in Sotoluca, Novae Hiſpaniae. ♃ (v. v.)

Folia *lanceolata petiolata baſi ad medium usque pinnatifida.* Flores *pedunculati maximi fere hujus generis candidi, poſt floreſcentiam purpurei.* Calycis *tubus ſuperne dentatus.* Petala *leviſſime obcordata.* Capſula *hirta pedunculo ſuperne incraſſato ſuffulta ſubrotundo-obovata quadrialata hirta.* W.

*12. OENOTHERA *fruticoſa.*

O. foliis lanceolatis ſubdentatis acutis, capſulis pedicellatis oblongo-clavatis angulatis. W.

O. foliis lanceolatis ſubdentatis, capſulis pedicellatis acutangulis, racemo pedunculato. *Sp. pl.* 492. *Curt. mag.* 332.

O. foliis lanceolatis, floribus terminalibus paniculatis. *Gou. hort.* 193.

O. florum calyce monophyllo, hinc tantum aperto. *Gron. virg.* 42.

Onagra anguſtifolia, caule rubro, flore minore. *Tournef. inſt.* 392.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 418.

Staudige Nachtkerze. W.

Habitat in Virginia. ♃ (v. v.)

Calyx *purpuraſcens, tetraphyllus, ſed rumpitur altero ſaepius et unico latere.* Flores *parvi, albi.* (*lutei. W.*) Tubus *filiformis, anguſtiſſimus.* Capſula *angulis* 4 *acutis compreſſis.* Folia *rarius denticulata.*

13. OENOTHERA *pumila.*

O. foliis lanceolatis integerrimis obtuſis, capſulis ſubpedicellatis elliptico-obovatis angulatis. W.

O. foliis lanceolatis obtuſis glabris ſubpetiolatis, caulibus proſtratis, capſulis acutangulis. *Sp. pl.* 493. *Curt. mag.* 355.

O. foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis obtuſis, capſulis ovatis obtuſis. *Mill. dict. t.* 188.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor mariana, anguſtioribus foliis. *Pluk. mant.* 123.

Lyſimachia marilandica parva, foliis anguſtis acutis. *Raj. ſuppl.* 416.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 419.

Niedrige Nachtkerze. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃ (v. v.)

Caulis *palmaris, herbaceus, teres, flexuoſus, divaricatiſſimus.* Folia *elliptico-lanceolata, integerrima.* Flores *axillares, ſolitarii, erecti, ſubſeſſiles.* Petala

lutea, obcordata, lineata. Capſulae *obovatae, obtuſae octangulares, angulis quatuor latioribus compreſſis quadrivalvis.* Radix *perennis.*

*14. OENOTHERA *roſea.*

O. foliis ovatis utrinque attenuatis dentatis, inferioribus lyratis, capſulis pedicellatis oblongo-obovatis angulatis. W.

O. foliis ovatis dentatis, inferioribus lyratis, capſulis clavatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 3.

Roſenrothe Nachtkerze. W.

Habitat in Peru. ♃ (v. v.)

Petala *obtuſa rubra.* W.

15. OENOTHERA *purpurea.*

O. foliis glauceſcentibus glabris lanceolatis integerrimis utrinque attenuatis obtuſis, capſulis ſeſſilibus ovatis angulatis. W.

O. (*purpurea*) foliis ovato-lanceolatis glauceſcentibus integerrimis, capſulis ſeſſilibus, ſtigmate atropurpureo. *Curt. mag.* 352.

Oenothera humilis. *Donn ind. hort. cantab.* 41.

Purpurfarbene Nachtkerze. W.

Habitat in America *boreali ad latus occidentale.* ⊙ (v. v.)

Caulis *ſemipedalis teres glaber.* Folia *glauco-viridia glabra integerrima.* Flores *magnitudine et colore Epilobii hirſuti.* Calycis *tubus corolla brevior.* Petala *obtuſa non emarginata ſubundulata.* Capſulae *ſeſſiles ovatae ſulcato-angulatae.* W.

Diſtinguitur tribus notis characteriſticis, nempe: foliis *glaucis,* floribus *purpureis et* ſtigmate *atropurpureo.* Curtis!

73. GAURA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 638.

Cal. 4-fidus, tubuloſus. *Cor.* 4-petala adſcendens verſus latus ſuperius. *Nux* infera, 1-ſperma, 4-angula.

1. GAURA *biennis.*

G. foliis lanceolatis dentatis, petalis obovatis adſcendentibus patulis, ſtylis ſtaminibusque deflexis, caule herbaceo. W.

Gaura. *Amoen. acad.* 3. *p.* 26. *Act. holmenſ.* 1756. *p.*

222. *t.* 8. **Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 8. *Mill. dict. n.* 1. *Curt. mag.* 389.

Lyſimachia Chamaenerio ſimilis floridana, foliis nigris punctis, capſulis carinatis in ramulorum cymis. *Pluk. amalth.* 139. *t.* 428. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 404.

Krautartige Prachtkerze. W.

Habitat in Virginia, Penſylvania. ♂ (v. v.)

*2. GAURA *fruticoſa.*

G. foliis lineari-lanceolatis denticulatis, petalis obovato-lanceolatis adſcendentibus adpreſſis, ſtylis ſtaminibusque rectis, caule fruticoſo. W.

G. caule fruticoſo. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 457. *Collect.* 1. *p.* 142.*

Strauchartige Prachtkerze. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Simillima praecedenti ſed exceptis notis indicatis, adhuc foliis *anguſtioribus*, floribus, *decies fere minoribus et* glabritie *diſtinctiſſima. Convenit vero fructibus ovatis ſubſeſſilibus.* W.

*3. GAURA *mutabilis.*

G. foliis ovatis dentatis, petalis ovatis acutis cruciatim patentibus, ſtylis ſtaminibusque rectis, caule fruticoſo. W.

G. (*mutabilis*) foliis ſeſſilibus alternis ſerratis, petalis orbiculato-acutis. *Cavan. ic. rar.* 3. *p.* 30. *t.* 258.*

Oenothera (*anomala*) caule fruticoſo, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus Oenotherae, fructibus Gaurae. *Curt. mag.* 388.

Baſtard Prachtkerze. W.

Habitat in Nova Hiſpania. ♄ (v. v.)

Caulis *fruticoſus teres pubeſcens.* Folia *breviſſime petiolata piloſiuſcula ovata dentata acuta, apice mucronata.* Corolla *flava ut in Oenotheris cruciatim patens, nec petalis unilateralibus.* Fructus *ellipticus utrinque attenuatus leviſſime ſulcatus. Gauris hanc plantam nec Oenotheris adſociavi, quum primarius hujus generis character conſiſtat in fructu, nec in petalorum ſitu. Differt enim Gaura ab Oenotheris fructu, ut Oenothera ab Epilobiis ſemine.* W.

732. EPILOBIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 639.

Cal. 4-fidus tubuloſus. *Petala* 4. *Capſ.* oblonga infera. *Sem.* comoſa.

* *Staminibus declinatis.*

1. EPILOBIUM *anguſtifolium.*
E. foliis ſparſis lineari-lanceolatis integerrimis venoſis, floribus inaequalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 4.
E. foliis ſparſis lineari-lanceolatis, floribus inaequalibus. *Oed. dan.* 289. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 164. *Reyg. ged.* 1. *p.* 107. *n.* 1. *Pollich. pal. n.* 369. *Gun. norv. n.* 57. *Kniph. cent.* 11. *n.* 41. *Hoffm. germ.* 132. *Roth. germ. I.* 166. *II.* 433.
E. (*ſpicatum*) foliis alternis lanceolatis glabris transverſim nervoſis, pedunculis ebracteatis, ſpica pyramidata. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 370.
E. flore difformi, foliis lanceolatis, transverſim nervoſis. *Hall. helv. n.* 1000.
Chamaenerion anguſtifolium. *Scop. ed.* 2. *n.* 455.
Epilobium floribus difformibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 304, 327.
E. foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 146. *Hort. cliff.* 154. *Roy. lugdb.* 250.
Lyſimachia Chamaenerion dicta anguſtifolia. *Bauh. pin.* 245.
β. Lyſimachia Chamaenerion dicta latifolia. *Bauh. pin.* 245.
Epilobium latifolium. *Schmidt. bohem. n.* 372.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 421.
Schmalblättriges Weidenröslein. W.
Habitat in Europa *boreali.* ♃ (v. v.)

*2. EPILOBIUM *anguſtiſſimum.*
E. foliis ſparſis linearibus obſolete denticulatis aveniis, petalis aequalibus integerrimis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 5. *Curt. mag.* 76.
Epilobium anguſtiſſimum. *Web. dec. pl. minus cognit. p.* 3.
E. (*roſmarinifolium*) floribus inaequalibus, ſtaminibus piſtilloque declinatis, foliis erectis ſparſis lineari-anguſtiſſimis, apice calloſo-mucronatis. *Haenke in Iacq. Collect.* 2. *p.* 50. * *Hoffm. germ.* 134.

E. (*anguſtifolium*) foliis ſparſis linearibus enerviis, pedunculis unibracteatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 370. *
E. (*Halleri*) foliis ſparſis linearibus integerrimis, floribus inaequalibus. *Retz. prod. ſcand. ed.* 2. *n.* 458.
Epilobium Dodonaei. *Allion. pedem. n.* 1016.
E. flore difformi foliis linearibus. *Hall. helv. n.* 1001.
Epilobium anguſtifolium γ. *Sp. pl.* 494.
Chamaenerion alpinum anguſtifolium, flore purpureo. *Scheuchz. it.* 1. *p.* 33. 4. *p.* 332. *Tournef. inſt.* 302.
Chamaenerion Geſneri ſive Delphinium buccinum Dioſcoridis. *Lobel. ic.* 343.
Lyſimachia ſiliquoſa ſpecioſa anguſtifolia. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 907.
Lyſimachia Chamaenerion dicta alpina. *Bauh. pin.* 245. *prodr.* 116. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 2.
Pſeudolyſimachium purpureum minus. *Dod. pempt.* 65.
Rosmarinblättriges Weidenröslein. W.
Habitat in Groenlandia, *inque alpibus* Helvetiae, Sabaudiae, Galliae, Auſtriae, Carnioliae. ♃ (v. ſ.)

3. EPILOBIUM *latifolium.*

E. foliis alternis oppoſitisque lanceolato-ovatis ſubintegerrimis pubeſcentibus aveniis, floribus inaequalibus. W.
E. foliis alternis lanceolato-ovatis, floribus inaequalibus. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 164. *n.* 34. *Flor. dan. t.* 565. *Gunn. norv. n.* 1066.
E. (*frigidum*) foliis oppoſitis alternisque lanceolatis ſubdentatis glabris, floribus axillaribus ſolitariis. *Retz. prod. Scand. ed.* 2. *n.* 459.
Epilobium corymboſum *Act. Haf.* 10. *p.* 440. *t.* 8. *f.* 23.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 422.
Breitblättriges Weidenröslein. W.
Habitat in Sibiria, Norvegia, Islandia *et* Groenlandia. ♃ (v. ſ.)

Differt a praecedentibus floribus duplo majoribus, foliis lanceolato-ovatis, alternis nec ſparſis, utrinque laeviſſimo tomento molliſſimis. Haec et prima differunt a ſequentibus in non paucis: his enim Flores *inaequales petalis integris;* Stamina *baſi conniventia ad* Stylum; Piſtillum *declinatum;* Folia *alterna;* Folia *erumpentia revoluta contra ac in reliquis.*

E. latifolium a nonnullis Botanicis in Germania obſervatum eſt E. anguſtifolii varietas. W.

** *Staminibus erectis regularibus, petalis bifidis.*

4. EPILOBIUM *hirſutum.*

E. foliis oppoſitis alternisque ſubamplexicaulibus ovato-lanceolatis ſerratis glabriuſculis venis hirſutis, caule ramoſiſſimo hirſuto. W.

E. foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti-amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 145. *Fl. ſuec.* 305, 328. *Gron. virg.* 154. *Roy. lugdb.* 261. *Fl. dan.* 326. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 165. *Pollich. pal. n.* 370. *Kniph. cent.* 5. *n.* 28.

Epilobium grandiflorum. *Hoffm. germ.* 133. *Roth. germ. I.* 167. *II.* 434. *Allion. pedem. n.* 1018.

Epilobium ramoſum. *Hudſ. angl.* 162.

Epilobium amplexicaule. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 371.

E. foliis ſemiamplexicaulibus, lanceolatis, hirſutis. *Hall. helv. n.* 995.

Chamaenerion hirſutum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 452.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, magno flore. *Bauh. pin.* 245. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *t.* 11. *f.* 3.

Lyſimachia purpurea. *Fuchſ. hiſt.* 491.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 423.

Groſsblutiges Weidenröslein. W.

Habitat in Europae *humidiuſculis.* ♃ (v. v.)

Planta ſubhirſuta. Foliorum baſis media altior lateralibus.

5. EPILOBIUM *pubeſcens.*

E. foliis oppoſitis alternisque ſubſeſſilibus lanceolatis denticulatis utrinque pubeſcentibus, caule ſimplici villoſo. W.

E. (*pubeſcens*) foliis lanceolatis ſubpetiolatis pubeſcentibus, caule villoſo ſimpliciſſimo. *Roth. germ. I.* 167. *II.* 435.

E. (*villoſum*) foliis oblongo-lanceolatis dentatis pubeſcentibus, caule tereti villoſo. *Ait. Kew.* 2. *p* 5.

Chamaenerion (*parviflorum*) foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis cauleque villoſis. *Schreb. ſpicil. p.* 146. *Hoffm. germ.* 133. *Retz. prod. ſcand. ed.* 2. *n.* 461.

E. (*molle*) foliis oppoſitis ſubpetiolatis lanceolatis denticulatis molliſſimis villoſo-pubeſcentibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 371.

Epilobium hirſutum. *Hudſ. angl.* 161. *Allion. pedem. n.* 1017.

Epilobium hirſutum β. *Sp. pl.* 494.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore. *Bauh. pin.* 245.

prod. 116. *Fl. dan. t.* 347. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 270. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 4.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta flore minore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 906.
Lyſimachia ſiliquoſa 2. *Tabern.* 335.
Behaartes Weidenröslein. W.
Habitat ad foſſas inque pratis Europae. ♃ (v. v.)

*6. EPILOBIUM *villoſum.*
E. foliis alternis lanceolatis ſerratis hirſutis. *Thunb. prod.* 75.
Capſches Weidenröslein. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

7. EPILOBIUM *montanum.*
E. foliis oppoſitis ovatis dentatis. *Fl. lapp.* 147. *Fl. ſuec.* 506, 329. *Hort. cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 251. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 165. *Gunn. norv. n.* 56. *Pollich. pal. n.* 371. *Kniph. cent.* 11. *n.* 42. *Hoffm. germ.* 133.
E. foliis ovato-lanceolatis, glabris, dentatis. *Hall. helv. n.* 996.
Chamaenerion montanum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 453.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major. *Bauh. pin.* 24.
Pſeudo-Lyſimachium purpureum primum. *Dod. pempt.* 85.
β. Lyſimachia ramoſa glabra, Violae ſurrectae foliis ſplendentibus. *Bocc. muſ.* 32. *t.* 16. *ex Hall.*
γ. Chamaenerion (*roſeum*) foliis oppoſitis alternisque ovato-lanceolatis, petiolis ſerratis glabris. *Schreb. ſpicil.* 147. *Retz. obſ.* 1. *p.* 16. *Hoffm. germ.* 133. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 438.
δ. E. (*alpeſtre*) foliis oppoſitis alternisve ovatis denticulatis ſubſeſſilibus glabris, caule ſimpliciſſimo obtuſangulo, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, capſulis utrinque attenuatis tetragonis. *Schmidt. bohem. n.* 377.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 424.
Berg Weidenröslein. W.
Habitat in Europae *montoſis.* ♂ (v. v.)
Caulis molliſſimus. Folia glabra.
Variat *foliis ternis et quaternis.* R.

*8. EPILOBIUM *glabellum.*
E. foliis oblongis dentatis obtuſis, imis oppoſitis, caule teretiuſculo erecto. *Forſt. prod. n.* 160.
Glattes Weidenröslein. W.

Habitat in Nova Zeelandia.

*9. EPILOBIUM *rotundifolium.*

E. foliis oppoſitis ſubrotundis denticulatis. *Forſt. prod. n.* 161.

Rundblättriges Weidenröslein. W.

Habitat in Nova Zeelandia.

10. EPILOBIUM *tetragonum.*

E. foliis lanceolatis denticulatis, imis oppoſitis, caule tetragono. *Sauv. monſp.* 75. *Pollich. pal. n.* 372. *Kniph. cent.* 11. *n.* 43. *Fl. dan. t.* 1029. *Hoffm. germ. I.* 167. *II.* 436.

E. foliis lanceolatis, glabris, dentatis. *Hall. helv. n.* 997.

Chamaenerion tetragonum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 454.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor. *Bauh. pin.* 303. *Raj. hiſt.* 801.

Lyſimachia minor. *Tabern. ic.* 184.

β. Chamaenerion (*obſcurum*) foliis oppoſitis alternisque lanceolatis glabris ſerratis baſi decurrentibus. *Schreb. ſpicil.* 147.* *Hoffm. germ.* 134. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 438.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 425.

Vierkantiges Weidenröslein. W.

Habitat in Europa. ♃ (v. ſ.)

Folia tenera macula livida. Summitas, adhuc tenella, nutans. Stigma *certiſſime integerrimum. Willich. obſ.* 69. *Moench.* R.

11. EPILOBIUM *paluſtre.*

E. foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 307, 330.* *Pollich. pal. n.* 373. *Hoffm. germ.* 133. *Roth. germ. I.* 167. *II.* 437.

E. foliis glabris ellipticis, integerrimis. *Hall. helv. n.* 998.

E. foliis linearibus. *Fl. lapp.* 149. *Roy. lugdb.* 251.

E. glabrum anguſtifolium. *Dill. giſſ. p.* 128. R.

Chamaenerion paluſtre. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 456.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra anguſtifolia. *Bauh. pin.* 245.

Lyſimachia ſiliquoſa minor. *Tabernaem. p.* 856. R.

β. Epilobium foliis lanceolatis, ramoſe florens. *Fl. lapp.* 148.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 426.

Sumpf Weidenröslein. W.

Habitat in Europae *humidiuſculis. β. in alpibus.* ♃ (v. v.)

In hoc et tetragono Stigma *craſſiuſculum clavatum, apice ſubquadrifidum.* Leers. *n.* 288.

12. EPILOBIUM *alpinum.*

E. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis integerrimis, ſiliquis ſeſſilibus, caule repente. *Flor. dan. t.* 322.
E. foliis ovalibus: ſuperioribus attenuatis. *Fl. ſuec.* 308, 331.
E. foliis ovato-oblongis integerrimis. *Fl. lapp.* 150.
E. foliis glabris ovatis. *Hall. helv. n.* 999.
Chamaenerion alpinum, alſines foliis. *Scheuch. alp.* 132. 332.
Lyſimachia ſiliquoſa nana, prunellae foliis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 161. *t.* 108.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 426.
Alpen Weidenröslein. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Lapponicis, *in* Dania. ♃ (v. ſ.)

Repens eſt, primo vere florens germinibus ſeſſilibus. Dubitat Hallerus, an Bocconis ſynonymon huc? R.

733. ANTICHORUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 640.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* ſupera, ſubulata, 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* plurima.

1. ANTICHORUS *depreſſus.*

A. depreſſus. *Mant.* 64. *Lin. fil. faſc. p.* 3. *t.* 2.* *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 27.
Iulliaea (*edulis*) caulibus proſtratis, foliis longe petiolatis ovatis margine plicato ſerrato, floribus tetrapetalis octandris. *Forſk. deſcr.* 210.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 247.
Liegender Antichorus. W.
Habitat in Arabia. ☉

Corchoro *affinis, puſilla, procumbens planta.* Caules *terrae adpreſſi, teretes, palmares, alterne ramoſi.* Folia *alterna, petiolata, ovalia, groſſe ſerrata, glabra, ſubplicata.* Stipulae *ſubulatae.* Flores *axillares, bini, oppoſiti, breviſſime pedunculati, lutei.* Pedunculi *craſſiuſculi*: Bracteis 2, *lateris ſuperioris.* Fructus *cernui, arcte ſub caule reflexi.* H. V.

734. COMBRETUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 641.

Cal. 4-dentatus, campanulatus, ſuperus. *Cor.* 4-petala, calyci inſerta. *Stamina* longiſſima. *Sem.* 1, quadrangulare: angulis membranaceis.

1. COMBRETUM *laxum.*
C. foliis oppoſitis, racemis laxis ebracteatis, calycibus interne villoſis. W.
C. ſpicis laxis. *Loefl. it.* 308. *Swartz. obſ.* 143. *
C. foliis oppoſitis; ſpicis laxis ſimplicibus. *Iacq. amer.* 104. *
Caura fruticoſa ſcandens, foliis oppoſitis. *Loefl. it.* 248.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 406.
Schlaffblütiger Langfaden. W.
Habitat in America *meridionali.* ♃

2. COMBRETUM *ſecundum.*
C. foliis oppoſitis, racemis ſecundis ebracteatis, calycibus glabris. W.
C. ſpicis ſecundis. *Iacq. amer.* 103. *t.* 176. *f.* 30. *Swartz. obſ.* 144.
Combretum laxum. *Aubl. guj.* 1. *p.* 351. *t.* 137. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 407.
Einſeitiger Langfaden. W.
Habitat in fruticetis Carthagenae. ♄

*3. COMBRETUM *purpureum.*
C. foliis oppoſitis ovatis acutis, racemis ſecundis bracteatis, bracteis pedunculo brevioribus, floribus decandris. W.
C. (*purpureum*) foliis ovato-oblongis calycibusque nudis, ſpicis ſimplicibus ſecundis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 51. *
C. (*coccineum*) floribus decandris, ſpicis laxis paniculatis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 727. *
Criſtaria coccinea. *Sonnerat it.* 2. *p.* 247. *t.* 140.
Rother Langfaden. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄
Folia *ovata acuta.* Bracteae *lineari-lanceolatae pedunculis multo breviores.* W.

*4. COMBRETUM *decandrum.*
C. foliis oppoſitis oblongis acuminatis, racemis laxis bra-

cteatis, bracteis flore longioribus, floribus decandris diſtichis.
Combretum decandrum. *Roxb. corom.* 1. *p.* 43. *t.* 59.*
Zehnfädiger Langfaden. W.
Habitat in montoſis ſylvaticis Indiae *orientalis.* ♄
Folia *oblonga acuminata.* Racemi *paniculati.* Flores *albi bracteis lanceolatis breviores.* Stamina *alternatim breviora corolla paulo longiora.* W.

*5. COMBRETUM *alternifolium.* †
C. foliis alternis, floribus decandris. *Iacq. amer.* 104.*
Wechſelblättriger Langfaden. W.
Habitat in Carthagena. ♄
Rami *ſeniores aculeati.* Iacq. l. c.

*735. VITMANNIA.

Vahl ſymb. 3. *p.* 51.

Cal. 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Nect.* ſquama ad baſin filamentorum. *Nux* ſemilunata compreſſa monoſperma.

*1. VITMANNIA *elliptica.*
V. elliptica. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 51. *t.* 60.*
Samandura. *Fl. zeyl.* 433. (*excluſo ſynonymo Rheedi.*)
Samadera. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 352. *t.* 156. *f.* 3.
Elliptiſche Vitmannie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Arbor *ramulis teretibus.* Folia *alterna petiolata elliptica acuta integerrima venoſa glabra.* Flores *umbellati in ramorum apice ad foliorum axillas.* W.

736. GRISLEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 642.

Cal. 4-fidus. *Petala.* 4, ex inciſuris calycis. *Filam.* longiſſima, adſcendentia. *Capſ.* globoſa, ſupera, 1-locularis, polyſperma.

1. GRISLEA *ſecunda.*
G. foliis petiolatis glabris, corymbis axillaribus ſecundis. W.
Grislea. *Hort. cliff.* 146. *Loefl. it.* 245.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 408.

Einſeitigblütige Griſlea. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

2. GRISLEA *tomentoſa.*
G. foliis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis, corymbis axillaribus patulis. W.
Griſlea tomentoſa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 29. *t.* 31.*
Lythrum (*fruticoſum*) foliis oppoſitis ſubtus tomentoſis, floribus decandris, corollis calyce, calyceque genitalibus brevioribus. *Sp. pl.* 641.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 16.
Filzige Grislea. W.
Habitat in collibus Indiae *et* Chinae. ♄
Frutex *cortice lacero.* Folia *oppoſita ſeſſilia lanceolata integerrima ſubtus ſubtomentoſa.*

*737. TETRATHECA.

Smith. Nov. Holl. 1. *p.* 5.

Cal. 4-fidus inferus. *Cor.* tetrapetala. *Antherae* 4-loculares. *Capſ.* 2-locularis 2-valvis, valvulis medio ſeptiferis. *Sem.* ſubbina.

*1. TETRATHECA *juncea.*
T. glabra, foliis alternis lanceolatis, caule acutangulo, ramis elongatis nudiuſculis. *Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 5. *t.* 2.*
Simſenartige Tetratheca. W.
Habitat in Nova Hollandia.
Planta ſpecioſa, varians petalis roſeis et albis. W.

*738. ROXBURGHIA.

Roxb. corom. 1. *p.* 29.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* foliola 4 lanceolata, medio petalorum inſerta, conniventia. *Antherae* geminae e baſi folii nectarii dependentes. *Capſ.* unilocul. bivalvis polyſperma. *Sem.* receptaculo ſpongioſo inſerta.

*1. ROXBURGHIA *glorioſoides.*
R. glorioſoides. *Roxb. corom.* 1. *p.* 29. *t.* 32.*

Prachtlilienartige Roxburghie. W.
Habitat ad radices montium Indiae *orientalis.* ♃

Planta *ſingularis medium inter Liliaceas et Aſclepiadeas tenens.* Radix *tuberoſa fuſiformis.* Caulis *herbaceus ſcandens ſulcatus.* Rami *alterni.* Folia *oppoſita petiolata cordata acuminata integerrima nervoſa glabra.* Pedunculi *biflori axillares.* Bracteae *binae lanceolatae ad pedunculi diviſionem.* Calyx *flavus corolla major.* Petala *purpurea.* W.

*739. ORNITROPHE.

Juſſ. gen. ed. Uſt. p. 274.

Cal. 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Stylus* 2-fidus. *Germen* didymum. *Baccae* 2, monoſpermae.

*1. ORNITROPHE *integrifolia.* W.

O. foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, racemis ſubſimplicibus. W.
Ornitrophe. *Lamarck illuſt. t.* 309. *f.* 1.
Ganzblättriger Vogelpfeffer. W.
Habitat in inſula Borbonia. ♄

*2. ORNITROPHE *ſerrata.*

O. foliis ternatis ſcabris, foliolis petiolatis ovatis acuminatis ſerratis, racemis ſimplicibus. W.
Ornitrophe ſerrata. *Roxb. corom.* 1. *p.* 44. *t.* 61. *
Geſägter Vogelpfeffer. W.
Habitat in montoſis Indiae *orientalis.* ♄ (v. v.)

3. ORNITROPHE *Cobbe.*

O. foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis acutis ſerratis, ſubtus pubeſcentibus, racemis ſimplicibus, pedunculo tomentoſo. W.
Rhus (*Cobbe*) foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis ſerratis, pedunculis tomentoſis. *Sp. pl.* 382.
Rhois trifoliatae frutex ſalwaccenſis, floribus juliformimibus. *Pet. muſ.* 678. *Raj. dendr.* 58.
Frutex trifolius ſpicatus, producens baccas nigras. *Burm. zeyl.* 101.
Kobbae. *Fl. zeyl.* 441.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 401.
Zeylaniſcher Vogelpfeffer. W.
Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ.)

Frutex *facie Rhois africanae.* Folia *alterna longis*

petiolis, ternata aut quinato-digitata, foliolis herbaceis magnis ovatis acutis argute ſerratis. Spicae *ſimplices raro ramoſae, ex alis: floſculis infinitis minimis, pedicellis minimis propriis adfixis.* Fl. zeyl.

Poſſideo ſpecimen ſub nomine Rhois Cobbe a Koenigio miſſum, qui contendit eandem eſſe plantam, quod deſcribam. Ramuli *teretes tomentoſi.* Folia *ternata, foliolis petiolatis ovatis acutis, nec acuminatis, ſerrata.* Folia *juniora ſunt ſubtus tomentoſa, adultiora vero pube molli tecta.* Racemi *ſimplices indiviſi, pedunculo communi denſe tomentoſo.* W.

Molago-Maram Rheed. mal. 5. p. 49. t. 25. huic affinis ſed racemis ramoſis diſtincta, a ſequenti etiam differre videtur, licet infloreſcentia conveniat. W.

4. ORNITROPHE *Cominia.*

O. foliis ternatis, foliolis petiolatis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, racemis compoſitis. W.

Schmidelia (*Cominia*) foliis ternatis, foliolis petiolatis, racemis compoſitis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 667.*

Allophylus (*Cominia*) foliis ternatis floribus paniculatis. *Swartz. prod.* 62.

Rhus (*Cominia*) foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis remotiſſime ſerratis ſubtus tomentoſis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 395.

Toxicodendron arboreum. *Mill. dict. n.* 8.

Cominia arborea, foliis undulatis pinnato-ternatis, floribus minimis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 205.

Baccifera indica trifolia, fructu rotundo monopyreno. *Sloan. jam.* 170. *hiſt.* 2. *p.* 100. *t.* 208. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1593.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 404.

Riſpenblütiger Vogelpfeffer. W.

Habitat in montoſis Jamaicae *occidentalis.* ♄

5. ORNITROPHE *occidentalis.*

O. foliis ternatis, foliolis ſubſeſſilibus, racemis ſimplicibus.

Schmidelia occidentalis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 665.*

Allophylus racemoſus. *Swartz prod.* 62.

Weſtindiſcher Vogelpfeffer. W.

Habitat in frutetis montoſis Hiſpaniolae. ♄

Frutex 9-10 *pedalis ramoſus erectus.* Rami *tereti-*

uſculi glabri. Folia *ternata, foliolis ſubſeſſilibus approximatis, lateralibus baſi obliquis, oblongis baſi attenuatis, apice acuminatis venoſis glabris, ſubtus leviter tomentoſis.* Racemi *ſimplices longitudine petiolorum.* Flores *polygami, hermaphroditi et maſculi in diverſis fruticibus albi, parvi.* Swartz. l. c.

*6. ORNITROPHE *rigida.*
O. foliis ſimplicibus denticulato-ſpinoſis, floribus racemoſis.
Schmiedelia rigida. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 663.*
Allophylus rigidus. *Swartz prod.* 62.
Steifblättriger Vogelpfeffer. W.
Habitat rarius in collibus montoſis aridis Hiſpaniolae. ♄
Ornitrophe diſtinguitur a Schmidelia ſtylo ſimplici bifido, quum Schmidelia ſtylis duobus bifidis gaudeat. W.

740. ALLOPHYLUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 643.

Cal. 4-phyllus: foliolis orbiculatis; oppoſitis minoribus. *Petala* 4, calyce minora. *Germen* didymum. *Stigma* 4-fidum.

1. ALLOPHYLUS *zeylanicus.*
A. zeylanicus. *Sp. pl.* 496.
Allophylus. *Fl. zeyl.* 140.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 452.
Zeyloniſcher Allophylus. W.
Habitat in Zeylona. ♄
Arbor *Perſeae facie.* Rami *teretes.* Folia *ovalia acuminata ſpithamaea integerrima glabra venoſa alterna petiolata.* Racemi *ex alis parvi breviſſimi.* Fl. zeyl.
Planta adhuc obſcura Ornitrophis et Schmideliae affinis. W.

*741. CORREA.

Andrews. rep. bot. 18.

Cal. campanulat. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala, petali apice reflexis. *Capſ.* 4-locul. 4-valvis, loculis monoſpermis.

*1. CORREA *alba.*
Correa (*alba*) foliis ſubrotundis ſupra tomentoſis, ſubtus

lanigeris, floribus terminalibus quaternis albidis. *Andrews. repoſ. bot. p. 18. t. 18.* *
Weiſſe Correa. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

Frutex *quadri-ſeu quinquepedalis, ramis oppoſitis teretibus.* Folia *oppoſita petiolata obovato-ſubrotunda integerrima venoſa tomentoſo-pubeſcentia, ſubtus villoſo-tomentoſa.* Flores *albi in umbella ſimplici terminali quadriflora collecti.* Pedunculus *communis vix ullus, proprii breviſſimi.* W.

*742. HONCKENYA. W.

Willd. in Uſteri delect. 2. *p.* 200.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* ſtaminiformia. *Capſ.* echinata 5-locul. 5-valvis polyſperma. *Sem.* arillata.

*1. HONCKENYA *ficifolia.* W.

H. ficifolia. *Willd. in Uſteri delect.* 2. *p.* 201. *tab.* 4. *
Feigenblättrige Honckenye. W.
Habitat in Guinea. ♄ (v. f.)

Caulis *lignoſus, fruticoſus vel arboreus, tomento fuſco brevi tectus, teres ramoſus.* Folia *alterna ſubtus tomento fulvo tecta, ſumma ſpathulato-oblonga obtuſa dentata, inferiora tri-vel quinqueloba dentata, lobis obtuſis.* Flores *terminales terni coeruleo-violacei. Valde affinis Aubletiae ſed capſulae forma, nectariis ſtaminiformibus, ſeminibusque arillatis diverſa.* W.

743. MIMUSOPS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 644.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 16-phyllum. *Drupa* acuminata.

1. MIMUSOPS *Elengi.*

M. foliis alternis ovatis acuminatis. W.
M. foliis alternis remotis. *Fl. zeyl.* 138. * *Roxb. corom.* 1. *p.* 15. *t.* 14. *
M. foliis alternis remotis acuminatis, ſtylis corollae longitudine. *Lamarck. encycl.* 4. *p.* 176. *t.* 300. *

Prunus malabarica fructu calyculato. *Raj. hiſt.* 1564. *Burm. ind.* 68. R.
Arbor zeylanica, floribus odoratis, faciem humanam quodammodo referentibus. *Burm. zeyl.* 27. R.
Flos cuſpidum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 189. *t.* 63.
Kauki indorum. *Pluk. alm.* 203. *Breyn. cent.* 20. *t.* 8.
Elengi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 34. *t.* 20.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 457.
Spitzblättrige Spitzenblume. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

*2. MIMUSOPS *hexandra.*
M. foliis alternis obovatis emarginatis, floribus hexandris. W.
Mimuſops hexandra. *Roxb. corom.* 1. *p.* 16. *t.* 15. *
Sechsfädige Spitzenblume. W.
Habitat in montibus Circarſienſibus Indiae. ♄

3. MIMUSOPS *Kauki.*
M. foliis alternis in apice ramorum confertis oblongis obtuſiſſimis. W.
M. foliis confertis. *Fl. zeyl.* 137.* *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 27.
M. (*obtuſifolia*) foliis alternis remotis obtuſis, ſtylis corolla longioribus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 177.*
Binectaria. *Forſk. deſcr.* 82.
Metroſideros macaſſarenſis. *Rumph. amb.* 3. *p.* 19. *t.* 8. *Burm. ind.* 86.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 460.
Stumpfblättrige Spitzenblume. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

4. MIMUSOPS *Imbricaria.*
M. foliis alternis in apice ramorum confertis, ovatis obtuſis retuſis, fructibus polyſpermis. W.
Imbricaria. *Juſſ. gen. ed. Uſteri p.* 169. *Lamarck illuſt. t.* 300.
Vielſaamige Spitzenblume. W.
Habitat in inſula Borbonia. ♄

744. IAMBOLIFERA.

Gen. pl. ed. Reichardi n. 513.

Cal. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. infundibulif. *Filam.* planiuſcula. *Stigma* ſimplex.

1. IAMBOLIFERA *pedunculata.*
I. pedunculata. *Sp. pl.* 497. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 52. *t.* 61.* *Dryand. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 232.*

Iambolifera. *Fl. zeyl.* 139. *
Geſtielte Jambolane. W.
Habitat in India. ♄
Panicula *et* Flores *ad Myrtum accedunt.*
Arbor *ramis teretibus alternis.* Folia *oppoſita petiolata ovata acuta integerrima venoſa.* Panicula *corymboſa longe pedunculata divaricata multiflora axillaris foliis brevior.* W.

745. CUPANIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 645.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala apice cucullata. *Styl.* 3-fidus. *Capſ.* 3-locularis 3-valvis, loculis ſubmonoſpermis. *Sem.* arillata.

1. CUPANIA *tomentoſa.*

C. foliis pinnatis, foliolis obovatis retuſis, inferne ferrugineo-tomentoſis. *Swartz. prod.* 61. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 657.
Trigonis tomentoſa. *Iacq. amer.* 102.
Filzige Cupanie. W.
Habitat in montoſis ſylvaticis Hiſpaniolae. ♄

2. CUPANIA *glabra.*

C. foliis pinnatis, foliolis ovatis obtuſis crenatis glabris. *Swartz. prod.* 61. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 659. *
C. arborea, foliis oblongis crenato-ſerratis diſtiche et alternatim ſitis, racemis laxis propendentibus. *Brown. jam.* 178.
Cupania americana. *Sp. pl.* 290?
C. caſtaniae folio, fructu ſericeo et ramoſo. *Plum. gen.* 45. *ic.* 110?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 530.
Glatte Cupanie. W.
Habitat in montoſis Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄
Adhuc incertum eſt; an Linnaei et Plumieri planta ad hanc vel ad praecedentem pertineat. W.

3. CUPANIA *Saponarioides.*

C. foliis pinnatis, foliolis oblongis attenuatis integerrimis, ſubtus ſcabris pubeſcentibus. *Swartz prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 661. *

Seifenbaumartige Cupanie. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

*746. XYLOCARPUS.
Gen. pl. ed. Schreb. n. 646.

Cal. 4-dentatus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* 8-fidum. *Filam.* nectario inſerta. *Drupa* exſucca magna 4-ſ. 5-ſulcata. *Nuces* 8-10, difformes.

*1. XYLOCARPUS *Granatum.*
X Granatum. *Koenig Naturf.* 20. *p.* 2. *
Granatum littoreum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 92. *tab.* 61.
Cadul gaha. *Cingalenſ.*
Candalanga. *Tamul.*
Indiſche Holzfrucht. W.
Habitat in India *orientali, in ſylvis coenoſis ad maris littora inter Rhizophoras.* ♄

Arbor *variae magnitudinis, ſaepius grandis, interdum fruticoſa.* Truncus *erectus cortice fiſſo duro fuſco-caſtaneo tectus, mediocris.* Frons *oblonga, interdum ſubgloboſa opaca.* Rami *majores ſparſi, minores ſaepius oppoſiti, cortice cinereo-fuſco tecti numeroſi.* Folia *oppoſita patentia petiolata oblongo-clavata rotundata vel interdum oblonga acuta integerrima, pagina ſuperiori vix convexa, glabra, nitida, obſcure viridia, inferiori venoſa, nervo magis prominulo rigidiuſculo, foliis pomorum parum majora.* Petioli *patentes parum curvati teretiuſculi ſubrugoſi caſtanei breves.* Racemi *ad ramos ſparſi, interdum axillares, erectiuſculi pedunculati ovato-oblongi parvi foliis breviores, partiales oppoſiti, terminales ſaepius trichotomi parentiſſimi.* Pedunculi *teretes glabri tenaces colorati rubri nudi.* Pedicelli *flore breviores.* Koenig l. c.

*747. EPHIELIS.
Gen. pl. ed. Schreb. n. 647.

Cal. 5-part. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* ſquamae 10, binae ſingulo patalo inſertae. *Capſ.* 1-locul. 2-valvis diſperma.

*1. EPHIELIS *fraxinea.* W.
Mataiba gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 331. *t.* 128. *

Eſchenblättriger Kronenbaum.
Habitat in ſylvis Gujanae *interioris.* ♄

Arbor 50-60 *pedalis.* Folia *alterna abrupte pinnata bi-tri-ſeu quadrijuga, foliolis petiolatis ovatis acuminatis integerrimis glabris.* Paniculae *ramoſae divaricatae terminales et axillares foliis longiores.* Flores *parvi albi.* W.

*748. MOLINAEA.

Juſſ. Gen. ed. Uſteri. 275.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Filam.* baſi villoſa. *Stylus* o. *Capſ.* 3-locul. 3-valvis, loculis monoſpermis.

*1. MOLINAEA *laevis.* W.

M. foliis pinnatis bijugis, corymbis paniculatis, fructibus obovato-truncatis triquetris. W.
Molinaea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 305. *f.* 1.
Glatte Molinäa. W.
Habitat in inſula Borbonia. ♄

Folia *abrupte pinnata, pinnulis oblongis obtuſis baſi attenuatis integerrimis bijugis.* Panicula *axillaris e corymbis parvis compoſita.* Capſulae *obovatae apice truncatae, triquetro-alatae.* W.

*2. MOLINAEA *caneſcens.*

M. foliis pinnatis bijugis, racemis paniculatis, fructibus ovatis. W.
Molinaea caneſcens. *Roxb. corom.* 1. *p.* 43. *t.* 60.*
Graue Molinäa. W.
Habitat in montoſis Indiae *orientalis.* ♄

Cortex *ramorum cinereus ſcaber.* Folia *abrupte pinnata, pinnulis ellipticis acutiuſculis integerrimis bijugis.* Panicula *axillaris e racemis longis oompoſita, foliis brevior.* Capſula *ovata triſulcata, non alata.* W.

*3. MOLINAEA *alternifolia.* W.

M. foliis pinnatis, foliolis alternis retuſis, panicula coarctata. W.
Molinaea. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 305. *f.* 2.
Wechſelblättrige Molinäa. W.
Habitat in inſula Borbonia. ♄

Folia *pinnata e foliolis octo obovato-oblongis leviſſime retuſis integerrimis petiolatis compoſita.* Pani-

cula *axillaris foliis brevior coarctata et corymbis parvis compoſita.* W.

Genus Molinaea proxime ad Cupaniam accedit, ſed ſtylo nullo et ſeminibus non arillatis diverſum. W.

749. MELICOCCA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 648.

Cal. 4-partitus. *Petala* 4, reflexa infra calycem. *Stigma* ſubpeltatum. *Drupa* corticoſa.

1. MELICOCCA *bijuga.*

M. bijuga. *Sp. pl.* 495. *Swartz obſ.* 146. *
Melicoccus bijugatus. *Iacq. amer.* 108. *t.* 72.
Melicoccus foliis ut plurimum bijugatis ovatis, per pennas alatas diſpoſitis. *Brown. jam.* 210.
Nux americana foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 466.
Gefiederte Honigfrucht. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

Obnoxia Cocco heſperidum prae reliquis, ut Sapindus, cui ſimillima.

*750. KOELREUTERIA.

Laxmann Act. petrop. 16. *p.* 561.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 4-petala irregularis. *Nect.* ſquamae 4, bifidae. *Capſ.* 3-locularis, loculis diſpermis.

1. KOELREUTERIA *paniculata.*

K. paniculata. *Laxmann Nov. Comment. petrop.* 16. *p.* 561. *t.* 18. * *Ait. Kew.* 2. *p.* 7. *Willd. arb.* 163. *
Koelreuteria paullinoides. *Herit. ſert. angl.* 18. *t.* 19.
Sapindus (*chinenſis*) foliis pinnatis, foliolis laciniatis. *Syſt. veg.* 315. *Lin. ſuppl.* 228.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 503.
Riſpentragende Koelreuterie. W.
Habitat in China. ♄ (v. v.)

Folia *alterna impari-pinnata.* Foliola *petiolata oblongo-ovata laciniato-dentata baſi cuneata, apice*

obtuſa utrinque glabra. Panicula *axillaris anguſta.* Flores *flavi.* W.

751. HAGENIA.

Lam. illuſt. gen. t. 311.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* 5-petala plana. *Nect.* foliola 5, petalis quadruplo breviora. *Capſula?*

*1. HAGENIA *abyſſinica.* †

Cuſſo vel Bankſia abyſſinica. *Bruce itin.* 5. *p.* 73. * *cum icone. Editio germanica* 5. *p.* 81. *t.* 22. 23. *
Abyſſiniſche Hagenie. W.
Habitat in Abyſſinia. ♄

Arbor *ramis annulatis.* Folia *in ramorum apice conferta, interrupte pinnata cum impari, foliolis ovato-lanceolatis ſeſſilibus argute ſerratis.* Petioli *baſi dilatata.* Panicula *nutans flexuoſa.* Flores *purpuraſcentes.* W.

752. PERSOONIA. W.

Carapa Aubl. guj. 2. *p.* 22.

Cal. 4-partitus. *Pet.* 4. *Nectar.* cylindricum octodentatum antheras gerens. *Capſ.* unilocularis quadrivalvis. *Nuces* difformes angulatae numeroſae.

1. PERSOONIA *guareoides.*

Carapa gujanenſis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 32. *t.* 387. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 301.
Guareaartige Perſoonie. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄

Arbor *ſimillima Guareae ſed fructu abunde diſtincta.* Folia *alterna abrupte pinnata, foliolis multijugis integerrimis lanceolatis acuminatis petiolatis.* Panicula *ut in Guarea.* W.

Dixi hoc genus in honorem C. H. Perſoon, ſummi mycologi. W.

753. GUAREA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 649.

Cal. 4-dentatus. *Petala* 4. *Nectar.* cylindricum, ore Antheras gerens. *Capſ.* 4-locularis, 4-valvis. *Sem.* ſolitaria.

1. GUAREA *trichilioides.*

G. trichilioides. *Mant.* 228. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 366. *t.* 210. * *Swartz obſ.* 146. *

Trichilia Guara. *Sp. pl.* 2. *p.* 551.

Melia (*Gaura*) floribus octandris. *Iacq. amer.* 126. *t.* 176. *f.* 37.

Elutheria arborea, foliis majoribus ovatis oppoſitis, petiolis brevibus ſubtumidis ganglionoſis. *Brown. jam.* 369.

Lauro affinis arbor, foliis latioribus ex adverſo ſitis, ligno moſchum olente. *Sloan. cat.* 137. *hiſt.* 2. *t.* 170. *f.* 1.

Guidonia, nucis juglandis foliis, major. *Plum. gen.* 4. *ic.* 147. *f.* 2.

Iito. *Marcgr. braſ.* 169. *Piſ. braſ.* 79. *t.* 80.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 450.

Trichiliartige Guarea. W.

Habitat in Braſilia *aliisque* Indiae *occidentalis locis.* ♄ (v. ſ.)

Flores *racemoſi.*

*754. HEDWIGIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1747.

Cal. 4-dentatus. *Cor.* tubuloſa quadrifida. *Capſ.* tricocca trilocularis. *Nuces* ſolitariae quolibet loculo.

*1. HEDWIGIA *balſamifera.*

H. balſamifera. *Swartz. prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 672. *

Bois cochon. *Nicolſon Hiſt. St. Doming. p.* 169.

Balſamiſche Hedwigie. W.

Habitat in ſylvis montium Hiſpaniolae *occidentalis.* ♄

Arbor *excelſa, cortice albido-cinereo.* Folia *alterna pedalia pinnata, foliolis oppoſitis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris.* Racemi *termina-*

les et axillares foliis breviores compoſiti erecti ſtricti. Flores *ſubconferti parvi albidi.* Swartz. l. c.

755. AMYRIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 650.

Cal. 4-dentatus. *Petala.* 4, oblonga. *Stigma* tetragonum. *Bacca* drupacea.

*1. AMYRIS *polygama.*

A. foliis ſimplicibus lanceolatis integerrimis, racemis ſimplicibus axillaribus numeroſis. W.

A. (*polygama*) caule arboreo, foliis ſimplicibus ſparſis lanceolato-ovatis integerrimis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 20. *t.* 239.*

Geſchlechtändernder Balſamſtrauch. W.

Habitat in Chili. ♄

Arbor *polygama interdum mere maſcula vel feminea. Variat interdum* calyce 5-*dentato,* petalis 5 *et* ſtaminibus *decem.* W.

2. AMYRIS *Elemifera.*

A. foliis ternatis quinato-pinnatisque ſubtus tomentoſis. *Mat. med.* 101.

Elemifera foliis ternatis. *Hort. cliff.* 486.

Cornus racemoſa trifolia et quinquefolia. *Plum. ic.* 100.

Iccicariba. *Marcgr. braſ.* 98.

Frutex trifolius reſinoſus, floribus tetrapetalis albis racemoſis. *Catesb. car.* 2. *p.* 33. *t.* 33. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 469.

Elemi Balſamſtrauch. W.

Habitat in Carolina. ♄

3. AMYRIS *ſylvatica.*

A. foliis ternatis crenatis acutis. *Iacq. amer.* 107.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 471.

Wald Balſamſtrauch. W.

Habitat Carthagenae *copioſe, in ſylvis umbroſis maritimis, Auguſto florens.* ♄

4. AMYRIS *maritima.*

A. foliis ternatis crenulatis obtuſis. *Iacq. amer.* 107. *Swartz. obſ.* 148.

A. fruticoſus minor, foliis orbiculatis venoſis pinnato-ternatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 209.

Baccifera trifolia racemoſa, floſculis albis tetrapetalis,

fructu nigro monopyreno foetido. *Sloan. cat.* 170. *hiſt.* 2. *p.* 101. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 60.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 472.
Meerſtrands Balſamſtrauch. W.
Habitat in America. ♄ (v. ſ.)
An *praecedentis varietas?*
An A. ſylvatica diſtincta ſpecies? Variat enim maritima pro differentia loci et ſoli magnitudine omnium partium. Swartz. l. c.

*5. AMYRIS *Kataf.*
A. foliis ternatis, apice ſerratis, pedunculis confertis bifidis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28.
A. (*Kataf*) foliis ternatis apice ſerratis, pedunculis dichotomis. *Forſk. deſcr.* 80.*
Arabiſcher Balſamſtrauch. W.
Habitat in Arabia. ♄ (v. ſ.)
A. ſylvatica et maritima differunt ab hac: foliis *nitidis crenatis, panicula terminali brachiata.* Vahl. l. c.

6. AMYRIS *gileadenſis.*
A. foliis ternatis integerrimis, pedunculis unifloris lateralibus. *Mant.* 65. *diſs. de Opobalſ.* 1764.* *Amoen. acad.* 7. *p.* 55. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *t.* 11.
A. Opobalſamum. *Forskoehl. deſcript. pl. flor. aegypt. p.* 79.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 473.
Gileadiſcher Balſamſtrauch. W.
Habitat in Arabia *felice.* ♄ *Forskoehl.*

7. AMYRIS *Opobalſamum.*
A. foliis pinnatis: foliolis ſeſſilibus. *Amoen. acad.* 7. *p.* 68. *Mat. med.* 101.
Opobalſamum. *Geoffr. mat. med.* 473.
Balſamum. *Bell. ic.* 110. *Alp. aegypt.* 48. *t.* 60.
Baleſſan. *Bruce itin.* 5. *p.* 16. *cum icone. Editio germanica* 5. *p.* 28. *t.* 2. 3.*
β. Balſamea meccanenſis. *Gleditſch. Act. Soc. Naturaeſcrut. Berol.* 3. *p.* 127. *t.* 3. *f.* 2.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 473.
Meccaſcher Balſamſtrauch. W.
Habitat in Arabia. ♄
A. gileadenſis, Opobalſamum et Balſamea meccanenſis ſunt forte non diſtinctae ſpecies ſed varietates ab aetate vel ſolo ortae. In A. Opobalſamo depinxit Bruce folia pinnata et ternata, in Balſamea vero fo-

lia ſunt bipinnata. Multa vegetabilia habent in juventute folia magis compoſita. Mimoſae omnes ſimplicifoliae gaudent primo anno foliis bipinnatis, Gleditſchia triacanthos profert in juventute folia bipinnata, ut multa alia taceam vegetabilia, eodem modo variantia. W.

*8. AMYRIS *enneandra*.
A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis baſi attenuatis reticulato-venoſis, paniculis axillaribus et terminalibus racemoſis. W.
Icica (*enneandra*) foliis ternatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 345. *t.* 134. *
Neunfädiger Balſamſtrauch. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*9. AMYRIS *heterophylla*.
A. foliis ternatis pinnatisque, foliolis petiolatis ovatis acuminatis ſimpliciter venoſis, racemis axillaribus et terminalibus. W.
Icica (*Araconchini*) balſamifera, foliis ternatis quinatis. *Aubl. guj.* 1 *p.* 343. *t.* 133. *
Verſchiedenblättriger Balſamſtrauch. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*10. AMYRIS *gujanenſis*.
A. foliis pinnatis, foliolis quinis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis congeſtis axillaribus. W.
Icica (*gujanenſis*) floribus caeſpitoſis ſupra et ad axillas foliorum. *Aubl. guj.* 1. *p.* 340. *t.* 131. *
Fünfblättriger Balſamſtrauch. W.
Habitat ad maris littora, in ſylvis Gujanae. ♄
Forte varietas ſequentis. W.

11. AMYRIS *ambroſiaca*.
A. foliis pinnatis, foliolis ſeptenis petiolatis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris ſubcorymboſis axillaribus. W.
A. foliis pinnatis petiolatis, paniculis confertis axillaribus. *Lin. ſuppl.* 216.
Icica (*heptaphylla*) foliis pinnato-ſeptenis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 337. *t.* 130.
Icica Braſilienſibus. *Marcg. braſ. p.* 98. *Piſ. braſ. p.* 59?
Terpentinboom. *Surinam.*
Wohlriechender Balſamſtrauch. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis ad maris littora.* ♄
Arbor *alta.* Folia *alterna pinnata, foliolis* 5 *ſ.* 6,

ovato-oblongis acutis glabris. Petioli *baſi gibbi.* Flores *albo-flaveſcentes.* Perianthium *minimum quadridentatum.* Petala 4 *lanceolata acuta erecta, apice patula.* Filamenta 8 *erecta filiformia calyce dimidio breviora tubo inſerta.* Antherae *oblongae luteae.* Germen *ſuperum ſubgloboſum.* Stylus *cylindricus.* Stigma *capitatum depreſſum tetragonum.* Fructus *ovatus obliquus quadrilocularis Lauri ſimilis.* Nucleus *cortice fragili quadrilocularis ſ. oſſicula* 4 *pulpa viſcoſa obvoluta.* Arbor *tota odoratiſſima, detruncata fundit balſamum album odoratiſſimum, cujus uſus eſt in Dyſenteria, pro doſi drachma una in vino rubro.* Fructus *ruber, pulpa viſcoſa odore et ſapore balſamico, quae indureſcit in Reſinam griſeam ad ſuffimenta utilem.*

Rouelle apud Aubletium demonſtrat Reſine de Coumier ex hac arbore ortam et credit ambram griſeam ſuccum reſinoſum hujus, qui per terram colatus tandem aqua marina in Ambram transformatur. Eadem etiam Rumphius in Herbario amboinenſi v. 2. p. 164. *Hoc confirmare videtur ſententiam antiquorum. Dioſcorides et Plinius jam ſuo tempore exiſtimarunt, Ambram gummi aut reſinam arboris aliquo modo mutatam eſſe.*

*12. AMYRIS *decandra.*

A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis utrinque acuminatis, paniculis axillaribus divaricatis. W.

Icica (*decandra*) foliis pinnato-quinatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 346. *t.* 135. *

Zehnfädiger Balſamſtrauch. W.

Habitat in ſylvis maritimis Gujanae. ♄

*13. AMYRIS *altiſſima.*

A. foliis pinnatis, foliolis ſeptenis petiolatis oblongo-obovatis acuminatis, racemo ſimplici axillari. W.

Icica (*altiſſima*) foliis ampliſſimis impari-pinnatis, fructu racemoſo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 342. *t.* 132. *

Höchſter Balſamſtrauch. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

14. AMYRIS *toxifera.*

A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis ſeptenis ovatis acuminatis, panicula axillari elongata. W.

A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis planis. *Sp. pl.* 469.

Elemifera foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 486.

Toxicodendron foliis alatis, fructu purpureo pyriformi

ſparſo. *Catesb. car. 1. p. 40. t. 40. Seeligm. av. ic. 2. t. 80.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p. 481.
Giftiger Balſamſtrauch. W.
Habitat in Carolina. ♄ (v. ſ.)

15. AMYRIS *Protium.*
A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis quinis oblongis acutis undulatis, racemis axillaribus. W.
A. foliis pinnatis: foliolis petiolatis undulatis. *Mant.* 65.
Protium javanicum. *Burm. ind.* 88.
Tingulong. *Rumph. amb. 7. p. 54. t. 23. f.* 1.
Oſtindiſcher Balſamſtrauch. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Folia *oppoſita, pinnata: foliolis 5 ſ. 7, glabris, petiolatis, laurinis.* Florum panicula *multiplex.* Calyx *ſubquadridentatus, obtuſus, perſiſtens.* Petala 4, *ſeſſilia, ovata, acuminata.* Nectarium *e receptaculo marginato cingente* Germen *intra ſtamina.* Antherae *oblongae, quaſi ex* 4 *connatae.* Filamenta 8, *ſubulata, petalis breviora.* Germen *ovatum.* Stylus *cylindricus longitudine ſtaminum.* Stigma *ſimplex.*

*16. AMYRIS *dentata.* W.
A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis novenis ovatis acuminatis dentatis, racemis axillaribus. W.
Gezähnter Balſamſtrauch. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Ab omnibus foliis pinnatis margine dentato diſtincta. Folia *ovata acuminata emarginata remote dentata punctis reſinoſis diaphanis inſtructa.* Racemi *ſimplices axillares.* Pedunculi *uniflori valde elongati.* W.

*17. AMYRIS *aniſata.* W.
A. foliis pinnatis, foliolis petiolatis tredecimis ovato-lanceolatis obſolete dentatis inaequalibus, paniculis axillaribus. W.
Guineſiſcher Balſamſtrauch. W.
Habitat in Guinea. ♄ (v. ſ.)
Similis praecedenti, ſed diſtinctiſſima: foliolis *numeroſioribus ovato-lanceolatis baſi inaequalibus vix manifeſte dentatis, et* paniculis *corymboſis, pedunculis multifloris.* W.

*18. AMYRIS *zeylanica.*
A. foliis pinnatis petiolatis glabris, racemis interruptis

axillaribus, floribus involucratis hexandris. *Retz. obſ.* 4. *p.* 25.*
Zeylaniſcher Balſamſtrauch. W.
Habitat in Zeylona. ♄

19. AMYRIS *balſamifera.*
A. foliis bijugis. *Sp. pl.* 496. *Swartz obſ.* 149.*
A. arboreus, foliis bijugatis ovatis glabris, racemis laxis terminalibis. *Brown. jam.* 208.
Lucinium arbor tiliae foliis minoribus, americanum. *Pluk. alm.* 227. *t.* 201. *f.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 482.
Vierblättriger Balſamſtrauch. W.
Habitat in Jamaica. ♄

Species ulterius examinanda, rara arbor in ſylvis et mihi non viſa. Swartz l. c.

Omnes Amyridis ſpecies, quas ſiccas examinavi, gaudent filamentis nectario, licet minutiſſimo, glanduloſo inſertis. Icicae differunt tantum glandula maxima annulari, hinc ab Amyride non ſunt ſeparandae. Cum genere Trichilia vero neque nectario neque fructu conveniunt. W.

*756. CEDROTA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 660.

Cal. 6-partitus, laciniis concavis. *Cor.* 0. *Germen* glandula cinctum.

*1. CEDROTA *longifolia.* W.
Aniba gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 327. *t.* 126.*
Langblättrige Cedrota. W.
Habitat in ſylvis deſertis Gujanae. ♄

Arbor *excelſa.* Folia *oppoſita petiolata longe lanceolata acuminata integerrima reticulato-venoſa glabra.* Panicula *axillaris.* Flores *parvi virides.* W.

757. XIMENIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 651.

Cal. 4-fidus. *Petala* 4, piloſa, revoluta. *Drupa* monoſperma.

1. XIMENIA *americana.*
X. foliis oblongis, pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 1193. *Swartz obſ.* 149.*

X. multiflora. *Iacq. amer.* 106. *t.* 177. *f.* 31. *Mill. dict. n.* 1.
X. aculeata, flore villoſo, fructu luteo. *Plum. gen.* 6. *ic.* 261. *f.* 1.
Heymaſſoli ſpinoſa. *Aubl. guj.* 1. *p.* 324. *t.* 125. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 453.
Americaniſche Ximenie. W.
Habitat in America. ♄

Folia *ovato-oblonga, alterna, integerrima, petiolata.* Spina *ad ſingulam foliorum axillam.* Racemus *multiflorus, inter ſpinam et ramum. An* Stamina 7?

*2. XIMENIA *elliptica.*

X. caule inermi, foliis elliptico-lanceolatis, pedunculis multifloris. *Forſt. prod. n.* 162.
Elliptiſche Ximenie. W.
Habitat in Nova Caledonia. ♄

3. XIMENIA *inermis.*

X. foliis ovatis, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 497.
Amyris arboreſcens, foliis ovatis glabris: vetuſtioribus confertis, petiolis ſubmarginatis, floribus ſolitariis. *Brown. jam.* 209.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 455.
Unbewaffnete Ximenie. W.
Habitat in Jamaica. ♄.

758. FUCHSIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 652.

Cal. 4-partitus coloratus corollifer. *Cor.* 4-petala. *Bacca* infera, 4-locularis, polyſperma.

1. FUCHSIA *triphylla.* †

F. racemo terminali, pedunculis unifloris, foliis ternis integerrimis. W.
F. pedunculis unifloris. *Mill. dict. n.* 1.
F. (*racemoſa*) caule herbaceo ſimplici, foliis ternis lanceolatis ſeſſilibus, floribus racemoſis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 599.
F. triphylla, flore coccineo. *Plum. gen.* 14. *t.* 133. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 429.
Traubenblütige Fuchſie. W.
Habitat in America *meridionali.*

Caulis *herbaceus, ſimpliciſſimus.* Folia *terna, lanceolata, ſeſſilia.* Racemus *terminalis, erectus.*

*2. FUCHSIA *coccinea.*

F. pedunculis unifloris axillaribus, foliis ternis ſerratis. *Willd. in Uſteri Annalen* 3. *Stück. p.* 37. *t.* 6. *

F. (*coccinea*) foliis oppoſitis ovatis denticulatis, petalis obovatis obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 8.

F. (*magellanica*) caule fruticoſo, foliis oppoſitis ternis alternisque, pedunculis unifloris axillaribus, petalis retuſis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 560. *

Thilco. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 64. *t.* 47.

Scharlachrothe Fuchſie. W.

Habitat in Chili, *usque ad fretum* Magellanicum. ♄ (v. v.)

3. FUCHSIA *excorticata.*

F. pedunculis axillaribus unifloris, foliis ovatis alternis. *Lin. ſuppl.* 217.

F. (*excorticata*) foliis alternis ovatis longe petiolatis, pedunculis unifloris axillaribus, petalis lanceolatis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 560.

Skinnera excorticata. *Forſt. prod. n.* 163.

Rindenloſe Fuchſie. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

Arbor *glaberrima.* Folia *alterna longe petiolata ovata ſubtus caneſcentia tenuiſſime ſerrata.* Pedunculi *axillares ſolitarii uniflori.* Flores *penduli majores.* Germen *inferum oblongum.* Corolla *monopetala infundibuliformis.* Tubus *baſi globoſus poſtea cylindricus in limbum.* Limbus *octofidus, laciniae quatuor alternae lanceolatae patentes, quatuor alternae triplo minores erectae.*

Laciniae *minores nuncupantur potius petala et corolla calyx, ut ex icone Forſteri patet.* W.

4. FUCHSIA *multiflora.* †

F. pedunculis multifloris. *Mutis.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 429.

Vielblütige Fuchſie. W.

Habitat in America.

759. CHLORA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 653.

Cal. 8-phyllus. *Cor.* 1-petala, 8-fida. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis, polyſperma.

1. CHLORA *perfoliata.*

C. foliis perfoliatis. *Syſt. veg.* 299.

Gentiana (*perfoliata*) corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 335. *Loefl. hiſp. p.* 33. *Pollich. pal. n.* 262. *Mill. dict. n.* 10. *Scop. carn. n.* 299. *Sabatti hort.* 1. *t.* 100. *Hoffm. germ.* 134. *Roth. germ. I.* 168. *II.* 440.

Gentiana foliis radicalibus ovatis, caulinis triangularibus perfoliatis, floribus octofidis. *Hall. helv. n.* 649.

Blackſtonia. *Hudſon. angl.* 146.

Gentiana caule dichotomo, foliis connatis, corollis octifidis. *Hort. cliff.* 81. *et* 496. *Roy. lugdb.* 433. *Dalib. pariſ.* 82. *Sauv. monſp.* 136. *Loefl. it.* 133. *

Centaurium luteum perfoliatum. *Bauh. pin.* 278. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 565. *t.* 5. *ſ.* 26. *f.* 1, 2. *Camer. epit.* 427.

Centaurium parvum, flore luteo. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 180.

Chlora. *Reneal. ſpec.* 80. *t.* 76.

β. Centaurium puſillum luteum. *Bauh. pin.* 278.

Centaurium novum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 78.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 430.

Durchwachſene Chlora. W.

Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia, Hiſpania, Germania, Oriente. ⊙ (v. ſ.)

2. CHLORA *quadrifolia.*

C. foliis quaternis. *Syſt. veg.* 299.

Gentiana quadrifolia. *Spec. pl.* 2. *p.* 1671.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 430.

Vierblättrige Chlora. W.

Habitat in Europa *auſtrali Cl. Alſtroemer.*

Planta Matre *Chlora perfoliata,* Patre *Lino quadrifolio.* Caulis *ſimplex, ſpithamaeus, ſubtetragonus, articulatus.* Folia *verticillato-quaterna, linearia, verſus apicem paullo latiora, obtuſiuſcula, longitudine articulorum.* Pedunculi *terminales, quinque: quinto intermedio; ſingulis in medio bracteae* 2, *oppoſitae.*

3. CHLORA *dodecandra.*

C. foliis oppoſitis. *Syſt. veg.* 299.

Chironia floribus duodecimfidis. *Sp. pl.* 2. *p.* 273.

Gentiana floribus duodecim-petalis, foliis diſtinctis. *Gron. virg.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 431.

Zwölffadige Chlora. W.

Habitat in Virginia.

4. CHLORA *ſeſſilis.* W.

C. acaulis, floribus quadrifidis. W.

Gentiana (*ſeſſilis*) corollis quadrifidis, floribus acaulibus, foliis ovatis. *Sp. pl.* 335.
Gentianoides flore luteo. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 20. *t.* 14.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 5. *p.* 868.
Sitzende Chlora. W.
Habitat in Chili.

5. CHLORA *imperfoliata.*

C. corollis ſexfidis. *Lin. ſuppl.* 218.
Undurchwachſene Chlora. W.
Habitat in extrema Italia. ⊙

Caulis *herbaceus ſimpliciſſimus erectus tetragonus laevis palmaris, articulis foliis longioribus.* Folia *oppoſita ſeſſilia ſubamplexicaulia ovata laevia acuta.* Flos *pedunculatus terminalis flavus folio major.* Calyx *monophyllus campanulatus longitudine corollae, ultra medium bifidus patulus perſiſtens, laciniis lanceolatis.* Corolla *monopetala hypocrateriformis.* Tubus *brevis patulus.* Limbus *longior ſexfidus, laciniis ovalibus.* Filamenta *ſex ſubulata tubo impoſita eoque paulo longiora.* Antherae *ſubrotundae.* Germen *oblongum.* Styli *duo conglutinati.* Stigmata *obtuſa.* *Genus dubium ignoto etiamnum fructu. Facies Chlorae, ſed differt calyce ad baſin diviſo, nec laciniis linearibus, corolla ſexfida, ſtylis duobus conglutinatis.*

*760. MICHAUXIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1769.

Cal. 16-partitus. *Cor.* rotata 8-partita. *Nect.* 8-valve ſtaminiferum. *Capſ.* 8-locularis polyſperma.

*1. MICHAUXIA *campanuloides.*

M. campanuloides. *Ait. Kew.* 2. *p.* 8. *Herit. monograph. cum icone.* *
Mindium. *Adanſ. famil.* 2. *p.* 134. *Juſſ. gen. edit. Uſt.* 183.
Campanula foliis radicalibus dentato-pinnatis, caulinis cordatis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 19.
Campanula peregrina maxima laciniatis foliis. *Moriſ. hiſt.* 2. *ſ.* 5. *p.* 460. *t.* 3. *f.* 31.
Viola mariana laciniatis foliis peregrina. *Bauh. pin.* 94.

Medium Dioſcoridis Rauwolfio. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 805. *Raj. hiſt.* 2. *p.* 732.
Medium Dioſcoridis vel Mindium Rhazis. *Rauw. it.* 284. *t.* 35. *Dalech. hiſt. app.* 33.
Glockenblumenartige Michauxie. W.
Habitat in Syria, Libano. ♂
Folia *lanceolata laciniato-dentata criſpa, caulina amplexicaulia alterna.* Caulis *ſimplex paniculatus.* Flores *nutantes magni albi.* W.

761. DODONAEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 654.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 3-locularis, trialata. *Sem.* bina.

1. DODONAEA *viſcoſa.*

D. foliis oblongis obtuſis baſi anguſtatis viſcoſis. W.
D. foliis oblongis. *Lin. ſuppl.* 218. *Swartz obſ.* 151.
Dodonaea. *Hort. cliff.* 144. *Fl. zeyl.* 141. * *Roy. lugdb.* 206. *Iacq. amer.* 109. *Fabr. helmſt.* 2. *p.* 430. *Trew. ehret* 12. *t.* 9.
Ptelea viſcoſa. *Sp. pl.* 2. *p.* 173. *Mill. dict. n.* 2.
Triopteris erecta fruticoſa, foliis oblongis acuminatis, ramulis gracilibus. *Brown. jam.* 191. *t.* 18. *f.* 1.
Aceri ſ. Paliuro affinis, anguſto oblongo liguſtri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt.* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 3. *Raj. dendr.* 94.
Cariophyllaſter litoreus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 110. *t.* 50.
Carpinus viſcoſa, ſalicis folio integro oblongo. *Burm. zeyl.* 55. *t.* 23.
Arbuſcula viſcoſa, elaeagni foliis laete virentibus, americana tricoccos. *Pluk. phyt.* 185. *t.* 447. *f.* 5.
Staphylodendron foliis lauri anguſtis. *Plum. ic.* 247. *f.* 2.
Thlaſpidioides arboreſcens fructu racemoſo. *Barrer. aequin.* 109.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 1. *p.* 447.
Klebrige Dodonaea. W.
Habitat in Indiis *locis arenoſis.* ♄ (v. ſ.)
Ramuli *viſcoſi tetragoni*, rami *vero teretes.* W.

*2. DODONAEA *triquetra.*

D. foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis glaberrimis, ramis laevibus triquetris. W.

D. (*triquetra*) caule fruticoſo triquetro glabro, foliis alternis lanceolatis glabris, floribus cymoſis axillaribus. *Wendl. obſ.* 44.
Dreykantige Dodonaea. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

3. DODONAEA *anguſtifolia.*
D. foliis linearibus margine revolutis. W.
D. foliis linearibus. *Lin. ſuppl.* 218. *Thunb. prod.* 77. *Swartz obſ.* 150. *
Schmalblättrige Dodonaea. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei, *in* India *auſtrali inque montibus frigidioribus* Jamaicae. ♄ (v. ſ.)
Similis D. viſcoſae, ſed folia *lanceolato-linearia.* Fructificatio *polygama.*

*762. VALENTINIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1748.

Cal. 5-partitus coloratus patens. *Cor.* nulla. *Capſ.* baccata tetraſperma pulpoſa.

*1. VALENTINIA *ilicifolia.*
V. ilicifolia. *Swartz prod.* 63. *Fl. ind. ocid.* 2. *p.* 689.*
Malpighia aquifolii amplioribus foliis. *Plum. ic.* 167. *f.* 2.
Ilex folio agrifolii americana. *Pluk. alm.* 197. *t.* 196. *f.* 3.
Hülſenblättrige Valentinie. W.
Habitat in ſteriliſſimis petroſis Hiſpaniolae *verſus oceanum, inque* Cuba *circa* Havanam. ♄
Frutex *bi-ſ. tripedalis ramoſus.* Folia *alterna ovato-lanceolata ſeſquipollicaria margine unduluto-ſpinoſa glabra rigidiſſima.* Flores *terminales ſubumbellati coccinei.* Swartz. l. c.

763. LAWSONIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 655.

Cal. 4-fidus. *Petala* 4. *Stamina* 4 parium. *Capſ.* 4-locularis, polyſperma.

1. LAWSONIA *inermis.*
L. inermis, foliis ſubſeſſilibus ovatis utrinque acutis. *Lin. ſuppl.* 219.
L. ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *Gron. orient.* 47. *Mat. med.* 102. *Mill. dict. n.* 1.

L. (*alba*) foliis ſeſſilibus ovatis utrinque acutis, petalis albis patentibus. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 101. *
Liguſtrum aegyptiacum. *Alp. aegypt.* 47.
Liguſtrum aegyptiacum latifolium. *Bauh. pin.* 476.
Alhenna ſ. Henna arabum. *Walth. hort.* 3. *t.* 4.
Alcanna arabum. *Bell. itin.* 35.
Cyprus, Henna, Alcanna. *Rauw. itin.* 60. *t.* 60.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 409.
Echte Alkanna. W.
Habitat in India, Aegypto. ♄ (v. ſ.)

Affinis maxime L. ſpinoſae; ut forte cultura mitior facta.

Figura Rauwolfii rudis at bona. W.

*2. LAWSONIA *purpurea.*

L. foliis ſubſeſſilibus lanceolatis, floribus corymboſis terminalibus. W.
L. (*purpurea*) foliis ſubſeſſilibus lanceolatis, petalis erectis purpureo-coeruleis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 102. *
Poutalesje. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.
Langblättrige Alkanna. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

Folia *lanceolata multo longiora, nec baſi attenuata.* Flores *corymboſi terminales nec ut in praecedenti racemoſi ex omnibus axillis et apice caulis.* W.

3. LAWSONIA *Acronychia.*

L. inermis, foliis longe petiolatis cuneiformibus. *Lin. ſuppl.* 219. *Forſt. prod. n.* 165.
Acronychia laevis. *Forſt. gen. n.* 27.
Südſee Alkanna. W.
Habitat in Nova Caledonia. ♄

Differt a L. inermi: foliis *longe petiolatis ad inſertionem ſubarticulatis,* calyce *omnium minimo,* petalis *non planis ovatis, ſed linearibus, apice ungue reflexo.*

4. LAWSONIA *ſpinoſa.*

L. ramis ſpinoſis. *Fl. zeyl.* 134. *Haſſelq. it.* 464. * *Mill. dict. n.* 2.
Rhamnus malabaricus. Mail anſchi. *Pluk. alm.* 38. 220. *f.* 1.
Cyprus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 42. *t.* 17.
Mail-anſchi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 73. *t.* 40.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 411.
Dornige Alkanna. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

*764. MELICOPE.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 656.

Cal. 4-partit. *Cor.* 4-petala. *Nect.* glandulae 4 didymae germina cingentes. *Capſ.* 4 monoſpermae.

*1. MELICOPE *ternata.*

M. ternata. *Forſt. prod. n.* 166. *Forſt. gen. n.* 28.
Entoganum laevigatum. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 331. *t.* 69. *f.* 6
Dreyblättrige Melicope. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄

765. DIMOCARPUS.

Loureiro cochin. p. 286.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Baccae* 2, monoſpermae. *Semen* magnum.

*1. DIMOCARPUS *Litchi.*

D. (*Litchi*) foliis pinnatis, baccis cordatis ſquamoſis. *Loureiro cochin. p.* 287.*
Euphoria. *Juſſ. gen. ed Uſteri p.* 274.
Scytalia chinenſis. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 197. *t.* 42. *f.* 3. *Schreb. gen. pl. n.* 671.
Litſea chinenſis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 550. *
Litchi chinenſis. *Sonnerat. itin.* 2. *p.* 180. *t.* 129. * *Du Halde chin.* 2. *p.* 144. *c. icone.*
Laetji. *Obſ. itin.* 192. 204.
Sapindus (*edulis*) inermis, foliis pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis, rachi ſimplici, fructibus muricatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 36. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 55. *
Liſchia ſive Liſchion indiae orientalis. *Zanon. hiſt.* 147. *t.* 108.
Eſsbare Zwillingspflaume. W.
Habitat in China, Tunquin *et* Cochinchina. ♄

Clariſſ. Loureiro quatuor hujus generis ſpecies enumeravit, quae forte tantum varietates ſunt. W.

*766. MEMECYLON.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 657.

Cal. ſuperus fundo ſtriato, margine integerrimo. *Cor.* 1-petala. *Antherae* inſertae lateri apicis filamenti. *Bacca* coronata calyce cylindrico.

1. MEMECYLON *capitellatum.*

M. foliis ovatis petiolatis, umbellis capitatis axillaribus ſubſeſſilibus. W.

M. foliis ovatis. *Fl. zeyl.* 136.

M. foliis ovatis ſupra nitidis, umbellis axillaribus breviſſimis ſubcapitatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 86. *t.* 284. *f.* 1.*

Cornus ſylveſtris, foliis croceum colorem tingentibus, floſculis ad foliorum alas globoſis. *Burm. zeyl.* 76. *t.* 30.

Crocus ſylveſtris zeylanicus ſ. Arbor Waukakaha. *Herm. zeyl.* 7. *Burm. ind.* 78. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 487.

Knopfförmiger Safranbaum. W.

Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ.)

*2. MEMECYLON *tinctorium.*

M. foliis oblongo-ovatis petiolatis, corymbis axillaribus. W.

Memecylon tinctorium. *Koenig.*

M. (*ramiflorum*) foliis ovatis, paniculis congeſtis breviſſimis lateralibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 86. *

Färbender Safranbaum. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Folia *flavo-viridia.* Corymbi *parvi axillares et laterales. Diſtinctiſſima a praecedente, licet habitu ſit ſimilis. Samara laeta ab hac valde diverſa.* W.

*3. MEMECYLON *grande.* †

M. foliis acuminatis. *Retz. obſ.* 4. *p.* 26.

Groſser Safranbaum. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Arbor *grandis.* Rami *teretes.* Folia *oppoſita integerrima ſemipedalia ovata longe acuminata.* Pedunculi *axillares alterni quadri-ſ. quinquefidi, pedicellis multifloris.* Antherae *incumbentes omnes curvatae, an ab exſiccatione?* Retz. l. c.

*4. MEMECYLON *cordatum.*

M. foliis cordatis ſubſeſſilibus, umbellis compoſitis axillaribus pedunculatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 87. *t.* 284. *f.* 2. *

β. foliis minoribus amplexicaulibus fructu globoſo. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 87.

Herzblättriger Safranbaum. W.

Habitat α. *in inſula* Mauritii, β. *in* India *orientali.* ♄

*767. BUGINVILLAEA.

Juſſ. gen. ed. Uſteri p. 102.

Cal. 0. *Cor.* infera tubuloſa, 4-dentata. *Stam.* receptaculo inſerta. *Fructus* monoſpermus.

*1. BUGINVILLAEA *ſpectabilis.*

Buginvillaea. *Lamarck illuſt. gen. t.* 294.

Anſehnliche Buginvillaea. W.

Habitat in Braſilia. ♄

Frutex *aculeatus, aculeis recurvis ſupra axillaribus.* Folia *alterna petiolata ſubrotundo-ovata acuminata integerrima venoſa.* Panicula *terminalis, pedunculis trifloris.* Flos *tubuloſus coſtae mediae bracteae ſubrotundae inſertus.* Corolla *minor bractea.* W.

768. VACCINIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 658.

Cal. ſuperus. *Cor.* 1-petala. *Filam.* receptaculo inſerta. *Bacca* 4-locularis, polyſperma.

* *Foliis annotinis ſ. deciduis.*

1. VACCINIUM *Myrtillus.*

V. pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. lapp.* 143. *Fl. ſuec.* 313, 333. *Mat. med.* 103. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugd.* 239. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 136. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 471. *Scop. carn. n.* 458. *Pollich. pal. n.* 374. *Hoffm. germ.* 134. *Roth. germ. I.* 169. *II.* 440. *Kniph. cent.* 8. *n.* 97. *Blackw. t.* 463. *Duham. arb.* 2. *t.* 107. *Willd. arb.* 397. *Knorr. del.* 1. *Tab. S.* 18. *n.* 1.

V. foliis venoſis, ovato-lanceolatis ſerratis, caule anguloſo. *Hall. helv. n.* 1020.
Vitis idaea foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.
Myrtillus germanica et Vitis idaea. *Dalech. hiſt.* 191, 192.
Myrtillus. *Matth.* 231. *Camer. epit.* 135.
Vaccinia nigra. *Dodon. pempt.* 768.
β. Vaccinium foliis oblongis crenatis fructu albo. *Rupp. ien.* 52. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 136. *n.* 9. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 413.
Gemeine Heidelbeere. W.
Habitat in Europae *ſylvis umbroſis.* ♄ (v. v.)
Filamenta *decem. Pollich. l. c.* 8 *et* 10 *numerat Moench. haſſ. n.* 322.

*2. VACCINIUM *pallidum.*
V. racemis bracteatis, corollis cylindraceo-campanulatis, foliis ovatis acutis ſerrulatis glabris deciduis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 10.
Bleiche Heidelbeere. W.
Habitat in America *boreali.* ♄

*3. VACCINIUM *hirtum.*
V. pedunculis unifloris, foliis ovatis ſerratis, ramis teretibus divaricatis. *Thunb. jap.* 155. *.
Haarige Heidelbeere. W.
Habitat in Iaponia. ♄
Frutex *ramoſiſſimus.* Ramuli *filiformes rugoſi apice villoſi.* Folia *alterna annua ſubſeſſilia ovata acuta ſerrata villoſa, ſubtus pallidiora patentia inaequalia unguicularia.* Corolla *campanulata, laciniis revolutis.* Antherae *corolla breviores.* Thunb. l. c.

4. VACCINIUM *ſtamineum.*
V. pedunculis ſolitariis nudis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongo-ovatis acutis integerrimis, ſubtus ſubglaucis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 10.
V. pedunculis ſolitariis unifloris, antheris corolla longioribus, foliis oblongis integerrimis. *Sp. pl.* 498.
V. ſtaminibus corolla longioribus. *Gron. virg.* 43.
Vitis idaea americana, longiori mucronato folio et crenato, floribus urceolatis racemoſis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 339. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 414.
Langfädige Heidelbeere. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄ (v. ſ.)

Frutex. Folia *oblonga, integerrima.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, filiformes, corolla longiores.* Corollae *quinquefidae campanulato-patentes.* Antherae 10. Stylus *flore longior.*

5. VACCINIUM *uliginoſum.*

V. pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtuſis laevibus. *Iacq. vind.* 239. *Oed. dan.* 231. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 137. *n.* 16. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 473. *Pollich. pal. n.* 375. *Kniph. cent.* 9. *n.* 96. *Hoffm. germ.* 135. *Roth. germ. I.* 169. *II.* 441. *Willd. arb.* 397. *

V. foliis integerrimis, ovatis, venoſis. *Hall. helv. n.* 1021.

V. foliis ovalibus integerrimis deciduis. *Fl. ſuec.* 312, 332.

V. foliis annuis integerrimis. *Fl. lapp.* 142.

Vitis idaea foliis ſubrotundis exalbidis. *Bauh. pin.* 470.

Vitis idaea Geſneri major. *Camer. hort.* 182.

Vitis idaea 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61. *t.* 62.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 415.

Rauſch Heidelbeere. W.

Habitat in Sueciae *borealibus et alpinis, uliginoſis.* ♄ (v. v.)

Folia *tenella baſi ciliata.*

6. VACCINIUM *album.*

V. pedunculis ſimplicibus, foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 499.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 416.

Weiſse Heidelbeere. W.

Habitat in Penſylvania. *Kalm.* ♄

Frutex. Folia *ovata, ſubtus tomentoſa.* Flores *duo vel tres ad apices ramorum: pedunculis aggregatis breviſſimis, nudis.*

7. VACCINIUM *mucronatum.*

V. pedunculis ſimpliciſſimis unifloris, foliis ovatis mucronatis glabris integerrimis. *Sp. pl.* 499.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 416.

Spitzige Heidelbeere. W.

Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.* ♄

Frutex *Ramis teretibus, glaucis.* Folia *elliptica, utrinque glabra, integerrima, mucronata, petiolis canaliculatis inſidentia.* Pedunculi *uniflori, foliis paulo breviores.*

*8. VACCINIUM *diffuſum.*
V. pedunculis ſolitariis nudis unifloris, foliis ovatis acutis obſolete ſerratis villoſiuſculis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.
Ausgebreitete Heidelbeere. W.
Habitat in Carolina *auſtrali.* ♄

*9. VACCINIUM *anguſtifolium.*
V. pedunculis ſolitariis unifloris, foliis elliptico-lanceolatis glabris obſolete ſerrulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.
Schmalblättrige Heidelbeere. W.
Habitat in Terra nova *et* Labrador. ♄

10. VACCINIUM *corymboſum.*
V. floribus corymboſis ovatis, foliis oblongis acuminatis integerrimis. *Sp. pl.* 499.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 417.
Doldentraubige Heidelbeere. W.
Habitat in America *ſeptentrionali. Kalm.* ♄
Frutex. Folia *oblonga, acuta, nervis ſubtus villoſis.* Corymbi *ex gemmaceo involucro, ſeſſiles.* Corollae *cylindraceo-ovatae, longiores, quam in reliquis. Stamina decem.*

*11. VACCINIUM *bracteatum.*
V. racemis foliatis, foliis ſerratis acutis. *Thunb. jap.* 156.*
Beblätterte Heidelbeere. W.
Habitat in Japonia. ♄
Folia *alterna breviſſime petiolata ovata acuta ſerrata, margine revoluta, venoſa utrinque glabra pollicaria, racemorum lanceolata ſerrata lineam longa.* Flores *racemoſi ſecundi.* Pedunculi *vix ſemilineam longi.* Bracteae *in medio pedunculi binae ſetaceae longitudine pedunculi.* Corolla *cylindrica alba.* Thunb. l. c.

*12. VACCINIUM *ciliatum.*
V. racemis foliatis, foliis ovatis integerrimis hiſpidis. *Thunb. jap.* 156.*
Gefranzte Heidelbeere. W.
Habitat in Japonia. ♄
Rami *alterni erecti villoſi.* Folia *ramea ſparſa ovata acuta integerrima hiſpida inaequalia pollicaria et bipollicaria; racemorum lanceolata glabra ſemiunguicularia.* Flores *racemoſi ſecundi.* Corolla *rubra.* Thunb. l. c.

*13. VACCINIUM *fuſcatum.*
V. racemis nudiuſculis, corollis cylindrico-ovatis, caly-

cibus acutis, foliis ellipticis acutis integerrimis, venis ſubtus villoſiuſculis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.

Bräunliche Heidelbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

14. VACCINIUM *frondoſum.*

V. racemis bracteatis, pedicellis bracteolatis, corollis ſubcampanulatis, foliis obovato-oblongis integerrimis deciduis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.

V. racemis filiformibus foliosis oblongis integerrimis. *Sp. pl.* 499.

V. foliis ovatis integris deciduis, racemis foliosis. *Gron. virg.* 155. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 417.

Blattreiche Heidelbeere. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄ (v. v.)

Frutex. Folia *oblonga, integerrima.* Racemi *infra folia, bracteis oblongis parvis.* Pedunculi *partiales bracteis longiores, inſtructi bracteolis duabus filiformibus.* Corolla *ovato-campanulata.* Stamina 10.

*15. VACCINIUM *venuſtum.*

V. racemis bracteatis, pedicellis bracteolatis, corollis ſubcampanulatis, foliis ellipticis integerrimis deciduis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 11.

Rothzweigigte Heidelbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

16. VACCINIUM *liguſtrinum.*

V. racemis nudis, caule fruticoſo, foliis crenulatis oblongis. *Sp. pl.* 500.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 418.

Liguſterblättrige Heidelbeere. W.

Habitat in Penſylvania. *Kalm.* ♄

Flores *in Racemis alternis, numeroſis, deſtitutis bracteis, ſ. foliolis, qua nota facile diſtinguitur.*

*17. VACCINIUM *reſinoſum.*

V. racemis bracteatis, corollis ovatis, foliis ellipticis acutiuſculis integerrimis deciduis, atomis reſinoſis irroratis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 12.

Andromeda (*baccata*) foliis lanceolatis integerrimis acutis glabris viſcidis, floribus racemoſis, baccis decaſpermis. *Wangenh. amer.* 11. *t.* 30. *f.* 69. *

Harzige Heidelbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

*18. VACCINIUM *amoenum.*

V. racemis bracteatis, corollis ſubcylindraceis, foliis ellipticis ſubſerrulatis deciduis, venis ſubtus villoſiuſculis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 12.

Breitblättrige Heidelbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

*19. VACCINIUM *virgatum.*

V. racemis ſeſſilibus, corollis ſubcylindraceis, foliis oblongo-ellipticis ſerrulatis deciduis utrinque glabris, ramis floriferis elongatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 12.

Ruthenförmige Heidelbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄

*20. VACCINIUM *tenellum.*

V. racemis bracteatis ſeſſilibus, corollis ovato-cylindraceis, foliis oblongo-ellipticis ſubcuneiformibus ſerrulatis deciduis ſubglabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 12.

Gagelblättrige Heidelbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

21. VACCINIUM *Arctoſtaphylos.*

V. floribus racemoſis, foliis crenulatis ovatis acutis caule arboreo. *Sp. pl.* 500.

Vitis idaea orientalis maxima, ceraſi folio, flore variegato. *Tournef. cor.* 42. *it.* 2. *p.* 223. *t.* 223.

β. Vitis idaea cappadocia maxima, meſpili folio, flore variegato. *Tournef. cor.* 42.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt 3. *p.* 418.

Orientaliſche Heidelbeere. W.

Habitat in Cappadocia *et* Madera. ♄ (v. ſ.)

Racemi *foliis longiores, infra folia ſiti, foliolis ovatis inſtructi.*

** *Foliis ſempervirentibus.*

*22. VACCINIUM *meridionale.*

V. foliis ovato-oblongis acutis ſerratis perennantibus planis lucidis, racemis terminalibus erectis, corollis priſmaticis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 13.

V. floribus racemoſis, foliis ovatis crenato-ſerratis ſempervirentibus, caule arboreo. *Swartz prod.* 62. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 676.*

Weſtindiſche Heidelbeere. W.

Habitat in montibus altiſſimis coeruleis Jamaicae *auſtralis.* ♄

Corollae *rarius quinquefidae.* Fructus *V. Vitis*

idaeae ſapidus. Similis V. Arctoſtaphylo, ſed in illo: folia annua, racemi foliosi, et flores *variegati.* Swartz. l. c.

23. VACCINIUM *cereum.*

V. pedunculis ſolitariis unifloris, ancellis quinquangulari-ovatis, foliis ovato-ſubrotundis ſerratis. *Forſt. prod. n.* 167.

Andromeda (*cerea*) pedunculis axillaribus ſolitariis diphyllis unifloris, foliis alternis ovatis ſerratis. *Lin. ſuppl.* 238.

Taheitiſche Heidelbeere. W.

Habitat in inſula Taheiti. ♄ (v. ſ.)

Folia *breve petiolata.* Corolla *campanulata.* Antherae *oblongae luteae dorſo bicornes.*

24. VACCINIUM *Vitis idaea.*

V. racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Oed. dan.* 40. *Mat. med. p.* 103. *Mill. dict. n.* 2. *Gunn. norv. n.* 109. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 475. *Scop. carn. n.* 459. *Pollich. pal. n.* 370. *Roth. germ. I.* 169. *II.* 441. *Kniph. cent.* 9. *n.* 95. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 18. *n.* 2. *Hoffm. germ.* 135.

V. foliis perennantibus, ovatis, ſubtus punctatis, oris contractis. *Hall. helv.* 1022.

V. foliis obverſe ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145. *Fl. ſuec.* 314, 334. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239. *Gort. gelr.* 81.

Vitis idaea foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470. *Du Ham. arb.* 7.

Vitis idaea buxeis nec deciduis foliis. *Cluſ. pann.* 77. R.

Vitis idaea rubra. *Camer. epit.* 136. R.

Vaccinia rubra. *Dodon. p.* 770.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 419.

Rothe Heidelbeere. W.

Habitat in Europae *frigidioris ſylvis macris.* ♄ (v. v.)

25. VACCINIUM *Oxycoccus.*

V. foliis integerrimis revolutis ovatis caulibus repentibus filiformibus nudis. *Oed. dan.* 80. *Mill. dict n.* 5. *Scop. carn. n.* 457. *Gunn. norv. n.* 72. *Pollich. pal. n.* 377. *Blackw. t.* 593. *Hoffm. germ.* 135.

V. caule proſtrato, foliis ovato lanceolatis, acutis, flore quadripartito. *Hall. helv. n.* 1203.

V. ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145.

V. ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus, pedunculis ſimplicibus ſtipula duplici. *Fl. ſuec* 315, 355.
Schollera Oxycoccos. *Roth. germ. I.* 170. *II.* 442.
Oxycoccus ſ. Vaccinia paluſtris. *Bauh. hiſt.* 1. *P.* 1. *p.* 525. *Tournef. inſt. app.* 655. R.
Vitis idaea paluſtris. *Bauh. pin.* 471.
Vaccinia paluſtria. *Dod. pempt.* 770. *Lob. ic.* 109.
Oxycoccos *Cordi hiſt.* 2. *p.* 146. b. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 421.
Moos Heidelbeere. W.
Habitat in Europae *paludibus ſphagno repletis.* ♄ (v. v.)
Racemus breviſſimus, pedunculis longiſſimis: bracteis 2 alternis; Corolla revoluta.

26. VACCINIUM *hiſpidulum.* †
V. foliis integerrimis revolutis ovatis, caulibus repentibus filiformibus hiſpidis. *Kalm. it.* 3. *p.* 37.
Houttuyn Lin Pfl. Syſt. 3. *p.* 422.
Borſtige Heidelbeere. W.
Habitat in Americae *ſeptentrionalis paludoſis.* ♄
Structura antecedentis, ſed majora omnia, et Caulis ſquamis ſetaceis imbricatus.

*27. VACCINIUM *macrocarpon.*
V. foliis integerrimis ovali-oblongis obtuſis planis, caulibus repentibus filiformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 13. *t.* 7.
Vaccinium hiſpidulum. *Wangenh. amer.* 108. *t.* 30. *f.* 67.*
Vitis idaea paluſtris americana oblongis ſplendentibus foliis, fructu grandiore rubro plurimis intus acinis referto. *Pluk. alm.* 392. *t.* 326. *f.* 6. *mala.*
Vitis idaea paluſtris virginiana, fructu majore. *Raj. hiſt.* 685.
Groſsfrüchtige Heidelbeere. W.
Habitat in paludibus turfoſis Americae *borealis.* ♄ (v. ſ.)

*769. MENZIESIA.

Smith. ic. inedit. 56.

Cal. monophyllus repandus. *Cor.* monopetala. *Filam.* receptaculo inſerta. *Capſ.* ſupera quadrilocularis, diſſepimenta e marginibus inflexis valvularum.

*1. MENZIESIA *ferruginea.*
M. ferruginea. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 56. *t.* 56.*

Braune Menzieſie. W.

Habitat in Americae *borealis tractu occidentali.* ♄

Frutex *habitu Vaccinii.* Folia *in ramis terminalia alterna conferta petiolata obovato-lanceolata ſerrulato-ciliata piloſa.* Flores *axillares ferruginei nutantes.* Pedunculi *uniflori glanduloſo-hiſpidi.* W.

770. ERICA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 659.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filam.* receptaculo inſerta. *Antherae* bifidae. *Capſ.* 4-locularis. *Diſſepimenta* e valvularum margine.

* *Ariſtatae foliis oppoſitis.*

1. ERICA *glutinoſa.*

E. antheris ariſtatis piſtilloque incluſis, corollis globoſo-ovatis, foliis oppoſitis ſparſisque ciliato-glanduloſis linearibus. W.

E. (*glutinoſa*) ariſtata, foliis oppoſitis ſparſisque linearibus ciliato-glanduloſis. *Thunb. Diſſ. de Erica n.* 48.* *Thunb. prod.* 72. *Berg. cap.* 99. *Icon. horti Kewenſ. t.* 17.

Andromeda (*droſeroides*) racemis ſecundis, foliis linearibus piloſis viſcidis. *Mant.* 239.

Chamaeciſtus roris ſolis foliis. *Petiv. muſ.* 22. *t.* 161.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 5. *p.* 569.

Sonnenthauartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

Caulis *ſuffruticoſus ramoſus.* Folia *alterna ſubſeſſilia linearia obtuſa canaliculata erectiuſcula, extus undique ſparſe piloſa, ciliata ſetulis apice glanduloſo-viſcidis.* Racemi *terminales ſolitarii.* Pedunculi *purpuraſcentes.* Flores *nutantes.* Calyx *ſcarioſus ovatus concavus parvus.* Corolla *ovata violacea collo atro-purpureo, limbo minuto albo obtuſo.* Antherae *exſertae baſeos ariſtis duobus ſetaceis.* Folia *Droſerae ciſtiflorae.*

2. ERICA *lutea.*

E. antheris ariſtatis ſtyloque incluſis, corollis oblongo-

ovatis, floribus terminalibus, foliis linearibus trigonis glabris oppoſitis, ramis deflexis. W.
E. ariſtata, foliis oppoſitis lineari-trigonis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 49. * *Thunb. prod.* 72. *Berg. cap.* 115.
E. antheris ariſtatis, corollis ovatis acuminatis, floribus congeſtis, foliis oppoſitis linearibus. *Mant.* 234.
E. antheris ariſtatis incluſis, corolla lutea cylindrica baſi inflata glabra, ſtylo incluſo, floribus terminalibus vel axillaribus umbellatis erectis, foliis oppoſitis lineari-trigonis obtuſis adpreſſis, margine ſubdentato glabro. *Wendland Erica. p.* 13. *t.* 4. *
E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-acuminatis luteis, foliis oppoſitis adpreſſis triquetris. *Andrews Erica.* *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 425.
Gelbe Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *ramis anguſtis.* (*Facies qualitercunque E. imbricatae.*) Folia *oppoſita linearia appreſſa fere imbricata.* Calyx *lanceolatus rotundatus colorato-flaveſcens, corolla dimidio brevior, arctus.* Corolla *ovato-oblonga ſubroſtrata lutea.* Antherae *incluſae ariſtatae.* Stylus *incluſus.* Stigma *truncatum tetragonum echinatum.*

Corollae *laciniae inaequales.* Antherae *ariſtatae nec muticae.* W.

* — *foliis ternis.*

3. ERICA *paniculata.*
E. ariſtata, foliis ternis trigonis glabris, floribus lateralibus aggregatis, caule erecto. *Thunb. prod.* 72.
E. antheris bifidis incluſis, corollis campanulatis ſubumbellatis, foliis quaternis linearibus laevibus. *Sp. pl.* 508.
E. tenuifolia floſculis ſuave rubentibus. *Pluk. alm.* 136. *t.* 279. *f.* 2.
E. africana anguſtiſſimis foliis, floſculis in capitulum congeſtis. *Seb. muſ.* 2. *p.* 46. *t.* 44. *f.* 4.
Riſpenartige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

4. ERICA *depreſſa.*
E. antheris ariſtatis incluſis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, floribus raris, foliis ternis, caule depreſſo. *Mant.* 230.

E. ariſtata, foliis ternis oblongis glabris, floribus ſubracemoſis, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 50. *t.* 6. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 72.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 428.
Liegende Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in lateribus rupium et planitie montis* Tabularis. ♄

Caules *procumbentes copioſi palmares.* Folia *terna lanceolata obtuſiuſcula laevia carinata.* Flores *ſparſi ſolitarii.* Calyx *ſcarioſus lanceolatus acutus corolla dimidio brevior.* Corolla *campanulata obtuſa rubra laevis.* Antherae *biariſtatae incluſae breviſſimae.* Stylus *incluſus.* Stigma *obtuſum.*

5. ERICA *Halicacaba.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis campanulato-ovatis inflatis, floribus terminalibus ſolitariis, foliis ternis linearibus trigonis. W.

E. ariſtata, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus ſolitariis, caule decumbente. *Thunb. Diſſ n.* 51. * *Thunb. prod.* 72.

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis inflatis, ſtylo incluſo, foliis ternis, floribus ſolitariis. *Syſt. veg.* 301. *Icon. horti Kewenſ. t.* 2.

E. antheris bifidis incluſis, corollis inflatis maximis, foliis ternis linearibus laevibus. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 15. * *Sp. pl.* 507.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 426.
Judenkirſchartige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in rupibus praeruptis lateris occidentalis montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

Frutex *altus, ramis purpuraſcentibus, ramulis ſubtomentoſis albis.* Folia *terna confertiſſima laevia margine ſcabra.* Pedunculi *foliis breviores.* Corolla *purpuraſcens glabra, ab omnibus diſtincta, magnitudine glandis quernae.*

6. ERICA *Monſoniana.*

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo incluſo, corollis oblongo-ovatis, calyce duplici colorato, floribus terminalibus ſubſolitariis, foliis ternis oblongis obtuſis. W.

E. ariſtata, foliis ternis ovatis glabris, floribus ſolitariis, caule erecto. *Thunb. Diſſ. n.* 52. *t.* 1. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 72.

E. foliis ternis ſtylo incluſo, corolla oblonga inflata, ca-

lyce calyculato, floribus terminalibus ramulorum obtuſorum. *Lin. ſuppl.* 223. *Icon. horti Kewenſ. t.* 7.
Monſonſche Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. ſ.)

Rariſſima et Ericarum ſpecioſiſſima, floribus *magnis albis,* ſtaminibus *ariſtatis.*

Folia *in ramis adultioribus oblonga vel elliptica, in ramulis junioribus linearia acuta, in omnibus margo eſt hiſpidiuſculus.* Flores *candidi in ramulorum apice ſolitarii vel terni.* Calycis *foliola oblonga apice reflexa candida longitudine dimidii corollae.* Bracteae *quatuor ejusdem formae et coloris calycem ad dimidium tegunt.* W.

*7. ERICA *diſcolor.*

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-clavatis, calyce duplici, floribus terminalibus ternis, foliis ternis glabris. W.

E. (*diſcolor*) antheris ariſtatis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis ſemicylindraceis, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Verſchiedenfarbige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *brevia patentia glabra.* Flores *in ramulorum apice tres plerumque pedunculati.* Calyx *duplex, laciniis lanceolatis.* Corolla *longe tubuloſa pallide purpurea apice vireſcens.* W.

*8. ERICA *denſifolia.* W.

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-clavatis pubeſcentibus, floribus axillaribus, foliis ternis oblongis imbricatis. W.

Dichtblättrige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *brevia terna petiolata lineari-oblonga margine ſcabriuſcula ceterum glabra adpreſſo-imbricata, ſulco longitudinali exarata.* Flores *purpurei magni axillares.* Corolla *pubeſcens. Habitu a reliquis diſtincta. Accepi hanc ſpeciem e collectione plantarum in Capite bonae ſpei facta, et a me emta.* W.

*9. ERICA *cruenta.*

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis incurvis, calyce ſimplici glanduloſo-dentato, flo-

ribus axillaribus verticillatis, foliis ternis margine ſcabris. W.

E. antheris ariſtatis, corollis cylindraceis incurvis, ſtylo exſerto, calycibus ſubulatis baſi dilatatis, bracteis remotis, foliis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 16. *Icon. horti Kewenſ. t.* 13.

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis ſubcylindraceis, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Dunkelrothe Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri.* Ramuli *pubeſcentes.* Folia *terna petiolata lineari-ſubulata ſulco exarata patentia glabra ſemiuncialia.* Petioli *adpreſſi, vix ſemilineares.* Flores *axillares.* Pedunculi *vix ſemiunciales interdum bi-vel trifidi.* Bracteae *tres ſubulatae triquetrae.* Calycis *foliola e tota baſi ſubulata carinata glabra bilinearia.* Corolla *intenſe punicea cylindracea uncialis, parum incurva, glabra, ſubpellucida, ſuperne parum ventricoſa, ore quadrifido;* laciniae *latae acutiuſculae ſuberectae.* Filamenta *albida.* Antherae *incluſae oblongae brunneae bifidae ariſtatae.* Ariſtae *ſubulato-capillares longitudine antherarum.* Stylus *corolla paulo longior rubicundus.* Stigma *exſertum incraſſatum atropurpureum.* Ait. l. c.

10. ERICA *nigrita.*

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, calycibus imbricatis trifloris ſeſſilibus. *Mant.* 65. *Burm. prod.* 11.

E. ariſtata, foliis ternis oblongis glabris, floribus ternis, bracteis acutis imbricatis. *Thunb. Diſſ. n.* 53.* *Thunb. prod.* 72.

E. (*laricina*) antheris ſubexſtantibus, corollis campanulatis, calycibus albidis laxis, foliis ternis nitidis patentibus. *Berg. cap.* 94. *

E. africana folio corios minore, flore albo. *Seba muſ.* 2. *p.* 11. *t.* 9 *f.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 430.

Lerchenbaumblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Diaboli. ♄ (v. ſ.)

Folia *terna ſubtriquetra glabra brevia patula.* Bracteae 3 *facie calycis.* Flores *terminales albi.* Antherae *convexae obtuſae nigrae.*

Corollae *laciniae ſunt ſaepius reflexae et tunc ſtamina videntur exſerta.* W.

*11. **ERICA** *phylicoides.* W.

E. antheris ariſtatis incluſis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis calyce parum longioribus, floribus axillaribus nutantibus, foliis ternis ſexfariam imbricatis. W.

Phylicaartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Affinis E. ſexfariae ſed characteribus indicatis abunde diverſa. Habitus totius plantae eſt Phylicae ericoidis. Folia *glabra lineari-trigona terna ſexfariam imbricata.* Flores *axillares ſub ramorum apice cernui.* Pedunculi *ſolitarii vel gemini longitudine floris.* Calyx *coloratus longitudine fere corollae foliolis carinatis.* Bracteae 3 *concolores e calyce remotae in medio pedunculi colorati.* Corolla *campanulata ſtaminibus ſtyloque longior.* W.

12. **ERICA** *regerminans.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, calycibus acutis, floribus racemoſis. *Mant.* 232.

E. ariſtata, foliis ternis linearibus glabris, floribus racemoſis, caule erecto. *Thunb. diſſ. n.* 54. * *Thunb. prod.* 72.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 426.

Sproſſende Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *fruteſcens determinate ramoſus, ramis junceis,* Folia *terna lineari-ſubulata acuminata laevia patula.* Flores *racemoſi ſecundi nutantes:* Pedunculis *longitudine floris, incarnatis:* Bracteis *remotis minutis coloratis.* Calyx *coloratus ruber lanceolatus minimus.* Corolla *ovato-globoſa rubra, ore obtuſo.* Antherae *ariſtatae, corolla paulo breviores.* Stylus *incluſus longitudine corollae.* Stigma *ſubcapitatum.* Ramus *ſpicam continuat.*

13. **ERICA** *urceolaris.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovato-conicis villoſis, ſtylo incluſo, calycibus lanceolatis, floribus umbellatis, foliis ternis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 15. *Icon. horti Kewenſ. t.* 16.

E. ariſtata, foliis ternis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſubracemoſis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 55. * *Thunb. prod.* 72. *Berg. cap.* 107.

E. (*pentaphylla*) antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, foliis ternis, floribus pubeſcentibus. *Syſt. veg.* 302.

E. (*pentaphylla*) antheris bifidis incluſis, corollis ovatis acutis, foliis quinis laevibus. *Sp. pl.* 506.

E. africana fruteſcens, juniperi folio, flore urceolari breviſſimo. *Seba muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 430.

Becherförmige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Rode Sand *prope rivos infra* Winterhoek *et prope* Puspas Rivier. ♄ (v. ſ.)

*14. ERICA *marifolia.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovato-conicis, ſtylo mediocri, foliis ternis ovatis pubeſcentibus ſubtus albidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 15. *Icon. horti Kewenſ. t.* 14.

E. ariſtata, foliis ternis ovatis ſubtus tomentoſis, floribus ſubumbellatis, caule erecto. *Thunb. prod.* 73.

Gamanderblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *piloſi.* Folia *petiolata ſubrotundo-ovata obtuſa pubeſcentia, ſubtus alba.* Flores *umbellati in ramorum apice.* Stamina *incluſa.* W.

15. ERICA *planifolia.*

E. antheris ariſtatis exſertis, corollis campanulatis, foliis ternis quaternisve ovatis acutis glanduloſo-ciliatis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis patentiſſimis. *Berg. cap.* 100.

E. antheris bifidis incluſis, corollis campanulatis, foliis quaternis ciliatis patentibus. *Sp. pl.* 502.

E. ariſtata, foliis ternis ovatis ciliatis, floribus axillaribus, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 60. * *Thunb. prod.* 73.

E. (*thymifolia*) antheris ariſtatis exſertis, corolla ſubcampanulata violacea glabra, ſtylo exſerto, calyce ovato ciliato, floribus racemoſis, foliis quaternis ovatis ciliatis, caule piloſo, pilis apice glanduloſis. *Wendl. obſ. p.* 48.

E. africana hirſuta thymi foliis ternis. *Pluk. mant.* 69. *t.* 347. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 431.

Flachblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *piloſi, pilis apice glanduliferis.* Folia *plerumque terna, ſaepius quaterna petiolata, ovata acuta glabra ſubtus pallida, margine ciliata, ciliis apice glanduloſis diſtantibus.* Calyces *et* pedunculi *eodem modo piloſi.* W.

*16. **ERICA** *hirta.*

E. ariſtata, foliis ternis linearibus hiſpidis, floribus umbellatis, calyce ſcabro rudi. *Thunb. Diſſ. n.* 56. *t.* 2. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 72.

Rauhe Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Paardeberg. ♄

Corollae *globoſae ſubvilloſae longe pedunculatae.* W.

*17. **ERICA** *bicolor.*

E. ariſtata, foliis ternis ovatis ſcabris, floribus ternis cernuis glabris, calyce villoſo colorato. *Thunb. Diſſ. n.* 57. * *Thunb. prod.* 72.

Zweyfarbige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Franſche Hoek. ♄

Folia *terna ovata obtuſa ſcabra tenuiſſime villoſa.* Flores *in ramis et ramulis terminales ſaepius terni nutantes glabri.* Corolla *campanulata.* Antherae *ſubexſertae.* Thunb. l. c.

18. **ERICA** *articularis.*

E. antheris ariſtatis incluſis, corollis globoſis calyce colorato multo minoribus, foliis ternis linearibus margine membranaceis. W.

E. ariſtata, foliis ternis ovatis glabris, floribus racemoſis, caule erecto. *Thunb. Diſſ. n.* 58. * *Thunb. prod.* 72.

E. antheris bifidis incluſis, corollis campanulatis calyce colorato brevioribus, foliis ternis linearibus laevibus appreſſis. *Mant.* 65.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 439.

Groſskelchige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Frutex. Folia *linearia adpreſſa glabra, longitudine internodiorum.* Flores *racemoſi pedunculati.* Bracteae *ſolitariae et binae calycis facie et colore.* Calyx *ovatus laevis incarnatus.* Corolla *campanulata alba.* Stamina *corolla breviora.* Antherae *fuſcae bipartitae.* Stylus *atropurpureus.* Stigma *apice coeruleſcens.*

19. **ERICA** *viridipurpurea.*

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, foliis ternis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 3[illegible].

E. (*vireſcens*) ariſtata, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus racemoſis ſecundis. *Thunb. Diſſ. n.* 59.
E. foliis lanceolatis oppoſitis imbricatis, floribus uno verſu racemoſis. *Hort. cliff.* 148. *Sauv. monſp.* 170.
E. major, floribus ex herbaceo purpureis. *Bauh. pin.* 485.
E. corios folio 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 42.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 429.
Grünlichrothe Heide. W.
Habitat in Luſitania. ♄
Variat *foliis quaternis.*

20. ERICA *pubeſcens.*
E. antheris ariſtatis ſtylo incluſo, corollis ovatis pubeſcentibus, foliis ternis quaternisve hirtis, caule piloſo. W.
E. ariſtata, foliis ternis quaternisque linearibus ſcabris, floribus umbellatis piloſis. *Thunb. Diſſ. n.* 61.* *Thunb. prod.* 73.
E. antheris bifidis incluſis, corollis ſubovatis pubeſcentibus, foliis quaternis linearibus hirtis. *Sp. pl.* 506.
β. E. (*parviflora*) antheris bifidis incluſis, corollis ſubrotundis longitudine calycis, foliis quaternis ciliatis. *Sp. pl.* 506.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 535.
Behaarte Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus infra montem* Tabularem. ♄ (v. ſ.)

* — —*foliis quaternis.*

21. ERICA *perſoluta.*
E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis, calyce colorato, foliolis ovatis ciliatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ternis quaternisve linearibus glabris patentibus, ramulis pubeſcentibus. W.
E. ariſtata, foliis ternis quaternisque trigonis glabris, floribus umbellatis calyce ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 62.* *Thunb. prod.* 73.
E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, calycibus ciliatis, foliis quaternis. *Mant.* 230.
E. (*ſubdivaricata*) antheris ſtyliisque incluſis, corollis ſubcampanulatis aggregatis ſubſeſſilibus, foliis quaternis obtuſis, ramulis divaricato-erectis. *Berg. cap.* 114.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 434.

Ausgebreitete Heide. W.

Habitat in campis arenoſis Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus laeviuſculus*: Ramis *pubeſcentibus*. Folia *quaterna linearia obtuſa erecta ſubtus canaliculata longitudine articulorum hiſpida aut ſubſcabra*. Flores *umbellati, diſperſi in ſummis ramulis*. Calyx *minutiſſimus* (*ſi probe advertas*) *ciliatus*. Corolla *campanulata obtuſa*. Antherae *baſi biariſtatae incluſae*. Stylus *longitudine corollae*. Stigma *capitatum*.

*22. ERICA *gracilis*.

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, calyce colorato, foliolis linearibus glabris, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus glabris adpreſſis, caule glaberrimo. W.

E. (*gracilis*) antheris ariſtatis incluſis, corolla alba ſubcampanulata glabra, ſtylo exſerto, floribus diſperſis vel terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus brevibus glabris nitidis. *Wendl. obſ.* 47.*

Schlanke Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*23. ERICA *ſtrigoſa*.

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, calycis foliolis linearibus ciliatis, floribus terminalibus umbellatis nutantibus, foliis quaternis linearibus erectis hirtis, ramulis piloſis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis glabris, ſtylo exſerto, foliis quaternis pubeſcentibus ciliatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 17.

Striegliche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami villoſiuſculi. Folia *quaterna petiolata linearia acuta patentia villoſiuſcula, pilis longis raris apice glanduloſis ciliata trilinearia*. Petioli *ſemilineares*. Flores *in ultimis ramulis axillares*. Pedunculi *ſesquilineares*. Bracteae *tres lineares minutae caducae*. Calycis *foliola lanceolata villoſa adpreſſa lineam longa*. Corolla *campanulata pallide rubens glabra, calyce fere duplo longior*: tubus *parum ventricoſus*; limbi *laciniae obtuſae erectae*. Filamenta *alba, calyce paulo breviora*. Antherae *incluſae oblongae nigricantes bipartitae, biariſtatae*: ariſtae *ſubulatae breves parum divaricatae*. Stylus *corolla paulo longior vireſcens*. Stigma *incraſſatum convexum nigro-purpureum*. Ait. l. c.

24. **ERICA** *caffra.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis pubeſcentibus, floribus congeſtis. *Syſt. veg.* 303.

E. antheris bicornibus incluſis, corollis ſubovatis mediocribus ſolitariis, foliis ternis, caule arboreo. *Sp. pl.* 502.

E. foliis lineari-ſubulatis ternis, corollis ovatis, calycibus acutis patulis. *Hort. cliff.* 148.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 437.

Cafferſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Magnitudine *Juniperi.*

25. **ERICA** *arborea.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulato-globoſis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ternis quaternisque linearibus ſcabriuſculis, ramulis villoſis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis, ramulis incanis. *Syſt. veg.* 302. *Mill. dict. n.* 5.

E. ramis erectis tomentoſis, foliis peranguſtis acutis confertis flores ſuperantibus. *Hall. helv. n.* 1074.

E. erecta foliis quaternis, floribus ſpicato-racemoſis. *Sauv. monſp.* 170. 46.

E. foliis aceroſis linearibus patentiſſimis, corollis ovatis, ſtaminibus brevibus. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 442.

E. maxima alba. *Bauh. pin.* 485.

E. coris folio 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 432.

Baumartige Heide. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

Flores *Convallariae albi.* Caules *albidi.*

*26. **ERICA** *ſtricta.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus glabris horizontalibus. W.

Erica ſtricta. *Donn. Catal. hort. Cantab. p.* 45.

Steife Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *et ramuli glaberrimi.* Folia *quaterna petiolata linearia utrinque plana obtuſa glabra horizontaliter patentia.* Pedunculi *quatuor vel quinque in ramulorum apice colorati glabri bracteis* 2 *ſ.* 3 *ſuffulti linea-*

ribus. Calyx *viridis glaber, foliolis oblongo-ovatis obtuſis.* Corolla *rubra ovata, laciniis limbi ovatis reflexis.* Stamina *corolla duplo breviora.* Stylus *incluſus.* W.

*27. ERICA *florida.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis, calyce villoſo reflexo, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus piloſis. W.

E. ariſtata, foliis quaternis lanceolatis hirſutis, floribus umbellatis, calyce villoſo reflexo. *Thunb. Diſſ. n.* 64. *t.* 6. *f.* 1.* *Thunb. prod.* 73.

Vollblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

28. ERICA *mucoſa.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis mucoſis, pedunculis ternis terminalibus flore longioribus, foliis quaternis linearibus margine cartilagineo ſerratis. W.

E. antheris ariſtatis incluſis, corollis globoſis mucoſis faſciculatis cernuo-patentibus terminalibus, foliis quaternis. *Andrews Erica.**

E. antheris ariſtatis, corollis ſubgloboſis mucoſis, ſtylo incluſo, foliis ternis. *Mant.* 232. *Icon. horti Kewenſ. t.* 15.

E. (*ferrea*) antheris ſtylisque incluſis, corollis globoſis umbellatis, umbellis paucis, foliis quaternis linearibus obtuſis imbricatis. *Berg. cap.* 112.*

E. criſtata, foliis ternis ovatis ſerratis glabris, floribus umbellatis viſcoſis, calyce ovato colorato. *Thunb. Diſſ. n.* 76.* *Thunb. prod.* 73.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 427.

Schleimige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *inter urbem et* Bay falſo. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruteſcens determinate ramoſus, lineis albis ſubulatis decurrentibus ſub cicatricibus foliorum.* Folia *terna linearia laevia appreſſa interſtitiis vix longiora.* Flores *terminales ſubumbellati:* Pedunculis *longitudine florum:* Bracteis *linearibus minutis remotis.* Calyx *ſcarioſus mucoſus, corolla paulo brevior, ovatus acutus.* Corolla *ſubgloboſa mucoſa obtuſa.* Antherae *ariſtatae ovatae breves.* Stylus *brevis cylindricus.* Stigma *nudum.*

29. ERICA *pilulifera.*

E. ariſtata, foliis quaternis linearibus ciliatis, floribus umbellatis, calyce naviculari apice ciliato glabro. *Thunb. Diſſ. n.* 65. * *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, foliis ternis, floribus umbellatis. *Syſt. veg.* 301.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 429.

Pillentragende Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus verſus* Bay falſo. ♄

Corollae *globoſo-campanulatae.*

*30. ERICA *amoena.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis, calyce colorato villoſo, floribus axillaribus verticillatis, foliis quaternis linearibus imbricatis villoſis. W.

E. (*amoena*) antheris ariſtatis incluſis, corolla campanulata rubra glabra, ſtylis incluſis, calyce colorato villoſo, bractea pedunculo longiore, floribus verticillatis, foliis quaternis linearibus villoſis imbricatis. *Wendl. obſ.* 48.

Angenehme Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

31. ERICA *Tetralix.*

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis ciliatis, floribus capitatis. *Oed. dan. t.* 81. *Fabr. helm.* 240. *Hoffm. germ.* 135. *Roth. germ. I.* 170. *II.* 444.

E. ariſtata, foliis quaternis oblongis ciliatis ſubtus tomentoſis, floribus umbellatis, calyce ciliato tomentoſo. *Thunb. Diſſ. n.* 66. *

E. foliis ſubulatis ciliatis quaternis, corollis globoſo-ovatis terminalibus confertis. *Hort. cliff.* 148. *Fl. ſuec.* 310. 337. *Roy. lugdb.* 442.

E. ex rubro-nigricans ſcoparia. *Bauh. pin.* 486.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 535.

Sumpf Heide. W.

Habitat in Europae *borealis paludibus ceſpitoſis.* ♄ (v. v.)

Bis in anno floret.

Clariſſimi Viri Smith et Gaertner differentiam inter Ericas et Andromedas in diſſepimentorum capſulae ſitu quaerunt; ſed haec ſpecies gaudet diſſepimento valvulis contrario; an ergo potius Andromedis adnumeranda? W.

*32. ERICA *inflata.*

E. ariſtata, foliis quaternis linearibus glabris, floribus umbellatis ventricoſis, calyce ſubulato glabro. *Thunb. Diſſ. n.* 67. *t.* 2. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 73.

Aufgeblaſene Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *glabra.* Flores *umbellati cernui.* Pedunculi *villoſi.* Corolla *ventricoſa inflata obtuſa pallide ſanguinea glabra ſubpollicaris.* Antherae *ariſtatae ſtylusque incluſus.* Thunb. l. c.

*33. ERICA *gilva.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindraceis, calycinis foliolis membranaceis, floribus axillaribus verticillatis, foliis quaternis linearibus glabris cartilagineo-mucronatis. W.

E. (*gilva*) antheris ariſtatis incluſis bicornibus, corolla cylindrica inflata, ſtylis incluſis, calycibus ovatis margine ſcarioſo, floribus verticillatis racemoſis, foliis quaternis et ultra acuminatis ſubtrigonis mucronatis glabris. *Wendl. obſ.* 48.

Fahlgelbe Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Corolla *magna cylindracea ſordide flaveſcens, apice anguſtata vireſcens, laciniis limbi ſubrotundis obtuſis breviſſimis.* W.

Ab affinibus foliis *confertiſſimis cartilagineo-mucronatis ut et* corollae *forma diſtincta.* W.

34. ERICA *abietina.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindricis, floribus verticillatis nutantibus, foliis quaternis linearibus adpreſſis. W.

E. antheris ariſtatis, corollis groſſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus ſeſſilibus. *Syſt. veg.* 302.

E. foliis ſubulatis glabris quinis pluribusque verticillatis, floribus longiſſimis terminalibus confertis. *Hort. cliff.* 148.

E. antheris ſtylisque incluſis, corollis ventricoſo-cylindricis magnis verticillatis pedicellatis nutantibus, foliis quaternis glabris. *Berg. cap.* 105. *

E. folio juniperi, floribus purpureis oblongis. *Buxb. cent.* 4. *p.* 25. *t.* 41. 42. *optima.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 8. *p.* 435.

Tannenartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

[redacted]




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



Corollae *cylindricae foliis duplo longiores.*
E. abietina Thunbergii mihi videtur dubia. W.

*35. ERICA *verticillata.*
E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindricis ſupra baſin conſtrictis, floribus pendulis verticillatis, foliis quaternis patentibus. W.
E. antheris ariſtatis incluſis, corollis pollicaribus cernuis ventricoſo-cylindricis ſaturate rubris, pedunculis longiſſimis, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *
Wirtelblütige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Diſtinctiſſima: corolla *coccinea ſupra baſin conſtricta, qua nota primo intuitu diſtinguitur.* W.

*36. ERICA *Patterſonia.*
E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corolla tubuloſo-clavata, floribus horizontalibus terminalibus, foliis quaternis quinisve linearibus glabris, junioribus confertiſſimis. W.
E. (*Patterſonia*) antheris ariſtatis incluſis, foliis quaternis, floribus axillaribus e foliis emergentibus cylindricis luteis. *Andrews Erica.* *
E. antheris ariſtatis incluſis, corolla lutea tubuloſa glabra, ſtylo incluſo, floribus terminalibus ramulorum et axillaribus, in medio caulis pyramidalibus erectis, foliis quinis confertis ſubulatis ſubfiliformibus glabris. *Wendl. Erica.p.* 15. *t.* 5. *
Patterſonſche Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Rami *glabri.* Folia *quaterna vel quina linearia glabra mucronata arcuata, in ramis junioribus confertiſſima.* Flores *ſolitarii vel bini in ramulorum breviſſimorum apice.* Calycis *foliola lanceolato-ſubulata glabra bracteis quatuor lineari-ſubulatis cincta.* Corolla *flava tubuloſa ſubclavata, laciniis limbi ovatis obtuſis patulis.* Antherae *bipartitae fuſcae baſi ariſtatae incluſae.* Stylus *ſubexſertus.* W.

* - - - *foliis ſenis.*

37. ERICA *mammoſa.*
E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis clavato-cylindraceis, floribus umbellatis foliis ſubſenis linearibus reflexis. W.
D. ariſtata, foliis ſenis lanceolatis glabris, floribus um-

bellatis, calyce ſubulato glabro. *Thunb. Diſſ. n.* 69.* *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis, corollis groſſis, ſtylo exſerto, foliis quaternis. *Mant.* 234.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 436.

Zitzenförmige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *frutex rigidulus, lineis albis ſubulati a cicatriculis foliorum decurrentibus.* Folia *quaterna ſubulata conferta margine ſcabriuſcula.* Flores *ſubcapitati pollicares.* Pedunculi *breviſſimi purpurei.* Bracteis *minimis remotis.* Calyx *coloratus ſanguineus ovatus breviſſimus.* Corolla (*E. cerinthoidis*) *ovato-cylindrica ſanguinea longiſſima, ore obtuſo.* Antherae *biariſtatae corolla longiores.* Stigma *turbinatum quadrangulare.*

Antherae *et* ſtylus *incluſus in ſpecimine meo, etiam Clariſſ. Thunberg idem obſervavit.* l. c. W.

38. ERICA *empetrifolia.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, floribus verticillatis, foliis ſenis linearibus piloſis. W.

E. ariſtata, foliis ſenis oblongis ciliatis, floribus verticillatis, calyce ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 70.* *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis, corollis ovatis, foliis quaternis, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Berg. cap.* 28.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ovatis ſubſeſſilibus, foliis quinis obtuſis ciliatis. *Sp. pl.* 507.

E. africana coridis folio piloſo, floſculis minutiſſimis purpureis inter ramulos diſperſis. *Pluk. mant.* 68.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 442.

Rauſchbeerblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus verſus* Bay falſo. ♄ (v. ſ.)

Folia *ſparſa, ut Lycopodii, quaſi ſpiraliter, unde numerus eorum difficilis.*

39. ERICA *ſpicata.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-clavatis, floribus in ramorum apice verticillatis, foliis quaternis ſeniave linearibus glabris. W.

E. ariſtata, foliis ſenis lanceolatis glabris, floribus verticillatis, calyce petiolato integro. *Thunb. Diſſ. n.* 71. *tab.* 4. *f.* 3.* *Thunb. prod.* 73.

E. antheris ariſtatis incluſis, floribus pluribus denſe ſpi-

catis ſubterminalibus, foliis ſubſenis. *Andrews Erica.* *

E. (*ſeſſiliflora*) antheris ariſtatis, foliis quaternis, ſtylo exſerto, ſpica floribus ſeſſilibus deflexis oblongis. *Lin. ſuppl.* 222.

Aehrenblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus inter* Nordhoek et Bay falſo. ♄ (v. v.)

Frutex *fuſcus ſcaber determinate ramoſus rigidulus, facie Pini ſylveſtris minoris.* Folia *quaterna confertiſſima linearia acuta ſaturate viridia.* Spica *terminalis undique ambiens oblonga.* Flores *ſeſſiles imbricati latiuſculi.* Corollae *foliis longiores clavatae obtuſae ſaepius cernuae.* Stamina *non exſerta.* Stigma *parum exſertum.*

Folia *quaterna et ſena in eodem frutice.* Flores *non ſeſſiles ſed pedunculo brevi inſtructi;* Corolla *albida apice vireſcens.* W.

* - - - - *foliis octonis.*

40. ERICA *octophylla.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo incluſo, corollis cylindraceis ventricoſis, floribus umbellato-capitatis, foliis linearibus octonis truncatis. W.

E. ariſtata, foliis octonis linearibus truncatis ſquarroſis, floribus umbellatis. *Thunb. Diſſ. n.* 72. *t.* 3. *f.* 1.* *Thunb. prod.* 73.

E. (*faſcicularis*) antheris ariſtatis, corollis groſſis, ſtylo incluſo, floribus faſciculatis, foliis pluribus linearibus truncatis. *Lin. ſuppl.* 219.

Achtblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots Holland. ♄

Caulis *fruticoſus erectus compoſitus bipedalis.* Folia *conferta ſparſa, ut vix pateat quot e regione, linearia fere filiformia pollicaria laevia, baſi capillaria, erecto-patula, apice fere glandulata.* Flores *in faſciculo terminali faſtigiato.* Calyx *brevior quadripartitus linearis erectus.* Corolla *groſſa cylindrica purpurea, ore quadrifido luteo erecto.* Antherae *ariſtatae longitudine corollae.* Stylus *longitudine ſtaminum.*

*41. ERICA *faſcicularis.*

E. antheris ariſtatis, ſtylo exſerto, corollis cylindricis

clavatis, floribus numeroſis verticillatis horizontalibus, foliis octonis linearibus glanduloſo-denticulatis. W.
Erica faſcicularis. *Icon horti Kewenſ. t.* 6.
E. (*coronata*) antheris ariſtatis incluſis, foliis octonis tremulantibus obtuſis ſcabroſis, corollis ſpecioſiſſimis verticillatis confertis cylindrico-clavatis. *Andrews Erica.* *
Kronenblütige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. f.)

Rami *glabri.* Folia *octona linearia confertiſſima arcuata margine glanduloſo-denticulata glabra, longe petiolata.* Flores *numeroſi* 15-24 *ſub apice ramorum formant verticillum, ſunt pedunculati et horizontaliter ſiti.* Calycis *foliola lanceolata viridia glabra.* Pedunculi *bracteis binis diſtantibus linearibus inſtructi.* Corolla *plus quam uncialis tubuloſa clavata ſanguinea apice viridis*; laciniis *ovatis acutiuſculis conniventibus.* Antherae *fuſcae biariſtatae incluſae.* Stylus *viridis exſertus.* Stigma *fuſceſcens.* W.

** 1. *Criſtatae foliis ſparſis.*

*42. ERICA *obliqua.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis ovatis viſcoſis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ſuboppoſitis ſparſis linearibus arcuatis truncatis. W.
E. criſtata, foliis oblique ſparſis linearibus truncatis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 73. *t.* 1. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 73. *Icon. horti Kewenſ. t.* 3.
Schiefblättrige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. f.)

Pedunculi *flore longiores colorati viſcidi, bracteis tribus linearibus inſtructi.* Folia *ſunt plerumque oppoſita, ſaepius quaterna, interdum vero ſubalterna.* W.

** 2. *foliis oppoſitis.*

43. ERICA *vulgaris.*

E. antheris criſtatis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, calycibus duplicatis, floribus racemoſis ſecundis, foliis oppoſitis ſeſſilibus ſagittatis. W.
E. criſtata, foliis oppoſitis ſagittatis. *Thunb. Diſſ. n.* 74. *

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis ſubaequalibus, calycibus duplicatis, foliis oppoſitis ſagittatis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 120. *n.* 20. *Gunn. norv. n.* 15. *Scop. carn. n.* 460. *Pollich. pal. n.* 378. *Fl. dan. t.* 627. *Kniph. cent.* ii. *n.* 44. *Hoffm. germ.* 135. *Roth. germ. I.* 170. *II.* 443.

E. foliis imis ſimplicibus adpreſſis, floralibus calcaratis. *Hall. helv. n.* 1012.

E. foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inaequalibus calyce brevioribus. *Hort. cliff.* 146. *Fl. ſuec.* 308. 336. *Roy. lugdb.* 442.

E. vulgaris glabra. *Bauh. pin.* 485. *Fl. lapp.* 141.

β. E. myricae folio hirſuto. *Bauh. pin.* 485.

E. vulgaris hirſuta. *Raj. angl.* 3. *p.* 471.

γ. E. vulgaris glabra, flore albo. *Rupp. jen.* 90.

δ. E. glabra foliis ſquarroſis. W.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 424.

Gemeine Heide. W.

Habitat in Europae *campeſtribus ſterilibus frequens,* δ. *in alpibus locis udis.* ♄ (v. v.)

** 3. *foliis ternis.*

44. ERICA *gnaphalodes.*

E. antheris criſtatis, corollis ovatis tectis, ſtylo incluſo, foliis ternis, ſtigmate quadripartito. *Berg. cap.* 119.

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus ternis glabris, calyce bracteisque navicularibus coloratis. *Thunb. Diſſ. n.* 75. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris bifidis incluſis, corollis globoſis ternis, calycibus duplicibus obtuſis. *Sp. pl.* 508.

E. africana tenuifolia unedonis flore. *Pluk. mant.* 68. *t.* 346. *f.* 11.

Erica pulchella. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 427. *t.* 23. *f.* 1.

Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 438.

Ruhrkrautartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis.* ♄ (v. ſ.)

45. ERICA *corifolia.*

E. antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, calycibus turbinatis, foliis ternis, floribus umbellatis. *Berg. cap.* 108.

E. criſtata, foliis ternis lanceolatis integris glabris, flori-

bus umbellatis glabris, calyce naviculari inflato. *Thunb. Diſſ. n.* 77. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ovatis, calycibus planis, bracteis coloratis, foliis ternis glabris. *Sp. pl.* 507.

E. antheris bifidis exſertis, corollis globoſis mediocribus, pedunculis triphyllis, foliis quaternis. *Syſt. nat.* 2. p. 355.

E. africana glabra fruticoſa coris folio, arbuti flore dilute purpureo. *Seb. muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 3.

E. capenſis coridis folio, flore rubello. *Pet. gaz.* 7. *t.* 3. *f.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 438.

Erdkieferblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in campo ſabuloſo infra* Taffelberg *et* Sternberg. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus compoſitus.* Folia *terna linearia glabra.* Flores *terminales ſ. umbellulae ſeſſiles.* Bracteae *in ſingulo pedunculo tres alternae ovatae purpureae, magnitudine et facie folioli calycini.* Calyx *patens, foliolis ovatis purpureis.* Corolla *ovata purpurea.* Stigma *capitatum.*

46. ERICA *calycina.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis ovatis magnitudine calycis colorati patentis, foliis ternis adpreſſis. W.

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis glabris, calyce naviculari truncato cuſpidato. *Thunb. Diſſ. n.* 78. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo incluſo, calycibus patentiſſimis rotatis, foliis ternis. *Syſt. veg.* 303.

E. antheris criſtatis incluſis, foliis ternis, ramis filiformibus, corollis minutis urceoliformibus, calycis foliolis corolla longioribus, pedunculis longiſſimis. *Andrews Erica.* *

Erica gnaphalodes. *Berg. cap.* 119.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ſubovatis calyces coloratos aequantibus, foliis ternis laevibus. *Sp. p.* 507.

E. africana humilis, flore albo urceolari coris folio, calyce amplo. *Seb. muſ.* 2. *p.* 13. *t.* 11. *f.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 439.

Bedeckte Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

Folia *triquetra.* Bracteae *alternae.* Calyx *obtuſus.*

47. **ERICA** *triflora.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis gl[illegible]boſis magnitudine calycis colorati adpreſſi, floribus ternis terminalibus, foliis ternis, caule hirſuto. W.

E. criſtata, foliis ternis ſubulatis glabris, floribus ſubternis, calyce ovato aequante, caule hiſpido. *Thunb. Diſſ. n.* 79. *t.* 5. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis, corollis globoſo-campanulatis, ſt lo incluſo, foliis ternis, floribus terminalibus. *Syſt. veg.* 303.

β. Erica triflora ariſtata. *Wendl. obſ.* 47. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 437.

Dreyblumige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Diaboli. ♄ (v. v.)

Rami *et* Pedunculi *tomentoſi.* Corollae *longitudine calycis.*

Varietas β. differt tantum a vulgari: antheris *ariſtatis hiſpidis*, foliis *et* floribus *minoribus et* habitu *confertiori.* Wendl. l. c.

48. **ERICA** *ſcoparia.*

E. criſtata, foliis ternis linearibus integris glabris, floribus umbellatis, calyce ovato brevi, caule hiſpido. *Thunb. Diſſ. n.* 80. *

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtigmate exſerto peltato, foliis ternis. *Syſt. veg.* 302.

E. antheris bicornibus incluſis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis albis. *Sp. pl.* 502.

E. erecta, foliis ternis, floribus ad alas ſeſſilibus verticillatis. *Sauv. monſp.* 170.

E. major ſcoparia, foliis deciduis. *Bauh. pin.* 485.

E. ſcoparia, floſculis herbaceis. *Lob. ic.* 2. *p.* 215. *Sauv. monſp.* 46.

E. coris folio IV. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 42.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 431.

Beſenförmige Heide. W.

Habitat Monſpelii, *in* Hiſpania, Europa *auſtrali.* ♄

Folia *brevi diffluunt.*

49. **ERICA** *Bergiana.*

E. criſtata, foliis ternis lanceolatis ſcabris, floribus ſubter-

nis, calyce reflexo ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 81. *Thunb. prod.* 74.

E. antheris ariſtatis, corollis campanulatis, ſtylo incluſo, calycibus reflexis, foliis ternis. *Mant.* 235.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 428.

Bergiusſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Roode Sands Kloof. ♄

Frutex *bipedalis pubeſcens.* Folia *terna linearia ſubciliata erecta.* Flores *terminales ramulorum ſubſolitarii, breviſſime pedunculati.* Calyx *tetraphyllus lanceolatus acutus, corolla triplo brevior patens ſ. reflexus.* Corolla *campanulata (Convallariae majalis) purpurea obtuſa.* Stamina *corolla breviora.* Antherae *ariſtatae.* Piſtillum *longitudine corollae.* Stigma *ſubcapitatum.*

*50. ERICA *formoſa.*

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ſulcatis, calyce patenti integro. *Thunb. Diſſ. n.* 82. *t.* 3. *f.* 3. * *Thunb. prod.* 74.

Zierliche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *parva oblonga obtuſa patentia.* Flores *in ramulis terminales bini, terni, raro plures, cernui.* Corolla *albida globoſa ſtriata.* Antherae *purpureae* ſtylusque *incluſus.* Thunb. l. c.

*51. ERICA *rubens.*

E. criſtata, foliis ternis linearibus integris glabris, floribus umbellatis globoſis, calyce lanceolato brevi, ramis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 83. * *Thunb. prod.* 74.

Roethliche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Calycis *foliola lanceolata adpreſſa ſupra plana, ſubtus convexa ſulco longitudinali viridi-purpuraſcentia breviſſima.* Corolla *globoſa ſanguinea magnitudine piperis.* Antherae *criſtatae* ſtylusque *incluſus.* Thunb. l. c.

*52. ERICA *incarnata.*

E. criſtata, foliis ternis ovatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis, calyce integro, ramis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 84. * *Thunb. prod.* 74.

Fleiſchfarbene Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Calycis *foliola lanceolata integra glabra adpreſſa pur-*

purea, corolla quadruplo breviora. Corolla *oblonga campanulata alba ſemiunguicularis.* Antherae *criſtatae incluſae.* Stylus *longitudine corollae, vix exſertus, ſtigmate obtuſo.* Thunb. l. c.

53. ERICA *cinerea.*

E. antheris criſtatis, corollis ovatis, ſtylo ſubexſerto, foliis ternis, ſtigmate capitato. *Oed. dan. t.* 38.

E. criſtata, foliis ternis lanceolatis integris glabris, floribus umbellatis ovatis, calyce ſerrulato, ramis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 85. *

E. antheris bicornibus incluſis, corollis ovatis racemoſis, foliis ternis glabris linearibus. *Sp. pl.* 501. *Mill. dict. n.* 3.

Erica humilis. *Necker gallob.* 182.

E. foliis linearibus ternis, floribus globoſo-oblongis laxe ſpicatis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 110.

E. foliis aceroſis glabris ternis, corollis oblongo-ovatis, ſtaminibus longioribus verticillato-racemoſis. *Loefl. it.* 157. *

E. humilis, cortice cinereo arbuti flore. *Bauh. pin.* 486.

E. coris folio 6. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 47.

β. Erica ternis per intervalla ramulis. *Bauh. pin.* 486.

E. coris folio 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 43.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 440.

Graue Heide. W.

Habitat in Europa *media, inque* Oriente. ♄ (v. v.)

Flores *coeruleſcentes.*

54. ERICA *auſtralis.*

E. antheris criſtatis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, foliis ternis patentibus. *Syſt. veg.* 303.

E. criſtata, foliis ternis linearibus ſerrulatis glabris, floribus terminali-ſubſeſſilibus, bracteis imbricatis. *Thunb. Diſſ. n.* 86. *

E. antheris criſtatis incluſis, corollis cylindricis, calycibus duplicatis, foliis quaternis patentibus. *Mant.* 231.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 441.

Südliche Heide. W.

Habitat in Hiſpania. ♄ (v. ſ.)

Caulis *frutex erectus rigidus cinereus.* Folia *quaterna linearia obtuſa margine ſcabriuſcula patentia.* Flores *terminales* 2 *ſ.* 3, *ſubſeſſiles.* Calyx *rudis acutus carinatus imbricatus bracteis ſimilibus.* Corolla *cylindrica vix clavata obtuſa calyce triplo longior.* La-

ciniae *corollae caneſcentes.* Antherae *biariſtatae criſtatae incluſae bifidae.* Stylus *exſertus.* Stigma *capitatum.*

** 4. *foliis quaternis.*

55. ERICA *ramentacea.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis, floribus umbellatis, foliis quaternis linearibus trigonis patentibus glabris. W.

E. antheris criſtatis incluſis, corollis globoſis, umbellis confertis rubro-purpureis, pedunculis longiſſimis coloratis, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *

E. criſtata, foliis quaternis trigonis integris, floribus umbellatis, calyce lanceolato brevi. *Thunb. Diſſ. n.* 87.* *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis incluſis, corolla purpurea globoſa, ore aperto obtuſo glabro, ſtylo incluſo, floribus ramulorum terminalibus umbellatis erectis et cernuis, foliis quaternis lineari-filiformibus glabris erectis ſubimbricatis. *Wendl. Erica. p.* 17. *t.* 6. *

E. antheris ariſtatis, corollis globoſis, ſtylo incluſo, ſtigmate duplicato, foliis quaternis ſetaceis. *Mant.* 65.

E. (*multumbellifera*) antheris ſtylisque incluſis, corollis globoſis umbellatis, umbellis frequentibus, foliis quaternis ſubulatis glabris adpreſſis. *Berg. cap.* 110.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 433.

Splittrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *filiformes ramentacei longi ferruginei.* Folia *anguſtiſſima quaterna erecta adpreſſa.* Flores *umbellati.* Calyx *corolla brevior viridis.* Corollae *globoſae purpureae.* Antherae *cornubus* 2 *ciliatis, introrſum mucronatae, lateribus ovato-dehiſcentes.* Stylus *purpureus.* Stigma *duplex, inferius ſubrotundum, ſuperius quadrifidum.*

Huc pertinent ſecundum Illuſtr. Thunberg: Erica pilulifera et granulata Linnaei. W.

*56. ERICA *quadriflora.* W.

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis, calyce reflexo ciliato, umbellis terminalibus ſubquadrifloris, foliis quaternis linearibus ciliatis, caule piloſo. W.

Vierblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes piloſi.* Folia *quaterna linearia margine revoluta ciliata.* Flores *purpurei in apice omnium ramulorum umbellati; umbellis plerumque quadrifloris, interdum, praecipue inferne trifloris.* Pedunculi *filiformes florum longitudine piloſi, bracteis binis coloratis linearibus ciliatis ſuffulti.* Calyx *coloratus, foliolis apice viridibus lanceolatis reflexis ciliatis.* Corolla *globoſa, laciniis limbi obtuſis erectis.* Stamina *corolla breviora.* Antherae *fuſcae appendicibus binis lanceolatis planis tenuiſſime ciliatis inſtructae.* Germen *atropurpureum.* Stylus *ſtaminibus parum longior incluſus atropurpureus.* Stigma *capitatum vireſcens.* W.

*57. ERICA *lateralis.* W.

E. antheris criſtatis, corollis globoſo-campanulatis, calycibus adpreſſis ciliatis, floribus terminalibus et axillaribus ſecundis, foliis quaternis glabris horizontalibus. W.

Einſeitige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *quaterna aceroſa lineari-trigona obtuſiuſcula glabra horizontaliter patentia.* Flores *ſecundi ad ramorum apices axillares numeroſi purpurei.* Stamina *incluſa.* Stylus *longitudine corollae.* W.

*58. ERICA *margaritacea.*

E. antheris criſtatis, ſtylo exſerto, corollis globoſo-campanulatis, floribus terminalibus ſubumbellatis, foliis quaternis lineari-trigonis glabris erectis. W.

E. antheris criſtatis, corollis urceolato-capitatis, ſtylo mediocri. *Ait. Kew* 2. *p.* 20.

E. criſtata, foliis quaternis trigonis integris, floribus umbellatis campanulatis, calyce trigono ſubaequante. *Thunb. prod.* 74.

Perlenartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Flores *terminales* 4-8 *e ſupremis axillis.* Pedunculi *filiformes foliis breviores.* Bracteae 3 *lineares.* Calycis *foliola e lata baſi ſubulata carinata; carina ſulco exarata, laevia ſesquilinearia.* Corolla *alba: tubus urceolatus calyce paulo longior: limbi laciniae obtuſae patulae.* Filamenta *alba tubo breviora, apice inflexa.* Antherae *ovatae compreſſae brunneae bipartitae criſtatae:* laminae *oblongae acutae extus inciſo-ſerratae albae, longitudine antherarum.* Germen *ſuperne octo-*

nodulоſum rubicundum. Stylus *longitudine corollae albicans.* Stigma *capitatum, ſubtus planum, ſupra convexum ſubquadrilobum.* Ait. l. c.

59. ERICA *baccans.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis globoſis calycis colorati magnitudine, floribus umbellatis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis margine cartilagineis glabris imbricatis. W.

E. antheris criſtatis incluſis, foliis quaternis rigidis glaucis, corollis globoſis umbellatis, calycibusque purpureis. *Andrews Erica.* *

E. criſtata foliis quaternis linearibus ſerrulatis, floribus umbellatis, calyce ovato aequante. *Thunb. Diſſ. n.* 88. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis, corollis globoſo-campanulatis tectis, ſtylo incluſo, foliis ternis imbricatis. *Mant.* 233.

E. africana glabra fruticoſa arbuti flore. *Seba. muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 438.

Beerenförmige Heide. W.

Habitat in collibus arenoſis Cap. b. ſpei ♄ (v. v.)

Caulis *erectus ramoſus.* Folia *terna linearia obtuſiuſcula margine ſcabra imbricata internodiis longiora:* Petiolis *albis.* Flores *terminales ſubterni nutantes, magnitudine piſi.* Pedunculi *purpurei:* Bracteis *alternis remotis incarnatis.* Calyx *coloratus incarnatus lanceolatus longitudine corollae carinatus inflexus.* Corolla *campanulato-ſubgloboſa obtuſa rubra.* Antherae *muticae breviſſimae criſtatae flavicantes.* Stylus *cylindricus brevis.* Stigma *capitatum.*

*60. ERICA *pendula.*

E. antheris criſtatis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, umbellis multifloris terminalibus, foliis quaternis quinisve glabris oblongis margine revolutis, ramis pendulis. W.

E. (*pendula*) antheris criſtatis incluſis, corolla urceolata glabra, ſtylo incluſo, calyce bracteato, floribus terminalibus umbellatis cernuis, foliis quaternis ſaepe quinis oblongis obtuſis integris glabris. *Wendland. obſ.* 48.

Hängende Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *penduli glabri.* Folia *quaterna vel quina lineari-oblonga petiolata margine revoluta obtuſa gla-*

bra erecta. Flores *in ramulorum apice plerumque novem pedunculati nutantes umbellati.* Pedunculi *colorati tenuiſſime pubeſcentes bracteis binis ſub calyce inſtructi.* Calycis *foliola lanceolata obtuſa viridia.* Corolla *ovata.* Antherae ſtylusque *incluſus.* W.

61. ERICA *phyſodes.*

E. criſtata, foliis quaternis linearibus, floribus umbellatis viſcoſis, calyce ovato brevi. *Thunb. Diſſ.* 89. * *Thunb. prod.* 74.

E. antheris criſtatis, corollis ovatis inflatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus ſubſolitariis. *Syſt. veg.* 304.

E. ſtylis ſubexſertis, corollis ovatis majuſculis in ramulis terminalibus ſubternis, foliis quaternis linearibus glabris. *Berg. cap.* 101.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ovatis inflatis glabris, foliis quaternis linearibus glabris obtuſis. *Sp. pl.* 506.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 442.

Aufgeblaſene Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

Folia *patula lato-linearia carinata.* Calyx *ovatus glaber coloratus corolla triplo brevior.* Corollae *magnitudine piſi viſcidae.*

62. ERICA *cernua.*

E. criſtata, foliis quaternis ovatis ciliatis, floribus capitatis, calyce ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 90. * *Thunb. prod.* 74.

E. foliis quaternis, ſtylo incluſo, corolla ovata, calyce ciliato, floribus octonis cernuis. *Lin. ſuppl.* 222.

Erica cernua. *Montin Act. upſ.* 2. *p.* 291. *t.* 9. *f.* 3. *mala.*

Gebeugte Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Koude Bockeveld. ♄

63. ERICA *retorta.*

E. antheris ſubcriſtatis, foliis quaternis recurvis, corollis ovato-oblongis, ſtylo mediocri. *Lin. ſuppl.* 220.

E. criſtata, foliis quaternis ovatis ſerrulatis ſquarroſis, floribus umbellatis viſcoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 91. * *Thunb. prod.* 75.

E. antheris muticis incluſis, floribus umbellatis, corollis conicis, foliis quaternis ciliatis ſeta terminatis. *Montin Act. holm.* 1774. *p.* 297. *t.* 7. *

E. antheris muticis incluſis, foliis quaternis retortis apice

ſetaceis, margine ciliatis, floribus umbellatis viſcoſis carneis ampullaceis. *Andrews Erica.* *

Krumblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruteſcens ſcabriuſculus determinate ramoſus.* Folia *quaterna oblongo-ovata recurvata ſeta terminata, ſupra convexa glabra lucida.* Flores *terminales corymboſi ſubſeſſiles.* Calyx *coloratus ruber lanceolatus, ariſta terminali.* Corolla *longa ovato-oblonga inflata viſcida.* Faux *globoſa.* Limbus *quadripartitus acuminatus brevis.* Filamenta *linearia membranacea.* Antherae *intra faucem oblongae acuminatae, baſi lanatae vix criſtatae muticae.* Germen *oblongum.* Stylus *filiformis.* Stigma *obtuſum antheris paulo longius.*

*** † *Muticae foliis alternis.*

64. ERICA *Daboecia.*

E. antheris muticis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis, floribus racemoſis, foliis alternis ovatis ſubtus tomentoſis. W.

E. mutica, foliis alternis ſubtus tomentoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 1.*

E. racemo terminali, foliis alternis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 509. *Hudſ. angl.* 166.

Andromeda (*Daboecia*) racemis ſecundis, floribus quadrifidis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Syſt. nat.* 300.

E. cantabrica flore maximo foliis myrti ſubtus incanis. *Tournef. inſt.* 603.

Erica ſ. Daboecia hibernis. *Raj. dendr.* 98.

E. hibernica, foliis myrti piloſis ſubtus incanis. *Petiv. gaz.* 42. *t.* 27. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 568.

Irrländiſche Heide. W.

Habitat in Hiberniae Gallo vidia *in montibus* Mayo *ſolo ceſpitoſo.* ♄ (v. v.)

Racemus *terminalis ſimplex:* Floribus *alternis ſecundis:* Pedicellis *unifloris ſubviſcidis, ſubtus* Bractea *lineari.* Calyx 4-*phyllus ſubulatus erectus purpuraſcens corolla quadruplo brevior deciduus.* Corolla *violacea cylindrico-ovalis, ore parum coarctato* 4-*fido, laciniis reflexis.* Stamina 8, *filamentis albis.* Antherae *longitudine filamentorum vix corolla breviores fuſcae*

ſagittatae muticae, apice truncatae foraminibus duobus. Stylus *filiformis longitudine corollae.* Stigma *obtuſum ſubquadrifidum.*

* * * † † *foliis oppoſitis.*

65. ERICA *tenuifolia.*
E. antheris muticis incluſis, corollis calyceque ſanguineis, foliis oppoſitis. *Syſt. veg.* 304.
E. mutica, foliis oppoſitis lanceolatis glabris, floribus ternis, calyce colorato. *Thunb. Diſſ. n.* 2. * *Thunb. prod.* 69.
E. antheris ſtylisque incluſis, corollis ovatis aggregatis ſubſeſſilibus terminalibus calyce brevioribus, foliis oppoſitis. *Berg. cap.* 116. *
E. antheris bifidis incluſis, corollis ovatis calyces coloratos aequantibus, foliis oppoſitis linearibus appreſſis. *Sp. pl.* 507.
E. africana corios folio minore. *Seb. muſ.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 443.
Dünnblättrige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

* * * † † † *foliis ternis.*

66. ERICA *albens.*
E. antheris muticis incluſis, corollis ovatis oblongis acutis, racemis ſecundis, foliis ternis. *Mant.* 231.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 444.
Weiſsliche Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Caulis *fruteſcens, ramis determinatis virgatis.* Folia *terna linearia triquetra erecta laevia, internodiis longiora acutiuſcula.* Flores *ſubſpicati ſecundi albi:* Pedunculi *bracteis lanceolatis albis.* Calyx *ſcarioſus albus ovatus acuminatus corolla dimidio brevior.* Corolla *oblongo-ovata alba ventre hyalino:* Limbo *quadripartito anguſtato acuto infundibuliformi.* Antherae *muticae bifidae obtuſae breves.* Stylus *corolla brevior.* Stigma *obtuſum.*

*67. ERICA *bracteata.*
E. mutica, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus umbellatis bracteis petiolatis coloratis obvallatis. *Thunb. Diſſ. n.* 3. * *Thunb. prod.* 69.

Beblätterte Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Platte Kloof. ♄

Flores *terminales umbellati rubri, bracteis obvallati.* Bracteae *petiolatae ovatae acuminatae carinatae glabrae, exteriores margine, interiores totae ſanguineae.* Antherae *muticae* ſtylus*que incluſus.* Thunb. l. c.

68. ERICA *Thunbergii.*

E. antheris muticis mediocribus, corollis planis, tubo globoſo, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Lin. ſuppl.* 220.

E. mutica, foliis ternis linearibus glabris, floribus umbellatis, corollae tubo globoſo, limbo campanulato. *Thunb. Diſſ. n.* 4. * *Thunb. prod.* 69.

Erica Thunbergii. *Montin. Act. upſ.* 2. *p.* 290. *t.* 9. *f.* 2. *mala.*

Thunbergſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Koude Bookeveld. ♄

Caulis *rufeſcens teres rarius ramoſus.* Folia *terna linearia laevia ſeſſilia acuta fere appreſſa.* Flores *terminales pedunculati.* Bracteae *duae alternae ſcarioſae lanceolatae.* Calyx *laevis, foliolis ovatis ſcarioſis acutis flavis.* Corollae *tubus ſubgloboſus.* Limbus *quadripartitus longitudine calycis: laciniis ovatis acutis patentibus.* Antherae *extra faucem eminentes purpureae bifidae, baſi interiore gibbae.* Stylus *ſtaminibus longior.* Stigma *ſimplex obtuſum.*

69. ERICA *tetragona.*

E. mutica, foliis ternis lanceolatis ciliatis, floribus racemoſis ſecundis tetragonis. *Thunb. Diſſ. n.* 5. *t.* 4. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 69.

E. foliis ternis, ſtylo incluſo, corolla tetragona oblonga, calyce lineari, floribus racemoſis ſecundis. *Lin. ſuppl.* 223.

Viereckige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Flores *lutei* E. *luteae ſed longiores.*

70. ERICA *umbellata.*

E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis ternis aceroſis. *Syſt. veg.* 306.

E. mutica, foliis ternis trigonis ciliatis, floribus umbellatis campanulatis, caule erecto. *Thunb. Diſſ. n.* 6. *

E. antheris bicornibus exſertis, corollis globoſis umbellatis, foliis ternis aceroſis glabris. *Sp. pl.* 501. *Icon. horti Kewenſ. t.* 5.

E. foliis aceroſis glabris ternis, corollis ovatis ſtaminibus brevioribus terminalibus. *Loefl. it.* 138.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 454.
Doldenblütige Heide. W.
Habitat in Luſitania. ♄ (v. ſ.)
Antherae *baſi gibboſo-caudatae.* Corollae *coeruleſcentes.*

71. ERICA *nudiflora.*
E. antheris muticis exſertis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, foliis ternis, ramis tomentoſis. *Mant.* 229. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 57. *t.* 57. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 453.
Nacktblütige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Caulis *tomentoſus determinate ramoſus flexuoſus.* Folia *terna linearia, ſubtus ſulco exarata erecta laevia, tenellis baſi ciliatis.* Flores *ſparſi per ramos copioſi.* Pedicelli *capillares longitudine corollae.* Calyx *ſimplex ſubulatus laevis omnium minimus.* Corolla *cylindrica longitudine folii obtuſiuſcula.* Antherae *exſertae oblongae muticae.* Stylus *exſertus capillaris.* Stigma *obtuſum.*
Simillima E. racemoſae ſed differt: foliis *ternis glabris,* calyce *glabro.* W.

*72. ERICA *petiolata.*
E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis calyce colorato bracteato parum longioribus, floribus ternis terminalibus, foliis ternis lanceolatis glabris. W.
E. mutica, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus umbellatis campanulatis, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 7. *t.* 6. *f.* 2. * *Thunb. prod.* 69.
Geſtielte Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

73. ERICA *Bryantha.*
E. antheris muticis, ſtylo exſerto, corolla campanulata, floribus racemoſis corymboſis, foliis ternis oblongis obtuſis. W.
E. mutica, foliis ternis ovatis ciliatis, floribus paniculatis, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 8. *
Andromeda (*Bryantha*) floribus corymboſis, foliis ellip-

ticis, caule proſtrato. *Mant.* 238. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 57. *t.* 74. *f.* 1. *
Bryanthus repens ſerpillifolio, flore roſeo. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 133. *tab.* 57. *fig.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 367.
Moos Heide. W.
Habitat in Sibiria *ad portum* Ochotenſem, *in* Camtſchatca *et in inſula* Beringii *cum Empetro et Muſcis in rupibus.* ♄

Planta *denſis caeſpitibus uti Serpillum provenit.* Antherae *dorſo filamentorum perpendiculariter adhaerentes.* Pedunculi *multiflori.*

*74. ERICA *Stelleriana.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis, floribus terminalibus geminis, foliis ſubternis oblongo-linearibus obtuſis. W.
Andromeda (*Stelleriana*) floribus terminalibus ſubſeſſilibus cernuis, foliis ellipticis confertis. *Pallas roſſ.* 2. *p.* 58. *t.* 74. *f.* 2. *
Stellerſche Heide. W.
Habitat in Camtſchatca. ♄

Simillima praecedenti, at flores *cernui majores gemini rubicundi*, folia *latiora et ut videtur terna vel oppoſita.* W.

*75. ERICA *fucata.*

E. mutica, foliis ternis lanceolatis glabris, floribus racemoſis ſecundis globoſis, ramis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 9. *
Geſchminkte Heide. W.
Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Flores *racemoſi ſecundi globoſi albo-virentes.* Antherae *muticae ſtylusque incluſus. Variat* ramis *erectis et inflexis.* Thunb. l. c.

*76. ERICA *axillaris.*

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus racemoſis globoſis, ramis tomentoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 10. * *Thunb. prod.* 69.
Winkelblütige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Flores *in axillis foliorum ſolitarii pedunculati globoſi minuti.* Antherae *muticae*, ſtylusque *incluſus.* Thunb. l. c.

77. ERICA *imbricata.*

E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ca-

lycibus imbricatis, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Syſt. veg.* 306.

E. mutica, foliis ternis oblongis ſerratis, floribus umbellatis, bracteis imbricatis, antheris exſertis. *Thunb. Diſſ. n.* 11. *Thunb. prod.* 69.

E. antheris ſtylisque incluſis, corollis oblongis, ramulis lateralibus frequentiſſimis breviſſimis ſterilibus quinquefariam imbricatis. *Berg. cap.* 117.

E. antheris bifidis exſertis, calycibus duplicatis coloratis acutis, corolla longioribus, foliis ternis laevibus. *Sp. pl.* 503.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 454.

Schuppige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis.* ♄

*78. ERICA *ſexfaria.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis calyce colorato imbricato brevioribus, floribus ternis terminalibus, foliis ternis lineari-trigonis glabris ſexfariam imbricatis. W.

Erica ſexfaria. *Icon. horti Kewenſis t.* 11.

Sechsreihige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Tota *glabra.* Folia *craſſiuſcula linearia trigona, margine cartilaginea, terna, patentiuſcula ſexfariam poſita.* Flores *in ramorum apice tres breviſſime pedunculati albi.* Calycis *foliola ſubrotunda acutiuſcula concava corolla campanulata majora, et bracteis quatuor concoloribus oblongo-ſubrotundis carinatis ad medium usque tecta.* Filamenta *rubicunda.* Antherae *fuſcae muticae calyce longiores.* Stylus *antheris longior rubicundus.* Stigma *quadridentatum.* W.

79. ERICA *melanthera.*

E. antheris muticis mediocribus, corollis campanulatis calyce colorato longioribus, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Mant.* 232.

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus umbellatis, bracteis ovatis laxis antheris incluſis. *Thunb. Diſſ. n.* 12.* *Thunb. prod.* 69.

Schwarzſtaubbeutliche Heide. W.

Habitat in campis ſabuloſis Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *fruticoſus flexilis.* Folia *terna linearia obtuſa laevia patula.* Flores *terminales ſubumbellati confertim ſparſi ſubnutantes.* Pedunculi *longitudine co-*

rollae purpuraſcentes: Bracteis *lanceolatis alternis coloratis.* Calyx *coloratus ſanguineus obovatus latior quam longus, apice carinatus mucrone.* Corolla *campanulato-hypocrateriformis ſanguinea.* Tubus *longitudine calycis:* Limbus *patens tubo fere longior, laciniis ſubrotundo-ovatis.* Antherae *muticae bifidae atrae, longitudine limbi corollae (adeoque exſertae.)* Stylus *exſertus corolla duplo longior ſetaceus.* Stigma *obtuſum ſubtetragonum.*

80. ERICA *leucanthera.*

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus umbellatis, antheris exſertis albis. *Thunb. Diſſ. n.* 13.* *Thunb. prod.* 69.

E. foliis ternis, ſtylo exſerto, corolla campanulata, calyce albo, floribus ternis, ſtaminibus muticis exſertis. *Lin. ſuppl.* 223.

Weiſsſtaubbeutlige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Singularis corolla *alba et* antheris *muticis exſertis albis.*

*81. ERICA *taxifolia.*

E. antheris muticis incluſis, corolla ovata calyce colorato tecta, floribus umbellato-corymboſis, foliis lineari-trigonis margine cartilagineis. W.

Erica taxifolia. *Icon. horti Kewenſ. t.* 19.

E. antheris muticis incluſis, corolla cylindrica rubra, limbo patente, ſtylis incluſis, calyce colorato ovato bracteato, foliis ternis trigonis mucronatis glabris, floribus axillaribus et terminalibus umbellatis. *Wendl. obſ.* 44.

Taxusblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *determinate ramoſus, ramis valde cicatriſatis.* Folia *linearia longa trigona glabra cartilagineo-marginata et mucronata.* Flores *in ramorum apice numeroſi corymboſo-umbellati.* Pedunculi *colorati tenuiſſime ciliati:* bracteis *binis coloratis lanceolatis inſtructi.* Calycis *foliola ſubrotundo-ovata purpurea, mucronata, ciliata, apice carinata, longitudine fere corollae.* Corolla *ovata, tubo carneo, laciniis limbi purpureis ovatis acutis.* Stamina *tubo corollae breviora.* Filamenta *alba.* Antherae *flavae ovatae muticae*

bipartitae obtuſae. Germen *atropurpureum.* Stylus *purpureus longitudine ſtaminum.* Stigma *obtuſum.* W.

82. ERICA *ſpumoſa.*

E. antheris muticis incluſis, corollis ternis calyce communi obtectis, ſtylo exſerto, foliis ternis. *Syſt. veg.* 304. *Berg. cap.* 103. *

E. mutica, foliis ternis trigonis glabris, floribus capitatis, bracteis imbricatis. *Thunb. Diſſ. n.* 14. * *Thunb. prod.* 70.

Erica ſcarioſa. *Berg. cap.* 102.

E. antheris bifidis incluſis, calycibus trifloris, ſquamis inflexis, foliis ternis laevibus. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 14. *Sp. pl.* 508.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 444.

Schaumige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

Calyx *imbricatus ſanguineus.* Corollae *campanulatae flavicantes.* Stylus *longiſſimus nutans.*

83. ERICA *capitata.*

E. antheris muticis incluſis, corolla globoſo-campanulata calyce lanato tecta, floribus ſeſſilibus, foliis ternis linearibus obtuſis villoſis. W.

E. antheris muticis mediocribus, corollis tectis calyce lanato, foliis ternis, floribus ſeſſilibus. *Syſt. veg.* 304.

E. antheris bifidis exſertis, corollis globoſis, calycibus lanatis coloratis, foliis ternis hirtis. *Sp. pl.* 504. *Berg. cap.* 94.

E. carnea promont. bonae ſpei, foliis et floribus villoſis. *Petiv. gaz.* 5. *t.* 2. *f.* 10.

E. africana calyce lanuginoſo ex viridi luteo, floribus concoloribus exiguis lanugine obſitis. *Seba. muſ.* 1. *p.* 30. *t.* 20. *f.* 1. *bona.*

E. capitata nodiflora, globulis lanugine ex flavo-vireſcente obductis. *Raj. dendr.* 98.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 445.

Kopfförmige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v.v.)

Corolla *ſemiquadrifida obtuſa, calyce non longior.* Antherae *in meis incluſae.* Stylus *exſertus.*

Flores *ſeſſiles in ramulorum apice magnitudine Piſi majoris.* Calyx *foliolis ſubrotundo-ovatis lanugine flaveſcente denſe obſitis, magnitudine corollae.* Co-

rollae *ſolitariae vel binae in calyce; tubo globoſo tenuiſſime albo-villoſo; limbo glabro erecto; laciniis ſubrotundis obtuſis rectis.* Antherae *ſtylusque incluſus. A ſequente diſtinctiſſima, qua cum conjunxit Illuſtriſſ. Thunberg.* W.

84. ERICA *Bruniades.*

E. antheris muticis exſertis, corolla campanulata calyce lanato tecta, floribus umbellatis, foliis ternis linearibus obtuſis pubeſcentibus. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis tectis calyce lanato, ſtylo exſerto, foliis ternis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 306.

E. antheris bifidis exſertis, corollis globoſis calyce lanato tectis, foliis ternis ſubciliatis patentibus. *Sp. pl.* 504.

E. (*capitata*) mutica, foliis ternis ovatis hirſutis, floribus umbellatis, calycibus lanatis. *Thunb. Diſſ. n.* 15.* *Thunb. prop.* 70.

E. promont. b. ſpei floribus albidis, ſtaminibus rubris. *Petiv. gaz.* 5. *t.* 2. *f.* 9.

Eriocephalus bruniades ericaeformis monomotapenſis capitulis globulorum inſtar interius cavis et denſa lanugine tectis. *Pluk. mant.* 69. *t.* 347. *f.* 9. *optima.*

Frutex africanus aromaticus. *Seb. muſ.* 2. *p.* 64. *t.* 63. *f.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 453.

Wollköpfige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Calyx *alba lana obductus tegit totam corollam ſubtruncatam.*

Folia *minus piloſa quam in praecedente et breviora.* Flores *minores, magnitudine ſeminis Coriandri, umbellati.* Umbellae *tri-quinqueflorae.* Pedunculi *longitudine floris albo-lanati.* Calyx *lana alba tectus.* Corolla *campanulata magnitudine calycis glabra vel vix manifeſte pubeſcens.* Antherae *exſertae.* Stylus *longiſſime exſertus.* W.

85. ERICA *Paſſerina.*

E. mutica, foliis ternis ovatis glabris, floribus ſubſolitariis, calycibus tomentoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 16.* *Thunb. prod.* 70.

E. foliis oppoſitis, corollis campanulatis, antheris incluſis muticis, piſtillo exſerto. *Lin. ſuppl.* 221.

Vogelkopfartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Flores *ſolitarii terminales pedunculati.* Pedunculi *albo-tomentoſi floribus fere longiores.* Calyx *campanulatus obtuſiuſculus quadripartitus: foliolis ovatis.* Corolla *campanulata calyce duplo major.* Filamenta *omnium breviſſima.* Antherae *muticae.* Germen *albo-tomentoſum.* Stylus *exſertus.* Stigma *ſubcapitatum. Herba Paſſerinae Ericoidis, et nulla nota, ab illius diſtinguenda, ut Paſſerina Ericoid[illegible] tota eſt herba Ericae floribus Paſſerinae.*

*86. **ERICA** *totta.*

E. mutica, foliis ternis oblongis hiſpidis, floribus ternis, calycibus ciliatis. *Thunb. Diſſ. n.* 17.* *Thunb. prod.* 70.

Hottentotten Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Rami *hiſpidi.* Folia *patenti-reflexa hiſpida, lineam longa.* Flores *in ultimis ramulis terminales ſolitarii* 2 *ſ.* 3 *breviſſime pedunculati cernui albidi.* Calycis *foliola ovata ciliata albida corolla breviora.* Bracteae *ad baſin calycis ovatae albae calyciformes.* Antherae *muticae ſtylusque incluſus.* Thunb. l. c.

87. **ERICA** *abſynthioides.*

E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-campanulatis, ſtylo exſerto, ſtigmate infundibuliformi, foliis ternis. *Syſt. veg.* 304.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ſubrotundis, foliis ternis linearibus ſubpubeſcentibus. *Mant.* 66.

E. (*virgata*) ſtigmatibus quadrilobis exſertis, corollis globoſo-campanulatis numeroſis ſecundis, ramis virgatis, foliis ternis hirſutis. *Berg. cap.* 97.

E. (*virgata*) mutica, foliis ternis oblongis ſcabris, floribus ternis globoſis, calycibus integris, ſtylo exſerto. *Thunb. Diſſ. n.* 18.* *Thunb. prod.* 70.

E. africana tenuifolia unedonis flore, foliis longioribus canali appreſſis. *Pluk. mant.* 68. *t.* 347. *f.* 14.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 446.

Wermuthartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in monte* Tabulari *et in dunis verſus* Bay falſo. ♄

Frutex *ſtatura Abſynthii paniculatus caule rufo*; Ramis *ternis.* Folia *terna linearia extus gibba ſubhirſuta.* Flores *terminales ramulorum.* Corollae *pallidae.*

Antherae *atropurpureae bifidae intra os corollae.* Stigma *eminens purpureum quadrifidum.*

88. ERICA *ciliaris.*

E. antheris muticis incluſis, corollis ovatis groſſis, ſtylo exſerto, foliis ternis, racemis ſecundis. *Syſt. veg.* 304.

E. mutica, foliis ternis ovatis ciliatis, floribus axillaribus campanulatis, calycibus ciliatis. *Thunb. Diſſ. n.* 19.*

E. antheris ſimplicibus incluſis, corollis ovatis irregularibus, floribus terno-racemoſis, foliis ternis ciliatis. *Sp. pl.* 503. *Mill. dict. n.* 4.

E. foliis ovatis ciliatis ternis, corollis ovatis apice tubuloſis irregularibus verticillato-racemoſis. *Loefl. it.* 138.*

E. hirſuta anglica. *Bauh. pin.* 602.

Erica XII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 46.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 447.

Gefranzte Heide. W.

Habitat in Luſitania. ♄ (v. v.)

Planta *ſuffruticoſa bipedalis.* Folia *terna patentiſſima ſeſſilia ovata acuta margine reflexa ciliata.* Corolla *magna ovata ore contracto inaequali.*

89. ERICA *coerulea.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, pedunculis terminalibus quaternis quinisque flore nutante multo longioribus, foliis ternis linearibus obtuſis cartilagineo-denticulatis. W.

Andromeda (*coerulea*) pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis ſparſis linearibus obtuſis planis. *Sp. pl.* 563. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 121.

Andromeda taxifolia. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 54. *t.* 72. *f.* 2.*

Andromeda foliis linearibus obtuſis ſparſis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 5. *ed. Smith. p.* 133. *t.* 1. *f.* 5. *Fl. ſuec.* 336, 354. *Hort. cliff.* 163.

Andromeda rarior norvegica. Burſer. *Amoen. acad.* 1. *p.* 332. *Fl. dan. t.* 57.

E. folio abietis, flore arbuti. *Buxb. cent.* 4. *p.* 26. *t.* 53.

E. foliis aceroſis glabris imbricatis, floribus campaniformibus baſi ventricoſis, antheris bifidis incluſis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 131. *t.* 57. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 565.

Blaue Heide. W

Habitat in alpibus Norvegiae, Lapponiae, *inque* Sibiria. ♄ (v. ſ.)

Pedunculi *et* calyces *glandulis pedicellatis tecti.* W.

90. ERICA *hiſpidula.*

E. antheris muticis incluſis, corollis ſubrotundis, foliis ſubternis ovatis acutis ciliatis, caule hiſpido. *Lin. ſuppl.* 222.

E. (*hiſpida*) mutica, foliis ternis ovatis integris, floribus umbellatis globoſis, calycibus integris. *Thunb. Diſſ. n.* 20.* *Thunb. prod.* 70.

Feinhaarige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in planitie montis* Tabularis. ♄ (v. ſ.)

Caules *decumbentes ſemipedales ſtrigoſi et piloſi.* Folia *ovata acuta ſubciliata ſubſeſſilia horizontalia patula laevia.* Flores *parvi campanulati, verſus terram flexi rarius ſparſi.* Antherae *incluſae.* Stylus *corolla longior.*

91. ERICA *Petiverii.*

E. antheris muticis exſertis, corollis cylindraceis, calycinis foliolis ſubrotundis mucronatis bracteatis, floribus pedunculatis ſolitariis terminalibus, foliis ternis ſquarroſo-patentibus. W.

E. antheris muticis longiſſimis exſertis, corollis acutis, ſtylo exſerto, calycibus imbricatis, foliis ternis. *Mant.* 235.

E. mutica, foliis ternis linearibus glabris, floribus terminalibus ſolitariis cylindricis, bracteis imbricatis. *Thunb. Diſſ. n.* 21.* *Thunb. prod.* 70.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 453.

Petiverſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Frutex *fuſcus.* Rami *tecti ramulis ternis confertis breviſſimis pubeſcentibus, obtectis foliis ſquarroſis.* Folia *terna conferta ſubulata ſubtrigona margine ſubſcabra apicem verſus patula ſ. exſtantia.* Flores *ſolitarii terminales ramulorum cernui, pedunculo brevi pubeſcenti.* Calyx *ſubcartilagineus angulatus imbricatus, bracteis ſimilibus ternis brevioribus.* Corolla *cylindrica foliis triplo longior, ore quadrifido acuto, lutea.* Antherae *lineares corolla duplo longiores apice bifidae, absque manifeſtis filamentis.* Stylus *filiformis exſertus ſtaminibus longior.* Stigma *ſimplex.*

Obſ. *Similis E. Plukenetii, ſed* Calyx *duplex*: Corollae *luteae, acute quadrifidae*; Folia *ſquarroſo-imbricata nec diſtantia.*

*92. ERICA *Bankſii.*

E. antheris muticis exſertis, corolla cylindrica limbo revoluto, calycinis foliolis coloratis oblongis obtuſis bracteatis, floribus ſeſſilibus geminatis terminalibus, foliis ternis linearibus glabris erectis. W.

E. (*Bankſia*) antheris muticis exſertis, attenuatis in filamenta plana, corolla cylindrica viridi-lutea, caule decumbente ſubſpithamaeo, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Bankſiſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *decumbens ramoſus.* Folia *terna conferta erecta lineari-trigona acuta.* Flores *in ramulorum apice bini vel ſolitarii ſeſſiles.* Calycis *foliola viridi lutea oblonga obtuſa; bracteis concoloribus tecta.* Corolla *viridi-lutea cylindrica calyce duplo longior, baſi ſubventricoſa, laciniis revolutis.* Antherae *bifidae ſenſim in filamenta dilatatae exſertae flavo-fuſceſcentes.* Stylus *viridis ſtaminibus longior.* Stigma *viride capitatum.* W.

*93. ERICA *Sebana.*

E. antheris muticis exſertis, corolla clavata incurvata, calycinis foliolis ſcarioſis oblongis obtuſis bracteatis, floribus ternis terminalibus, foliis ternis linearibus ſquarroſo-patentibus. W.

Erica Sebana. *Donn index horti cantab.* 45. *Icon. horti Kewenſ. t.* 10.

E. (*Plukenetii*) antheris exſertis, corollis lateralibus cylindricis nutantibus, ramulis lateralibus frequentiſſimis breviſſimis ſterilibus. *Berg. cap.* 91. *deſcriptio nec ſynonyma.*

E. africana anguſtifolia glabra, floribus longis tubuloſis dependentibus coccineis cum longiſſimis filamentis ſeu apicibus concoloribus. *Raj. dendr.* 98. *Seba muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 4.

Sebaſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Flores *terni breviſſime pedunculati in apice ramulorum breviſſimorum.* Calyx *ſcarioſus: foliolis oblongis obtuſis carinatis, bracteis concoloribus tectis.* Corolla

purpurea clavata calyce duplo longior incurvata, laciniis limbi obtuſis rectis. Antherae *longiſſimae exſertae bifidae.* Stylus *longitudine ſtaminum.* W.

*94. ERICA *monadelphia.*

E. antheris muticis exſertis, corolla cylindrico-ovata, calycinis foliolis coloratis oblongis obtuſis bracteatis, floribus ternis terminalibus, foliis ternis linearibus obtuſis adpreſſo-erectis. W.

E. antheris muticis exſertis, attenuatis in filamenta plana, corolla conica ſanguinea, oris laciniis erectis adpreſſis, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Verwachſenfädige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

A praecedentibus corollae *figura*, foliis *obtuſis in ramis junioribus arcte adpreſſis*, calyce *colorato ſanguineo et aliis notis diſtinctiſſima.* Filamenta *ſunt dilatata et margine leviter cohaerentes.* W.

95. ERICA *Plukenetii.*

E. antheris muticis longiſſimis exſertis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, calycibus ſimplicibus, foliis ternis. *Syſt. veg.* 305.

E. mutica, foliis ternis linearibus glabris, floribus racemoſis cylindricis, bracteis remotis. *Thunb. Diſſ. n.* 22. * *Thunb. prod.* 70.

E. antheris bifidis exſertis, corollis ſubcylindricis ſubtruncatis longioribus calycibus ſimplicibus, foliis ternis linearibus. *Sp. pl.* 504.

Erica Plukenetiana. *Icon. horti Kewenſ. t.* 9.

Chamaepithys aethiopica, foliis laete virentibus, flore oblongo phoeniceo plusquam eleganti. *Pluk. mant.* 45. *t.* 344. *f.* 3. *Seba muſ.* 2. *t.* 25. *f.* 5.

α. E. (*Plukenetii pinifolia*) antheris muticis exſertis corolla ſubduplo longioribus, corolla cylindrica inflata atropurpurea glabra ſtylo exſerto, floribus ramulis racemoſis ſolitariis ſecundis cernuis, foliis ternis ſubulatis inflexis glabris confertis. *Wendl. obſ.* 45. *Wendl. Erica p.* 9. *t.* 2. *

β. E. (*Plukenetii interrupta*) antheris muticis tertia parte exſertis, corolla cylindrica carnea glabra, ſtylo exſerto, floribus racemoſis ſolitariis ſecundis cernuis, foliis ternis longis linearibus acuminatis inflexis glabris interruptis. *Wendl. obſ.* 46.

γ. E. (*Plukenetii inflata*) antheris muticis exſertis corol-

la duplo longioribus, corolla atropurpurea ventricoſa obtuſa glabra, ſtylo exſerto, floribus racemoſis ſolitariis ſecundis cernuis, foliis ternis linearibus ſubcapillaribus erectis confertis glabris. *Wendl. obſ.* 46.

β. E. (*Plukenetii conferta*) antheris muticis tertia parte exſertis, corolla cylindrica carnea glabra, ſtylo exſerto, floribus racemoſis ſolitariis ſecundis cernuis, foliis ternis linearibus ſubcapillaribus erectis confertis glabris. *Wendl. obſ.* 46.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 452.

Plukenetſche Heide. W.

Habitat in collibus arenoſis Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *terna linearia conferta.* Flores *pedunculati nutantes.* Calyx *corolla dimidio brevior ſubulatus carinatus.* Corolla *cylindrica longa ore obſolete quadrifido.* Stamina *fere membranacea linearia obtuſa corolla duplo longiora.*

Obſ. *Similis E. Petiveri ſed* calyx *ſimplex.* Corollae *obſolete quadrifidae rubrae.*

*96. ERICA *verſicolor.*

E. antheris muticis ſubexſertis, corollis clavato-tubuloſis glabris, floribus pedunculatis terminalibus, foliis ternis linearibus ciliatis. W.

E. antheris muticis ſubincluſis, ſtylo exſerto, corollis ſubcylindraceis coſtatis varie coloratis, foliis ternis. *Andrews Erica.* *

Bunte Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Corollae *tubus aurantiaco-ſanguineus ſuperne flavus, laciniis limbi viridibus.* Ramuli *apice* 3-*ſ. quadriflori.* W.

*97. ERICA *perſpicua.*

E. antheris muticis incluſis, corollis tubuloſis villoſis, floribus ſeſſilibus terminalibus ſolitariis, foliis ternis linearibus ciliatis. W.

E. (*perſpicua*) antheris muticis incluſis, corolla alba perſpicua cylindrica clavata pubeſcente, ſtylis incluſis, calyce margine ciliari, floribus in ramulis terminalibus ſolitariis ſubſeſſilibus pyramidatis, foliis ternis linearibus brevibus pubeſcentibus confertis. *Wendl. obſ.* 45. *Wendl. Erica p.* 7. *t.* 1. *

Durchſcheinende Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *ramulis breviſſimis numeroſis obſitus.* Flores *in omnibus fere ramulis ad apicem ſeſſiles.* Caly. *breviſſimus viridis bracteatus.* Corolla *albido-diaphana.* W.

*98. ERICA *Aitoni.*

E. antheris muticis incluſis, corolla hypocrateriformi, floribus umbellatis, foliis ternis linearibus patenti-erectis. W.

E. (*Aitonia*) antheris baſi bicornibus incluſis, corollis longiſſimis viſcoſis ſulcatis ſesquipollicaribus, laciniis maximis cordatis, foliis ternis. *Andrews Erica.**

Jaſminblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Ab omnibus hucusque notis Ericae ſpeciebus corolla peculiari diſtinctiſſima, quae figura et magnitudine exacte eadem ac illa Jaſmini officinalis. Tubus *ſanguineus ſtriatus viſcoſus.* Limbus *albus amplus planus, laciniis ovatis acutis apice reflexis.* W.

*** ††††*foliis quaternis pluribusve.*

*99. ERICA *cephalotes.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-clavatis, calycibus pubeſcentibus, floribus capitato-verticillatis, foliis ſenis linearibus. W.

E. mutica, foliis ſenis lanceolatis, floribus verticillato-capitatis clavatis. *Thunb. Diſſ. n.* 23.* *Thunb. prod.* 70.

Strauſsblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Corolla *purpurea.* W.

*100. ERICA *pulchella.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-campanulatis, calycibus glabris, floribus axillaribus verticillatis, foliis ſenis linearibus. W.

E. mutica, foliis ſenis lanceolatis, floribus axillaribus tubuloſo-campanulatis. *Thunb. Diſſ. n.* 24. *t.* 4. *f.* 1.* *Thunb. prod.* 70.

Schöne Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Corolla *purpurea tenuiſſime pubeſcens.* W.

*101. ERICA *longifolia.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis pubeſcentibus tubuloſo-clavatis, floribus axillaribus ver-

ticillatis, foliis ſubdenis linearibus margine cartilagineis ſcabris. W.

Erica longifolia. *Donn ind. hort. cantab. p. 42. Icon. horti Kewenſ. t. 4.*

E. (*pinea*) antheris muticis incluſis, corolla alba clavata villoſa viſcoſa, ſtylo incluſo, floribus verticillatis recurvis, foliis ſenis et ultra, lineari-lanceolatis curvatis ſubpiloſis confertis. *Wendl. Erica p. 11. t. 3.* *

Langblättrige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Simillima ſequenti, at differt: foliis *denis longioribus* corollis *clavatis evidenter coſtatis*, ſtyloque *incluſo. Ab E. pinea diſtincta* corolla *pubeſcente recta nec curvata*, foliisque *denis*. W.

Variat foliis denis et octonis. W.

*102. ERICA *veſtita*.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis pubeſcentibus tubuloſis curvatis, floribus axillaribus verticillatis, foliis ſenis adpreſſis linearibus margine cartilagineis ſcabris. W.

E. mutica, foliis ſenis linearibus ſecundis, floribus axillaribus clavatis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 25. * *Thunb. prod.* 70.

α. E. (*veſtita alba*) antheris muticis ſubincluſis, foliis ſenis tremulantibus linearibus confertis attenuatis in petiolos capillares, floribus clavatis albidis. *Andrews Erica.* *

β. E. (*veſtita purpurea*) antheris muticis ſubexſertis, foliis ſenis linearibus tremulantibus attenuatis in petiolos capillares ſemiunguiculares, floribus axillaribus clavatis purpureis. *Andrews Erica.* *

Bekleidete Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*103. ERICA *pinea*.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis glabris clavato-curvatis, floribus axillaribus verticillatis, foliis ſenis lineari-lanceolatis. W.

E. mutica, foliis ſenis lineari-lanceolatis, floribus verticillatis clavatis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 26. * *Thunb. prod.* 70.

Fichtenartige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *ſena unguicularia.* Calycis *foliola baſi latiora*

dein lineari-ſubulata glabra corolla triplo breviora. Corolla *clavata curvata alba glabra obtuſa pollicaris.* Antherae *muticae minutae purpureae ſubincluſae.* Stylus *vix exſertus.* Thunb. l. c.

*104. ERICA *Leea.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis glabris tubuloſo-clavatis ſubtetragonis, floribus axillaribus verticillatis, foliis ſenis rigidis. W.

E. antheris muticis ſubincluſis, corollis coſtatis quadratis ſubpollicaribus luteo-aurantiis, quatuor quinqueve pendulis, foliis ſenis maximis rigidis. *Andrews Erica.* *

Leeſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

105. ERICA *coccinea.*

E. antheris incluſis, ſtylo exſerto, corolla tubuloſo-clavata pubeſcente, calycibus villoſis, floribus axillaribus verticillatis, foliis ſenis linearibus, baſi margine glanduloſis, ſubpubeſcentibus. W.

E. mutica, foliis ſenis lanceolatis, floribus racemoſis clavatis villoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 27. * *Thunb. prod.* 70.

E. antheris muticis ſubincluſis, corollis clavatis groſſis, ſtylo incluſo, calycibus hirſutis, foliis quaternis. *Syſt. veg.* 305.

E. antheris bifidis exſertis, corollis clavatis quadrifidis, calycibus imbricatis, foliis ternis glabris. *Sp. pl.* 505.

E. africana anguſtifolia, floribus oblongis tubuloſis dependentibus coccineis, cum longiſſimis filamentis concoloribus. *Raj. dendr.* 98. *Seb. muſ.* 1. *p.* 32. *t.* 21. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 448.

Hochrothe Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus infra montem* Tabularem *et verſus* Bay falſo. ♄ (v. ſ.)

Corollae *pubeſcentes.* Flores *copioſi.*

Folia *tenuiſſime pubeſcentia, ſuperiora baſin verſus margine glandulis inſtructa.* Calyx *bracteis binis ad baſin cinctus villoſus.* Stylus *in ſpecimine meo eſt revera exſertus.* W.

*106. ERICA *purpurea.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corolla tubuloſa glabra, floribus axillaribus verticillatis, foliis ſenis linearibus. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis verticillatis tubuloſis, a baſi incurvata ſenſim ampliatis, foliis ſubſenis. *Andrews Erica.*
Purpurfarbene Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Calyx *glaber bracteis binis ad baſin cinctus.* Corolla *tubuloſa parum ſuperne dilatata, limbo plano.* W.

*107. ERICA *concinna.*

E. antheris muticis incluſis, corollis cylindricis baſi attenuatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis ſubſenis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 23.
Nette Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Rami *glabri.* Folia *ramorum ſena, ramulorum quaterna, petiolata erecta aceroſa glabra quadrilinearia.* Petioli *glabri vix ſemilineares.* Flores *terminales umbellati: umbellae 3-6 florae.* Pedunculi *filiformes piloſiuſculi bilineares.* Bracteae 3 *ſubulatae ciliatae calyci adpreſſae.* Calycis *foliola e lata baſi ſubulata ciliata dorſo ſulco exarata bilinearia.* Corolla *carnea extus villoſiuſculi cylindracea vix uncialis craſſitie pennae gallinae.* Filamenta *glabra tubo corollae paulo breviora.* Antherae *oblongae baſi acuminatae, apice ad medium bipartitae, ubi filamentis affixae muticae brunneae incluſae.* Germen *turbinatum ſupra concavum, margine crenulato.* Stylus *rubicundus longitudine ſtaminum.* Stigma *ſubcapitatum atrorubens.*

108. ERICA *grandiflora.*

E. antheris muticis exſertis, corollis cylindraceis ſubincurvis glabris, ſtylo elongato, floribus axillaribus pedunculatis, foliis ſubſenis aceroſis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 25. *Icon. horti Kewenſ. t.* 8. *Curt. mag.* 189.
E. foliis quaternis ſtylo exſerto, corolla cylindrica, calyce ſimplici, floribus lateralibus ſubcurvatis. *Lin. ſu. pl.* 223.
E. mutica, foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemoſis clavatis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 28. *Thunb. prod.* 70.
β. E. (*exſurgens*) antheris muticis exſertis, foliis quaternis mucronatis apicibus reflexis, corollis clavato-cylindraceis verticillatis aurantiis. *Andrews Erica.* *
Groſsblütige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *in ſpeciminibus meis glabra.* Flos *omnium maximus aurantio-flavus latere ſuperiore coccineus.* W.

*109. ERICA *cylindrica.*

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus terminalibus cylindricis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 29. * *Thunb. prod.* 70.

Cylindriſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *imbricata lineam longa.* Flores *in ultimis ramulis terminales ſubſolitarii erecti.* Calycis *foliola carinata ſubulata glabra corolla triplo breviora.* Corolla *cylindrica alba glabra ſemipollicaris.* Antherae *muticae* ſtylusque *incluſus.*

110. ERICA *curviflora.*

E. antheris muticis, corollis curvato-clavatis glabris, floribus ſolitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus terminalibus ſolitariis curvatis clavatis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 30. * *Thunb. prod.* 71.

E. antheris muticis incluſis, corollis clavatis groſſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis glabris. *Syſt. veg.* 305.

E. antheris bifidis exſertis, corollis clavato-cylindricis curvis ſolitariis, foliis ternis glabris. *Sp. pl.* 505.

E. africana fruteſcens. *Seb. muſ.* 2. *t.* 19. *f.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 448.

Krummblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *rivulorum latera prope* Drakenſtein. ♄ (v. ſ.)

Corolla *ſanguinea glabra.* Folia *glabra.* W.

*111. ERICA *ſimpliciflora.*

E. antheris muticis exſertis, corollis tubuloſo-clavatis rectis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.

Erica ſimplicifolia. *Donn. catal. hort. cantab.* 45.

Einzelnblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Rami *piloſi undique ramulis breviſſimis obſiti.* Folia *quaterna lineari-trigona glaberrima.* Flores *ſolitarii ſeſſiles in omnibus ramulorum apicibus.* Corolla *tubuloſo-clavata recta nec curvata flavo purpuraſcens longa.* Stamina *exſerta.* Stylus *longitudine ſtaminum.* W.

112. ERICA *tubiflora.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis pubeſcentibus, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus, foliis quaternis lineari-trigonis pubeſcentibus. W.

E. antheris muticis incluſis, corollis clavatis groſſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis ſubciliatis. *Syſt. veg.* 305.

E. mutica, foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus terminalibus ſolitariis curvatis clavatis hirſutis. *Thunb. Diſſ. n.* 31. * *Thunb. prod.* 71.

E. antheris bifidis incluſis, corollis clavato-cylindricis incurvatis pubeſcentibus acutis, foliis quaternis ciliatis. *Sp. pl.* 505.

E. foliis linearibus quaternis oppoſitis villoſis, corollis longiſſimis ſolitariis. *Hort. cliff.* 148.

E. africana fruteſcens. *Seb. muſ.* 2. *t.* 19. *f.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 448.

Roehrenblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *prope* Drakenſtein. ♄ (v. ſ.)

Corollae *pubeſcentes laciniis lanceolatis.* Stylus *vix exſertus.*

*113. ERICA *lanata.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-clavatis pubeſcentibus, floribus terminalibus ſubſolitariis, foliis quaternis linearibus villoſis imbricatis erectis. W.

E. (*lanata*) antheris muticis incluſis, corolla miniata curvata clavata villoſa, ſtylo exſerto, floribus terminalibus ſingulis ternisve, foliis quaternis ſubimbricatis linearibus brevibus obtuſis lanatis plurimis. *Wendl. obſ.* 45.

Wollige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Simillima praecedenti, ſed diverſa: foliis *dimidio brevioribus latioribus obtuſis planis villoſioribus et imbricatis*, floribus *ſaepius ternis in ramorum apice*, calycibus *majoribus*, *foliolis oblongo-lanceolatis obtuſis multo latioribus*, corolla *magis curvata breviore.* W.

*114. ERICA *procera.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis baſi ventricoſis, floribus ſubſolitariis terminalibus, foliis quaternis lineari-trigonis pubeſcentibus erectis. W.

E. (*procera*) antheris muticis incluſis, corolla aurantiaca tubuloſa baſi inflata hirſuta, ſtylis exſertis, floribus pyramidatis ſubſolitariis terminalibus ſeſſilibus, foliis quaternis linearibus erectis ſubpubeſcentibus. *Wendl. obſ.* 45.

Hohe Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Differt a praecedente: foliis *pubeſcentibus nec villoſis, lineari-trigonis nec planis*, calyce *bracteis binis cincto*, corolla *baſi ventricoſa*. *Diverſa ab E. tubiflora*: foliis *erectis nec patentiuſculis, minus piloſis*, calyce *non foliolis numeroſis involuto, laciniis corollae obtuſiſſimis et habitu*. W.

*115. ERICA *conſpicua.*

E. antheris muticis ſubincluſis, corollis cylindricis curvis longiſſimis piloſis, limbo revoluto, ſtylo exſerto, foliis quaternis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 22. *Icon. horti Kewenſ. t.* 12.

Langblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *pubeſcens*. Folia *lineari-triquetra glabra acutiuſcula*. Flores *in ramulorum apice ſolitarii vel terni breviſſime pedunculati*. Calycis *foliola ovata obtuſa*. Corolla *flava longe tubuloſa incurva pubeſcens, laciniis obtuſiſſimis reflexis*. Antherae *exſertae*. Stylus *longiſſimus*. W.

*116. ERICA *glanduloſa.*

E. mutica, foliis quaternis linearibus glanduloſo-piloſis, floribus clavatis glabris, calycibus hiſpidis. *Thunb. Diſſ. n.* 32. *Thunb. prod.* 71.

Drüſige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *quaterna linearia obtuſa ſupra plana, ſubtus profunde ſulcata, pilis glanduloſis hiſpida imbricata lineam longa*. Calycis *foliola ovata breviſſima, pilis glanduloſo-capitatis viſcidis hiſpida*. Corolla *cylindrico-clavata ſanguinea glabra pollicaris*. Antherae *muticae incluſae*. Stylus *ſtigmate capitato*. *Differt facile a congeneribus* pilis *glanduloſo-capitatis et viſcidis*. Thunb. l. c.

*117. ERICA *transparens.*

E. mutica, foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus terminali-ſubſolitariis. *Thunb. prod.* 71.

Erica cerinthoides γ. *Thunb. Diſſ. n.* 33.
Durchſichtige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Diſtincta ab E. perſpicua, foliorum *numero et* corollis *glabris*. Corolla *ceterum alba diaphana*. W.

118. ERICA *cerinthoides*.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis tubuloſo-clavatis piloſo-viſcoſis, floribus verticillatis nutantibus, foliis quaternis linearibus reflexis villoſo-glanduloſis. W.

E. antheris muticis incluſis, corollis clavatis groſſis, ſtigmate incluſo cruciato, foliis quaternis. *Syſt. veg.* 305.

E. mutica, foliis quaternis oblongis ciliato-ſerratis, floribus cylindricis villoſis, calycibus ſerratis. *Thunb. Diſſ. n.* 33.* *Thunb. prod.* 71.

E. antheris bifidis incluſis, corollis ſubclavatis hirtis, floribus aggregatis ſeſſilibus, foliis quaternis ciliatis. *Sp. pl.* 505.

E. africana flore purpureo. *Barth. act.* 2. *p.* 57.

E. coris folio hiſpido cerinthoides africana. *Breyn. cent.* 25. *t.* 33. *Seb. muſ.* 2. *p.* 22. *f.* 4. *et tab.* 34. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 449.
Wachsblumenartige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus infra* Taffelberg *et* Sternberg. ♄ (v. ſ.)

Flores *ſubcapitati pubeſcentes*. Calyx *quaſi duplicatus*.

119. ERICA *Sparrmanni*.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſis ſtrigoſo villoſis, calyce lanato, floribus ſeſſilibus quaternis, foliis [illegible] oblongis ciliatis imbricatis. W.

E. mutica, foliis quate[illegible]ngis ciliato-ſerratis, floribus campanulatis calycibusque ſtrigoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 33.* *Thunb. prod.* 71.

E. foliis quaternis imbricatis ciliatis, capitulis quadrifloris, corollis tubuloſis ſtrigoſo-hiſpidis, antheris muticis. *Lin. ſuppl.* 219. *Act. holm.* 1778. *p.* 24. *t.* 2.*
Sparrmanniſche Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Longe Kloof. ♄

Singularis eſt capitulis florum ſemper diviſis in flores quatuor. Capitulum *antequam flores elongantur globoſum echinatum inſtar Achyranthidis apparet, ex*

patentiſſimis luteis ſetis foliorum involucri et calycis. Corolla *hirſutiſſimae, ore quadrifido, laciniis breviſſimis.*

120. ERICA *Maſſoni.*

E. antheris muticis incluſis, corollis cylindricis groſſis, floribus capitatis, foliis octofariis imbricatis pubeſcentibus. *Lin. ſuppl.* 221. *Icon. horti Kewenſ. t.* 20. *Curt. mag.* 356.

E. mutica, foliis quaternis oblongis ſerratis villoſis, floribus cylindricis viſcoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 35. *t.* 3. *f.* 2.* *Thunb. prod.* 71.

E. antheris muticis incluſis, corollis ſubcylindricis viſcoſis ſpecioſiſſimis tricoloratis, foliis ſubquaternis pilis longis veſtititis. *Andrews Erica.**

Maſſonſche Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. ſ.)

Caules *fruteſcentes filiformes foliis undique tecti.* Folia *quaterna octofariam imbricata breviſſima elliptica conferta obtuſa ciliata, unde villoſa apparent.* Flores *in capitulo terminali ſeſſili.* Calyx *brevior linearis piloſus.* Corolla *cylindrica groſſa, ore quadrifido erecto acutiuſculo.* Antherae *muticae corolla breviores.* Piſtillum *longitudine ſtaminum.*

*121. ERICA *ventricoſa.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis oblongo-ovatis, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus ciliatis. W.

E. mutica, foliis quaternis trigonis ciliatis, floribus ventricoſis glabris. *Thunb. Diſſ. n.* 36. *t.* 1. *f.* 1. *Thunb. prod.* 71. *Curt. mag.* 350.

E. antheris baſi bicornibus incluſis, corollis oblongo-ovatis ventricoſis glabris, foliis quaternis ciliatis. *Andrews Erica* *

Bauchige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*122. ERICA *ampullacea.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis ſtriatis baſi globoſo-ovatis, ſuperne cylindraceis, floribus terminalibus umbellatis, foliis quaternis linearibus ciliatis reflexis. W.

E. (*ampullacea*) foliis ciliatis mucronatis, bracteis colo-

ratis, floribus umbellatis ſubquaternis erecto-patentibus, ſtylo exſerto. *Curt. mag.* 303. *
Blaſenförmige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *pallide purpurea lineis ſaturatioribus longitudinalibus, baſi globoſo-ovata, ſuperne valde elongata et anguſtata cylindracea, limbo patente, laciniis obtuſis. Differt a praecedente:* foliis *duplo brevioribus reflexis,* corollae *forma et ſtriis,* calyce *colorato* bracteis*que ad pedunculorum baſin coloratis brevibus.* W.

123. ERICA *faſtigiata.*
E. antheris muticis incluſis, corollis hypocrateriformibus faſciculatis, ſtylo incluſo, foliis quaternis. *Syſt. veg.* 305. *Burm. prod.* 11.
E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus integris. *Thunb. Diſſ. n.* 37. *Thunb. prod.* 71.
E. antheris muticis incluſis, corollis hypocrateriformibus faſciculatis, foliis quaternis linearibus ſcabris. *Mant.* 66. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 450.
Gipfelblütige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in* Platte Kloof, Franſche Hoek *et montibus* Hottentots-Holland. ♄ (v. v.)
Fruticulus *ramis laevibus quadrifariam ſtria exaratis.* Folia *quaterna linearia acuminata triquetra laevia, margine ſcabra erecta, longitudine internodiorum, at ſumma longiora.* Flores *faſciculati faſtigiati terminales.* Calyx *foliis ſimilis.* Corolla *tubo cylindrico patulo foliis paulo longiore.* Limbus *quadripartitus planus, ſubtus ruber, ſupra albus, laciniis ſubcordatis.* Stamina *capillaria corolla breviora.* Antherae *vix emarginatae.*

*124. ERICA *incurva.*
E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, floribus terminalibus capitatis, foliis quaternis incurvis ciliatis. W.
E. antheris muticis exſertis, corolla purpurea ovata minima glabra, ſtylo exſerto, floribus terminalibus capitatis involucratis, foliis quaternis denſis linearibus pubeſcentibus incurvis. *Wendl. obſ.* 47.
Krummblättrige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Habitu accedit ad E. empetrifoliam ſed longe diverſa foliis *linearibus incurvis quaternis longe ciliatis*, floribus *denſe capitatis*, antheris *muticis*. W.

*125. ERICA *globoſa*. W.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, calycibus imbricatis, floribus terminalibus globoſo-capitatis, foliis quaternis linearibus cartilagineo-dentatis, apice calloſis. W.

Kuglichblütige Heide. W

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *quaterna petiolata horizontaliter patentia linearia apice calloſa, margine cartilaginea globoſo-dentata.* Flores *ſex ad octo in ramulorum apice ſeſſiles et capitati.* Calycis *foliola alba longitudine tubi corollae oblonga acuta margine tenuiſſime ſubciliata.* Bracteae *concolores longitudine calycis.* Corolla *ut in ſicco ſpecimine videtur rubra, campanulata profunde quadrifida, laciniis rectis acutis.* Stamina *corolla breviora.* Stylus *longitudine laciniarum corollae.* W.

126. ERICA *comoſa*.

E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-oblongis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus congeſtis. *Mant.* 234.

E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus ciliatis. *Thunb. Diſſ. n.* 38. *Thunb. prod.* 71. *Icon. horti Kew. t.* 18.

Erica transparens. *Berg. cap.* 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 451.

Buſchige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſummitate montis* Tabularis *et in* Platte Kloof. ♄ (v. ſ.)

Caulis *ramis ſupra flores congeſtis.* Folia *quaterna linearia obtuſiuſcula erecta.* Flores *congeſti infra caulis apicem.* Calyx *ſcarioſus ſubdiaphanus obtuſiuſculus erectus.* Corolla *ovato-cylindrica:* Limbo *plano acutiuſculo.* Antherae *muticae incluſae breviſſimae.* Stylus *incluſus.* Stigma *capitatum.*

Obſ. Corollae *figura ſimilis E. albentis.*

127. ERICA *denticulata*.

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis ovatis, calycinis foliolis membranaceis ciliato-dentatis, floribus terminalibus ſeſſilibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.

E. antheris muticis incluſis, corollis ovato-infundibu-

liformibus, ſtylo incluſo, calycibus denticulatis, foliis quaternis. *Mant.* 229.
E. (*dentata*) mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus capitatis, calycibus ſerratis. *Thunb. Diſſ. n.* 39. * *Thunb. prod.* 71.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 450.
Gezähnelte Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Caules *diſtorti E. vulgaris.* Folia *quaterna conferta patentiuſcula ſubteretia laevia.* Flores *ſubfaſciculati terminales.* Calyx *duplicatus: foliolis ſerrato-denticulatis.* Corolla (*tubus oblongo-ovatus*) *ſubinfundibuliformis.* Laciniis *ovatis obtuſis patentibus.* Antherae *muticae corolla non longiores fere incluſae.* Stylus *incluſus.* Stigma *obtuſum.*

*128. ERICA *Muſcari.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis ovatis ſubtetragonis, calycinis foliolis lanceolatis integerrimis, floribus terminalibus ſeſſilibus, foliis quaternis lineari-trigonis glabris. W.
E. antheris muticis incluſis, corollis oblongo-ovatis obtuſe tetragonis, foliis quaternis. *Andrews Erica.* *.
Wohlriechende Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Rami *glabri omnes apice floriferi.* Corollae *pallide flavae limbo reflexo, ſubtetragonae*, antheris ſtylisque *incluſis.* W.

129. ERICA *viſcaria.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo incluſo, corollis campanulatis glutinoſis, calycibus foliaceis ciliatis, floribus ſubracemoſis, foliis quaternis linearibus glabris. W.
E. antheris muticis incluſis, corollis campanulatis glutinoſis, ſtylo incluſo, foliis quaternis, floribus racemoſis. *Mant.* 231. *Icon. horti Kewenſ. t.* 1.
E. mutica, foliis quaternis trigonis glabris, floribus racemoſis campanulatis, calyce rudi ciliato. *Thunb. Diſſ. n.* 40. * *Thunb. prod.* 71.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 451.
Klebrige Heide. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Caulis fruticoſus determinate ramoſus. Folia *quaterna linearia erecta acuta interſtitiis longiora margine ſcabra.* Flores *racemoſi.* Bracteis *calycinis rudibus*

approximatis. Calyx *rudis ſubulatus corolla dimidio brevior.* Corolla *campanulata valde mucoſa purpuraſcens ſemiquadrifida: laciniis erectis acutis.* Antherae *muticae bifidae extrorſum cavitate dehiſcentes breviſſimae.* Stylus *corolla brevior ſtaminibus duplo longior purpureus.* Stigma *capitatum quadrilobum.* Germen *hirſutum.*

Variat foliis quaternis et ſenis. W.

*130. ERICA *pyramidalis.*

E. antheris muticis incluſis, ſtylo exſerto, corollis hiſpidis campanulato-infundibuliformibus, floribus umbellatis, foliis quaternis lineari-triquetris pubeſcentibus. W.

E. (*pyramidalis*) antheris muticis incluſis, corollis infundibuliformibus quaternis, ſtylo ſubexſerto, foliis quaternis pubeſcentibus. *Ait. Kew.* 3. *p.* 491. *Curt. mag.* 366.*

Pyramidenförmige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes pubeſcentes.* Folia *quaterna lineari-triquetra pubeſcentia tenuia.* Flores *rubri in apice ramulorum plerumque terni pedunculati recti.* Calycis *foliola colorata apice viridia lanceolata brevia.* Corolla *campanulato-infundibuliformis pilis breviſſimis tecta, laciniis limbi longis ovatis acutis rectis.* Stamina *longitudine corollae.* Stylus *exſertus.* W.

131. ERICA *mediterranea.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis cylindraceo-campanulatis, floribus axillaribus, pedunculis flore brevioribus, foliis quaternis linearibus glabris. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis ovatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis patentibus, floribus ſparſis. *Mant.* 229.

E. mutica, foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemoſis campanulatis, calyce colorato integro lanceolato. *Thunb. Diſſ. n.* 41.*

E. maxima purpuraſcens longioribus foliis. *Bauh. pin.* 485.

E. foliis corios quaternis, flore purpuraſcente. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 356.

E. corios folio II. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 42.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 457.

Mittelländiſche Heide. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

Caulis *ramis albicantibus angulatis.* Folia *quaterna laevia patentia* (*rarius quina*). Flores *laterales ſparſi.*

Calyx *ſimplex coloratus lanceolatus acutus, corolla dimidio brevior.* Corolla *ovata.* Antherae *exſertae muticae.* Stylus *exſertus corolla duplo longior.* Stigma *ſimplicisſimum.*

132. ERICA *multiflora.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis campanulatis, floribus axillaribus, pedunculo longitudine floris, foliis quinis linearibus glabris. W.

E. mutica, foliis quinis linearibus glabris, floribus racemoſis ſubcampanulatis, calyce colorato integro ovato. *Thunb. Diſſ. n.* 42. *

E. antheris muticis exſertis, corollis cylindricis, ſtylo exſerto, foliis quinis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 307.

E. antheris ſimplicibus bifidis exſertis, corollis cylindricis, foliis quinis patentibus. *Sp. pl.* 503.

E. foliis corios multiflora. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 356. *Raj. angl.* 3. *p.* 471. *

E. maxima purpuraſcens longioribus foliis. *Bauh. pin.* 485.

E. juniperifolia denſe fruticans narbonenſis. *Lob. hiſt.* 620. *Garid. aix.* 160. *t.* 32. *Sauv. monſp.* 46.

β. *longipedunculata* pedunculis flore duplo longioribus.

Erica multiflora longipedicellata. *Wendl. obſ.* 47.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 456.

Vielblütige Heide. W.

Habitat in Anglia, G. Narbonenſi, Oriente. ♄ (v. v.)

Caul. *altitudine humana.* Folia *quaterna ſ. quina patentia obtuſa baſi gibba.* Flores *purpuraſcentes.*

Differt praecipue a praecedente, foliis *latioribus,* pedunculis *longitudine floris,* corolla *breviore urceolato-campanulata,* calycinis *foliolis ovatis minoribus ſaepius margine tenuisſime ciliatis.* W.

133. ERICA *herbacea.*

E. antheris muticis exſertis, ſtylo exſerto, corollis tubuloſo-campanulatis, floribus axillaribus ſecundis, foliis quaternis linearibus glabris. W.

E. antheris muticis exſertis, corollis oblongis, ſtylo exſerto, foliis quaternis, floribus ſecundis. *Syſt. veg.* 306.

E. mutica, foliis quaternis linearibus glabris, floribus racemoſis ſecundis. *Thunb. Diſſ. n.* 43. *

E. foliis patentibus quaternis acutis caducis, flore calyce longiore, antheris eminentibus. *Hall. helv. n.* 1013.

E. procumbens herbacea. *Bauh. pin.* 486.

E. corios folio VIII. *Cluſ. hiſt.* 1, *p.* 44.

β. Erica carnea. *Sp. pl.* 504. *Scop. carn. n.* 461.
E. antheris ſimplicibus exſertis, corollis ovatis ſublongioribus, foliis quaternis triangularibus patentibus glabris. *Iacq. auſtr. t.* 32.
E. procumbens, ternis foliis carnea. *Bauh. pin.* 468.
E. coris folio IX. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 44.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 456.
Krautartige Heide. W.
Habitat in Europa *auſtraliori.* ♄ (v.v.)
E. α. hyemalis eſt planta β. vernalis ſ. junior flores perficiens. Hall. l. c.
Differt a binis praecedentibus corollae *forma*, calyce *adpreſſo, nec patente, multo longiore,* floribus *ſecundis.* W.

134. **ERICA** *purpuraſcens.*
E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis, floribus ſparſis. *Syſt. veg.* 306.
E. mutica, foliis quaternis quinisque glabris, floribus ſparſis campanulatis, caule decumbente. *Thunb. Diſſ. n.* 44.*
E. foliis in ſummitate quinis, caule procumbente. *Sp. pl.* 503. *Segu. veron.* 280.
E. procumbens dilute purpurea. *Bauh. pin.* 486. *Raj. hiſt.* 1715.
E. foliis corios, flore purpureo dilutioris coloris. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 358.
E. coris folio VII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 43.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 455.
Italiäniſche Heide. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄
Calyx *ſubulatus.* Corolla *cylindrica.* Antherae *profunde bifidae.* Folia *terna ſ. quaterna, at in ſummis ramulis quina obſervante Seguiero.*

135. **ERICA** *vagans.*
E. antheris muticis exſertis, corollis campanulatis, ſtylo exſerto, foliis quaternis, floribus ſolitariis. *Syſt. veg.* 306.
E. mutica, foliis quaternis quinisque glabris, floribus ſparſis campanulatis, caule erecto. *Thunb. Diſſ. n.* 45.*
E. antheris muticis exſertis, floribus campanulatis ſolitariis, foliis quaternis patulis. *Mant.* 230.
Zerſtreutſtielige Heide. W.
Habitat in Africa, *etiam* Toloſae. ♄
Caulis (*Empetri*) *fruticoſus, ſcabriuſculus.* Ramis *ultimis albidis divaricatis.* Folia *quaterna, rarius*

quina linearia obtuſiuſcula laeviuſcula, ſ. ſcabriuſcula, ſubtus convexa canaliculataque breviuſcula conferta: Flores *ad latera ramulorum ſparſi pedunculati ſolitarii.* Calyx *coloratus erectus concavus breviſſimus.* Corolla *campanulata obtuſa.* Antherae *ecaudatae exſertae bipartitae.* Stylus *exſertus.* Stigma *ſimplex.*

Similis E. herbaceae, cui Ramuli *laeves;* Folia *acuta;* Corollae *ovatae acutiuſculae;* Calyces *patentes longitudine dimidiae corollae;* Antherae *lineares acutae duplo longiores, nec baſi gibbae.*

136. ERICA *cubica.*

E. antheris muticis incluſis, corollis campanulatis acutis, ſtylo incluſo, calycibus tetragonis, foliis quaternis patentibus. *Syſt. veg.* 305. *Mant.* 233.

E. mutica, foliis quinis trigonis incurvis glabris, floribus umbellatis globoſis, calyce colorato carinato. *Thunb. Diſſ. n.* 46.* *Thunb. prod.* 72.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 450.

Würfelblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus determinate ramoſus.* Folia *quaterna patentia linearia acuta, internodiis longiora, ſubincurva; petiolis albis.* Flores *terminales corymboſi.* Pedunculi *ſubtomentoſi, medio* Bracteis *ſetaceis.* Calyx *ſcarioſus tetragonus, foliolis obcordatis ſcarioſis complicatis carinatis, apice inflexo rudi.* Corolla *campanulata ſemiquadrifida acuta purpurea (baſi pallida), calyce duplo longior.* Antherae *muticae apice bicornes acuminataeque breviſſimae.* Stylus *longitudine corollae.* Stigma *obtuſum.*

*137. ERICA *racemoſa.*

E. mutica, foliis quaternis lanceolatis villoſis, floribus racemoſis globoſis, calycibus tomentoſis. *Thunb. Diſſ. n.* 47. *t.* 5. *f.* 1. *Thunb. prod.* 72.

Traubenblütige Heide. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *erectus pedalis et ultra.* Rami *verticillati et elongati divaricato-erecti pubeſcentes.* Ramuli *verticillati breves, per intervalla ſparſi, villoſi.* Folia *quaterna lanceolata obtuſa, ſupra plana, laeviuſcula, ſubtus ſulcata hiſpida, patentia, lineam longa.* Flores *in ramulis racemoſi ſubnutantes incarnati.* Racemi *ſubdiſtichi pollicares usque digitales.* Pedunculi *ca-*

pillares villoſi cernui, corollae longitudine. Calycis *foliola ovata obtuſa incano-tomentoſa, adpreſſa breviſſima.* Corolla *ſubgloboſa, ore patulo obtuſo.* Antherae *muticae exſertae brunneae.* Stylus *exſertus ſtaminibus longior,* ſtigmate *capitato. Differt ab E. purpuraſcente:* caule *erecto; ab E. vagante:* foliis *piloſis; ab E. mediterranea:* foliis *piloſis,* corollaque *globoſa; ab E. hirta:* floribus *racemoſis.* Thunb. Diſſ. l.c.

771. OPHIRA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 662.

Involucr. 2-valve, 3-florum. *Cor.* 4-petala, ſupera. *Bacca* 1-locularis.

1. OPHIRA *ſtricta.*

O. ſtricta. *Mant.* 229. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 293. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 458.

Gerade Ophira. W.

Habitat in Africa. *D. Burmann.* ♄

Frutex *erectus.* Folia *oppoſita, ovato-linearia.* Flores *laterales, ſeſſiles.*

Similitudo multa cum Grubba Bergii, *cui Germen ſuperum et Stigma ſimplex erit.*

*772. GRUBBIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 663.

Involucr. 2-valve triflorum. *Cor.* 4-petala, infera. *Stigma* ſimplex.

*1. GRUBBIA *roſmarinifolia.*

G. roſmarinifolia. *Berg. cap.* 90. *t.* 2. *f.* 3. *Act. holm.* 1767. *p.* 33. *t.* 2. * *Thunb. prod.* 75.

Clavis *Ericae* 1. Antherae *ariſtatae aut muticae.*
2. Antherae *incluſae aut exſertae.*
3. Folia *oppoſita* 2. 3, 4, *plurave.*
4. Stigma *incluſum aut exſertum.*
5. Corollae *figura.*

Diſſ de Erica. *Upſal.* 1770 *de his omnibus.*

Differt Erica ab Andromeda non ſolo ſtaminum numero, ſed capſulae ſtructura; in Ericis enim valvularum margo inflexus format diſſepimenta, in Andromedis vero diſſepimenta valvulis ſunt contraria. W.

Chamelaea africana roſmarini foliis rarioribus, floribus ex foliorum alis erumpentibus. *Herm. afr.* 6.
Rosmarinblättrige Grubbie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Rami *oppoſiti ramuloſi.* Folia *linearia obtuſiuſcula, margine revoluto, ſemiunguicularia, ſupra viridia, punctis minutiſſimis elevatis ſcabra, ſubtus glauca, oppoſita, internodiis longiora patentia.* Flores *axillares conglomerati albo-hirſuti ſeſſiles.* Berg. l. c.

773. DAPHNE.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 664.

Cal. o. *Cor.* 4-fida, corollacea, marceſcens, *Stamina* includens. *Drupa* 1-ſperma.

** Floribus lateralibus.*

1. DAPHNE *Mezereum.*

D. floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Mat. med. p.* 103. *Oed. dan. t.* 268. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 26. *Mill. dict. n.* 2. *Gunn. norv. n.* 22. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 210. *Pollich. pal. n.* 370. *Pall. it.* 2. *p.* 225. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 445. *Willd. arb.* 98. *Ludw. ect. t.* 63. *Kniph. cent.* 1. *t.* 23. *Knorr. del.* 1. *t. K.* 6. *Blackw. t.* 582. *Hoffm. germ.* 136.
Thymelaea ſpica cylindrica, ſuperne folioſa. *Hall. helv. n.* 1024.
Daphne floribus ſeſſilibus infra folia elliptico-lanceolata. *Fl. lapp.* 140. *Fl. ſuec.* 311, 338. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 201.
Thymelaea Mezereum. *Scop. carn.* 2. *n.* 462.
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. *Bauh. pin.* 462.
Daphnoides. *Cam. epit.* 937.
Chamelaea germanica. *Dod. purg.* 130.
Daphnoides flore purpureo. *Tragi.* 59. 1074. R.
β. Thymelaea lauri folio deciduo, flore albido, fructu flaveſcente. *Du Hamel. arb.* 4. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 213. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 459.
Gemeiner Seidelbaſt. W.
Habitat in Europae *borealis ſylvis.* ♄ (v. v.)

Flores *bini, terni, quaterni.* R.

2. DAPHNE *Thymelaea.*

D. floribus ſeſſilibus axillaribus, foliis lanceolatis, ramis ſimpliciſſimis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *

D. floribus ſeſſilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus ſimpliciſſimis. *Mill. dict. n.* 3. *Ger. prov. t.* 17. *f.* 2.

D. floribus ſeſſilibus axillaribus aggregatis, limbo acuto, foliis lanceolatis glaucis utrinque glabris. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 419. *

D. floribus tetrandris ſecundum caules ſimpliciſſimos. *Sauv. monſp.* 56.

Thymelaea foliis polygalae glabris. *Bauh. pin.* 46[illegible]

Thymelaea alpina glabra, floſculis ſubluteis ad foliorum ortum ſeſſilibus. *Pluk. alm.* 366. *t.* 229. *f.* 2.

Sanamunda viridis vel glabra. *Bauh. prodr.* 160.

Sanamunda glabra. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 592.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 463.

Aſtloſer Seidelbaſt. W.

Habitat in Hiſpania et Monſpelii *in Horto Dei.* ♄ (v. ſ.)

D. dioica differt: caule *ramoſiſſimo,* ramis *verrucoſis,* foliis *confertioribus brevioribus, verſus apicem latioribus, nec utrinque anguſtatis.* Vahl. l. c.

3. DAPHNE *dioica.*

D. floribus axillaribus geminis, foliis lineari-lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 223. (*excluſis ſynonymis*) *Gouan. illuſt.* 27 *t.* 17. *f.* 1.

D. floribus ſeſſilibus axillaribus ſubgeminatis, foliis lineari-lanceolatis obtuſiuſculis glabris confertis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 419. *

Kurzblättriger Seidelbaſt. W.

Habitat in Pyrenaeis *locis apricis.* ♄

Frutex *pedalis ramoſus rigens, cortice ſuberoſo cicatricibus exaſperato.* Folia *conferta imbricata glabra lineari-lanceolata.* Flores *axillares bini albo-flaveſcentes quadrifidi acuti, tubo ventricoſo, dioici.*

*4. DAPHNE *calycina.*

D. floribus axillaribus ſolitariis calyculatis, foliis lineari-lanceolatis glabris, caulibus proſtratis. *La Payr. Mem. p.* 2. *t.* 15. *Lamarck. encyclop.* 3. *p.* 420. *t.* 290. *f.* 3. *

Thymelaea pyrenaica juniperifolia, ramulis ſurrectis. *Tournef. inſt.* 594?

Wachholderblättriger Seidelbaſt. W.

Habitat in Pyrenaeis. ♄ (v. ſ.)

Folia *lineari-ſubulata glaberrima.* Flores *viridiflaveſcentes baſi bracteis binis oblongis obtuſis calyciformibus obvallati.* W.

5. DAPHNE *pubeſcens.*

D. floribus ſeſſilibus lateralibus aggregatis, foliis lanceolato-linearibus, caule pubeſcente. *Mant.* 66.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 463.
Behaarter Seidelbaſt. W.
Habitat in Auſtria. *D. Iacquin.* ♄

Caules *baſi pubeſcentes, ſimplices, pubeſcentes.* Folia *alterna, remota, lineari-lanceolata, nudiuſcula, annua, ſubmucronata.* Flores *axillares, ſeſſiles, anguſti, quinque vel pauciores, tubo filiformi, pubeſcente, foliis breviores. Diverſa videtur a* D. Thymelaea.

*6. DAPHNE *vermiculata.*

D. floribus ſeſſilibus lateralibus ſolitariis glabris, foliis lineari-lanceolatis villoſis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *
Sanamunda vermiculata. *Barr. ic.* 231.
Arragoniſcher Seidelbaſt. W.
Habitat in Arragonia. ♄

7. DAPHNE *villoſa.*

D. floribus ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, foliis lanceolatis planis ciliatis piloſis confertis. *Sp. pl.* 510.
Thymelaea villoſa minor luſitanica, polygoni folio. *Tournef. inſt.* 594.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 464.
Wolliger Seidelbaſt. W.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. *Alſtroemer.* ♄

Frutex *ramis alternis.* Folia *polygoni, lanceolata, vix petiolata, utrinque pilis albis remotis: paucioribus in pagina ſuperiore, pluribus ad margines. Ex alis rudimenta plurima folioſa ramulorum, unde quaſi verticillata.* Flores *anguſti, parvi, foliis breviores.*

8. DAPHNE *Tarton-raira.*

D. floribus ſeſſilibus lateralibus aggregatis, baſi ſquamis imbricatis, foliis obovatis nervoſis ſericeis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 53. *
D. floribus ſeſſilibus aggregatis axillaribus, foliis ovatis utrinque pubeſcentibus nervoſis. *Gron. orient.* 125.
Mill. dict. n. 4.
Thymelaea foliis candicantibus et ſerici inſtar mollibus. *Bauh. pin.* 463.

Tarton-Raire galloprovinciae monſpelienſium. *Lob. ic.* 371.
Sanamunda argentata latifolia. *Barr. ic.* 221.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 465.
Silberblättriger Seidelbaſt. W.
Habitat in Galloprovincia. ♄

*9. DAPHNE *nitida.*

D. floribus lateralibus aggregatis ſeſſilibus baſi nudis, foliis lineari-oblongis ſericeis enerviis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 53.*
Thymelaea ſeu Tartonraira lini foliis argenteis. *Tournef. cor.* 41?
Glänzender Seidelbaſt. W.
Habitat in montibus calcareis Tuneti. ♄

10. DAPHNE *alpina.*

D. floribus ſeſſilibus aggregatis lateralibus, foliis lanceolatis obtuſiuſculis, ſubtus tomentoſis. *Mill. dict. n.* 5. *Gouan. illuſtr.* 27. *Willd. arb* 99.*
D. floribus ſeſſilibus aggregatis ſublateralibus, foliis lanceolatis obtuſiuſculis, junioribus hirſutis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 421.*
Thymelaea foliis ellipticis calveſcentibus, floribus aggregatis, ſeſſilibus, hirſutis. *Hall. helv. n.* 1026.
Thymelaea cantabrica juniperifolia, ramulis procumbentibus. *Tournef. inſt.* 595.
Thymelaea floribus inter folia, folio utrinque hirſuto. *Hall. helv.* 187. *Sauv. monſp.* 57.
β. Chamelaea ſabaudica, folio utrinque incano, flore albo. *Raj. hiſt.* 1588.
Thymelaea, incana, mezerei folio et facie, ſurculis admodum fragilibus. *Pluk. alm.* 366. *t.* 229. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 466.
Alpen Seidelbaſt. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Genevae, Italiae, Auſtriae. ♄ (v. v.)

11. DAPHNE *Laureola.*

D. racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Mat. med.* 104. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 213. *Willich. obſ.* 11. *Jacq. auſtr. t.* 183. *Hoffm. germ.* 136. *Willd. arb.* 100.*
Thymelaea foliis perennantibus, ellipticis, floribus ex alis nutantibus. *Hall. helv. n.* 1025.
Thymelaea Laureola. *Scop. carn.* 2. *n.* 463.

Daphne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 147. *Hort. upſ.* 94. *Sauv. monſp.* 57.
Thymelaea lauri folio ſempervirens ſ. Laureola mas. *Tournef. inſt. Du Ham. arb.* 1.
Laureola ſempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas. *Bauh. pin.* 662.
Laureola. *Dod. pempt.* 365. *Blackw. t.* 62.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 466.
Immergrüner Seidelbaſt. W.
Habitat in Anglia, Helvetia, Gallia, Baldo. ♄ (v. v.)

Racemi *axillares, laterales, nutantes, bracteis concavis, alternis, absque floribus in ſuis albis.* Flores 5, *terminales racemi, in umbellulam congeſti.* Flores *triſtes colore, odore, tempore.*

12. DAPHNE *pontica.*

D. pedunculis lateralibus bifloris, foliis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 511. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 54.
Thymelaea pontica, citrei foliis. *Tournef. itin.* 3. *p.* 180. *t.* 180.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 468.
Pontiſcher Seidelbaſt. W.
Habitat in Ponto. ♄

13. DAPHNE *pendula.*

D. capitulis lateralibus pedunculatis involucratis nutantibus, foliis lanceolato-ellipticis alternis glabris. *Smith. ic. inedit.* 1. *p.* 34. *t.* 34. *
Scopolia compoſita. *Lin. ſuppl.* 409.
Hängender Seidelbaſt. W.
Habitat in Iava. ♄

Arbor *ramis teretibus glabris, apice foliatis, infra folia floriferis.* Folia *alterna breve petiolata oblonga utrinque acuminata integerrima venoſa glaberrima longitudine digiti.* Stipulae *nullae.* Pedunculi *in axillis foliorum poſt eorum caſum ſolitarij nutantes filiformes.* Involucrum *multiflorum diphyllum.*

** *Floribus ſpicatis ſ. racemoſis.*

*14. DAPHNE *Lagetto.*

D. ſpicis paniculatis terminalibus, foliis ovatis acutis. *Swartz. prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 680. *
Lagetta lintearia. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 363. *t.* 289.
Frutex foliis majoribus cordatis nitidis, petiolis pollicaribus inſidentibus. *Brown. jam.* 371. *t.* 31. *f.* 5.

Laurifolia arbor folio latiore longo mucronato laevi ſplendente, cortice interiore in telas plurimas linearum aemulas extenſili. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 22. *t.* 168. *f.* 1. 2. 3. *t.* 169. *f.* 1.
Arbor americana ſindophoros laurifolia. *Pluk. alm.* 41.
Lorbeerblättriger Seidelbaſt. ♄
Habitat in montibus excelſis Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄

*15. DAPHNE *polyſtachya.* W.
D. ſpicis axillaribus binis ternisve, foliis ovatis acuminatis integerrimis. W.
Cansjera (*malabarica*) racemulis axillaribus ſubfaſciculatis, foliis alternis ovato-acutis, caule ſarmentoſo. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 418. *t.* 289. *f.* 1.*
Tsjereu-Caniram. *Rheed. mal.* 7. *p.* 3. *t.* 2.
Vielähriger Seidelbaſt. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Hujus et ſequentis flores ſunt tetrandri.

*16. DAPHNE *monoſtachya.* W.
D. ſpicis axillaribus ſolitariis, foliis ovato-lanceolatis integerrimis. W.
Cansjera malabarica β. *Lam. encycl.* 3. *p.* 418. *t.* 289. *f.* 2.*
Scheru-Valli-Caniram. *Rheed. mal.* 7. *p.* 7. *t.* 4.
Einähriger Seidelbaſt. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

*17. DAPHNE *tinifolia.*
D. racemis compoſitis erectis, floribus terminalibus confertis, foliis oblongis. *Swartz. prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 683. *
Laurus foliis ovatis planis integerrimis, pedunculis racemoſis, floribus in capitulum collectis. *Mill. dict.*
Arbor cortice fiſſo, foliis oblongis, racemis terminalibus umbellulatis. *Brown. jam.* 372. *n.* 19.
Traubenblütiger Seidelbaſt. W.
Habitat in montibus excelſis Iamaicae *auſtralis.* ♄

18. DAPHNE *Gnidium.*
D. racemis terminalibus paniculatis, foliis lineari-lanceolatis acuminato-cuſpidatis. W.
D. panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. *Sp. pl.* 511. *Mill. dict. n.* 7.
D. foliis lanceolatis baſi anguſtioribus, racemo nudo terminali. *Sauv. monſp.* 56.
D. floribus racemoſis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integris. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 427.

Thymelaea foliis lini. *Bauh. pin.* 463.
Thymelaea. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 87. *Camer. epit.* 974.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 469.
Riſpenblütiger Seidelbaſt. W.
Habitat in Hiſpania, Italia, G. Narbonenſi. ♄ (v. ſ.)

*** *Floribus terminalibus aggregatis.*

19. DAPHNE *indica.*
D. capitulo terminali pedunculato, foliis oppoſitis oblongo-ovatis glabris. *Oſb. it.* 246.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 468.
Indiſcher Seidelbaſt. W.
Habitat in China. ♄
Frutex *parvus.* Folia *oppoſita, oblongo-ovata, integerrima, glabra.* Pedunculus *terminalis, breviſſimus, apice gerens flores* 6 *ad* 8 *ſeſſiles.*

20. DAPHNE *foetida.*
D. glabra, floribus terminalibus congeſtis ſeſſilibus, foliis oppoſitis petiolatis ovato-oblongis acutis. *Lin. ſuppl.* 223. *Forſt. prod. n.* 168.
Stinkender Seidelbaſt. W.
Habitat in inſula Taheiti. ♄
Hanc diſtinguit Forſter, ſed an diſtincta a D. indica?

21. DAPHNE *rotundifolia.*
D. hirſuta, floribus terminalibus congeſtis ſeſſilibus, foliis oppoſitis ellipticis ſubpetiolatis obtuſis glabris. *Lin. ſuppl.* 223. *Forſt. prod. n.* 169.
Rundblättriger Seidelbaſt. W.
Habitat in inſula Namoka. ♄
Rami *tomentoſi cani.*

*22. DAPHNE *odora.*
D. capitulo terminali ſubſeſſili multifloro, foliis ſparſis oblongo-lanceolatis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 26.
D. floribus aggregatis ſeſſilibus terminalibus, foliis ovatis alternis glabris. *Thunb. jap.* 159.* *Banks icones Kaempf. t.* 16.
Wohlriechender Seidelbaſt. W.
Habitat in China, Japonia. ♄ (v. v.)

*23. DAPHNE *occidentalis.*
D. pedunculis axillaribus, floribus terminalibus umbellulatis dioicis, foliis alternis lanceolatis glabris. *Swartz prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 685.*
Weſtindiſcher Seidelbaſt. W.

Habitat in montibus altis Jamaicae *auſtralis.* ♄

24. DAPHNE *Cneorum.*

D. floribus faſciculatis terminalibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis nudis mucronatis. *Pollich. pal. n.* 380. *t.* 1. *f.* 4. *Gouan. illuſtr.* 27. *Hoffm. germ.* 136. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 446. *Willd. arb.* 100.*

Thymelaea foliis glabris linearibus ariſtatis, floribus ſeſſilibus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1027.

Thymelaea minor ſ. Daphnoides alpinum. *Geſn. faſc.* 5. *t.* 3. *f.* 6.

Daphne humifuſa, foliis oblongis flores ſeſſiles terminales ſubcingentibus. *Sauv. monſp.* 57. *Duham. arb.* 2. *t.* 94.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore odoratiſſimo. *Tournef. Scheuchz. alp.* 4. *p.* 141. R.

Thymelaeae affinis facie externa. *Bauh. pin.* 463.

Cneorum. *Matth. hiſt.* 46. *Cluſ. hiſt.* 89.

Thymelaea minor. *Cord. hiſt.* 189.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 468.

Wohlriechender Seidelbaſt. W.

Habitat in Helvetia, Hungaria, Pyrenaeis, Baldo, Germania, Gallia. ♄ (v. v.)

Caules *humifuſi.* Folia *annua, glabra.* Flores *congeſti, foliis cincti, ſuaveolentes, ſupra rubri.* Bis *quotannis floret.* Scop.

Variat *floribus albis.* *Cluſ. hiſt.* R.

*25. DAPHNE *altaica.*

D. floribus terminalibus ſubſeſſilibus, foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis obtuſis baſi anguſtatis glabris. W.

D. floribus faſciculatis terminalibus ſeſſilibus, foliis oblongo-ovatis glabris. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 53. *t.* 35.*

Sibiriſcher Seidelbaſt. W.

Habitat in Sibiria *in alpibus* Altaicis. ♄ (v. ſ.)

26. DAPHNE *ſquarroſa.*

D. floribus terminalibus pedunculatis, foliis ſparſis linearibus patentibus mucronatis. *Mill. dict. n.* 8.

Thymelaea capitata lanuginoſa, foliis creberrimis minimis aculeatis. *Burm. afr.* 134. *t.* 49. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 471.

Sparriger Seidelbaſt. W.

Habitat in Aethiopia. ♄

*27. DAPHNE *glomerata.*

D. floribus ſubſeſſilibus glomeratis terminalibus, foliis

ovato-lanceolatis glabris involucriformibus, caule ſimplici. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 423. *
Thymelaea orientalis minima Laureolae folio, floribus glomeratis albis. *Tournef. cor.* 41.
Knaulblütiger Seidelbaſt. W.
Habitat in Oriente. ♄

28. DAPHNE *oleoides.*

D. floribus geminis terminalibus ſeſſilibus, foliis elliptico-lanceolatis glabris. *Mant.* 66. *Schreber. dec.* 13. *t.* 7.
D. (*ſalicifolia*) floribus aggregatis perpaucis ſeſſilibus terminalibus, foliis lineari-lanceolatis utrinque glabris. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 423. *
Thymelaea cretica oleae folio utrinque glabro. *Tournef. cor.* 41.
Chamaedaphnoides cretica. *Alp. exot.* 44. *t.* 43.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 471.
Oelbaumblättriger Seidelbaſt. W.
Habitat in Creta. ♄ (v. ſ.)
Caulis *fruticuloſus, compoſitus.*

*29. DAPHNE *ſericea.*

D. floribus aggregatis terminalibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis ſubtus villoſis, laciniis corollae obtuſis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 28. *
D. (*oleaefolia*) floribus faſciculatis ſeſſilibus terminalibus, foliis lanceolato-oblongis ſubtus villoſis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 424. *
Thymelaea cretica oleaefolio ſubtus villoſa. *Tournef. cor.* 41.
Seidenartiger Seidelbaſt. W.
Habitat in Creta. ♄ (v. ſ.)
A D. oleoide differt: foliis *ſubtus villoſis*, numero *florum*, laciniis *limbi oblongis.* Vahl. l. c.

*30. DAPHNE *collina.*

D. floribus faſciculatis terminalibus, foliis obovatis obtuſis ſupra glaberrimis ſubtus villoſis. *Smith ſpicil. t.* 18. *
D. (*buxifolia*) floribus aggregatis ſeſſilibus terminalibus, foliis oblongis obtuſiſſimis ſubtus villoſis. *Vahl ſymb.* 1. *p.* 29?
Daphnoides aliud rarum foliis ſupinis hirſutis. *Geſn. faſc. p.* 6. *t.* 3. *f.* 7. *excluſis ſynonymis.*
Thymelaea ſaxatilis oleae folio. *Tournef. inſt.* 594.

Chamelaea alpina folio inferno incano. *Bauh. pin.* 462.
Chamelaea incana et lanuginoſa. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 586.
Chamelaea alpina incana. *Lob. ic.* 378.
Stumpfblättriger Seidelbaſt. W.
Habitat in collibus Italiae *auſtralis, prope* Caſertam *ad ripas* Vulturni. ♄ (v. ſ.)

774. DIRCA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 665.

Cal. 0. *Cor.* tubuloſa limbo obſoleto. *Stam.* tubo longiora. *Drupa* 1-ſperma.

1. DIRCA *paluſtris.*

Dirca. *Amoen. acad.* 3. *p.* 12. *t.* 1. *f.* 7. *Kalm. it.* 3. *p.* 88. *Duham. arb.* 1. *t.* 212. *Mill. dict. Wangenh. amer.* 91. * *Willd. arb.* 102. *
Thymelaea floribus albis primo vere erumpentibus, foliis oblongis acuminatis, viminibus et cortice valde tenacibus. *Gron. virg.* 155.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 472.
Sumpf Lederholz. W.
Habitat in Virginiae *paludoſis.* ♄ (v. v.)

775. GNIDIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 666.

Cal. infundibulif. 4-fidus. *Petala* 4, calyci inſerta. *Nux* ſubdrupacea.

1. GNIDIA *pinifolia.*

G. foliis ſparſis trigonis, floribus umbellato-capitatis. *Thunb. prod.* 76.
G. foliis lineari-ſubulatis ſupra planis acutis, floribus binis axillaribus. *Lin. ſuppl.* 225.
G. foliis ſparſis linearibus: floralibus verticillatis. *Berg. cap.* 122. *Wendl. obſ.* 15. *t.* 2. *f.* 11. *
G. foliis ſparſis lineari ſubulatis, floralibus verticillatis, floribus aggregatis terminalibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 512.
Rapunculus foliis nervoſis linearibus, floribus argenteis non galeatis. *Burm. afr.* 112. *t.* 41. *f.* 3.
Valerianoides aethiopica fruteſcens. *Seba. muſ.* 2. *p.* 22. *t.* 32. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 474.
Fichtenblättrige Gnidie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *linearia, acuminuta, obtuſa, carinata.* Calyx *albus.* Petala *lanceolata, calyce breviora, alba.* Stamina 4 *intra tubum:* 4 *extra.*

Rami *laeves nec tomentoſi.* Folia *lineari-ſubulata acuta non pungentia ſubtus convexa, ſupra plana laevia patula.* Flores *e ſummis ramulis bini glabri.* Limbus *acutus, tubo duplo longiore.* Antherae *quatuor ſupra faucem pilis cinctae et quatuor intra tubum minores.*

2. GNIDIA *radiata.*

G. foliis ſubulatis triquetris acutis, capitulis terminalibus ſeſſilibus radiatis, bracteis lanceolatis. *Mant.* 67. *Burm. prodr.* 12. *Wendl. obſ.* 15. *t.* 2. *f.* 12. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 474.

Geſtrahlte Gnidie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Frutex *ſcaber, prolifer.* Folia *ſparſa, triquetra, mucronata, glabra.* Capitula *terminantia ramos, radiata* Bracteis *lanceolatis, folio latioribus.* Flores *extus ſubvilloſi.* Calycis *limbus intus glaber, longitudine tubi.* Petala 4, *calyce minora, piloſa.* Stamina 4 *exſerta;* 4 *in fauce.*

3. GNIDIA *filamentoſa.*

G. foliis elliptice ovatis glaberrimis approximatis, floribus capitatis, filamentis capillaribus. *Lin. ſuppl.* 224.

G. foliis ovatis glabris, floribus capitatis, filamentis capillaribus. *Thunb. prod.* 76.

Langfädige Gnidie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Frutex *glaberrimus cicatricibus foliorum tuberculatus.* Folia *alterna ſeſſilia elliptica integerrima avenia.* Capitula *florum ſolitaria ſeſſilia.* Involucrum *glabrum.* Corolla *villoſa, limbo quadripartito.* Filamenta *capillacea, quatuor longitudine corollae, quatuor ad faucem breviora.* Varietas *foliis anguſtioribus, ſed filamentis facile cognoſcitur.*

*4. GNIDIA *carinata.*

G. foliis lanceolatis obtuſis carinatis glabris, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.

Kielförmige Gnidie W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*5. GNIDIA *ſcabra.*

G. foliis lanceolatis acutis ſcabris, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.

Scharfe Gnidie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

6. GNIDIA *ſimplex.*

G. foliis omnibus linearibus acutis, floribus terminalibus ſeſſilibus. *Mant.* 67. *Burm. prodr.* 12.

G. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus capitatis, ramis erectis. *Thunb. prod.* 76.

G. viridis. *Berg. cap.* 125.

Thymelaea foliis Paſſerinae. *Breyn. cent.* 10. *t.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 475.

Einfache Gnidie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caules *ſemipedales, inaequales, exaſperati tuberculis* 4 *a caſu foliorum.* Folia *ſparſa, linearia, acuta, erecta, laevia.* Flores *terminales, nudi, ex apice rami villoſo, ſeſſiles, lutei calyce, petalis, antheris.* Folia *floralia reliquis non latiora.* Petala *oblonga, acuminata.* Stamina 4 *in fauce;* 4 *ſupra faucem.*

7. GNIDIA *capitata.*

G. foliis ſparſis lanceolatis glabris, floribus capitatis, bracteis obvallatis, pedunculo nudo. *Lin. ſuppl.* 224. *Thunb. prod.* 76.

Kopfblütige Gnidie. W.

Habitat ad Cap b. ſpei. ♄

Caulis *fruticoſus, ramis erectis teretibus purpuraſcentibus.* Folia *anguſtiora lanceolata remotiora laevia.* Flos *aggregatus terminalis pedunculatus.* Involucrum *octophyllum lanceolatum aequale, floſculis dimidio brevius.* Floſculi *ſedecim ſeſſiles pubeſcentes cani.* Tubus *filiformis.* Limbus *brevis quinquepartitus.* Stamina *decem, quinque extra faucem, quinque intra faucem.* Flos *Paſſerinae ſimilis. Forte Dais.*

*8. GNIDIA *laevigata.*

G. foliis oppoſitis ovatis glabris, floribus terminalibus ſubcapitatis. *Thunb. prod.* 67. *Wendl. obſ.* 17. *t.* 2. *f.* 14. *

Glatte Gnidie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*9. GNIDIA *biflora.*
G. foliis ſparſis lanceolatis glabris, floribus lateralibus binis, ramis divaricatis. *Thunb. prod.* 76.
Zweyblütige Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*10. GNIDIA *racemoſa.*
G. foliis obovato-lanceolatis laxis glabris, floribus racemoſis axillaribus. *Thunb. prod.* 76.
Traubenblütige Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

11. GNIDIA *tomentoſa.*
G. foliis ſparſis ovato-oblongis glabris, margine ſcabris. *Sp. pl.* 512.
G. foliis ſparſis ovatis piloſis ſcabris, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
G. pubeſcens. *Berg. cap.* 124.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 476.
Filzige Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Ramulorum *apices lanati ut congeneres.* Folia *ſuprema ſubpubeſcentia.* Stamina 4 *exſerta;* 4 *in fauce.* Petala *parva, emarginata.*

*12. GNIDIA *argentea.*
G. foliis ſparſis obovatis tomentoſo-argenteis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
Silberfarbene Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

13. GNIDIA *imbricata.*
G. foliis oblongis quadrifariam imbricatis ſericeis, floribus terminalibus in axillis foliorum. *Lin. ſuppl.* 225.
G. foliis ovatis quadrifariis tomentoſis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
Dachziegelblättrige Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

14. GNIDIA *ſericea.*
G. foliis oppoſitis ovatis tomentoſis, floribus terminalibus. *Thunb. prod.* 76.
G. foliis ovatis tomentoſis: floralibus quaternis, caule hirſuto, florum corona ſetis octo. *Syſt. veg.* 309. *Wendl. obſ.* 16. *t.* 2. *f.* 13. *
Paſſerina ſericea. *Sp. pl.* .. *p.* 513. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271. *

Nectandra ſericea. *Burm. cap.* 131.
Thymelaea ſericea, foliis oblongis, floribus tubuloſis anguſtiſſimis. *Burm. afr.* 135. *t.* 49. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 476.
Seidenartige Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄ (v. ſ.)

Faux *floris coronata filis* 8 *coloratis longitudine corollae, extra petala.* Stamina *in fauce* 4; *in tubo* 4.

15. GNIDIA *oppoſitifolia.*

G. foliis oppoſitis lanceolatis tomentoſis, floribus terminalibus. *Thunb. prod.* 76.
G. foliis oppoſitis lanceolatis. *Syſt. veg.* 309.
Thymelaeae africanae ſanamundae prioris Cluſii facie. *Pluk. alm.* 367. *t.* 323. *f.* 7.
β. Paſſerina (*laevigata*) foliis ovatis glabris acutis, floribus obtuſis. *Spec. pl.* 2. *p.* 513. *Amoen. acad.* 4. *p.* 312. *
Nectandra laevigata. *Berg. cap.* 134.
Thymelaea foliis planis acutis, coma et floribus purpureis. *Burm. afr.* 137. *t.* 49. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 476.
Paarblättrige Gnidie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Culta in hortis Petala *acquirit.* Folia *ſuprema apice ſanguinea.* Flores *terminales, extus villoſi.* Stamina, *praeter callos iſtos* 4 *ſupra faucem, ſunt* 4 *ſub fauce;* 4 *in medio tubi.*

16. GNIDIA *daphnaefolia.*

G. decandra, foliis oblongis planis integerrimis, capitulo terminali pedunculato involucrato, floribus quinquefidis. *Lin. ſuppl.* 225.
α. *hirſuta;* foliis oblongis ſpathulatis hirſutie canis, floribus minoribus.
β. *glabra;* foliis oblongis verſus baſin attenuatis nudiuſculis, floribus majoribus.
Seidelbaſtblättrige Gnidie. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

Habitus, folia, inflorefcentia ejusque involucrum, calycis figura et hirſuties Daidis cotinaefoliae eſt, ſtructura vero et ſitus partium floris eſt exacte Gnidiae, ſed non numerus. Folia *ſunt alterna nec oppoſita ut in genere Daidis.* Involucrum *florum eſt ut in Daide, ſed pentaphyllum.*

776. STELLERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 667.

Cal. 0. *Cor.* 4-fida. *Stamina* breviſſima. *Nux* 1, roſtrata.

1. STELLERA *Paſſerina.*

S. foliis linearibus, floribus axillaribus ſeſſilibus quadrifidis. W.

S. foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 400. *Hall. helv. n.* 1028. *Sauv. monſp.* 69. *Pollich. pal. n.* 381. *Hoffm. germ.* 137. *Roth. germ.* 171. *II.* 446.

Paſſerina foliis linearibus, floribus laxe ſpicatis alternis in foliorum binorum alis ſeſſilibus. *Guett. ſtamp.* 25. *Dalib. pariſ.* 118.

Paſſerina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 456. *Fuchſ. p.* 535.

Lithoſpermum, lineariae folio, germanicum. *Bauh. pin.* 259.

Linaria alterna botryoides montana. *Columm. ecphr.* 1. *p.* 82. *t.* 80.

Lingua paſſerina. *Tabern. p.* 828. *Tragi p.* 535. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 432.

Gemeine Stellere. W.

Habitat in Germaniae, Helvetiae, Italicae, Galliae *campis aridis apricis.* ☉ (v. ſ.)

Facies *Theſii alpini.* Folia *glabra.* Flores *axillares, ſeſſiles, in lana minuta.*

2. STELLERA *Chamaeiaſme.*

S. foliis lanceolatis, floribus terminalibus racemoſis nudis quinquefidis. W.

S. foliis lanceolatis, floribus quinquefidis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 400. * *Gmel. ſib.* 3. *p.* 27.

Chamaeiaſme radice mandragorae. *Amm. ruth.* 16. *t.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 432.

Sibiriſche Stellere. W.

Habitat in Sibiria. *Gmelin.* ♃ (v. ſ.)

777. PASSERINA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 668.

Cal. 0. *Cor.* 4-fida. *Stamina* tubo impoſita. *Nux* 1, corticata.

1. PASSERINA *filiformis.*

P. foliis linearibus convexis quadrifariam imbricatis, ra-

mis tomentoſis. *Mill. dict.* 1. *Berg. cap.* 130. *Wendl. obſ.* 18. *t.* 2. *f.* 15. *

P. foliis trigonis acutis quadrifariis, floribus racemoſis. *Thunb. prod.* 75.

P. foliis linearibus. *Hort. cliff.* 246. *t.* 11.* *Roy. lugdb.* 208.

Thymelaea aethiopica fruticoſa, foliis in longum ſtriatis, ſurculis valde tomentoſis. *Pluk. alm.* 180.

Thymelaea aethiopica, paſſerinae foliis. *Breyn. cent.* 10. *t.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 477.

Fadenförmiger Vogelkopf. W.

Habitat in Aethiopia. ♄ (v. ſ.)

Corollae *tubus longitudine germinis.* Folia *floralia baſi margine lato membranaceo, quod non in reliquis.*

2. PASSERINA *hirſuta.*

P. foliis carnoſis extus glabris, caulibus tomentoſis. *Mill. dict. n.* 2. *Oſb. it.* 50. *Wendl. obſ.* 18. *t.* 2. *f.* 16. * *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 29 *

P. (*Metnan*) foliis ovatis incurvis quadrifariam imbricatis, caule tomentoſo, floribus congeſtis ſeſſilibus terminalibus. *Forſk. deſcr.* 81.

Thymelaea tomentoſa, foliis ſedi minoris. *Bauh. pin.* 461.

Sanamunda 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 89. *Breyn. cent. t.* 19.

Seſamoides parvum dalechampi. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 595.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 478.

Haariger Vogelkopf. W.

Habitat in Galloprovincia, Italia, Oriente. ♄ (v. ſ.)

Sanamundam 3. Cluſii *ad* Daphnem *ſuam* dioicam *revocat Gouan. illuſtr.* 27. *t.* 17. *f.* 1. R.

3. PASSERINA *ericoides.*

P. foliis linearibus laevibus ſubimbricatis, corollis globoſis. *Mant.* 236. *Burm. prodr.* 12.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 479.

Heideartiger Vogelkopf. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Facies *adeo tota Ericae, ut primo intuitu jurares Ericam eſſe.* Frutex *ſtatura Paſſerinae filiformis.* Ramuli *pubeſcentes.* Folia *brevia (Ericae), ovato-oblonga, carnoſa, oppoſita: floriferis ſubcordatis.* Flores *ſeſſiles, in ſummis ramulis, laterales.* Semina *ova-*

ta atra, nitida. Corollae *tubus globoſus, inflatus (Ericae), coloratus, uti limbus.*

*4. PASSERINA *nervoſa.*

P. foliis lanceolatis glabris tricoſtatis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 75.

Nervenblättriger Vogelkopf. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*5. PASSERINA *cephalophora.* †

P. foliis trigonis quadrifariis, capitulis lanatis. *Thunb. prod.* 75.

Kopftragender Vogelkopf. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

6. PASSERINA *capitata.*

P. foliis linearibus glabris, capitulis pedunculatis tomentoſis. *Berg. cap.* 127. *Wendl. obſ.* 18. *t.* 2. *f.* 17.

P. foliis lanceolatis glabris laevibus, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 75.

P. foliis lanceolato-linearibus glabris, floribus capitatis, receptaculo incraſſato. *Amoen. acad.* 6. *afr.* 16.*

Thymelaea foliis linearibus alternis, floribus ex uno petiolo copioſis. *Burm. afr.* 133. *t.* 48. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 480.

Knopfblütiger Vogelkopf. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *ſparſa, linearia, laevia.* Capitula *terminalia, globoſa, pedunculata, tomentoſa.* Pedunculi *tomentoſi, incraſſati.* Flores *multi, absque tubo ſeſſiles.* Stamina *ſupra faucem* 16, *quorum* 8 *interiora caſtrata.*

*7. PASSERINA *orientalis.* W. †

P. foliis lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis glabriuſculis, floribus axillaribus. W.

P. foliis lanceolatis. *Gron. orient.* 126.

Sanamunda I. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 88.

Orientaliſcher Vogelkopf. W.

Habitat in Oriente *et in* Hiſpania. ♄

8. PASSERINA *ciliata.*

P. foliis oblongo-lanceolatis ciliatis, floribus axillaribus, caule villoſo. W.

P. foliis lanceolatis ciliatis, floribus ſubſolitariis. *Thunb. prod.* 75.

P. foliis lanceolatis ſubciliatis erectis, ramis nudis. *Mill. dict.* 3. *Berg. cap.* 126. *Dryand. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 234.

Thymelaea foliis oblongis acutis ad oras fimbriatis. *Burm. afric.* 129. *t.* 47. *f.* 2.
Erica africana, ruſci folio. *Seb. muſ.* 2. *p.* 15. *t.* 12. *f.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 480.
Gefranzter Vogelkopf. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Flores *purpurei, fauce villoſa.*

9. PASSERINA *uniflora.*

P. foliis linearibus oppoſitis, floribus terminalibus ſolitariis, ramis glabris. *Berg. cap.* 128. *Wendl. obſ.* 19. *t.* 2. *f.* 18. *
P. foliis lanceolatis laevibus, floribus terminalibus ſolitariis. *Thunb. prod.* 75.
Thymelaea foliis triquetris cruciatim oppoſitis, flore ſericeo. *Burm. afr.* 132. *t.* 48. *f.* 2.
Thymelaea ramoſa, linearibus foliis anguſtis, flore ſolitario. *Burm. afric.* 131. *t.* 48. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 481.
Einblütiger Vogelkopf. W.
Habitat in Aethiopia. ♄ (v. ſ.)
Flores *coerulei.* Stamina 8, *ad faucem floris.* Antherarum *rudimenta* 8 *latent in fundo floris.*

10. PASSERINA *grandiflora.*

P. glaberrima, foliis oblongis acutis concavis extus rugoſis, floribus terminalibus ſeſſilibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 226.
P. (*linoides*) foliis lineari-lanceolatis glabris tricoſtatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Thunb. prod.* 75?
Groſsblütiger Vogelkopf. W.
Habitat in Africa. ♄
Rami *uniflori.* Folia *oppoſita ſubimbricata obtuſa cum acumine, extus quaſi venis elevatis rugoſa, intus concava glaberrima.* Stamina *octo ſupra tubum.* Stigma *capitatum extra tubum. Diſtinguitur facile magnis florum limbis, extus ſericeis.*

*11. PASSERINA *caneſcens.*

P. foliis oblongis quadrifariam imbricatis lanato-tomentoſis, floribus terminalibus lanatis. W.
Paſſerina caneſcens. *Schousboe Act. Haf.* *
Grauer Vogelkopf. W.
Habitat in Marocco. ♄ (v. ſ.)
Diſtinguitur facile ramis *numeroſis brevibus*, foliis *parvis imbricatis valde lanatis*, floribus*que cylindraceis.* W.

12. PASSERINA *ſpicata.*

P. foliis ovatis villoſis, floribus lateralibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 226. *Wendl. obſ.* 19. *t.* 2. *f.* 19. *
P. foliis ovatis villoſis, floribus lateralibus ſeſſilibus. *Thunb. prod.* 75.
Aehrenblütiger Vogelkopf. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Ramulis *floriferis refert ſpicam folioſam.*

13. PASSERINA *laxa.*

P. foliis ovatis ſparſis, floribus capitatis, ramis laxis cernuis. *Lin. ſuppl.* 226. *Wendl. obſ.* 20. *t.* 2. *f.* 20. *
P. foliis ovatis piloſis, floribus capitatis, ramis laxis. *Thunb. prod.* 75.
Schlaffaeſtiger Vogelkopf. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Similis P. ericoidi, ſed differt floribus capitatis.

*14. PASSERINA *ſtricta.*

P. foliis ovatis hirſutis, floribus capitatis, ramis rigidis. *Thunb. prod.* 75.
Steifäſtiger Vogelkopf. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

15. PASSERINA *Anthylloides.*

P. foliis ovatis villoſis, floribus capitatis hirſutis. *Lin. ſuppl.* 225.
P. foliis oblongis villoſis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 76.
Wollblumenartiger Vogelkopf. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Flores *extus hirſutiſſimi albi, intus in viva planta lutei, in ſicca nigri.*

*16. PASSERINA *pentandra.*

P. foliis ovatis hirſutis, ſpicis ovatis terminalibus. *Thunb. prod.* 76.
Fünffädiger Vogelkopf. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

778. LACHNAEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 669.

Cal. 0. *Cor.* 4-fida: limbo inaequali. *Nux* ſubdrupacea.

1. LACHNAEA *Eriocephala.*

L. capitulis ſolitariis lanatis, foliis quadrifariam imbricatis. *Sp. pl.* 514.

Paſſerina (*Eriocephala*) foliis linearibus convexis imbricatis, capitulis lanatis. *Thunb. prod.* 75.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 482.

Wollenköpfige Lachnaea. W.

Habitat in Aethiopia. ♄ (v. ſ.)

Folia *trigona gibba.* Capitula *terminalia, ſolitaria, tomentoſa, cincta lana candida.*

2. LACHNAEA *conglomerata.*

L. capitulis confertis, foliis laxis. *Sp. pl.* 514.

Paſſerina (*glomerata*) foliis teretibus truncatis quadrifariis, floribus capitatis. *Thunb. prod.* 57.

Thymelaea africana, polii anguſtioribus foliis, floribus in capitulis ſummo caule conglomeratis. *Pluk. mant.* 179. *Raj. dendr.* 54.

Sanamunda 3 Cluſii affinis, polii folio. *Breyn. Cent.* 18. *t.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 482.

Knaulblütige Lachnaea. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

779. BAECKEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 670.

Cal. infundibuliformis, 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 3-ſ. 4-locularis polyſperma calyce tecta.

1. BAECKEA *fruteſcens.*

B. foliis oppoſitis muticis, dentibus calycinis membranaceis coloratis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3. *p.* 260.

B. fruteſcens. *Sp. pl.* 514.

Baeckea. *Oſb. it.* 251. *t.* 1.*

Baeckea chinenſis. *Gaert. Sem.* 1. *p.* 157. *t.* 31.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 483.

Strauchartige Baeckie. W.
Habitat in China. ♄ *D. D. Abrah. Baeck S. R. M. Sueçiae Archiater, et Amicus noſter vere ſincerus, e cujus horto ſicco plurimas rariores ſtipes obtinuimus, etiam hanc primus nobiſcum communicavit.*

Frutex *habitu abrotani, ramis virgatis*: Ramulis *oppoſitis, brevibus, ſimplicibus.* Folia *oppoſita, linearia, acuta, glabra, integerrima.* Flores *axillares, ſolitarii: pedunculo nudo longitudine floris, foliis longe breviore.* Perianthium *infundibuliforme, quinquedentatum.* Petala 5, *ſubrotunda, calyci inſerta.* Filamenta 8, *quorum* 6 *paria, et* 2 *ſolitaria, breviſſima, inflexa.* Antherae *ſubovatae, parvae.* Germen *ſubrotundum.* Stylus *filiformis, corolla brevior.* Stigma *capitatum. Chinenſibus* Tiongina. *Osbek.*

*2. BAECKEA *denſifolia.*
B. foliis quadrifariam imbricatis obtuſis mucronulo reflexo, dentibus calycinis foliaceis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 3. *p.* 260.
Dichtblättrige Baeckie. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

D I G Y N I A.

780. SCHMIEDELIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 672.

Cal. 2-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Germina* pedicellata, flore longiora.

1. SCHMIEDELIA *racemoſa.*
S. racemoſa. *Mant.* 67.
Uſubis triphylla. *Burm. ind.* 81. *t.* 32. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 485.
Traubenblütige Schmiedelie. W.
Habitat in India *orientali, ſub Klinting biroe.* ♄ (v. ſ.)

Rami *flexuoſi (Rhois Toxicodendri.)* Folia *alterna, ternata: foliolis petiolatis, ovato-oblongis, acuminatis, ſubſerratis, nudis.* Petioli *communes teretes, ſubtomentoſi, longitudine foliorum.* Racemi *axillares, ſimplices: Floribus ad ſingula puncta pluribus ſparſis.*

781. GALENIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 673.

Cal. 4-fidus. *Cor.* o. *Capſ.* ſubrotunda, 2-ſperma.

1. GALENIA *africana.*

G. erecta fruticoſa, foliis linearibus carnoſis. *Lin. ſuppl.* 227.
G. foliis linearibus, caule erecto. *Thunb. prod.* 77.
Galenia. *Hort. cliff.* 150. *Roy. lugdb.* 209. *Mill. dict. et illuſt. Fabr. helmſt. p.* 432.
Frutex africanus folio roſmarini tenuiore, flore et fructu chenopodii. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 267.
Sherardia. *Pont. epiſt.* 14.
Kali lignoſum, flore muſcoſo, roſmarini folio. *Bocc. muſ.* 150. *t.* 110.
Atriplex africana lignoſa fruteſcens, rosmarini foliis. *Till. piſ.* 20. *t.* 15.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 486.
Schmalblättrige Galenie. W.
Habitat in Africa. ♄ (v. ſ.)

Frutex *ruſticus, habitu Tetragoniae, licet minuta omnia, et totus obſolete papilloſus.* Caulis *teres ſetulis raris reflexis.* Folia *oppoſita, linearia, ſeſſilia, perennia.* Flores *ſeſſiles, albi, in panicula dichotoma.*

2. GALENIA *procumbens.*

G. procumbens, foliis ovatis canaliculatis apice patulo recurvato. *Lin. ſuppl.* 227.
G. foliis ovatis canaliculatis ſquarroſis, caule decumbente. *Thunb. prod.* 77.
Liegende Galenie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

782. WEINMANNIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 674.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 2-locularis, biroſtris.

1. WEINMANNIA *glabra.*

W. foliis pinnatis, foliolis obovatis crenatis laevibus. *Lin. ſuppl.* 228. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 313. *f.* 1. *Swartz. obſ.* 151.

Weinmannia pinnata. *Sp. pl.* 515.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 487.
Glatte Weinmannie. W.
Habitat in Jamaica. ♄

Arbuſcula *Ramis oppoſitis: ultimis ſubpubeſcentibus.* Folia *oppoſita, pinnata cum impari:* Petiolo communi *alato, articulis ſubovatis:* Foliola 11-13, *parva, nuda, obtuſa, oppoſita, ſeſſilia, obovata, latere inferiore verſus baſin anguſtiora, ſerraturis utrinque* 3 *ſ.* 4. Stipulae *ovatae, magnitudine foliorum, deciduae, inter paria petiolorum ſolitariae.* Racemi *terminales, ſolitarii, pedunculati, foliis longiores, erecti, ſimplices:* Floribus *numeroſis, albis, magnitudine Tiarellae:* Pedicellis *unifloris, e ſingulis punctis pedunculi pluribus.* Calyx *foliolis oblongis, quatuor, patentibus, albis.* *Petala* 4, *lanceolata, calyce triplo longiora.* Germen *ovatum, biſulcum.* Styli 2, *albi, filiformes.* Stigmata *capitata.*

*2. WEINMANNIA *hirta.*

W. foliis pinnatis, foliolis ovatis ſerrato-crenatis, ſubtus racemisque hirſutis. *Swartz. prod.* 63. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 691. *
Windmannia fruticoſa, foliis ſubrotundis ſerratis, per pinnas cordato-alatas, racemis terminalibus, pinnis et ramis oppoſitis. *Brown. jam.* 212.
Behaarte Weinmannie. W.
Habitat in altis montibus Jamaicae *auſtralis.* ♄ (v. ſ.)

Differt a W. glabra: hirſutie *et* pubeſcentia *plurium partium, quae in W. glabra glaberrima;* articulis *petioli communis ſubcordatis, nec obovatis;* capſulis *oblongis brevibus, nec ſubrotundis longius roſtratis.* Swartz. l. c.

3. WEINMANNIA *tomentoſa.*

W. foliis pinnatis, foliolis ovatis integerrimis ſubtus tomentoſis, ſtipulis caducis. *Lin. ſuppl.* 227.
Filzige Weinmannie. W.
Habitat in Nova Granada *Mutis.* ♄

Arbor *cortice fuſceſcente valde ramoſa, glioſaque.* Folia *oppoſita ſubtus tomentoſa, pinnata cum impari.* Petiolus *communis alatus, articulis obovatis.* Foliola *undecim ad tredecim parva craſſiuſcula, ſubtus valde tomentoſa ovata integerrima regularia.* Stipulae *ſolitariae utrinque, foliolis majores, deciduae.* Racemi

verſus apicem denſiſſimi, quaſi ſpicae, pedicellis breviſſimis. Nectarium *campanulatum ſtamina cingens integerrimum membranaceum.*

4. WEINMANNIA *trifoliata.*

W. foliis ternatis, foliolis elliptice lanceolatis ſerratis glaberrimis, paniculis compoſitis. *Lin. ſuppl.* 227. *Lamarck illuſt. gen. t.* 313. *f.* 2.
W. foliis ternatis, foliolis ellipticis ſerratis glabris. *Thunb. prod.* 77.
Dreyblättrige Weinmannie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄. (v. ſ. ſ. fl.)

Facie *non multum aliena videtur a Pteleis.* Frutex *glaberrimus.* Folia *appoſita.* Paniculae *axillares.*

5. WEINMANNIA *racemoſa.*

W. foliis ſimplicibus obovato-ellipticis obtuſis, dentatis, racemis glabris. W.
W. foliis ſimplicibus ovatis ſerratis utrinque glaberrimis, ſtipulis nullis. *Lin. ſuppl.* 227.
W. foliis ſimplicibus ovatis ſerratis petiolatis, racemis axillaribus ſolitariis. *Forſt. prod. n.* 173.
Stumpfblättrige Weinmannie. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄ (v. ſ.)

Rami *et* ramuli *glabri.* Folia *oppoſita petiolata obovato-elliptica obtuſa utrinque glaberrima, dentata, dentibus obtuſis ut in Populo monilifera.* Racemi *longiſſimi axillares ſolitarii vel gemini terminales glabri.* W.

*6. WEINMANNIA *parviflora.*

W. foliis ſimplicibus oblongis acuminatis dentatis, racemis hirtis terminalibus paniculatis. W.
W. foliis ſimplicibus ovatis ſerratis ſubſeſſilibus, racemis terminalibus ternis quinisve. *Forſt. prod. n.* 174.
Kleinblütige Weinmannie. W.
Habitat in inſula Taheiti. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri,* ramuli *pubeſcentes.* Folia *oppoſita breve petiolata oblonga acuminata utrinque glabra dentata, dentibus remotis acutis.* Racemi *pubeſcentes in ramorum apice* 3-6 *paniculati.* *Differt a praecedente:* foliorum *forma,* pubeſcentia *racemorum, et ramulorum, denique* floribus *quadruplo minoribus.* W.

783. CODIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 675.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Receptaculum* commune involucratum. *Involucrum* 4-phyllum.

1. CODIA *montana.*

C. montana. *Lin. ſuppl.* 288. *Forſt. gen. n.* 30. *Forſt. prod. n.* 175.

Berg Kugelſtrauch. W.

Habitat in Nova Caledonia. ♄

Folia *oppoſita petiolata elliptica glaberrima integerrima obtuſa.* Capitula *globoſa terminalia et axillaria breviſſima pedunculata. Forte Bruniae ſpecies foliis ellipticis.*

784. MOEHRINGIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 676.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis.

1. MOEHRINGIA *muſcoſa.*

M. muſcoſa. *Scop. carn. n.* 466. *Pall. it.* 2. *p.* 219.

Alſine octoſtemon, foliis linearibus connatis. *Hall. helv. n.* 860.

Alſine muſcoſa quibusdam. *Bauh. pin. p.* 365.

Alſine montana, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 251. *Scheuch. alp.* 503. *t.* 6. *Pluk. alm.* 23. *t.* 75. *f.* 1.

Alſine ſaxifraga anguſtifolia minima montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 290.

Alſine ſaxatilis. *Lindern. hort. t.* 2. R.

β. Alſine tenuifolia muſcoſa. *Bauh. pin.* 251. *Moriſ. bleſ.* 10. *hiſt.* 2. *p.* 551. *ſ.* 5. *t.* 23. *f.* 12. *Seguier. t.* 5. *f.* 1.

Alſine polygonoides, foliis tenuiſſimis, per genicula binis, ad ſummitatem polyanthos. *Pluk. phyt. p.* 22. *t.* 74. *f.* 3. *Hall.* R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 434.

Mooſige Möhringie. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Italiae, Auſtriae, Monspelii *ad fontes et ſcaturigines.* ♃ (v. f.)

TRIGYNIA.

785. POLYGONUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 677.

Cal. 0. *Cor.* 5-partita, calycina. *Sem* 1, angulatum.

*) Atraphaxoides *caule fruteſcente.*

1. POLYGONUM *fruteſcens.*
P. caule fruticoſo, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, ochrea lanceolata internodiis breviore, petalis binis exterioribus minoribus reflexis. W.
P. caule fruticoſo, calycinis foliolis duobus reflexis. *Hort. upſ.* 95. *Willich. illuſtr. n.* 7. *Willd. arb.* 226. *
P. fruticoſum floribus pentapetalis octandris, trigynis, petalis 2 exterioribus reflexis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 60. *t.* 12. *f.* 2.
Atraphaxis inermis foliis planis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 209.
Lapathum orientale, frutex humilis, flore pulchro. *Tourneſ. cor.* 38.
Lapathum dauricum montanum, fruticans, ramis late ſparſis. *Amm. ruth.* 227.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 436.
Strauchartiger Knöterig. W.
Habitat in Sibiria, Dauria. ♄ (v. v.)
Calyx *diphyllus.* Petala 3, *obcordata.* Stigmata 3. Frutex *triqueter.*
Cum Atraphaxi ſpinoſa *conjungit Gmel. Willich; mutatur enim in Atraphaxin ſpinoſam. Pallas it.* 1. *p.* 262, 265.

*2. POLYGONUM *grandiflorum.* W.
P. caule fruticoſo, foliis ovato-oblongis acutis, ochrea lanceolata internodiorum longitudine, petalis aequalibus erectis. W.
P. orientale fruticoſum latifolium minimum, flore maximo. *Tourneſ. cor.* 39.
Groſsblütiger Knoeterig. W.

Ochrea *dicitur in Polygonis et Cyperis vagina ad petioli baſin.* W.

Habitat in Oriente. ♄ (v. ſ.)

Frutex *parvus vix ſemipedalis facie Polygalae Chamaebuxi.* Folia *alterna ovato-oblonga integerrima coriacea breviſſime petiolata margine revoluta acuta leviſſime venoſa, glabra.* Ochreae *membranaceae lanceolatae internodiis longiores ſaepius lacerae diaphanae albae.* Flores *axillares pedunculati ad ramorum apicem maximi hujus generis, myrti communis fere magnitudine.* W.

* * Biſtortae *ſpica unica.*

3. **POLYGONUM** *Biſtorta.*

P. caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Mat. med* 104. *Oed. dan.* 421. *Mill. ic. t.* 66. *Blackw. t.* 254. *Pollich. pal. n.* 382. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 40. *Ludw. ect. t.* 31. *Kniph. cent.* 1. *n.* 65. *Hoffm. germ.* 137. *Roth. germ. I.* 172. *II.* 449.

P. radice lignoſa intorta, ſpica ovata, foliorum petiolis alatis. *Hall. helv. n.* 1560.

Biſtorta foliis ovato-oblongis acuminatis. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upſ.* 95. *Roy. lugdb.* 217.

Biſtorta major, radice magis intorta. *Bauh. pin.* 192.

β. Serpentaria mas ſ. Biſtorta. *Fuchſ.* 773. R.

Biſtorta britannica. *Lob. ic.* 292. R.

Biſtorta media, folio minus rugoſo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 539. R.

Biſtorta. *Cam. epit.* 683.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 437.

Wieſen Knöterig. W.

Habitat in montibus Helvetiae, Auſtriae, Germaniae, Galliae. ♃ (v. v.)

4. **POLYGONUM** *viviparum.*

P. caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis lanceolatis. *Oed. t.* 13. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 44. *t.* 7. *f.* 2. *Gunn. norv. n.* 9. *Kniph. cent.* 2. *n.* 61. *Hoffm. germ.* 138.

P. radice lignoſa, intorta, foliis nervoſis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. *Hall. helv. n.* 1558.

Polygonum floribus trigynis, octandris, ſpicatis; foliis caulinis lanceolatis; ſemine ſubrotundo. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 422. *n.* 3. *ed.* 2. *n.* 470.

Biſtorta foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 152. *Fl. ſuec.* 321, 340. *Hort. cliff.* 150.

Biſtorta montana minor, radice intorta inodorâ, floſculis in ſpicae cacumine albis ſterilibus, inferna ſpicae parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis fecunda. *Amm. ruth.* 169.
Biſtorta alpina media. *Bauh. pin.* 192. *Pluk. t.* 151. *f.* 2.
Biſtorta alpina minor. *Bauh pin.* 192. *Amm. ruth.* 169.
Biſtorta alpina minima. *Hall. opuſc.* 234.
Biſtorta alpina ſ. minor. *Camer. epit.* 684.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 439.
Zwiebeltragender Knöterig. W.
Habitat in Europae *ſubalpinis paſcuis duris.* ♃ (v. v.)

Spicae *flores inferiores in bulbos tranſeunt ſaepe viviparos.*

* * * Perſicariae *piſtillo bifido, aut ſtamina minus* 8.

5. POLYGONUM *virginianum.*

P. floribus pentandris ſemidigynis, corollis quadrifidis inaequalibus, foliis ovatis. *Sp. pl.* 516.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla quadrifida inaequali. *Wach. ultr.* 258.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis, ſtylo duplici, corolla quadrifida inaequali. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 43. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria fruteſcens maculoſa virginiana, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 589. *Raj. hiſt.* 183.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 440.
Virginiſcher Knöterig. W.
Habitat in Virginia. ♃ (v. ſ.)

Caulis *piloſus.* Ochreae *membranaceae truncatae ſetis rigidis tectae et ciliatae.* Folia *ovata acuminata ſuperne glabra, inferne pubeſcenti-mollia viridia, margine ſetis ciliata.* Spicae *tenuiſſimae filiformes, floribus parvis albis remotiſſimis obſitae.* Spica *terminalis ſemipedalis et ultra; laterales ſesqui-vel biunciales.* W.

6. POLYGONUM *lapathifolium.*

P. floribus hexandris digynis, ſtipulis muticis, pedunculis ſcabris, ſeminibus utrinque depreſſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 30.
P. floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corollae regulari aequalibus. *Sp. pl.* 517.
Polygonum penſylvanicum. *Curt. lond.*

Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla regulari ſtaminibus aequali. *Wach. ultr.* 257.
Perſicaria florum ſtaminibus quinis ſemidigynis, ſtylo bifido corollae regulari aequantibus. *Hort. cliff.* 42.
Peſicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tournef. illuſtr.* 510. *Raj. ſuppl.* 119.
Perſicaria Hydropiper. *Lob. ic.* 315.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 440.
Ampferblättriger Knöterig. W.
Habitat in Gallia, Anglia. ⊙ (v. v.)

Caulis *erectus, firmus, laevis.* Vaginae *pubeſcentes, ciliatae.* Folia *ovata, petiolata, magnitudine Phytolaccae.* Pedunculi *oppoſitifolii, longitudine foliorum ſpicato-racemoſi.*

7. POLYGONUM *amphibium.*

P. floribus pentandris ſemidigynis, ſpica ovata. *Oed. dan. t.* 282. *Pollich. pal. n.* 383. *Hoffm. germ.* 138. *Roth. germ. I.* 173. *II.* 450.
P. foliis ovato-lanceolatis ciliatis, ſpicis ovatis. *Hall. helv. n.* 1565.
P. ſpicis ſolitariis pedunculatis, ſtaminibus quinque, foliis ſerratis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 46.
P. foliis glabris, longe petiolatis, ſpica ſubrotunda. *Moench. haſſ. n.* 328. *a.*
Perſicaria, florum ſtaminibus quinis corollam ſuperantibus, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria floribus pentandris digynis, corolla ſtaminibus breviore. *Fl. ſuec.* 318, 341.
Potamogeton ſalicis folio. *Bauh. pin.* 193.
Fontinalis ſ. Potamogeton. *Dodon. cereal.* 227.
β. Perſicaria acida lungermanni. *Trew. comm. nor.* 1737. *t.* 5. *f.* 1. 2.
P. amphibium *terreſtre*, foliis hirſutis ſubſeſſilibus, ſpica oblonga. *Moench. l. c.* β.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 441.
Waſſer Knöterig. W.
Habitat in Europa. ♃ (v. v.)

Varietas *aquatica* α. *ſtaminibus flore brevioribus.* β. *terreſtris ſtaminibus corolla longioribus, caule erecto, foliis manifeſte hirſutis. Hall. Iacq.*

Varietas *aquatica* α. *natans, glabra, ſtaminibus corolla brevioribus.* Var. β. terreſtris, *erecta, foliis ſcabris, ſtaminibus non ſemper corolla longioribus.* Haec *rariſſime floret. Leers. herb. n.* 296. R.

8. POLYGONUM *ocreatum.*

P. floribus pentandris trigynis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 517.

Perſicaria ſpicis longis copioſiſſimis, foliis ex lineari lanceolatis, vaginis debilibus, floribus pentandris trigynis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 51. *n.* 39. *t.* 8.

Scheidiger Knöterig. W.

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.*

Stipulae *ſunt vaginae integrae, ventricoſae, laeves, ampliores multo quam caulis.* Folia *lanceolata, revoluta.* Flores *racemoſi.*

9. POLYGONUM *Hydropiper.*

P. floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Mat. med.* 104. *Blackw. t.* 119. *Trew. comm. nor.* 1737. *t.* 5. *f.* 7. 8. *Pollich. pal. n.* 384. *Ludw. ect. t.* 168. *Hoffm. germ.* 158. *Roth. germ. I.* 173. *II.* 451.

P. ſpicis ſtrigoſis laxis, foliis lanceolatis, ſeminibus obtuſe triangulis, vaginis debilibus. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 50.

P. floribus digynis, hexandris; foliis lanceolatis. *Scop. carn.* 1. *p.* 420. *n.* 1. *var.* 6. *ed.* 2. *n.* 467.

P. foliis ovato-lanceolatis, vaginis calvis truncatis. *Hall. helv. n.* 1554.

Perſicaria floribus hexandris ſemidigynis. *Fl. ſuec.* 320, 343.

Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 216.

Perſicaria urens ſ. Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.

Hydropiper. *Dod. pempt.* 607. *Fuchſ.* 842.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 443.

Scharfer Knöterig. W.

Habitat in Europae *ſubhumidis.* ⊙ (v. v.)

*10. POLYGONUM *filiforme.*

P. floribus pentandris digynis, ſpicis filiformibus, foliis ovatis, ſtipulis ciliatis. *Thunb. jap.* 163.*

Fadenförmiger Knöterig. W.

Habitat in Japonia.

Caulis *teres lineis elevatis obſoletis lineatus erectus, villoſus, pilis adpreſſis, ferrugineus.* Rami *alterni hirſuti erecti.* Folia *alterna petiolata ovata acuta integra ciliata villoſa erecta pollicaria.* Petioli *baſi dilatati amplexicaules vaginantes.* Stipulae *intrafoliaceae inflatae truncatae ciliatae membranaceae.* Flores *ſpicati inferne remoti, ſuperne approximati minuti,*

ſenſim florentes. Spica *terminalis filiformis apice cernua ſpithamaea.* Bractea *amplexicaulis barbata triflora. Intra hanc duae bracteae ſingulum florem obvolventes lanceolatae integrae.* Corolla *ad baſin fere 4-partita glabra: laciniae ovatae ſemilineam longae: tribus ſuperioribus rubris, inferiora verſus flexis: infima alba.* Filamenta *quinque prope germen inſerta capillaria calyce paulo breviora, tribus brevioribus, alba.* Antherae *globoſae flavae.* Germen *triquetrum ſuperum.* Styli *duo ſubulati albi erecti, longitudine filamentorum.* Stigmata *ſimplicia obtuſa patula alba.* Thunb. l. c.

*11. POLYGONUM *tinctorium.*

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipulis glabris arctis truncatis ciliatis, foliis ovatis acutiuſculis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 31.

P. (*tinctorium*) floribus hexandris ſemitrigynis, ſpicis ramoſis, foliis craſſis ovatis, ſtipulis membranaceis. *Loureiro. cochin. p.* 297.

Färber Knöterig. W.

Habitat in China. ♂

Caulis *herbaceus perennis teres bipedalis multiplex ſuberectus:* ſtipulis *membranaceis vaginantibus.* Folia *ovata integerrima glabra craſſa ſuccoſa alterna laete viridia.* Flos *ruberrimus, ſpicis longis ramoſis ſubſex.* Corolla 5-*partita connivens.* Stamina *ſex.* Stylus *ſemitrifidus.* Loureiro l. c.

*12. POLYGONUM *minus.*

P. floribus hexandris ſubmonogynis, foliis lineari-lanceolatis, caule baſi repente. *Ait. Kew.* 2. *p.* 31. *Curt. lond.*

P. (*anguſtifolium*) floribus pentandris ſemidigynis, ſpicis filiformibus, foliis lanceolato-linearibus. *Roth. germ. II.* 453. *Hoffm. germ.* 138.

Polygonum intermedium. *Ehrh. herb.* 94.

Polygonum mite. *Schranck. bav.* 1. *p.* 668.

Polygonum ſtrictum. *Allion. ped. n.* 2051. *t.* 67. *f.* 1.

Polygonum Perſicaria β. *Sp. pl.* 518.

P. foliis ovato-lanceolatis glabris, ſpicis ſtrigoſis vaginis ciliatis. *Hall. helv. n.* 1555.

Perſicaria minor. *Bauh. pin.* 101. *Moriſ. hiſt.* 2. *ſ.* 5. *t.* 29. *f.* 5.

Perſicaria puſilla repens. *Lob. ic.* 316. *bona. Raj. angl.* 3. *p.* 145.
Perſicaria anguſtifolia. *Bauh. pin.* 101. *prod.* 43.
Perſicaria pumila. *Tabern.* 858.
Kleiner Knöterig. W.
Habitat in uliginoſis Germaniae, Helvetiae, Italiae, Galliae, Angliae. ⊙ (v.v.)

13. POLYGONUM *Perſicaria.*

P. floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. *Fl. ſuec.* 319, 342. *Pollich. pal. n.* 385. *Flor. dan. t.* 702. *Blackw. t.* 118. *Kniph. cent.* 4. *n.* 63. *Scop. carn. n.* 460.
P. foliis ovato-lanceolatis, ſubhirſutis, ſpicis ovatis, vaginis ciliatis. *Hall. helv. n.* 1557.
P. ſpicis denſis, floribus hexandris digynis, ſeminibus compreſſis, vaginis ciliaribus. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 47.
Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 216.
Perſicaria mitis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 779. *Fl. lapp.* 71.
Perſicaria mitis maculoſa et non maculoſa. *Bauh. pin.* 101. *Trew. icon. in commer. nor.* 1737. *t.* 5. *f.* 3, 4, 5, 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 445.
Gemeinſter Knöterig. W.
Habitat in Europae *humidis et ad vias.* ⊙ (v. v.)
Variat ſpicis rubris et albis, foliis viridibus et nigro-maculatis. W.

*14. POLYGONUM *incanum.*

P. floribus hexandris digynis, ſpicis oblongis, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus. W.
P. (*incanum*) caule procumbente erecto geniculato, foliis ovato-lanceolatis ſubtus incanis, ſpicis terminalibus axillaribusque interruptis, floribus hexandris. *Schmidt. bohem. n.* 391. *
Polygonum tomentoſum. *Schrank. bav.* 1. *p.* 669.
Polygonum Perſicaria γ. *Sp. pl.* 518.
P. foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentoſis, ſpicis ovatis, vaginis ciliatis. *Hall. helv. n.* 1556.
Perſicaria folio ſubtus incano. *Raj. ſynop.* 3. *p.* 145.
Grauer Knöterig. W.
Habitat in Germania, Bohemia, Bavaria, Helvetia. ⊙ (v. v.)
Folia *ſubtus pubeſcentia albida, ceterum habitus prae-*

cedentis, *ſed* caulis *ſemper adſcendens et* ſpicae *interruptae*, *quod vero interdum etiam in P. Perſicaria.* W.

*15. POLYGONUM *glabrum.* W.

P. floribus hexandris digynis, ſpicis virgatis, ochreis truncatis nudis, foliis lanceolatis acuminatis glabris. W.

Mudalej pundu. *Tamul.*

Glatter Knöterig. W.

Habitat in India *orientali.* (v. ſ.)

Simillimum ſequenti, *ſed abunde diſtinctum*: foliis *lanceolatis valde acuminatis margine non ciliatis*, ochreis *truncatis nullo modo ciliatis ſed glaberrimis*, *etiam ochreae florales absque ullis ciliis. Variat* ſtaminibus *ſex et ſeptem. Eſt certe planta diſtincta jam e longinquo ſpectata diverſa. A P. filiformi* foliis *longioribus triuncialibus*, ſpicis *brevioribus aliisque notis diſcrepat*, *nec cum P. tinctorio convenit ob* ochreas *glaberrimas*, foliorum *ſtructuram et alios characteres.* W.

16. POLYGONUM *barbatum.*

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ochreis truncatis ſetaceo-ciliatis, foliis oblongis acutis glabriuſculis. W.

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipulis truncatis ſetaceo-ciliatis, foliis lanceolatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 52.

Perſicaria procumbens longiſſima anguſtiſſima non maculoſa, ſpica longiori laxiori et graciliore. *Sloan. jam.* 48. *hiſt.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 1.

Velutta-modela-mucu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 145. *t.* 77.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 446. *t.* 49. *f.* 2.

Bärtiger Knöterig. W.

Habitat in China. (v. ſ.)

Caulis *herbaceus*, *rufus.* Stipulae *vaginales laxae*, *piloſae*, *truncatae*, *ciliatae*, *ſetis validis longitudine ferme ipſius ſtipulae.* Spicae *virgatae*, *longae*: *floribus remotis*, *tribus ex ſingula bractea turbinata.*

Tomum duodecimum horti malabarici et Sloani opus non poſſideo, *ergo hiſce de ſynonymis nil dixi. Gmelinus*, *Sloani plantam ad P. ocreatum pertinere*, *autumat.* W.

*17. POLYGONUM *tomentoſum.* W.

P. floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ochreis truncatis hiſpidis ſetaceo-ciliatis, foliis ovatis acuminatis utrinque tomentoſis. W.

Polygonum ocreatum. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 442. *t.* 49. *f.* 1.

Perſicaria maderaſpatana longiore folio hirſuto. *Pluk. alm.* 288. *t.* 210. *f.* 7.

β. foliis adultioribus ſcabris, junioribus tantum tomentoſis. W.

Filziger Knöterig. W.

Habitat in Zeylona. (v. ſ.)

Ab affinibus, foliis *utrinque tomento tenui molli albicante tectis, et eorum forma ovata acuminata diſtinctum. Figura Houttuyni optima, aſt ſpicae ſunt nudae absque floribus. Varietas* β. *eſt eadem planta ſed,* folia *inferiora utrinque ſcabra, nec albicantia tomentoſa.* W.

Ochreae hujus ſpeciei ſunt pilis brevibus adpreſſis tectae membranaceae truncatae ſetaceo-ciliatae. W.

18. POLYGONUM *orientale.*

P. floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, ſtipulis hirtis hypocrateriformibus. *Kniph. cent.* 4. *n.* 62.

Perſicaria florum ſtaminibus ſex pluribusque, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 96. *Roy. lugdb.* 216.

Perſicaria foliis ovato-lanceolatis acutis, foliis pentandris, caule erecto. *Mill. dict. t.* 201.

Perſicaria orientalis; nicotianae folio, calyce florum purpureo. *Tournef. cor.* 38. *Comm. rar.* 43. *t.* 43.

Schovanna modela muccu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 147. *t.* 76.

β. floribus albis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 32.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 447.

Tabacksblättriger Knöterig. W.

Habitat in Oriente, India. ⊙ (v. v.)

Indica longe hirſutior eſt, quam orientalis.

19. POLYGONUM *penſylvanicum.*

P. floribus octandris digynis, pedunculis hiſpidis, foliis lanceolatis, ſtipulis muticis. *Sp. pl.* 519.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 448.

Penſylvaniſcher Knöterig. W.

Habitat in Penſylvania. *Kalm.*

Facies *et habitus Pol. Perſicariae, ſed majora ſtrictiora omnia.* Caulis *ramoſus, angulatus.* Folia *lanceolata, acuminata carina ſubtus admodum ſcabra.* Stipulae *truncatae, muticae.* Pedunculi *ſcabri, ſetis rigidiuſculis apice gluten ſecernentibus.* Spicae *ſubracemoſae floſculis pedicellatis.*

**** Polygona *foliis indiviſis, floribus octandris.*

20. POLYGONUM *maritimum.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, ochreis bilobis membranaceis, foliis ellipticis obtuſis ſubcarnoſis, caule ſuffruticoſo. W.

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovali-lanceolatis ſempervirentibus, caule ſuffruteſcente. *Kniph. cent.* 11. *n.* 85.

P. maritimum latifolium. *Bauh. pin.* 281.

Polygonum maritimum. *Cam. epit.* 691.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 449.

Meerſtrands Knöterig. W.

Habitat in litoribus M. mediterranei, Orientis, Virginiae. ♄ (v. ſ.)

Affine nimis P. aviculari, ut vix diſtinguatur, etiam floribus quaternis et caule hinc planiore; ſed majora durioraque omnia. Folia *ovata, coriacea, ſempervirentia, exſiccatione coeruleſcentia.* Caulis *brevior, durus, perennans.*

21. POLYGONUM *aviculare.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Mat. med.* 105. *Hort. cliff.* 150. *Fl. ſuec.* 332. 339. *Gron. virg.* 44. *Roy. lugdb.* 215. *Blackw. t.* 315. *Scop. carn. n.* 471. *Pollich. pal. n.* 386. *Hoffm. germ.* 139. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 454.

P. floribus ſubſolitariis, in alis foliorum ſeſſilibus, ſtaminibus octo. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 40. *n.* 32.

P. procumbens, foliis linearibus acutis, floribus ſolitariis. *Hall. helv. n.* 1560.

P. latifolium. *Bauh. pin.* 281.

β. P. brevi anguſtoque folio. *Bauh. pin.* 281.

γ. P. oblongo anguſto folio. *Bauh. pin.* 281. *Fl. lapp.* 153. *Tabern.* 833.

δ. anguſtis foliis, calycibus purpuraſcentibus. *Dill. app.* 65.

ε. P. erectum humile, foliis orbum. *Dill. app.* 65.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 449.

Vogel Knöterig. W.

Habitat in Europae *cultis ruderatis.* ⊙ (v. v.)

Variat *corolla* 4-*partita cum ſtaminibus ſeptem. Gmel. l. c.* R.

Poſſideo ſpecimina ex India orientali, quae forte ſpecie differunt, ſed praeter, folia *breviora,* caulem *ri-*

gidum, internodiaque *breviſſima*, *nullam video differentiam.* W.

*22. POLYGONUM *Bellardi.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, ochreis ciliatis, foliis lanceolatis acutis, caule erecto. W.

P. (*Bellardi*) erectum, floribus axillaribus octandris trigynis, foliis elliptico-lanceolatis, vaginis ciliatis. *Allion. pedem. n.* 2052. *t.* 90. *f.* 2. *

Bellardiſcher Knöterig. W.

Habitat in agro Pedemontano. ⊙

*23. POLYGONUM *ſetoſum.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lineari-ſubulatis, ochreis membranaceis ciliatis, caule erecto. W.

P. (*ſetoſum*) floribus octandris trigynis? axillaribus, foliis ſubulato-linearibus, ſtipulis ſetaceo-laceris, caulibus ſubfruticoſis. *Iacq. obſ. bot.* 3. *p.* 8. *t.* 57. *

P. orientale caryophylli folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 39.

Borſtiger Knöterig. W.

Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

24. POLYGONUM *erectum.*

P. floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovalibus, caule erecto herbaceo. *Sp. pl.* 520.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 451.

Aufrechter Knöterig. W.

Habitat in Philadelphia, *enata ex ſeminibus D. Kalmii.* ⊙

25. POLYGONUM *articulatum.*

P. floribus octandris trigynis, ſpicis articulatis paniculatis, ſtipulis vaginalibus truncatis. *Sp. pl.* 520.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 451.

Gegliederter Knöterig. W.

Habitat in Canada. *Kalm.* ⊙

Radix *fibroſa*, *parva.* Caulis *pedalis*, *ramis ſuperne alternis*; *ſubdiviſus in paniculam floriferam.* Stipulae *ſolitariae*, *vaginales*, *ſuperne latiores*, *integrae*, *truncatae*, *nec fiſſae.* Folia *linearia*, *glabra.* *Paniculam terminant Spicae filiformes*, *anguſtiſſimae*, *imbricatae bracteis vaginalibus*, *turbinatis*, *truncatis*; *ex ſinu ſingulo oritur Pedunculus ſolitarius*, *capillaris*, *baſi articulatus*, *coloratus*, *uniflorus.* Corolla *incar-*

nata, quinquepartita, fundo laxiore quam in P. aviculari, ſtaminibus octo, Piſtillo ſtylis 3.

26. POLYGONUM *divaricatum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſo-paniculatis, foliis lanceolatis laevibus, caule divaricato patulo glabro. W.

P. floribus octandris trigynis racemoſis, foliis lanceolatis, caule divaricato patulo. *Sp. pl.* 520.

Perſicaria montana, foliis longioribns anguſtioribus, floribus racemoſis. *Amm. ruth.* 240.

Helxine foliis lanceolatis, caule diffuſo. *Hort. upſ.* 96.

Fagopyrum orientale ramoſum et multiflorum, perſicariae folio. *Tournef. cor* 39. *Buxb. cent.* 2. *p.* 31. *t.* 31.

Polygonum ſpicis paniculatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 57. *t.* 11. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 452.

Ausgebreiteter Knöterig. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

A ſequentibus ſatis diſtinctum: foliis planis lanceolatis utrinque et margine glaberrimis, ochreis *glabris,* caule *divaricato ad geniculos nullo modo piloſo. Planta Gmelini differre videtur venis foliorum prominentibus, eſt forte varietas.* W.

*27. POLYGONUM *alpinum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſo-paniculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris margine ciliatis, caule ramoſo, geniculis barbatis. W.

Polygonum alpinum. *Allion. pedem. n.* 2049. *t.* 68. *f.* 1.

P. caule erecto, foliis ovato-lanceolatis ſubhirſutis, ſpicis paniculatis. *Hall. helv. n.* 1564.

Perſicaria folio nigricante, floribus albis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 27. *Allion. ſpec. pedem.* 41. *t.* 8.

Perſicaria alpina altera ſaxatilis, foliis durioribus acutis. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 108. *t.* 83.

Alpen Knöterig. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Sabaudiae, *inque inſula* Corſica. ♃ (v. ſ.)

28. POLYGONUM *undulatum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſo-paniculatis, foliis lanceolatis undulatis ſuperne ſcabris, ſubtus pubeſcentibus, caule ramoſo inferne pubeſcente, geniculis ciliatis. W.

P. (*undulatum*) floribus octandris trigynis, foliis lanceolatis acuminatis undulatis. *Murr. comment. goett.*

1774. *p.* 34. *t.* 5. * (*excluſis ſynonymis Bocconi et Allionii.*)

P. (*ſibiricum*) floribus octandris trigynis racemoſis, foliis ovato-lanceolatis undulatis ſcabris, ſtipulis hirtis. *Lin. ſuppl.* 228.

P. ſpicis paniculatis denſe conſtipatis, floribus octandris trigynis, foliorum lanceolatorum vaginis hirſutis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 56. *t.* 10. *

Wellenblättriger Knöterig. W.

Habitat in ſaxoſis humidiuſculis montium Sibiriae. ♃ (v. ſ.)

Caute diſtinguendum a praecedente, differt ab hoc: foliis *parum anguſtioribus, undulatis, ſuperne ſcabris, inferne pubeſcentibus,* caule *inferne et infra geniculos pubeſcente.* W.

*29. POLYGONUM *ſericeum.*

P. floribus octandris trigynis racemoſis, foliis ovatis incano-pubeſcentibus, caule decumbente. W.

Polygonum ſericeum. *Pall. it. ed. min.* 3. *p.* 233.

P. foliis ovatis hirſutis, floribus pedunculatis in ſpicis laxiſſimis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 58. *t.* 9. *f.* 2.

Seidenartiger Knöterig. W.

Habitat in Sibiria *ad lacum* Baical. ♃

30. POLYGONUM *ſerratum.*

P. foliis crenatis. *Sp. pl.* 517. †

P. folio oblongo crenato. *Shaw. afr.* 489.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 452.

Geſägter Knöterig. W.

Habitat in Mauritania.

***** Helxine *foliis ſubcordatis.*

*31. POLYGONUM *corymboſum.* W.

P. floribus octandris trigynis, penduncul is glanduloſo-piloſis, foliis oblongo-lanceolatis ſubſeſſilibus, bracteis membranaceis ciliatis. W.

Doldentraubiger Knöterig. W.

Habitat in Java. (v. ſ.)

Accedit ad ſequentem ſpeciem, ſed diverſum: foliis *oblongo-lanceolatis breviſſime petiolatis,* bracteis *ochreaeformibus membranaceis margine ciliatis minutiſſimis,* pedunculis *communibus medio paucis pilis apice glanduliferis inſtructis.* W.

32. POLYGONUM *chinenſe.*

P. floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis petiolatis, bracteis cordatis ſeſſilibus. W.

P. floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis, bracteis cordatis. *Sp. pl.* 521. *Burm. ind.* 90. *t.* 30. *f.* 3.

Chineſiſcher Knöterig. W.

Habitat in India, China.

Caulis *flexuoſus.* Folia *ovato-cordata, ſ. lato-ovata glabra utrinque.* Pedunculi *hiſpidi, apice ſaepius trifidi.* Flores *capitati.* Stipulae *vaginales, latae, integerrimae nec ciliatae, ovatae.* Flores *in capitulis ſubrotundis, pauci, terminales.*

33. POLYGONUM *ſagittatum.*

P. foliis ſagittatis, caule aculeato. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 65. *t.* 13. *f.* 2. *icon plantae ſylveſtris.*

Helxine caule aculeato, foliis ſagittatis. *Gron. virg.* 44. *Cold. noveb.* 92.

Helxine caule erecto aculeis reflexis exaſperato. *Hort. cliff.* 151. *t.* 12. * *ic. plantae hortenſis. Roy. lugdb.* 211.

Fagotritico ſimilis, anguſtiori folio, convolvuli modo ſcandens, caule ſpinulis deflexis denſius obſito. *Pluk. mant.* 74. *t.* 398. *f.* 5.

Planta poſterior e novo belgio. *Laët. amer.* 73. *t.* 74.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 454.

Pfeilförmiger Knöterig. W.

Habitat in Virginiae, Marilandiae *madidis.* ☉ (v. ſ.)

Interdum *ſcandit frutices.*

34. POLYGONUM *arifolium.*

P. foliis haſtatis, caule aculeato. *Sp. pl.* 521.

Fagotritico ſimilis ſpinoſa ſcandens, ari folio latiore floridana. *Pluk. amalth.* 87. *t.* 398. *f.* 3.

Planta prior e novo belgio. *Laët. amer.* 73.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 455.

Aronblättriger Knöterig. W.

Habitat in Virginia, Florida.

Caulis *ſcandit. Clayt.*

35. POLYGONUM *craſſifolium.*

P. foliis haſtatis, inferioribus ovatis, reliquis lineari-lanceolatis, caule decumbente glabro. W.

P. (*craſſifolium*) floribus octandris trigynis, foliis haſtatis carnoſis. *Murr. comment. goett.* 1774. *p.* 37. *t.* 6. *

Dickblättriger Knöterig. W.
Habitat in Sibiria *locis apricis verſus* Ieniſeam.

36. POLYGONUM *perfoliatum.*

P. foliis triangularibus, caule aculeato, ſtipulis perfoliato-folioſis patentibus ſubrotundis. *Burm. ind.* 90. *t.* 31. *f.* 2.
Fagotritico ſimilis ſpinoſa minor ſinica. *Pluk. alm.* 87. *t.* 398. *f.* 1. *Burm.*
Truëllum. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 401. *t.* 48. *f.* 1?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 455.
Durchwachſener Knöterig. W.
Habitat in India.

Similis *P. ſagittato et arifolio.* Caulis *angulatus aculeis parvis recurvis, ut etiam Petioli.* Stipulae *non vaginantes, ſed patentes, foliaceae, ovatae ſ. ſubrotundae, integerrimae.* Folia *triangularia, baſi parum ſinuata latiora quam longa, interdum peltata.* Pedunculi *ad apicem caulis, pauciflori, aculeati.*

37. POLYGONUM *tataricum.*

P. foliis cordato-ſagittatis, caule inermi erecto, ſeminibus ſubdentatis. *Sp. pl.* 521.
Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus ſubdentatis. *Hort. upſ.* 96.
Helxine caule erecto inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminum angulis dentatis. *Hort. cliff.* 151.
P. floribus octandris trigynis, ſeminibus triangulis, angulis ſinuatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 64. *t.* 13. *f.* 1.
Fagopyrum erectum, fructu aſpero. *Amm. ruth.* 168.
Fagopyrum erectum fructu ex calyce eminente ſerrato. *Hall. goett.* 5. R.
Fagotriticum ſibiricum. *Act. Stockh.* 1744. *p.* 117. *t.* 4.
Frumentum Saracenicum. *Act. Nat. Cur.* 3. *p.* 1. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 456.
Tatariſcher Knöterig. W.
Habitat in Tataria. ⊙ (v. v.)

*38. POLYGONUM *emarginatum.*

P. foliis cordato-ſagittatis, caule erecto inermi, ſeminibus apice truncatis emarginatis alis cartilagineis. *Roth. catalect. bot.* 1. *p.* 48. *
Ausgerandeter Knöterig. W.
Habitat in China. ⊙ (v. v.)

Simillimum ſequenti, ſed ſeminibus *abunde diſtinctum.* W.

39. **POLYGONUM** *Fagopyrum.*

P. foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis aequalibus. *Mat. med.* 105. *Knorr. del.* 2. *t. F. Hoffm. germ.* 139. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 456.

P. caule erecto, foliis ſagittatis, valvulis integerrimis. *Hall. helv. n.* 1563.

Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis, ſeminibus integerrimis. *Hort. upſ.* 96.

Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis. *Hort. cliff.* 151. *Fl. ſuec.* 324, 345. *Roy. lugdb.* 217.

Eryſimum cereale, folio hederaceo. *Bauh. pin.* 27.

Ocymum cereale. *Tabern. hiſt.* 276.

Frumentum Saracenicum. *Matth.* 876.

Fagopyrum. *Dodon. cer. p.* 80.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 457.

Buchweizen Knöterig. W.

Habitat in Aſia, *inter ſegetes* Europae *quaſi ſponte.* ☉ (v. v.)

40. **POLYGONUM** *Convolvulus.*

P. foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtuſatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 62. *Pall.* 1. *p.* 39. *Pollich. pal. n.* 387. *Hoffm. germ.* 139. *Flor. dan. t.* 744. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 456.

P. caule volubili, foliis ſagittatis. *Hall. helv. n.* 1561.

Helxine caule volubili. *Fl. lapp.* 154. *Fl. ſuec.* 323, 344. *Hort. cliff.* 150. *Gron. virg.* 157. *Roy. lugdb.* 217.

Helxine ſemine triangulo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 157. R.

Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Bauh. pin.* 295.

Volubilis nigra. *Tabern.* 876.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 458.

Windender Knöterig. W.

Habitat in Europae *agris.* ☉ (v. v.)

Caules *angulati.* Racemi *ex alis.* Flores *etiam ad baſin pedunculi communis.* Semina *calyce triquetro tecta.* Antherae *violaceae.*

41. **POLYGONUM** *dumetorum.*

P. foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 63. *Willich. illuſtr. n.* 9. *Poll.*

pal. n. 388. *Hoffm. germ.* 139. *Flor. dan. t.* 756. *Roth. germ. I.* 174. *II.* 457.
P. caule volubili, foliis ſagittatis, valvulis ſeminalibus alatis. *Hall. helv. n.* 1562.
P. ſcandens. *Grim. iſen. in Nov. Act. A. N. C. tom.* 3. *p.* 308.
Fagopyrum praelongum dumetorum, ſeminibus alatis duplici more diſpoſitis. *Dill. app.* 60.
Fagopyrum ſcandens altiſſimum dumetorum, ſeminibus tribus alis pellucidis. *Rupp. jen.* 99.
Fagopyrum ſylvaticum ſcandens, flore foliaceo. *Pont. anth.* 265.
Fagopyrum majus ſcandens. *Vaill. pariſ.* 52.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 459.
Hecken Knöterig. W.
Habitat in Europae *auſtralioris ſylvis umbroſis.* ☉ (v. v.)

Folia *cordata lobis baſeos rotundatis.* Caulis *non ſtriatus.* Panicnla *e racemo compoſito, alternatim bifario.* Antherae *albae.*

42. POLYGONUM *ſcandens.*
P. foliis cordatis, racemo ſimplici axillari, caule erecto laevi ſcandente. W.
P. foliis cordatis, caule erecto ſcandente. *Sp. pl.* 522.
P. foliis cordatis, caule volubili, floribus carinatis. *Syſt. nat.* 1. *p.* 364.
Fagopyrum ſcandens americanum maximum. *Tournef. inſt.* 511.
Fagopyrum ſcandens, caule rubente, ſemine nigro. *Gron. virg.* 44. *Cold. noveb.* 93.
Fagotriticum volubile majus virginianum. *Pluk. alm.* 143. *t.* 177. *f.* 7.
Fogopyrum ſcandens ſ. Volubilis nigra major, flore et fructu membranaceis compreſſis. *Sloan. jam.* 46. *hiſt.* 1. *p.* 138. *t.* 90. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 461.
Kletternder Knöterig. W.
Habitat in America. ♃ (v. ſ.)

Obſ. Petiolorum *baſis ſubtus poro perforata in P. ſcandenti, dumetorum, Convolvulo.*

*43. POLYGONUM *multiflorum.*
P. foliis cordatis, panicula divaricata axillari, caule erecto angulato ſcandente. W.

P. (*multiflorum*) foliis cordatis, caule volubili angulato. florum panicula ramoſa. *Thunb. jap.* 169. *
Polygonum chinenſe. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 453. *t.* 49. *f.* 3.
Vielblütiger Knöterig. W.
Habitat in Japonia. ♃

786. COCCOLOBA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 678.

Cal. 5-partitus, coloratus. *Cor.* 0. *Bacca* calycina, monoſperma.

1. COCCOLOBA *uvifera.*
C. foliis cordato-ſubrotundis nitidis. *Sp. pl.* 523.
C. foliis ſubrotundis integris nitidis planis, racemis fructuum cernuis. *Iacq. amer.* 112. *t.* 73. *Mill. dict. n.* 1.
Coccolobis foliis craſſis orbiculatis ſinu aperto. *Brown. jam.* 208.
Polygonum foliis ſubrotundis, caule arboreo, fructibus baccatis. *Sp. pl.* 1. *p.* 365.
Uvifera foliis ſubrotundis, ampliſſimis. *Hort. cliff.* 487.
Uvifera litorea, foliis amplioribus fere orbiculatis craſſis americana. *Pluk. alm.* 394. *t.* 236. *f.* 7.
Guajabara racemoſa, foliis coriaceis ſubrotundis. *Plum. ic. t.* 145.
Populus americana rotundifolia. *Bauh. pin.* 430.
Prunus maritima racemoſa, folio ſubrotundo glabro, fructu minore purpureo. *Sloan. jam.* 183. *hiſt.* 2. *p.* 129. *t.* 220. *f.* 3. *Raj. dendr.* 40. *Catesb. car.* 2. *p.* 96. *t.* 96.
β. C. (*leoganenſis*) foliis ſubrotundis integerrimis nitidis planis, racemis fructuum erectis. *Iacq. amer.* 113. *t.* 178. *f.* 33.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 489.
Gemeine Seetraube. W.
Habitat in America. ♄

*2. COCCOLOBA *auſtralis.*
C. foliis cordato-ovatis acutis, floribus polygamis. *Forſt. prod. n.* 176.
Südliche Seetraube. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄

3. COCCOLOBA *pubeſcens.*
C. foliis orbiculatis pubeſcentibus. *Sp. pl.* 523. *Mill. dict. n.* 2.

C. (*grandifolia*) foliis ſubrotundis integerrimis rugoſis. *Iacq. amer.* 113.
Coccolobis arborea, foliis orbiculatis. *Brown. jam.* 210.
Scortea arbor americana, ampliſſimis foliis averſa parte nervis extantibus. *Pluk. phyt.* 222. *f.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 492.
Behaarte Seetraube. W.
Habitat in America. ♄

Arbor *praealta.* Lignum *duriſſimum ſub terra lapideſcit. Iacq.*

*4. COCCOLOBA *diverſifolia.*
C. foliis ramuſculorum ovatis, ramorum ovato-cordatis. *Iacq. amer.* 114. *t.* 76. *
Verſchiedenblättrige Seetraube. W.
Habitat in Domingo. ♄

*5. COCCOLOBA *flaveſcens.*
C. foliis ellipticis obtuſis mucronatis, baſi cordatis. W.
C. foliis lanceolato-oblongis obtuſis cum acumine. *Iacq. amer.* 114. *t.* 75. *
Gelbliche Seetraube. W.
Habitat in Domingo. ♄

6. COCCOLOBA *excoriata.*
C. foliis oblongo-ovatis acutiuſculis baſi cordatis, racemis pendulis. W.
C. foliis ovatis, ramis quaſi excorticatis. *Sp. pl.* 524. *Mill. dict. n.* 4.
Coccolobis montana major arborea, foliis ſubrotundis, cortice laevi. *Brown. jam.* 210.
Guajabara alia racemoſa, foliis oblongis. *Plum. ic.* 146. *f.* 1.
Arbor indica, glycyrrhizae foliis ſubrotundis, floribus in praelongam ſpicam adactis. *Pluk. amalth.* 22. *t.* 363. *f.* 4?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 494.
Rindenloſe Seetraube. W.
Habitat in America. ♄

*7. COCCOLOBA *nivea.*
C. foliis oblongis acuminatis, baſi attenuatis, racemis erectiuſculis. W.
C. (*nivea*) foliis oblongis acuminatis venoſis, ſupra nitidis, racemis erectiuſculis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 693. *

C. (*nivea*) foliis ovato-oblongis acutis rugoſis. *Iacq. amer.* 115. *t.* 78.
Weiſse Seetraube. W.
Habitat in montoſis aridis Jamaicae. ♄

8. COCCOLOBA *punctata*
C. foliis lanceolato-ovatis. *Mill. dict. n.* 3.
C. (*coronata*) foliis ovali-oblongis acuminatis planis. *Iacq. amer.* 114. *t.* 77.
Coccolobis foliis oblongo-ovatis venoſis, uvis minoribus punctatis. *Bromn. jam.* 240.
Uvifera arbor americana, fructu aromatico punctato. *Pluk. alm.* 394. *t.* 237. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 495.
Punctirte Seetraube. W.
Habitat in America. ♄

*9. COCCOLOBA *obtuſifolia.*
C. foliis oblongis obtuſiſſimis. *Iacq. amer.* 114. *t.* 74. *
Stumpfblättrige Seetraube. W.
Habitat in fruticoſis et ſylvaticis Carthagenae. ♄ (v. ſ.)

*10. COCCOLOBA *microſtachya.* W.
C. foliis ovatis obtuſis glaberrimis, racemis nutantibus. W.
Kleinährige Seetraube. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri cinerei.* Folia *petiolata alterna ovata obtuſa latere exteriore latiora utrinque glabra, fere ſesquiuncialia, integerrima.* Racemi *terminales breviſſimi nutantes parviflori. Accedit ad C. obtuſifoliam ſed:* foliis *ovatis et* racemis *multo minoribus nutantibus diſtincta.* W.

11. COCCOLOBA *emarginata.*
C. foliis coriaceis ſubrotundis exciſo-emarginatis. *Syſt. veg.* 314. *Iacq. amer.* 37. *obſ.* 1. *p.* 18. *t.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 496.
Ausgerandete Seetraube. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

12. COCCOLOBA *barbadenſis.*
C. foliis cordato-ovatis undulatis. *Syſt. veg.* 314. *Iacq. amer.* 37. *obſ.* 1. *t.* 8. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 496.
Barbadenſiche Seetraube. W.
Habitat in Barbados. ♄

13. COCCOLOBA *tenuifolia.*
C. foliis ovatis membranaceis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397.* *Mill. dict. n.* 5.
Coccolobis fruteſcens, foliis ſubrotundis, fructu minore trigono. *Brown. jam.* 210. *t. f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 497.
Dünnblättrige Seetraube. W.
Habitat in Jamaica. ♄

787. PAULLINIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 679.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Capſ.* turbinata trigona 3-locularis, loculis monoſpermis.

1. PAULLINIA *nodoſa.* †
P. foliis ternatis, petiolis nudis, foliolo medio obovato. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 11. *t.* 62. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 490.
Knotige Paullinie. W.
Habitat in America. ♄

2. PAULLINIA *Cururu.*
P. capſulis pyriformibus obtuſis, foliis ternatis, foliolis oblongis dentato-ſerratis ſubacuminatis, petiolis alatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 121.
P. foliis ternatis, petiolis marginatis. *Iacq. l. c. t.* 61. *f.* 4.
P. foliis ternatis, petiolis marginatis, foliolis cuneiformibus obtuſis ſubdentatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 524. *Mill. dict. n.* 3.
P. foliis ternatis, foliolis obtuſis vix denticulatis glabris deſinentibus in petiolum proprium. *Hort. cliff.* 151.*
Cururu ſcandens triphylla. *Plum. gen.* 34. *ic.* 111. *f.* 2.
Houttuyn. Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 490.
Stumpfrüchtige Paullinie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

3. PAULLINIA *carthaginenſis.* †
P. foliis biternatis, petiolis omnibus marginatis, caule inermi. *Iacq. obſ.* 3. *t.* 62. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 491.
Carthaginenſiſche Paullinie. W.
Habitat Carthagenae. ♄

4. **PAULLINIA** *caribaea.* †

P. foliis biternatis, petiolulis omnibus marginatis, ramis aculeatis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 491.
Caribaeiſche Paullinie. W.
Habitat in Caribaeis. ♄

5. **PAULLINIA** *curaſſavica.*

P. valvulis capſularum ſemiobcordatis, foliis biternatis, foliolis crenatis ovalibus imparibus ovato-cuneatis, petiolo intermedio marginato. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 123. *t.* 11. *f.* 2.
P. foliis biternatis, petiolulis omnibus marginatis, ramis inermibus. *Iacq. l. c. t.* 61. *f.* 8. *Swartz. obſ.* 151.
P. foliis biternatis, foliolis ovatis ſubſinuatis. *Spec. pl.* 2. *p.* 525.
P. foliis decompoſitis ternatis, caule inermi. *Hort. cliff.* 152. *
P. ſarmentoſa, foliis ternato-ternatis ad apices crenatis, infimis minoribus, quandoque tantum auritis. *Brown. jam.* 212.
Cururu ſcandens enneaphylla, fructu racemoſo rubro. *Plum. gen.* 34. *ic.* 111. *f.* 1.
Cordis indi folio et facie fruteſcens curaſſavica latifolia. *Pluk. alm.* 120. *t.* 168. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 491.
Curaſſaviſche Paullinie. W.
Habitat in Curaſſao. ♄

Caulis *ſulcatus, angulis villoſis ferrugineis, ſulcis apicem verſus ferrugineo-punctatis.* Schumacher l. c.

6. **PAULLINIA** *barbadenſis.*

P. valvulis capſularum ſemiovatis villoſiuſculis, foliis biternatis, foliolis ovalibus integerrimis ſerratisque coriaceis, petiolis ſubmarginatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 123.
P. foliis biternatis, petiolo intermedio marginato, reliquis nudis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 491.
Barbadenſiſche Paullinie. W.
Habitat in Barbados. ♄

7. **PAULLINIA** *polyphylla.*

P. valvulis capſularum ſemiobovatis, foliis ſupradecompoſitis, foliolis ovato-cuneatis, apice crenatis, ſupra gla-

bris ſubtus petiolisque villoſis. *Schumacher. Act. Hiſt. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 124.
P. foliis triternatis, petiolulis nudis. *Iacq. ibid. t.* 61. *f.* 10. *Fabric. helmſt. p.* 235.
P. foliis ſupradecompoſitis. *Hort. cliff.* 152. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 492.
Vielblättrige Paullinie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Cirrhus axillaris; Flores *paniculati.* Petioli *partiales teretiuſculi.*

*8. PAULLINIA *tetragona.*
P. capſulis tricarinatis tricornibus, foliis pinnatis, foliolis ovatis ſubſerratis acutis glabris, petiolis nudis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 122.
P. (*tetragona*) foliis pinnatis, foliolis integerrimis, fructu trigono ſubalato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 355.
Vierkantige Paullinie. W.
Habitat in Cajenna. ♄

*9. PAULLINIA *Veſpertilio.*
P. capſulis alatis, alis horizontalibus, foliis pinnatis, foliolis ovatis apice inciſo-ſerratis, petiolis nudis. *Schumacher. Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 122. *t.* 11. *f.* 1.
P. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis inciſis, petiolis nudis, capſulis pedicellatis, alis horizontalibus lanceolatis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 695. *
Geflügelte Paullinie. W.
Habitat in inſula St. Chriſtophori Americes. ♄

10. PAULLINIA *pinnata.*
P. capſulis pyriformibus tricornibus, foliis pinnatis, foliolis oblongis obtuſe ſerratis acuminatis, petiolis marginatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 121.
P. foliis pinnatis, petiolis marginatis, foliolis nitidis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 12.
P. foliis pinnatis: foliolis inciſis, petiolis marginatis. *Hort. cliff.* 152. * *Roy. lugdb.* 464. *Mill. dict. n.* 5.
Cururu ſcandens pentaphylla. *Plum. gen.* 34.
Clematis pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoſo tricocco et coccineo. *Plum. amer.* 76. *t.* 91.
Piſum cordatum non veſicarium. *Sloan jam.* 111.
Cururu-ape. *Marcgr. braſ.* 22. *Piſ. braſ.* 114. *Raj. hiſt.* 1347.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 492.
Gefiederte Paullinie. W.
Habitat in Braſilia, Iamaica, Domingo, *locis ſiccis arenoſis.* ♄ (v. ſ.)
Foliola oblongo-ovata, profunde et remote ſerrata. Fructus *ruber.*

11. PAULLINIA *tomentoſa.*
P. foliis pinnatis, foliolis ovatis rhombeis repandis obtuſis tomentoſis, petiolis marginatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 121.
P. foliis pinnatis, petiolis marginatis, foliolis tomentoſis.
P. foliis pinnatis tomentoſis, petiolis infra foliola nudis. *Iacq. amer. p.* 37. *obſ.* 1. *p.* 19. *t.* 10. *et obſ.* 3. *t.* 61. *f.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 493.
Filzige Paullinie. W.
Habitat in America. ♄
Petioli communes *marginati, ſed non inter foliola inferiora.*

*12. PAULLINIA *cauliflora.* †
P. foliis pinnatis, pinnula infima ternata, petiolo ad apicem marginato, baſi nudo, floribus corymboſo-capitatis axillaribus et terminalibus.
P. foliis pinnatis glabris, pari infimo ternato. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 458. *Collect.* 4. *p.* 176. *
Stammblütige Paullinie. W.
Habitat in ſylvis Americae *calidioris ad* Caracas. ♄

*13. PAULLINIA *japonica.* †
P. foliis quinato-pinnatis petiolulatis marginatis, caule herbaceo inermi. *Thunb. jap.* 170.
Japaniſche Paullinie. W.
Habitat in Japonia. ♃

Caulis *herbaceus angulatus ſcandens glaber, craſſitie vix calami, inermis.* Folia *alterna petiolata glabra.* Foliola *infima ovata ſubſeſſilia inciſo-bifida vel trifida, inciſuris integris, pollicaria.* Foliola *intermedia ternata petiolulo marginato, pinnis lateralibus ovatis integris vel inciſis, intermedia trifida.* Foliolum *ultimum pinnatum petiolulo articulato marginato.* Pinnae *bijugae oblongae inciſo-trifidae vel quinquefidae, ultima trifida majori.* Petioli *cauli ſimiles bipollica-*




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



res. Flores *foliis oppoſiti paniculati.* Pedunculi *longitudine foliorum pedicellis breviſſimis.* Thunb. l. c.

14. PAULLINIA *diverſifolia.* †

P. foliis ſupradecompoſitis, petiolis marginatis: infimis pinnatis, reliquis ternatis. *Iacq. l. c. t.* 62. *f.* 14.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 493.
Verſchiedenblättrige Paullinie. W.
Habitat in America. ♄

*788. SERIANA.

Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 4. *Nectar.* 4-phyllum. *Samarae* 3, longitudinaliter connatae globoſae, inferne in alam membranaceam dilatatam.

1. SERIANA *ſinuata.*

S. alis capſularum poſtice dilatatis, foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis dentato-ſinuatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 126. *t.* 12. *f.* 1.
Paullinia (*Seriana*) foliis ternatis, petiolis nudis, foliolis ovato-oblongis. *Sp. pl.* 524. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 11. *t.* 61. *f.* 2.
Paullinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pedunculis cirrhiferis. *Hort. cliff.* 152. *Mill. dict. n.* 4.
Seriana ſcandens triphylla et racemoſa. *Plum. gen.* 34. *ic.* 113. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 490.
Tiefzähnige Seriane. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

Caulis *ſulcatus hirſutus*, foliola *coriacea glabra mucronata, baſi anguſtata, per petiolum decurrentia.* Schumacher l. c.

*2. SERIANA *divaricata.*

S. foliis biternatis, foliolis ovatis integerrimis ſubacutis lucidis petiolatis, petiolis nudis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 126. *t.* 12. *f.* 2.
Paullinia (*divaricata*) foliis biternatis, foliolis ovatis acutis ſubintegris, petiolis nudis, paniculis divaricatis, alis capſularum ovatis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 696. *
Weitriſpige Seriane. W.

Habitat in ſylvis Jamaicae. ♄

Panicula *bicirrhoſa*, alis *capſularum poſtice parum dilatatis et rotundatis*. Schumacher l. c.

*3. SERIANA *caracaſana*.

S. alis capſularum poſtice rotundatis, foliis biternatis, foliolis oblongis utrinque acutis remotiſſime dentatis, petiolis nudis. W.

Paullinia (*caracaſana*) foliis biternatis, petiolis nudis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 52. *t.* 99. *

Weitzähnige Seriane. W.

Habitat ad Caracas. ♄

Folia *glabra*, *foliolis utrinque dentibus breviſſimis tribus vel quatuor notatis*. Panicula *bicirrhoſa racemoſa*. W.

*4. SERIANA *racemoſa*.

S. alis capſularum poſtice dilatatis antice ſubſinuatis, foliis biternatis, foliolis ovatis profunde ſerratis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 3.

Traubenblütige Seriane. W.

Habitat in Vera Cruce. ♄

Folia *acuta*. Petioli *ſubnudi*. Panicula *bicirrhoſa*. Schumacher l. c.

*5. SERIANA *ſpectabilis*.

S. capſularum alis poſtice dilatatis, foliis biternatis, foliolis obovatis terminalibus retuſis, petiolis alatis. *Schumacher. Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 4.

Anſehnliche Seriane. W.

Habitat in America. ♄

Racemi *ſubſimplices bicirrhoſi*. Schumacher l. c. Foliola *integerrima, lateralia acuta, terminale emarginatum*. W.

6. SERIANA *mexicana*. †

S. foliis biternatis, foliolis obovatis integerrimis omnibus emarginatis, petiolis alatis, racemis compoſitis. W.

Paullinia (*mexicana*) foliis biternatis, petiolis marginatis, foliolis ovatis integris. *Sp. pl.* 525. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 124. *t.* 11. *f.* 3.

Paullinia foliis ternato-decompoſitis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 152.

Quauhomecatl. *Hern. mex.* 289.

Mexicaniſche Seriane. W.

Habitat in Mexico. ♄

Specimen herbarii Linnaeani depinxit Clariſſ. Schumacher, ſed fructibus carebat, hinc dubii generis planta. W.

*7. **SERIANA** *anguſtifolia.* W.

S. foliis biternatis, foliolis lineari-lanceolatis integerrimis acutis, petiolis alatis. W.

Paullinia mexicana. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 11. *t.* 61. *f.* 5.

Seriana ſcandens enneaphylla et racemoſa, *Plum. gen.* 34. *ic.* 113. *f.* 1.

Schmalblättrige Seriane. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

Perperam conjunxit Linnaeus hanc cum praecedente, a qua diſtinctiſſima videtur: foliolis *lineari-lanceolatis acutis, nec obovatis emarginatis,* petiolis *articulate alatis,* racemis *ſimplicibus.* W.

*8. **SERIANA** *lupulina.*

S. alis capſularum ſemiovalibus, foliis biternatis crenatis ſubtus ferrugineis, foliolis terminalibus ſubrhombeis lateralibus ovatis, petiolis ſubalatis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 127. *t.* 12. *f.* 5.

Hopfenartige Seriane. W.

Habitat in America. ♄

Racemi *ſubſimplices longitudine foliorum bicirrhoſi.* Schumacher l. c.

*9. **SERIANA** *lucida.*

S. alis capſularum ſemiovalibus, foliis biternatis, foliolis ovatis acutis ſerratis petiolis ſubnudis. *Schumacher Act. Hiſt. Nat. Haf.* 3. *p.* 2. *p.* 128.

Glänzende Seriane. W.

Habitat in inſula St. Crucis. ♄ (v. ſ.)

Folia *apice lucida.* Flores *racemoſo-paniculati.* Panicula *bicirrhoſa.* Schumacher l. c.

10. **SERIANA** *triternata.*

S. foliis triternatis, foliolis ovatis obtuſis repandis, petiolis alatis, racemis paniculatis. W.

Paullinia (*triternata*) foliis triternatis, petiolis marginatis. *Mant.* 236. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 11. *t.* 62. *f.* 11? *Iacq. amer.* 110. *t.* 180. *f.* 32?

Seriana fruteſcens polyphylla et racemoſa. *Plum. gen.* 34. *ic.* 112.

Cordis-indi folio et facie fruteſcens portoricenſis. *Pluk. alm.* 120. *t.* 168. *f.* 5.

Dreymalgedreyte Seriane. W.
Habitat in America. ♄

789. CARDIOSPERMUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 680.

Cal. 4-phyllus. *Pet.* 4. *Nectar.* 4-phyllum, inaequale. *Capſ.* 3, connatae, inflatae.

1. CARDIOSPERMUM *Halicacabum.*

C. caule, petiolis, foliolisque inciſo-dentatis glabris. W.
C. foliis laevibus. *Hort. cliff.* 150. *Hort. upſ.* 97. *Fl. zeyl.* 142. *Roy. lugdb.* 464. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 2. *n.* 11.
C. foliis ternato-ternatis acuminatis ſerratis. *Brown. jam.* 213.
Piſum veſicarium, fructu nigro, alba macula notato. *Bauh. pin.* 743. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 238.
Halicacabum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 60. *t.* 24. *f.* 2.
Halicacabus peregrinus. *Dod. pempt.* 455.
β. Corindum ampliore folio, fructu maximo. *Tournef. inſt.* 431.
γ. Corindum fructu et folio minori. *Tournef. inſt.* 431. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 461.
Glatter Herzſame. W.
Habitat in Indiis. ☉ (v. v.)

2. CARDIOSPERMUM *hirſutum.* W.

C. caule petiolisque hirſutis, foliolis dentatis glabris. W.
Behaarter Herzſame. W.
Habitat in Guinea. (v. ſ.)

Caulis *quadripedalis et ultra ſcandens, profunde ſulcatus denſe hirſutus.* Folia *alterna petiolata biternata, foliolis ovatis acuminatis uncias duas et dimidiam longis, ſesquiunciam latis, ſimpliciter et groſſe dentatis, utrinque glabris venoſis; axillis venarum ſubtus pubeſcentibus.* Petiolus *fere triuncialis ſulcatus hirſutus, partialis uncialis vel ſesquiuncialis ſemiteres glaber vel pilis rariſſime obſitus.* Pedicelli *teretes trilineares glabri.* Pedunculi *ſemipedales ſulcati glabri, ut in praecedente.* Flores *praecedentis ſed paulo majores.* Fructum *non vidi.* W.

Simile C. Halicacabo ſed triplo majus, differt: caule *et* pedunculis *communibus hirſutis,* foliolis *ovatis ſimpliciter dentatis, nec inciſo-dentatis,* axillis *venarum*

ſubtus pubeſcentibus. A C. Corindo foliis *acuminatis ſubtus glabris diſtinctum.* W.

3. CARDIOSPERMUM *Corindum.*
C. foliis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 526.
C. villoſum, foliis inciſis obtuſis, petiolis brevibus. *Mill. dict. n.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 462.
Braſilianiſcher Herzſame. W.
Habitat in Braſilia. ⊙
Similis C. Halicacabo, ſed capſulae et Folia ſubtus tomentoſa. Pedunculi inter cirrhos 10 *ſ.* 11 *floribus, a caſu fructificationum perſiſtentes, rigidi. Capſulae arctiores.*

*4. CARDIOSPERMUM *grandiflorum.*
C. foliis pubeſcentibus, capſulis acuminatis maximis. *Swartz. prod.* 64. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 698.*
Groſsblütiger Herzſame. W.
Habitat in fruticetis ſepibusque Jamaicae. ♄
Diſtinguitur a C. Corindo: foliis *magis acuminatis nec baſi ſubcordatis,* floribus *et* fructibus 3 *ſ.* 4-*plo majoribus,* capſulis *acuminatioribus.* Swartz l. c.

790. SAPINDUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 681.

Cal. 4-phyllus. *Pet.* 4. *Capſ.* carnoſae, connatae, ventricoſae.

1. SAPINDUS *Saponaria.*
S. inermis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, rachi alata. *Ait. Kew.* 2. *p.* 35.
S. foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Mat. med. p.* 105. *Mill. dict. n.* 1.
Sapindus. *Hort. cliff.* 152. *Roy. lugdb.* 464.
S. foliis oblongis vix petiolatis per coſtam ample alatam. *Brown. jam.* 206.
Prunifera racemoſa, folio alato coſta media membranulis utrinque exſtantibus donata. *Sloan. jam.* 184. *hiſt.* 2. *p.* 131.
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 498.
Gemeiner Seifenbaum. W.

Habitat in America *calidiori.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*2. SAPINDUS *longifolius.*

S. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis glabris, unico terminali, rachi ſimplici. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 53.*

Langblättriger Seifenbaum. W.

Habitat in India *orientali?* ♄

3. SAPINDUS *ſpinoſus.*

S. foliis abrupte pinnatis, caule ſpinoſiſſimo. *Sp. pl.* 526.

S. fruticoſus, caudice et ramis ſpinoſiſſimis, foliis ovatis pinnatis *Brown. jam.* 207. *t.* 20. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 501.

Dorniger Seifenbaum. W.

Habitat in Jamaica. ♄

4. SAPINDUS *laurifolius.*

S. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis attenuatis glabris, rachi ſimplici, petalis margine tomentoſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 54.*

S. (*trifoliatus*) foliis ternatis. *Fl. zeyl.* 603.

Poerinſii ſ. Vercoepoelongi. *Rheed. mal.* 4. *p.* 43. *t.* 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 503.

Lorbeerblättriger Seifenbaum. W.

Habitat in Malabaria. ♄

*5. SAPINDUS *emarginatus.*

S. foliis pinnatis, foliolis oblongis emarginatis ſubtus villoſis, rachi ſimplici, petalis margine tomentoſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 54.*

Ausgerandeter Seifenbaum. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

*6. SAPINDUS *rubiginoſus.*

S. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus villoſis, rachi ſimplici, petalis glabris. W.

Sapindus rubiginoſa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 44. *t.* 62.*

Roſtfarbiger Seifenbaum. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Differt a praecedente: foliis *quinquejugis, longioribus acutis,* (*nec trijugis emarginatis*), panicula *e paucis racemis compoſita divaricata, nec ſupradecompoſita coarctata,* petaliſque *glabris.* W.

*7. SAPINDUS *tetraphyllus.*

S. foliis pinnatis, foliolis lanceolato-oblongis glabris, rachi ſimplici, racemis ſubſimplicibus, petalis glabris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 54.*

Vierblättriger Seifenbaum. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Racemi *plures ex eodem puncto ſimplices, baſi ramo uno alterove digitales.* Vahl. l. c.

*8. SAPINDUS *rigidus.*
S. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis, rachi ſimplici, corollis fructibusque glabris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 55.
S. inermis, foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis, rachi ſimplici. *Ait. Kew.* 2. *p.* 36. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 341. *t.* 70. *f.* 3. *Mill. dict.*
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7.
Eſchenblättriger Seifenbaum. W.
Habitat in America. ♄
Racemus *ſupradecompoſitus pedalis, ramis ramulisque patentibus.* Vahl. l. c.

9. SAPINDUS *arboreſcens.* †
S. foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, panicula axillari ſimplici. W.
S. fructu parvo rubro. *Aubl. guj.* 1. *p.* 357. *t.* 139. *
Kleinfrüchtiger Seifenbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄
Folia *trijuga.* W.

*10. SAPINDUS *fruteſcens.* †
S. foliis pinnatis, foliolis alternis lanceolatis acuminatis glabris, panicula axillari ſimplici. W.
S. foliis pinnatis, fructu coccineo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 355. *t.* 138. *
Strauchartiger Seifenbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄
Folia *ſeptemjuga.* W.

*791. PONAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 682.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* trilocularis trialata; loculis monoſpermis.

*1. PONAEA *ſaponarioides.* W.
Toulicia gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 359. *t.* 140. *
Seifenbaumartige Ponäa. W.
Habitat in interioribus ſylvis Gujanae. ♄
Arbor *mediocris.* Folia *alterna abrupte pinnata* octo-

juga, foliolis oblongis acutis ſeſſilibus integerrimis venoſis glabris. Racemi *paniculati terminales.* W.

TETRAGYNIA.

*792. VEREA.

Andrews repoſ. bot. 21.

Cal. 4-phyll. *Cor.* hypocrateriformis 4-fida, tubo ventricoſo. *Squamae nectarif.* 4 ad baſin germinum. *Capſulae* 4 ſuperae 1-loculares polyſpermae.

*1. VEREA *crenata.*

V. (*crenata*) foliis oppoſitis patentibus, racemis longiſſimis laxis, floribus luteis. *Andrews repoſit. bot. p.* 21. *t.* 21. *

Gekerbte Verea. W.

Habitat in Sierra Leone. ♄

Planta *fruticoſa quadripedalis ſucculenta.* Folia *ampla oppoſita oblonga baſi in petiolum attenuata, obtuſa, repanda, groſſe crenata carnoſa avenia.* Racemi *terminales et in axillis foliorum ſub apice caulis, ſimplices.* Corollae *flavae fauce rubicundae.* W.

793. PARIS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 685.

Cal. 4-phyllus. *Pet.* 4, anguſtiora. *Bacca* 4-locularis.

1. PARIS *quadrifolia.*

P. foliis quaternis. *Fl. lapp.* 155. *Fl. ſuec.* 325, 346. *Hort. cliff.* 153. *Roy. lugdb.* 461. *Hall. helv. n.* 1006. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 176. *Willich. illuſtr. n.* 35. *Scop. carn. n.* 472. *Pollich. pal. n.* 389. *Blackw. t.* 286. *Flor. dan. t.* 139. *Kniph. cent.* 12. *n.* 73. *Hoffm. germ.* 140. *Roth. germ. I.* 175. *II.* 457.

Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.

Herba Paris. *Matth.* 1193. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 613. R.

Aconitum ſalutiferum. *Tabern. hiſt.* 720.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 9. *p.* 463.

Vierblättrige Einbeere. W.
Habitat in Europae *nemoribus.* ♃ (v. v.)
Foliis 3, 4, 5, *etiam* 6 *variat. Haller.*

794. ADOXA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 684.

Cal. 2-fidus, inferus. *Cor.* 4-ſ. 5-fida, ſupera. *Bacca* 4-ſ. 5-locularis, calyce coalita.

1. ADOXA *Moſchatellina.*
Adoxa. *Hort. cliff.* 152. *Fl. ſuec.* 326, 347. *Roy lugdb.* 252. *Oed. dan. t.* 9. *Gunn. norv. n.* 616. *Pollich. pal. n.* 390. *Kniph. cent.* 8. *n.* 3. *Sabb. hort.* 2. *t.* 69. *Hoffm. germ.* 140. *Roth. germ. I.* 176. *II.* 459.
Moſchatellina. *Hall. helv. n.* 1005.
Moſchatella. *Cord. hiſt.* 172.
Ranunculus nemoroſus Moſchatellina dictus. *Bauh. pin.* 178.
Fumaria bulboſa ſ. tuberoſa minima. *Tabern. ic.* 39.
Minimus Ranunculus ſeptentrionalium, herbide muſcoſo flore. *Lob.* 674.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 465.
Gemeines Biſamkraut. W.
Habitat in Europae *nemoribus.* ♃ (v. v.)
Huc relata ſecundum florem terminalem ex principiis Phil. bot. 178.

795. ELATINE.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 685.

Cal. 4-phyllus. *Pet.* 4. *Capſ.* 4-locularis, 4-valvis, depreſſa.

1. ELATINE *Hydropiper.*
E. foliis oppoſitis. *Fl. lapp.* 156. *Fl. ſuec.* 327, 348. *Gron. virg.* 158. *Roy. lugdb.* 452. *Flor. dan. t.* 156. *Roth. germ. I.* 175. *II.* 458.
E. foliis conjugatis. *Hall. helv. n.* 858.
α. E. (*Hydropiper*) foliis oppoſitis, floribus alternis. *Hoffm. germ.* 140. *Schkuhr bot. Handb. t.* 109.
Hydropiper. *Buxb. cent.* 3. *p.* 35. *t.* 37. *f.* 3.
Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore albo tetrapetalo. *Vaill. pariſ.* 5. *t.* 2. *f.* 2.

ſ. E. (*triandra*) foliis et floribus oppoſitis. *Hoffm. germ.* 140. *Schkuhr bot. Handb. t.* 109.
Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore roſeo tripetalo. *Vaill. pariſ.* 5. *t.* 2. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 467.
Paarblättriger Waſſerpfeffer. W.
Habitat in Europae *inundatis.* ⊙ (v. ſ.)

2. ELATINE *Alſinaſtrum.*
E. foliis verticillatis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 349. *Roy. lugdb.* 452. *Sauv. monſp.* 164. *Boehm. lipſ.* 127. *Hall. helv. n.* 857. *Roth. germ. I.* 176. *II.* 458.
E. foliis emerſis linearibus, immerſis capillaceis. *Sauv. act. monſp.* 1743. *p.* 50.
Potamopitys. *Buxb. act. petrop. t.* 1. *f.* 6.
Ericoides facie pinaſtellae. *Rupp. jen.* 90? *Buxb. hall. p.* 105.
Equiſetum paluſtre, linariae ſcopariae folio. *Bauh. pin.* 15.
Alſinaſtrum galii folio. *Vaill. pariſ.* 6. *t.* 1. *f.* 6.
Alſinaſtrum gratiolae folio. *Tournef. inſt.* 244. *Raj. ſuppl.* 502.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 468.
Wirtelblättriger Waſſerpfeffer. W.
Habitat Aboae, Lipſiae, Pariſiis, Monſpelii, *in* Helvetia *in foſſis.* (v. ſ.)

796. HALORAGIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 686.

Cal. 4-phyllus ſuperus. *Pet.* 4. *Drupa* ſicca. *Nux* 4-locularis.

1. HALORAGIS *Cercodia.*
H. foliis ſerratis floribus verticillatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 37. *Medicus obſ. bot.* 1783. *p.* 73.
H. (*Tetragonia*) foliis lanceolatis inciſis, fructibus tetragonis. *l'Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 82.
H. (*alata*) fructu quadrialato. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 69. *Miſc.* 2. *p.* 332. *
H. (*alata*) foliis ovato-lanceolatis, fructibus pyramidatis tetragonis alatis. *Forſt. prod. n.* 180.
Cercodia erecta. *Murray comment. goett.* 1780. *p.* 3. *t.* 1. *

Tetragonia (*ivaefolia*) erecta glabra, foliis petiolatis ovato-lanceolatis ſerratis, petalis deciduis. *Lin. ſuppl.* 257.
Sägeblättriges Meerträublein. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄ (v. v.)

Suffrutex *bipedalis ramoſus paniculatus erectus.* Caulis *tetragonus, angulis elevatis rotundatis ſcabris, ruber.* Rami *oppoſiti.* Folia *oppoſita petiolata horizontalia ovato-lanceolata inaequaliter ſerrata, ſerraturis pungentibus ſcabra plana venoſa pollicaria.* Petioli *foliis triplo breviores ſemiteretes canaliculati.* Stipulae *nullae.* Flores *in ſummitate ramorum axillares terni pedunculati parvi viridi-rubicundi.* Pedunculi *breves teretes ſcabri, poſt floreſcentiam reflectuntur infra folia.*

2. HALORAGIS *proſtrata.*

H. foliis integerrimis, floribus ſolitariis axillaribus. W.
H. (*proſtrata*) foliis oblongis integerrimis mucronatis, fructibus globoſis. *Forſt. prod. n.* 179.
H. (*proſtrata*) foliis lanceolatis integris, fructibus globoſis. *l'Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 82.
Haloragis proſtrata. *Lin. ſuppl.* 229.
Liegendes Meerträublein. W.
Habitat in Botanices *inſula, in* Nova Caledonia, *inque* Pinorum *inſula.* ♄

Rami *tetragoni glabri.* Folia *oppoſita, ſeſſilia oblonga, baſi attenuata in inſertionem, undulata glabra.* Fructus *globoſi axillares ſolitarii pedicellati. Primo habitu fructu maturo referebat Ammanniam latifoliam ut fere juraſſem illam.*

797. FORSKOLEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 678.

Cal. 4-phyllus corolla longior. *Pet.* 8, ſpathulata. *Pericarp.* nullum. *Sem.* 4 lana connexa.

1. FORSKOLEA *tenaciſſima.*

F. piloſo-hiſpida, foliis ellipticis muticis laciniis calycinis oblongo-lanceolatis acutis. *Ait. Kew.* 2, *p.* 121.
F. foliis ovatis ſerratis. *Lin. ſuppl.* 245.
Forſkoelea tenaciſſima. *Mant.* 72. *Lin. faſc.* 1. *t.* 1. *Jacq. hort.* 1. *p.* 18. *t.* 48. *Giſecke ic. faſc.* 1. *n.* 10.

Caidbeja adhaerens. *Forſk. deſcr.* 82.
Chamaedrifolia tomentoſa muſcatenſis. *Pluk. alm.* 97. *t.* 275. *f.* 6. *Shaw. afr.* 133.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 689.
Eyförmige Forſkolea. W.
Habitat in Aegypto. ⊙ (v. v.)

Caulis *bipedalis paniculatus teres hiſpidus ruber.* Ramis *alternis.* Folia *alterna petiolata ovata lineata ſerrata, ſerraturis* 5 *ſ.* 6, *hiſpida, hiſpiditate ſuperioris paginae hamata.* Petioli *teretes foliis breviores.* Flores *axillares gemini ſeſſiles hirti decidui maturo fructu.*

2. FORSKOLEA *candida.*

F. ſcabra, foliis ellipticis undulatis muticis, laciniis calycinis ovatis obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 122.
F. (*candida*) foliis dentatis. *Lin. ſuppl.* 245.
F. (*candida*) foliis ovatis dentatis. *Thunb. prod.* 77.
F. (*ſcabra*) foliis ovato-lanceolatis dentatis ſcabris ſubtus albidis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 31. *
Weiſsblättrige Forſkolea. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Caulis *ſuffruticoſus laevis ſimilis F. tenaciſſimae.* Folia *ovalia petiolata alterna tribus ſ. quatuor angulis ſ. dentibus utrinque, F. tenaciſſimae multo minora, ſubtus niveo-tomentoſa, ſupra ſcabritie adhaerentia ut in F. tenaciſſima.* Flores *axillares ſeſſiles, ſimiles F. tenaciſſimae ſed minores.* Petala *alba.*

*3. FORSKOLEA *anguſtifolia.*

F. ſtrigoſa, foliis lanceolatis, dentibus ſpinoſo-ſetaceis, laciniis calycinis lanceolato-ſubulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 122.
F. foliis lanceolatis octodentatis ciliato-ſpinuloſis, ſubtus nudis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 31. *
F. foliis lanceolatis dentatis ſinuatis. *Murr. comment. goett.* 1784. *p.* 24. *t.* 2. *
Schmalblättrige Forſkolea. W.
Habitat in inſula Teneriffa. ⊙ (v. v.)

Claſſis IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

798. LAURUS. *Cal.* o. *Cor.* 6 - petala, calycina. *Bacca* 1 - ſperma. *Nectarii* glandulae biſetae.

800. PANKE. *Cal.* 4 - fidus. *Cor.* 4 - fida. *Capſ.* monoſperma.

799. ANACARDIUM. *Cal.* 5 - partitus. *Cor.* 5 - petala. *Stamine* decimo caſtrato. *Nux* receptaculo carnoſo.

801. PLEGORHIZA. *Cal.* o. *Cor.* 1 - petala. *Capſ.* 1 - locul. 1 - ſperma.

802. CASSYTA. *Cal.* o. *Cor.* 6 - partita, calycina. *Bacca* 1 - ſperma. *Nectarii* glandulae truncatae.

† *Anacardium ſtamine decimo caſtrato. Amyris enneandra. Brownaea enneandra. Gardenia Thunbergia.*

TRIGYNIA.

803. RHEUM. *Cal.* o. *Cor.* 6 - fida. *Sem.* 1, *triquetrum.*

HEXAGYNIA.

804. BUTOMUS. *Cal.* o. *Cor.* 6 - petala. *Capſ.* 6, polyſpermae.

M O N O G Y N I A.

798. L A U R U S.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 688.

Cal. 0. *Cor.* calycina, 6-partita. *Nectarium* glandulis tribus, biſetis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Drupa* 1-ſperma.

1. LAURUS *Cinnamomum.*

L. foliis trinerviis ovato-oblongis, nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Fl. zeyl.* 145. * *Mat. med. p.* 106. *Mill. dict. n.* 11. *Iacq. amer.* 117. *Blackw. t.* 354.
L. foliis oblongo-ovatis nitidis planis. *Hort. cliff.* 154.
Cinnamomum foliis latis ovatis, frugiferum. *Burm. zeyl.* 62. *t.* 27.
Cinnamomum ſ. Canella zeylanica. *Bauh. pin.* 408.
Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655. *Burm. ind.* 91.

β. Katou-Karva. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53. R. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 505. *t.* 8. *f. B.*
Zimmt Lorbeer. W.
Habitat in Zeylona, *in* America *ad montem* Calebaſſe *Martinicae.* ♄ *Iacq.* (v. ſ.)
Dioica enneandra.

2. LAURUS *Caſſia.*

L. floribus triplinerviis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 146. *Mat. med.* 107.
Cinnamomum perpetuo florens, folio tenuiore acuto. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
Laurus Canella. *Mill. dict. n.* 12.
Caſſia lignea. *Blackw. t.* 319.
Caſſia malabarica. *Herm. lugdb.* 130.
Caſſia cinnamomea, myrrhae odore, folio trinervi ſubtus caeſio. *Plukn. alm.* 89.
Cinnamomum ſ. Canella malabarica ſ. javanenſis. *Bauh. pin.* 409.
Carna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 59. *Burm. ind.* 91.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 514.
Caſſien Lorbeer. W.
Habitat in Malabaria, Sumatra, Iava. ♄

3. LAURUS *Camphora.*

L. foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Mat. med. p.* 107. *Mill. dict. n.* 9. *Fabric. helmſt.* 400. *Iacq. Collect.* 4. *p.* 221. *t.* 3. *f.* 2.* *Thunb. jap.* 173.*

L. foliis ovatis utrinque acuminatis trinerviis nitidis, petiolis laxis. *Hort. cliff.* 154.

L. Camphorifera. *Kaempf. amoen.* 770. *t.* 771.

Camphora officinarum. *Bauh. pin.* 500. *Blackw. t.* 347.

Arbor camphorifera japonica. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 16. *ic.* 16. *t.* 2. *Comm. hort.* 1. *p.* 185. *t.* 59.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 517.

Campfer Lorbeer. W.

Habitat in Japonia. ♄ (v. ſ.)

4. LAURUS *Culilaban.* †

L. foliis triplinerviis oppoſitis. *Mant.* 237. *Mat. med. p.* 108.

Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. *p.* 65. *t.* 14.

Coelit Lawan. *E. N. C. dec.* 2. *ann.* 3. *p.* 53.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 521.

Culilaban Lorbeer. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Obſ. *Cum ſit prorſus ſingulare, dari in Lauri genere folia oppoſita, mereretur ejus fructificatio acutius examinari. Fide Rumphii receptum genus.*

*5. LAURUS *montana.*

L. foliis triplinerviis ovato-acuminatis perennantibus, floribus racemoſo-paniculatis. *Swartz. prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 700.*

Berg Lorbeer. W.

Habitat in altis montibus Jamaicae *auſtralis.* ♄ (v. ſ.)

Habitu L. Camphorae ſimillima, ſed folia craſſiora nec glauca. Swartz l. c.

6. LAURUS *Chloroxylon.*

L. foliis trinerviis ovatis coriaceis: nervis apicem attingentibus. *Sp. pl.* 508.

Chloroxylon foliis ovatis glabris rigidis trinerviis, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 187. *t.* 7. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 524.

Grünholziger Lorbeer. W.

Habitat in Jamaica. ♄

*7. LAURUS *glauca.*

L. foliis nervoſis lanceolatis perennantibus, ramulis tuberculatis, floribus ſolitariis. *Thunb. jap.* 173.*

Tſons. *Kaempf. amoen.* 770.
Graugrüner Lorbeer. W.
Habitat in Japonia. ♄
Folia *lanceolata acuminata, acumine obtuſo, integerrima, margine reflexo, ſupra pallide viridia, ſubtus glauca vel lutea glabra bipollicaria vel ultra.* Flores *in ramulis infra folia ſparſi ſolitarii pedunculati.* Pedunculi *breviſſimi uniflori vel bifidi craſſi cinerei ſemilineam longi.* Drupa *ovata parum attenuata obtuſa coeruleo-atra ſucculenta glabra magnitudine piſi, ſucco coeruleo.* Nux *figura drupae ſtriata ferruginea unilocularis.* Oleum *fructuum expreſſum pro fundendis candelis inſervit.* Thunb. l. c.

*8. LAURUS *pedunculata.*

L. foliis nervoſis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Thunb. jap.* 174.
Einblütiger Lorbeer. W.
Habitat in Japonia. ♄
Caulis *fruticoſus.* Rami *teretes a caſu foliorum nodulosi cinerei rugoſi glabri.* Folia *oppoſita breviter petiolata oblonga acuminata nervoſa integerrima glabra bipollicaria.* Flores *verſus apicem ramulorum ſparſi pedunculati.* Pedunculi *ſolitarii uniflori longitudine dimidia foliorum.* Thunb. l. c.

*9. LAURUS *cauſtica.* †

L. foliis ovalibus rugoſis perennantibus, floribus quadrifidis. *Molina chil. ed. germ. p.* 151. *
Llithi. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 30. *t.* 23.
Aezender Lorbeer. W.
Habitat in Chili. ♄
Arbor *venenata.* Folia *reticulato-venoſa.* W.

10. LAURUS *nobilis.*

L. foliis lanceolatis venoſis perennantibus, floribus quadrifidis, dioicis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upſ.* 98. *Mat. med.* 107. *Roy. lugdb.* 98. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn.* 474. *Blackw. t.* 175. *femina.*
L. foliis ovato-lanceolatis, ramis floriferis folio brevioribus. *Hall. helv. n.* 1602.
L. vulgaris. *Bauh. pin.* 460.
Laurus. *Cam. epit.* 60. *Tournef. inſt.* 597. *Dod. pempt.* 849. *Raj. hiſt.* 2. 1688.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 524.
Gemeiner Lorbeer. W.

Habitat in Italia, Graecia. ♄ (v. v.)

Stamina *numero variant*, flore plano *etiam ludit*. R.

11. LAURUS *indica*.

L. foliis venoſis lanceolatis perennantibus planis, ramumulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 159. *Mill. dict. n.* 4. *Fabric. helmſt. p.* 400. *Wendl. obſ. bot. p.* 21. *t.* 3. *f.* 22. *

L. indica. *Pluk. alm.* 210. *t.* 304. *f.* 1. *Ald. farn.* 61.

L. latifolia indica. *Barr. car.* 123. *t.* 877.

Cinnamomum ſylveſtre americanum. *Seb. theſ.* 2. *p.* 90. *t.* 84. *f.* 6.

Laurus indica Aldini. *Raj. hiſt.* 2. *p.* 1553. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 526.

Madera Lorbeer. W.

Habitat in Madera. ♄ (v. v.)

*12. LAURUS *foetens*.

L. foliis venoſis ellipticis acutis perennantibus, axillis venarum ſubtus villoſis, racemis elongatis compoſitis paniculaeformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 39.

Stinkender Lorbeer. W.

Habitat in inſulis Canariis, *inque* Madera. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

13. LAURUS *Perſea*.

L. foliis ovatis coriaceis tranſverſe venoſis perennantibus, floribus corymboſis. *Iacqu. obſ.* 1. *p.* 37. *Swartz obſ.* 152.*

L. foliis oblongo-ovatis, fructu obovato, pericarpio butyraceo. *Brown. jam.* 214.

Perſea. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 2. *Plum. gen.* 44. *t.* 20. *Mill. dict. n.* 11.

Perſea americana. *Bauh. pin.* 441.

Pyro ſimilis fructus in nova hiſpania, nucleo magno. *Bauh. pin.* 439.

Prunifera arbor fructu maximo pyriformi viridi, pericarpio eſculento butyraceo nucleum unicum maximum nullo oſſiculo tectum cingente. *Sloan. jam.* 132. *hiſt.* 2. *p.* 132. *t.* 222. *f.* 2. *Raj. dendr.* 48.

Arbor americana, ampliſſimis pergamenis foliis ſuperficie nitidiſſima, fructu pyriformi cruſtaceo cortice coriato. *Pluk. alm.* 39. *t.* 267. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 528.

Advagto Lorbeer. W.

Habitat in America *calida*. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Stamina *huic* 6. *Miller*; Fructus *gratiſſimus*. *Introducta in hortum Farneſii* 1620.

14. LAURUS *Borbonia.*
L. foliis lanceolatis perennantibus, calycibus fructus baccatis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226. *Fabric. helmſt.* 389.
L. foliis lanceolatis perennantibus, marginibus reflexis, transverſe venoſis, floribus racemoſis. *Mill. dict.* 5.
L. caroliníenſis, foliis acuminatis, baccis coeruleis, pedicellis longis rubris inſidentibus. *Catesb. car.* 1. *p.* 63. *t.* 63. *Seligm. aves. ic.* 60.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 532.
Rother Lorbeer. W.
Habitat in Carolina, Virginia. ♄ (v. v. ſ. fl.)
Stamina 5; *antheris fuſcis.* Germen *globoſum.* Stylus *brevis.* Stigma *tuberculatum.* Baccae *purpureae.* Pedunculi *longi rubri. Fabric. helmſt.* 389.
Mihi *vero viſa:* Cal. 3-*phyllus, breviſſimus.* Petala 3, *lanceolata.* Stamina 9: *tribus interioribus utrinque glandula ad baſin.* Antherae *utroque latere polliniferae et apice bivalves introrſum deorſum. Staminis decimi rudimentum.* Stylus *ſtigmate craſſinsculo.*

*15. LAURUS *martinicenſis.* †
L. foliis oblongis acuminatis coriaceis perennantibus planis, racemis paniculatis, pedunculis calycibusque tomentoſis. W.
L. foliis oblongis acuminatis venoſis planis, racemis paniculatis. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 109. *t.* 5. *f.* 2.*
Martiniquer Lorbeer. W.
Habitat in ſylvis Martinicae. ♄
Diverſa a ſequenti, ſed ad L. coriaceam accedere videtur. W.

*16. LAURUS *exaltata.*
L. foliis lanceolato-ovatis ſubcoriaceis perennantibus planis, floribus racemoſo-corymboſis, fructu calyce urceolato glabro ſemitecto. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 702.*
Hoher Lorbeer. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae *occidentalis.* ♄

*17. LAURUS *alpigena.*
L. foliis ovatis obtuſis convexiuſculis coriaceis, ſubtus venoſis glaucescentibus, racemis erectis folio longioribus. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 704.*
Gebirgs Lorbeer. W.
Habitat in ſummis montibus Jamaicae *auſtralis.* ♄

A caeteris dignoſcenda: foliis *fere minoribus, magis ovatis obtuſis ſubtus glauco-pubeſcentibus,* racemis *erectis paucifloris.* Swartz l. c.

*18. LAURUS *triandra.*

L. foliis lanceolato-ovatis acuminatis membranaceis planis, floribus triandris, fructu calyce fere tecto. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 706. *

Dreyfädiger Lorbeer. W.

Habitat rarius in montibus Jamaicae *occidentalis.* ♄

Diſtinctiſſima ab omnibus floribus *triandris et* figura *fructus.* Flores *numeroſi decidunt ſteriles, antheris tantum praediti absque piſtillo.* Swartz l. c.

*19. LAURUS *ſanguinea.*

L. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, ſubtus venoſo-reticulatis, racemis terminalibus lateralibusve erectis folio brevioribus, calyce turbinato fructum baſi cingente. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 707.

Nectandra (*ſanguinea*) caule diffuſo, foliis alternis lanceolatis, antheris quaternis collateralibus. *Rottb. pl. ſurin.* 10. *

Blutfarbener Lorbeer. W.

Habitat Surinami. ♄

*20. LAURUS *ſurinamenſis.*

L. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, ramis patentiſſimis, racemis filiformibus lateralibus axillaribusve. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 708.

Nectandra (*bijuga*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis filiformibus, floribus polygamis, antheris bijugis. *Rottb. pl. ſurinam. p.* 10. *

Ocotea gujanenſis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 781. *t.* 310. *

Poroſtema. *Schreb. gen. pl. n.* 1226.

Surinamiſcher Lorbeer. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*21. LAURUS *hexandra.*

L. foliis lanceolatis, racemis axillaribus, floribus hexandris. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 708.

Ajovea gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 311. *t.* 120. *

Douglaſſia. *Schreb. gen. pl. n.* 1761.

Sechsfädiger Lorbeer. W.

Habitat in ſylvis interioribus Gujanae. ♄

*22. LAURUS *ſalicifolia.*

L. foliis lanceolatis acuminatis planis perennantibus ce-

riaceis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 709. *
Weidenblättriger Lorbeer. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

*23. LAURUS *coriacea.*
L. foliis ovatis acuminatis planis reticulato-venoſis ſubcoriaceis, racemis erectis foliis brevioribus. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 710. *
Lederartiger Lorbeer. W.
Habitat in montibus frigidioribus Jamaicae. ♄

*24. LAURUS *Leucoxylon.*
L. foliis oblongo-lanceolatis planis perennantibus, racemis axillaribus folio brevioribus, calycibus fructiferis pedunculisque incraſſatis verrucoſis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 711. *
L. foliis venoſis ovatis, fructu majori, calycibus tumidis, laciniis reflexis. *Brown. jam.* 214?
Weiſsholziger Lorbeer. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae. ♄ (v. ſ.)
Calyce *tumido exalbido-verrucoſo, haec ſpecies valde notabilis.* Swartz l. c.

*25. LAURUS *membranacea.*
L. foliis oblongis acuminatis venoſis margine convexis coriaceo-membranaceis, racemis erectis folio brevioribus. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 713.
Häutiger Lorbeer. W.
Habitat in montibus excelſis Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄
L. Borboniae proxima, diverſa tamen: ramulis *ſtrictioribus*, foliis *minoribus erectis (nec declinatis ſubpendulis,) chartae inſtar membranaceis*, racemis *brevioribus minus ſubdiviſis erectis nec diffuſis.* Swartz l. c.

*26. LAURUS *patens.*
L. foliis oblongis utrinque acuminatis planis membranaceis, racemis erectis folio longioribus, ramisque patentibus diffuſis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 715. *
Ausgebreiteter Lorbeer. W.
Habitat in Jamaicae *montoſis.* ♄
Differt a praecedente: foliis *minime nitidis fuſco-viridibus*, ramis racemisque *folio longioribus patentibus.* Swarz l. c.

*27. LAURUS *parviflora.*
L. foliis oblongo ellipticis acuminatis planis membrana-

ceis, racemis terminalibus axillaribusve folio brevioribus erectis confertis ſubpaniculatis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 717.*
Kleinblütiger Lorbeer. W.
Habitat in montibus Jamaicae. ♄
Quoad figuram foliorum et racemorum L. Leucoxylo ſimillima, flores *vero in hac pedicellis longioribus, laciniis calycinis rotundatis concavis, nec acutis ſubreflexis.* Fructu *ſeu figura drupae, quam adhuc ignoramus, magis forte differunt,* Swartz l. c.

*28. LAURUS *pendula.*
L. foliis oblongis apice brevi attenuato venoſis membranaceis ſubtus glaucescentibus, racemis laxis, fructibus pendulis nudis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 719.*
L. foliis obverſe ovatis ſubtus cinereis, fructibus oblongis ſparſis, calycibus deciduis. *Brown. jam.* 214.
Hängender Lorbeer. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae *occidentalis.* ♄
Optime dignoſcitur: racemis *laxis fere deflexis,* fructu *nudo pendulo.* Swartz l. c.

*29. LAURUS *floribunda.* †
L. foliis ovato-lanceolatis planis membranaceis venoſis, racemis axillari-terminalibus folio longioribus paniculatis, pedunculis longiſſimis. *Swartz prod.* 65. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 721. *
Vielblütiger Lorbeer. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae *auſtralis.* ♄

*30. LAURUS *lucida.*
L. foliis oblongis ſerratis, ramulis ternis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Thunb. jap.* 174.*
Glänzender Lorbeer. W.
Habitat in Japonia. ♄

*31. LAURUS *umbellata.* †
L. foliis ovatis ſerratis, ramulis umbellatis, floribus racemoſis. *Thunb. jap.* 175.*
Doldentraubiger Lorbeer. W.
Habitat in Japonia. ♄

32. LAURUS *aeſtivalis.*
L. foliis venoſis oblongis acuminatis annuis, ſubtus rugoſis, ramis ſupra axillaribus. *Mill. dict. n.* 8.

L. foliis lanceolatis enervibus annuis. *Gron. virg.* 159.
L. foliis enervibus ovatis utrinque acutis. *Gron. virg.* 46.
Cornus foliis ſalicis laureae acuminatis, floribus albis, fructu ſaſſafras. *Catesb. car.* 2. *p.* 28. *t.* 28?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 533.
Sommer Lorbeer. W.
Habitat in Virginia *ad ripas rivulorum.* ♄

Pedunculi hujus fructiferi colorati ſunt. Mas 6-*andrus.* Mill.

33. LAURUS *Benzoin.*

L. foliis enerviis ovatis utrinque acutis integris annuis. *Hort. cliff.* 154. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 226. *Fabric. helmſt.* 401. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 354. *Mill. dict. n.* 6. *Willd. arb.* 165. *
Laurus aeſtivalis. *Wangh. amer.* 87.
Arbor virginiana citreae vel limonii folio, Benzoinum fundens. *Comm. hort.* 1. *p.* 189. *t.* 97.
Arbor virginiana, piſhaminis folio, baccata Benzoinum redolens. *Pluk. alm.* 42. *t.* 139. *f.* 3. 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 534.
Benzoin Lorbeer. W.
Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

34. LAURUS *Saſſafras.*

L. foliis integris trilobisque. *Hort. cliff.* 154. *Mat. med.* 108. *Gron. virg.* 46. *Roy. lugdb.* 227. *Cold. noveb.* 94. *Kalm. it.* 2. *p.* 270. 434. *Mill. dict. n.* 7. *Trew. ehret. t.* 59. 60. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 356. *Blackw. t.* 267. *Gieſeke. ic. faſc.* 1. *n.* 9.
Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Saſſafras dicta. *Pluk. alm.* 120. *t.* 222. *f.* 6. *Catesb. car.* 1. *p.* 55. *t.* 55. *Seligm. av. ic.* 2. *t.* 10.
Saſſafras arbor, ex florida, ficulneo folio. *Bauh. pin.* 431.
β. Cornus mas ſ. Saſſafras laurinis foliis indiviſis. *Pluk. amalth.* 66.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 535.
Saſſafras Lorbeer. W.
Habitat in Virginia, Carolina, Florida. ♄ (v. ſ.)

Mares 5-*petali*, 8-*andri*; Hermaphroditae 6-*andrae. Mill. Du Roi.*

799. ANACARDIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1582.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5, reflexa. *Antherae* 9, decimo caſtrato. *Nux* reniformis ſupra receptaculum carnoſum.

1. ANACARDIUM *occidentale.*

Anacardium. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *Mat. med.* 113. *Hort. upſ.* 102. *Roy. lugdb.* 463. *Brown. jam.* 227. *Mill. dict. Iacq. amer.* 124. *t.* 181. *f.* 35. *Blackw. t.* 369.
Anacardii alia ſpecies. *Bauh. pin.* 512.
Pomifera ſ. potius Prunifera indica, nuce reniformi. *Cateſb. car.* 3. *p.* 9. *t.* 9.
Acaiou. *Piſ. braſ.* 58. *mant.* 193.
Caſſuvium. *Rumph. amb.* 1. *p.* 177. *t.* 69.
Caſchon. *Mer. ſurin.* 16. *t.* 16.
Kapa-maua. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 539.
Weſtindiſcher Nierenbaum. W.
Habitat in Indiis. ♄ (v. ſ.)

Calyx *ſupra receptaculum carnoſum, pyriforme; infra Germen nucis, dorſo affixa. diſſ. alt. de ſurinam.* 1776. Filamenta *quidem* 10, *ſed unico caſtrato. E nuce, candelae admota, ignis luſorius Phyſicis.*

Eſt plana polygama dioica. Filamentum *longius in apertis floribus ſterile eſt, in clauſis vero* Antheram *gerit magnam, toroſam. Cetera Filamenta* Antheris *minoribus, effoetis, perſiſtentibus gaudent. Rottboell. in Coll. havn.* 2. *p.* 253. R.

*800. PANKE.

Molin. chil. ed. germ. 119.

Cal. 4-fidus. *Cor.* campanulata 4-fida. *Capſ.* 2-valvis monoſperma.

*1. PANKE *tinctoria.*

P. foliis quinquelobis petiolatis. W.
P. (*tinctoria*) caule erecto racemifero. *Molin. chil. ed. germ.* 120. *
Färber Panke. W.
Habitat in Chili *montoſis humidis.* ♃

Folia *quinqueloba ſerrata quinquenervia papilloſa tomentoſa pulpoſa perſiſtentia.* Petioli *teretes ſemipedales aculeati.* Racemus *terminalis.* Flores *pedunculati plurimi.* Molin. l. c.

*2. PANKE *ſonchifolia.* W.

P. foliis lyratis amplexicaulibus. W.
Llaupanke ampliſſimo Sonchi folio. *Feull. peruv.* 2. *p.* 44. *t.* 31. *
Gänſediſtelblättrige Panke. W.
Habitat in Chili *locis montoſis.* ♃

Caulis *tripedalis.* Folia *lyrata repanda denticulata utrinque tomentoſa reticulato-venoſa.* Racemus *terminalis ſimpliciſſimus.* W.

Panke acaulis Molinae ad Gunneram pertinet, ſecundum ſententiam Clariſſimi Iuſſieu gen. pl. ed. Uſt. p. 444. W.

*801. PLEGORHIZA.

Molin. chil. ed. germ. 140.

Cal. 0. *Cor.* monopetala. *Capſ.* 1-locul. 1-ſperma.

*1. PLEGORHIZA *adſtringens.* W.

Plegorhiza Guajcuru. *Molin. chil. ed. germ.* 140. *
Zuſammenziehende Wundwurzel. W.
Habitat in Chili *provinciis borealioribus.* ♄

Caulis *lignoſus.* Folia *radicalia in ceſpitem congeſta petiolata ovalia ſimplicia integra; ramea ſeſſilia ovata.* Flores *terminales pedunculati plurimi.* Corolla *monopetala integra.* Stamina *novem breviſſima.* Antherae *oblongae.* Germen *orbiculatum.* Stylus *cylindricus longitudine ſtaminum.* Stigma *ſimplex.* Capſula *oblonga compreſſiuſcula.* Semen *unicum oblongum ſubcompreſſum.* Mol. l. c.

802. CASSYTA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 690.

Cor. calycina 6-partita. *Nectarium* glandulis 3, truncatis, germen cingentibus. *Filamenta* interiora glandulifera. *Drupa* 1-ſperma.

1. CASSYTA *filiformis.*

C. filiformis laxa. *Oſb. it.* 243. * *Iacq. amer.* 115. *t.* 97. *Mill. dict.*
Volutella aphylla. *Forſk. deſc.* 84.

Cuſcuta altera ſ. major. *Camell. luz.* 1. *n.* 1. *Pet. gaz.* 77. *t.* 49. *f.* 12.
Cuſcuta baccifera barbadenſium. *Pluk. alm.* 126. *t.* 172. *f.* 2.
Cuſcuta. *Rumph. amb.* 5. *p.* 491. *t.* 184. *f.* 4.
Acatſia-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 83. *t.* 44. *Raj. ſuppl.* 551.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 469.
Fadenförmige Caſſyte. W.
Habitat in India. (v. ſ.)
Herba *Cuſcutae;* Fructificatio *Lauri.*

2. CASSYTA *corniculata.*
C. ramis lignoſis ſpinoſis. *Mant.* 277. *Burm. ind.* 93. *t.* 33. *f.* 1. †
Caſſutha cornea. *Rumph. amb.* 7. *p.* 56.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 471.
Stachliche Caſſyte. W.
Habitat in Celebis *montibus inter truncos putridos.* ♄
Rami *pedales, lignoſi, craſſitie digiti.* Spinae *ſolitariae, recurvae.* Folia *ſpinis minora, lanceolato-linearia.* Baccae *ſubſeſſiles.*
Propoſui hanc, ut autoptae accurate examinent fructificationem. Genus ex Burmanno mutuatum.

TRIGYNIA.

803. RHEUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 692.

Cal. o. *Cor.* 6-fida, perſiſtens. *Sem.* 1, triquetrum.

1. RHEUM *Rhaponticum.*
R. foliis obtuſis glabris, venis ſubtus piloſiuſculis, ſinu baſeos dilatato, petiolis ſupra ſulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 41.
R. foliis glabris, petiolis ſubſulcatis. *Mat. med. p.* 109. *Georgi. it.* 1. *p.* 210. *Pall. it.* 1. *p.* 380. *Knorr. del.* 2. *t. R. Sabb. hort.* 1. *t.* 34. *Regn. bot.*
R. foliis glabris. *Hort. upſ.* 98.
Rheum. *Hort. cliff.* 155.
R. foliis cordatis, ſpicis obtuſis. *Mill. dict. n.* 1.
Rhaponticum. *Alp. rhapont.* 1. *t.* 1.

Rhaponticum ſolio lapathi majoris glabro. *Bauh. pin.* 116.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 472.
Stumpfblättriger Rhabarber. W.
Habitat in Thracia, Scythia, Monte Aureo. ♃ (v. v.)
Petioli ſubtus ſulcati, quod non in ſequenti ſpecie.

2. RHEUM *undulatum.*

R. foliis ſubvilloſis undulatis, ſinu baſeos dilatato, petiolis ſupra planis margine acutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 41.
R. (*Rhabarbarum*) foliis ſubvilloſis, petiolis aequalibus. *Syſt. veg.* 385. *Pall. it.* 2. *p.* 559. *Regn. bot.*
R. (*undulatum*) foliis ſubvilloſis undulatis, petiolis aequalibus. *Spec. pl.* 531. *Amoen. acad.* 3. *p.* 212. *t.* 4. * *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 2. *n.* 68.
R. foliis ſubvilloſis. *Hort. upſ.* 98.
Rhabarbarum folio oblongo criſpo undulato, flabellis ſparſis. *Geoffr. mat.* 2. *p.* 125.
Rhabarbarum ſinenſe, folio criſpo, flagellis rarioribus et minoribus. *Amm. herb.* 206.
Rhabarbarum folio longiori hirſuto criſpo, florum thyrſo longiori et tenuiori. *Amm. ruth.* 9.
Acetoſa montana, folio cubitali oblongiore criſpo, floribus in ſubviridi luteolis, *Meſſerſchmidii. Amm. ruth.* 226.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 473. *t.* 50. *f.* 1.
Wellenblättriger Rhabarber. W.
Habitat in China, Sibiria. ♃ (v. v.)

3. RHEUM *palmatum.*

R. foliis palmatis acuminatis ſcabriuſculis, ſinu baſeos dilatato, petiolis ſupra obſolete ſulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 41.
R. foliis palmatis acuminatis. *Lin. faſc.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12. *Mat. med.* 109. *Med. in obſ. Soc. oecon. Lut.* 1771. *p.* 324. *Mill. dict. n.* 4. *Blackw. t.* 600. *a. b. Kniph. cent.* 12. *n.* 84. *Mill. illuſtr.*
Rhabarbe. *Brun. orient.* 192. *t.* 73.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 475. *t.* 50. *f.* 2.
Schlizblättriger Rhabarber. W.
Habitat in China *ad murum.* ♃ (v. v.)
Gemmae *obſcure rubrae.* Folia *ſeminalia ovalia et integra. Medic. l. c.*

4. RHEUM *compactum.*

R. foliis ſublobatis obtuſiſſimis lucidis argute denticulatis glaberrimis. *Sp. pl.* 531.

R. foliis cordatis glabris marginibus ſinuatis, ſpicis diviſis nutantibus. *Mill. dict. t.* 218.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 475.
Dichter Rhabarber. W.
Habitat in Tataria, China. ♃
Folia, *magis quam reliqua, coriacea ſ. compacta:* Lobis *rotundatis, obſoletioribus, crenatis margine cartilagineo acutis denticulis, utrinque glaberrimis, venis robuſtioribus.* Paniculae *rami nutantes.*

5. RHEUM *tataricum.*
R. foliis cordato-ovatis integris planis glaberrimis, petiolis ſemiteretibus angulatis, panicula ſulcata. *Lin. ſuppl.* 229.
Tatariſcher Rhabarber. W.
Habitat in Tataria *minori.* ♃
Folia *glaberrima plana magna radicalia humo incumbentia.* Petioli *rubri ſemiteretes.* Nervi *foliorum valde dilatati.* Inflorescentia *vix foliis altior.* Racemi *ſulcati.*

6. RHEUM *Ribes.*
R. foliis obtuſiſſimis ſubverruculoſis, venis ſubtus ſpinuloſis, petiolis ſupra planis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 42.
R. foliis granulatis, petiolis aequalibus. *Gron. orient.* 130. *Mill. dict. n.* 5.
Lapathum orientale, aſpero et verrucoſo folio, Ribes arabibus dictum. *Dill. elth.* 191. *t.* 158 *f.* 192.
Lapathum orientale tomentoſum rotundifolium, Ribes arabum dictum. *Breyn. E. N. C. cent.* 7. *p.* 7.
Lapathum orientale aſperum, folio ſubrotundo, fructu magno purpureo. *Pocock. orient.* 189. *t.* 84.
Ribes arabum. *Rauw. it.* 266. 282.
Ribes arabum, foliis petaſitidis. *Bauh. pin.* 455.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 477.
Morgenländiſcher Rhabarber. W.
Habitat in Perſia, Libano, Carmelo. ♃
Flores *hujus ſpeciei non vidi. Facies ſuadet hujus generis eſſe.*

*7. RHEUM *hybridum.*
R. foliis ſupra glabris, ſubtus piloſiuſculis ſublobatis acutis, ſinu baſeos anguſtato, petiolis ſupra obſolete ſulcatis margine rotundatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 42.
R. foliis cordatis acuminatis planis, radicalibus utrinque

bi- vel tridentatis, reliquis repandis. *Murr. Comm. goett.* 1779. *p.* 7. *t.* 1 *Comm. goett.* 1774. *p.* 50. *t.* 12. *
Baſtard Rhabarber. W.
Habitat in Aſia *boreali.* ♃ (v. v.)

*8. RHEUM *leucorrhizum.*
R. foliis transverſe ovalibus depreſſis, panicula ſeminifera divaricata, calycis foliolis binis multoties majoribus. *Pall. Nov. Act. petrop.* 1792. *p.* 381. *
Weiſswurzliger Rhabarber. W.
Habitat in Sibiria *in montoſis deſerti* Songarici. ♃
Folia *radicalia communiter tria, diametro* 4 *ad* 5 *pollicum, ad terram appreſſa trinervia valde venoſa glabra coriacea, orbiculato-transverſe ovalia, baſi productiuſcula, per oram confertim aſperata denticulis minutiſſimis acutis cartilagineo-rigidis.* Petioli *compreſſi laeves ſolidi ſucculenti.* Caulis *florens ſpithamaeus ſulcatus paniculatus.* Pall. l. c.

HEXAGYNIA.

804. BUTOMUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 693.

Cal. 0. *Petala* 6. *Capſ.* 6, polyſpermae.

1. BUTOMUS *umbellatus.*
Butomus. *Fl. lapp.* 159. *Fl. ſuec* 328, 350. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv. n.* 1186. *Pollich. pal. n.* 391. *Scop. carn. n.* 475. *Fl. dan. t.* 604. *Curt. fl. lond. faſc.* 1. *Kniph. cent.* 7. *n.* 6. *Hoffm. germ.* 141. *Roth. germ. I.* 177. *II.* 460.
Iuncus floridus major. *Bauh. pin.* 112.
Sedo affinis Iuncoides umbellata paluſtris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 468. *ſ.* 12. *t.* 5. *f.* 1.
Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.
Iuncus floridus. *Matth.* 1037. *Camer. epit.* 781. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 524.
Iuncus cyperoides floribus paluſtris. *Lob. ic. p.* 86.
Butomus. *Caeſalp.* 553.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 11. *p.* 660.
Doldenblütiger Waſſerliſch. W.
Habitat in Europae *aquoſis.* ♃ (v. v.)

Claſſis X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

** Flores polypetali irregulares.*

805. SOPHORA. *Cor.* papilion: Vexillo adſcendente. *Lomentum* moniliforme.

806. PODALYRIA. *Cor.* papilion: Vexillo adſcendente. *Legumen* ventricoſum polyſpermum.

807. PULTENAEA. *Cor.* papilion: Alae vexillo breviores. *Legumen* diſpermum.

808. ANAGYRIS. *Cor.* papilion: Vexillo brevi recto. *Carina* alis longiore.

809. CERCIS. *Cor.* papilion. alis vexilliformibus. *Nect.* gland. ſtyliformis, ſub germine.

810. BAUHINIA. *Cor.* patens, unguiculata, adſcendens. *Petala* lanceolata.

811. HYMENAEA. *Cor.* ſubaequalis. *Legum.* lignoſum pulpa farinoſa.

829. MYROXYLON. *Cor.* petalo ſupremo latiore. *Legumen* 1-ſpermum apice dilatatum.

812. PARKINSONIA. *Cor.* petalo infimo reniformi. *Legum.* teres, tortuoſum.

815. CAESALPINIA. *Cor.* petalo infimo pulchriore. *Cal.* laciniae inaequales. *Legum.* compreſſum.

828. TOLUIFERA. *Cor.* petalo infimo majore. *Cal.* campanulatus.

813. CASSIA. *Cor.* inaequalis. *Anth.* roſtratae. *Lomentum* planum.

814. CUBAEA. *Cor.* ſubaequalis, petalis 2 deflexis. *Legumen* coriaceum ventricoſum. *Semina* ſubreniformia.

Lomentum *differt a legumine, quod ſeptis transverſis ſit interſtinctum. Legumen dehiſcit longitudinaliter, lomentum vero vel nunquam, vel in articulos transverſales, qui ut in bacca ſic dicta ſicca, clauſi manent.* W.

816. GUILANDINA. *Cor.* ſubaequal. calyci inſidens. *Legum.* rhombeum. *Sem.* oſſea.
817. HYPERANTHERA. *Cor.* ſubaequalis. *Legumen* 3 - valve. *Sem.* alata.
837. GAERTNERA. *Cor.* ſubaequalis. *Cal.* 4 - partitus. *Samara* quadrialata.
851. GOMPHIA. *Cor.* ſubaequalis. *Baccae* plures receptaculo magno inſertae.
824. DICTAMNUS. *Cor.* patula. *Filam.* pulveracea. *Capſ.* 5, connexae. *Sem.* arillata.
866. RHODORA. *Cor.* inaequalis tripetala. *Cal.* 5-dentatus. *Capſ.* 5 - loculares.

** *Fl. polypetali aequales.*

820. CYNOMETRA. *Cal.* 4 - phyllus: lacin. oppoſ. major. *Legum.* 1 - ſpermum, carnoſum.
831. PROSOPIS. *Cal.* hemiſphaericus, 4 - dentatus. *Legum.* polyſpermum.
818. SCHOTIA. *Cal.* 5 - fidus aequalis. *Legum.* compreſſum polyſpermum.
832. CADIA. *Cal.* 5 - fidus. *Petala* obcordata. *Legumen* polyſpermum.
836. ADENANTHERA. *Antheris* glandula inſidens. *Leg.* compreſſum membranaceum.
830. HAEMATOXYLON. *Piſtilli* ſtigma emarginatum. *Legumen* valvis navicularibus.
839. GILIBERTIA. *Nectar.* tubuloſum truncatum. *Antherae* ſeſſiles. *Capſ.* 4 - locularis.
840. TRICHILIA. *Nectar.* tubuloſum, 5 - dentatum. *Capſ.* 3 - locularis, 3 - valvis. *Sem.* baccata.
841. TURRAEA. *Nectar.* tubuloſum, 10 - dentatum. *Capſ.* 5 - cocca. *Sem.* bina.
845. MELIA. *Nect.* tubuloſum, 10 - dentatum. *Drupa* Nuce 5 - loculari.
842. SANDORICUM. *Nect.* tubuloſum, 10 - dentatum. *Drupa* nucibus 5.
843. SWIETENIA. *Nect.* tubuloſum, 10 - dentatum. *Capſ.* lignoſa, 5 - valvis. *Sem.* imbricata, margine membranaceo.
819. GUAIACUM. *Cal.* laciniae 2 exteriores minores. *Capſ.* carnoſa, 3 ſ. 5 - locularis, angulata.
827. RUTA. *Germen* punctis 10 melliferis. *Capſ.* 5-fida, 5 - locularis, polyſperma.

848. **TRIBULUS.** *Piſtilli* ſtylus nullus. *Capſ.* 5, connexae, polyſpermae.
847. **FAGONIA.** *Cor.* ungues calyci inſertae. *Capſ.* 5-locularis, 10-valvis, 1-ſperma.
846. **ZYGOPHYLLUM.** *Nect.* ſquamae 10 ſtaminiferae. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.
850. **ZWINGERA.** *Capſ.* 5, coriaceae non dehiſcentes.
849. **QUASSIA.** *Capſ.* 5, bivalves, 1-ſpermae, inſertae receptaculo carnoſo.
861. **CERATOPETALUM.** *Cor.* 5-petala pinnatifida. *Cal.* 5-fidus ſtaminiferus. *Capſ.* 2-locularis.
852. **THRYALLIS.** *Cor.* 5-petala. *Capſ.* tricocca.
835. **EKEBERGIA.** *Cor.* 4-petala. *Bacca* 5-ſperma.
857. **SCHOUSBOEA.** *Cor.* 5-petala calyci inſerta. *Bacca* infera 5-gona monoſperma.
826. **PETALOMA.** *Cor.* 5-petala inter calycis lacinias inſerta. *Bacca* 1-locularis.
853. **LIMONIA.** *Cor.* 5-petala. *Bacca* 3-ſperma.
844. **COOKIA.** *Cor.* 5-petala. *Pomum* 5-loculare, loculis monoſpermis.
858. **HEISTERIA.** *Cor.* 5-petala. *Drupa* inſidens calyci colorato grandefacto.
859. **QUISQUALIS.** *Cor.* 5-petala, calyci inſidens filiformi.
854. **MONOTROPA.** *Cal.* corollinus, baſi gibbus. *Capſ.* 5-locularis polyſperma.
872. **CLETHRA.** *Piſtilli* ſtigmata tria. *Capſ.* 3-locul. polyſperma.
873. **PYROLA.** *Antherae* ſurſum bicornes. *Capſ.* 5-locularis polyſperma.
865. **LEDUM.** *Cor.* plana, 5-partita. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.
855. **DIONAEA.** *Cal.* 5-phyllus. *Stigma* fimbriatum. *Capſ.* 1-locularis. *Sem.* baſeos capſulae.
833. **MURRAYA.** *Bacca* 1-ſperma. *Cor.* 5-petala. *Nectarium* margine cingens germen.
834. **BERGERA.** *Bacca* 2-ſperma. *Cor.* 5-petala. *Stigma* turbinatum.
862. **MELASTOMA.** *Cor.* calyci inſidens. *Anther.* refractae. *Bacca* 5-locularis, calyce veſtita.
863. **MERIANIA.** *Cor.* calyci inſidens. *Antherae* refractae. *Capſ.* 5-loculares diſſepimentis contrariis.

856. IUSSIEUA. *Cor.* 4 ſ. 5-petala. *Capſ.* infera.

† *Rhexiae nonnullae. Conocarpus racemoſa. Combretum decandrum, alternifolium. Iacquinia racemoſa. Amyris decandra. Gerania aliquot. Lythrum cordifolium, ciliatum, Melanium. Griſlea tomentoſa. Anacardium occidentale.*

*** *Flores monopetali aequales.*

822. PANZERA. *Petalum* unicum laterale. *Cal.* 4-partitus. *Legumen.*

825. NICANDRA. *Cor.* tubuloſa 10-fida. *Cal.* 4-fidus inaequalis. *Bacca* 3-locularis.

823. CODON. *Cor.* campanulata, 10-fida. *Cal.* 10-partitus. *Capſ.* polyſperma.

875. INOCARPUS. *Cor.* tubuloſa, 5-fida. *Cal.* 2-fidus. *Drupa* 1-ſperma.

838. STRIGILIA. *Cor.* 5-fida. *Nectar.* 10-partitum. *Fructus* 6-locularis.

868. ANDROMEDA. *Cor.* campanulata, rotunda. *Capſ.* 5-locularis.

867. RHODODENDRON. *Cor.* infundibulif. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locularis.

864. KALMIA. *Cor.* limbo ſubtus 5-corniculato. *Capſ.* 5-locularis.

869. EPIGAEA. *Cal.* exterior 3-phyllus; interior 5-phyllus. *Capſ.* 5-locularis.

870. GUALTHERIA. *Cal.* exterior 2-phyllus; interior 5-fidus. *Capſ.* 5-locul. calyce baccato.

871. ARBUTUS. *Cor.* ovata, baſi diaphana. *Bacca* 5-locularis.

874. STYRAX. *Cor.* infundibulif. *Drupa* diſperma.

† *Vaccinia nonnulla. Gardenia Thunbergia.*

**** *Fl. apetali ſ. incompleti.*

860. DAIS. *Cor.* 1-petala. *Involucr.* 4-phyllum, multiflorum.

878. AQUILARIA. *Cal.* 5-fidus. *Nectar.* 5-fidum, lobis bifidis. *Capſ.* 2-locularis 2-valvis.

879. AUGEA. *Cal.* 5-partit. *Nect.* 10-dentat. *Capſ.* 10-locul.

876. SAMYDA. *Cal.* 5-partitus. *Nectar.* 10-fidum, cingens germen ſtaminiferum. *Capſ.* baccata unilocularis 4-valvis.

877. CASEARIA. *Cal.* 5-phyllus. *Nect.* 5-phyllum foliolis cum filamentis alternantibus. *Capſ.* baccata 1-locul. 3-valvis.
881. BUCIDA. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 1-ſperma.
821. CRUDIA. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Samara* orbiculata.
880. COPAIFERA. *Cal.* o. *Cor.* 4-petala. *Legumen* 1-ſpermum.

† *Stellera Chamaejaſme. Conocarpus racemoſa. Forſkolea.*

DIGYNIA.

890. SCLERANTHUS. *Cor.* o. *Cal.* 5-fidus, inferus, *Sem.* 2.
885. TRIANTHEMA. *Cor.* o. *Capſ.* circumſciſſa.
886. CHRYSOSPLENIUM. *Cor.* o. *Cal.* ſuperus. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris.
882. ROYENA. *Cor.* 1-petala. *Cal.* ventricoſus. *Capſ.* 4-ſperma, 4-valvis.
883. HYDRANGEA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, ſuperus. *Capſ.* 2-locul. 2-roſtris, circumſciſſa.
887. SAXIFRAGA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſ.* 1-locularis, 2-roſtris.
888. TIARELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* corolliferus. *Capſ.* bivalvis: altera majore.
889. MITELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* corolliferus. *Capſ.* bivalvis. *Petala* pectinata.
884. CUNONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* 2-locularis, acuta.
891. GYPSOPHILA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-part. campanulatus. *Capſ.* 1-locul. globoſa.
892. SAPONARIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus, baſi nudus. *Capſ.* 1-locul. oblonga.
893. DIANTHUS. *Cor.* 5-petala. *Cal.* tubuloſus, baſi ſquamoſus. *Capſ.* 1-locul. oblonga.

TRIGYNIA.

900. BRUNNICHIA. *Capſ.* 1-ſperma. *Cor.* o. *Cal.* 5-fidus.
897. ARENARIA. *Capſ.* 1-locul. *Pet.* integra, patentia.
896. STELLARIA. *Capſ.* 1-locul. *Pet.* 2-partita, patentia.

899. **DEUTZIA.** *Capſ.* 3-locul. 3-roſtrata. *Petala* integra.

894. **CUCUBALUS.** *Capſ.* 3-locul. *Pet.* bifida, fauce nuda.

895. **SILENE.** *Capſ.* 3-locul. *Pet.* bifida, fauce coronata.

898. **CHERLERIA.** *Capſ.* 3-locul. *Nectar.* petaloidea calyce minora.

901. **GARIDELLA.** *Capſ.* 3, diſtinctae. *Pet.* calycina. *Nectar.* 5, bilabiata.

906. **ERYTHROXYLON.** *Drupa* 1-ſperma. *Pet.* baſi ſquama inſtructa.

902. **MALPIGHIA.** *Drupa* 3-ſperma. *Pet.* 5, unguiculata. *Cal.* glandulоſus.

903. **BANISTERIA.** *Samarae* 3, unialatae. *Pet.* 5, unguiculata. *Cal.* glandulоſus.

904. **HIRAEA.** *Samarae* 3, alis binis oppoſitis ſ. ala circumdatae. *Pet.* 5, unguiculata. *Cal.* eglandulоſus.

905. **TRIOPTERIS.** *Samarae* 3, tri ſ. quadrialatae. *Pet.* 5, ungulata. *Cal.* glandulоſus.

† *Tamarix germanica.*

TETRAGYNIA.

† *Lychnis alpina, quadridentata.*

PENTAGYNIA.

911. **CNESTIS.** *Capſ.* 5, monoſpermae. *Cor.* 5-petala.

912. **COTYLEDON.** *Capſ.* 5 ad nectaria. *Cor.* 1-petala.

913. **SEDUM.** *Capſ.* 5 ad nectaria. *Cor.* 5-petala.

914. **PENTHORUM.** *Capſ.* 5-loba. *Cor.* petala rariora.

915. **BERGIA.** *Capſ.* 5-locul. 5-valvis: valvis horizontaliter dehiſcentibus.

08. **JONQUETIA.** *Capſ.* 1-locul. 5-ſperma. *Pet.* integra. *Cal.* 5-phyllus.

22. **SPERGULA.** *Capſ.* 1-locul. polyſperma. *Pet.* integra. *Cal.* 5-phyllus.

21. **CERASTIUM.** *Capſ.* 1-locul. *Pet.* 2-fida. *Cal.* 5-phyllus.

19. **AGROSTEMMA.** *Capſ.* 1-locul. oblonga. *Cal.* tubuloſus, coriaceus.

920. LYCHNIS. *Capſ.* 3-locul. oblonga. *Cal.* tubuloſus, membranaceus.

918. OXALIS. *Capſ.* 5-locularis, angulata. *Cor.* baſi ſubcohaerens.

910. ROBERGIA. *Drupa* nuce 1-loculari. *Cal.* 1-phyllus.

909. SPONDIAS. *Drupa* nuce 5-loculari. *Cal.* 1-phyllus.

907. AVERRHOA. *Pomum* 5-loculare. *Cal.* 5-phyllus.

917. GRIELUM. *Sem.* 5 diſtincta, mutica. *Cor.* 5-petala. *Styli* nulli.

916. SURIANA. *Sem.* 5 ſubrotunda. *Cor.* 5-petala. *Styli* filiformes, laterales.

† *Adoxa. Coriaria. Gerania. Droſera luſitanica.*

D E C A G Y N I A.

923. NEURADA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 10-cocca.

924. PHYTOLACCA. *Cal.* 5-phyllus, corollinus. *Cor.* nulla. *Bacca* 10-cocca.

M O N O G Y N I A.

805. S O P H O R A.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 694.

Cal. 5-dentatus, ſuperne gibbus. *Cor.* papilionacea: alis longitudine vexilli. *Lomentum* moniliforme.

*1. SOPHORA *tetraptera.*
S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis (17—19.) lanceolato-oblongis villoſiuſculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 43.
Sophora tetraptera. *Joh. Mill. ic. tab.* 1. *Lamarck, illuſt. gen. t.* 325. *f.* 3.
Flügelfrüchtige Sophore. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄ (v. v.)

2. SOPHORA *microphylla.*
S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis (33—41.) obovatis villoſiuſculis, leguminibus membranaceo-quadrangulis, caule arboreo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 43. *Lamarck illuſt. gen. t.* 325. *f.* 1.
S. (*tetraptera*) foliis pinnatis, foliolis numeroſis obovatis emarginatis, leguminibus tetragonis, angulis membranaceis. *Lin. ſuppl.* 230. *Forſt. prod. n.* 183.
Kleinblättrige Sophore. W.
Habitat in Nova Zeelandia. (v. v. f. fl.)

*3. S[illegible]ORA *flaveſcens.*
S. fo[illegible]atis, foliolis numeroſis oblongis glabris caule herba[illegible] *Kew.* 2. *p.* 43.
Gelbliche [illegible]ore. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)
Similis ſequenti ſed tota glabra. Folia *impari-pinnata, foliolis ſexjugis ovato-lanceolatis obtuſiuſculis.* Calyx *obſolete quinquedentatus.* Fructus *mihi ignotus.* W.

4. SOPHORA *alopecuroides.*
S. foliis pinnatis: foliolis numeroſis oblongis villoſis, caule herbaceo. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 10. *n.* 94.
Sophora. *Hort. cliff.* 156.
Ervum orientale alopecuroides perenne, fructu longiſſimo. *Tournef. cor.* 27. *Dill. elth.* 136. *t.* 112. *f.* 136.

Glycyrrhiza ſiliquis nodoſis quaſi articulatis. *Buxb. cent.* 3. *p.* 25. *t.* 46.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 494.
Fuchsſchwanzartige Sophore. W.
Habitat in Oriente. ♃ (v. ſ.)

5. SOPHORA *tomentoſa.*
S. foliis pinnatis: foliolis numeroſis ſubrotundis tomentoſis. *Mill. dict. n.* 2.
S. tomentoſa, foliolis ſubrotundis. *Fl. zeyl.* 163.
Indigofera foliis tomentoſis. *Hort. cliff.* 487.
Colutea zeylanica argentea tota. *Herm. lugdb.* 169. *t.* 171. *Raj. hiſt.* 1720.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 495.
Filzige Sophore. W.
Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ.)

6. SOPHORA *occidentalis.*
S. foliis pinnatis, foliolis numeroſis ſubrotundis incanis ſubtomentoſis. *Swartz obſ.* 154.*
S. foliis pinnatis: foliolis numeroſis ſubrotundis. *Trew. ehret.* 27. *t.* 59.
Galega fruticoſa, foliis ſubrotundis pinnatis, ſpicis ſimplicibus terminalibus. *Brown. jam.* 289. *t.* 31. *f.* 1.
Corallodendron foliis pſeudo-acaciae ſubtus tomentoſis, flore luteo. *Plum. ſpec.* 21. *ic.* 101.
Arbori coral affinis non ſpinoſa, fraxini folio rotundiore, foliis et ramulis pubeſcentibus. *Sloan. jam.* 144. *hiſt.* 2. *p.* 40. *t.* 107. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 496.
Weſtindiſche Sophore. W.
Habitat in America. ♄ (v. ſ.)

Differt a Soph. tomentoſa parum admodum. Folia minus tomentoſa, et fere ſubtus tantum ſubtomentoſa. An varietas praecedentis?

7. SOPHORA *japonica.*
S. foliis pinnatis: foliolis pluribus ovatis glabris, caule arboreo. *Mant.* 68. *Burm. ind.* 93. *Thunb. jap.* 178.* *Willd. arb.* 364.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 497.
Japaniſche Sophore. W.
Habitat in Japonia. ♄ *Kleinhoff.* (v. v. ſ. fl.)

Arbor *foliis Robiniae Caragannae.* Folia *ſparſa, pinnata: Foliolis ovatis, tenuibus, utrinque laevibus,*

7-11; *inferioribus paulo minoribus.* Racemi *parvi.* Flores *albi, magnitudine Indigoferae.*

8. SOPHORA *heptaphylla.*

S. foliis pinnatis: foliolis ſeptenis glabris. *Mat. med.* 110.

S. glabra, foliolis ſeptenis. *Fl. zeyl.* 164.

Fruticulus ſinenſis, ſennae ſylveſtris folio anguſtiore, nodoſa ſiliqua roſtro longiore donata. *Pluk. amalth.* 18. *t.* 451. *f.* 10?

Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 60. *t.* 22.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 498.

Siebenblättrige Sophore. W.

Habitat in India. ♄

*9. SOPHORA *monoſperma.*

S. foliis impari-pinnatis, pinnis 5-jugis, leguminibus monoſpermis, caule arboreo. *Swartz prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 722. *

Glycine arboreum, foliis oblongis, ſeminibus majoribus. *Brown. jam.* 298.

Einſaamige Sophore. W.

Habitat in Jamaica *aliisque inſulis* Indiae *occidentalis.* ♄

Arbuſcula *decempedalis cortice albido, ligno duro.* Rami *ferrugineo-tomentoſi.* Folia *pinnata cum impari, foliolis utrinque glabris rigidis.* Paniculae *terminales ramoſae.* Corolla *magna coerulea odorata.* Legumen *ovatum villoſum lignoſum monoſpermum bivalve.* Semen *unicum ſphaericum magnum coccineum, macula nigra notatum, ſuturae leguminis ſuperiori adfixum.* Swartz. l. c.

*806. PODALYRIA.

Virgilia et Podalyria Lamarck ill. gen. t. 326, 327.

Cal. ſubbilabiatus 5-fidus. *Cor.* papilionacea, alae vexilli longitudine. *Legumen* ventricoſum polyſpermum.

1. PODALYRIA *capenſis.*

P. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis mucronatis ſubtus incanis, leguminibus tomentoſis. W.

Sophora (*capenſis*) foliis pinnatis: foliolis numeroſis lanceolatis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo. *Mant.* 67. *Thunb. prod.* 79.

Sophora oroboides. *Berg. cap.* 142.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 497.
Capſche Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Frutex *tenellus pubeſcens, adultior ſpontaneus nudus facie Amorphae.* Folia *alterna pinnata cum impari:* Foliolis 23 *anguſto lanceolatis aequalibus integerrimis ſupra nitidis, ſubtus ſubtomentoſis.* Racemus *terminalis:* Floribus *albis Crotalariae recurvatis.* Filamenta *quaſi villis intertexta:* Legumen *oblongum compreſſum tomentoſum.* Semina 3-6, *duriſſima.*

***2. PODALYRIA *aurea*.**

P. foliis pinnatis, foliolis ellipticis acutiuſculis ſubtus nudiuſculis, leguminibus glabris. W.
Sophora (*aurea*) foliis pinnatis: foliolis numeroſis oblongo-ovalibus, ſupra glaberrimis, caule fruticoſo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 44.
Virgilia. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 326. *f.* 1.
Robinia (*ſubdecandra*) racemis ſimplicibus, filamentis ſubliberis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *l'Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 157. *t.* 75.*
Goldfarbene Podalyrie. W.
Habitat in Abyſſinia. ♄

***3. PODALYRIA *argentea*. †**

P. petiolis ſpineſcentibus diphyllis, foliolis ſericeo-tomentoſis oblongis utrinque acutis. W.
Sophora (*argentea*) petiolis diphyllis ſpineſcentibus, pedunculis racemoſo-multifloris terminalibus. *Pall. Act. petrop.* 1792. *p.* 373. *t.* 8.*
Silberfarbene Podalyrie W.
Habitat in Sibiria *in collibus arenoſis deſerti* Songarici *ad fluvium* Bekun. ♄

Simillima Robiniae Halodendro, Legumina *plana monoſperma.* Flores *vero adhuc ignoti.* W.

4. PODALYRIA *geniſtoides*.

P. foliis ternatis ſeſſilibus, foliolis linearibus mucronatis, margine revolutis. W.
Sophora (*geniſtoides*) foliis ternatis ſeſſilibus: foliolis linearibus. *Sp. pl.* 534. *Thunb. prod.* 79.
Geniſta africana, foliis galii, *Old. afr.* 31.
β. Sophora *gallioides*. *Berg. cap.* 141.
Geniſta roſmarini folio, triphyllos. *Pluk. phyt.* 413. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 499.

Ginſterartige Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Corollae *carina utrinque cornuta, ut Indigoferae.*

*5. PODALYRIA *ternata.*
P. foliis ſeſſilibus, foliolis lanceolatis ſericeis.
Sophora ternata. *Thunb. prod.* 79.
Gedreyte Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

6. PODALYRIA *auſtralis.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis obovato-lanceolatis obtuſis, ſtipulis lanceolatis acutis petiolo duplo longioribus. W.
Sophora (*auſtralis*) foliis ternatis ſubſeſſilibus glabris, ſtipulis enſiformibus. *Syſt. veg.* 325.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 499.
Südliche Podalyrie. W.
Habitat in Carolina. ♃ (v. v.)
Caulis *herbaceus, ſaepius decumbens.* Folia *cuneato-oblonga, glabra, viridi-flaveſcentia.* Stipulae *enſiformes, petiolo breviſſimo longiores.*

7. PODALYRIA *tinctoria.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis ſubrotundo-obovatis obtuſis mucronatis, ſtipulis obſoletis oblongis acutis petiolo multoties brevioribus. W.
Podalyria. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 327. *f.* 1.
Sophora (*tinctoria*) foliis ternatis ſubſeſſilibus: foliolis obovatis glabris, ſtipulis minutis. *Sp. pl.* 534. *Mill. dict.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 500.
Färbende Podalyrie. W.
Habitat in Barbados *et* Virginia. ♃ (v. ſ.)
Caulis *ramoſiſſimus.* Stipulae *vix ullae.* Folia *breviſſime petiolata, obovata, obtuſa exſiccatione nigra.* Racemi *craſſitie ſetae equinae, pauciflori.*

8. PODALYRIA *alba.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis oblongis obtuſis, ſtipulis filiformibus petiolo brevioribus. W.
Sophora (*alba*) foliis ternatis petiolatis, foliis ellipticis glabris, ſtipulis ſubulatis brevibus. *Syſt. veg.* 325.
Crotalaria (*alba*) foliis ternatis lanceolato-ovatis, caule laevi herbaceo, racemo terminali. *Sp. pl.* 2. *p.* 1006. *Hort. cliff.* 499. * *Roy. lugdb.* 375. *Mill. dict. n.* 11.

Anonis caroliniana perennis non ſpinoſa, foliorum marginibus integris, floribus in thyrſo candidis. *Mart. cent.* 44. *t.* 44.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 500.
Weiſse Podalyrie. W.
Habitat in Carolina. ♃ (v. ſ.)
Caulis *laevis, altus, atropurpureus.* Folia (*Laburni*) *ternata, laevia, elliptica, mucronata, utrinque glabra, ſesquipollicaria, modice petiolata.* Stipulae *vix ullae.* Filamenta *omnino diſtincta.* Vexillum *corolla brevius.* Racemus *pendulus floribus albis, magnitudine Laburni, pedalis.*

9. PODALYRIA *lupinoides.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis elliptico-lanceolatis obtuſis pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis petiolo longioribus. W.
Sophora (*lupinoides*) foliis ternatis petiolatis: foliolis ovalibus piloſis. *Sp. pl.* 534. *Pall. it.* 2. *p.* 676.
S. foliis ternatis, ſpica verticillata. *Amoen. acad.* 2. *p.* 350. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 501.
Feigbohnenartige Podalyrie. W.
Habitat in Camtſchatca. ♃ *G. Demidoff.* (v. ſ.)
Flores *ſubſeſſiles, lutei.* Stipulae *enſiformes, magnae.*

*10. PODALYRIA *trifoliata.*
P. foliis ternatis petiolatis, foliolis ovatis ſericeis.
Sophora trifoliata. *Thunb. prod.* 79.
Dreyblättrige Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

11. PODALYRIA *calyptrata.*
P. foliis ſimplicibus ellipticis ſupra ſcabriuſculis, ſubtus villoſis reticulato-venoſis, pedunculis unifloris, calycibus villoſis baſi calyptra decidua inſtructis. W.
Sophora (*calyptrata*) foliis ſimplicibus ſubovatis pubeſcentibus, pedunculis unifloris, calycibus tomentoſis, florum calyptra decidua. *Retz. obſ.* 1. *p.* 36. *
Sophora (*calyptrata*) foliis ſimplicibus ovatis reticulatis, floribus axillaribus calyptratis. *Thunb. prod.* 79.
Crotalaria foliis ſimplicibus ovatis villoſis, petiolis ſimpliciſſimis, ramis teretibus. *Hort. cliff.* 357. * *Roy. lugdb.* 374. *Seb. muſ.* 2. *t.* 99. *f.* 3. *bona.*
Sophora biflora. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 3. *p.* 501. *t.* 24. *f.* 1.

Netzblättrige Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*12. PODALYRIA *biflora.*

P. foliis ſimplicibus ovatis ſubtomentoſis, pedunculis bifloris, calycibus baſi intruſis tomentoſis coloratis.
Podalyria. *Lamarck illuſt. gen. t.* 327. *f.* 3.
Sophora biflora. *Retz. obſ.* 1. *p.* 36.*
Zweyblütige Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

13. PODALYRIA *myrtillifolia.*

P. foliis ſimplicibus elliptico-obovatis obtuſis cuſpidatis utrinque ſericeis, pedunculis unifloris. W.
Sophora (*myrtillifolia*) foliis ſimplicibus obovatis utrinque ſericeis obtuſis cum acumine, pedunculis unifloris, calycibus baſi intruſis tomentoſis. *Retz. obſ.* 1. *p.* 36.*
Sophora (*rotundifolia*) foliis ſimplicibus obovatis ſericeis, floribus axillaribus, pedunculis longitudine folii. *Thunb. prod.* 79.
Sophora (*biflora*) foliis ſimplicibus obovatis ſubtomentoſis, pedunculis bifloris. *Sp. pl.* 534.
Sophora rotundifolia α. *Berg. cap.* 138.*
Crotalaria arbor africana ſtyracis folio molli incano. *Pluk. alm.* 122. *t.* 185. *f.* 2.
Geniſta arboreſcens africana ſtyracis folio. *Herm. lugdb.* 270. *t.* 271.
Myrto-Geniſta capitis b. ſpei. *Breyn. cent. t.* 29?
Myrtenblättrige Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*14. PODALYRIA *hirſuta.*

P. foliis ſimplicibus hirſutis, ſuperioribus ovatis, inferioribus ſubrotundis, ramis teretibus, laciniis calycinis lanceolatis longitudine alarum.
Sophora hirſuta. *Ait. Kew.* 2. *p.* 46.
Haarige Podalyrie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*15. PODALYRIA *buxifolia.*

P. foliis ſimplicibus ovalibus, ſupra glabris, ſubtus ſericeis, pedunculis unifloris, calycibus baſi intruſis tomentoſis coloratis.
Podalyria. *Lamarck illuſt. gen. t.* 327. *f.* 4.
Sophora buxifolia. *Retz. obſ.* 1. *p.* 35.*
Sophora (*pedunculata*) foliis ſimplicibus ovatis tomen-

toſis, floribus axillaribus, pedunculis folio longioribus. *Thunb. prod.* 79.

Geniſta africana fruteſcens nummulariae hirſuto folio, floribus parvis purpureis. *Raj. dendr.* 105?

Buchsbaumblättrige Podalyrie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Sophoram cordatam Thunbergii ob brevem deſcriptionem omiſi. W.

*807. PULTENAEA.

Smith Nov. Holl. 1. *p.* 35.

Cal. 5-dentatus utrinque appendiculatus. *Cor.* papilionacea, alis vexillo brevioribus. *Legumen* uniloculare diſpermum.

*1. PULTENAEA *ſtipularis.*

P. foliis linearibus mucronatis ſubciliatis, floribus terminalibus capitatis. W.

P. (*ſtipularis*) foliis linearibus mucronatis ſubciliatis, ſtipulis ſolitariis binerviis laceris. *Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 35. *t.* 12. *

Ginſterartige Pultenäa. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

*2. PULTENAEA *paleacea.*

P. foliis linearibus mucronatis glabris, capitulo terminali, bracteis oblongo-acuminatis dentatis flore longioribus. W.

Spreublütige Pultenäa. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*3. PULTENAEA *linophylla.*

P. foliis linearibus obtuſis mucronatis ſtrigoſis, capitulis terminalibus paucifloris, bracteis ſcarioſis bifidis calyce multo brevioribus. W.

P. (*linophylla*) ſericea, foliis linearibus carinatis, mucrone obtuſo reflexo terminatis. *Schrad. et Wendl. ſert. hannov. p.* 28. *t.* 18. *

Flachsblättrige Pultenäa. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*4. PULTENAEA *juncea.*

P. foliis filiformibus apice cartilagineo-trifido, racemo terminali, calycibus inappendiculatis, caule exſtipulato. W.

Sophora (*juncea*) foliis ſimplicibus teretibus acuminatis

apice tridentatis, floribus racemoſis. *Schrad. et Wendl. ſert. hannov. p. 9. t. 3.* *
Binſenartige Pultenäa. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. v.)

*5. PULTENAEA *villoſa.*
P. foliis oblongis piloſis, floribus ſolitariis axillaribus, caule villoſo. W.
Haarige Pultenäa. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*6. PULTENAEA *daphnoides.*
P. foliis obovatis glabris mucronatis, floribus terminalibus capitatis. W.
P. (*daphnoides*) frutex tripedalis, caule erecto ſericeo ramoſo; foliis alternis cuneiformibus ſubmucronatis ſubſericeis, floribus papilionaceis terminalibus capitatis, 6-8, involucro ſericeo, ſtipula cava piloſa. *Wendl. obſ.* 43.
Seidelbaſtartige Pultenäa. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

808. ANAGYRIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 695.

Vexillum alaeque carina breviores in corolla papilionacea. *Legumen.*

1. ANAGYRIS *foetida.*
A. foetida. Sp. pl. 534.
Anagyris. *Haſſelq. it.* 466. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 93.
A. foliis ovatis, floribus lateralibus. *Mill. dict. n.* 1.
A. floribus lateralibus. *Roy. lugdb.* 371.
A. foetida. *Bauh. pin.* 391.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 503.
Stinkende Anagyris. W.
Habitat in Italiae, Siciliae, Hiſpaniae *montibus.* ♄ (v. ſ.)
Folia *alterna ternata.* Flores *in ramis terminales ſubracemoſi.* W.

809. CERCIS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 696.

Cal. 5-dentatus, inferne gibbus. *Cor.* papilionacea: vexillo ſub alis brevi. *Legumen.*

1. CERCIS *Siliquaſtrum.*
C. foliis orbiculatis cordatis. *Willd. arb.* 58. *

C. foliis cordato-orbiculatis glabris. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. orient.* 131. *Mill. dict. n.* 1. *Medic. in obſ. Soc. oecon. Lutrenſ. p. a.* 1774. *p.* 167.
Siliqua ſylveſtris rotundifolia. *Bauh. pin.* 402.
Arbor judae. *Dod. pempt.* 786. *Raj. hiſt. p.* 1717.
Siliquaſtrum. *Tournef. inſt.* 646. *t.* 414.
Arbor judaica. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 433.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 549.
Europäiſcher Judasbaum. W.
Habitat in Italia, Hiſpania, Narbona, Oriente. ♄ (v. v.)

2. CERCIS *canadenſis.*
C. foliis cordatis acuminatis. *Willd. arb.* 59.*
C. foliis cordatis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 156. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 463. *Gron. virg.* 47. *Mill. ic.* .. *Medic. in obſ. Soc. oecon. Lutr. p. a.* 1774. *p.* 170.
C. foliis cordato acuminatis. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 147.
Siliquaſtrum-canadenſe. *Tournef. inſt.* 647. *Du Ham. arb.* 3.
Ceratia agreſtis virginiana, folio rotundo minore. *Raj. dendr.* 100.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 552.
Canadiſcher Judasbaum. W.
Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)
Folia *glabra ſunt.* Du Roi *l. c.* R.

810. BAUHINIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 697.

Cal. 5-fidus, deciduus. *Petala* patula, oblonga, unguiculata: ſuperiore magis diſtante, omnia calyci inſerta. *Legumen.*

1. BAUHINIA *ſcandens.*
B. caule cirrhifero. *Loefl. it.* 218. *Mill. dict. n.* 9.
Clematis indica, folio bifido, flore fructuque carens, arbores tranſcendens. *Raj. ſuppl.* 328.
Folium linguae. *Rumph. amb.* 5. *p.* 1. *t.* 1.
Naga-mu-valli. *Rheed. mal.* 8. *p.* 57. *t.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 504.
Klimmende Bauhinie. W.
Habitat in Malabaria, Amboina, Cumana. ♄
Sub hac latent ſine dubio binae diſtinctae ſpecies. W.

*2. BAUHINIA *parviflora.*
B. racemis axillaribus terminalibusque nutantibus, petalis linearibus, lobis foliorum rotundatis glabris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 55. *
Kleinblütige Bauhinie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Differt a B. ſcandente: cirrhis *nullis*, foliis *multo minoribus, lobis rotundatis obtuſiſſimis nec attenuatis.* Vahl. l. c.

*3. BAUHINIA *racemoſa.*
B. floribus triandris extus ſtaminibusque baſi hirſutis, foliis ſubtus ſericeis, lobis rotundatis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 56. *t.* 62. *
B. foliis ſubrotundo-cordatis, lobis ſemiorbiculatis ſubtus tomentoſis, ſtaminibus barbato-plumoſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 385. *
Traubenblütige Bauhinie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

4. BAUHINIA *aculeata.*
B. caule aculeato. *Hort. cliff.* 156. *t.* 14. *Roy. lugdb.* 463. *Loeſl. it.* 219. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. amer.* 119. *t.* 177. *f.* 2.
Bauhinia aculeata, folio rotundo et emarginato. *Plum. gen.* 23. *ic.* 44. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 505.
Stachliche Bauhinie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

5. BAUHINIA *divaricata.*
B. foliis glabris, lobis divaricatis acutis binerviis, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 47.
B. foliis ovatis: lobis divaricatis. *Sp. pl.* 535.
Bauhinia foliis quinquenerviis, laciniis acuminatis remotiſſimis. *Hort. cliff.* 156. *t.* 15. *Roy. lugdb.* 464.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 506.
Ausgebreitete Bauhinie. W.
Habitat in America. ♄

*6. BAUHINIA *aurita.*
B. foliis baſi ſubtransverſis, lobis lanceolatis porrectis trinerviis, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 48.
Bauhinia divaricata β. *Sp. pl.* 535.
B. foliis ovato-cordatis lobis longiſſimis parallelis. *Mill. ic.* 41. *t.* 61.

Geöhrte Bauhinie. W.
Habitat in Jamaica. ħ (v. ſ. ſ. fl.)

*7. BAUHINIA *porrecta.*
B. foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 48.
B. floribus ſubdecandris, foliis cordatis, lobis porrectis acutis trinerviis, petalis lanceolatis. *Swartz. prod.* 66.
B. floribus diadelphis ſubde[illegible], foliis cordatis, lobis ſemiovatis acutis ſubquad[illegible], petalis lanceolatis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 52. *t.* 100.
B. non aculeata, folio ampliori et bicorni. *Plum. gen.* 23. *ic.* 44. *f.* 2.
B. foliis bilobis, ſpicis laxis terminalibus. *Brown. jam.* 286.
Sennae ſpuriae aut Aſpalatho affinis arbor ſiliquoſa, foliis binis. *Sloan. jam.* 150. *hiſt.* 1. *p.* 51.
Spitzblättrige Bauhinie. ħ
Habitat in Jamaica, Hiſpaniola. (v. ſ. ſ. fl.)

8. BAUHINIA *ungulata.*
B. foliis ovatis: lobis parallelis. *Sp. pl.* 535.
B. foliis ovatis oblongis recta linea bifidis. *Hort. cliff.* 157.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 506.
Klauenförmige Bauhinie. W.
Habitat in America. ħ (v. ſ. ſ. fl.)

9. BAUHINIA *variegata.*
B. calycibus monophyllis rumpentibus, petalis ſeſſilibus ovatis, foliorum lobis ovatis obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 48.
B. foliis cordatis: lobis coadunatis obtuſis. *Mill. dict. n.* 8.
Arbor. ſ. Thomae ſ. Aſſitra. *Zanon. hiſt.* 26. *t.* 15.
Chovanna-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 57. *t.* 32. *Raj. hiſt.* 1751. *Burm. ind.* 94.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 554.
Bunte Bauhinie. W.
Habitat in Malabariae, Maderae *arenoſis.* ħ
Corollae *patentes:* Petalis *ovatis, acutis, roſeis,* *luteo purpureoque variegatis.*

*10. BAUHINIA *candida.*
B. foliis cordatis ſubtus pubeſcentibus, lobis ovatis obtuſis, calycibus ſuperne attenuatis elongatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 49.
Weiſse Bauhinie. W.
Habitat in India *orientali.* ħ

11. BAUHINIA *purpurea.*
B. floribus triandris, foliorum lobis ovalibus obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 49.
B. foliis ſubcordatis bipartitis rotundatis ſubtus tomentoſis. *Mill. dict. n.* 6.
Chovanna mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 59. *t.* 33. *Raj. hiſt. p.* 1751.
Mandaru ſecunda ſpecies. *Pluk. alm.* 240. *Burm. ind.* 94.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 556.
Rothe Bauhinie. W.
Habitat in Indiae *arenoſis.* ♄ (v. ſ.)
Flores patentes, purpuraſcentes: Petalis lanceolatis, diſtantibus.

12. BAUHINIA *tomentoſa.*
B. foliis cordatis: lobis ſemiorbiculatis tomentoſis. *Mill. dict. n.* 2.
B. foliis cordato-ſubrotundis: laciniis rotundatis. *Hort. cliff.* 157. *Hort. upſ.* 99. *Fl. zeyl.* 147. *Roy. lugdb.* 464.
B. foliis ſubrotundis, flore flaveſcente ſtriato. *Burm. zeyl.* 44. *t.* 18. *Burm. ind.* 94.
Mandaru maderaſpatenſe, foliis firmioribus biſulcis glabritie ſplendentibus. *Pluk. alm.* 240. *t.* 44. *f.* 6.
Chanſchena-pou. *Rheed. mal.* 1. *p.* 63. *t.* 35. *Raj. hiſt.* 1752.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 557.
Filzige Bauhinie. W.
Habitat in India. ♄
Corollae campanulatae, albo-flaveſcentes: Petalis obovatis.

13. BAUHINIA *acuminata.*
B. foliis ovatis: lobis acuminatis ſemi-ovatis. *Mill. dict. n.* 3.
B. inermis foliis cordatis ſemibifidis: laciniis acuminato-ovatis erectis dehiſcentibus. *Hort. cliff.* 157. *Fl. zeyl.* 148.
Velutta-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 61. *t.* 34. *Raj. hiſt.* 1751.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 558.
Zugeſpitzte Bauhinie. ♄
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)
Corollae campanulatae, albae: Petalis obtuſis. Stamina diadelpha in B. hac et B. divaricata, contrario ac in Papilionaceis modo.

*14. BAUHINIA *gujanenſis.*

B. foliis binatis, foliolis acuminatis, caule cirrhoſo. W.

B. (*gujanenſis*) foliis usque ad petiolum diviſis, foliolis acutis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 386. *

α. B. (*Outimouta*) caule cirrhifero, foliis cordiformibus bipartitis, ſubtus aureis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 375. *t.* 144.*

β. B. (*gujanenſis*) caule cirrhifero, foliis laevibus bipartitis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 377. *t.* 145. *

Gujanaſche Bauhinie. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*15. BAUHINIA *rubeſcens.*

B. foliis binatis, foliolis obtuſis. W.

B. (*rubeſcens*) foliis ad petiolum usque diviſis, foliolis ſemiorbiculatis obtuſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 386.* *illuſt. gen. t.* 329. *f.* 2.

Röthliche Bauhinie. W.

Habitat in Africa. ♄

811. HYMENAEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 698.

Cal. 5-partitus. *Pet.* 5, ſubaequalia. *Stylus* intortus. *Legumen* repletum pulpa farinacea.

1. HYMENAEA *Courbaril.*

H. foliolis coriaceis ſubaveniis baſi inaequalibus, paniculae floribus pedunculatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 30.

H. Courbaril. *Sp. pl.* 537. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 305. *t.* 145. *f.* 1. *Lamarck illuſt. gen. t.* 330. *f.* 1.

Hymenaea. *Hort. cliff.* 484. *Hort. upſ.* 305. *Mat. med.* 510. *Brown. jam.* 221. *Mill. dict.*

Courbaril bifolia, folio pyramidato. *Plum. gen.* 49.

Ceretia diphyllos anteguana, ricini majoris fructu nigro, ſiliqua grandi incluſo. *Pluk. alm.* 96. *t.* 82. *f.* 3.

Itaiba Braſilienſibus, Arbor ſiliquoſa et gummifera. *Raj. hiſt.* 1760.

Arbor ſiliquoſa ex qua Gummi Elemi. *Bauh. pin.* 404.

Itaiba. *Piſ. braſ.* 123.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 560.

Gemeiner Locuſtbaum. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*2. HYMENAEA *venoſa.*

H. foliis membranaceis venoſis baſi ſubaequalibus, paniculae floribus ſubſeſſilibus. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 31. *

Adriger Locuſtbaum. W.
Habitat in Cajenna. ♄

Similis H. Courbaril, differt vero: foliis *triplo longioribus venis numeroſis tenuiſſimis ſubreticulatis, baſi fere aequalibus, nec foliis venis obſcuris latereque inferiore ſupra baſin deſinentibus,* calycibus *ſericeis magis nitentibus ſeſſilibus, nec pedunculatis.* Vahl. l. c.

*3. HYMENAEA *verrucoſa.*

H. foliolis venoſis baſi inaequalibus, panicula flexuoſa divaricata, pedunculis multifloris, legumine verrucoſo. W.

Hymenaea verrucoſa. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 306. *t.* 139. *f.* 7. *Lamarck illuſt. gen. t.* 330. *f.* 2.

Warziger Locuſtbaum. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄

Habitus H. Courbaril, ſed diverſa: foliis *minoribus,* panicula *divaricata flexuoſa, pedunculis multifloris, floribus pedicellatis, atque* legumine *minore verrucis elevatis ornato.* W.

812. PARKINSONIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 699.

Cal. 5-fidus. *Pet.* 5, ovata: infimo reniformi. *Stylus* nullus. *Lomentum* moniliforme.

1. PARKINSONIA *aculeata.*

Parkinſonia. *Hort. cliff.* 157. *t.* 13. *Hort. upſ.* 99. *Roy. lugdb.* 465. *Brown. jam.* 222. *Iacq. amer.* 121. *t.* 80.

P. aculeata, foliis minutis uni coſtae adnexis. *Plum. gen.* 25.

P. aculeata, foliis mimoſae uni coſtae affixis. *Walth. hort.* 6. *t.* 13.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 563. *t.* 8. *f.* 2.

Stachliche Parkinſonie. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. ſ.)

813. CASSIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 700.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Antherae* ſupremae 3, ſteriles; infimae 3, roſtratae. *Lomentum.*

* *Sennae.*

1. CASSIA *diphylla.*

C. foliis conjugatis, ſtipulis cordato-lanceolatis. *Sp. pl.* 537.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 537.
Zweyblättrige Caſſie. W.
Habitat in India. ⊙

Frutex Caule *tereti.* Folia *conjugata ſ. duo in petiolo brevi, ſemiorbiculata, obtuſa, ſtriata.* Stipulae *cordato-lanceolatae, totos ramos obtegentes.*

2. CASSIA *Abſus.*

C. foliis bijugis obovatis, glandulis duabus ſubulatis inter infima. *Fl. zeyl.* 153.*
Senna quadrifolia, ſiliqua plana hirſuta, flore aureo ſanguineo. *Burm. zeyl.* 212. *t.* 97.
Senna exigua maderaſpatana tetraphylla ſiliquifera glabra, florum pediculis ad exortum foliorum propendentibus. *Pluk. alm.* 341. *t.* 60. *f.* 1.
Loto affinis aegyptiaca. *Bauh. pin.* 332.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 508.
Aegyptiſche Caſſie. W.
Habitat in India, Aegypto. ⊙ (v. ſ.)
Planta *piloſa.*

3. CASSIA *viminea.*

C. foliis bijugis ovato-oblongis acuminatis, glandula oblonga inter infima, ſpinis ſubpetiolaribus obſoletis tridentatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397. * *Loefl. it.* 232. *Swartz obſ.* 156. *
C. viminea, foliis ovatis acuminatis bijugatis, racemis laxis alaribus, ſiliquis brevioribus compreſſis. *Brown. jam.* 223.
Senna ſpuria tetraphylla, ſiliqua lata compreſſa. *Sloan. jam.* 2 *p.* 49. *t.* 189. *f.* 6. 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 509.
Schlanke Caſſie. W.
Habitat in Jamaicae *montibus altiſſimis interioris ſylvaticis.* ♄

4. CASSIA *bacillaris.*

C. foliis bijugis ovatis obliquis, glandula obtuſa inter infima, racemis axillaribus pedunculatis, ſiliqua tereti longa. *Lin. ſuppl.* 231.
Stockfrüchtige Caſſie. W.
Habitat in Surinamo. ♄ *C. G. Dalberg.*

Frutex *duodecim pedum glaberrimus.* Folia *alterna petiolata bijuga.* Foliola *latere interiore obliqua, utrinque glaberrima, inferiora exquiſite ovata, ſuperiora*

magis elongata. Glandula *conica obtuſa inter inferiora foliola.* Stipulae *nullae.* Racemi *axillares ſolitarii pauciflori erecti.* Pedicelli *dependentes angulati.* Flores *aurantiaci mediocres.* Legumen *omnino C. fiſtulae, ut diſtingui nequeat, ſubcurvum, cylindricum glaberrimum, acumine filiformi terminatum, longitudine pedali, interius iſthmis interceptum, quod externe tamen non apparet.*

5. CASSIA *Tagera.*

C. foliis trijugis: glandula petiolari, ſtipulis ciliatis cordatis acuminatis. *Sp. pl.* 538.

Caſſia 6, Senna ſpuria tetraphylla arboreſcens, ſiliquis tenuibus longiſſimis pendulis. *Amm. herb.* 603. *n.* 33?

Tagera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 103. *t.* 52.? *Raj. hiſt.* 1743.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 509.

Gefranzte Caſſie. W.

Habitat in India.

Fruticulus *procumbens: Ramis filiformibus.* Petioli *breviſſimi;* Foliola *quatuor, ſemiorbiculata, venoſa, quorum duo exteriora majora.* Stipulae *cordatae ſ. cordato-lanceolatae, margine piloſae.*

6. CASSIA *Tora.*

C. foliis trijugis obovatis: exterioribus majoribus: glandula ſubulata inter inferiora. *Roy. lugdb.* 468. *Fl. zeyl.* 152. *Hort. upſ.* 100. *Mill. dict. t.* 82.

C. ſiliqua quadrangulari. *Dill. elth.* 72. *t.* 63. *f.* 73.

β. C. humilis, ſiliquis foeni graeci. *Plum. ſpec.* 18. *t.* 76. *f.* 2.

Senna orientalis hexaphylla, Tala Zeylonenſium. *Herm. lugdb.* 557. *Raj. hiſt.* 1743.

Senna orientalis hexaphylla, ſiliquis longis incurvis. *Pluk. alm.* 342.

Galega indica minor hexaphyllos Amanni. *Raj. hiſt.* 911.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 510.

Viereckigfrüchtige Caſſie. W.

Habitat in India. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *erectus, minus lignoſus, ſubſcaber, a cicatricibus foliorum nodoſus.* Rami *patentiſſimi.* Foliola *mucrone molli; inferiora breviora, obtuſiora.* Stipulae *lineares, acuminatae, piloſae.* Glandulae *acuminatae, apice fuſcae, inter ſingula paria* 2 *inferiora, non vero inter extimum par ſitae.* Flores *lutei.*

Var. β. *differt ſiliqua recurva.* An *diſtincta ſpecies?*

7. CASSIA *bicapſularis.*
C. foliis trijugis obovatis glabris: interioribus rotundioribus: glandula interjecta globoſa. *Hort. cliff.* 159. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 468. *Mill. dict. n.* 7. *Merian. ſur. t.* 32.
C. hexaphylla, ſiliqua bicapſulari. *Plum. ſpec.* 18. *t.* 76. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 510.
Zweyfächrige Caſſie. W.
Habitat in India. ♄
Folia *bijuga tantum, glandula rotunda inter infimum par.* Bracteae *ventricoſae, ſubimbricatae.* Siliqua *teres longa. Linn. diſſ. plant. Surinam.* 1776.

8. CASSIA *emarginata.*
C. foliis ſubquadrijugis ovatis ſubintegris, floribus racemoſis irregularibus, caule arboreo. *Swartz. obſ.* 157.*
C. foliis trijugis ovatis rotundatis emarginatis aequalibus. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.
C. (*racemoſa*) foliolis quinquejugis lanceolatis rigidis, floribus racemoſis axillaribus, ſiliquis planis, caule fruticoſo. *Mill. dict.*
C. arboreſcens, ſiliquis compreſſis. *Brown. jam.* 223.
C. minor hexaphylla fruticoſa, ſennae foliis. *Sloan. jam.* 146. *hiſt.* 2. *p.* 44. *t.* 180. *f.* 1. 2. 3. 4. *Raj. dendr.* 110.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 511.
Ausgerandete Caſſie. W.
Habitat in Caribaeis. ♄

9. CASSIA *obtuſifolia.*
C. foliis trijugis ovatis obtuſiuſculis. *Sp. pl.* 539. *Swartz obſ.* 158.*
C. foetida, foliis ſennae italicae. *Dill. elth.* 71. *t.* 62. *f.* 72.
C. minor herbacea plerumque hexaphylla, folio obtuſo. *Sloan. jam.* 148. *hiſt.* 2. *p.* 47. *t.* 180. *f.* 5?
Gallinaria rotundifolia. *Rumph. amb.* 5. *p.* 283. *t.* 97. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 512.
Stumpfblättrige Caſſie. W.
Habitat in Cubae *et* Jamaicae *ruderatis.* ☉ (v. f.)

*10. CASSIA *ſennoides.*
C. foliis trijugis, foliolis ellipticis obtuſis, glandula inter infima foliola. W.
C. foliis trijugis, foliolis averſe ovatis, glandula obtuſa inter infima, ſtipulis ſubulatis, caule arboreo. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 70. *Collect.* 1. *p.* 74.*
Sennenartige Caſſie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

*11. CASSIA *acuminata.* W.

C. foliis trijugis, foliolis ovatis acuminatis, glandula ſeſſili inter foliola. W.

C. (*Apoucouira*) arboreſcens, foliis amplis bi-et trijugis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 379. *t.* 146. *

Langſpitzige Caſſie. W.

Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄

Racemi *axillares.* W.

*12. CASSIA *corymboſa.*

C. foliis trijugis lanceolatis ſubfalcatis glabris, glandula inter infima, corymbis pedunculatis axillaribus, leguminibus cylindricis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 637. *

Doldentraubige Caſſie. W.

Habitat in Bonaria. ♄

13. CASSIA *longiſiliqua.*

C. foliis quadrijugis, foliolis extimis lanceolatis, glandula ſubulata infra infima interque extima. *Lin. ſuppl.* 230.

C. arboreſcens diffuſa, ſiliquis longis compreſſis. *Brown. jam.* 223.

Langfrüchtige Caſſie. W.

Habitat in America. ♄

Caulis *erectus teretiuſculus, obtuſe ſulcatus, ramis vix pubeſcentibus.* Folia *quadrijuga.* Foliola *viridia glaberrima ſubtus pallidius viridia, ovato-oblonga, extima gradatim longiora, ut linearia potius quam lanceolata.* Glandula *inter vel infra infimum par oblonga ſubulata, inter extimum par acutior, raro ulla inter paria intermedia.* Petiolus *erectus teretiuſculus.* Stipulae *lineares acutae breves.* Legumen *tetragonum hirtum brevius. Nocte obdormit arcte petiolo erigato, foliolis pendulis prope caulem.*

14. CASSIA *falcata.*

C. foliis quadrijugis ovato-lanceolatis retrofalcatis: glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 512.

Sichelblättrige Caſſie. W.

Habitat in America. ⊙

*15. CASSIA *ſericea.*

C. foliis ſubquadrijugis ovatis hirſutis, glandula ſubulata inter foliola, pedunculis quadrifloris, legumini-

bus tetragonis. *Swartz. prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 724.*

C. (*ſericea*) foliolis trijugatis acuminatis ovatis villoſis, floribus ſolitariis axillaribus, ſiliquis erectis. *Mill. d.*

C. (*ſenſitiva*) foliis quinquejugis et quadrijugis, foliis villoſe ciliatis, glandula pedicellata et villoſa inter omnia foliolorum paria. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 459. *Collect.* 2. *p.* 362.*

Paiomirioba II. *Piſ. braſ.* 185.

Seidenartige Caſſie. W.

Habitat in graminoſis ſubalpinis Jamaicae. ⊙ (v. v.)

16. CASSIA *occidentalis.*

C. foliis quinquejugis ovato-lanceolatis margine ſcabris: exterioribus majoribus: glandula baſeos petiolorum. *Sp. pl.* 539. *Mill. dict. n.* 1. *Fabric. helmſt.* 329. *Swartz obſ.* 159.

C. foliolis quatuor parium ovato-lanceolatis, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.

C. herbacea major erecta ramoſa, foliis ovato-acuminatis ſiliquis anguſtioribus compreſſis, ſpicis laxioribus terminalibus aſſurgentibus. *Brown. jam.* 224.

Senna occidentalis, odore opii viroſo, orobi pannonici foliis mucronatis, glabra. *Comm. hort.* 1. *p.* 51. *t.* 26. *Sloan. jam. hiſt.* 2. *t.* 176. 3. 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 512.

Weſtindiſche Caſſie. W.

Habitat in Jamaica. ♄ (v. v.)

Caulis *ſeſquipedalis, punctis vagis ſcaber, exaratus deorſum a ſingulo petiolo ſulcis duobus.* Folia *ſuperiora Foliolis quinque parium, ovato-lanceolatis, glabris, margine ſcabris, acuminatis, exterioribus ſenſim majoribus, foetidis.* Racemus *terminalis.* Flores *lutei absque macula.* Folia *impuberis plantae quinquejuga; adultae tantum trijuga.*

17. CASSIA *planiſiliqua.*

C. foliis quinquejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula baſeos petiolorum. *Roy. lugdb.* 468.

C. ſiliquis planis. *Plum. ſpec.* 18. *t.* 77.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 513.

Flachfrüchtige Caſſie. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

18. CASSIA *Fiſtula.*

C. foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petio-

lis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. * *Mat. med.* 111. *Haſſelq. it.* 468. *Mill. dict. n.* 8. *Blackw. t.* 381.
C. foliolis quinque parium lanceolatis: extimis minoribus. *Hort. cliff.* 158.
C. fiſtula alexandrina. *Bauh. pin.* 405. *Comm. hort.* 1. *p.* 215. *t.* 110. *Rumph. amb.* 2. *p.* 83. *t.* 21.
Conna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 37. *t.* 22.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 514.
Röhrenfrüchtige Caſſie. W.
Habitat in India, Aegypto. ♄
Stipulae *vix manifeſtae.* Folia *glabra, baſi aequalia.*

*19. CASSIA *patula.*
C. foliis quinquejugis oblongis acutiuſculis glabris, glandula baſeos petiolorum, ramis laevibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 51.
Ausgebreitete Caſſie. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. v.)
Folia *interdum ſejuga. Differt a C. occidentali et planiſiliqua,* foliis *apice non attenuatis.* Ait. l. c.

*20. CASSIA *lineata.*
C. foliis quinquejugis oblongiuſculis ſubtus pubeſcentibus ſubaequalibus, glandula obſoleta ſub infimis, pedunculis unifloris. *Swartz. prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 726. *
Geſtreifte Caſſie. W.
Habitat in ruderatis et cultis Jamaicae. ♃
Diverſa a C. piloſa; caule *magis fruticoſo rigido,* ramis *minime piloſis,* ſtipulis, pedunculis *brevibus et* leguminibus *linearibus.* Swartz l. c.

21. CASSIA *atomaria.*
C. foliis quinquejugis ovatis ſubtomentoſis, petiolis teretibus eglandulatis. *Sp. pl.* 540.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 515.
Punctirte Caſſie. W.
Habitat in America. *Dr. Iacquin.*
Caulis *mihi humanae altitudinis, lignoſus, cinereus, ramoſiſſimus.* Ramuli *et* Petioli *vix manifeſte pubeſcentes.* Petioli *atomis ſubferrugineis adſperſi, non canaliculati.* Folia *utrinque viridia, tactu tomentoſa, ovata; inferiora minora, obtuſiora, ſubemarginata, margine interiore baſeos non minore.* Stipulae *ſubulatae, ſaepe perſiſtentes a caſu foliorum praeſentis anni. Nondum mihi floruit in Horto Upſal.*

22. CASSIA *piloſa.*

C. foliis quinquejugis eglandulatis, ſtipulis ſemicordatis acuminatis, caule ſtricto piloſo. *Mant.* 68. *Swartz obſ.* 160. *

C. ſuffruticoſa erecta hirſuta, floribus ſingularibus ad alas. *Brown. jam.* 224.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 516.

Haarige Caſſie.

Habitat in Jamaicae *auſtralis aridis cultis.*

Caulis *erectiuſculus, fruticuloſus:* Ramis *erectis, undique valde piloſis.* Folia *glabra.* Stipulae *ſemicordatae, acuminatae, ciliatae.* Folia *laevia.* Pedunculi *erecti, gemini, uniflori, laeves.* Siliquae *oblongae, compreſſae.* Flores *pentandri.*

*23. CASSIA *arboreſcens.*

C. foliis ſubquinquejugis ellipticis glabris, glandula oblonga inter inferiora, ſtipulis ſubulato-falcatis, racemis axillaribus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 56. *

Wellia Tagera. *Rheed. mal.* 6. *p.* 17. *t.* 9. 10.

Baumartige Caſſie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

24. CASSIA *Senna.*

C. foliis ſejugis ſubovatis, petiolis eglandulatis. *Mat. med.* 110.

C. foliis tri-quadri-ſejugiſve ſubovatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 539. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 468.

Senna (*alexandrina*) foliolis 4-jugis lanceolatis acutis. *Mill. dict. n.* 1.

Senna Alexandrina ſ. foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 201. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.

β. Senna italica ſ. foliis obtuſis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 200. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

Senna (*italica*) foliolis quinquejugatis cordatis obtuſis. *Mill. dict. n.* 2.

Senna. *Dod. pempt.* 361.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 516.

Sennen Caſſie. W.

Habitat in Aegypto. ⊙

Stipulae *patentes.* Petioluli *luteo-colorati absque glandulis.* Legumina *ovali-oblonga, refalcata.*

*25. CASSIA *ruſcifolia.*

C. foliis ſubſejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula ad petioli baſin, lomento compreſſo marginato. W.

C. foliis ſejugis, foliolis lanceolatis acutis glabris, glandula ſupra baſin coſtae, pedunculis multifloris. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 71. *Collect.* 1. *p.* 43. *

Mäuſedornblättrige Caſſie. W.

Habitat in Maderae *rupibus.* ♄ (v. ſ.)

26. CASSIA *biflora.*

C. foliis ſejugis oblongiuſculis glabris: inferioribus minoribus, glandula ſubulata inter infima, pedicellis ſubbifloris. *Hort. cliff.* 159. *

C. biflora. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397. *

C. fruticoſa, foliis minoribus obovatis ſexjugatis, floribus geminis ſ. bigeminatis, racemis alaribus. *Brown. jam.* 223.

C. minor arboreſcens, ſiliquis planis articulatis. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 78. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 517.

Zweyblumige Caſſie. W.

Habitat in America. ♄

*27. CASSIA *chinenſis.*

C. foliis ſubſejugis ovatis acutis glabris, glandula ad petioli baſin, lomento cylindrico uncinato, transverſim coſtato. W.

C. foliis pinnatis ex quatuor ad ſeptem paribus, foliolis lanceolatis, glandula ſupra baſin coſtae, legumine transverſim coſtato. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 73. *Collect.* 1. *p.* 64. *

Chineſiſche Caſſie. W.

Habitat ad Peking *in* China. ♄

*28. CASSIA *multiglanduloſa.*

C. foliis ſejugis ovali-oblongis obtuſis piloſis, exterioribus majoribus, glandulis ſubulatis omnium parium, ſiliquis linearibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 52.

C. (*multiglanduloſa*) foliis ſejugis. foliolis obtuſis ſubtus et ad oras villoſis, glandula inter omnia foliorum paria. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 72. *Collect.* 1. *p.* 42. *

Vieldrüſige Caſſie. W.

Habitat culta in inſula Teneriffa. ♄

29. CASSIA *hirſuta.*

C. foliis ſejugis late ovatis acuminatis lanatis. *Lin. ſuppl.* 231.

C. foliis ſejugis ovatis acuminatis lanatis. *Hort. cliff.* 159. *Roy. lugdb.* 467.

C. americana foetida, foliis amplioribus villoſis. *Tourneſ. inſt.* 619.

Senna occidentalis, odore opii viroſo, foliis orobi pannonici mucronatis hirſutis. *Herm. lugdb.* 556.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 518.
Rauhe Caſſie. W.
Habitat in America.

30. CASSIA *tomentoſa.*
C. foliis ſex-ſ. octojugis, foliolis linearibus baſi oblique rotundatis ſupra hirtis, paniculis axillaribus, leguminibus villoſis. *Lin. ſuppl.* 231.
Filzige Caſſie. W.
Habitat in America *meridionali. Mutis.* ♄
Arbor *ramis lignoſis teretibus flexuoſis, villo denſiori molli albo, in ſiccis luteo, tectis.* Folia *petiolata pinnata ſex- ad octojuga.* Foliola *oppoſita lineari-lanceolata acuta integerrima, baſi oblique rotundata, ſupra viridia hirta, ſubtus alba ſ. lutea et tomentoſa, margine interiori obliterato.* Petiolus *tomentoſus.* Stipulae *ſemilunares ſ. lanceolatae tomentoſae deciduae.* Paniculae *axillares in ſummitate caulis ſolitariae.* Pedunculi *tomentoſi.* Flores *magnitudine mediocri lutei.* Siliquae *erectae compreſſae valde tomentoſae.*

31. CASSIA *ſerpens.*
C. foliis ſeptemjugis, floribus pentandris, caulibus filiformibus proſtratis herbaceis. *Sp. pl.* 541. *Swartz obſ.* 161.*
C. herbacea tenuiſſima procumbens, floribus ſingularibus ad alas. *Brown. jam.* 225.
Senna occidentalis ſiliqua ſingulari, foliis herbae mimoſae, floribus pediculis longioribus inſidentibus. *Sloan. hiſt.* 2. *p.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 518.
Kriechende Caſſie. W.
Habitat in Jamaicae *paſcuis aridis.* ⊙
Caules *filiformes, herbacei, proſtrati, rarius ad baſin ramoſi, glabri.* Foliola *oblonga, ſtriata, anguſtata.* Stipulae *ſubulatae.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, longitudine foliorum, nudi, horizontales.* Siliquae *erectae, rhombeo-oblongae; ad angulum rectum cum pedunculo poſitae.*

*32. CASSIA *mexicana.*
C. foliis ſeptemjugis, foliolis obtuſiuſculis pubeſcentibus ciliatis, glandula cylindrica inter infima. W.
C. foliis ſeptemjugis villoſulis, glandula tereti inter infima. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 41. *t.* 203. *

Mexicaniſche Caſſie. W.
Habitat in Mexico.

*33. CASSIA *anguſtifolia.*

C. foliis ſeptemjugis lanceolatis, extimis majoribus, petiolis eglandulatis, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 29. *

Schmalblättrige Caſſie. W.
Habitat in Arabia. ♄

A C. Senna differt: numero *et* figura *foliorum*, leguminibus *maturis intus non curvatis. A C. liguſtrina* foliolis *extimis majoribus*, petiolis *eglandulatis diſcrepat.* Vahl. l. c.

34. CASSIA *liguſtrina.*

C. foliis ſeptemjugis lanceolatis, extimis minoribus, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 100. *Gron. virg.* 47. *Roy. lugdb.* 467.

C. liguſtri folio. *Plum. ſpec.* 10. *Dill. elth.* 350. *t.* 259. *f.* 338.

C. bahamenſis, pinnis foliorum mucronatis anguſtis, calyce floris non reflexo. *Mart. cent.* 21. *t.* 21.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 519.

Liguſterartige Caſſie. W.
Habitat in Virginia, Bahama. ♄
Folia glabra, margine piloſa.

*35. CASSIA *florida.*

C. foliis ſeptemjugis ovali-oblongis glabris emarginatis eglanduloſis, floribus racemoſis, bracteis ſpathulatis mucronatis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 57. *

Vielblütige Caſſie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

*36. CASSIA *ſtipulacea.*

C. foliis ſuboctojugis ovato-lanceolatis, glandula inter inferiora, ſtipulis ovatis maximis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 52.

Pſeudo-Acacia foliis mucronatis, flore luteo. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 56. *t.* 42.

Chiliſche Caſſie. W.
Habitat in Chili. ♄

37. CASSIA *alata.*

C. foliis octo-jugis ovali-oblongis: *exterioribus* minoribus, petiolis eglandulatis, ſtipulis patulis. *Syſt. Veget.* 328. *Swartz obſ.* 162. *

C. foliis octojugis ovali-oblongis: inferioribus minoribus, petiolis eglandulatis, ſtipulis patulis. *Sp. pl.* 2.

p. 541. *Hort. cliff.* 158. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 467. *Mill. dict. n.* 3.
C. (*herpetica*) foliis circiter decemjugis oblongis apice rotundatis, ſiliquis membranaceis quadrangulis fragilibus rigidis. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 24. *t.* 45. *f.* 2. *
C. ſiliquis quadrialatis, ſpicis terminalibus, foliis plurimis pinnatis majoribus obovatis. *Brown. jam.* 224.
C. ſylveſtris foetida, ſiliquis alatis. *Plum. ſpec.* 18.
Faba dulcis. *Mer. ſurin.* 58. *t.* 58.
Herpetica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 35. *t.* 18.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 519.
Geflügelte Caſſie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♃ (v. v. ſ. fl.)
Planta 11 *pedum.* Caulis *craſſus, herbaceus tamen.* Stipulae *ſemicordatae.* Petioli *flaveſcentes, valde canaliculati ut fere marginati.* Foliola 16-20, *lineari-ovata, obtuſa: inferiora minora.* Glandulae *foliorum nullae, ſed ſetae breviſſimae,* 2, *diſtantes.*

38. CASSIA *marilandica.*
C. foliis octojugis ovato-oblongis aequalibus, glandula baſeos petiolorum. *Hort. cliff.* 159. *Hort. upſ.* 100. *Roy. lugdb.* 467. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 12. *n.* 22. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 133. *Willd. arb.* 54. *
C. mimoſae foliis, ſiliqua hirſuta. *Dill. elth.* 351. *t.* 260. *f.* 339.
C. foliis octo ſaepius parium ovato-oblongis aequalibus, glandula ſupra baſin petiolorum. *Gron. virg.* 65.
C. marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. *Mart. cent.* 23. *t.* 23.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 520.
Marilandiſche Caſſie. W.
Habitat in Virginia, Marilandia. ♃ (v. v.)
Caulis et folia adſperſa pilis raris.

*39. CASSIA *faſtigiata.*
C. foliis novemjugis oblongis glabris, glandula pedicellata inter omnia foliola, floribus racemoſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 57. *
Gipfelblütige Caſſie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

*40. CASSIA *frondoſa.*
C. foliis novemjugis ovali-oblongis glabris obtuſiuſculis, glandula cylindrica inter inferiora, petiolo baſi eglanduloſo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 35.

C. (*Criſta*) foliis pinnatis ex ſeptem et novem paribus, foliolis oblongis obtuſis, glandula terete et obtuſa inter infima. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 74. *Collect.* 1. *p.* 82.*.
Blattreiche Caſſie. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

41. CASSIA *tenuiſſima.*
C. foliis novemjugis oblongis, glandula ſubulata inter infima. *Roy. lugdb.* 478.
Senna ſpuria fruteſcens, ſiliquis tenuiſſimis. *Houſt. mſſ.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 512.
Dünnfrüchtige Caſſie. W.
Habitat in Havana. ♄

*42. CASSIA *virgata.*
C. foliis decemjugis ovato-lanceolatis villoſis, glandula petiolari pedicellata, pedunculis unifloris foliolis longioribus. *Swartz prod.* 66. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 728.*
Ruthenförmige Caſſie. W.
Habitat in Jamaica, Hiſpaniola. ♄
C. Chamaecriſtae proxima, ſed differt; caule *fruticoſo ramoſo,* ramis *rigidis ſubflexuoſis erectis:* foliis *anguſtioribus acutioribus.* Swartz l. c.

43. CASSIA *Sophora.*
C. foliis decemjugis lanceolatis, glandula baſeos oblonga. *Fl. zeyl.* 150.
Senna vigintifolia ſiliquis teretibus. *Burm. zeyl.* 213. *t.* 98.
Galegae affinis. *Bauh. pin.* 352.
Gallinaria acutifolia. *Rumph. amb.* 5. *p.* 283. *t.* 97. *f.* 1.
Ponnam-Tagera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 101. *t.* 52.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 521.
Sophoraartige Caſſie.
Habitat in Indiae *umbroſis.*
Facies *foliorum C. liguſtrinae.* Folia *pinnata, foliolis circiter* 10 *parium, coriariae facie, foliolis lanceolatis, ſive ovato-lanceolatis acutis viridibus herbaceis glabris ſubaequalibus ſubpetiolatis.* Glandula *oblonga ſupra baſin petioli communis.* Racemus *parvus ex alis.* Corollae *albido-flaveſcentes venis fuſcis.* Antherae *tres ſupremae minimae ſteriles, tres infimae arcuatae, quatuor intermediae rectae.* Fl. zeyl.

44. CASSIA *bracteata.*
C. foliis decemjugis oblongis obtuſis eglandulatis, race-

mis elongatis, bracteis ovatis tumidis imbricatis, legumine quadrangulari compreſſo. *Lin. ſuppl.* 232.
Beblätterte Caſſie. W.
Habitat in Surinamo. *C. G. Dalberg.*

Folia *plus quam pedalia octo ſ. decemjuga.* Foliola *palmaria linearia, apice rotundata, ſubtus mollia cana.* Petiolus *compreſſus inter paria canaliculatus.* Racemus *maximus ex floribus denſe congeſtis, inter bracteas ovatas magnas tumidas imbricatas nervoſas pubeſcentes, ſtatim ante explicationem floris caducas.* Flores *lutei.* Rudimenta *leguminum erant incurva compreſſa, angulis quatuor.*

45. CASSIA *auriculata.*
C. foliis duodecim-jugis obtuſis mucronatis, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipulis reniformibus barbatis. *Fl. zeyl.* 151. *
Senna ſpuria maderaſpatana, caule ad foliorum alas geminatis ſubrotundis appendiculis auriculato. *Pluk. alm.* 341. *t.* 314. *f.* 4. *Raj. dendr.* 110.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 522.
Geöhrte Caſſie. W.
Habitat in India.

*46. CASSIA *brevifolia.*
C. ramoſiſſima ſubglabra, foliis duodecim-jugis obovatis, pedunculis lateralibus unifloris foliis longioribus. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 644. *
Kurzblättrige Caſſie. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

Folia *quinque ſ. ſex lineas longa, e* 12 *rarius* 14 *paribus compoſita.* Foliola *minutiſſima valde approximata.* Pedunculus *ſupraaxillaris foliis multo longior.* Lamarck l. c.

*47. CASSIA *mollis.*
C. foliis duodecim-jugis ovali-oblongis, molliter villoſis, baſi aequalibus, apice integris eglanduloſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 57. *
C. foliis plurimis oblongis, flore rubello, ſiliquis maximis craſſioribus trinerviis. *Brown. jam.* 223.
C. nigra ſ. fiſtuloſa ſecunda. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 44.
C. fiſtula flore incarnato braſiliana. *Breyn. cent.* 58. *t.* 21.
C. fiſtula braſiliana. *Bauh. pin.* 403.
Weiche Caſſie. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

48. CASSIA *javanica.*
C. foliis duodecim-jugis ovali-oblongis glabris eglandulofis obtuſis emarginatis baſi obliquis, racemis axillaribus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 58. *
C. foliis duodecim-jugis oblongis obtuſis glabris, glandula nulla. *Sp. pl.* 542.
C. fiſtula javanica, flore carneo. *Comm. hort.* 1. *p.* 217. *t.* 111.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 522.
Javaniſche Caſſie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

49. CASSIA *grandis.*
C. foliis vigintijugis ſubholoſericeis eglandulatis. *Lin. ſuppl.* 230.
Arbor ſiliquoſa braſiliana, ſiliqua hiſpida ferruginea, ceratoniae facie. *Breyn. cent. t.* 14.
Groſse Caſſie. W.
Habitat in Surinamo. ♄ *C. G. Dahlberg.*
Arbor *robuſta valida, ramis ſubtiliſſime holoſericeis.* Folia *circiter vigintijuga absque glandulis.* Foliola *oblonga obtuſa aequalis latitudinis, ſecundum longitudinem ſubtiliſſime holoſericea.* Siliquae *ſesquipedales compreſſiuſculae digitos tres latae ponderoſiſſimae acuminatae, ſuturis elevatis teretibus extantibus; altera geminata.*

* * Chamaecriſtae *foliolis numeroſis.*

*50. CASSIA *nigricans.*
C. foliis quatuordecim-jugis lineari-oblongis obtuſiſſimis mucronatis, glandula baſeos ſeſſili. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 30. *
Caſſia procumbens. *Forſk. Cat. pl. arab. p.* 111.
Schwärzliche Caſſie. W.
Habitat in Arabia *felici.* ♄

*51. CASSIA *polyphylla.*
C. foliis multijugis, foliis ellipticis obtuſis ciliatis, glandula oblonga ſeſſili inter infima, pedunculis ſubbifloris. W.
C. foliis a quinquejugis ad duodecim-juga, in ramis ſenioribus aggregatis, foliolis oblongis ciliatis, facie glabris, dorſo hiſpidulis, glandula pyramidali ſeſſili inter foliola infima, pedunculis ſubbifloris. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 460. *Collect.* 4. *p.* 104. *
Vielblättrige Caſſie. W.
Habitat in inſula Porto Rico. ♄

52. CASSIA *Chamaecriſta.*

C. foliis multijugis, glandula petiolari pedicellata, ſtipulis enſiformibus. *Hort. upſ.* 101. *Swartz obſ.* 164. *

C. foliolis plurium parium linearibus, ſtipulis ſubulatis. *Hort. cliff.* 158. *Gron. virg.* 47.

C. ſuffruticoſa erecta, foliolis linearibus plurimis pinnatis, floribus ſingularibus vel geminis ſparſis. *Brown. jam.* 225.

Chamaecriſta pavonis major. *Comm. hort.* 1. *p.* 53. *t.* 37.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 524.

Niedrige Caſſie. W.

Habitat in Jamaica, Barbados, Virginia. ⊙ (v. v.)

Foliola 20. *Pedicellus ſpatio ſupra petiolum egrediens.* Petala *duo ſuperiora macula purpurea.* Antherae *rubrae.*

53. CASSIA *glanduloſa.*

C. foliis multijugis multiglandulatis, ſtipulis ſubulatis. *Sp. pl.* 542.

Chamaecriſta pavonis americana, ſiliqua multiplici. *Breyn. cent.* 64. *t.* 24.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 524.

Drüſige Caſſie. W.

Habitat in Jamaica, Guadeloupe. (v. ſ.)

Caules *ſuffruticoſi; ramis nudiuſculis.* Foliola *lanceolata petiolo, inter ſingula paria, glandula pedicellata notato.* Stipulae *ſubulatae.* Pedunculi *axillares foliorum, gemini, uniflori, folio breviores.* Siliquae *orobi.* Flores *hexandri antheris duabus longiſſimis.*

54. CASSIA *mimoſoides.*

C. foliis multijugis linearibus: glandula baſeos petiolorum obſoleta, ſtipulis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 154.

Mimoſa herba zeylanica, foliis et ſiliquis anguſtis glabris. *Burm. zeyl.* 160.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 525.

Sinnpflanzenartige Caſſie. W.

Habitat in Zeylona.

Petioli *absque glandula.* Caulis *non flexuoſus.* Stipulae *lanceolatae, ſeta terminatae.*

Caulis *erectus ſimpliciſſimus teres bipedalis altior.* Folia *pinnata: foliolis infinitis linearibus, glandula ſeſſili ſupra baſin petioli.* Stipulae *lanceolatae ſeta terminatae; ex alis.* Pedunculi *duo, erecto uniflori filiformes, verſus apicem bractea duplici lanceolata, ter-*

minati flore patulo. Stamina 10, *quorum 7 cum antheris oblongis.* Legumina *linearia.* Fl. zeyl.

*55. CASSIA *microphylla.* W.

C. foliis multijugis linearibus mucronatis, glandula inter infima, ſtipulis lanceolatis mucronatis, pedunculis ſolitariis unifloris, caule ramoſo virgato. W.

Feinblättrige Caſſie. W.

Habitat in inſula St. Crucis. (v. ſ.)

Caulis *pubeſcens.* Lomentum *compreſſum lineare pube tenui tectum. Valde affinis praecedenti, diſtinxi tantum hanc auctoritate Clariſſ. Vahl, qui diverſam eſſe credit.* W.

56. CASSIA *flexuoſa.*

C. foliis multijugis, ſtipulis dimidiato-cordatis. *Sp. pl.* 543.

Senna ſpuria occidentalis, ſiliqua ſingulari, foliis herbae mimoſae. *Herm. lugdb.* 558. *Sloan. jam.* 150. *Raj. ſuppl.* 18.

Chamaecriſta pavonis braſiliana, ſiliqua ſingulari. *Breyn. cent.* 65. *t.* 23.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 525.

Gebogene Caſſie. W.

Habitat in Braſilia. ⊙

*57. CASSIA *capenſis.*

C. foliis multijugis, foliis linearibus, caule flexuoſo erecto villoſo. *Thunb. prod.* 79.

Capiſche Caſſie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

58. CASSIA *nictitans.*

C. foliis multijugis, floribus pentandris, caule erectiusculo. *Sp. pl.* 543.

C. calycibus acutis, floribus pentandris. *Hort. cliff.* 497. *t.* 36. *Hort. upſ.* 101.

Senna ſpuria virginiana, mimoſae foliis, floribus parvis nictitantibus. *Pluk. alm.* 341. *t.* 314. *f.* 5.

Amoena moeſta. *Rumph. amb.* 6. *p.* 147. *t.* 61. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 526.

Virginiſche Caſſie. W.

Habitat in Virginia. ⊙ (v. v.)

Glandula *petiolorum pedicellata et fuſca.* Pedunculi *saepius tripartiti et triflori, ſpatio ſupra alas enati.*

59. CASSIA *procumbens.*
C. foliis multijugis eglandulatis, caule procumbente. *Sp. pl.* 543.
C. americana procumbens herbacea, mimoſae foliis, floribus parvis ſiliquis anguſtis planis. *Comm. petrop. t.* 11.
Chamaecriſta mariana, flore minore. *Pet. ſicc.* 243. *n.* 40.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 527.
Liegende Caſſie. W.
Habitat in Indiis, Virginiae *apricis ſiccis.* ⊙

*814. CUBAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 702.

Cal. turbinatus 5-partitus. *Cor.* 5-petala ſubaequalis. *Stam.* calyci inſerta longa omnia foecunda, tria ſuperiora breviora. *Legumen.*

*1. CUBAEA *paniculata.*
C. foliis pinnatis, foliolis oppoſitis.
Tachigali paniculata. *Aubl. guj.* 1. *p.* 372. *t.* 143. *f.* 1.*
Riſpenblütige Cubäa. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*2. CUBAEA *trigona.*
C. foliis pinnatis, foliolis alternis.
Tachigali trigona. *Aubl. guj.* 1. *p.* 374. *t.* 143. *f.* 2.*
Dreyeckige Cubäa. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄
Simillima praecedenti cujus forte varietas, differt tantum: foliolis *majoribus alternis, nec oppoſitis.* Rachis *foliorum in binis ſpeciebus trigona.* W.

815. CAESALPINIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 701. 703.

Cal. 5-partit. lacinia infima majori ſubfornicata. *Petala* 5. *Stam.* baſi lanata omnia foecunda. *Legumen* compreſſum.

1. CAESALPINIA *bijuga.*
C. aculeata, foliis duplicato-bijugis, foliolis obcordatis calycibusque glabris, ſtaminibus corollam aequantibus. *Swartz obſ.* 166.

Poinciana (*bijuga*) aculeis ſolitariis, foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 544. *Iacq. amer.* 123. *n.* 2.
Caeſalpinia (*veſicaria*) caule aculeato, foliis obcordatis ſubrotundis. *Sp. pl.* 545.
C. ſpinoſa, foliis minoribus obcordatis bipinnatis. *Brown. jam.* 227.
Senna ſpuria arborea ſpinoſa, foliis alatis ramoſis ſ. decompoſitis flore luteo, ſiliquis brevibus ſulcatis nigris ſabinae odore. *Sloan. jam.* 149. *hiſt.* 2. *p.* 50. *t.* 181. *f.* 2. 3. *bona. Raj. dendr.* 111.
Acacia glorioſa jamaicenſis, foliis minoribus ſubrotundis, ſpinis ad genicula ſimplicibus, floribus flavo-purpureis. *Plum. alm.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 528. 569.
Ausgerandetblättrige Cäſalpinie. W.
Habitat in Jamaica. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

2. CAESALPINIA *pulcherrima*.

C. aculeata, foliolis oblongo-ovalibus emarginatis, calycibusque glabris, corymbis ſimplicibus, petalis fimbriatis, ſtaminibus longiſſimis. *Swartz obſ.* 166.
Poinciana (*pulcherrima*) aculeis geminis. *Hort. upſ.* 101. *Iacq. amer.* 122. *Mill. dict.*
Poinciana aculeata, foliis bipinnatis, floribus croceis pulcherrimis, pedunculis longis ſpicatis inſidentibus. *Brown. jam.* 1. *p.* 225.
Senna ſpuria, arborea, ſpinoſa, foliis alatis ramoſis ſeu decompoſitis, flore ex luteo et rubro ſpecioſo. *Sloan. jam.* 2. *p.* 49.
Criſta pavonis flore elegantiſſimo variegato. *Burm. zeyl.* 79.
Frutex pavonius, Criſta pavonis. *Breyn. cent.* 61. *t.* 22. *Raj. hiſt.* 981.
Acacia orientalis glorioſa, coluteae foliis, ad genicula ſpinis gemellis aculeata. *Pluk. alm.* 5.
Flos pavonis. *Mer. ſur.* 45. *t.* 45?
Tſietti mandaru. *Rheed. mal.* 6. *p.* 1. *t.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 528.
Schönſte Cäſalpinie. W.
Habitat in Indiis. ♄ (v. ſ.)

Petiolus communis *Glandula una ad baſin et alia ad ſupremum par; partialis ſupra baſin mucronibus duobus.* Frutex 12-*pedalis. Emmenagoga Tinctura ex* Herb. *manip.* 3 *et* Sem. *no.* 20. Doſis *uncia una. Diſſ alt. de pl. Surin. anno* 1776. *edit.*

3. CAESALPINIA *elata.*
C. inermis, foliolis linearibus obtuſis cum acumine, corymbis compoſitis, calycibus coriaceis tomentoſis, petalis fimbriatis, ſtaminibus longiſſimis. *Swartz obſ.* 166.
Poinciana caule inermi. *Cent.* 146. *Forſkaehl. aegypt.* 86.
Poinciana foliis bipinnatis, foliolis ovato-oblongis, caule inermi. *Hort. cliff.* 158. *Fl. zeyl.* 159.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 521.
Hohe Cäſalpinie. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)
Foliola *integerrima, minuta.* Calyces *coriacei.* Filamenta *atropurpurea, baſi villoſa, longiſſima.*

*4. CAESALPINIA *Coriaria.*
C. inermis, foliolis linearibus obtuſis, racemis paniculatis, calycibus glabris, ſtaminibus corolla duplo longioribus. W.
Poinciana (*Coriaria*) caule inermi racemis ſpicatis. *Jacq. amer.* 123. *t.* 175. *f.* 36. *
Siliqua arboris Guatapanae ex Curacao inſula. *Breyn. cent. p.* 58. *f.* 5.
Libidibi. *Berg. Act. holm.* 1774. *p.* 57.
Gerber Cäſalpinie. W.
Habitat in maritimis inundatis ſalſis Curacao *et* Carthagenae. ♄ (v. ſ.)

5. CAESALPINIA *braſilienſis.*
C. inermis, foliolis ovato-oblongis, rachidibus pubeſcentibus, calycibus tomentoſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Swartz obſ.* 166.
C. caule foliisque inermibus. *Mat. med.* 112.
C. arborea inermis, foliis minoribus: paribus bipinnatis, ligno kermeſino: Braſiletto. *Brown. jam.* 227.
C. foliolis duplicato-pinnatis, foliolis emarginatis, floribus decandris. *Mill. dict. n.* 1.
Pſeudo-Santalum croceum. *Sloan. jam.* 213. *hiſt.* 2. *p.* 184.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 566.
Braſiliſche Cäſalpinie. W.
Habitat in Carolina, Jamaica, Braſilia. ♄
Braſiletto *officinis dicta.*

*6. CAESALPINIA *echinata.*
C. aculeata, foliolis ellipticis obtuſis, racemis ſimplicibus, leguminibus echinatis. W.

C. (*echinata*) caule ramisque aculeatis, foliolis ovatis obtuſis, leguminibus echinatis. *Lamarck encyclop.* 1. *p.* 455. *
Pſeudo-Santalum rubrum ſ. arbor Braſilia. *Bauh. pin.* 393.
Arbor Braſilia. *Raj. hiſt.* 1736.
Acacia glorioſa ſpinis armata, cujus lignum Braſilia dictum, tinctoria. *Pluk. alm.* 5.
Ibirapitanga. *Piſ. braſ.* 164.
Fernambuc Cäſalpinie. W.
Habitat in Braſilia. ♄

7. CAESALPINIA *Sappan.*

C. aculeata, foliolis oblongo-ovalibus inaequilateris obtuſis, calycibusque glabris, ſtaminibus corolla longioribus, petalo ſupremo minore. *Swartz obſ.* 167.
C. caule aculeato, foliolis oblongis inaequilateralibus emarginatis. *Fl. zeyl.* 158. *Roxb. coram.* 1. *p.* 17. *t.* 16. *
Ligno braſiliano ſimile. *Bauh. pin.* 393.
Lignum Sappan. *Rumph. amb.* 4. *p.* 56. *t.* 21. *Meiſt. it.* 90.
Tſiam pangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 570.
Braſilienholz Cäſalpinie. W.
Habitat in Indiis. ♄

8. CAESALPINIA *Criſta.*

C. aculeata, foliolis ovalibus, racemis ſimplicibus, petalis ovatis calyce glabro brevioribus, ſtaminibus calyce longioribus. *Swartz. obſ.* 167.
C. caule aculeato, foliolis ovatis integris, floribus pentandris. *Sp. pl.* 544.
C. foliis duplicato-pinnatis, foliolis ovatis integerrimis, floribus pentandris. *Mill. dict. n.* 2.
Caeſalpina polyphylla aculeis horrida. *Plum. gen.* 26. *t.* 68.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 568.
Vielſtachliche Cäſalpinie. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*9. CAESALPINIA *mimoſoides.*

C. aculeata, foliolis oblongis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus, leguminibus lanuginoſis. W.
C. caule petiolis pedunculisque aculeatis, foliolis oblon-

gis obtuſis parvis, leguminibus lanuginoſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 457. *
Mimoſa malabarica, flore pentapetalo, ſiliquis lanuginoſis. *Raj. hiſt.* 1740.
Kal-todda-vaddi. *Rheed. mal.* 6. *p.* 15. *t.* 8.
Sinnpflanzenartige Cäſalpinie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Eſt ſenſitiva ut nonnullae Mimoſae, notante Rheede. W.

816. GUILANDINA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 704.

Cal. 1-phyllus, hypocrateriformis. *Petala* calycis collo inſerta, ſubaequalia. *Legumen.*

1. GUILANDINA *Bonduc.*

G. aculeata, pinnis ovatis, foliolis aculeis ſolitariis. *Mill. dict. n.* 1. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 429. *
G. caule fructuque aculeatis. *Hort. cliff.* 158.
Cäſalpinia aculeis recurvis, foliolis ovatis. *Fl. zeyl.* 157.
Bonduc vulgare majus polyphyllum. *Plum. gen.* 25.
Acacia glorioſa, lentiſci folio, ſpinoſa flore ſpicato luteo, ſiliqua magna muricata. *Pluk. alm.* 4. *t.* 2. *f.* 2.
Lobus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus. *Sloan. jam.* 144. *hiſt.* 2. *p.* 40.
Frutex globulorum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 89. *t.* 48.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 532.
Gemeine Guilandine. W.
Habitat in Indiis. ♄

2. GUILANDINA *Bonduccella.*

G. aculeata, pinnis oblongo-ovatis, foliolis aculeis geminis. *Mill. dict. n.* 2. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 429. * *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 30.
G. aculeata, foliolis ovalibus acuminatis. *Fl. zeyl.* 156. *Hort. upſ.* 101.
G. ſpinoſa, foliis bipinnatis ovatis cum acumine, ſeminibus cinereis. *Brown. jam.* 228.
Glycyrrhiza (*aculeata*) ramis rachibusque foliorum univerſalibus et partialibus aculeatis. *Forſk. deſcr.* 135.
Bonduc vulgare minus polyphyllum. *Plum. gen.* 25.
Criſta Pavonis, glycyrrhizae folio, minor repens ſpinoſiſſima, flore luteo ſpicato minimo, ſiliqua latiſſima

echinata, ſemine rotundo cinereo. *Breyn. prod.* 3. *app.* 33. *t.* 28.
Globuli majores. *Rumph. amb.* 5. *p.* 92. *t.* 49. *f.* 1.
Lobus echinatus fructu caeſio, foliis longioribus. *Sloan. jam.* 144. *hiſt.* 2. *p.* 41.
Caretti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 35. *t.* 22.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 533.
Zwey ſtachliche Guilandine. W.
Habitat in Indiis. ♄ (v. ſ.)

3. GUILANDINA *Nuga.*
G. caule inermi, foliis petiolo primario ſubtus aculeis geminis. *Sp. pl.* 546. †
Nugae ſylvarum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 94. *t.* 50.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 534.
Stachelloſe Guilandine. W.
Habitat in Amboina. ♄
Legumina laevia ſunt.

*4. GUILANDINA *paniculata.*
G. ramis petiolisque aculeatis, floribus paniculatis ebracteatis, leguminibus monoſpermis laevibus. *Lamarck encyclop.* 1. *p.* 429. *
Ticanto. *Adanſ. fam.* 319.
Cacu mullu. *Rheed. mal.* 6. *p.* 33. *t.* 19.
Riſpenblütige Guilandine. W.
Habitat in Malabaria *et* Nova Hibernia. ♄

*5. GUILANDINA *axillaris.*
G. aculeata, foliis pinnatis, floribus axillaribus ſubſolitariis, leguminibus monoſpermis villoſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 430. *
Bau-caretti. *Rheed. mal.* 6. *p.* 35. *t.* 20.
Winkelblütige Guilandine. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

*817. HYPERANTHERA.

Vahl. ſymb. 1. *p.* 30.

Cal. 5-partitus. *Petala* calyci inſerta inaequalia. *Legumen* 3-valve toruloſum. *Semina* alata.

*1. HYPERANTHERA *decandra.* †
H. floribus decandris, foliis ſubbipinnatis; foliolis inferioribus ternatis, leguminibus ſuboctogonis. W.

Anoma (*Moringa*) foliis alternis bipinnatis, ſiliquis polygonis, ſeminibus triquetro-alatis. *Loureiro cochin.* 342. *
Zehnfädige Behennuſs. W.
Habitat in India. ♄
An varietas ſequentis? W.

2. HYPERANTHERA *Moringa.*

H. floribus ſemidecandris, foliis ſubbipinnatis, foliolis inferioribus ternatis, leguminibus trigonis. W.
H. (*Moringa*) floribus ſemidecandris, foliis ſubbipinnatis, foliis inferioribus ternatis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 30.*
Anoma (*Morunga*) foliis oppoſitis bipinnatis, ſiliquis trigonis, ſeminibus triquetro-alatis. *Loureiro cochin.* *p.* 343. *
Moringa zeylanica. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 393. * *illuſt. gen. t.* 337. *Schreb. gen. n.* 1606.
Guilandina (*Moringa*) inermis, foliis ſubbipinnatis, foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Mat. med. p.* 112. *Mill. dict. n.* 4. *Swartz obſ.* 167. * *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 461. *Collect.* 2. *p.* 371. *
Lignum peregrinum aquam coeruleam reddens. *Bauh. pin.* 416.
Moringha zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloſo. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.
Morungu. *Rheed. mal.* 6. *p.* 19. *t.* 11. *Rumph. amb.* 1. *p.* 184. *t.* 74, 75.
Balanus Myrepſica. *Blackw. t.* 386.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 573.
Gemeine Behennuſs. W.
Habitat in Zeylona, America, Aegypto. ♄

Polygama *ex Hermaphroditis duobus.* Legumen *longiſſimum, triquetrum,* 3-*valve, laeve, valvulis triquetris, uniloculare.* Semina *alterna, remota, longitudinaliter digeſta, triquetra.*

*3. HYPERANTHERA *ſemidecandra.*

H. floribus ſemidecandris, foliis bipinnatis, apice ſimpliciter pinnatis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 30.
Hyperanthera peregrina. *Forſk. deſcr.* 67. *
Gymnocladus (*arabica*) foliis bipinnatis, petiolo communi glanduloſo, floribus inaequalibus hermaphroditis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 726.
Arabiſche Behennuſs. W.
Habitat in Arabia. ♄

*4. **HYPERANTHERA** *cochinchinenſis.* †

H. floribus ſemidecandris, foliis bipinnatis tomentoſis, leguminibus bivalvibus, ſeminibus nudis. W.

Anoma (*cochinchinenſis*) foliis oppoſitis bipinnatis, ſiliquis ſubcompreſſis bivalvibus, ſeminibus nudis. *Loureiro cochin.* 343. *

Cochinchineſiſche Behennuſs. W.

Habitat in Cochinchina. ♄

*818. SCHOTIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 705.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5, calyci inſerta, lateribus invicem incumbentibus clauſa. *Legumen* pedicellatum.

1. **SCHOTIA** *ſpecioſa.*

S. ſpecioſa. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 75. *Collect.* 1. *p.* 93. * *Ait. Kew.* 2. *p.* 56.

Schotia afra. *Thunb. prod.* 79.

Theodora ſpecioſa. *Medic. monogr. p.* 16. *t.* 1.

Guajacum (*afrum*) foliis multijugis acutis. *Sp. pl.* 547. *Mill. dict. n.* 3.

Guilandinoides. *Hort. cliff.* 439.

Acacia africana, quae Acaciae ſimilis, foliis myrti parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloide. *Walth. hort.* 2. *t.* 2.

Afra arbor acaciae ſimilis foliis myrti aculeatis ſplendentibus. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 57.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 582.

Prächtige Schotie. W.

Habitat in Senegal *et ad* Cap. b. ſpei *prope* Moſſel-Bay. ♄ (v. f.)

Rami *rigidi.* Folia *alterna pinnata octojuga.* Petiolus *communis marginatus articulatus canaliculatus.* Foliola *ovato-oblonga oppoſita integerrima mucronata glabra rigidula perennia, baſi interiore laeviſſime abbreviata.* Stipulae *ramis adpreſſae ſubulatae minimae.*

819. GUAIACUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 727.

Cal. 5-fidus, inaequalis. *Petala* 5, calyci inſerta. *Capſ.* angulata, 3 ſ. 5-locularis.

*1. GUAIACUM *dubium.* †
G. foliis conjugatis oblongo-lanceolatis obtuſis. *Forſt. prod. n.* 186.
Zweifelhaftes Franzoſenholz. W.
Habitat in inſula Tongatabu. ♄

2. GUAIACUM *officinale.*
G. foliolis bijugis obtuſis. *Mat. med.* 112. *Mill. dict. n.* 1. *Swartz obſ.* 168. *
G. foliis pinnatis: foliolis quaternis obtuſis. *Hort. cliff.* 187.
G. foliis fere impetiolatis bijugis obovatis et leniter radiatis, pinnis et ramulis dichotomis. *Brown. jam.* 225.
G. flore coeruleo, fructu ſubrotundo. *Plum. gen.* 39.
G. jamaicenſe, foliis velut muria conditis ſpiſſius virentibus, flore ſubcaeruleo. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 4.
G. magna matrice. *Bauh. pin.* 448.
Pruno vel Evonymo affinis arbor, folio alato buxeo ſubrotundo. *Sloan. jam.* 186. *hiſt.* 2. *p.* 133. *t.* 222. *f.* 3. 4. 5. 6.
Arbor ligni Sancti vel Guajacum. *Seb. theſ.* 1. *p.* 86. *t.* 53. *f.* 2. *Blackw. t.* 350. *n.* 1. 2.
Guayacum. *Cluſ. exot.* 312. 314.
β. Guajacum jamaicenſe, lentiſci ſubrotundis foliis laete virentibus; flore albo. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 579.
Vierblättriges Franzoſenholz. W.
Habitat in Hiſpaniola, Jamaica. ♄ (v. ſ.)

3. GUAIACUM *ſanctum.*
G. foliolis multijugis obtuſis. *Mill. dict. n.* 2.
G. foliis pinnatis, foliolis obverſe ovatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 208.
G. flore coeruleo fimbriato, fructu tetragono. *Plum. gen.* 39.
G. americanum, lentiſci folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 171. *t.* 88.
G. propemodum ſine matrice. *Bauh. pin.* 448.
Iaſminum vulgo americanum ſ. Evonymo affinis occidentalis, alatis ruſci foliis, nucifera, cortice ad genicula fungoſo. *Pluk. alm.* 159. *t.* 94. *f.* 4.

Lignum vitae ex Braſilia. *Blackw. t.* 350. *f.* 3. 4..
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 581.
Vielblättriges Franzoſenholz. W.
Habitat in Americes *inſula ſ. Iohannis de Porto Rico.* ♄

820. CYNOMETRA.

Cal. 4-phyllus. *Antherae* apice bifidae. *Legumen* carnoſum, lunatum, 1-ſpermum.

1. CYNOMETRA *cauliflora.*

C. trunco florifero. *Act. upſ.* 1741. *p.* 79. *Fl. zeyl.* 166.
Cynomorium. *Rumph. amb.* 1. *p.* 163. *t.* 62. *Burm. ind.* 100.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 583.
Stammblütige Hundsruthe. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ. c. fr.)

2. CYNOMETRA *ramiflora.*

G. ramis floriferis. *Act. upſ.* 1741. *p.* 79. *Fl. zeyl.* 167.
Cynomorium ſylveſtre. *Rumph. amb.* 1. *p.* 164. *t.* 63.
Iripa. *Rheed. mal.* 4. *p.* 65. *t.* 31. *Raj. hiſt.* 1675. *Burm. ind.* 100.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 585.
Aſtblütige Hundsruthe. W.
Habitat in India. ♄

*821. CRUDIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 711.

Cal. monophyllus, limbo 4-fido. *Cor.* 0. *Filamenta* baſi dilatata. *Samara* ſubdiſperma orbiculata.

*1. CRUDIA *ſpicata.*

C. foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis. W.
Apalatoa ſpicata. *Aubl. guj.* 1. *p.* 383. *t.* 147.*
Aehrenblütige Crudie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Folia *alterna pinnata, foliolis alternis glabris.* Racemi *ſimplices axillares.* W.

*2. CRUDIA *aromatica.*
C. foliis ſimplicibus ellipticis acuminatis. W.
Touchiroa aromatica. *Aubl. guj.* 1. *p.* 385. *t.* 148. *
Gewürzhafte Crudie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄
Folia *hujus ſimplicia alterna.* Racemi *ut in praecedente, cui ceterum ſimillima.* W.

*822. PANZERA. W.

Eperua Aubl. guj. 1. *p.* 369.

Cal. monophyllus limbo 4-partito. *Petalum* 1, ſubrotundum laterale baſi convolutum. *Filamenta* baſi incraſſata barbata, 5 ſterilia. *Legumen.*

*1. PANZERA *falcata.* W.
Eperua falcata. *Aubl. guj.* 1. *p.* 369. *t.* 142. *.
Sichelſaamige Panzere. W.
Habitat in ſylvis Gujanae *ad fluviorum ripas.* W.
Arbor *ſexagintapedalis.* *Folia alterna pari-pinnata, foliolis trijugis ellipticis acuminatis ſubſeſſilibus integerrimis glabris.* Panicula *ſimplex e racemis ſimplicibus valde elongata.* W.
Genus a Dimorpha ſtaminibus *et* legumine *aliisque notis diſtinctiſſimum, licet affine.* W.
Dixi hoc genus in honorem Panzeri, Med. Doct. Norimbergenſis, Botanici multis ſcriptis celebris. W.

823. CODON.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 715.

Cal. 10-partitus. *Cor.* campanulata, 10-fida. *Capſ.* polyſperma.

1. CODON *Royeni.*
C. Royeni. *Syſt. nat. ed.* 13. *p.* 292. *Thunb. prod.* 80. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 479.
Royeniſches Codon. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙
Caulis *herbaceus, firmus, cubitalis, teres ramis aſſurgentibus.* Folia *alterna petiolata, cordato-ovata, ſubrepanda, indiviſa, acuminata, ſubcoriacea, gla-*

bra, ſupra avenia. Flores *ſupra-axillares, ſolitarii, pedunculati, facie corollae Atropae Belladonnae, albidi, extus notati ſtriis* 10 *purpuraſcentibus.* Herba *tota adſperſa ſtriis. Royen. mſſ.*

824. DICTAMNUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 726.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, patula. *Filamenta* punctis glanduloſis adſperſa. *Capſ.* 5, coalitae.

1. DICTAMNUS *albus.*

Dictamnus. *Hort cliff.* 161. *Hort. upſ.* 102. *Mat. med.* 113. *Roy. lugdb.* 463. *Sauv. monſp.* 232. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 177. *Scop. carn. n.* 476. *Pollich. pal. n.* 392. *Mill. ic. t.* 123. *Blackw. t.* 75. *Ludw. ect. t.* 10. *Kniph. cent.* 1. *n.* 25. *Hoffm. germ.* 141. *Roth. germ. I.* 180. *II.* 461.

D. albus vulgo Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.

Fraxinella. *Reneal. ſpec.* 122. *t.* 121. *Hall. helv. n.* 1029.* *Riv. pent. irreg. t.* 132.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 480.

Weiſswurzlicher Diptam. W.

Habitat in Germania, Gallia, Italia. ♃ (v. v.)

Ordo naturalis Rutae communis.

*825. NICANDRA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 714.

Cal. turbinatus 4-partitus. *Cor.* 1-petala profunde 10-fida. *Filamenta* annulo nectarifero inſerta. *Bacca* ſexſulcata 3-locul. polyſperma.

*1. NICANDRA *amara.*

Potalia amara. *Aubl. guj.* 1. *p.* 394. *t.* 151.*

Bittrer Männerſieg. W.

Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄

Caulis *lignoſus mono-vel tripedalis ſimplex, inferne nudus.* Folia *oppoſita petiolata oblongo-obovata acuminata luteo-viridia venoſa integerrima glabra.* Petioli *baſi vaginati connati.* Corymbus *pauciflorus terminalis.* Calyx *luteus.* Corolla *alba.* W.

*826. PETALOMA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1750.

Cal. urceolatus 5-dentatus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Stamina* margini calycis inſidentia. *Bacca* 1-locularis.

*1. PETALOMA *myrtilloides*.

P. pedunculis ſolitariis unifloris, foliis ſubſeſſilibus ovatis attenuatis baſi obliquis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 833. *

Myrti folio arbor cortice argenteo, foliis oblongis ad baſin latioribus acuminatis inodoris, ex adverſo ſitis, flore pentapetaloide pallide albicante. *Sloan. cat. p.* 162. *hiſt.* 2. *p.* 78. *t.* 187. *f.* 3.

Arbor foliis cordatis myrtineis oppoſitis, baccis diſpermis. *Brown. jam.* 370.

Myrtenblättrige Randblume. W.

Habitat in ſylvis depreſſis Hiſpaniolae, Jamaicae. ♄

*2. PETALOMA *Muriri*.

P. pedunculis confertis axillaribus, foliis petiolatis ovatis acuminatis, baccis tetraſpermis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 835. *

Mouriri gujanenſis. *Aubl guj.* 1. *p.* 453. *t.* 180. *

Langzugeſpitzte Randblume. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

827. RUTA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 725.

Cal. 5-partitus. *Petala* concava. *Receptac.* punctis melliferis decem cinctum. *Capſ.* lobata.

* *Quinta pars numeri in quibusdam excluditur.*

1. RUTA *graveolens*.

R. foliis ſupradecompoſitis, foliolis oblongis, terminali obovato, petalis integerrimis. W.

R. foliis decompoſitis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *Hort. upſ.* 102. *Mat. med.* 113. *Roy. lugdb.* 461. *Scop. carn. n.* 477. *Ludw. ect. t.* 20. *Blackw. t.* 7. *Kniph. cent.* 3. *n.* 79. *Willd. arb.* 330. *

R. foliis duplicato-pinnatis, lobulis ovatis. *Hall. helv. n.* 1003.
R. ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 336. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 507. *ſ.* 5. *t.* 14. *f.* 5. *Du Ham.* 2. *ic.* 61.
β. Ruta hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 336.
R. (*hortenſis*) foliis decompoſitis, floribus octandris, ſtaminibus corolla longioribus. *Mill. dict. n.* 1. R. graveolens hortenſis. *Dod. pempt.* 119.
γ. Ruta hortenſis latifolia arbuſculae ſimilis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 260.
R. africana maxima. *Swert. hort.* 24.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 535.
Gemeine Raute. W.
Habitat in Europae *auſtralis*, Alexandriae, Mauritaniae, Helvetiae *ſterilibus.* ♄ (v. v.)
Flos *primarius* 5-*fidus*, *reliqui quadrifidi.* Paniculae *rami primi bipartiti*, *reliqui flores alterni.*

*2. RUTA *montana.*

R. foliis ſupradecompoſitis, foliolis omnibus linearibus, petalis integerrimis. W.
R. (*montana*) foliis ſupradecompoſitis, laciniis linearibus, petalis imberbibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 57.
R. (*montana*) foliis bipinnatis linearibus, floribus ſpicatis ſecundis, ſpicis divaricato-corymboſis. *Loefl. it.* 140. *
R. (*legitima*) foliolis linearibus acutis, petalis erectis imberbibus. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 76. *collect.* 1. *p.* 74. *
R. (*legitima*) foliolis linearibus acutis, petalis adunco-roſtratis imberbibus, ſtipulis trifidis ariſtatis. *Allion. pedem. n.* 1023. *
R. (*ſylveſtris*) foliis inferioribus decompoſitis, ſummis quinquefidis trifidisque. *Mill. dict. n.* 3.
R. foliis duplicato-pinnatis linearibus, lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1004.
R. ſylveſtris minor. *Bauh. pin.* 336. *Cam. epit.* 495.
R. montana legitima. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 136.
R. minor. *Tabern.* 134.
Berg Raute. W.
Habitat in collibus Helvetiae, Aquitaniae, Hiſpaniae et Luſitaniae. ♄ (v. ſ.)

3. RUTA *chalepenſis.*

R. foliis ſupradecompoſitis oblongis, terminali obovato, petalis ciliato-dentatis. W.

R. foliis ſupradecompoſitis, petalis ciliatis. *Mant.* 69.

α. R. chalepenſis latifolia, petalis villis ſcatentibus. *Tourn. inſt.* 257.

β. R. chalepenſis anguſtifolia, petalis villis ſcatentibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 508. *ſ.* 5. *t.* 35. *f.* 8.

R. (*chalepenſis*) foliis decompoſitis, floribus decandris, petalis ciliatis. *Mill. dict. n.* 5. B.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 537.

Aleppiſche Raute. W.

Habitat in Arabia. ♄ (v. v.)

Simillima R. graveolenti *ejusque progenies.* Primi *flores* 5-*fidi*, *reliqui* 4-*fidi.* Petala *concava*, *margineque undulata, ut in* R. graveolente, *ſed* Caulis *altior*; Petala *margine ciliata*; Capſulae *lobi acuti, obtuſi.*

Differt β. Petalorum *unguibus longioribus*, Capſulaeque *lobis approximatis*, *nec diſtantibus.* H. V.

4. RUTA *pinnata.*

R. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis baſi attenuatis ſerrato-crenatis, petalis integerrimis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 58.

R. foliis pinnatis trijugis, foliolis lanceolatis, impari ſerrato, petalis planis ſubcrenulatis. *Lin. ſuppl.* 232.

Gefiederte Raute. W.

Habitat in Canariis *ad rupes circa* Puerto de la Orotava. *Fr. Maſſon.* ♄ (v. ſ.)

Caulis *ut in reliquis ſpeciebus.* Folia *pinnata trijuga cum impari.* Foliola *lateralia oppoſita linearia integra ſ. crenulata punctata.* Foliolum impar *ſubovatum ſerratum.*

5. RUTA *patavina.*

R. foliis ternatis ſeſſilibus linearibus integerrimis, baſi attenuatis. W.

R. foliis ternatis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 549. *Mill. dict. n.* 8.

Pſeudo-Ruta patavina trifolia, floribus luteis umbellatis. *Mich. gen.* 22. *t.* 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 538.

Dreyblättrige Raute. W.

Habitat prope Patavium. ♃

Petala *plana*, *integra.*

6. RUTA *linifolia.*

R. foliis ſimplicibus lanceolatis glabris, filamentis ciliatis, caule ſimplici herbaceo. W.

R. foliis lanceolatis, indiviſis. *Sp. pl.* 549. *Mill. dict. n.* 6.

R. foliis ſimplicibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 146.
R. ſylveſtris linifolia hiſpanica. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 82. *t.* 73. *Barr. ic.* 1186.
β. Ruta montana, foliis integris ſubrotundis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 30. *t.* 28. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 538.
Flachsblättrige Raute. W.
Habitat in Hiſpania, β. *in* Rodaſtro. ♃ (v. ſ.)

Paniculae rami laterales bifidi, triflori, flore intermedio ſeſſili. Petala 5, *ſeſſilia, integra, ovata. Filamenta baſi piloſa arcte includunt receptaculum poris melliferis pertuſum. Pericarpia punctis elevatis.*

Planta Buxbaumii non eſt diverſa ab hiſpanica. W.

*7. RUTA *fruticuloſa.*

R. foliis ſimplicibus lineari-ſpathulatis pubeſcentibus, filamentis lanatis, caule ramoſo fruticoſo. W.
R. (*fruticuloſa*) foliis integris ſeſſilibus ovato-lanceolatis, ramisque piloſis. *Billard. pl. ſyr. dec.* 1. *p.* 13. *t.* 4. *
R. orientalis linariae folio, flore parvo. *Tournef. cor.* 19. *Buxb. cent.* 2. *p.* 30. *t.* 28. *f.* 1.
Kleinblütige Raute. W.
Habitat in Media, *inque* Syria *prope* Damaſcum. ♄ (v. ſ.)

Filamenta *dilatata baſi valde ſunt lanata.* Flores *duplo minores praecedente, et* petala *magis unguiculata.* W.

828. TOLUIFERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 713.

Cal. 5-dentatus, campanulatus. *Petala* 5, infimo maximo, obcordato. *Stylus* nullus.

1. TOLUIFERA *Balſamum.*

Toluifera. *Mat. med.* 114. *Mill. dict.*
Balſamum Tolutanum, foliis ceratiae ſimilibus. *Bauh. pin.* 401.
Balſamum provinciae Tolu, Balſamifera quarta. *Hernand. mex.* 53.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 587.
Americaniſcher Tolubaum. W.
Habitat in America *prope* Carthagenam. ♄

829. MYROXYLON.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 709.

Cal. campanulatus 5-dentatus. *Petala* 5, ſupremo reliquis majore. *Germen* corolla longius. *Legumen* apice monoſpermum!

1. MYROXYLON *peruiferum.*

M. foliis abrupte pinnatis bijugis, foliolis ſuboppoſitis. W.
Myroxylon peruiferum. *Lin. ſuppl.* 233.
Hoitziloxitl. *Hern. mex. p.* 51. *cum figura ſatis bona.*
Cabureiba. *Piſo braſ.* 57. 119. *absque figura.*
Wohlriechendes Balſamholz. W.
Habitat in calidiſſimis provinciis Terrae Firmae Americae meridionalis. *Mutis.* ♄

Arbor *pulcherrima, cortice laevi craſſo valde reſinoſo, ut omnes arboris partes.* Folia *alterna abrupte pinnata.* Foliola *bijuga ſuboppoſita petiolata ovato-lanceolata, apice producto obtuſo emarginato, integra venoſa glaberrima.* Rachis *per longitudinem inferioris paginae folii currens elevata pubeſcens.* Petiolus *communis teres pubeſcens.* Racemi *axillares erecti ſecundi, foliis longiores, pedunculo teretiuſculo pubeſcente, floribus ſparſis.* Bractea *ſingulum pedunculum ſuffulciens minima ovata erecta concava, nudo oculo tuberculum referens.* Pedicelli *erecti.* Calyx *campanulatus viridi-caneſcens, cinctus extra orificium petalis antherisque albis, intra continens legumen viride, quod in flore ſingularem faciem repraeſentat.* Foliorum *ſubſtantia plena punctis linearibus translucentibus reſinoſis, ut folia Citri.*

Ex hac arbore venit Balſamum peruvianum. W.

*2. MYROXYLON *pedicellatum.*

M. foliis impari pinnatis ſubquinquejugis, foliolis alternis, legumine pedicellato. W.
Myroſpermum (*pedicellatum*) leguminibus pedicellatis *Lamarck encycl.* 4. *p.* 181. * *illuſt. gen. t.* 341. *f.* 1.
Myroſpermum. *Juſſ. gen. ed. Uſt. p.* 403.
Geſtieltes Balſamholz. W.
Habitat in Peru. ♄

Folia *quadri-ſ. quinquejuga.* W.

*3. MYROXYLON *fruteſcens.*

M. foliis impari-pinnatis ſeptemjugis, foliolis alternis, legumine ſeſſili. W.

Myroſpermum (*fruteſcens*) leguminibus ſeſſilibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 181. * *illuſt. gen. t.* 341. *f.* 2.
Myroſpermum fruteſcens. *Iacq. amer.* 120. *t.* 174. *f.* 34.
Strauchartiges Balſamholz. W.
Habitat in Carthagenae *fruticetis.* ♄

Legumen *hujus in calyce eſt ſeſſile. Diverſiſſima a praecedente:* foliis *et* legumine. W.

Clariſſ. Lamarck hanc ſpeciem non a M. peruifero diverſam eſſe credit, ſed diſſuadent: deſcriptiones Iacquini et Linnaei, ut et balſamum hujus foetidum. W.

830. HAEMATOXYLON.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 708.

Cal. 5-partitus. *Pet.* 5. *Capſ.* lanceolata, 1-locularis, 2-valvis: valvis navicularibus.

1. HAEMATOXYLON *campechianum.*
Haematoxylum. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 465. *Mat. med.* 114. *Mill. dict. Iacq. obſ.* 1. *p.* 20.
H. ſpinoſum, foliis pinnatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 1. *p.* 221.
Lignum campechianum, ſpecies quaedam. *Sloan. jam.* 213. *hiſt.* 2. *p.* 183. *t.* 10. *f.* 1. 2. 3. 4. *Catesb. car.* 3. *p.* 66. *t.* 66.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 590.
Weſtindiſches Blutholz. W.
Habitat in Campeche Americes. ♄ (v. ſ.)

Tabula *Blackw.* 493. *non huc pertinet, monente* Iacquino. R.

831. PROSOPIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 706.

Cal. hemiſphaericus, 4-dentatus. *Stigma* ſimplex. *Legumen* polyſpermum.

1. PROSOPIS *ſpicigera.*
Proſopis. *Mant.* 68. *Burm. ind.* 102. *t.* 25. *f.* 3. *Roxb. corom.* 1. *p.* 45. *t.* 63. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 593.
Aehrentragende Proſopis. W.
Habitat in India. ♄

Arbor. Folia *alterna conjugata: foliolis pinnatis, octojugis ſine impari, Tamarindi ſimilibus, pinnis ob-*

long:s obtuſis. Spicae *anguſtae, longae, terminales et axillares.* Flores *parvi.*

*832. CADIA.

Forſk. deſcr. 90.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5 aequalia obcordata. *Legumen* polyſpermum. W.

*1. CADIA *purpurea.*

C. purpurea. *Forſk. deſcript. p.* 90. * *Ait. Kew.* 3. *p.* 492. *l'Herit. in Magaz. encycl.* 5. *p.* 29. *

Panciatica purpurea. *Piccivoli hort. panciat.* 9. *cum fig.*

Spaendoncea tamarindifolia. *Desfont. in Decad. philoſ. polit. et litter.* 7. *p.* 259. *

Rothe Cadie. W.

Habitat in Arabia *felici.* ♄

Rami *griſeo-vireſcentes teretes propendentes, juniores lanugine pubeſcentes.* Folia *alterna impari-pinnata, foliolis numeroſiſſimis parvis oblongis obtuſis ſeſſilibus glabris.* Petiolus *pubeſcens.* Pedunculi *ſolitarii axillares bi-vel triflori.* Flores *nutantes.* Corolla *recens alba dein roſea.* W.

833. MURRAYA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 717.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala campanulata. *Nectar.* germen cingens. *Bacca* 1-ſperma.

1. MURRAYA *exotica.*

M. exotica. *Mant.* 563. *Murr. commentar. goett.* 9. *p.* 186. *t.* 1. *

Chalcas paniculata. *Mant.* 68.

Chalcas Cammuneng. *Burm. ind.* 104.

Marſana buxifolia. *Sonnerat. it.* 2. *p.* 192. *t.* 139.

Camunium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 29. *t.* 18. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 539. 541. *t.* 24. *f.* 2.

Indiſche Murraye. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ *Koenig.* (v. ſ.)

Arbor *inter minores, cortice albicante, facie Schini.* Folia *alterna, petiolata, rigidula, pinnata impari.* Foliola 7, *petiolulata, alterna, obovata, glabra, obtuſiuſcula.*

834. BERGERA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 718.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* turbinatum. *Bacca* 2-ſperma.

1. **BERGERA** *Koenigii.*

B. Koenigii. *Mant.* 563.
Papaja ſylveſtris. *Rumph. amb.* 1. *p.* 149. *tab.* 53. *f.* 1. W.
Königſche Bergere. W.
Habitat in India *orientali. Koenig.* ♄ (v. ſ.)

Arbor *frondoſa, cortice Alni.* Folia *alterna, petiolata, pinnata impari.* Foliola *alterna, petiolulata, ovato-lanceolata, rhomboidea, latere altero anguſtiora, glabra; latere antico ſubſerrata.* Corymbi *terminales compoſiti, foliis breviores, patentes.* Bracteae *pedicellis adpreſſae, ſolitariae, lanceolatae, parvae, caducae.* Racemi *erecti pedicellis teretiuſculis, brevibus;* Bracteae *lanceolatae, perſiſtentes.*

*835. EKEBERGIA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 719.

Cal. 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Nectar.* annulus germen cingens. *Bacca* 5-ſperma.

1. **EKEBERGIA** *capenſis.*

E. capenſis. *Sparrman Act. holm.* 1779. *p.* 252. *t.* 9.* *Thunb. Diſſ. nov. pl. gen.* 2. *p.* 44.* *Thunb. prod. p.* 79.
Capiſche Ekebergie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *in ſylvis* Hauteniquas *inque ſylva* Elſenboſch *infra* Longkloff. ♄

Arbor *procera cortice cinereo.* Folia *alterna abrupte pinnata, rarius impari-pinnata, quadri ſ. ſexjuga, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis venoſis glabris ſeſſilibus.* Rachis *foliorum triquetra ſubalata.* Panicula *axillaris corymboſa foliis multoties brevior.* Pedicelli *ut calyces extus lanati.* W.

836. ADENANTHERA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 707.

Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Antherae* apice exteriore glandulae globoſae affixae. *Legumen* membranaceum.

1. ADENANTHERA *pavonina.*
A. foliis decompoſitis utrinque glabris. *Roy. lugdb.* 462. *Vir. cliff.* 36. *Fl. zeyl.* 160.* *Burm. ind.* 100. *Mill. dict. Iacq. collect.* 4. *p.* 212. *t.* 23.*
Poinciana foliis duplicato-pinnatis: foliolis alternis. *Hort. cliff.* 158.
Coralaria parvifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 173. *t.* 109.
Mandſiadi. *Rheed. mal.* 6. *p.* 25. *t.* 14. *Raj. hiſt.* 1752.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 594.
Glattblättrige Drüſenblume. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

2. ADENANTHERA *falcata.*
A. foliis decompoſitis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 550.
Clypearia alba. *Rumph. amb.* 3. *p.* 176. *t.* 111. *Burm. ind.* 101.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 596.
Haarige Drüſenblume. W.
Habitat in India. ♄

*3. ADENANTHERA *ſcandens.* †
A. foliis pinnatis bijugis, foliolis ovatis obliquis glabris, cirrhis terminalibus bifidis. *Forſt. prod. n.* 187.
Kletternde Drüſenblume. W.
Habitat in inſula Mallicollo. ♄

*837. GAERTNERA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 735.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala lacero-ciliata. *Filamenta* baſi leviſſime cohaerentia, unicum reliquis longius. *Samara* monoſperma qradrialata, alis inaequalibus.

1. GAERTNERA *racemoſa.*
G. racemoſa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 19. *t.* 18.*
Molina (*racemoſa*) foliis ovato-lanceolatis, floribus racemoſis terminalibus. *Cavan. Diſſ.* 9. *p.* 435 *t.* 263.*
Hiptage Madablota. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 169. *t.* 116.

Madablota. Baniſteria tetraptera. *Sonnerat. it. 2. p. 238. t. 135.* *

Baniſteria (*benghalenſis*) foliis ovato-oblongis acuminatis, racemis lateralibus, ſeminibus patentibus. *Sp. pl.* 611. *Fl. zeyl.* 176. * *Mill. dict. n.* 5.

Baniſteria (*unicapſularis*) *foliis* ovato-lanceolatis acuminatis, racemis terminalibus, capſulis ſolitariis polypteris. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 363. *

Acer benghalenſis laurinis foliis, fructu tergemino. *Pluk. alm.* 7. *t.* 3. *f.* 1. *mala.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 593.

Traubenblütige Gärtnere. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

*838. STRIGILIA.

Cavan. diſſ. 7. *p.* 358.

Cal. 5-dentatus. *Cor.* profunde 5-partita. *Nectarium* profunde 10-partitum, laciniis lanceolatis. *Antherae* ſeſſiles in nectarii laciniis. *Fructus* 6-locularis?

1. STRIGILIA *racemoſa.*

S. racemoſa. *Cavan. Diſſ.* 7. *p.* 358. *t.* 201. *

Traubenblütige Strigilie. W.

Habitat in Peru. ♄

Rami *rufo-tomentoſi.* Folia *alterna petiolata elliptica acuta integerrima, ſupra glabra, infra rufo-tomentoſa.* Racemi *axillares.* W.

*839. GILIBERTIA.

Gmel. ſyſt. nat. p. 682.

Cal. 4-5-dentatus. *Cor.* 4-5-petala. *Nectar.* cylindricum truncatum. *Antherae* margini nectarii inſertae. *Capſ.* 4-locul. loculis ſubmonoſpermis.

1. GILIBERTIA *decandra.*

G. foliis alternis oblongis integris utrinque attenuatis, racemis axillaribus. W.

Quiviſia (*decandra*) foliis alternis lanceolatis glabris integerrimis, floribus axillaribus racemoſis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 367. *t.* 211. *

Zehnfädige Gilibertie. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

*2. GILIBERTIA *ovata.*

G. foliis alternis obovatis obtuſis integris, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus tomentoſis. W.

Quiviſia (*ovata*) foliis ovatis alternis integerrimis, floribus ſubſeſſilibus axillaribus binis aut pluribus. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 368. *t.* 212. *

Eyförmige Gilibertie. W.

Habitat in inſula Borbonia. ♄

*3. GILIBERTIA *heterophylla.*

G. foliis alternis obovatis integris ſinuatisque, pedunculis unifloris axillaribus, fructibus glabris. W.

Quiviſia (*heterophylla*) foliis ovatis integris aut pinnatifidis, floribus axillaribus binis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 368. *t.* 213. *f.* 1. 2. *

Verſchiedenblättrige Gilibertie. W.

Habitat in inſula Borbonia. W.

Forte tantum varietas praecedentis. W.

*4. GILIBERTIA *oppoſitifolia.*

G. foliis oppoſitis ellipticis obtuſiuſculis integris, pedunculis axillaribus trifloris. W.

Quiviſia (*oppoſitifolia*) foliis oppoſitis ovatis integerrimis glabris, floribus axillaribus, pedunculis trifloris. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 368. *t.* 214. *

Paarblättrige Gilibertie. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

840. TRICHILIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 721.

Cal. ſub 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* dentatum cylindricum, in apice dentium Antheras gerens. *Capſ.* 3-locularis, 3-valvis. *Sem.* baccata.

1. TRICHILIA *hirta.*

T. foliis pinnatis, foliolis paucioribus ellipticis acuminatis glabris, racemis confertis. *Swartz obſ.* 171.

T. foliis pinnatis ſubhirſutis. *Sp. pl.* 550.

T. ſubhirſuta, foliis pinnatis ovatis, racemis alaribus. *Brown. jam.* 278.

Pruno forte affinis arbor, folio alato, flore herbaceo pentapetalo racemoſo. *Sloan. hiſt.* 2. *t.* 220. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 598.

Rauhblättrige Trichilie. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*2. TRICHILIA *ſpondioides.*

T. foliis impari-pinnatis ſubhirſutis, pinnis numeroſis, inferioribus majoribus, racemis axillaribus. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 730. *

T. (*ſpondioides*) racemis axillaribus, foliis pinnatis, foliolis intermediis majoribus. *Iacq. amer.* 128. *hort. Schoenb.* 1. *p.* 54. *t.* 102.

Evonymus caudice non ramoſo, folio alato, fructu rotundo tripyreno. *Sloan. jam.* 171. *hiſt.* 2. *p.* 103. *t.* 210. *f.* 2. 3. *Raj. hiſt.* 3. *dendr. p.* 70.

Myrobalanenartige Trichilie. W.
Habitat in ſylvaticis montoſis Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄

*3. TRICHILIA *emetica.*

T. foliis pinnatis ſubtus villoſis, foliolis ellipticis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31. *

Elcaja. *Forſk. deſcr.* 127. *

Brechenmachende Trichilie. W.
Habitat in montibus Arabiae *felicis.* ♄

4. TRICHILIA *glabra.*

T. foliis pinnatis glabris, foliolis extimis majoribus. *Syſt. nat.* 13. *p.* 294.

T. havanenſis. *Iacq. amer.* 129. *n.* 2. *t.* 175. *f.* 58.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 600.

Glatte Trichilie. W.
Habitat ad Havanam *in ſylvis montoſis.* ♄

*5. TRICHILIA *pallida.*

T. foliis impari-pinnatis membranaceis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus octandris, capſulis bivalvibus. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 733. *

Porteſia (*ovata*) foliis pinnatis cum impari, foliolis obovatis, floribus glomerato-racemoſis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 369. *t.* 215. *

Bleiche Trichilie. W.
Habitat in fruticetis montoſis Hiſpaniolae. ♄

*6. TRICHILIA *moſchata.*

T. foliis alternatim pinnatis, racemis axillaribus, floribus ſubdecandris monopetalis, capſulis monoſpermis. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 735. *

Biſamduftende Trichilie. W.
Habitat in Jamaicae *borealis ſylvis vetuſtis.* ♄

*7. TRICHILIA *ſpectabilis.*
T. foliis pinnatis, foliolis obovatis, racemis axillaribus compoſitis. *Forſt. prod. n.* 188.
Anſehnliche Trichilie. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄

*8. TRICHILIA *alliacea.*
T. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis acutis, racemis axillaribus ſupradecompoſitis. *Forſt. prod. n.* 189.
Knoblauchduftende Trichilie. W.
Habitat in inſula Namoka. ♄

*9. TRICHILIA *heterophylla.* W.
T. foliis pinnatis ternatisque, foliolis ovatis acuminatis, racemis axillaribus, floribus octandris. W.
Porteſia (*mucronata*) foliis ternatis aut quinato-pinnatis, foliolis glabris mucronatis, racemulis florum axillaribus. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 370. *t.* 216.*
Verſchiedenblättrige Trichilie. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

10. TRICHILIA *trifoliata.*
T. foliis ternatis, foliolis obovatis nitidis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31.
T. foliis ternatis. *Sp. pl.* 551. *Iacq. amer.* 129. *t.* 82.
T. Haleſia. *Loefl. it.* 188.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 601.
Dreyblättrige Trichilie. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*11. TRICHILIA *nervoſa.*
T. foliis ternatis, foliolis ovatis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31.*
Melia (*Koetjape*) foliis ternatis. *Burm. ind.* 101. *excluſ. ſynonymo.*
Nervenblättrige Trichilie. W.
Habitat in Java. ♄

*12. TRICHILIA *ſpinoſa.* W.
T. foliis ſimplicibus ovatis emarginatis, ramis ſpinoſis. W.
Turraea virens. *Hellenius Act. holm.* 1788. *p.* 294. *t.* 10. *f.* 1.* *bona.*
Dornige Trichilie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Fructus *hujus plantae eſt* bacca *trilocularis, loculis monoſpermis ut ipſe obſervavi et amicus meus indicus D. Klein adnotavit. Medium itaque tenet inter Trichiliam et Limoniam.* Rami *ſunt ſpinoſi.* W.

841. TURRAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 722.

Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* dentatum cylindricum ore inter dentes antheras gerens. *Capſ.* 5-cocca. *Sem.* bina.

1. TURRAEA *virens.*

T. foliis elliptico-lanceolatis emarginatis glaberrimis, calycibus fructibusque ſericeo-villoſis. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 10. *t.* 10. *

Turraea virens. *Mant.* 237.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 580.

Glänzende Turraea. W.

Habitat in Indiae *orientalis acervis ſcoriarum ad montes quondam ardentes.* ♄ *Koenig.*

Arbor *ſaturate virens, facie Quisqualis.* Folia *alterna, petiolata, elliptico-lanceolata, integerrima, emarginata, laevia, ſubtus pallidiora.* Petioli *breviſſimi.* Stipulae *nullae.* Flores *laterales, axillares, flavi, congeſti in ſpicam minimam, foliolis aliquot parvis interſtincti.*

2. TURRAEA *pubeſcens.* †

T. foliis ovatis emarginatis ſubtus pubeſcentibus, calycibus villoſis. W.

T. foliis ovatis integris emarginatisve membranaceis pubeſcentibus, floribus umbellatis. *Hellen. Act. holm.* 1788. *p.* 296. *t.* 10. *f.* 3. *

Behaarte Turraea. W.

Habitat in inſula Hainam. ♄

Fructus *adhuc ignotus.* W.

3. TURRAEA *maculata.*

T. foliis ovatis acutis glabris, calycibus ciliatis. W.

T. (*maculata*) foliis nudis, calycibus glabris ciliatis. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 11. *t.* 11. *

T. (*glabra*) foliis ovato-lanceolatis glabris acutis, petalis longiſſimis glabris. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 360. *t.* 204. *

Gefleckte Turraea. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄

4. TURRAEA *ſericea.*

T. foliis ovatis obtuſiuſculis utrinque tomentoſis, calycibus pedunculis petalisque villoſis. W.

T. (*ſericea*) foliis utrinque villoſis, calycibus pedunculisque tomentoſis. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 12. *t.* 12. *

T. (*tomentoſa*) foliis ovatis integerrimis tomentoſis, petalis longiſſimis villoſis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 361. *t.* 205. *f.* 2. *

Seidenartige Turraea. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄

*5. TURRAEA *lanceolata.*

T. foliis lanceolatis utrinque rotundatis glabris, laciniis calycinis longiſſimis lanceolatis. W.

T. foliis alternis lanceolatis coriaceis glabris, pedunculis axillaribus ſubbifloris. *Cavan. Diſſ.* 7. *p.* 361. *t.* 205. *f.* 1. *

Lanzettenblättrige Turraea. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄

*842. SANDORICUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1751.

Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum truncatum ore antheras gerens. *Drupa* nucibus 5 foeta.

*1. SANDORICUM *indicum.*

S. indicum. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 357. *t.* 202. 203. * *Lamarck encycl.* 3. *p.* 66. *

Hantol. *Raj. ſuppl. p.* 54.

Sandoricum. *Rumph. amb.* 1. *p.* 167. *t.* 64?

Indiſches Sandoricum. W.

Habitat in Philippinis *et* Moluccis. ♄

Arbor *cortice cinereo ligno centro rubro.* Folia *alterna longe petiolata ternata.* Foliola *petiolata ſubrotundo-ovata acuminata venoſa integerrima, ſuperne glabra, inferne ferrugineo-tomentoſa.* Petioli *tomentoſi.* Panicula *anguſta axillaris petiolo longior nuda.* Valde *affine Trichiliae nervoſae, ſed differre videtur:* foliis *ſupra non aveniis et* panicula *nuda nec foliolo lanceolato ad ſingulum ramum inſtructa.* W.

843. SWIETENIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 723.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Nectar.* cylindricum ore antheras gerens. *Caps.* 5-locularis, lignoſa, baſi dehiſcens. *Sem.* imbricata, alata.

1. SWIETENIA *Mahagoni.*

S. foliis pinnatis ſubquadrijugis, foliolis ovato-lanceolatis baſi aequalibus, paniculis axillaribus. W.

S. foliis abrupte pinnatis, pinnulis ovato-lanceolatis obliquis, floribus racemoſis minimis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 365. *t.* 209. *

Swietenia. *Sp. pl.* 548. *Iacq. am.* 127.
Cedrus Mahagoni. *Mill. dict. n.* 2.
Cedrela foliis pinnatis, floribus ſparſis, ligno odorato. *Brown. jam.* 158.

Arbor foliis pinnatis nullo impari: nervo ad latus. *Catesb. car.* 2. *p.* 81. *t.* 81.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 603.
Gemeiner Mahagonibaum. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Affinitate proxima jungitur Cedrelae.

*2. SWIETENIA *febrifuga.*

S. foliis pinnatis ſubquadrijugis, foliolis elliptico-ſubrotundis emarginatis, baſi inaequalibus, panicula terminali divaricata. W.

Swietenia febrifuga. *Roxb. corom.* 1. *p.* 18. *t.* 17. *
Fieberrinden Mahagonibaum. W.
Habitat in montibus Indiae *orientalis.* ♄

*3. SWIETENIA *Chloroxylon.*

S. foliis pinnatis multijugis, foliolis dimidiato-cordatis obtuſis, panicula terminali patenti. W.

Swietenia Chloroxylon. *Roxb. corom.* 1. *p.* 46. *t.* 64. *
Grünholziger Mahagonibaum. W.
Habitat in montibus Indiae *orientalis.* ♄



IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

*844. COOKIA.

Retz. obſ. 5. p. 29.

Cal. 5-fidus, inferus. *Cor.* 5-petala aequalis, infera. *Pomum* 5-loculare; loculis 1-ſpermis.

*1. COOKIA *punctata.*

C. punctata. *Sonnerat it. 2. p. 181. t. 130.* * *Retz. obſ. bot. 6. p. 29.* * *Iacq. hort. Schoenb. 1. p. 53. t. 101.* *
Quinaria Lanſium. *Loureiro cochin. p. 334.* *
Punktirte Cookie. W.
Habitat in China *auſtrali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Arbor *trunco fuſceſcente ſtriato verrucoſo.* Ramuli *teretes virides ut petioli et pedunculi communes paniculae verrucis parvis punctati.* Folia *alterna impari-pinnata.* Foliola *petiolata alterna ovata acuminata integerrima, interiore latere anguſtiora glabra.* Panicula *vaſta divaricata terminalis.* Flores *albi.* W.

845. MELIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 724.

Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* cylindraceum dentatum fauce, *Antheras* gerens. *Drupa* nuce quinqueloculari.

1. MELIA *Azedarach.*

M. foliis bipinnatis, foliolis laevibus ſubquinatis. W.
M. foliis bipinnatis. *Fl. zeyl.* 162. * *Gron. orient.* 133. *Mill. dict. n. 1. Kniph. cent. 2. n. 44. Cavan. diſſ. 7. p. 363. t. 207.* *
M. foliis decompoſitis. *Hort. cliff.* 161. *Roy. lugdb.* 462.
Azedarach. *Dod. pempt.* 848. *Burm. zeyl.* 40. *Herm. lugdb.* 652. *Raj. hiſt.* 1546.
Arbor fraxini folio, flore caeruleo. *Bauh. pin.* 415.
Pſeudo-Sycomorus. *Cam. epit.* 181.
Azadirachta indica, foliis ramoſis minoribus, flore albo ſubcaeruleo purpuraſcente majore. *Comm. hort.* 1. *p.* 147. *t.* 76.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 608.
Glatter Zedrach. W.
Habitat in Syria, Zeylona. ♄ (v. v.)

*2. MELIA *ſempervirens.*
M. foliis bipinnatis, foliolis rugoſiuſculis ſubſeptenis. *Swartz prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 737. *
Melia Azedarach β. *Sp. pl.* 550.
Azedarach ſempervirens et florens. *Tournef. inſt.* 616.
Immergrüner Zedrach. W.
Habitat in ſepibus Jamaicae. ♄ (v. ſ.)
A M. Azedarach diſtincta eſt, non pro varietate aeſtimari debet. Differt enim ab illa, quod tota planta minor et ſaepe floret biennis, quod foliola *laete viridia raro plus quam 7 rugoſiuſcula profundius et magis inaequaliter ſerrata et acuminata.* Swartz obſ. 181.

*3. MELIA *compoſita* W.
M. foliis pinnatis, foliolis infimis ternatis, pedunculis, calycibus, corollisque tomentoſis. W.
Behaarter Zedrach. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Ramuli *nigricantes teretes craſſi rugoſo-ſtriati a caſu foliorum cicatriſati.* Ramuli *juniores teretes tomentoſi et tantum foliis inſtructi.* Folia *alterna longe petiolata impari-pinnata.* Foliola *petiolata utrinque glabra ovata acuminata venoſa remote et obtuſe dentata, baſi integerrima, inferiora ternata.* Folia *juniora utrinque pubeſcentia.* Petioli *ſubpubeſcentes praeſertim baſin verſus.* Paniculae *corymboſae multiflorae axillares pedunculatae foliis breviores.* Pedunculi *teretes pubeſcentes.* Calyx *obtuſe quinque dentatus tomentoſus.* Petala *linearia obtuſa externe tomentoſa.* Nectarium *cylindricum dentatum.* Antherae *ovatae acutae fauci nectarii inſertae.* Stigma *capitatum.* Fructus *ignotus. Meliis, nec Trichiliis hanc adnumeravi, quum habitu et nectarii ſtructura Meliis ſit proxima. Folia quemadmodum iis Staphyleae indicae a Burmanno tab.* 24. *delineatae ſimilia. Melia dubia Cavanilles diſſ.* 7. *p.* 364. *noſtrae videtur proxima.* W.

4. MELIA *Azadirachta.*
M. foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 161. * *Roy. lugdb.* 462. *Mill. dict. n.* 2. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 364. *t.* 208. *
Olea malabarica, fraxini folio. *Pluk. alm.* 269. *t.* 247. *f.* 1.
Azedarach foliis falcato-ſerratis. *Burm. zeyl.* 40. *t.* 15.
Azadirachta indica, folio fraxini. *Breyn. ic.* 21. *t.* 15.

Arbor indica, fraxino ſimilis, oleae fructu *Bauh. pin.* 416.
Aria Bepou. *Rheed. mal.* 4. *p.* 107. *t.* 52.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 610.
Groſsblättriger Zedrach. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

846. ZYGOPHYLLUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 730.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectarium* 10-phyllum, germen tegens ſtaminiferum. *Capſ.* 5-locularis.

1. ZYGOPHYLLUM *ſimplex.*
Z. foliis ſimplicibus ſeſſilibus cylindricis. *Mant.* 68.
Z. portulacoides. *Forſk. flor. aegypt. p.* 88. *n.* 67. *ej. ic. t.* 12. B.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 486.
Einfaches Doppelblatt. W.
Habitat in Arabia. *Forſkoehl.*
Planta *tenera, ſucculenta, nata e ſeminibus Forſkoehlianis, non floruit.* Caulis *herbaceus, dichotomus, pollicaris, divaricatus.* Folia *oppoſita, ſubſeſſilia, carnoſa, linearia, patentiſſima.* Flores *flavi. Forſkoehl.* H. V.

*2. ZYGOPHYLLUM *cordifolium.*
Z. foliis ſimplicibus oppoſitis ſeſſilibus ſubrotundis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 60.
Z. foliis ſimplicibus oppoſitis cordato-orbiculatis. *Lin. ſuppl.* 232. *Thunb. prod.* 80.
Herzblättriges Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

3. ZYGOPHYLLUM *Fabago.*
Z. foliis conjugatis petiolatis, foliolis obovatis, pedunculis erectis, calyce glabro, petalis indiviſis, caule herbaceo. W.
Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis obovatis, caule herbaceo. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 176. *n.* 93. *Mill. dict. n.* 1. *Lerch. in nov. Act. A. N. C. vol.* 5. *app. p.* 163. *Knorr. del.* 2. *t.* C.
Z. capſulis priſmatico-pentaäedris. *Hort. upſ.* 103. *Sp. pl.* 1. *p.* 385. *Gron. orient.* 132.

Z. foliis petiolatis. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 460.
Capparis portulacae folio. *Bauh. pin.* 480.
Capparis fabago. *Dod. pempt.* 741.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 483.
Gemeines Doppelblatt. W.
Habitat in Syria, Mauritania, Sibiria. ♃ (v. v.)
Folia ovata, petiolata. Petala *obtuſa.*

*4. ZYGOPHYLLUM *foetidum.*
Z. foliis conjugatis petiolatis, foliolis obovatis, flore nutante, calyce pubeſcente, petalis inciſis, caule fruticoſo. W.
Z. (*foetidum*) foliis petiolatis, foliolis obovatis, floribus nutantibus, petalis reflexis inciſis. *Schrad. et Wendl. ſert. hannov. p.* 17. *t.* 9.*
Z. (*retrofractum*) foliis conjugatis petiolatis, foliolis ovatis, caule fruticoſo ramisque retrofractis. *Thunb. prod.* 80?
Stinkendes Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*5. ZYGOPHYLLUM *maculatum.*
Z. foliis conjugatis petiolatis, foliolis lineari-lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 60.
Geflecktes Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Petala *lutea macula cordata rubra ad baſin omnium, et ſupra hanc linea transverſa rubra in tribus ſuperioribus.* Ait. l. c.

6. ZYGOPHYLLUM *coccineum.*
Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis cylindricis carnoſis laevibus. *Lepech. it.* 1. *p.* 310.
Z. foliis petiolatis: foliolis linearibus carnoſis. *Sp. pl.* 2. *p.* 551.
Z. deſertorum. *Forskoehl. flor. arab. p.* 87. *n.* 65. *ic. t.* 11.
Z. capſulis cylindricis. *Sp. pl.* 1. *p.* 386.
Fabago arabica teretifolia, flore coccineo. *Shaw. afr.* 231. *f.* 231.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 484.
Rothes Doppelblatt. W.
Habitat in Africa, Sibiria. (v. ſ.)
Diſtincta a Z. albo floribus rubris, Capſulis oblongis.

7. ZYGOPHYLLUM *album.*

Z. foliis conjugatis petiolatis: foliolis clavatis carnoſis arachnoideo-incanis. *Mant.* 379.
Z. foliis petiolatis: foliolis clavatis carnoſis. *Linn. dec.* 1. *t.* 8.
Z. proliferum. *Forsk. flor. p.* 87. *n.* 65. *it. t. XII. f. A.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 485.
Weiſses Doppelblatt. W.
Habitat in Aegypto *inque* Canariis. ♄

Fruticulus *ſucculentus, cano-albus, ut tota planta.* Folia *oppoſita, ovata, teretia.* Petiolus *ovato-oblongus adhuc major.* Pedunculi *laterales, uniflori, breviſſimi.* Calyx *purpuraſcens, concavus.* Petala *lato-lanceolata.* Staminum *baſi ſquamae, quae tegunt receptaculum.* Receptaculum *fructus carnoſum, germine majus, depreſſum, angulis* 10 *obſoletis.* Germen *ſuperum, ovatum.* Stylus *ſtigmatibus* 5, *acutis.*

8. ZYGOPHYLLUM *Morgſana.*

Z. foliis conjugatis ſubpetiolatis, foliolis obovatis, caule fruticoſo. *Mill. dict. n.* 3. *Thunb. prod.* 80.
Fabago triphylla et tetraphylla, flore tetrapetalo, fructu membranaceo quadrangulari. *Burm. afr.* 7. *t.* 3. *f.* 2.
Fabago capenſis fruteſcens major. *Dill. elth.* 142. *t.* 116. *f.* 141.
Planta africana fruteſcens, portulacae foliis, Morgſani ſyrorum, ex brevi pediculo binis. *Pluk. amalth.* 173. *t.* 429. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 541.
Kurzgeſtieltes Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *teres, articulatus, cinereus.* Rami *alterni.* Folia *oppoſita, conjugata, ſubſeſſilia.* Foliola *ovata, obtuſa, integerrima, carnoſa, laevia.* Stipulae *ſolitariae inter petiolos, lineares, reflexae.* Pedunculi *laterales, gemini, uniflori, interfoliacei, alterius lateris (nec oppoſiti,) longitudine folii.* Calyx 4-*phyllus, laevis, concavus, obtuſus.* Corolla *flava, intra calycis apices fuſca.* Petala 4, *rarius* 5, *patentia, ſubemarginata.* Stamina *petalis duplo plura, erecta.* Antherae *flavae, baſi ſquama nectarifera flava margine fuſca.* Stylus *longitudine ſtaminum.*

9. ZYGOPHYLLUM *microphyllum.*
Z. foliis conjugatis ſeſſilibus, foliolis ovatis laevibus, caule fruticoſo. *Thunb. prod.* 80.
Z. foliolis ovalibus minutis, capſulis emarginatis. *Lin. ſuppl.* 232.
Kleinblättriges Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *fruticoſus erectus, ramis ſaepius alternis.* Folia *oppoſita ſubpetiolata conjugata, foliolis ovalibus carnoſiuſculis planis laevibus.* Pedunculi *capillares laterales longitudine foliorum ſolitarii.* Petala *oblonga flava.* Capſula *utrinque retuſa quinquangularis, angulis valde compreſſis rotundatis.*

10. ZYGOPHYLLUM *ſeſſilifolium.*
Z. foliis conjugatis ſeſſilibus: foliolis lanceolato-ovalibus margine ſcabris, caule fruticoſo. *Mill. dict. n.* 2. *Thunb. prod.* 80.
Z. capſulis globoſo-depreſſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 385.
Z. foliis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 160. *Roy. lugdb.* 460.
Fabago capenſis fruteſcens minor. *Dill. elth.* 142. *t.* 116. *f.* 142.
Fabago humilis quadrifolia glabra, flore albido, fructu rotundo. *Burm. afr.* 4. *t. f.* 1.
Fabago africana arboreſcens, flore ſulphureo, fructu rotundo. *Comm. rar.* 10. *t.* 10.
β. Zygophyllum *fulvum* capſulis ovatis acutis. *Sp. pl.* 1. *p.* 386. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 3. *n.* 100.
Fabago flore luteo, petalorum unguibus rubris, fructu ſulcato acuto oblongo. *Burm. afr.* 6. *t.* 3. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 542.
Ungeſtieltes Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Folia ſeſſilia: Foliola ovali-lanceolata margine cartilagineo crenata ſ. ſcabra. Caulis *angulatus.* Pedunculi *ſolitarii, foliis longiores.* Petala *crenata.*

11. ZYGOPHYLLUM *ſpinoſum.*
Z. foliis conjugatis ſeſſilibus: foliolis linearibus, carnoſis ſupra planis, caule fruticoſo. *Mant.* 380. *Thunb. prod.* 80.
Z. caule aculeato. *Sp. pl.* 1. *p.* 386.
Fabago tenuifolia ſpinoſa, fructu rotundo. *Burm. afr.* 5. *t.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 543.

Stachliches Doppelblatt. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Caulis *erectus*: *Ramis alternis*, *longitudine plantae.* Stipulae *verticillatae*, 4, *ſubulatae*, *breviſſimae*, *rigidulae.* Folia *quaterna*, *linearia*, *carnoſa*, *ſupra plana*, *ſubtus teretiuſcula*, *acuta.* Corollae *nutantes*, *luteae.*

12. ZYGOPHYLLUM *aeſtuans.*
Z. foliis conjugatis ſeſſilibus: foliolis obovatis retuſis. *Sp. pl.* 552.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 485.
Surinamſches Doppelblatt. W.
Habitat in Surinamo. *Rolander*: *ſed impubes periit.*

Caules *herbacei*, *pedales*, *laeves*, *diffuſi*, *teretiuſculi*, *latere ſuperiore plani.* Folia *oppoſita*, *conjugata*, *ſeſſilia*: Foliola *obovata*, *avenia*, *retuſa.* Stipulae *quinae*, *reflexae*; *duabus inter folia a latere ſuperiore*; *unica inter folia a latere inferiore*; *unica inter foliorum utrumque par.*

*13. ZYGOPHYLLUM *lanatum.* W. †
Z. foliis ternatis, foliolis ſubtus papilloſis, floribus pentagynis, caule flexuoſo articulis lanato. W.
Wolliges Doppelblatt. W.
Habitat in Sierra Leone. (v. ſ.)

Dubii generis planta. Caulis *videtur herbaceus*, *flexuoſus teres glaber.* Articuli *valde lanati.* Folia *oppoſita petiolata ternata parva.* Foliola *breviſſime petiolata ſubrotunda baſi attenuata*, *apice mucronata*, *ſuperne laevia*, *ſubtus papillis elevatis obſita.* Pedunculi *axillares ſolitarii uniflori*, *durante floreſcentia erecti*, *poſtea cernui.* Calyx *pentaphyllus foliolis linearibus obtuſis interne et margine pubeſcentibus.* Corollam *nullam vidi*, *forte decidua jam erat.* Filamenta *baſi parum dilatata.* Germen *clavatum.* Styli *quinque longi filiformes.* Stigmata *obtuſa.* Capſula *quinquangularis ovata*, *quinquelocularis quinquevalvis baſi dehiſcens*; *valvulis carinato-marginatis.* Semina *ſolitaria.* W.

14. ZYGOPHYLLUM *arboreum.*
Z. foliis pinnatis, caule arboreo. *Iacq. amer.* 130. *t.* 83.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 612.
Baumartiges Doppelblatt. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

Folia *oppoſita, pinnata absque impari, ſaepius ſeptemjuga; pinnis alternis, lanceolatis, obtuſis.* Pedunculi *ramoſi.*

847. FAGONIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 731.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, cordata. *Capſ.* 5-locularis, 10-valvis: loculis 1-ſpermis.

1. FAGONIA *cretica.*
F. ſpinoſa, foliolis lanceolatis planis laevibus. *Hort. upſ.* 103. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 8. *n.* 41.
F. ſpinoſa. *Hort. cliff.* 160.
Trifolium ſpinoſum creticum. *Bauh.*! *pin.* 330. *prodr.* 142. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 24. 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 487.
Cretiſche Fagonie. W.
Habitat in Creta. ⊙ (v. v.)

Caulis *pentagonus, depreſſus, patens, dichotomus, pedalis, latere ſuperiore canaliculatus, nodoſo-geniculatus.* Rami *alterni, bifarii, patentes.* Folia *oppoſita, petiolata, ternata:* Foliola *aequalia, ſeſſilia, lanceolata, mucronata, ſubcarnoſa, integerrima.* Stipulae 4, *ſubulatae, patentes, ſpineſcentes, breves, recurvatae.* Pedunculi *laterales, axillares, ſolitarii, uniflori, alterni, erecti, longitudine petioli, ex eadem ala cum ramulo.* Calyx *deciduus.* Petala *violacea, unguiculata, inter ſinus calycis patentia etiam unguibus extra calycem.* Capſula *cernua, ovata, 5-gona angulis compreſſis, ſubciliatis. Ergo* Flos *Malpighiae,* Herba *Tribuli ſtructura.* Affinis *Zygophyllo.*

2. FAGONIA *hiſpanica.*
F. inermis. *Mill. dict. n.* 2.
F. hiſpanica non ſpinoſa. *Tournef. inſt.* 265.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 488.
Spaniſche Fagonie. W.
Habitat in Hiſpania. ♂

3. FAGONIA *arabica.*
F. ſpinoſa, foliolis linearibus convexis. *Shaw. afr.* 229. *Forskoehl. aegypt. p.* 88. *Mill. dict. n.* 3.
F. arabica longiſſimis aculeis armata. *Shaw. afr.* 229.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 488.

Arabiſche Fagonie, W.
Habitat in Arabia.

4. FAGONIA *indica.*
F. foliis ſimplicibus ovalibus, ſpinis geminis. *Mant.* 238. *Burm. ind.* 102. *t.* 34. *f.* 1. †
Indiſche Fagonie. W.
Habitat in Perſia.
Folia *oppoſita, ſubpetiolata, ovali-oblonga, glabra, integerrima. Burm.*

848. TRIBULUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 732.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5, patentia. *Stylus* 0. *Capſ.* 5, gibbae, ſpinoſae, polyſpermae.

1. TRIBULUS *maximus.*
T. foliis ſubquadrijugis; exterioribus majoribus, pericarpiis decaſpermis muticis. *Loefl. it.* 208. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 462. *Collect.* 4. *p.* 110. *
T. foliis trium parium pinnatis. *Hort. cliff.* 160.
T. foliis ſenis pinnatis: extimis majoribus, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 120. *t.* 132. *f.* 3.
T. terreſtris major, flore maximo odorato. *Sloan. jam.* 90. *hiſt.* 1. *p.* 209. *t.* 132. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 650.
T. terreſtris fructu turbinato, foliis lanuginoſis. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 254. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 489.
Groſser Bürzeldorn. W.
Habitat in Jamaicae *aridis.* ⊙ (v. ſ.)
Fructus decaſpermos, laevis ſ. muticus.

2. TRIBULUS *lanuginoſus.*
T. foliis ſubquinquejugis ſubaequalibus, ſeminibus bicornibus. *Sp. pl.* 553.
T. foliolis quinque parium. *Fl. zeyl.* 168. *
T. terreſtris zeylanicus, cauliculis villoſis, fructu acuminato. *Burm. zeyl.* 266. *t.* 106. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 490.
Wolliger Bürzeldorn. W.
Habitat in Zeylona. (v. ſ.)
Caules *adſcendentes, longi, teretes, piloſi, articulati.* Folia *oppoſita (ſuprema alterna,) petiolata altero minore: Foliola ovali-oblonga, acutiuſcula, utrin-*

que piloſa. Petioli *piloſi.* Stipula *ad quodvis folium, lanceolata, marceſcens.* Pedunculus *ex alis alternis, ſ. minoris folii (una cum ramulo,) uniflorus, piloſus, foliis brevior.* Fructus *angulatus, piloſus.*

3. TRIBULUS *terreſtris.*

T. foliolis ſexjugatis ſubaequalibus, ſeminibus quadricornibus. *Hort. cliff.* 160. *Hort. upſ.* 103. *Hort. lugdb.* 460. *Sauv. monſp.* 227. *Brown. jam.* 220. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. it.* 1. *p.* 172. *Kniph. cent.* 6. *n.* 95.

T. foliis aequalibus duodenis, conjugatis, fructu quadricorni. *Hall. helv. n.* 947. R.

T. terreſtris, ciceris folio, fructu aculeato. *Bauh. pin.* 250.

T. terreſtris. *Lob. ic.* 2. *p.* 84. *Dod. cer.* 223. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 352.

T. terreſtris minor incanus hiſpanicus. *Barr. rar.* 54. *t.* 558.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 491.

Gemeiner Bürzeldorn. W.

Habitat in Europa *auſtrali ad ſemitas.* ☉ (v. v.)

4. TRIBULUS *ciſtoides.*

T. foliolis octojugatis ſubaequalibus. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 54. *t.* 103. *Collect. ſuppl.* 109. * *Swartz obſ.* 171.

T. foliis octo parium pinnatis. *Roy. lugdb.* 460.

T. terreſtris major curaſſavicus. *Herm. par.* 236. *t.* 136.

T. terreſtris americanus, argemones flore flavo. *Pluk. alm.* 374. *t.* 67. *f.* 4. *Raj. ſuppl.* 649.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 492.

Ciſtenblütiger Bürzeldorn. W.

Habitat in America *calidiore.* ♃

849. QUASSIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 728.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Nect.* 5-phyllum. *Drupae* 5, diſtantes bivalves monoſpermae receptaculo carnoſo inſertae.

1. QUASSIA *amara.*

Q. floribus hermaphroditis, foliis impari-pinnatis, foliolis oppoſitis ſeſſilibus, petiolo articulato alato, floribus racemoſis. *Lin. ſuppl.* 235.

Quaſſia. *Mat. med.* 114. *Amoen. acad.* 6. *p.* 421. *t.* 4. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 2. *p.* 464.
Echte Quaſſie. W.
Habitat in Surinamo. ♄

Arbor *alta* (*eſt ſemper frutex nunquam arbor.* W.) Folia *alterna interrupte pinnata cum impari bijuga.* Foliola *oppoſita ad articulos petioli elliptica utrinque acuminata integerrima glaberrima venoſa.* Petiolus *bi-articulatus more Citri alatus membranula verſus articulorum apices ſenſim dilatata, rotundata, ad apicem articuli primi foliolis duobus ſeſſilibus, ad ultimi tribus aequalibus inſtructus.* Racemi *elongati ſecundi.* Flores *remoti bracteati. Facillime cognoſcitur foliis a reliquis omnibus diverſiſſimis.*

Quaſſia amara eſt planta rariſſima, lignum amaritie reliquis palmam praeripit. Lignum Quaſſiae venale non ex hoc frutice venit; colligitur a Quaſſia excelſa, quae minus amara. Lunà Act. Soc. Hiſt. Nat. Haf. 1. *p.* 2. *p.* 68. W.

2. QUASSIA *Simaruba.*

Q. floribus monoicis, foliis abrupte pinnatis, foliolis alternis ſubpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis. *Lin. ſuppl.* 234.
Simarouba. *Aublet. Act. pariſ.* 1776.
Simarouba amara. *Aubl. guj.* 2. *p.* 859. *t.* 331. 332.
Simarube Quaſſia. W.
Habitat in locis arenoſis Cajennae, Gujanae, *in* Carolina, *et in inſulis* Sandominicana, Jamaica. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Truncus *cortice laeteſcente amaro luteſcente.* Folia *abrupte pinnata, foliolis utrinque duobus ad novem oblongis acutis glaberrimis ſubſeſſilibus.* Petiolus *cylindricus.* Paniculae *axillares amplae.* Flores *in eadem panicula maſculi et feminei mixti.* Flores *maſculi:* Perianthium 1-*phyllum* 5-*dentatum.* Petala 5 *albicantia lanceolata calyci inſerta.* Nectarium *ſquamula ſubrotunda villoſa, ſinguli filamenti baſi interiori adnata.* Filamenta 10 *longitudine corollae.* Germen *ſterile in receptaculo carnoſo patulo depreſſum* 5-*ſtriatum nectariis tectum.* Stylus *nullus.* Stigma *nullum.* Flores *feminei:* Perianthium *ut in maſculis.* Petala *ut in maſculis.* Nectarium *ſquamulae* 10 *villoſae in orbem locatae.* Stamina *nulla.* Germina 5 *connexa.* Stylus *quinqueſtriatus.* Stigmata 5 *patentia.* Drupae *ovatae ſub-*

carnoſae nigrae receptaculo carnoſo orbiculato lateraliter affixae. Semina *ſolitaria, teſta fragili.*

Cortex Simarubae officinarum eſt cortex radicis. Barbari utuntur decocto hujus amaro purgante in febribus et diarrhoeis curandis. Ex his cognitionem hujus corticis habuerunt Europaei, quo diarrhoeas et dyſenterias tam facile curarunt.

*3. QUASSIA *excelſa.*

Q. floribus polygamis pentandris paniculatis, foliis impari-pinnatis, foliolis oppoſitis petiolatis, petiolo nudo. *Swartz Act. holm.* 1788. *p.* 302. *t.* 8. *prod.* 67. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 742.*

Quaſſia polygama. *Act. Edinb.* 3.

Unechte Quaſſie. W.

Habitat in ſylvis ſubmontoſis Jamaicae *et* Caribaearam. ♄

*850. ZWINGERA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1752.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* baſi dilatata piloſa. *Capſ.* 5, coriaceae 1-ſpermae receptaculo carnoſo inſertae.

*1. ZWINGERA *amara.* W.

Simaba gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 400. *t.* 153. *

Bittere Zwingere. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Frutex *octopedalis.* Folia *alterna impari-pinnata efoliolis quinis, vel ternata.* Foliola *oblonga acuminata emarginata integerrima venoſa glabra.* Pedunculi *triflori axillares.* Flores *albidi.* W.

Genus proximum Quaſſiae ſed diverſum: Calyce 5-*partito, nec* 5-*phyllo,* Nectarii *defectu,* Fructibus*que ſiccis. An character ſufficiens pro diverſo genere, quum et Quaſſia excelſa nectario careat?* W.

*851. GOMPHIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 738.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Antherae* ſubſeſſiles. *Drupae* 2 ſ. 5 monoſpermae receptaculo ſubrotundo carnoſo inſertae.

*1. GOMPHIA *anguſtifolia.*

G. foliis lanceolatis extrorſum ſerratis, panicula termi-

nali, petalis calyce longioribus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 49. *
Schmalblättrige Nagelbeere. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

*2. GOMPHIA *nitida.*
G. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis, paniculis terminalibus, calycibus corollae aequalibus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 49. * *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 739?
Glänzende Nagelbeere. W.
Habitat in ſylvis Jamaicae. ♄
Clariſſ. Vahl mihi in litteris ſcripſit ſuam a planta Swartzii eſſe diverſam. W.

3. GOMPHIA *Jabotapita.*
G. racemis terminalibus, petalis calyce triplo longioribus, drupis receptaculo immerſis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis. W.
Ochna (*Iabotapita*) racemis terminalibus. *Sp. pl.* 732.
Jabotapita pyramidato flore luteo, fructu rubro. *Plum. amer.* 42. *ic.* 153.
Jabotapita. *Marcg. braſ.* 101. *Raj. hiſt.* 1632.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 22.
Jabotapita Nagelbeere. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*4. GOMPHIA *laevigata.*
G. foliis lanceolatis obtuſiſſimis integerrimis emarginatis, panicula terminali. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 49. *
Glatte Nagelbeere. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

*5. GOMPHIA *laurifolia.*
G. racemis terminalibus, drupis receptaculo ſuperimpoſitis, foliis oblongis utrinque acuminatis integerrimis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 741. *
Lorbeerblättrige Nagelbeere. W.
Habitat in montibus Jamaicae. ♄

852. THRYALLIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 733.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 3-cocca.

1. THRYALLIS *braſilienſis.*
T braſilienſis. *Sp. pl.* 554.
Fruticeſcens herba pilonis. *Marcgr. braſ.* 97. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 493.
Braſiliſche Dochtpflanze. W.
Habitat in Braſilia. ♄

Fruticulus *ramis teretibus, articulatis.* Folia oppoſita, *petiolata, ovata, integerrima.* Stipulae *ſetaceae,* Racemus *terminalis, e dichotomia ramorum, ſimplex, pedalis:* Bracteis *ſetaceis, breviſſimis;* Pedicellis *filiformibus, flore longioribus.* Flores *parvi lutei. Fructus tricocci.*

853. LIMONIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 720.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

* *Spinoſae.*

1. LIMONIA *monophylla.*
L. foliis ſimplicibus ſpinis ſolitariis. *Mant.* 237.
Limones puſilli zeylanici ſylveſtres. *Burm. zeyl.* 143. *t.* 65. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 614.
Einblättrige Limonelle. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

Folia *oblongo-ovata.* Spinae *axillares, ſolitariae.* Pedunculi *axillares conferti, uniflori.*

2. LIMONIA *trifoliata.*
L. foliis ternatis, ſpinis geminis. *Mant.* 237. *Iacq. ic. rar. t.* 463. *Collect.* 3. *p.* 176. *
L. ſpinis axillaribus geminis, foliis ternatis ovatis, impari majore, fructu ſolitario. *Burm. ind.* 103. *t.* 35. *f.* 1.
β. inermis foliis ſeſſilibus. W.
Citrus parva dulcis. *Sonnerat it. nov. guin. p.* 103. *t.* 63.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 615.
Dreyblättrige Limonelle. W.
Habitat in India *orientali. D. du Cheſne.* ♄ (v. ſ.)

Arbor *facie Citri, ramulis flexuoſis.* Folia *alterna, petiolata, ternata, integerrima, adſperſa poris more Citri, magnitudine Iaſmini fruticoſi.* Foliola *lateralia ſeſſilia; intermedium majus, emarginatum.* Spinae *ſtipulares, petiolo longiores.* Bacca *pedunculata, globoſa, glabra, rubra, magnitudine Vaccinii.*

3. LIMONIA *acidiſſima.*
L. foliis pinnatis, ſpinis ſolitariis. *Mant.* 380.
L. ſpinis axillaribus ſolitariis rectis, foliis pinnatis: petiolis alatis. *Brown. jam.* 102.
L. malus ſylveſtris zeylanica, fructu pumilo. *Burm. zeyl.* 143. *Burm. ind.* 102.
Schinus foliis pinnatis: petiolo marginato articulato, ſpinis axillaribus ſolitariis. *Fl. zeyl.* 175.*
Aniſifolium. *Rumph. amb.* 2. *t.* 43.
Catu Tſieru Naregam. *Rheed. mal.* 4. *p. t.* 14.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 616.
Gefiederte Limonelle. W.
Habitat in India. ♄
Clariſſ. Koenig putat, hanc ad Crataevae genus pertinere. Retz. obſ. 4. p. 26.

** *Inermes.*

*4. LIMONIA *lucida.*
L. inermis, foliis ſimplicibus, pedunculis axillaribus. *Forſt. prod. n.* 191.
Glänzende Limonelle. W.
Habitat in inſula Mallicollo. ♄

*5. LIMONIA *mauritiana.*
L. foliis ſubternatis, foliolis ovatis integris ſubacuminatis, paniculis axillaribus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 497.*
Africaniſche Limonelle. W.
Habitat in inſula Mauritii. ♄
Habitus Rhois. Folia *e tribus rarius quatuor foliolis compoſita.* W.

*6. LIMONIA *pentaphylla.*
L. inermis, foliis ſubquinatis. *Retz. obſ.* 5. *p.* 24.
Fünfblättrige Limonelle. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Spinae *nullae.* Folia *plerumque in petiolo quina alterna ovata acuta integra magnitudine foliorum Citri medicae.* Petioli *partiales breves ſubalati, alae vero inflexae.* Racemi *breves compoſiti.* Flores *minuti.* Calyx *quinquedentatus.* Retz. l. c.

*7. LIMONIA *madagaſcarenſis.*
L. foliis pinnatis, foliolis alternis ſubquaternis lanceolatis dentatis, paniculis brevibus axillaribus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 497.*

Madagaſcarſc Limonelle. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

8. LIMONIA *minuta.*

L. inermis, foliis pinnatis, racemis corymboſis terminalibus. *Forſt. prod. n.* 190.
Kleine Limonelle. W.
Habitat in Amicorum *inſulis.* ♄

854. MONOTROPA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 737.

Cal. o. *Petala* 10; horum 5 exteriora baſi excavato-mellifera. *Capſ.* 5-valvis. *Quinta* pars numeri quibusdam excluditur.

1. MONOTROPA *Hypopithys.*

M. floribus lateralibus octandris, terminali decandro. *Fl. ſuec.* 329, 351. *Phil. bot.* §. 158. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 177. *Willich. obſ. n.* 70. *Pollich. pal. n.* 393. *Mattuſch. ſil. n.* 288. *Kniph. cent.* 10. *n.* 63. *Flor. dan.* 232. *Hoffm. germ.* 142. *Roth. germ. I.* 180. *II.* 461.
Hypopithys ſpica florida nutante. *Hall. helv. n.* 1002.
Hypopithys multiflora. *Scop. carn. n.* 478.
Orobanche quae Hypopithys dici poteſt. *Bauh. pin.* 88. *prodr.* 31.
Orobanche Hypopithys lutea. *Mentz. pug.* 3. *f.* 5.
Orobanche flore breviore duplici, verbaſculi odore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 504. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 20.
Orobanche verbaſculi odore. *Plot. oxf.* 146. *t.* 9. *f.* 6. *Pluk. alm.* 273. *t.* 209. *f.* 5.
Hypopithys. *Riv. tetr. irreg.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 494.
Fichten Ohnblatt. W.
Habitat in Sueciae, Germaniae, Angliae, Canadae *ſylvis Paraſitica radicum.* ♃ (v. v.)
Variat floribus cernuis et erectis. Varietas floribus erectis quandoque eſt uniflora. W.

2. MONOTROPA *uniflora.*

M. caule unifloro, flore decandro. *Sp. pl.* 555.
M. flore nutante. *Gron. virg.* 41.
Orobanche monanthos virginiana, flore majore pentapetalo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 502. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 5. *mala.*

Orobanche virginiana, flore pentapetalo cernuo. *Pluk. alm.* 273. *t.* 209. *f.* 2. *Cateſb. car.* 1. *p.* 36. *t.* 36. *bon.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 496.
Einblüthiges Ohnblatt. W.
Habitat in Marilandia, Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)

855. DIONAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 729.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-locularis, gibba, polyſperma.

1\. DIONAEA *Muſcipula.*

Dionaea. *Ellis. in Nov. act. Upſal.* 1. *p.* 98. *t.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 497. *t.* 50. *B.*
Wunderbarer Fliegenfänger W.
Habitat in Carolinae *uliginoſis.* ♃

Miraculum *Naturae.* Folia *radicalia, petiolata, biloba, ſubrotunda, ciliata, conduplicanda, ſupra ſpinulis* 3 *ſ.* 4 *breviſſimis.* Petioli *alati* (more Aurantii,) *folio fere longiores absque ciliis.* Scapus *ſpithameus, erectus, filiformis.* Corymbus *terminalis, ſubumbellatus:* Pedunculis *ſimplicibus, unifloris, interſtinctis* Bractea *lanceolata, pedunculis breviore.* Flores *albi.* Petala *lineata* ſtriis 7, *ad apicem utrinque inflexa.*

Senſibilia *ſunt Folia, ut dum inſectum irrepat aut inſideat folio, ſe claudant conduplicatis lateribus et decuſſatis ciliis marginalibus, detinentia etiam inſectum aculeis paginae ſuperioris, uſquedum laſſum quieſcat, tumque dimittunt.*

Hanc plantam in epiſtola ad Ill. Linneum *data fuſius deſcripſit cl.* Ioh. Ellis. *Quam epiſtolam Ill.* Schreberus *latine et germanice reddidit et una cum icone plantae vivis coloribus expreſſa publici juris fecit Erlangae* 1771. R.

856. IUSSIEUA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 741.

Cal. 4 ſ. 5-partitus, ſuperus. *Petala* 4 ſ. 5. *Capſ.* 4 ſ. 5-locularis, oblonga, angulis dehiſcens. *Sem.* numeroſa, minuta.

1\. IUSSIEUA *repens.*

I. repens, floribus pentapetalis decandris, foliis ovato-oblongis. *Mant.* 381.

I. repens, flor. pentapetalis decandris, pedunculis folio longioribus. *Fl. zeyl.* 169. *
Iuſſieua repens. *Swartz obſ.* 172?
Oenothera herbacea repens *Brown. jam.* 208?
Nir Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 99. *t.* 51. *Raj. hiſt.* 1510.
β. Iuſſieua *adſcendens.*
I. adſcendens, floribus pentapetalis decandris, foliis obovato-oblongis glabris, pedunculis folio brevioribus. *Mant.* 69.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 499.
Kriechende Iuſſieua. W.
Habitat in India. ♃

Huic β. Caules *herbacei, adſcendentes, ſimplices, laeves.* Folia *alterna, petiolata, obovato-oblonga, laevia, obtuſa.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, folio breviores, ſed fructus longitudine folii.*

2. IUSSIEUA *tenella.*

I. glabra, floribus pentapetalis ſubſeſſilibus, foliis oppoſitis lineari-lanceolatis. *Burm. ind.* 103. *t.* 34. *f.* 2. †
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 500.
Zarte Iuſſieua. W.
Habitat in Iava.

3. IUSSIEUA *linearis.* W.

I. foliis linearibus ſeſſilibus hiſpidis, floribus tetrapetalis octandris. W.
Linienblättrige Iuſſieua. W.
Habitat in Guinea. (v. ſ.)

Caulis *erectus ramoſus glaber ſtriatus teres, apice pilis rariſſimis tectus.* Rami *alterni ſimplices divaricati ſtriati teretes, pilis ſparſis ad ſummitatem copioſioribus breviſſimis obſiti.* Folia *longiſſima biuncialia et ultra linearia obtuſiuſculà ſeſſilia alterna, vix manifeſte venoſa, pilis rigidis minutis erectis hiſpida.* Flores *ſeſſiles axillares.* Germen *inferum hiſpidum teres calyce perſiſtenti coronatum.* W.

4. IUSSIEUA *linifolia.*

I. foliis laciniiſque calycinis lineari-lanceolatis glabris, floribus ſeſſilibus octandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 32.
Flachsblättrige Iuſſieua. W.
Habitat in America *meridionali.*

Caulis *herbaceus erectus tener glaber, inferne tetragonus, ſuperne compreſſo-angulatus ramoſus.* Rami *alterni ſubfiliformes patentiſſimi.* Folia *ſubſeſſilia pol-*

licaria vel minora anguſta lineari-lanceolata utrinque attenuata glaberrima, vix venoſa, tenuiſſime ſubnervoſa. Flores *axillares ſolitarii ſeſſiles.* Calyx *laciniis quatuor lanceolatis attenuatis vix ſemiunguicularibus.* Capſula *pollicaris tenuis teres glabra.* Vahl. l. c.

5. IUSSIEUA *peruviana.*

I. erecta, floribus pentapetalis, pedunculis bracteatis, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus. W.

I. erecta, floribus pentapetalis, pedunculis folioſis. *Sp. pl.* 555.

Onagra laurifolia, flore amplo pentapetalo. *Few. peruv.* 716. *t.* 11.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 500.

Peruvianiſche Iuſſieua. W.

Habitat in Lima.

6. IUSSIEUA *hirta.*

I. erecta hirſuta, foliis lanceolatis attenuatis ſubtus hirtis, floribus pedunculatis octandris. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 31.*

I. erecta hirſuta, floribus tetrapetalis octandris, foliis ovatis acuminatis ſubtus hirtis. *Swartz. obſ.* 143.

Oenothera (*hirta*) hirta, foliis ſupra glabris. *Sp. pl.* 491.

Oenothera aſſurgens hirſuta, floribus ſolitariis. *Brown. jam.* 208.

Onagra fruteſcens et hirſuta nerii folio, flore magno luteo. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 174. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 417.

Rauhe Iuſſieua. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. ſ.)

7. IUSSIEUA *pubeſcens.* †

I. erecta villoſa, floribus pentapetalis decandris ſeſſilibus. *Mill. dict. n.* 2. *Loefl. it.* 282. *n.* 201.

Lyſimachia lutea erecta non pappoſa major, foliis hirſutis, fructu caryophylloide. *Sloan. jam.* 85.

Behaarte Iuſſieua. W.

Habitat in America.

8. IUSSIEUA *octovalvis.*

I. erecta, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis, capſulis multivalvibus, foliis lanceolatis. *Swartz obſ.* 142.*

Oenothera (*octovalvis*) foliis lanceolato-oblongis acuminatis planis glabris. *Sp. pl.* 492. *Iacq. amer.* 102. *t.* 70.

Oenothera aſſurgens glabra, foliis lanceolatis alternis integerrimis, floribus ſolitariis alaribus. *Brown. jam.* 208.
Onagra foliis perſicariae anguſtioribus, flore magno luteo. *Plum. ſpec. 7. ic. 275. f. 1.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 416. *t.* 48. *f.* 2.
Vielklappige Iuſſieua. W.
Habitat in Caribaeis *locis aquoſis humidis.* ⊙

9. IUSSIEUA *ſuffruticoſa.*
I. erecta villoſa, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis. *Mill. dict. n.* 1. *Rumph. amb.* 6. *t.* 41.
Ludwigia capſulis oblongis uncialibus. *Roy. lugdb.* 252.
Lyſimachia indica non papposa, flore luteo minimo, ſiliquis caryophyllum aromaticum aemulantibus. *Herm. lugdb.* 396.
Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 55. *t.* 49. *Raj. hiſt.* 1510.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 501.
Staudige Iuſſieua. W.
Habitat in India.

Caulis *erectus, alterne ramoſus.* Folia *alterna, lanceolata, vix petiolata, uti tota planta, utrinque pubeſcentia.* Capſulae *foliis paulo breviores, pollices* 2 *longae, ſtriatae, ſubſeſſiles.*

10. IUSSIEUA *acuminata.*
I. erectiuſcula glabra, foliis lato-lanceolatis attenuatis, floribus octandris ſubſeſſilibus. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 745. *
Langzugeſpitzte Iuſſieua. W.
Habitat in depreſſis Jamaicae *auſtralis rarius.* ⊙

11. IUSSIEUA *inclinata.*
I. erecta glabra, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis. *Lin. ſuppl.* 235.
Gebogene Iuſſieua. W.
Habitat in Surinami *paludoſis. C. G. Dalberg.* ⊙

Planta *annua erecta tota glabra.* Caulis *ſimplex teres craſſus poroſus aquaticus, ad articulos inferiores radicans.* Folia *obovata obtuſa petiolata, petiolis vix longiora coſtata glabra alterna.* Pedunculi *ſolitarii axillares uniflori, petiolo paulo longiores.* Germen *pedunculo paulo brevius laeve incraſſatum tetragonum acutangulum.* Calyx *foliolis ovatis perſiſtentibus.* Petala *quatuor ovata majora venoſa tenerrima.* Antherae *octo.*

12. IUSSIEUA *erecta.*

I. erecta glabra, floribus tetrapetalis octandris ſeſſilibus. *Flor. zeyl.* 170. *Hort. upſ.* 103. *Mill. dict. n.* 3. *Swartz obſ.* 173.* *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 31? *Thunb. jap.* 180?

I. (*diffuſa*) caule repente, foliis lanceolatis. *Forſk. deſcr.* 210?

Ludwigia capſulis oblongis. *Hort. cliff.* 491.

Onagra perſicae foliis amplioribus, parvo flore luteo. *Plum. ſpec.* 7. *t.* 175. *f.* 2.

Lyſimachia lutea non papposa erecta, foliis glabris, fructu caryophylloidi. *Sloan. jam.* 85. *hiſt.* 1. *p.* 37. *t.* 11. *f.* 1.

Iaſminum catalonicum, flore luteo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 42. *t.* 24. *f.* 3.

Herba vitiliginum *Rumph. amb.* 6. *p.* 49. *t.* 21. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 501.

Aufrechte Iuſſieua. W.

Habitat in America *et forte in* Virginia. ⊙

Caulis *erectus, ſimplex, altus, ſtrictus, teres, ut tota planta glaberrimus.* Folia *alterna, petiolata, lanceolata,* (*obovata. Diſſ. de pl. ſurinam.* 1776.) *pollicis transverſi latitudine.* Capſulae *ſubſeſſiles, folio triplo breviores. Paluſtris planta.*

*857. SCHOUSBOEA. W.

Cacoucia Aubl. guj. 1. *p.* 450.

Cal. campanulatus 5-fidus corollifer. *Petala* 5. *Bacca* quinquangularis monoſperma. *Semen* arillatum.

*1. SCHOUSBOEA *coccinea.* W.

Cacoucia coccinea. *Aubl. guj.* 1. *p.* 450. *t.* 179.*

Scharlachfarbene Schousböa. W.

Habitat in Gujana *ad ripas fluvii* Sinemarenſis. ♄

Frutex *ſcandens.* Folia *alterna petiolata ovata acuminata ſubcordata venoſa integerrima glabra.* Racemus *terminalis.* Flores *breviſſime pedunculati, bractea lanceolata viridi ſuffulti.* Calyx *coloratus coccineus.* Petala *rubra venoſa.* Fructus *magnitudine nucis juglandis.* W.

Genus proximum Fuchſiis et Combretis, ſed fructu diverſum. Dixi in honorem Clariſſ. Schousboe bota-

nici celebris, qui in itinere per imperium Maroccanum multa nova detexit vegetabilia. W.

858. HEISTERIA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 736.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Drupa* calyce colorato maximo.

1. HEISTERIA *coccinea.*
Heiſteria. *Iacq. amer.* 126. *t.* 81.
Borbonia fructu oblongo nigro, calyce coccineo. *Plum. gen.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 544.
Scharlachfarbene Heiſterie. W.
Habitat in ſylvis denſis Martinicae *ad torrentes.* ♄
Lauro *affinis.*

859. QUISQUALIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 739.

Cal. 5-fidus, filiformis. *Petala* 5. *Drupa* 5-angulari.

1. QUISQUALIS *indica.*
R. indica. *Sp. pl.* 556.
Quisqualis pubeſcens. *Burm. ind. t.* 35. *f.* 2.
Quisqualis glabra. *Ej. t.* 28. *f.* 2.
Quisqualis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 71. *t.* 38.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 546.
Indiſche Quisqualis. W.
Habitat in India. ♄

Rami *teretes, pubeſcentes.* Folia *oppoſita, petiolata, cordata ſ. ovata, integerrima.* Stipulae *nullae.* Spica *terminalis et axillares pedunculatae Bracteis ovato-oblongis, oppoſitis,* Floribusque *oppoſitis ſtatura Daphnes, calyce filiformi extus pubeſcente.*

860. DAIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 740.

Involucrum 4-phyllum. *Cor.* 4. ſ. 3-fida. *Bacca* 1-ſperma.

1. DAIS *cotinifolia.*
D. foliis obovatis obtuſis, floribus quinquefidis decandris. W.

D. floribus quinquefidis decandris. *Sp. pl.* 556. *Lamarck illuſt. gen. t.* 368. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 548.
Perükenbaumblättrige Dais. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ *Dav. v. Royen.*

Folia *oppoſita, obovata, integerrima, glabra, petiolata.* Flores *faſciculo aggregati, terminales, pubeſcentes:* Involucro *gemmaceo, quadrivalvi. Affinis Paſſerinis.*

*2. DAIS *diſperma.*
D. floribus octandris decandrisque, foliis ovato-lanceolatis enerviis. *Forſt. prod. n.* 192.
Zweyſaamige Dais. W.
Habitat in inſula Tongatabu. ♄

3. DAIS *octandra.*
D. foliis ovato-lanceolatis venoſis, floribus quadrifidis octandris. W.
D. floribus quadrifidis octandris. *Mant.* 69. *Burm. ind. t.* 33. *f.* 2.
β. D. (*laurifolia*) floribus decandris, foliis lanceolatis acutis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 77. *Collect.* 1. *p.* 146.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 548.
Achtmännige Dais. W.
Habitat in India. ♄

Folia oppoſita, elliptico-oblonga, acuminata, petiolata, laevia. Involucrum *unum alterumve, terminale, pedunculatum, floribus brevius.* Flores *glabri.* Stamina 8, *ſupra tubum, corolla quadrifida longiora.*

Binas hujus generis ſpecies indicavit adhuc Clariſſ. Lamarck encycl. 2. *p.* 252. *Ambae vero jam a Linnaei filio ſub nomine Gnidia daphnaefolia, videntur deſcriptae. Altera enim Dais pubeſcens, eſt hujus plantae varietas α. altera Dais madagaſcarenſis dicta, eſt varietas β.* W.

*861. CERATOPETALUM.

Smith. Nov. Holl. 1. *p.* 9.

Cal. 5-partitus ſtaminiferus perſiſtens. *Petala* 5-pinnatifida. *Antherae* calcaratae. *Capſ.* in fundo calycis tecta bilocularis.

*1. CERATOPETALUM *gummiferum.*
C. gummiferum. *Smith. Nov. Holl.* 1. *p.* 9. *t.* 3.*
Gummibringende Hornblume. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Arbor *procera.* Folia *oppoſita petiolata ternata.* Foliola *ſeſſilia lanceolata ſerrata venoſa glabra.* Panicula *terminalis.* Calyx *flaveſcens laciniis rubicundis.* Petala *flava.* W.

862. MELASTOMA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 742.

Cal. 5-fidus, campanulatus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Bacca* 5-locularis, calyce obvoluta.

** Dodecandrae.*

1. MELASTOMA *calyptrata.*

M. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis trinerviis glabris obſolete denticulatis, floribus paniculatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 40. *

Gekappter Schwarzſchlund. W.

Habitat in inſula Montſerrat. ♄

Panicula *terminalis erecta palmaris.* Rami *patentes infimi quatuor, reliqui oppoſiti, glabri.* Ramuli *divaricati triflori.* Flores *pedicellati calyptrati.* Calyptra *conica acuta transverſim decidua.* Calyx *magnitudine ſeminis Coriandri truncatus.* Petala *flava.* Vahl. l. c.

2. MELASTOMA *crocea.*

M. foliis ovatis ſubſerratis glabris, nervis ad petiolum barbatis, panicula terminali. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 54. *

Safranfarbener Schwarzſchlund. W.

Habitat in Peru. ♄

Folia *ſunt quinquenervia.* W.

3. MELASTOMA *patens.*

M. foliis quinquenerviis cordatis hirſutis ſubdenticulatis, racemo terminali patulo, floribus dodecandris. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 791. *

Melaſtoma umbellata. *Mill. dict.*

Weitriſpiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in montibus altioribus Jamaicae. ♄

Hirſuties *omnium partium fuſco-rubra.* Swartz l. c.

** * Decandrae foliis trinerviis.*

4. MELASTOMA *crenata.*

M. hiſpida, foliis ſubcordatis oblongis crenatis acumina-

tis, racemis axillaribus paucifloris longitudine petioli. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 41. *
Gekerbter Schwarzſchlund. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*5. MELASTOMA *rigida.*

M. foliis trinerviis ſubdenticulatis ſubcordato-ovatis rigidis, ſubtus ſcabris, racemis terminalibus paniculatis ferrugineo-hirtis. *Swartz. prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 768. *
Steifblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus altiſſimis coeruleis Jamaicae. ♄

*6. MELASTOMA *decuſſata.*

M. foliis lanceolato-oblongis ſerrulatis ciliatis ſupra glaberrimis, ſpicis racemoſis bipartitis, floribus confertis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 42. *
M. (*racemoſa*) foliis ovatis quinquenerviis, petiolis et limbis foliorum villoſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 406. *t.* 156. *
Durchkreuztraubiger Schwarzſchlund. W.
Habitat ad rivulorum ripas Cajennae, Gujanae. ♄

*7. MELASTOMA *montana.*

M. foliis trinerviis ſubdenticulatis glabriuſculis, racemo terminali, pedunculis tripartito-trifidis patulis, petalis retuſis, calyce truncato. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 766. *
Berg Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus excelſis Jamaicae *auſtralis.* ♄

*8. MELASTOMA *procera.*

M. arborea, foliis trinerviis ſubdenticulatis glabris, racemo terminali, pedunculis trifidis erectis, calycibus truncatis. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 764. *
Hoher Schwarzſchlund. W.
Habitat in altis montibus Jamaicae. ♄

*9. MELASTOMA *adſcendens.*

M. foliis trinerviis denticulatis ovatis acutis glabris, racemo ovato terminali, racemulis floribus ſubſecundis, caule ſcandente. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 772. *
Melaſtoma ſcandens. *Swartz prod.* 69.
Steigender Schwarzſchlund. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae. ♄

10. MELASTOMA *aſpera.*
M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis trinerviis ſcabris, floribus terminalibus ſubcorymboſis. W.
M. foliis integerrimis trinerviis lanceolatis ſcabris. *Sp. pl.* 560. *Fl. zeyl.* 172.
M. ſcabra trinervia. *Burm. zeyl.* 154. *t.* 72.
Fragarius ruber. *Rumph. amb.* 4. *p.* 91. *t.* 43. *Raj. hiſt.* 1493.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 624.
Scharfblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in India. ♄

11. MELASTOMA *ledifolia.*
M. villoſa, foliis ovato-lanceolatis integerrimis trinerviis, floribus axillaribus terminalibusque bracteatis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 48. *
Porſtblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Peru. ♄
Folia *petiolata Ledi latifolii ſuperne raris pilis obſita, inferne albo-villoſa.* Flores *pedunculati ſolitarii vel gemini.* Bracteae *binae ſub calyce.* Lamarck. l. c.

12. MELASTOMA *ſtrigoſa.*
M. foliis integerrimis trinerviis ſtrigoſis ovatis, floribus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 236.
Srieglicher Schwarzſchlund. W.
Habitat in Nova Granada. ♄ *Mutis.*
Frutex *caule ſtrigis adpreſſis ſcabro.* Folia *oppoſita ſubpetiolata ovata trinervia integerrima, ſupra ſtrigoſa, ſubtus ſolis nervis ſtrigoſa.* Pedunculi *oppoſiti aut terminales uniflori cernui, ſaepius diphylli.* Calyx *valde ſtrigoſus.* Corolla *purpurea.*

13. MELASTOMA *holoſericea.*
M. foliis oblongo-ovatis integerrimis ſubtus canis, ſpicis racemoſis bipartitis, floribus confertis biſeriatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 42. *
M. foliis integerrimis trinerviis oblongo-ovatis ſubtus tomentoſis, racemis brachiatis, ſpicis bipartitis. *Sp. pl.* 559.
M. foliis integerrimis ovato-lanceolatis ſubtus ſericeis, nervis ante baſin coadunatis. *Hort. cliff.* 162.
Acinodendrum americanum ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano maximo utrinque glabro. *Pluk. mant.* 4. *t.* 252. *f.* 2.

Arbor racemoſa braſiliana folio malabathri. *Breyn. cent.* 3. *t.* 2. 4.
Mucra. *Marcgr. braſ.* 117.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 625.
Sammetartiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Braſilia, Surinamo. ♄
Arbor *ramis tomentoſis.* Folia *petiolata trinervia excepto marginali nervo, reticulata, ſubtus tomentoſa, uti petioli.* Racemi *terminales e dichotomia brachiati, ſpicis lateralibus conjugatis ſecundis flavis.*

*14. MELASTOMA *velutina.* W.
M. foliis trinerviis integerrimis ſeſſilibus ovatis acutis villoſo-ſericeis, racemis brachiatis, ramis bipartitis, caule acute quadrangulo.
Melaſtoma holoſericea. *Swartz obſ.* 176. *
Seidenartiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Jamaica, Braſilia. ♄

15. MELASTOMA *ſeſſilifolia.*
M. foliis integerrimis trinerviis ſpathulatis ſeſſilibus ſubtus ſubtomentoſis. *Sp. pl.* 558.
M. foliis amplioribus per petiolum recurrentibus et contractis, faſciculis florum ſparſis. *Brown. jam.* 219. *t.* 29. *f.* 1. 2.
Arbor americana, foliis a concurſu nervorum ima parte longius productis, ſubtus lanugine candicante tomentoſis. *Pluk. alm.* 50. *t.* 249. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 626.
Stielloſer Schwarzſchlund. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*16. MELASTOMA *ramiflora.*
M. foliis trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis ſcabriuſculis, ramis floriferis, floribus pedunculatis ſubconfertis. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 775. *
Aſtblütiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in paroecia St. Thomae *in* Jamaica *locis paludoſis.* ♄

*17. MELASTOMA *glabra.*
M. foliis integerrimis trinerviis oblongis acuminatis glabris, panicula terminali, calycibus circumſciſſis. W.
M. foliis integerrimis trinerviis elliptico-lanceolatis ſcabris, calycibus circumſciſſis. *Forſt. prod. n.* 194.
Glatter Schwarzſchlund. W.
Habitat in Societatis *inſulis.* ♄ (v. ſ.)

'18. MELASTOMA *chryſophylla.*

M. glabra, foliis ovatis acutis trinerviis integerrimis ſubtus aureo-virentibus, panicula terminali. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 50. *

Goldfarbener Schwarzſchlund. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄.

Tota planta glabra. Folia *ſubtus ſunt flavo-viridia coloris Lichenis vulpini.* Flores *mediocres.* Calycis *laciniae lanceolatae ciliatae deciduae.* Lamarck l. c.

'19. MELASTOMA *quadrangularis.*

M. foliis trinerviis integerrimis ovato-lanceolatis glabris, nervis ſubtus coloratis, ramis tetragonis, racemo ſtricto terminali. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 770. *

Viereckiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Jamaicae *montibus altis.* ♄

'20. MELASTOMA *trinervia.*

M. foliis trinerviis absque marginali, integerrimis utrinque glabris tenuioribus, racemis terminalibus, racemulis bipartitis, floribus ſeſſilibus. *Swartz. prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 774. *

Dreynerviger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Jamaicae *montoſis.* ♄ (v. f.)

'21. MELASTOMA *repens.*

M. foliis obovatis glabris trinervibus ſubintegerrimis, floribus ſolitariis terminalibus caule repente. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 54. *illuſt. gen. t.* 362. *f.* 2.

Melaſtoma octandra. *Oſb. it.* 213. * *Retz. obſ.* 4. *p.* 25. *

Kriechender Schwarzſchlund. W.

Habitat in China. ♃

*** *Decandrae foliis triplinerviis.*

22. MELASTOMA *Groſſularioides.*

M. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis denticulatis triplinerviis glabris. W.

M. foliis denticulatis triplinerviis ovatis acuminatis. *Sp. pl.* 558.

Arbor americana, latiore et acuminato folio trinervio, utrinque glabro et margine laeviter crenato. *Pluk. alm.* 40. *t.* 249. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 621.

Stachelbeerartiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Surinamo. *D. Bartſch.*

23. MELASTOMA *parviflora.*

M. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis denticulatis triplinerviis glabris, panicula terminali trichotoma. W.

M. (*parviflora*) foliis ovato-oblongis glabris denticulatis, floribus paniculatis terminatricibus, fructu parvo coeruleo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 433. *t.* 171. *

Kleinblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in paludoſis Cajennae, Gujanae. ♄

*24. MELASTOMA *ſuccoſa.*

M. foliis ellipticis acutis integerrimis triplinerviis hirſutis ſubtus tomentoſis, floribus lateralibus ſubſeſſilibus, petalis denticulatis. W.

M. (*ſuccoſa*) foliis ovatis hirſutis aſperis, ſubtus incanis, fructu purpuraſcente. *Aubl. guj.* 1. *p.* 418. *t.* 162. *

Saftiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in ſylvis Gujanae, Cajennae. ♄

*25. MELASTOMA *arboreſcens.*

M. foliis ſubrotundo-ovatis acutis integerrimis triplinerviis glabris, corymbis bracteatis lateralibus, petalis biunguiculatis. W.

M. (*arboreſcens*) foliis ſubrotundis quinquenerviis, floribus corymboſis, petalis baſi bifidis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 420. *t.* 163. *

Baumartiger Swarzſchlund. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Videtur affinis M. Groſſularioidi, ſed quoad folia diverſa, defectu dentium et acuminis. W.

*26. MELASTOMA *longifolia.*

M. foliis lanceolatis acutis integerrimis glabris triplinerviis, ſummis quaternis, panicula terminali ſupradecompoſita. W.

M. (*longifolia*) foliis lanceolatis glabris trinerviis, ad ſummitatem caulis quaternis, floribus parvis albis paniculatis, fructu parvo coeruleo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 432. *t.* 170. *

Langblättriger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Gujana *ad ripam amnis* Galibienſis. ♄

*27. MELASTOMA *praſina.*

M. foliis triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis glabris, panicula terminali patentiſſima. *Swartz prod.* 69. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 777. *

M. (*laevigata*) foliis integerrimis quinquenerviis ova-

to-oblongis laeviuſculis acuminatis, margine laevibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 412. *t.* 159.
Lauchfarbener Schwarzſchlund. W.
Habitat in ſylvis Jamaicae, Hiſpaniolae *inque pratis* Cajennae, Gujanae. ♄

**** *Decandrae, foliis quintuplinerviis.*

28. MELASTOMA *agreſtis.*

M. villoſa, foliis ovato-lanceolatis denticulatis quintuplinerviis, corymbo terminali. W.

M. (*agreſtis*) foliis ovato-oblongis, floribus albis paniculatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 425. *t.* 166. *

Acker Schwarzſchlund. W.

Habitat ad rivulorum ripas, inque muris antiquis Cajennae. ♃

Folia *ferrugineo-villoſa.* Aubl. l. c.

29. MELASTOMA *ſcandens.*

M. foliis ovatis ſubſerratis hirſutis quintuplinerviis, corymbo terminali capitato, caule ſcandente. W.

M. (*ſcandens*) caule et foliis piloſis, floribus albis terminatricibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 435. *t.* 172. *

Kletternder Schwarzſchlund. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

30. MELASTOMA *alata.*

M. foliis ovatis utrinque acuminatis integerrimis quintuplinerviis ſubtus pubeſcentibus, capitulis paniculatis terminalibus, caule alato. W.

M. (*alata*) floribus racemoſis, foliis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis canis ſubſeſſilibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 410. *t.* 158. *

Geflügelter Schwarzſchlund. W.

Habitat in campeſtribus Cajennae, Gujanae. ♄

31. MELASTOMA *flaveſcens.*

M. foliis obovato-acutis integerrimis quintuplinerviis ſubtus pubeſcentibus, corymbis bracteatis lateralibus. W.

M. (*flaveſcens*) foliis ovatis quinquenerviis ſubtus incanis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 423. *t.* 164. *

Gelblicher Schwarzſchlund. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

***** *Decandrae, foliis quinquenerviis.*

*32. MELASTOMA *hirta.*

M. foliis denticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis, caule hiſpido. *Mill. dict. n.* 3. *Swartz obſ.* 175.*

Arbuſcula Jamaicenſis quinquenervis, minutiſſime dentatis foliis et caule pubeſcentibus. *Pluk. alm.* 40. *t.* 264. *f.* 1. *vel potius* 265. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 623.

Behaarter Schwarzſchlund. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Flores in foliorum alis breviter pedunculati.

Variat floribus *dodecandris*, calyce *ſexfido*; petalis *ſex*, ſtaminibus *duodecim*, bacca *ſexloculari.* Swartz l. c.

*33. MELASTOMA *ſpicata.*

M. foliis ſubdenticulatis quinquenerviis ovato-lanceolatis villoſis, ſpicis axillaribus. W.

M. (*ſpicata*) foliis ovato-oblongis acuminatis piloſis, floribus cernuis ſpicatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 423. *t.* 165.

Aehrenblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in pratis Gujanae. ♄

34. MELASTOMA *Acinodendron.*

M. foliis ovatis acuminatis denticulatis quinquenerviis, cymis axillaribus. W.

M. foliis denticulatis ſubtrinerviis ovatis acutis. *Sp. pl.* 558.

M. foliis ovato-lanceolatis crenatis, nervis quinque longitudinalibus, extimis obſoletioribus. *Hort. cliff.* 162.

Acinodendron americanum pentaneuron, foliis craſſis hirſutis ad ambitum rarioribus ſerris. *Pluk. mant.* 4. *t.* 159. *f.* 1.

Groſſularia alia plantaginis folio, fructu rariore violaceo. *Plum. ic.* 142. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 620.

Beeren Schwarzſchlund. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

Species obſcura. Swartz obſ. 174.

*35. MELASTOMA *cymoſa.*

M. foliis cordatis acuminatis quinquenerviis ſerrulatis pubeſcentibus, cyma terminali, calycinis laciniis ſubrotundis, ſtaminibus quinque ſterilibus. W.

M. (*cymoſum*) foliis ſeptemnerviis cordato-acuminatis pubeſcentibus, floribus terminalibus cymoſis. *Schrad. ed Wendl. ſert. hannov.* 18. *t.* 8.*

Doldentraubiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. v.)

'36. MELASTOMA *grandiflora.*

M. foliis cordatis acuminatis quinquenerviis ſerrulatis piloſis, pedunculo terminali bifido, calycinis laciniis lineari-ſubulatis, ſtaminibus quinque ſterilibus. W.

M. foliis cordatis quinquenerviis ſerrulatis cauleque hirtis, pedunculis bifidis, ſtaminibus quinque ſterilibus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 59. *

M. (*grandiflora*) caule et foliis hirſutis cordatis acuminatis, flore violaceo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 414. *t.* 160. *

Groſsblütiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in pratis Cajennae *et* Gujanae. ♄

'37. MELASTOMA *elegans.*

M. hiſpida, foliis cordatis inaequaliter crenato-dentatis, racemis dichotomiae terminalibusque paucifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 44. *

M. (*elegans*) foliis cordatis piloſis eleganter crenatis, floribus corymboſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 427. *t.* 167. *

Schöner Schwarzſchlund. W.
Habitat in Cajennae *muris antiquis.* ♄

'38. MELASTOMA *rufeſcens.*

M. foliis cordatis crenulatis ſcabris ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus glomerato-ſpicatis. W.

M. (*rufeſcens*) foliis craſſis rugoſis cordatis ſubtus tomentoſis ſubſeſſilibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 408. *t.* 157.

Fuchsfarbener Schwarzſchlund. W.
Habitat in locis compeſtribus Gujanae. ♄

'39. MELASTOMA *rubra.*

M. foliis cordatis ſubcrenatis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, floribus axillaribus et lateralibus ſolitariis ſeſſilibus. W.

M. (*rubra*) foliis ſubcordatis ſeſſilibus, floribus axillaribus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 416. *t.* 161. *

Rother Schwarzſchlund. W.
Habitat ad rivulorum ripas Gujanae. ♄

'40. MELASTOMA *Majeta.*

M. foliis obovatis acuminatis quinquenerviis ſubcrenulatis piloſis, baſi ad petiolum veſiculoſis, floribus ſolitariis axillaribus ſeſſilibus, calyce ſquamoſo. W.

M. (*Majeta*) piloſa, foliis ovatis acuminatis baſi veſiculoſis, floribus ſeſſilibus, calyce ſquamis involucrato. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 34. *

Majeta gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 443. *t.* 176. *
Beutelblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄
Folia *ut in toto genere oppoſita, ſed altero ſemper duplo minore.* Haec *et binae ſequentes gaudent veſica ſingulari ad folii baſin.* W.

*41. MELASTOMA *heterophylla.*
M. piloſa foliis oppoſitis diſparibus denticulatis, petiolis ſuperne veſiculoſis, paniculis breviſſimis lateralibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 35. *
Verſchiedenblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Peru. ♄
Folia *oppoſita quinquenervia, alterum petiolatum ovato-oblongum acuminatum, veſica inſtructum, alterum minus, ſeſſile cordatum vix veſica donatum.* Lamarck l. c.

*42. MELASTOMA *Phyſiphora.*
M. foliis ovatis attenuatis denticulatis ciliatis, petiolis hiſpidis apice veſiculoſis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 45. *
Tococa gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 438. *t.* 174. *
Blaſentragender Schwarzſchlund. W.
Habitat ad viarum margines Cajennae, Gujanae. ♄
Racemus *terminalis erectus ſubcompoſitus.* W.

*43. MELASTOMA *purpurea.*
M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis quinquenerviis piloſis ſubdenticulatis, ramis bifidis paniculatis terminalibus. W.
M. (*purpuraſcens*) floribus racemoſis, foliis ovato-oblongis acuminatis, denticulis caule et ramis hiſpidis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 402. *t.* 154. *
Purpurbeeriger Schwarzſchlund. W.
Habitat ad ripas rivulorum Gujanae. ♄

*44. MELASTOMA *argentea.*
M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis ovatis glabris, ſubtus tomentoſis candidis, paniculis terminalibus patentibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 779. *
Acinodendron americanum quinquenervium comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris, prona parte albicantibus. *Pluk. mant.* 4.
Groſſulariae fructu arbor maxima non ſpinoſa, malabathri folio maximo inodoro, flore racemoſo albo. *Sloan. jam.* 164. *hiſt.* 2. *p.* 84. *t.* 196. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 3. *dendr. p.* 26.

Silberfarbener Schwarzſchlund. W.
Habitat ad littus Mosquito-ſhore Americes. ♄

45. MELASTOMA *elata.*

M. foliis quinquenerviis ſerrato-denticulatis oblongis coriaceis, ſubtus ferrugineo-tomentoſis, paniculis terminalibus patentibus, floribus ſeſſilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 781.*
Groſser Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus elevatioribus Jamaicae *aliarumque inſularum* Indiae *occidentalis.* ♄

Differt a M. argentea cui proxima: foliis *argute nervoſis ferrugineo-tomentoſis, nec argenteo-albidis,* paniculis *erectioribus,* floribus*que ſubſeſſilibus.* Swartz l. c.

46. MELASTOMA *impetiolaris.*

M. foliis quinquenerviis denticulatis ſubſeſſilibus oblongis acuminatis coriaceis, ſubtus tomentoſo-ferrugineis, paniculis terminalibus axillaribusque erectis, floribus ſeſſilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 788.*
Sitzender Schwarzſchlund. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

47. MELASTOMA *fragilis.*

M. foliis quinquenerviis ovatis reticulatis ſerratis, racemis brachiatis terminalibus, pedunculis inferioribus trifidis, pedicellis ſubbifloris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 44.*
M. foliis quinquenerviis reticulatis, racemis floribus ſecundis ſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 236.
Coa-ghiyryo. *Marcg. braſ.* 59. *Piſo. braſ.* 217.
Texauatl. *Hernand. mex.* 414.
Zerbrechlicher Schwarzſchlund. W.
Habitat in Braſilia, Mexico *et* Surinamo. *C. G. Dahlberg.* ♄

Frutex *rigidulus.* Folia *oppoſita brevius petiolata ovata quinquenervia laevia ſerrata ciliata reticulata fragiliſſima.* Racemus *terminalis brachiatus, racemulis trifidis e baſi floriferis.* Flores *ſurſum ſecundi.* Antherae *in fundo umbilici decem.* Fructus *majores globoſi piſiformes glabri, umbilico excavato; minores umbilico clauſo ſquamis quinque.*

48. MELASTOMA *coriacea.*

M. foliis quinquenerviis cartilagineo-denticulatis ovatis rugoſis glabris coriaceis, ramulis petiolisque ſtrigoſis, paniculae ramis tetragonis, floribus ſubſeſſilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 790.*

Lederblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in ſummitate montis la Soufrière *inſulae* Guadeloupae. ♄

49. MELASTOMA *groſſa.*
M. foliis integerrimis quinquenerviis ſubcordatis ſcabris. *Lin. ſuppl.* 236.
Anſehnlicher Schwarzſchlund. W.
Habitat in Nova Granada. *D. Mutis.* ♄
Arbor *ramis rigidiuſculis teretibus hiſpidis.* Folia *cordata ovata integerrima quinquenervia hirſutie rigidula denſiſſima quaſi tomentoſa.* Flores *in apice ramorum ſubſeſſiles groſſi.* Calyx *validus, pilis ſtrigoſus.* Corolla *extus parum piloſa.*

50. MELASTOMA *malabathrica.*
M. foliis integerrimis quinquenerviis lanceolato-ovatis ſcabris. *Fl. zeyl.* 171.* *Mill. dict. n.* 7. *Burm. ind.* 104.
M. quinquenervia hirta major, capitulis ſericeis villoſis. *Burm. zeyl.* 155. *t.* 73.
Kedali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 87. *t.* 42.
Fragarius niger. *Rumph. amb.* 4. *p.* 137. *t.* 72.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 627.
Malabariſcher Schwarzſchlund. W.
Habitat in India. ♄

*51. MELASTOMA *ſtrigilloſa.*
M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis acuminatis, ſuperne ſtrigoſo-piloſis ſubtus tomentoſis, racemis axillaribus, floribus pedicellatis confertis. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 793.*
Borſtiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Jamaica *rarius.* ♄

*52. MELASTOMA *Tamonea.*
M. foliis quinquenerviis oblongo-lanc[illegible]acutis integerrimis ſubtus tomentoſo-incanis, racemis terminalibus compoſitis, racemulis brachiatis, pedunculis umbellulatis, bracteis geminis. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 783.*
Fothergilla mirabilis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 441. *t.* 175.*
Groſſulariae fructu arbor maxima non ſpinoſa, malabathri folio integro minori, ſubtus albido, fructu majori *Sloan. jam.* 164. *hiſt.* 2. *p.* 84. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 1501. *et* 1642.
Beblätterter Schwarzſchlund. W.

Habitat in montibus Jamaicae *auſtralis et in inſulis* Caribaeis *inque ſylvis* Cajennae *et* Gujanae. ♄

53. MELASTOMA *albicans.*

M. foliis quinquenerviis integris ovatis acutis, ſupra glabris; ſubtus tomentoſis albido-ferrugineis, racemis terminalibus erectis, floribus confertis ſeſſilibus. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 786. *

Weiſslicher Schwarzſchlund. W.

Habitat in montibus Jamaicae *inque* Braſilia *ad portum* Rio di Janeiro. ♄

54. MELASTOMA *capitata.*

M. foliis quinquenerviis lato-lanceolatis integerrimis, capitulis terminalibus involucratis, ramis tetragonis, filamentis appendiculatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 45. *

Kopfblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in India *occidentali.* ♄

55. MELASTOMA *ſplendens.*

M. foliis quinquenerviis integris oblongis acuminatis utrinque glabris, ſuperne nitidis, paniculis terminalibus erectis, floribus ſubumbellatis. *Swartz prod.* 70. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 789. *

Groſſularia plantaginis folio lato, fructu minimo coeruleo. *Plum. ſpec.* 18. *t.* 140. *Tournef. inſt.* 640.

Leuchtender Schwarzſchlund. W.

Habitat in ſylvis montium Jamaicae. ♄

56. MELASTOMA *laevigata.*

M. foliis integerrimis quinquenerviis ovato-oblongis laeviuſculis acuminatis: margine laevibus. *Sp. pl.* 559. *Swartz obſ.* 176. *

Melaſtoma fruticoſa minor, foliis tenuibus ovatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 219.

Groſſularia fructu non ſpinoſo malabathri folio oblongo, floribus herbaceis racemoſis, fructu nigro. *Sloan. cat.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 140. *Raj. hiſt.* 2. *dend.* 26.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 628.

Polirter Schwarzſchlund. W.

Habitat in America. ♄

Folia tenuiora et minus conſiſtentia. Racemi terminales compoſiti Floribus minutis.

57. MELASTOMA *criſpata.*

M. foliis integerrimis quinquenerviis quaternis, ramis criſpatis. *Sp. pl.* 560. †

Funis muraenarum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 66. *t.* 35.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 631.
Krauſsſtieliger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Amboina. ♄

****** *Octandrae, foliis trinerviis.*

*58. MELASTOMA *hirſuta.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis hirſutis, pedunculis axillaribus divaricatis trifidis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 801.
Raucher Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus Jamaicae *auſtralis ad thermas prope* Bath. ♄

*59. MELASTOMA *microphylla.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis ovatis obtuſis ſuperne hiſpidis, ſubtus tomentoſis ferrugineis, pedunculis trifidis axillaribus, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 813.*
Kleinblättriger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Jamaicae *auſtralis paroecia* St. Thomae *in valle.* ♄
Differt a M. hirſuta, cui proxima: foliis *ovatis obtuſis minoribus, nec attenuato-acuminatis, ſuperne hiſpidis, infra tomentoſo-hirſutis,* floribus *minoribus;* pedunculis *plerumque ſimplicibus.* Swartz l. c.

*60. MELASTOMA *micrantha.*
M. foliis trinerviis denticulatis oblongis utrinque acutis glabris, racemis axillaribus reclinatis, floribus acuminatis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 803.*
Kleinblütiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus altioribus Jamaicae *occidentalis.* ♄

*61. MELASTOMA *capillaris.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis lato-lanceolatis attenuatis glabris, pedunculis capillaribus axillaribus trifloris, floribus octandris. *Swartz. prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 808.*
Haarſtieliger Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus Jamaicae *auſtralis.* ♄
A congeneribus diſcrepat: foliis *in longum acumen attenuatis,* pedunculis *capillaribus.* Swartz l. c.

*62. MELASTOMA *rubens.*
M. foliis trinerviis denticulatis ovato-lanceolatis glaberrimis, ramis petiolisque coloratis, racemo terminali

floribus confertis dioicis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 797. *
M. foliis ovatis nitidis minutiſſime denticulatis, venis et ramulis purpuraſcentibus. *Brown. jam.* 219.
Röthlicher Schwarzſchlund. W.
Habitat in alpibus Jamaicae *auſtralis.* ♄
Diſtincta, omnibus fere partibus purpuraſcentibus, ſiccatis atreſcentibus, floribus dioicis. Numerus denarius rarior. Swartz. l. c.

*63. MELASTOMA *glabrata.*
M. foliis trinerviis ſubdenticulatis ovatis acutis glabris coriaceis, pedunculis terminalibus ſolitariis unifloris, floribus octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 806. *
Einblütiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in alpibus Jamaicae *auſtralioris.* ♄

*64. MELASTOMA *glanduloſa.*
M. foliis trinerviis integerrimis ovatis, ſuperne ſtrigoſo-ſcabris, ſubtus hirſuto-hiſpidis glanduloſis, racemis terminalibus, floribus confertis octandris. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 799. *
Drüſiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in ſummis montibus Jamaicae. ♄

*65. MELASTOMA *hirtella.*
M. foliis trinerviis integerrimis, margine hiſpido-piloſis, pedunculis breviſſimis axillaribus trifloris, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 810. *
Gefranzter Schwarzſchlund. W.
Habitat in montibus elevatioribus Jamaicae. ♄

*66. MELASTOMA *triflora.*
M. foliis trinerviis elliptico-lanceolatis integerrimis, ramis petiolis calycibusque ſtrigoſis, floribus axillaribus ſubpedunculatis ternis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 46. *
Dreyblütiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in Caribaeis. ♄

67. MELASTOMA *octandra.*
M. foliis integerrimis trinerviis ovato-lanceolatis glabris, margine nervisque ſubtus hiſpidis, floribus terminalibus. W.
M. foliis integerrimis trinerviis ovatis glabris margine hiſpidis. *Fl. zeyl.* 173. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 630.
Achtfädiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ.)

Diſtinctiſſima a M. repente. W.

*68. MELASTOMA *divaricata.* W.

M. foliis trinerviis integerrimis ovatis acutis ſubtus pubeſcentibus, panicula terminali divaricata, floribus octandris. W.

Ausgebreitetblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Rami *ſeniores nigricantes, teretes glabri, juniores ferrugineo-tomentoſi.* Folia *oppoſita petiolata ovata, breviſſime acuminata, integerrima trinervia, ſuperne nitida glabra, inferne tomento fuſco te nui tecta.* Panicula *terminalis divaricata.* Pedunculi *fuſco-tomentoſi.* Calyx *urceolatus truncatus tomentoſus.* Petala *quatuor ovata acuta.* Antherae *ſubſeſſiles vel breviſſimis filamentis ſuffultae.* Fructus *Piperis magnitudine.* W.

*69. MELASTOMA *tetrandra.*

M. foliis trinerviis integerrimis oblongis baſi emarginatis convexiuſculis glabris, racemo erecto terminali, floribus tetrandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 795. *

Vierfädiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in cacumine montium coeruleorum Jamaicae *auſtralis.* ♄

*70. MELASTOMA *faſcicularis.*

M. foliis trinerviis integerrimis ovatis acutis ſcabris, ramis floriferis, floribus confertis pedunculatis octandris. *Swarz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 801. *

Büſchelblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in ſylvis montium Jamaicae *interioris.* ♄

*71. MELASTOMA *anguſtifolia.*

M. foliis trinerviis lineari-lanceolatis integerrimis ſubtus incanis, ramis virgatis, paniculis terminalibus, floribus erectis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 796. *

Schmalblättriger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Jamaica *inque inſula* St. Johannis. ♄

*72. MELASTOMA *purpuraſcens.*

M. foliis trinerviis integerrimis oblongis acutis ſtriatis glaberrimis, racemis lateralibus tripartitis patulis, floribus octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 804. *

Geſtreifter Schwarzſchlund. W.

Habitat in montibus excelſis Jamaicae. ♄

Folia *fere triplinervia. Species a reliquis facile diſtinguenda:* foliis *parallele ſtriatis glaberrimis*, racemis *lateralibus ſubpaniculatis.* Swartz l. c.

*73. MELASTOMA *alpina.*

M. foliis trinerviis integerrimis ovatis coriaceis glabris, paniculis ſimpliciter trichotomis, floribus diſtinctis octandris. *Swartz prod.* 71. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 800.*

Alpen Schwarzſchlund. W.

Habitat in regione muſcoſa montis la Soufriere *inſulae* Guadeloupe. ♄

******* *Octandrae, foliis triplinerviis.*

*74. MELASTOMA *verticillata.*

M. foliis triplinerviis oblongis attenuatis denticulatis villoſis, ſupra ſcabris, racemis axillaribus, floribus verticillatis. *Vahl eclog.* 1. *p.* 47. *

Wirtelblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Caribaeis. ♄

*75. MELASTOMA *acuminata.*

M. foliis triplinerviis ovatis extrorſum denticulatis acuminatis ſubtus incanis, corymbis terminalibus faſtigiatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 47. *t.* 7.*

M. (*cinnamomifolia*) foliis ſubintegerrimis triplinerviis lanceolatis acuminatis. *Iacq. collect.* 2. *p.* 111. *t.* 6. *f.* 2?

Langzugeſpitzter Schwarzſchlund. W.

Habitat in Montſerrat. ♄

*76. MELASTOMA *lateriflora.*

M. foliis obovatis acuminatis ſetaceo-ſubſerratis glabris, pedunculis infrafoliaceis aggregatis unifloris. *Vahl eclog.* 1. *p.* 48.*

Seitenblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat verſus cacumina montium inſulae Montſerrat. ♄

*77. MELASTOMA *elaeagnoides.*

M. foliis triplinerviis integerrimis lato-lanceolatis ſubtus albido-tomentoſis, pedunculis terminalibus trichotomis, floribus ſolitariis. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 815.*

Oleaſterblättriger Schwarzſchlund. W.

Habitat in inſula St. Johannis Americes. ♄ (v. ſ.)

78. MELASTOMA *ſcabroſa.*

M. foliis triplinerviis denticulatis ovatis ſcabris hirſutis, floribus axillaribus aggregatis ſeſſilibus octandris. *Swartz obſ.* 174.*

M. foliis denticulatis quinquenerviis cordatis ſcabris ſubtus tomentoſis, ramis tomentoſo-villoſis. *Sp. pl.* 558.

M. ſubhirſuta, foliis cordatis ſcabris minutiſſime denticulatis reticulatis, racemis minoribus alaribus. *Brown. jam.* 219. *t.* 24. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 622.

Gehäuftblütiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Jamaicae *montibus frigidioribus.* ♄

*79. MELASTOMA *virgata.*

M. foliis triplinerviis integerrimis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, ramis virgatis floriferis, racemis decuſſatis diffuſis ſparſis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 816.*

Ruthenförmiger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Jamaicae *ſylveſtribus montium.* ♄

******** *Octandrae, foliis quinquenerviis.*

*80. MELASTOMA *umbroſa.*

M. foliis quinquenerviis lato-ovatis acuminatis utrinque hirtis, ramulis floriferis, racemis dichotomis patentibus, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 817.*

Schattenliebender Schwarzſchlund. W.

Habitat in inſula St. Chriſtophori *aliisque inſulis* Caribaeis. ♄

Diſtinctiſſima: foliis *maximis,* ramis*que patentiſſimis.* Swartz l. c.

*81. MELASTOMA *hiſpida.*

M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis ovatis acutis, ſuperne ſtrigoſo-hirſutis, ſubtus reticulato-tomentoſis, paniculis terminalibus divaricatis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 821.*

Netzblättriger Schwarzſchlund. W.

Habitat in Jamaicae *montibus.* ♄

*82. MELASTOMA *ſeſſiliflora.*

M. villoſo-ſubtomentoſa, foliis quinquenerviis lanceolato-ovatis denticulatis ſubpetiolatis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubverticillatis. *Vahl eclog.* 1. *p.* 49.*

Stiellosblütiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*83. MELASTOMA *piloſa.*

M. foliis quinquenerviis ſubdenticulatis oblongis acutis, nervis ſubtus, ramulis racemisque lateralibus piloſo-hirſutis, floribus octandris. *Swartz prod.* 72. *Fl. ind.* 2. *p.* 819. *

Dünnhaariger Schwarzſchlund. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae. ♄

M. micranthae proxima, diverſa tamen: foliis *quinquenerviis ſubtus* ramisque *piloſo-hirſutis;* racemis *erectiuſculis nec reclinatis lateralibus (nec axillaribus) hirſutis;* petalis *ſubrotundis.* Swartz l. c.

84. MELASTOMA *diſcolor.*

M. foliis quinquenerviis ſubintegerrimis oblongis acuminatis glabris ſubtus flavo-incanis, racemis cymoſis, floribus octandris. *Swartz obſ.* 178.

M. foliis integerrimis quinquenerviis oblongo-ovatis glabris margine laevibus. *Sp. pl.* 560.

M. floribus octandris, foliis quinquenerviis. *Iacq. amer.* 130. *t.* 84. *

Groſſularia plantaginis folio apicibus candidis et falcatis. *Plum. ic. t.* 42. *f.* 1.

Groſſulariae fructu non ſpinoſo malabathri foliis ſubtus niveis, fructu racemoſo umbellae modo diſpoſito. *Sloan. jam.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 86. *t.* 198. *f.* 1.

Arbor americana quinquenervia comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris prona parte albicantibus. *Pluk. alm.* 40. *t.* 264. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 1. *p.* 629.

Zweyfarbiger Schwarzſchlund. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

*85. MELASTOMA *coccinea.*

M. foliis quinquenerviis elliptico-ovatis acuminatis glabris integerrimis, thyrſo terminali, pedunculis pedicellisque nodoſis hiſpidis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 48. *

M. (*coccinea*) nodoſo-teres, foliis ovatis anguſto-acuminatis integris lucidis quinquenerviis, racemis ſubſeſſilibus laxifloris coccineis. *Act. Soc. hiſt. nat. pariſ.* 1. *p.* 109. ?

Scharlachrother Schwarzſchlund. W.
Habitat in inſula Montſerrat. ♄

Variat flore albo. Vahl. l. c.

*863. MERIANIA.

Swartz Fl. ind. occid. 823.

Cal. 5-fidus campanulatus. *Petala* 5, calyci inſerta. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

*1. MERIANIA *leucantha.*

M. foliis oblongis nitidis, floribus bracteis geminis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 826.*

Rhexia (*leucantha*) foliis oppoſitis cartilagineo-denticulatis coriaceis nitidis, ramulis tetragonis, floribus terminalibus decandris. *Swartz prod.* 61.

Weiſsblütige Merianie. W.

Habitat in montibus altiſſimis Jamaicae. ♄

*2. MERIANIA *purpurea.*

M. foliis ovato-lanceolatis, floribus bracteis quaternis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 829.*

Rhexia (*purpurea*) foliis oppoſitis denticulatis coriaceis, ramulis teretibus, floribus axillaribus decandris. *Swartz prod.* 61.

Rothblütige Merianie. W.

Habitat in ſummis montibus Jamaicae. ♄

864. KALMIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 743.

Cal. 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis: limbo ſubtus quinquecorni. *Capſ.* 5-locularis.

1. KALMIA *latifolia.*

K. foliis ovato-ellipticis ternis ſparſisque, corymbis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 64. *Willd. arb.* 161.*

K. foliis ovatis, corymbis terminalibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 13.* *Kalm. it.* 2. *p.* 43. *et* 3. *p.* 148. *Mill. dict. n.* 1. *Wang. amer.* 64. *t.* 24. *f.* 50.*

Andromeda foliis ovatis obtuſis, corollis corymboſis infundibuliformibus, genitalibus declinatis. *Gron. virg.* 160.

Chamae Daphne foliis tini, floribus bullatis. *Cateſb. car.* 2. *p.* 98. *t.* 98.

Ledum floribus bullatis confertis in ſummis caulibus. *Trew. ehret. t.* 38. *f.* 1.

Ciſtus Chamae Rhododendros mariana laurifolia, floribus expanſis ſummo ramulo in umbellam plurimis. *Pluk. alm.* 49. *t.* 379. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 549.
Breitblättrige Kalmie. W.
Habitat in Marilandia, Virginia, Penſylvania. ♄ (v. v.)

2. KALMIA *anguſtifolia.*

K. foliis lanceolatis, corymbis lateralibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 14. *Kalm. it.* 3. *p.* 147. *Mill. dict. n.* 2. *Curt. mag.* 331. *Wangh. amer.* 65. *t.* 24. *f.* 51. * *Willd. arb.* 162. *
Azalea foliis lanceolatis integerrimis non nervoſis glabris, corymbis terminalibus. *Gron. virg.* 21.
Chamae Daphne ſempervirens, foliis oblongis anguſtis, foliorum faſciculis oppoſitis. *Cateſb. car.* 3. *p.* 17. *t.* 17. *f.* 1.
Ledum floribus bullatis faſciculatis ex alis oppoſitis foliorum. *Trew. ehret. t.* 38. *f.* 2.
Ciſtus ſempervirens laurifolia, floribus eleganter bullatis. *Pluk. alm.* 106. *t.* 161. *f.* 3.
Anonyma. *Cold. noveb.* 100.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 551.
Schmalblättrige Kalmie. W.
Habitat in Penſylvania, Nova Caeſarea, Noveboraco. ♄ (v. v.)

Variat floribus rubris et cernuis. Ait. Kew. 2. *p.* 64.

*3. KALMIA *glauca.*

K. foliis oppoſitis oblongis laevigatis ſubtus glaucis, margine revolutis, corymbis terminalibus, ramulis ancipitibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 64. *t.* 8. *Willd. arb.* 162. *
K. (*polifolia*) foliis lanceolatis revolutis, corymbis terminalibus ſpicatis. *Wangh. Act. Soc. nat. ſcrut. Berol.* 8. *p.* 129. *t.* 5. *
Graue Kalmie. W.
Habitat in Terra Nova. ♄ (v. v.)

*4. KALMIA *hirſuta.*

K. foliis oppoſitis alternisque ellipticis hirſutis, pedunculis axillaribus unifloris. W.
K. foliis ovato-lanceolatis hirſutis ſparſis, floribus racemoſis. *Curt. mag.* 138. *
K. ſuffruticoſa hirſuto-hiſpida, foliis ſublanceolatis revolutis alternis, floribus ſolitariis axillaribus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 333. *

K. foliis parvis lanceolatis hirſutis, floribus ſolitariis axillaribus, caule ſuffruticoſo villoſo. *Walt. carol.* 138.
Haarige Kalmie. W.
Habitat in Carolina *meridionali.* ♄

865. LEDUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 744.

Cal. 5-fidus. *Cor.* plana, 5-partita. *Capſ.* 5-locularis, baſi dehiſcens.

1. LEDUM *paluſtre.*
L. foliis linearibus margine revolutis ſubtus tomentoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 65. *Willd. arb.* 167.*
Ledum. *Fl. lapp.* 160. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 352. *Mat. med.* 115. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 127. *Mill. dict. Reyg. ged.* 1. *p.* 113. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 361. *Mattuſch. ſil.* 1. *n.* 289. *Hoffm. germ.* 142. *Roth. germ. I.* 182. *II.* 465.
α. *erectum*, bipedale erectum. *Ait. l. c.*
L. foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 1. *n.* 341, 352.
Ciſtus Ledon foliis roſmarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467. *Du Ham. arb.* 13.
Roſmarinum ſylveſtre. *Cam. epit.* 546.
β. *decumbens*, ſpithamaeum decumbens. *Ait. l. c.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 552.
Sumpf Porſt. W.
Habitat in Europae *ſeptentrionalis paludibus uliginoſis*, β. *in ſinu* Hudſonis. ♄ (v. v.)

*2. LEDUM *latifolium.*
L. foliis oblongis margine revolutis ſubtus tomentoſis, floribus ſubpentandris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 65. *Willd. arb.* 168.* *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 464. *collect.* 2. *p.* 308.*
L. (*groenlandicum*) foliis ellipticis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 493. *Gunn. norv. n.* 1067. *Fl. dan.* 567.
Breitblättriger Porſt. W.
Habitat in uliginoſis Groenlandiae, *ſinus* Hudſonis *littoris* Labrador, Terrae novae, *et* Novae Scotiae. ♄

*3. LEDUM *buxifolium.*
L. foliis ovato-oblongis planis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 65.
Ledum buxifolium. *Berg. Act. petrop.* 1777. *p.* 213. *t.* 3. *f.* 2.*

Buchsbaumblättriger Porſt. W.
Habitat in Carolina *et* Nova Caeſarea. ♄ (v. ſ.)

866. RHODORA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 745.

Cal. 5-dentatus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locul.

1. RHODORA *canadenſis.*

R. canadenſis. *Sp. pl.* 561. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 141. *t.* 68. * *Willd. arb.* 287. *
Chamaerhododendros. *Duhamel. ſem. app.* 10. *t.* 27. *f.* 2.
Canadiſche Rhodore. W.
Habitat in Canada *et* Terra Nova. ♄ (v. v.)

Frutex *bipedalis.* Folia *alterna elliptica integerrima margine revoluta ſuperne glabra nitida, inferne pallidiora ſubpubeſcentia.* Flores *terminales umbellati.* W.

867. RHODODENDRON.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 746.

Cal. 5-partitus. *Cor.* ſubinfundibuliformis. *Stam.* declinata. *Capſ.* 5-locularis.

1. RHODODENDRON *ferrugineum.*

R. foliis glabris ſubtus leproſis, corollis infundibuliformibus. *Mill. dict. n.* 2. *Jacq. obſ.* 1. *p.* 26. *t.* 16. *auſtr. t.* 255. *Scop. carn. n.* 479. *Willd. arb.* 284. *
R. foliis ellipticis, glabris, ſubtus rubiginoſis. *Hall. helv. n.* 1015.
Azalea maculis ferrugineis ſubtus adſperſa, floribus decandris. *Lemonier. Sauv. monſp.* 57.
Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hiſt.* 1005.
Evonymus theophraſti. *Dalech. hiſt.* 27.
Montana allobrogum lentiſcifolia. *Lob. ic.* 366.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 553.
Roſtfarbiger Alpbalſam. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Allobrogicis, Pyrenaeis, Sibiricis. ♄ (v. ſ.)

Corolla *declinata, inaequalis:* Petalis 2 *inferioribus anguſtioribus.*

Floribus *albis rara varietas. Hall. l. c.* R.

2. RHODODENDRON *dauricum.*

R. foliis glabris punctatis nudis, corollis rotatis. *Sp. pl.* 562. *Pall. roſs.* 1. *p.* 47. *t.* 32. *

R. (*dauricum*) foliis glabris utrinque nudis, petiolis longiſſimis, corollis violaceis foliis amplioribus, rotatis. *Andrews repoſ. bot.* 4. *t.* 4.

Andromeda foliis ovatis utrinque punctatis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 124. *n.* 10.

Chamaerododendros folio glabro majuſculo, amplo flore roseo. *Amm. ruth.* 181. *t.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 555.

Davuriſcher Alpbalſam. W.

Habitat in Dauria. ♄

Caulis *nudus, proliferus, apice folioſus.* Folia *petiolata, oblonga, ſupra nuda, confertim utrinque punctata, ſubtus confertiſſime ferrugineo-punctata.* Corollae *violaceae, foliis ampliores.* Stamina *patentia, longitudine corollae.* Stylus *ſanguineus.* Similis *Azaleae lapponicae.*

*3. RHODODENDRON *camtſchaticum.*

R. foliis obovatis acutis ciliatis nudis, corollis rotatis, petalis acutis. W.

R. (*camtſchaticum*) foliis ciliatis nervoſis, corollis rotatis, calycibus foliaceis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 48. 33. *

Chamaerhododendron berberis folio, flore amplo roſeo. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 126. *n.* 13.

Camtſchatiſcher Alpbalſam. W.

Habitat in Camtſchatca *locis montoſis lutoſis verſus mare* Ochotenſe *et in inſula* Beringii. ♄

Folia *petiolata obovata acuta venoſa* (*nec nervoſa*) *ciliata, utrinque viridia.* Flores *magnitudine fere R. pontici roſei, pedunculati terminales ſubſolitarii.* Petala *ovata acuta.* W.

4. RHODODENDRON *hirſutum.*

R. foliis ellipticis acutiuſculis ciliatis ſubtus punctatis, corollis infundibuliformibus. W.

R. foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus. *Mill. dict. n.* 1. *Jacq. auſtr. t.* 98. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 480.

R. foliis ovatis, ciliatis, ſubtus punctatis. *Hall. helv. n.* 1016.

Ledum alpinum hirſutum. *Bauh. pin.* 468. *Raj. hiſt.* 1005.

Nerium alpinum quibusdam, aliis Ledum hirſutum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 21 22. *Hall.* R.
Ledum alpinum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 82.
Balſamum alpinum. *Lob. ic.* 468.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 555.
Gefranzter Alpbalſam. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Auſtriacis, Stiriacis. ♄ (v. ſ.)

5. RHODODENDRON *Chamaeciſtus.*

R. foliis ellipticis acutiuſculis glanduloſo-ciliatis nudis, corollis rotatis, petalis obtuſis. W.
R. foliis ciliatis, corollis rotatis. *Iacq. auſtr. t.* 217. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 481.
Ledum foliis ſerpylli ad margines cilii inſtar piloſis, flore purpureo. *Mich. gen.* 225. *t.* 106.
Chamae Ciſtus hirſuta. *Bauh. pin.* 466.
Chamae Ciſtus VIII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 76.
Ciſtus pumilus montis Baldi. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 19. *Raj. hiſt.* 1005.
Ciſtus Chamaerhododendros foliis confertis ferrea rubigine nitentibus margine piloſis. *Pluk. alm.* 106. *t.* 23. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 556.
Drüſiger Alpbalſam. W.
Habitat in Baldo *et prope* Salisburgum, *inque* Auſtria, Carniolia. ♄ (v. ſ.)

*6. RHODODENDRON *caucaſicum.*

R. foliis ſcabris ſubtus ferrugineo-tomentoſis, umbellis terminalibus, corollis rotatis, petalis ſubrotundis. W.
R. (*caucaſicum*) foliis ovatis ſcabris, margine inflexis, ſubtus tomentoſo-pallidis, umbellis terminalibus albifloris, bracteis elongatis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 46. *t.* 31.*
Caucaſiſcher Alpbalſam. W.
Habitat in ſummis alpibus Caucaſi *in regione nivali.* ♄
Valde affine ſequenti, cujus forte varietas, niſi differret: foliis *ſubtus tomentoſis et* floris *colore qui albus quandoque rubicundus eſt.* W.

7. RHODODENDRON *Chryſanthum.*

R. foliis oblongis ſcabris, ſubtus diſcoloribus glabris, umbellis terminalibus, corollis rotatis, petalis obovatis irregularibus. W.
R. foliis oblongis impunctatis ſupra ſcabris venoſiſſimis,

corollae rotata irregulari, gemma florifera ferrugineo-tomentoſa. *Lin. ſuppl.* 237.

R. foliis ovatis ſcabris, margine reflexis, ſubtus glabris, umbellis terminalibus, corollis flavis irregularibus. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 44. *t.* 30. *

Rhododendron Chryſanthum. *Pall. it.* 3. *p.* 369. *app.* 724. *n.* 87. *t. N. f.* 1. 2. *Koelpin monogr.*

Rhododendron aureum. *Georgi itin. p.* 214.

Andromeda foliis ovatis utrinque venoſis, corollis campanulatis obliquis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 121. *t.* 54.

Gelber Alpbalſam. W.

Habitat in Sibiriae *alpibus praeſertim* Davuriae, *ad lacum* Baical *inque* Camtſchatca *et inſula* Beringii. ♄

Frutex *parvus diffuſus, cortice fuſco.* Folia *oblonga utrinque attenuata venoſo-reticulata margine reflexo, ſubtus pallidiora.* Rami *inter folia ſquamis ſtipulaeformibus ferrugineis tecti, et terminantur pedunculis pluribus ex axillis ſuperiorum ſquamarum unifloris.* Flos *magnus luteus rotatus nutans, figura R. daurici.*

A R. daurico toto coelo diſtinctum. W.

8. RHODODENDRON *ponticum.*

R. foliis oblongis glabris utrinque concoloribus, corymbis terminalibus, corollis campanulato-rotatis, petalis lanceolatis. *Willd. arb.* 285.*

R. foliis nitidis lanceolatis utrinque glabris, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 562. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 78. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 43. *t.* 29. *

Chamaerhododendros pontica maxima, folio laurocerafi. *Tournef. cor.* 42. *it.* 2. *p.* 99.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 557.

Pontiſcher Alpbalſam. W.

Habitat in Oriente, Gibraltariae *ſubhumidis umbroſis. Alſtroemer.* ♄ (v. v.)

Folia *Pruni Lauroceraſi, perennia, acuta: Petiolis brevibus, glabris.* Racemus *terminalis, longitudine pedicellorum ſ. foliorum: Pedicellis alternis, nudis.* Calyx *minutiſſimus.* Corolla *campanulata, magnitudine Nerii, purpurea.* Stamina *declinata, longitudine corollae.*

Similitudo cum Azalea pontica, *ſed differt numero ſtaminum.* Schreb. *in nov. Act. Upſ.* 1. *p.* 90. R.

9. RHODODENDRON *maximum.*

R. foliis oblongis glabris ſubtus diſcoloribus, umbellis

terminalibus, corollis rotatis, petalis ſubrotundis. *Willd. arb.* 286.*

R. foliis nitidis ovalibus obtuſis venoſis margine acuto reflexo, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 563. *Trew. ehret. t.* 66. *Wangh. amer. p.* 63. *t.* 23. *f.* 49.

Ledum lauroceraſi folio. *Amoen. acad.* 2. *p.* 200.

Kalmia foliis lanceolato-ovatis nitidis ſubtus ferrugineis, corymbis terminalibus. *Mill. dict. t.* 229.

Chamaerhododendros, lauri folio, ſempervirens, floribus bullatis corymboſis. *Cateſb. car.* 3. *p.* 17. *t.* 17. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 559.

Groſser Alpbalſam. W.

Habitat in Virginia. *Collinſon.* ♄ (v. v.)

Rami *et Folia magnitudine et conſiſtentia Padi Lauroceraſi dicti, venis reticulatis inſcripta, margine reflexa.* Lacinia *infima corollae maculata eſt.*

10. RHODODENDRON *punctatum.*

R. foliis oblongis glabris, ſubtus reſinoſo-punctatis, umbellis terminalibus, corollis infundibuliformibus. W.

Rhododendron punctatum. *Donn ind. horti cantab.* 49.

Punctirter Alpbalſam. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

Habitus praecedentis ſed folia *inferne et coſta media punctis reſinoſis adſperſa et* corollae *infundibuliformes.* W.

868. ANDROMEDA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 747.

Cal. 5-partitus. *Cor.* ovata: ore 5-fido. *Capſ.* 5-locularis, valvulis diſſepimento contrariis.

1. ANDROMEDA *tetragona.*

A. foliis imbricatis carinatis margine nudis, pedunculis ſolitariis axillaribus, corollis campanulatis. W.

A. pedunculis ſolitariis lateralibus, corollis campanulatis, foliis oppoſitis imbricatis obtuſis revolutis. *Sp. pl.* 563. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 120. *n.* 5. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 56. *t.* 73. *f.* 4. *

A. foliis quadrifariam imbricatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 338, 356.

A. foliis quadrifariam imbricatis obtuſis, ex alis florens. *Fl. lapp.* 166. *t.* 1. *f.* 4. *Hort. cliff.* 163.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 563.
Viereckige Andromede. W.
Habitat in alpibus Lapponicis, Sibiricis. ♄ (v. ſ.)

*2. ANDROMEDA *ericoides.*

A. foliis imbricatis convexis margine ſetaceo-ciliatis, pedunculis ſolitariis axillaribus, corollis globoſis. W.
A. (*ericoides*) pedunculis lateralibus, floribus globoſis octandris, foliis quadrifariam imbricatis ciliatis. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 56. *t.* 73. *f.* 3. *
Heideartige Andromede. W.
Habitat in Camtſchatca *et in ſummis alpibus* Davuriae. ♄
Capſula *quoad valvularum ſtructuram adhuc ignota.*
Forte Ericae ſpecies. W.

3. ANDROMEDA *hypnoides.*

A. foliis imbricatis ſubulatis glabris, pedunculis ſolitariis terminalibus, corollis globoſo-campanulatis. W.
A. pedunculis ſolitariis terminalibus, corollis campanulatis, foliis confertis ſubulatis. *Sp. pl.* 563. *Oed. dan. t.* 10. *Pall. it.* 3. *p.* 34.
A. foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 337, 355.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 564.
Moosartige Andromede. W.
Habitat in alpibus Lapponicis, Sibiricis. ♄ (v. ſ.)
Antherae *ariſtatae.*

*4. ANDROMEDA *lycopodioides.*

A. foliis imbricatis ſubulatis glabris, pedunculis ſubgeminatis axillaribus, corollis campanulatis. W.
A. (*lycopodioides*) pedunculis ſolitariis lateralibus, floribus campanulatis octandris, foliis quadrifariam imbricatis. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 55. *t.* 73. *f.* 1. *
Erica foliis aceroſis glabris imbricatis ſquamatim caules amplexantibus, corollis campanulatis nutantibus, antheris bicornibus. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 130. *t.* 57. *f.* 1.
Bärlappenartige Andromede. W.
Habitat in Camtſchatcae *montibus circa mare* Ochotenſe *et in inſula* Beringii. ♄
Simillima praecedenti, ſed pedunculorum *ſitu atque* corolla *majori campanulata, ut et* ramis *tenuioribus* foliisque *brevioribus diverſa.* Capſulae *ſtructura adhuc ignota.* W.

*5. ANDROMEDA *empetrifolia.*
A. foliis oblongis obtuſis integerrimis, pedunculis ſolitariis axillaribus, corollis globoſis. W.
A. (*empetrifolia*) foliis minutis oblongo-ovatis ſparſis, pedunculis lateralibus ſolitariis unifloris, corollis globoſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 154. *
Rauſchbeerenblättrige Andromede. W.
Habitat in freti Magellanici *locis Sphagno repletis.* ♄

*6. ANDROMEDA *Myrſinites.*
A. foliis ovatis argute ſerratis, pedunculis ſolitariis axillaribus, corollis globoſo-campanulatis. W.
A. (*Myrſinites*) foliis minutis ovato-lanceolatis ſerratis ſparſis, pedunculis ſolitariis axillaribus breviſſimis unifloris. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 154. * *illuſt. gen. t.* 365. *f.* 2.
Myrſineblättrige Andromede. W.
Habitat in freti Magellanici *ſylvaticis montoſis.* ♄
Habitu ſimillima Arbuto microphyllae. W.

7. ANDROMEDA *mariana.*
A. pedunculis aggregatis rameis, corollis ovato-cylindricis, foliis oblongo-ovatis integerrimis deciduis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 67.
A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis, foliis alternis ovatis integerrimis. *Sp. pl.* 564. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. ic. rar.* 2. *t.* 465. *Collect.* 2. *p.* 326. *
A. foliis ovatis, pedunculis faſciculatis, capſulis pentagonis apice dehiſcentibus. *Gron. virg.* 49.
α. foliis ovalibus.
Arbuſcula mariana, brevioribus evonymi foliis pallide virentibus, floribus arbuteis ex eodem nodo plurimis, ſpicatim uno verſu erumpentibus. *Pluk. mant.* 25. *t.* 448.
β. foliis oblongis.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 565.
Marilandiſche Andromede. W.
Habitat in Virginia. ♄
Antherae *muticae.* Corollae *cylindrico-campanulatae.*

8. ANDROMEDA *ferruginea.*
A. pedunculis aggregatis axillaribus, corollis ſubgloboſis, foliis ellipticis integerrimis ſubtus ſquamoſo-farinoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 67.
Roſtfarbige Andromede. W.
Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

*9. ANDROMEDA *faſciculata.* †

A. pedunculis aggregatis, foliis alternis ovato-lanceolatis obtuſis ſubcrenatis coriaceis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 836. *

Büſchelblütige Andromede. W.

Habitat in montibus Jamaicae *auſtralioris.* ♄

Diſtinguitur ab A. mariana: foliis *longioribus obtuſioribus aveniis coriaceis.* Swartz l. c.

*10. ANDROMEDA *jamaicenſis.*

A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis diaphanis, foliis alternis lato-lanceolatis obtuſis integerrimis ſubtus cinereis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 838. *

Weſtindiſche Andromede. W.

Habitat in ſummis montibus Jamaicae. ♄

Affinis A. marianae, ſed differt: habitu, foliis *anguſtioribus ſubtus cinereo-ferrugineis*, floribus *minoribus ovatis diaphanis.* Swartz l. c.

*11. ANDROMEDA *octandra.*

A. pedunculis aggregatis, corollis cylindricis quadrifidis, foliis alternis ovato-lanceolatis integris. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 840. *

Achtfädige Andromede. W.

Habitat in montibus altiſſimis Jamaicae *auſtralis.* ♄

An forte Menzieſiae ſpecies? W.

*12. ANDROMEDA *pulverulenta.* †

A. pedunculis aggregatis, corollis campanulatis, foliis ovatis dentatis. W.

Andromeda pulverulenta. *Bartram. it. ed. germ. p.* 453. *t.* 8.

Beſtäubte Andromede. W.

Habitat in Florida. ♄

13. ANDROMEDA *polifolia.*

A. pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 119. *Hall. helv. n.* 1017. *Pollich. pal. n.* 394. *Hoffm. germ.* 142. *Mattuſch. ſil. n.* 290. *Fl. dan. t.* 54. *Roth. germ. I.* 182. *II.* 466. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 37. *

α. *latifolia* foliis oblongis, corollis ovatis incarnatis, laciniis calycinis patentibus ovatis albis interdum apice rubicundis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 68.

β. *media*, foliis lanceolatis, corollis oblongo-ovatis rubicundis, laciniis calycinis magis erectis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 68.

A. foliis alternis lanceolatis margine reflexis. *Fl. lapp.* 173. *t.* 1. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 335, 353. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. opuſc.* 140.
Rhododendron polifolium. *Scop. carn. n.* 482.
Polifolia. *Buxb. act.* 2. *p.* 345. *cent.* 5. *p.* 28. *t.* 49. *f.* 1.
Vitis idaeae affinis polifolia montana. *Bauh. hiſt.* 1. *P.* 1. *p.* 525.
Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſula ciſtoide. *Pluk. alm.* 136. *t.* 175. *f.* 1.
γ. *anguſtifolia*, foliis lanceolato-linearibus, laciniis calycinis oblongis rubris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 68.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 566.
Poleiblättrige Andromede. W.
Habitat in turfoſis uliginoſis α. *in* America *boreali.* β. *in* Europa *et* Aſia *boreali* γ. *in* Terra nova *et littore* Labrador. ♄ (α. β. v. v.)
Antherae *ariſtatae.*

14. ANDROMEDA *ſalicifolia.*
A. racemis ſecundis nudis, corollis ſubcylindricis, foliis lanceolatis acutis integerrimis. *Smith. ic. pl. ined.* 1. *p.* 58. *t.* 58.*
A. (*ſalicisfolia*) arboreſcens, racemis terminalibus, floribus ſparſis erectis, foliis peracute lanceolatis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 158.*
β. foliis ovato-lanceolatis. *Lamarck l. c.*
Weidenblättrige Andromede. W.
Habitat in inſula Mauritii. ♄
Folia *ſubtus alba, et quod memoratu dignum, trinervia.* W.

15. ANDROMEDA *buxifolia.*
A. racemis ſecundis nudis, corollis ſubcylindricis, foliis cordato-ovatis integerrimis mucronulatis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 59. *t.* 59.*
A. fruteſcens, racemis terminalibus erectis, floribus ſparſis nutantibus ovatis, foliis, abſtracto apiculo terminali, cordato-ovatis obtuſiſſimis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 158.*
Buchsbaumblättrige Andromede. W.
Habitat in inſula Borboniae. W.

16. ANDROMEDA *japonica.*
A. racemis ſecundis paniculatis terminalibus, foliis lanceolato-obovatis acutis apice ſerrulatis. W.
A. (*japonica*) racemis paniculatis cylindricis bracteatis,

foliis ellipticis reflexis apice ſerratis. *Thunb. jap.* 181. *t.* 22. *
Japaniſche Andromede. W.
Habitat in Japonia. ♄

17. ANDROMEDA *paniculata.*
A. racemis terminalibus paniculatis, corollis ſubrotundis, foliis ovatis integriuſculis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69.
A. racemis ſecundis nudis paniculatis, corollis ſubcylindricis, foliis alternis oblongis crenulatis. *Sp. pl.* 564. *Mill. dict. n.* 3.
A. foliis ovatis acutis crenulatis planis alternis, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 162. *Gron. virg.* 48.
Vitis idaea americana, longiori mucronato et crenato folio, floribus urceolatis racemoſis. *Pluk. alm.* 391.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 569.
Riſpenblütige Andromede. W.
Habitat in Virginia. ♄ (v. ſ.)
Antherae *ariſtatae.*

18. ANDROMEDA *arborea.*
A. paniculis terminalibus, corollis ſubpubeſcentibus, foliis ellipticis acuminatis denticulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69.
A. racemis ſecundis nudis, corollis rotundo-ovatis. *Sp. pl.* 565. *Mill. dict. n.* 4.
A. arborea, foliis oblongo-ovatis integerrimis, floribus paniculatis nutantibus, racemis ſimpliciſſimis. *Gron. virg.* 48.
Frutex foliis oblongis acuminatis, floribus ſpicatis uno verſu diſpoſitis. *Cateſb. car.* 1. *p.* 71. *t.* 71.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 570.
Baumartige Andromede. W.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄ (v. ſ.)

19. ANDROMEDA *racemoſa.*
A. racemis terminalibus ſimplicibus bracteatis, corollis cylindricis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69. *Willd. arb.* 21. *
A. racemis ſecundis bracteatis, corollis gibboſo-cylindricis, foliis alternis oblongis ſerratis. *Sp. pl.* 564. *Wangh. amer.* 104.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 570.
Traubenblütige Andromede. W.
Habitat in Penſylvania, *et* Marilandia. ♄ (v. v.)
Haec differt a priori: 1. *Racemis minus paniculatis.* 2. *Bractea ſub ſingulo flore lineari-lanceolata,*

ſtricta, flore longiore, viridi, decidua; in praecedenti nulla bractea. 3. *Capſulis retinentibus ſtylum, quem antecedens dimittit.* 4. *Foliis magis ſerratis.*

20. ANDROMEDA *Cateſbaei.*

A. racemis terminalibus axillaribusve ſecundis, corollis ventricoſo-tubuloſis, foliis oblongo-lanceolatis tenuiſſime ſerrulatis. W.

A. (*Cateſbaei*) racemis ovatis axillaribus, corollis ventricoſo-tubuloſis bracteatis, foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis ſerrulatis craſſis perennantibus. *Walt. carol.* 137.

Frutex foliis ſerratis, floribus longioribus ſpicatis ſubviridibus, capſula pentagona. *Cateſb. carol.* 2. *p.* 43. *t.* 43.

Grünblütige Andromede. W.

Habitat in Virginia, Carolina. ♄

21. ANDROMEDA *axillaris.*

A. racemis axillaribus ſimplicibus, corollis oblongis, foliis ovatis acutis ſerrulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 69.

Winkelblütige Andromede.

Habitat in Carolina. ♄ (v. ſ.)

22. ANDROMEDA *coriacea.*

A. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis ovatis integerrimis nitidiſſimis, ramulis triquetris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

Lederblättrige Andromede. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

23. ANDROMEDA *acuminata.*

A. racemis axillaribus ſimplicibus, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70. *Willd. arb.* 22.*

A. (*lucida*) racemis ſecundis nudis patentiſſimis, corollis ſubcylindricis, foliis integerrimis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 79. *Collect.* 1. *p.* 95.*

Zugeſpitzte Andromede. W.

Habitat in America *boreali.* ♄

24. ANDROMEDA *rupeſtris.*

A. racemis ſimpliciſſimis bracteatis, corollis campanulatis, foliis alternis oblongis ſerrulatis. *Forſt. prod. n.* 195.

A. foliis oblongis alternis ſerrulatis. *Lin. ſuppl.* 237.

Felſen Andromede. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

25. ANDROMEDA *anaſtomoſans.*

A. foliis ovatis ſubſerratis, ſubtus anaſtomoſibus punctatis. *Lin. ſuppl.* 237.

Vieladrige Andromede. W.

Habitat in Nova Granada. *Mutis.* ♄

Frutex *determinate ramoſus, ramis piloſis.* Folia *alterna conferta ſubpetiolata ovata acuta lucida, vix manifeſte ſerrata, ſubtus venis anaſtomoſantibus puncto elevato.* Racemi *ad genicula annotina conferti congeſti ex racemis foliaceis, foliolis caulinis ſimilibus, ſed parvis.* Corollae *ovatae.* Antherae *ariſtis duabus, ſingulis iterum biariſtatis.* Capſulae *obtuſae, angulis dehiſcentibus.*

26. ANDROMEDA *calyculata.*

A. pedunculis ſolitariis axillaribus ſecundis, bracteis binis, foliis ovalibus ſquamoſo-punctatis obſolete ſerrulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

A. racemis ſecundis foliaceis, corollis ſubcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtuſis punctatis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 357. *Gort. ingr.* 64. *Mill. dict. n.* 5.

α. *ventricoſa*, corollis globoſis, foliis oblongo-lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

Chamaedaphne. *Buxb. in comment. petrop.* 1. *p.* 241. *t.* 8. *f.* 1.

β. *latifolia*, corollis oblongo-cylindraceis, foliis oblongo-ovalibus obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70. *Willd. arb.* 22.*

γ. *anguſtifolia*, corollis oblongo-ovalibus, foliis oblongo-lanceolatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 70.

Andromeda. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 119. *n.* 4.

Ciſtus Ledon ſ. Andromeda, floribus monopetalis parvis albis tubuloſis ſpicatim in ſummis ramulis diſpoſitis, foliis et facie vitis idaeae, capſula minima ſicca quinquepartita. *Gron. virg.* 21?

Hydragonum. *Siegeſb. petrop.* 56.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 571.

Roſtblättrige Andromede. W.

Habitat α. *in* Ruſſia β. *in* Terra nova. γ. in Europa *et* America *boreali inque* Sibiria. ♄ (α. v. v. γ. v. ſ.)

Frutex *foliis ovali-lanceolatis, coriaceis, myricae conſiſtentia, obtuſis, margine recurvis, adſperſis punctis vix conſpicuis, calloſis, ab utraque parte.* Racemi *ex ramis propriis, foliolis ovalibus alternis, in*

quorum ala Flos ſolitarius, pedicellatus. Calyx *a baſi tegitur duobus foliolis ovatis.* Flores *ad unum latus nutant.* Stamina 10, *antheris oblongis, muticis, bifidis.*

Quoad floris ſtructuram eſt Gaultheria, ſed fructus Andromedae. W.

869. EPIGAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 748.

Cal. exterior 3-phyllus: interior 5-partitus. *Cor.* hypocrateriformis. *Capſ.* 5-locularis.

1. EPIGAEA *repens.*

E. foliis cordato-ovatis integerrimis, corollis cylindricis. *Swartz prod.* 74.

Epigaea repens. *Sp. pl.* 565. *Lamarck illuſt. gen. t.* 367. *f.* 1.

Epigaea. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *Mill. dict. n.* 1.

Memecylum. *Mich. gen.* 13.

Arbutus foliis ovatis integris, petiolis laxis longitudine foliorum. *Gron. virg.* 49.

Pyrolae affinis repens fruticoſa, foliis rigidis ſcabritie exaſperatis, flore pentapetaloide fiſtuloſo. *Pluk. alm.* 309. *t.* 107. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 596.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 572.

Kriechender Grundſtrauch. W.

Habitat in Virginiae, Canadae *pinetis.* ♄ (v. ſ.)

2. EPIGAEA *cordifolia.*

E. foliis cordatis ſubrotundis ſerratis convexis hiſpidis rigidis, corollis ovatis. *Swartz prod.* 73. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 842.

Epigaea. *Lamarck illuſt. gen. t.* 367. *f.* 2.

Gaultheria (*ſphagnicola*) erecta, ramis parciusque foliis hirſutis, foliis ſubrotundo-cordatis convexis rigidis, ſerris ſetigeris. *Richard. in Act. Pariſ. hiſt. nat.* 1. *p.* 109.

Herzblättriger Grundſtrauch. W.

Habitat in ſummitate montium Guadeloupae, *inque* Cajenna. ♄

870. GAULTHERIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 749.

Cal. exterior 2-phyllus; interior 5-fidus. *Cor.* ovata. *Nectarium* mucronibus 10. *Capſ.* 5-locularis, veſtita calyce interiore baccata.

1. GAULTHERIA *procumbens.*

G. foliis oblongo-obovatis mucronatis dentatis confertis, caule procumbente. W.

Gaultheria. *Kalm. Amoen. acad.* 3. *p.* 14.* *Duham. arb.* 1. *p.* 286. *t.* 113. *Mill. dict. Willd. arb.* 125.*

Vitis idaea canadenſis, pyrolae folio. *Tournef. inſt.* 608.

Anonyma pedunculis arcuatis. *Cold. noveb.* 98.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 573.

Niederliegende Gaultherie. W.

Habitat in Canadae *ſterilibus arenoſis.* ♄ (v. v.)

*2. GAULTHERIA *antipoda.*

G. foliis ſparſis ſubrotundis ſerrato-dentatis, caule fruticoſo diffuſo. *Forſt. prod. n.* 196.

Südliche Gaultherie. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

871. ARBUTUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 750.

Cal. 5-partitus. *Cor.* ovata: ore baſi pellucida. *Bacca* 5-locularis.

1. ARBUTUS *Unedo.*

A. caule arboreo, foliis glabris obtuſe ſerratis, panicula terminali, baccis polyſpermis. *Lin. ſuppl.* 238.

A. caule arboreo, foliis glabris ſerratis, baccis polyſpermis. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Sauv. monſp.* 59. *Gron. orient.* 137. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 66. *Knorr. del.* 1. *t. E.* 1. *a. Seeligm. av.* 5. *t.* 1.

A. folio ſerrato. *Bauh. pin.* 460. *Mill. dict. n.* 1 *et ic. t.* 48. *f.* 1. 2.

Arbutus. *Cam. epit.* 168.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 575.

Erdbeerartige Sandbeere. W.

Habitat in Europae *auſtralis*, Hiberniae *occidentalis*, Orientis, *ſylvis.* ♄ (v. v.)

Baccae *polyſpermae, tuberculis ſeminum exaſperatae. Variat flore albo, rubro et pleno.* W.

2. ARBUTUS *laurifolia.*

A. arborea, foliis oblongis utrinque acuminatis acute ſerratis glabris, racemis axillaribus ſecundis ſeſſilibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 238.

Lorbeerblättrige Sandbeere. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

Simillima A. Unedoni, ſed differt: ſerraturis *acutis cuſpidatis*, racemis *axillaribus ſimpliciſſimis ſecundis folio brevioribus.*

3. ARBUTUS *Andrachne.*

A. caule arboreo, foliis glabris integerrimis ſerratisque, baccis polyſpermis. *Mill. dict. n.* 2.

Andrachne fruteſcens, ſpica erecta, foliis ovatis integerrimis et ſerratis. *Ehret act. angl.* 1767. *Vol.* 57. *p.* 114. *t.* 6. *opt.*

A. folio non ſerrato. *Bauh. pin.* 460.

Andrachne theophraſti. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 48.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 576.

Candiſche Sandbeere. W.

Habitat in Oriente. ♄ (v. ſ.)

Panicula *erecta pedunculis hiſpidis.* Simillima *A. Unedoni, ſed foliis nonnullis integerrimis et panicula viſcido-pubeſcente, quae in Unedone laevis.*

4. ARBUTUS *ferruginea.*

A. arboreſcens, foliis oblongis obtuſis glabris integerrimis, racemis terminalibus. *Lin. ſuppl.* 238.

Roſtfarbene Sandbeere. W.

Habitat in America. *Mutis.* ♄

Rami *angulati ſimplices glabri.* Folia *alterna petiolata.* Racemi *in axillis foliorum ramum terminantes ſolitarii.* Pedicelli *ramoſi patentes, in medio bracteis binis oppoſitis ovatis glabris.* Flores *remoti nutantes.* Calyx *quinquedentatus patentiuſculus.* Corolla *magis quam in reliquis ſpeciebus elongata fere ut in Andromeda.* Piſtillum *corolla longius.* Flores *ſiccati nigreſcentes. Suaſu Mutiſii, qui dixit fructum baccam eſſe, ad hoc genus amandavi.*

5. ARBUTUS *acadienſis.*

A. caulibus procumbentibus, foliis ovatis ſubſerratis, floribus ſparſis, baccis polyſpermis. *Mill. dict. n.* 3.

Vitis idaea acadienſis, foliis alaterni. *Tournef. inſt.* 608.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 577.
Acadiſche Sandbeere. W.
Habitat in Acadia. ♄

6. ARBUTUS *alpina.*
A. caulibus procumbentibus, foliis rugoſis ſerratis. *Fl. lapp.* 161. *Fl. ſuec.* 340, 359. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv. n.* 1019. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 118. *n.* 2. *Fl. dan. t.* 83.
Vitis idaea foliis oblongis albicantibus. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idaea. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61.
Vua urſi Galeni. *Zanon. t.* 178. *Hall.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 578.
Alpen Sandbeere. W.
Habitat in alpibus Lapponiae, Helvetiae, Sibiriae, Angliae. ♄ (v. ſ.)

7. ARBUTUS *Uva urſi.*
A. caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *t.* 6. *f.* 3. *Fl. ſuec.* 339, 358. *Mat. med.* 115. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv. n.* 1018. *Mill. dict. n.* 5. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 118. *n.* 1. *Scop. carn. n.* 483. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 69. *Fl. dan. t.* 33. *Blackw. t.* 592. *Kniph. cent.* 9. *n.* 10. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 466. *Willd. arb.* 24.*
Uva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.
Radix idaea putata et Uva urſi. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 524.
Arbutus noveboracenſibus Bearberry. *Cold. nov.* 104.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 578.
Gemeine Sandbeere. W.
Habitat in Europa *frigida*, Canada. ♄ (v. v.)
Baccae 5-*ſpermae, ut in A. alpina.*

8. ARBUTUS *mucronata.*
A. caule fruticoſo, foliis alternis ovatis ſerratis mucronatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Lin. ſuppl.* 239. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 31.* *Lamarck. illuſt. gen. t.* 366. *f.* 2.
Spitzblättrige Sandbeere. W.
Habitat in Tierra del Fuego. ♄
Frutex *rigidiſſimus.* Folia *alterna breviſſime petiolata ovata plana rigida, margine cartilagineo ſerrato, ſerraturis utrinque quatuor, acuta, mucrone pungente, avenia.* Gemmae *in axillis foliorum, ſquamis paucioribus concavis imbricatis, unde exeunt pedunculi ſolitarii, interdum ſquamoſi uniflori.* Flores *cernui.*

*9. ARBUTUS *microphylla.*
A. caule fruticoſo, foliis ovatis ſerratis muticis, pedunculis axillaribus unifloris. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 32. *
A. (*ſerpillifolia*) caulibus ſuffruticoſis hiſpidis, foliis ovatis ſubdentatis coriaceis glabris, floribus ſubſeſſilibus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 226. * *illuſt. gen. t.* 366. *f.* 3.
Kleinblättrige Sandbeere. W.
Habitat in Tierra del Fuego. ♄

10. ARBUTUS *pumila.*
A. caulibus diffuſis, foliis alternis diſtichis oblongis integerrimis, floribus lateralibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 239.
A. caulibus proſtratis, foliis alternis diſtichis oblongis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Forſt. Comment. goett.* 9. *p.* 32. *
Niedrige Sandbeere. W.
Habitat in Tierra del Fuego. ♄
Planta *pumila fruticoſa.* Folia *minutiſſima fere Empetri ſupra glaberrima, ſubtus carinata.* Pedunculi *eſquamis gemmae axillaris nudi elongati uniflori.* Flores *cernui.*

872. CLETHRA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 751.

Cal. 5-partitus. *Pet.* 5. *Stigma* 3-fidum. *Capſ.* 3-locularis 3-valvis.

1. CLETHRA *alnifolia.*
C. foliis obovatis ſerratis ſubtus ſubpubeſcentibus, racemo ſimplici bracteato. W.
C. fruticoſa, foliis obovato-lanceolatis, racemis ſpiciformibus, calycibus acutis, bracteis perſiſtentibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 73. *Willd. arb.* 68. *
Clethra alnifolia. *Sp. pl.* 566.
α. *denudata*, foliis utrinque nudis. *Ait. l. c.*
Clethra. *Gron. virg.* 47. *Duham. arb.* 1. *p.* 176. *t.* 72. *Mill. dict. et ic. t.* 28. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 153.
Alnifolia americana ſerrata, floribus pentapetalis albis in ſpicam diſpoſitis. *Pluk. alm.* 18. *t.* 115. *f.* 1. *Catesb. car.* 1. *p.* 66. *t.* 66.

β. pubeſcens, foliis ſubtus tomentoſis. *Ait. l. c.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 580.
Ellerblättrige Clethra. W.
Habitat in Carolina, Virginia, Penſylvania. ♄ (v. v.)

***2. CLETHRA *paniculata*.**

C. foliis lanceolato-obovatis ſerratis glabris, panicula anguſtata bracteata. W.
C. fruticoſa, foliis lanceolatis utrinque nudis, floribus paniculatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 73.
Riſpenblütige Clethra. W.
Habitat in America *boreali.* ♄ (v. f.)
Panicula *non e racemis compoſita anguſta et elongata.* Pedunculi *ut in praecedente albo-pubeſcentes.* W.

***3. CLETHRA *arborea*.**

C. foliis oblongis acuminatis ſerratis glabris, racemis paniculatis, florentibus ebracteatis, pedunculis hirſutis. W.
C. arborea, foliis oblongo-lanceolatis utrinque glabris, racemis ſpiciformibus, calycibus obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 73.
Baumartige Clethra. W.
Habitat in Madera. ♄ (v. f.)

4. CLETHRA *tinifolia*.

C. foliis oblongis integerrimis ſubtus incanis, racemis paniculatis, florentibus ebracteatis, pedunculis tomentoſis. W.
C. arborea, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis ſubtus incanis, racemis paniculatis ſpiciformibus tomentoſis. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 845.*
Tinus occidentalis. *Sp. pl.* 530.
Volkameria arborea, foliis oblongo-ovatis alternis ſuperne glabris, ſubtus ſubvilloſis et nervoſis, ſpicis ramoſis et terminalibus. *Brown. jam.* 214. *t.* 21. *f.* 1.
Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu racemoſo. *Sloan. hiſt.* 2. *p.* 86. *t.* 198. *f.* 2. (*icon nec deſcriptio.*)
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 546.
Lorbeerblättrige Clethra. W.
Habitat in montibus altioribus Jamaicae *auſtralis.* ♄

873. PYROLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 572.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-locularis, angulis dehiſcens.

1. PYROLA *rotundifolia.*
P. ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato, *Fl. ſuec.* 330, 360. *Mat. med.* 116. *Amoen. acad.* 1. *p.* 156. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 128. *Pall. it.* 3. *p.* 287. *Poll. pal. n.* 395. *Fl. dan. t.* 110. *Blakw. t.* 594. *Retz. obſ.* 1. *p.* 17. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 462.
P. ſtaminibus et piſtillis declinatis. *Fl. lapp.* 169.
P. foliis ſubrotundis, tubis recurvis. *Hall. helv. n.* 1010.
P. foliis integerrimis. *Vir. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 440.
P. foliis ſubrotundis, ſcapo racemoſo. *Hort. cliff.* 162.
P. rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.
P. noveboracenſis. *Cold. noveb.* 99.
P. folio rotundo. *Riv. t.* 135. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 503.
Rundblättriges Wintergrün. W.
Habitat in Europa *ſeptentrionaliore*, Virginia, Braſilia. ♃ (v. v.)

2. PYROLA *minor.*
P. floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillisque rectis. *It. gotl.* 206. *Fl. ſuec.* 331, 361. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 128. *Gort. ingr.* 65. *Scop. carn. n.* 484. *Pollich. pal. n.* 396. *Flor. dan. t.* 55. *Kniph. cent.* 2. *n.* 82. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 463.
P. foliis ſubrotundis, ſcapo undique racemoſo, genitalibus rectis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 192.
P. foliis ſubrotundis racemoſis, tubis rectis. *Hall. helv. n.* 1009. *opuſc.* 82.
P. minor. *Riv. pent.* 149. *Raj. angl.* 3. *p.* 363.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 504.
Kleines Wintergrün. W.
Habitat in Europa *frigidiore.* ♃ (v. v.)

3. PYROLA *ſecunda.*
P. racemo unilaterali. *Fl. ſuec.* 332, 362. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 129. *t.* 56. *f.* 2. *Scop. carn. n.* 485. *Pollich. pal. n.* 397. *Fl. dan. t.* 402. *Hall. helv. n.* 1008. *Hoffm. germ.* 143. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 463.
P. floribus uno verſu ſparſis. *Fl. lapp.* 168.

P. folio mucronato ſerrato. *Bauh. pin.* 181.
P. 2. tenerior. *Cluſ. pan.* 506.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 504.
Einſeitiges Wintergrün. W.
Habitat in Europae *borealis ſylvis.* ♄ (v. v.)

4. PYROLA *umbellata.*

P. pedunculis ſubumbellatis. *Fl. ſuec.* 333, 363. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 129. *n.* 18. *Pollich. pal. n.* 398. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 151. *II.* 464.
P. fruteſcens, arbuti flore. *Bauh. pin.* 191.
P. 3. fruticans. *Cluſ. pan.* 507.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 505.
Doldentragendes Wintergrün. W.
Habitat in Europae, Aſiae et Americae *ſeptentrionalis ſylvis.* ♄ (v. v.)

5. PYROLA *maculata.*

P. pedunculis bifloris. *Mill. dict. n.* 4.
P. petiolis apice bifloris vel trifloris. *Gron. virg.* 48.
P. marilandica minor, folio mucronato arbuti. *Pet. muſ.* 675.
P. mariana, arbuti foliis anguſtioribus, trifoliata ad medium nervum linea alba utrinque per longitudinem diſcurrente. *Pluk. mant.* 157. *t.* 349. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 505.
Geflecktes Wintergrün. W.
Habitat in Americae *ſeptentrionalis ſylvis.* ♄

6. PYROLA *uniflora.*

P. ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 167. *Fl. ſuec.* 334, 364. *Hall. helv. n.* 1011. *it. harc. n.* 21. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 129. *Gort. ingr.* 66. *Pall. it.* 3. *p.* 287. *Scop. carn. n.* 486. *Pollich. pal. n.* 399. *Fl. dan. t.* 8. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 181. *II.* 464.
P. rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
Singulari flore ampliore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 2.
Pyrola IV. *Cluſ. pan.* 508, 509.
P. flore ſingulari. *Riv. pent. irr. t.* 137.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 506.
Einblumiges Wintergrün. W.
Habitat in Europae *borealis ſylvis.* ♃ (v. v.)

874. STYRAX.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 753.

Cal. inferus. *Cor.* infundibulif. *Drupa* 2-ſperma.

1. STYRAX *officinale.*
S. foliis ovatis ſubtus villoſis, racemis ſimplicibus folio brevioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 75.
S. foliis ovatis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Cavan. Diſſ.* 6. *p.* 338. *t.* 188. *f.* 2. *
Styrax officinale. *Sp. pl.* 635.
Styrax. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upſ.* 122. *Mat. med.* 116. *Roy. lugdb.* 265. *Sauv. monſp.* 306. *Gron. orient.* 147. *Mill. dict. et ic. t.* 260. *Regn. bot.*
Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.
Styrax. *Cam. epit.* 48. *Matth. in dioſcor. lib.* 1. *cap.* 68. *Lob. ic.* 151. *Tournef. inſt.* 598. *t.* 369.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 633.
Echter Storax. W.
Habitat in Syria, Iudaea, Italia. ♄ (v. f.)
Germen *omnino ſuperum nec inferum eſt, et* ſtaminum *numerus naturalis* 10. *Ab* Haleſia *diverſum.*

2. STYRAX *grandifolium.*
S. foliis obovatis ſubtus villoſis, pedunculis inferioribus axillaribus ſolitariis unifloris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 75.
S. (*officinale*) foliis rotundatis integris ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis terminalibus, racemis longis baſi folioſis apice nudis. *Walt. carol.* 140.
Groſsblättriger Storax. W.
Habitat in Carolina *auſtrali.* ♄

3. STYRAX *Benzoin.*
S. foliis oblongis acuminatis ſubtus tomentoſis, racemis compoſitis longitudine foliorum. *Dryand. in Act. angl.* 77. *p.* 308. *t.* 12. *
Laurus Benzoin. *Houttuyn in Act. harlem.* 21. *p.* 265. *t.* 7.
Arbor Benzoini. *Grimm. in Eph. A. N. C. dec.* 1. *ann.* 1. *p.* 370. *fig.* 31.
Benjui. *Garcias ab Horto in Cluſ. exot. p.* 155.
Benzoin Storax. W.
Habitat in Sumatra. ♄
Folia *ovata acuminata integerrima.* Panicula *axil-*

laris longitudine foliorum. Hujus et praecedentium folia ſunt integerrima, ſequentis vero dentata. W.
Ex hac arbore venit reſina Benzoin dicta. W.

*4. STYRAX *laevig[atum]*.

S. foliis oblongis utrinque glabris, pedunculis axillaribus unifloris ſolitariis binisve. *Ait. Kew.* 2. *p.* 75.
S. (*glabrum*) foliis ſubovatis glaberrimis denticulatis, floribus axillaribus cernuis. *Cavan. diſſ.* 6. *p.* 340. *t.* 188. *f.* 1. *
S. (*americana*) foliis ovato-lanceolatis ſubdentatis, floribus octandris. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 81. *
S. (*laeve*) foliis ovatis utrinque acuminatis ſerrulatis laevibus, racemis lateralibus folioſis brevibus. *Walt. carol.* 140.
Glattblättriger Storax. W.
Habitat in Carolina *auſtrali.* ♄ (v. ſ.)

875. INOCARPUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 754.

Cal. bifidus. *Cor.* infundibuliformis. *Stam.* duplici ſerie. *Drupa* monoſperma.

1. INOCARPUS *edulis.*

I. edulis. *Lin. ſuppl.* 239. *Forſt. gen. n.* 33. *prod. n.* 197. *pl. eſcul. p.* 50. * *Thunb. Diſſ. Nov. gen. pl.* 2. *p.* 46. *
Gujanus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 170. *t.* 65.
Eſsbare Faſerfrucht. W.
Habitat in Java, Celebe, Amboina, Banda, *inque* novis Hibridibus, *inſulis* Societatis *et* Amicorum. ♄
Arbor. Folia *alterna dodrantalia oblonga ſubcordata, breviſſime petiolata integerrima glabra venoſa.* Spicae *axillares ſolitariae parvae hirſutae.* Flores *parvi alterni, bracteis parvis ſuffulti.*

876. SAMYDA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 744.

Cal. 5-partitus, coloratus. *Cor.* nulla. *Nectar.* campanulatum ſtaminiferum. *Capſ.* intus baccata, 4-valvis, 1-locularis. *Sem.* nidulantia.

1. SAMYDA *nitida.*

S. floribus octandris, foliis cordatis glabris. *Sp. pl.* 557.

β. foliis nitidis cordatis, laeviſſime crenatis, rudimentis mollibus rubentibus, racemis tenuioribus alaribus. *Brown. jam.* 217. *t.* 23. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 582.
Glänzende Samyde. W.
Habitat in America. ♄

2. SAMYDA *macrophylla.* W.
S. floribus octandris, foliis ovatis acutis glabris, axillis venarum ſubtus villoſis, corymbo terminali. W.
Groſsblättrige Samyde. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Rami *glabri teretes a foliorum caſu cicatriſati flaveſcentes.* Folia *ampla ſaepius ſemipedalia et ultra, ovata acuta, margine obſolete crenulata, utrinque glabra, ſubtus vero in venarum axillis et ad coſtam mediam villoſa.* Flores *parvi in corymbo pedunculato ſubterminali.* Calyx *campanulatus, limbo quinquefido revoluto.* Corolla *nulla.* Nectarium *campanulatum gerens* Filamenta *octo minutiſſima ſubulata.* Antherae *fuſcae.* Germen *ovatum.* Stylus *ſubulatus.* Stigma *piloſum.* Fructus *ignotus.* W.

3. SAMYDA *multiflora.*
S. floribus octandris, foliis oblongis dentatis utrinque attenuatis, ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris aggregatis axillaribus. W.
S. (*multiflora*) floribus octandris, foliis ovatis utrinque acutis, inferne tomentoſis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 48. *t.* 67.*
Vielblütige Samyde. W.
Habitat in inſula St. Dominici. ♄

4. SAMYDA *villoſa.*
S. floribus decandris, foliis oblongis ſubſerratis baſi obliquis, ſericeis, ſubtus villoſis, pedunculis ſolitariis axillaribus. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 758. *
Rauhe Samyde. W.
Habitat in montibus Jamaicae. ♄

5. SAMYDA *glabrata.*
S. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus unifloris. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 760. *
Glatte Samyde. W.
Habitat in altis montibus Jamaicae *auſtralis.* ♄
Cum S. nitida non confundenda, cui folia *cordata et* ſtamina *octo.* Swartz l. c.

*6. SAMYDA *ſpineſcens.*
S. floribus decandris terminalibus, foliis lanceolato-ovatis obtuſis crenatis glabris, ramis patulis ſpineſcentibus. *Swartz prod.* 68. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 762. *
Dornige Samyde. W.
Habitat in Hiſpaniola. ♄
Calyx *hujus pentaphyllus, tamen* nectario *truncato cylindrico inſtructus.* W.

7. SAMYDA *pubeſcens.* †
S. floribus dodecandris, foliis ovatis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 557.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 583.
Behaarte Samyde. W.
Habitat in America. ♄
Planta obſcura. Swartz obſ. 179.

8. SAMYDA *ſerrulata.*
S. floribus dodecandris, foliis ovato-oblongis ſerrulatis. *Sp. pl.* 558. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 328. *t.* 17. *f.* 1. *
S. floribus dodecandris. *Iacq. amer.* 132.
Guidonia ulmi folio, flore roſeo niveo. *Plum. gen.* 4. *ic.* 146. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 584.
Geſägte Samyde. W.
Habitat in America. ♄

*9. SAMYDA *polyandra.* W. †
S. floribus polyandris. W.
Meliſtaurum diſtichum. *Forſt. gen. n.* 72. *prod. n.* 570.
Vielfädige Samyde. W.
Habitat in Nova Caledonia. ♄

*877. CASEARIA.
Gen. pl. ed. Schreb. n. 756.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 0. *Nectar.* 4-5-phyllum cum ſtaminibus alternans. *Capſ.* intus baccata 3-valvis 1-locularis. *Sem.* nidulantia.

1. CASEARIA *ſpinoſa.*
C. floribus octandris, foliis ovatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus unifloris, ramis ſpinoſis. W.

C. (*aculeata*) aculeata, floribus octandris. *Iacq. amer.* 133. *
Samyda (*ſpinoſa*) floribus octandris, ramis ſpinoſis. *Sp. pl.* 557. *Swartz obſ.* 179.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 583.
Dornige Caſearie. W.
Habitat in montoſis Domingo. ♄

2. CASEARIA *nitida.*

C. floribus octandris, foliis ovatis crenatis glabris, cymis pedunculatis axillaribus. W.
C. (*nitida*) inermis, floribus octandris. *Iacq. amer.* 132. *
Act. helv. 8. *p.* 58. *t. f.* 1.
Glänzende Caſearie. W.
Habitat in Carthagenae *fruticetis.* ♄
Diverſiſſima a Samyda nitida. W.

3. CASEARIA *ramiflora.*

C. floribus octandris, foliis ellipticis ſerratis utrinque glabris, ramis floriferis. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 50. *
Iroucana gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 329. *t.* 127. *
Athenaea. *Schreb gen. pl. n.* 661.
Aſtblütige Caſearie. W.
Habitat in inſula St. Crucis *et ad littora maris* Gujaniae, Cajennae. ♄

4. CASEARIA *hirta.*

C. floribus octandris, foliis ovatis ſerratis ſubtus hirtis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 756. *
Samyda (*tomentoſa*) floribus octandris, foliis ovatis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Swartz prod.* 68.
Haarige Caſearie. W.
Habitat in paſcuis ſylvaticis Jamaicae. ♄

5. CASEARIA *parviflora.*

C. floribus decandris, foliis oblongis acuminatis crenulatis utrinque glabris nitidis, pedunculis confertis axillaribus unifloris. W.
Samyda (*parviflora*) floribus decandris, foliis ovato-oblongis utrinque glabris. *Sp. pl.* 557. *Loefl. itin.* 260. *Mill. dict. n.* 2. *Swartz obſ.* 178. *
Samyda foliis ovatis cum acumine, fructibus plurimis minoribus confertis. *Brown. jam.* 217.
Arbor baccifera, foliis oblongis acuminatis, floribus confertim ex alis foliorum erumpentibus, fructu minimo croceo. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 108. *t.* 211. *f.* 2. *Raj. dend.* 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 581.
Kleinblütige Caſearie. W.
Habitat in fruticetis Americae *calidioris.* ♄ (v. ſ.)

*6. CASEARIA *parvifolia.* W.

C. floribus decandris, foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris pedunculis unifloris aggregatis lateralibus. W.
C. (*decandra*) floribus decandris. *Iacq. amer.* 133. *t.* 85.*
Kleinblättrige Caſearie. W.
Habitat in montibus ſylvaticis Martinicae. ♄

Diverſiſſima a praecedente: foliis *multo minoribus ovatis nec oblongis*, floribus *lateralibus, id eſt in ramis aphyllis, nec axillaribus, denique* calycibus *reflexis.* W.

*7. CASEARIA *ſylveſtris.*

C. floribus decandris, foliis ovatis acuminatis integerrimis, ramis virgatis, pedunculis axillaribus confertiſſimis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 752.*
Wald Caſearie. W.
Habitat in ſylvis montoſis Indiae *occidentalis, in* Jamaica *vulgaris.* ♄

*8. CASEARIA *macrophylla.*

C. floribus decandris ſubtomentoſis, foliis ellipticis acuminatis ſubcrenatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 32.*
Pitumba gujanenſis. *Aubl. guj.* 2. *app.* 29. *t.* 385.
Groſsblättrige Caſearie. W.
Habitat in Cajenna. ♄

Rami *teretes glabri griſeo-punctati.* Folia *petiolata alterna ſex-vel octopollicaria utrinque glabra transverſim ſimpliciter venoſa perforata, ſubtus pallidiora ſubcoſtata, coſtis ſubpurpuraſcentibus, acuminata integerrima, extrorſum verſus crenata,* crenae *interdum obſcuriores.* Pedunculi *axillares breviſſimi uniflori aggregati.* Vahl. l. c.

Valde affinis C. parviflorae. W.

*9. CASEARIA *ſerrulata.*

C. floribus decandris, foliis ovato-lanceolatis obtuſis ſerrulatis, ramulis flexuoſis, pedunculis axillaribus confertiſſimis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 754.*
Feingeſägte Caſearie. W.
Habitat in Indiae *occidentalis inſula* Nevis. ♄

*10. CASEARIA *elliptica.* W.

C. floribus decandris, foliis elliptico-lanceolatis obtuſis

ſubſerratis, junioribus ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus confertis. W.

Anavinga (*lanceolata*) foliis alternis lanceolatis leviter ſerratis, ſubtus ſubpubeſcentibus, baccis ovalibus pedunculo longioribus. *Lamarck. encycl* 1. *p.* 146.* *illuſt. gen. t.* 355. *f.* 1.

Elliptiſche Caſearie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

11. CASEARIA *ovata.* †

C. foliis ſubrotundo-ovatis acuminatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. W.

Anavinga (*ovata*) foliis alternis ovatis acuminatis ſerrulatis, baccis globoſis pedunculo aequalibus. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 147.*

Anavinga. *Rheed. mal.* 4. *p.* 101. *t.* 49.

Eyförmige Caſearie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Flores *ſunt quadrifidi ſecundum Rheede, an itaque octandri?* W.

12. CASEARIA *hirſuta.*

C. floribus decandris, foliis ovatis acuminatis dentato-ſerratis hirtis, ſubtus villoſis, pedunculis lateralibus confertis. *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 755.*

Rauhe Caſearie. W.

Habitat in montibus Jamaicae *et* Hiſpaniolae. ♄

*878. AQUILARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1753.

Cal. campanulatus 5-fidus. *Cor.* 0. *Nectar.* campanulat. 5-fidum interne ſtaminiferum. *Capſ.* 2-locul. 2-valvis lignoſa. *Sem.* ſolitaria.

1. AQUILARIA *ovata.*

A. ovata. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 377. *t.* 224.*

Aquilaria malacenſis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 49.* 2. *p.* 603.*

Agallochum ſecundarium. *Rumph. amb.* 2. *p.* 34. *t.* 10.

Sinkoo. *Kaempf. amoen.* 903.

Eyblättriges Adlerholz. W.

Habitat in montibus Malaccae. ♄

Arbor *cortice cinereo.* Folia *alterna petiolata oblongo-ovata acuminata glabra integerrima tenuiſſime venoſa.* W.

*879. AUGEA.

Thunb. prod. capenſ. n. 33.

Cal. 5-partitus. *Cor.* o. *Nectar.* 10-dentatum. *Capſ.* 10-locularis.

*1. AUGEA *capenſis.*
A. capenſis. *Thunb. prod.* 80.
Capiſche Augea. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

880. COPAIFERA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 757.

Cal. o. *Petala* 4. *Legumen* ovatum. *Sem.* 1, arillo ovato.

1 COPAIFERA *officinalis.*
Copaiva. *Mat. med.* 115. *Iacq. amer.* 133. *t.* 86. *Mill. dict.*
Coapoiba. *Marcgr. braſ.* 130. *Piſ. braſ.* 56. *Raj. hiſt.* 1593.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 638. *t.* 10. *f.* 1.
Weſtindiſcher Copaivabaum. W.
Habitat in Braſilia, Antillis. ♄
Folia *alterna, pinnata, quadrijuga: foliolis altero latere anguſtioribus, alternis, exceptis ultimis.*

881. BUCIDA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 758.

Cal. 5-dentatus, ſuperus. *Cor.* o. *Bacca* 1-ſperma.

1. BUCIDA *Buceras.*
B. ſpicis elongatis, foliis cuneiformibus glabris. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 50.
Bucida Buceras. *Sp. pl.* 556. *Swartz obſ.* 180. *
Bucida. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397. *
Buceras ramulis flexuoſis tenuioribus, foliis obovatis con-

fertis, ſpicis plurimis terminalibus. *Brown. jam.* 221. *t.* 23. *f.* 1.

Mangle Iulifera, foliis ſubrotundis verſus ſummitatem latiſſimis confertim naſcentibus, cortice ad coria denſanda utili. *Sloan. jam.* 156. *hiſt.* 2. *p.* 67. *t.* 189. *f.* 3. *Raj. dendr.* 116.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 643.

Glattblättriger Kuhhornbaum. W.

Habitat in Jamaica. ♄ (v. f.)

Affinis Rhizophorae.

2. BUCIDA *capitata.*

B. floribus capitato-ſpicatis, foliis cuneiformibus margine villoſo-ciliatis. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 50. *t.* 8. *

Behärtblättriger Kuhhornbaum. W.

Habitat in Montſerrat. ♄

D I G Y N I A.

882. ROYENA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 759.

Cal. urceolatus. *Cor.* 1-petala, limbo revoluto. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis.

1. ROYENA *lucida.*

R. foliis ovatis ſcabriuſculis. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 411. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 10. *n.* 74.

R. foliis ovatis villoſis. *Thunb. prod.* 80.

Staphylodendron africanum ſempervirens, foliis ſplendentibus. *Comm. hort.* 1. *p.* 187. *t.* 96.

Staphylodendrum africanum, folio ſingulari lucido. *Herm. parad.* 232. *t.* 232.

Piſtacia africana. *Pluk. alm.* 298. *t.* 63. *f.* 4. *t.* 317. *f.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 585.

Glänzende Royene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

2. ROYENA *villoſa.*

R. foliis cordatis oblongis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 568. *Thunb. prod.* 80.

R. ſcabra. *Burm. prodr.* 13.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 586.

Langhaarige Royene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. *Dav. Royen.* ♄.

Similis *R. lucidae, ſed* Rami *villoſi.* Folia *elliptica ſ. oblonga, baſi cordata, ſubtus tomentoſa, obtuſiuſcula, breviter petiolata: petiolis villoſis.* Flores *axillares, nutantes, ſolitarii: pedunculis villoſis longitudine florum.* Bracteae 2, *oppoſitae, ovatae, acutae, pubeſcentes, calyce majores eique ſubjectae, deciduae.*

*3. **ROYENA** *pallens.*

R. foliis oblongo-obovatis obtuſis glabris. W.

R. (*pallens*) foliis oblongis obtuſis glabris, margine revolutis. *Thunb. prod.* 80.

Bleiche Royene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

4. **ROYENA** *glabra.*

R. foliis lanceolatis glabris. *Roy. prodr.* 441. *Mill. dict. n.* 2. *Burm. cap.* 144.

R. foliis oblongis acutis glabris planis. *Thunb. prod.* 80.

R. foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 149.

Vitis idaea aethiopica, buxi minoris folio, floribus albis. *Comm. hort.* 1. *p.* 125. *t.* 65.

Vitis idaea aethiopica, myrti foliis, floſculis dependentibus. *Pluk. alm.* 391. *t.* 321. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 586.

Glatte Royene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

5. **ROYENA** *hirſuta.*

R. foliis oblongo-lanceolatis villoſiuſculis. W.

R. foliis lanceolatis hirſutis. *Roy. lugdb.* 441. *Mill. dict. n.* 3. *Thunb. prod.* 80. *Iacq. collect. ſuppl.* 110. *t.* 13. *f.* 1. *

Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirſutis. *Hort. cliff.* 163.

Staphylodendrum africanum, folio lanuginoſo roſmarini latiore. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 235.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 587.

Haarige Royene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

6. **ROYENA** *polyandra.*

R. foliis ellipticis, floribus polyandris polygamis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 76.

R. foliis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtaminibus plurimis. *Lin. ſuppl.* 240. *Thunb. prod.* 80.

Vielfädige Royene. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*7. ROYENA *anguſtifolia.* W.

R. foliis lanceolatis acutis ſubtus piloſiuſculis. W.
Schmalblättrige Royene. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Ab omnibus hucusque notis ſpeciebus diverſiſſima, foliis *anguſtis lanceolatis utrinque acutis ſubtus piloſiuſculis.* W.

8[illegible]3. HYDRANGEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 760.

Cal. ſuperus 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 2-locularis, 2-roſtris, foramine inter cornua dehiſcens.

1. HYDRANGEA *arboreſcens.*

H. cymis nudis, foliis oblongo-ovatis acuminatis dentatis glabris. W.
H. foliis ovatis glabris, ſtaminibus alternis longioribus. *Smith. ic. pictae.* 1. *p.* 12. *Willd. arb.* 143. *
Hydrangea arboreſcens. *Sp. pl.* 568. *Lamarck illuſt. gen. t.* 370. *f.* 1.
Hydrangea. *Gron. virg* 50. *Duham. arb.* 1. *p.* 298. *t.* 118. *Mill. dict. et ic. t.* 251. *Du Roi harbk.* 1. *p.* 309. *Wangenh. amer.* 107.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 588.
Baumartige Hydrangea. W.
Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

Frutex *ex ordine Arbuſtivarum XIX, foliis oppoſitis, floribus in cymam digeſtis.*

Stamina *octo ad decem.* *Du Roi. l. c.* R.

*2. HYDRANGEA *hortenſis.*

H. cymis radiatis, foliis ellipticis utrinque attenuatis dentatis glabris. W.
H. foliis ellipticis ſerratis glaberrimis, ſtaminibus aequalibus. *Smith. ic. pictae.* 1. *p.* 12. *t.* 12. *
Primula (*mutabilis*) caule fruticoſo multiplici, foliis ovatis ſerratis, floribus nudis. *Loureiro cochin. p.* 127.
Viburnum (*ſerratum*) foliis oblongis ſerratis baſi integris ſubtus pallidis. *Thunb. jap.* 124?

Hortenſia. *Juſſ. gen. ed. Uſt. p.* 237. *Lamarck illuſ gen. t.* 380.
Sijo. *Kaempf. amoen.* 854.
Schönblühende Hydrangea. W.
Habitat culta in hortis Chinae, Japoniae. ♄ (v. v.)

*3. HYDRANGEA *radiata.*
H. cymis radiatis, foliis cordatis dentatis. W.
Hydrangea. *Lamarck illuſt. gen. t.* 370. *f.* 2.
H. (*radiata*) caule ſuffruticoſo quinquepedali ramoſo, fo liis latis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis oppoſiti pagina inferiore argentea lanoſa. *Walt. carol.* 251
Herzblättrige Hydrangea. W.
Habitat in Carolina. ♄

*4. HYDRANGEA *quercifolia.*
H. cymis radiatis, foliis oblongis ſinuato-lobatis denta tis. W.
Hydrangea quercifolia. *Bartram. itin. ed. germ. p.* 36 *t.* 7. *
H. (*radiata*) foliis lobatis ſubtus tomentoſis. *Smith i pictae. p.* 12.
Eichenblättrige Hydrangea. W.
Habitat in Florida. ♄
Synonymum Walteri, ſub hac ſpecie a Clariſſ. Smit *citatum, ad praecedentem ſine dubio petinet.* W.

884. CUNONIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 761.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* bilocu laris, acuminata, polyſperma. *Styli* flor longiores.

CUNONIA *capenſis.*
C. capenſis. *Sp. pl.* 569. *Thunb. prod.* 81.
Ooſterdykia floribus ſpicatis pentapetalis, foliis oblongi ſubincanis ſerratis. *Burm. afr.* 259. *t.* 96.
Arbuſcula, arbuti alatis foliis, africana. *Pluk. alm.* 45 *t.* 141. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 589.
Capiſche Cunonie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)
Folia *oppoſita, pinnata cum impari ſeſſili, nec lon giore.* Foliola *ſaepe ſeptem, lanceolata, glabra, ſer*

rata. Glandulae *ſpathiformes, axillares, petiolatae.* Racemi *terminales, bini, ſimplices: pedicelli ex ſingulis punctis ſparſis plures, uniflori.*

885. TRIANTHEMA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 762.

Cal. ſub apice mucronatus. *Cor.* o. *Stam.* 5 ſ. 10. *Germen* retuſum. *Capſ.* circumſciſſa.

1. TRIANTHEMA *monogyna.*

T. floribus pentandris monogynis. *Mant.* 69.

T. Portulacaſtrum. *Spec. pl.* 2. *p.* 335. *Sauv. meth.* 117. *Kniph. orig.* 4. *praef.*

Portulaca curaſſavica procumbens, capparidis folio, flore muſcoſo, capſula bifurca. *Herm. par.* 213. *t.* 213. *Raj. ſuppl.* 506.

Portulacae affinis, folio ſubrotundo, flore pentapetalo dilute purpureo. *Sloan. jam.* 89. *hiſt.* 1. *p.* 205. *Raj. ſuppl.* 506.

Kali curaſſavicum procumbens, foliis ſubrotundis. *Pluk. alm.* 202. *t.* 95. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 507.

Portlacblättrige Dreyblume. W.

Habitat in Jamaica, Curaſſao. ⊙ (v. ſ.)

Caules *depreſſi, ſubdichotomi, articulati, laeves, latere ſuperiore pubeſcentes.* Folia *oppoſita, petiolata, ovalia, obtuſa, integerrima margine rubro: altero folio ſemper minore.* Petioli *bidentati, folio breviores.* Flores *axillares, ſeſſiles.* Calyx *perianthium diphyllum: foliolis ſubulatis, perſiſtentibus, vel potius Bracteae.* Petala 5, *ovalia, ſub apice mucronata, quaſi ex calyce et petalis ſimul nata.* Filamenta 6-10, *corolla breviora.* Antherae *ovales, didymae.* Germen *ſemiinferum, retuſum, bicorne.* Stylus *filiformis, hinc hiſpidus, longitudine corollae.* Stigma *ſimplex.*

Genus *vix aliud magis difforme, ideoque niſi ſpecialis character habeatur, facile ſpecies confunduntur.* H. V.

2. TRIANTHEMA *cryſtallina.*

T. floribus pentandris monogynis congeſtis, foliis ovalibus, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 52. *

Papularia (*cryſtallina*) monogyna, calyce nullo, corolla monopetala. *Forſk. deſcr.* 69. *

Cryſtallene Dreyblume. W.
Habitat in Arabia *et* India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

3. TRIANTHEMA *pentandra.*

T. floribus pentandris digynis. *Mant.* 70.
Racoma. *Forſkoehl. aegypt. p.* 71. R.
Portulacae affinis polygonoides, bliti folio et facie made raſpatenſis. *Pluk. alm.* 304. *t.* 120. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 508.
Fünffädige Dreyblume. W.
Habitat in Arabia. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *pedalis, teres, erectus, ſcabriuſculus.* Foli *oppoſita, petiolata, elliptica, obtuſiuſcula, integer rima, erecto-patentia, oleracea.* Rami *alterni brevi res.* Flores *axillares, alterius ſ. alterius alae, inte ramum, et caulem: ſubſeſſiles, plures, congeſti; intu pallidi, extus vireſcentes.* Calyx *monophyllus, cam panulatus, 5-partitus, intus purpuraſcens: lacini lanceolatis, ſub apice mucronatis, perſiſtens.* Coroll *nulla.* Filamenta 5, *ſetacea, erecta, diſtantia, lon gitudine corollae.* Germen *ſuperum, obtuſiſſimum rubrum.* Styli 2, *longitudine germinum, recurvati, ſu pra longitudinaliter pubeſcentes.* Stigma *ſimplex.* Fru ctus *ut in congeneribus.* H. V.

*4. TRIANTHEMA *fruticoſa.*

T. fruticoſa monogyna, filamentis alternis antheriferi *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 32. *
Gymnocarpos decandrum. *Forſk. deſcript.* 65. *tab.* 10.
Strauchartige Dreyblume. W.
Habitat in Aegypto *in deſertis* Kahirinis *inque regn* Tunetano. ♄

*5. TRIANTHEMA *humifuſa.*

T. monogyna, foliis lanceolatis, caule fruteſcente tere *Thunb. prod.* 80.
Liegende Dreyblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*6. TRIANTHEMA *anceps.*

T. monogyna, foliis lanceolatis, caule fruteſcente anci piti. *Thunb. prod.* 80.
Zweykantige Dreyblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

7. TRIANTHEMA *decandra.*

T. floribus ſubdecandris digynis. *Mant.* 70.
Zaleia decandra. *Burm. ind.* 110. *t.* 31. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 509.
Zehnfädige Dreyblume. W.
Habitat in India. ⊙ (v. ſ.)

Herba ſtatura Glini. Caulis *herbaceus, diffuſus, alternatim diffuſus.* Folia *oppoſita, petiolata, elliptica, integerrima, glabra.* Petioli *utrinque membranacei.* Bracteae *membranaceae.* Flores *axillares, breviter pedunculati.* Calyx *pentaphyllus, perſiſtens, foliolis ovalibus, margine membranaceis, intus alis exterioribus ſub apice mucronatis.* Corolla *nulla.* Filamenta 10, *rarius* 1, *capillaria, longitudine calycis.* Antherae *ſubrotundae.* Germen *ſuperum, retuſum.* Styli 2, *filiformes, patuli.* Stigmata *obtuſa.* Fructus *ut in congeneribus.*

886. CHRYSOSPLENIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 763.

Cal. 4 ſ. 5-fidus, coloratus. *Cor.* o. *Capſ.* biroſtris, 1-locularis, polyſperma.

1. CHRYSOSPLENIUM *alternifolium.*

C. foliis alternis. *Fl. ſuec.* 316, 365. *It. ſcan.* 16. *Oed. dan. t.* 366. *Hall. helv. n.* 1548. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 29. *Willich. obſ.* 12. *Scop. carn. n.* 487. *Pollich. pal. n.* 400. *Moench. haſſ. n.* 345. *Leers herb. n.* 312. *Doerr. naſſ. p.* 81. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 447.
Chryſoſplenium. *Hort. cliff.* 149. *Roy. lugdb.* 209.
C. foliis amplioribus auriculatis. *Rudb. lapp.* 97. *Fl. lapp.* 151.
C. foliis [illegible] oblongis inſidentibus. [illegible] 146.
Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis inſidentibus. *Raj. hiſt.* 206.
Sedum paluſtre luteum majus, foliis pediculis longis inſidentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 510.
Wechſelblättriges Milzkraut. W.
Habitat in Sueciae, Germaniae, Angliae *opacis humentibus.* ♃ (v. v.)

Flos primarius Decandrus, reliqui Octandri. Phil. Bot. 178.

Flos *etiam primarius plerumque* 4-*fidus, octandrus. Leers. l. c.* Flores *ſemper* 4-*ſidi. Moench. Doerrien.* R.

2. CHRYSOSPLENIUM *oppoſitifolium.*

C. foliis oppoſitis. *Sauv. monſp.* 128. *Hall. helv. n.* 1549. *Oed. dan. t.* 365. *Pollich. pal. n.* 401. *Neck. gallob.* 190. *Leers. herb. n.* 313. *Moench. haſſ. n.* 346. *Sabb. hort.* 2. *t.* 51. *Reich. flor. n.* 985. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 171. *II.* 448.

C. foliis amplioribus auriculatis. *Tournef. inſt.* 146.

Chryſoſplenium l. Saxifraga aurea. *Tabern. hiſt.* 1224.

Saxifraga aurea. *Dod. pempt.* 316. *Lob hiſt.* 336. *ic.* 312.

Saxifraga rotundifolia aurea. *Bauh. pin.* 309.

Saxifraga romanorum. *Dalech. hiſt.* 1114.

Sedum paluſtre luteum, foliis ſubrotundis ſeſſilibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 7.

Alchimilla rotundifolia aurea hirſuta. *Herm. lugdb.* 14.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 510.

Paarblättriges Milzkraut. W.

Habitat in Belgio, Anglia, Canada, *etc. locis umbroſis humentibus.* ♃ (v. v.)

Affinis nimium praecedenti.

Flores *ſemper* 4-*fidi, octandri.* Leers *l. c.* Flos *primarius* 5-*fidus.* Moench *l. c.* R. *Ego nullum certe florem* 5-*fidum et decandrum vidi, licet multa examinaverim ſpecimina.* R.

887. SAXIFRAGA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 764.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 2-roſtris 1-locularis, polyſperma.

1. SAXIFRAGA *Cotyledon.*

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-dentatis, caule paniculato folioſo, calycibus glanduloſo-piloſis. W.

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caule paniculato. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 489. *Mattuſch. ſil. n.* 298. *Kniph. cent.* 1. *n.* 79. *Iacq. Collect.* 4. *p.* 291.

S. foliorum ora cartilaginea ſerrata, petiolis paucifloris, petalis punctatis. *Hall. helv.* 978.

S. foliis lingulatis radicalibus margine cartilagineo acute ſerratis, floribus paniculatis. *Fl. ſuec.* 356, 366.

S. foliorum marginibus cartilagine crenatis. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453.
Sanicula montana crenata, folio longiore, pediculo folioſo. *Pluk. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 1.
Sedum ſerratum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 689. R.
Sedum ſerratum album bicorne, marginibus argenteis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 19. 20.
Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis. *Bauh. pin.* 285.
Cotyledon minor, foliis ſubrotundis ſerratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133. *Hall. helv. n.* 978. *β.*
Saxifraga, ſedi folio, flore albo, multiflorum. *Tournef. inſt.* 252.
S. foliorum ora cartilaginea, caule triplicato ramoſo, petalis immaculatis. *Hall. helv. n.* 977.
Saxifraga Cotyledon. *Fl. dan. t.* 241.
Sedum ſerratum, flore albo, multiflorum. *Dodon. pem. p.* 131.
Saxifraga ſedi folio, pyrenaica, ſerrata. *Tournef. inſt.* 252.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 513.
Nabelkrautartiger Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Europae. ♃ (v. v.)

Panicula *ramoſiſſima multiflora et ſubramoſa pauciflora.* Petala *immaculata et punctata, idque conſtanter. Varietas γ. videtur ſpecie a reliquis differre, ob caulem conſtanter magis compoſitum et petala immaculata. Planta Halleri n.* 977. *videtur adhuc diverſa a norvegica in Fl. dan. t.* 241. *depicta. In Halleri planta ſunt petala linearia baſi ſubciliata, in planta Florae danicae vero ſubrotunda, diſtinguant alii, quid ſit varietas vel ſpecies.* W.

SAXIFRAGA *Aizoon.*

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-dentatis, caule ſimplici racemoſo folioſo, calycibus glabris. W.
S. (*Aizoon*) foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caule ſubracemoſo, calyce glabro. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 411. *Iacq. auſtr.* 5. *t.* 438.
Saxifraga Cotyledon ε. *Sp. pl.* 570.
S. foliis radicalibus in orbem politis, ſerraturis cartilagineis. *Fl. lapp.* 177. *t.* 2. *f.* 2.
S. ſedi folio anguſtiore ſerrato. *Seguier. ver.* 448. *t.* 9. *f.* 1.

Cotyledon pyramidale lato crenato et retuſo folio polyanthos. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 109. *t.* 86.
Traubenblütiger Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Europae. ♃ (v. ſ.)

Differt a praecedente, caule *racemoſo et* calyce glabro. W.

3. SAXIFRAGA *mutata.*

S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis margine cartilagineis repandis caule racemoſo folioſo, calycibus glandulofo-piloſis, petalis lineari-lanceolatis. W.
S. foliis radicalibus aggregatis lingulatis cartilagineo-ſerratis, caule racemoſo folioſo. *Sp. pl.* 570. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 466. *Collect.* 1. *p.* 284. *Curt. mag.* 351.
S. foliorum ora cartilaginea, rariſſime dentata, petali[s] maculoſis. *Hall. helv. n.* 979. *t.* 16. *Seguier. ver.* [3.] *p.* 199. *Burſ. XVI.* 98.
Geum alpinum majus viſcoſum, foliis oblongo-rotundi[s] atrorubentibus et croceis floribus. *Scheuchz. it.* 2. *p.* 124. *Hall.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 514.
Veränderter Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Carnioliae, Italiae. ♃ (v. ſ.)

Hybrida quaſi apparet haec planta S. Cotyledoni af[fi]nis, ſed diſtincta. Folia *Radicalia aggregata, lingulata, cartilagine ſerrata, verſus baſin ciliato-vil[lo]ſa.* Caulis *firmior, ſimplex foliis copioſioribus, ma[]gis viſcidus.* Racemi *alterni, breves.* Flores *quadrupl[o] majores: Petalis lanceolatis, longis, diverſiſſimi[s] croceis nec albis.*

4. SAXIFRAGA *penſylvanica.*

S. foliis oblongo-lanceolatis piloſiuſculis denticulati[s] caule nudo, pedunculis alternis corymboſo-capitati[s] W.
S. foliis lanceolatis denticulatis, caule nudo paniculat[o] floribus ſubcapitatis. *Sp. pl.* 570. *Mill. dict. n.* 8.
S. foliis radicalibus lanceolatis denticulatis, caule ſubnu[]do piloſo ramoſo, floribus confertis capitatis. *Gro[n.] virg.* 49.
S. noveboracenſis. *Cold. noveb.* 105.
S. penſylvanica, floribus muſcoſis racemoſis. *Dill. elt[h.]* 337. *t.* 253. *f.* 328.

Sanicula virginiana alba, folio oblongo mucronato. *Pluk. alm.* 331. *t.* 59. *f.* 1. *et t.* 222. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 515.
Penſylvaniſcher Steinbrech. W.
Habitat in Virginia, Penſylvania, Canada. ♃ (v. ſ.)
Folia *ſuperne et margine, ut caulis, pilis articulatis brevibus tecta.* W.

5. SAXIFRAGA *hieracifolia.*
S. foliis oblongo-lanceolatis glabris repando-dentatis, caule nudo, pedunculis unifloris aggregatis. W.
Saxifraga hieracifolia. *Waldſtein et Kitaibel plantae rariores Hungariae.*
Habichtskrautblättriger Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Carpathicis. ♃ (v. ſ.)
Simillima praecedenti ut primo intuitu vix diverſa videatur, ſed re vera diſtincta, modo florendi. Folia *oblongo-lanceolata repando-dentata utrinque glabra, margine tenuiſſime ciliata, pilis brevibus articulatis.* Caulis *nudus pedalis ſimpliciſſimus teres pubeſcens.* Pedunculi *uniflori quatuor vel ſex aggregati alternatim per intervalla et* bractea *lanceolata ſuffulti.* Flores *ſuperiores ſubſeſſiles magis conferti.* W.

6. SAXIFRAGA *androſacea.*
S. foliis lanceolatis obtuſis piloſis, caule nudo bifloro. *Plum. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 2. *Iacq. auſt. t.* 389.
S. foliis hirſutis, ellipticis et tridentatis, caule paucifloro. *Hall. helv. n.* 984. *opuſc. tot. p.* 292. *t.* 2.
Saxifraga pyrenaica. *Scop. carn. n.* 498. *t.* 16.
Sedum alpinum tertium. *Col. ecphr.* 2. *p.* 66. *t.* 67. *f. ultima.*
Saxifraga alpina, habitu androſaces, villoſa. *Hall. comm. nor.* 1746. *t.* 1. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 515.
Mannsſchildartiger Steinbrech. W.
Habitat in Sibiria, Helvetia, Auſtria, Carniolia. ♃ (v. ſ.)

7. SAXIFRAGA *caeſia.*
S. foliis linearibus perforato-punctatis aggregatis recurvatis, caule multifloro. *Iacq. auſtr. t.* 374. *Scop. carn. n.* 495. *t.* 15.
S. foliis craſſis duris recurvis, ſubtus ſulcatis, baſi ciliatis. *Hall. helv. n.* 982.
Sedi ſpecies minima. *Geſn. faſc.* 24. *t.* 11. *f.* 30.

Saxifraga alpina minima, foliis caeſiis deorſum incurvis, *Tournef. inſt.* 253. *Segu. veron.* 449. *t.* 9. *f.* 2.
Sedum alpinum album, foliis compactis. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 32.
Sedum alpinum minimum, foliis cinereis, flore candido. *Scheuch. alp.* 341, 141. *t.* 21. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 516.
Bläulicher Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaicis, Baldo. ♃ (v. ſ.)

Foliorum *baſis ciliata.*

Varietas *ex alpibus italicis: cujus* Caulis *duplo major, hirſutus, viſcoſus.* Calyces *magni, hirſuti.* Folia *quadruplo majora, patentia, fere S. Cotyledonis, dignoſcenda punctis pertuſis.*

8. SAXIFRAGA *burſeriana.*

S. foliis aggregatis imbricatis triquetris ſubulatis laevibus, caule ſubnudo unifloro. *Syſt. nat.* 303. *Wulf. in Iacq. miſc.* 1. *p.* 152. *t.* 17. *f.* 3. *
S. foliis compactis, plicatis, pungentibus, caule viſcido, paucifloro. *Hall. helv. n.* 983. *Act. helv.* 6. *p.* 10. *n.* 39.
S. alpina, foliis glaucis acutis, monanthos, caule folioſo. *Segu. ver.* 3. *p.* 201. *t.* 5. *f.* 2.
Sedum alpinum ſaxifragae albae flore. *Bauh. pin.* 284. *Burſ.* XVI. 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 517.
Burſerſcher Steinbrech. W.
Habitat in Taurero Raſtadienſi, *montibus* Leſſanenſibus. ♃ (v. ſ.)

Facies *Sedi minoris.* Folia *juniperina, denſe imbricata, acuta, carinata, glabra.* Caulis *vix digitalis, rufeſcenti-hiſpidus ſ. glutinoſus, foliolis* 3 *ſ.* 4, *alternis, linearibus.* Flores *lactei lineis pallidis.*

Varietatem *hujus caulibus* 5-*floris: floribus faſtigiatis e monte Canzo Italiae.* Vandelli.

Saxifraga burſeriana *caule unifloro eſt, et varietas illa, de qua hic loquitur Linnaeus, diſtincta ſpecies eſt caule multifloro; huic addendum* Synonymon Hallerianum. *Iacq. l. c.* R.

9. SAXIFRAGA *ſedoides.*

S. foliis aggregatis alternis oppoſitisque ſublanceolatis,

flore pedunculato. *Sp. pl.* 572. *Iacq. miſc.* 2. *p.* 134. *t.* 21. *f.* 22. *

Saxifraga muſcoides. *Allion. ped. n.* 1528. *t.* 61. *f.* 2.

Saxifraga trichodes. *Scop. carn. n.* 496. *tab.* 15.

S. foliis mollibus ellipticis ſubhirſutis, caule paucifloro. *Hall. helv. n.* 985.

S. alpina minima, foliis lingulatis in orbem actis, flore ochroleuco. *Segu. veron.* 450. *t.* 9. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 517.

Sedumartiger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Tridentinis, Carinthiacis. ♃ (v. f.)

Caulis *ramoſiſſimus, filiformis, depreſſus, apicibus terminatis.* Foliis *aggregatis, linearibus, laevibus.* Pedunculus *ſaepe* 1-*florus, rarius* 2-*ſ.* 3-*florus.* Flos *ſuperus.*

10. SAXIFRAGA *tenella.*

S. foliis lanceolatis mucronatis baſi ciliatis imbricatis, caule nudiuſculo paucifloro, calycibus mucronatis. W.

S. (*tenella*) ſtolonibus proſtratis imbricato-folioſis e latere cauliferis, caulibus erectis ſubnudis paucifloris, foliis lineari-ſubulatis ciliatis ſpinula terminatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 144. *t.* 17. *

Zarter Steinbrech. W.

Habitat in Carinthiae *alpibus* ♃ (v. f.)

Accedit ad ſequentem ſed flores *quadruplo minores,* calyx *mucronatus et* germen *inferum glanduloſo-piloſum.* W.

11. SAXIFRAGA *bryoides.*

S. foliis lanceolatis mucronatis margine cartilagineis ciliatis, caule nudiuſculo paucifloro, calycibus obtuſis. W.

S. foliis ciliatis inflexis imbricatis, caule nudiuſculo paucifloro. *Sp. pl.* 572. *Scop. carn. n.* 497. *t.* 15. *Iacq. miſc.* 2. *p.* 49. *t.* 5. *f.* 1. *

S. foliis lanceolatis, ciliatis, compactis, caule unifloro. *Hall. helv. n.* 969.

S. pyrenaica minima lutea muſco ſimilis. *Tournef. inſt.* 253.

Sedum muſcoſum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 695. *Scheuch. alp.* 142. *t.* 21. *f.* 2.

Sedum ejusdem alpinum quartum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 66. *t.* 67. *f.* 1. 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 518.

Moosartiger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Auſtriacis. ♃ (v. ſ.)

Folia *ſerrata, baſi ciliata, ſerraturis ſaepe apice calloſis.* Folia radicalia *in orbem digeſta*; caulina 5 ſ. 6, *alterna, tenera.* Caulis *pubeſcens.* Flores 1 ſ. *pauci*: Petala *flava maculis fulvis.*

12. SAXIFRAGA *bronchialis.*

S. foliis imbricatis ſubulatis ciliatis ſpinoſis, caule ſubnudo multifloro. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 164. *t.* 65. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 519.

Vielblütiger Steinbrech. W.

Habitat in Sibiria.

Stolones *oblongi confertim imbricati*: *Foliis planis, ſubulatis, mucronato-ſpinoſis, ſpinoſo-ciliatis.* Caulis *altus, nudiuſculus*: *foliis aliquot minimis mucronatis margine laevibus.* Panicula *parva.*

13. SAXIFRAGA *ſtellaris.*

S. foliis ſerratis, caule nudo ramoſo, petalis acuminatis. *Oed. dan. t.* 23. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 163. *n.* 75. *Scop. carn. n.* 492. *t.* 13. *Iacq. Collect.* 1. *p.* 202. *t.* 13. *

S. foliis rhomboideis, acute ſerratis, caule nudo ramoſo. *Hall. helv. n.* 973.

S. foliis lanceolatis dentato-ſerratis, caule nudo ſimplici. *Fl. ſuec.* 335, 367.

S. caule nudo ſimplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. *Fl. lapp.* 175.

Sanicula myoſotis, floribus albicantibus fere umbellatis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 58. *f.* 2. *et t.* 222. *f.* 4.

Sedum montanum hirſutum, mucronato et dentato folio, flore albo guttato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *ſ.* 1. *t.* 9. *f.* 13.

Sanicula alpina aliquatenus affinis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 708. R.

Sanicula montana minor. *Cluſ. pann.* 441. *Haller.*

β. *comoſa* panicula foliacea.

Saxifraga. *Fl. lapp.* 175. *t.* 2. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 5[illegible]

Sternförmiger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Spitzbergenſibus, Lapponicis, Helveticis, Styriacis, Weſtmorlandicis. ♃ (v. ſ.

Calyx *reflexus.*

14. SAXIFRAGA *craſſifolia.*

S. foliis ovalibus retuſis obſolete ſerratis petiolaris, caule

nudo, panicula conglomerata. *Linn. dec.* 2. *p.* 27. *t.* 14.

S. foliis ovalibus crenulatis, caulibus nudis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 166. *t.* 66.

Geum ſaxatile rotundifolium majus flore purpureo. *Amm. ruth. n.* 90.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 520.

Dickblättriger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Sibiriae. ♃ (v. v.)

Radix *craſſitie fere digiti.* Folia *bina, palmaria, coriacea, ovalia, retuſa, repando-crenata, glabra, foliatione involuta.* Gemmae *maximae foliolis* 2 ſ. 3, *ovatis, concavis, quorum unum ſcapo adhaerens attollitur.* Scapus *nudus, pedalis, craſſitie digiti, ſubpaniculatus ramis pedatis.* Flores *ſuperi ſubnutantes, campanulati: petala obovata, ruberrima.*

15. SAXIFRAGA *nivalis.*

S. foliis obovatis crenatis ſubſeſſilibus, caule nudo, floribus congeſtis. *Mill. dict. n.* 9. *Gunn. norv. n.* 545. *Lightf. ſcot.* 1. *p.* 221. *Fl. dan. t.* 28. *t.* 12. *Vahl. in Act. Soc. Hiſt. Nat. Haf.* 2. 1. *p.* 52. *

S. foliis ſubovatis crenatis, caule nudo, floribus capitatis. *Fl. ſuec.* 354, 368.

S. caule nudo ſimplici, foliis elliptico-ſubrotundis crenatis, floribus capitatis. *Fl. lapp.* 176. *t.* 2. *f.* 5. 6.

S. foliis cordato-ovalibus crenatis, corolla alba, caule hirſuto aphyllo. *Gron. virg.* 160.

S. foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus compactis. *Raj. angl.* 3. *p.* 354. *t.* 16. *f.* 1.

Sempervivum minus dentatum. *Mart. ſpitzb.* 43. *t. F. f. A. Pluk. phyt.* 222. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 520.

Schnee Steinbrech. W.

Habitat in ſummis alpibus Spitzbergenſibus, Lapponicis, Arvonicis, Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)

*16. SAXIFRAGA *Bellardi.*

S. acaulis, foliis ſubrotundis repandis flore ſeſſili. W.

S. (*Bellardi*) acaulis foliis cuneiformibus trilobis et quinquelobis. *Allion. ped. n.* 1536. *t.* 88. *f.* 1. *

Kleinſter Steinbrech. W.

Habitat in rupibus humidis Pedemontanis. ♃

*17. SAXIFRAGA *davurica.*

S. foliis cuneiformi-rhombeis apice dentatis glabris petiolatis, caule nudo. W.

Saxifraga punctata. *Pall. itin. 3. app. n. 91. t. P. fig. 2.* *
Davuriſcher Steinbrech. W.
Habitat in ſummis alpibus Davuriae *ſub nive.* ♃

18. SAXIFRAGA *ſarmentoſa.*

S. foliis ſubrotundis dentatis piloſis, ſtolonibus reptantibus, petalis duobus elongatis. *Ait. Kew. 2. p. 79.*

S. (*ſarmentoſa*) foliis radicalibus ſubrotundis cordatis crenatis, ſarmentis axillaribus radicantibus, corolla irregulari, racemo compoſito. *Lin. ſuppl. 240. Schreb. monog. Dionaeae. p. 16. t. 2. 3.*

S. foliis inciſo-lobatis piloſis, caule ſubnudo erecto paniculato. *Thunb. jap. 182.* *

S. (*ſtolonifera*) foliis ſubrotundis baſi cordatis crenatis ſarmentis axillaribus, corollis inaequalibus. *Jacq. ic. rar. 1. t. 80. Miſc. 2. p. 327.* * *Meerb. ic. 23.*

S. (*ligulata*) foliis ſubrotundis ſubtus papilloſis, panicula ſecunda, petalis binis inferioribus longiſſimis. *Murr. in comment. goett. 1781. p. 26. t. 1.*

Schkika. *Kaempf. am. 870.*
Wuchernder Steinbrech. W.
Habitat in China, Japonia. ♃ (v. v.)

Statura *plantae omnino Heucherae.* Folia *radicalia petiolata cordato-ſuborbiculata piloſa crenata lobulis obtuſis, oleracea, ſupra venis albis, ſubtus hepatici coloris.* Petioli *teretiuſculi folio longiores.* Stipulae *nullae.* Caulis *herbaceus teres ſesquipedalis fere aphyllus, uti tota herba pilis extantibus pubeſcens, totus racemus compoſitus, racemis partialibus ante antheſin apice cernuis.* Sarmenta *ramoſa e ſingulis foliorum radicalium alis longiſſima copioſa radicantia propaginibus.* Petala *tria minora albida rubro inquinata; duo majora alba.* Nectarium *luteum.* Stamina *alba ſuperne craſſiora longitudine minorum petalorum.* Styli *longitudine minorum petalorum.* Stamina *duo defloreta reflectuntur pone corollam.*

19. SAXIFRAGA *punctata.*

S. foliis ſubrotundis dentatis longius petiolatis, caule nudo. *Sp. pl. 574. Mill. dict. n. 7.*

Sedum bicorne ſerratum, pallidiore folio rotundiore, floribus punctatis. *Moriſ. hiſt. 3. p. 478. ſ. 12. t. 9. f. 17.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p. 521.
Punctirter Steinbrech. W.
Habitat in Sibiria. ♃ *Georgi it 1. p. 215.*

Folia *ſubrotunda, dentibus inciſa, ut fere lobata absque ora cartilaginea, minime retuſa, dentibus acutis; Petioli laeves foliis triplo longiores, ſuperne ſenſim dilatati in folium.* Flores *minores quam in S. Geo, fere inferi.*

20. SAXIFRAGA *umbroſa.*

S. foliis obovatis ſubretuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Sp. pl.* 574. *Mill. ic.* 141. *f.* 2.

S. foliis cuneiformibus retuſis radicalibus ſinuato-ſerratis margine acutis, caule paniculato. *Hort. upſ.* 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 522.

Schattenliebender Steinbrech. W.

Habitat in montibus apud Cantanbros. ♃ (v. v.)

Affinis nimium S. Geo; Folia baſi minime cordata, crenis angulatis; petiolis ciliato-villoſis. Flores *inferi.*

21. SAXIFRAGA *hirſuta.*

S. foliis cordato-ovalibus retuſis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Mill. dict. n.* 6.

Geum folio circinato acute crenato, piſtillo floris rubro. *Magn. hort.* 87. *t.* 87.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 522.

Haarigſtieliger Steinbrech. W.

Habitat in Pyrenaeis. ♃ (v. v.)

Affinis nimium S. Geo, ſed folia ovalia, nec reniformia. Calyx *reflexus.*

22. SAXIFRAGA *cuneifolia.*

S. foliis cuneiformibus obtuſiſſimis repandis, caule nudo paniculato. *Sp. pl.* 574. *Scop. carn. n.* 490. *t.* 13.

Saxifraga punctata. *Gunn. norv. n.* 1076. *Act. Haf.* 10. *p.* 445. *t.* 3. *f.* 10.

S. foliis petiolatis obtuſis, caule fragili nudo ramoſo. *Hall. helv. n.* 974.

Cotyledon altera olim matthioli. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 684.

Cotyledon aut Sedi ſpecies quaedam. *Geſn. faſc.* 19. *t.* 12. *f.* 37. *bene.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 523.

Keilblättriger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Styriae, Gotthardo. *Gerard.* ♃ (v. ſ.)

Simillima S. umbroſae, ſed Foliorum margo non crenatus, at obtuſiſſime repandus, ut et folia longe minora. Calyx *reflexus.*

23. SAXIFRAGA *Geum.*

S. foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *Pall. it.* 2. *p.* 35. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 491.

Geum folio ſubrotundo minori, piſtillo floris rubro. *Magn. hort.* 88. *t.* 88.

Sanicula montana rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 243.

Sedum montanum rotundifolium minus album non guttatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 478. *f.* 12. *t.* 9. *f.* 12.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 523.

Nierenblättriger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Europae. ♃ (v. v.)

Calyx *reflexus.*

** *Foliis indiviſis, caule folioſo.*

24. SAXIFRAGA *oppoſitifolia.*

S. foliis caulinis ovatis oppoſitis imbricatis: ſummis ciliatis. *Fl. ſuec.* 359, 369. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 168. *Mill. dict n.* 11. *Gunn. norv.* 53. *Fl. dan. t.* 34. *Hohenwarth et Reiner it.* 1. *p.* 135. *t.* 3. * *Vahl. in Act. Hiſt. Nat.* 2. 1. *p.* 51. *Allion. pedem. n.* 1529. *t.* 21. *f.* 3.

S. caulibus repentibus ſurculiferis, foliis obovatis margine leproſo-cartilagineis ciliatisque, ſurculorum quadrifariam imbricatis, pedunculorum oppoſitis. *Wulf. in Iacq. Collect.* 2. *p.* 286. *

S. foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 179. *t.* 2. *f.* 1.

S. caule repente, foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis, ciliatis. *Hall. helv. n.* 980.

Sedum alpinum ericoides purpuraſcens. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 132. *Moriſ. hiſt.* 1. *p.* 480. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 36.

Sedum montanum erioides. *Bauh. prodr.* 132. *Hall.* R.

β. Saxifraga biflora. *Allion. ped. n.* 1530. *t.* 21. *f.* 1.

S. (*biflora*) caulibus repentibus ſurculiferis, foliis omnibus oppoſitis obovatis ciliatis, ſurculorum rariter imbricatis, pedunculis ſubtrifloris, calycinis ſegmentis ovato-obtuſis, petalis lanceolatis. *Hohenwarth et Reiner. it.* 1. *p.* 138. *t.* 2. *f.* 2. *

S. foliis imbricatis ovatis, caulibus reptantibus bifloris. *Hall. helv. n.* 981.

γ. Saxifraga purpurea. *Allion. ped. n.* 1531. *t.* 21. *f.* 2.

S. (*retuſa*) propaginibus proſtratis, foliis oppoſitis quadrifariam imbricatis punctatis triquetris acutis planoexſtantibus, floribus terminalibus geminatis. *Gouan. illuſt.* 28. *t.* 18. *f.* 1.

S. alpina ericoides flore purpuraſcente. *Tournef. inſt.* 253.
Sedum alpinum ericoides coeruleum. *Bauh. prodr.* 132. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 694.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 524.
Paarblättriger Steinbrech. W.
Habitat in rupibus alpium Spitzbergenſium, Lapponicarum, Pyrenaicarum, Helveticarum. ♃ (v. ſ.)
Caules *filiformes, dependentes, repentes.* Folia *ovata, quadrifariam imbricata, oppoſita, ſeſſilia, ciliata.* Flos *terminalis, ſolitarius, ſeſſilis.*
Varietas *ſterilis Geſn. faſc.* 26. *t.* 9. *f.* 3.

25. SAXIFRAGA *aſpera.*

S. foliis caulinis lanceolatis alternis ciliatis, caulibus procumbentibus. *Ger. prov.* 423. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 44. *t. app.* 31. *Mill. dict. n.* 14.
S. foliis duris, ciliatis, caule ramoſo, paucifloro. *Hall. helv. n.* 970.
S. ſedi foliis crenatis aſperis T. *Scheuch. it.* 2. *p.* 140. *t.* 20. *f.* 3.
Sedum alpinum, foliis crenatis aſperis. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 132. *Geſn. faſc.* 22. *t.* 6. *f.* 27.
Sedum alpinum hiſpidum fere ſpinoſum, flore pallido. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 695. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 25.
Sedum minimum alpinum villoſum alterum. *Park. theatr.* 738.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 525.
Scharfer Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Helveticis. ♃ (v. ſ.)
Flores *ſuperi*, 3 *ſ.* 4. Petala *albida ungue luteo, apice mucronata. Haller.*

26. SAXIFRAGA *Hirculus.*

S. foliis caulinis lanceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. *Fl. ſuec. n.* 370. *Flor. dan. t.* 200. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 165. *t.* 65. *f.* 3. *Weber ſpicil. fl. goett. p.* 13. *Hoffm. germ.* 144. *Roth. germ. I.* 184. *II.* 468.
S. foliis ellipticis, caule unifloro. *Hall. helv. n.* 972. *t.* 11.
Geum paluſtre luteum bicorne, nardi celticae ſimilis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477.
Chamae Ciſtus friſicus, foliis nardi celticae. *Bauh. pin.* 466.

Hirculus qui Chamae Ciſti genus. *Cluſ. cur.* 5.
Saxifraga anguſtifolia autumnalis, flore luteo guttato. *Breyn. cent.* 106. *t.* 48.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 526.
Ciſtenblütiger Steinbrech. W.
Habitat in Suecia, Helvetia, Lapponia, Sibiria, Germania. ♃ (v. ſ.)

Caulis *purpureus, ſimplex, ſaepe biflorus.* Pedunculi *pubeſcentes.* Calyx *reflexus.* Folia *non ciliata.* Petala *nervoſa, flava punctis fulvis.*

27. SAXIFRAGA *Aizoides.*

S. foliis caulinis lineari-ſubulatis ſparſis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. *Willich. illuſtr. n.* 25. *Gunn. norv. n.* 541. *Flor. dan. t.* 72.
S. foliis linearibus ſparſis glabris. *Fl. ſuec.* 357, 371.
S. foliis ſubulatis ſparſis. *Fl. lapp.* 178.
Sedum alpinum, flore pallido. *Bauh. pin.* 284. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 3.
Sedum minus VI. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 60.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 526.
Immergrüner Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Lapponicis, Styriacis, Weſtmorlandicis, Baldo. ♃ (v. ſ.)

Flores *magis ſuperi, quam inferi.* Calyx *patens, longitudine corollae.* Petala *flava punctis croceis.*

28. SAXIFRAGA *autumnalis.*

S. foliis caulinis linearibus alternis ciliatis: radicalibus aggregatis. *Mill. dict. n.* 10. *Iacq. vind.* 37. *Scop. carn. n.* 493. *t.* 14.
S. foliis ellipticis ciliatis, caule ſimplici, folioſo, paucifloro. *Hall. helv. n.* 971.
Sedum alpinum, floribus luteis maculoſis. *Bauh. pin.* 284.
Sedum anguſtifolium autumnale, flore luteo guttato. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 477. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 527.
Herbſt Steinbrech. W.
Habitat in humentibus Boruſſiae, Helvetiae. ♃ (v. ſ.)

Calyx *corolla longe brevior et viridis eſt.* Flores *inferi.*

Varietas *S. aizoidis ex mente Halleri et Iacquini, ſed in hac folia mucronata, quod non in praecedente. Variat S. autumnalis floribus purpureis.* W.

29. SAXIFRAGA *rotundifolia.*
S. foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis, caule paniculato. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 162. *Mill. dict. n.* 5. *et ic. t.* 141. *Scop. carn.* 2. *n.* 488.
S. foliis reniformibus, acute ſerratis, hirſutis, petiolatis, caule ramoſo. *Hall. helv. n.* 975.
S. foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoſo folioſo. *Hort. cliff.* 167. *Roy. lugdb.* 453.
Sanicula montana rotundifolia major. *Bauh. pin.* 243.
Sanicula alpina. *Cam. epit.* 764. *Geſn. faſc.* 19. *t.* 10. *f.* 25.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 528.
Rundblättriger Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Auſtriacis. ♃ (v. v.)
Flores inferi.

*** *Foliis lobatis, caulibus erectis.*

30. SAXIFRAGA *granulata.*
S. foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. *Hort. cliff.* 167. *Fl. ſuec.* 350, 372. *Mat. med.* 116. *Roy. lugdb.* 453. *Pollich. pal. n.* 402. *Flor. dan. t.* 514. *Blackw. t.* 56. *Ludw. ect. t.* 120. *Kniph. cent.* 1. *n.* 80. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 184. *II,* 468.
S. foliis radicalibus reniformibus, obtuſe dentatis, caulinis palmatis. *Hall. helv. n.* 976.
S. rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.
S. alba. *Dod. pempt.* 316.
Saxifraga IV. *Cam. epit.* 719.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 528.
Körniger Steinbrech. W.
Habitat in Europae *apricis.* ♃ (v. v.)
Germen *inferum.*

31. SAXIFRAGA *bulbifera.*
S. foliis palmato-lobatis: caulinis ſeſſilibus, caule ramoſo bulbifero. *Sp. pl.* 577. *Gunn. norv. n.* 1006. *Fl. dan. t.* 390.
S. bulboſa altera bulbifera montana. *Col. ecphr.* 1. *p.* 318. *t.* 317.
S. ad folia bulbos gerens. *Bauh. pin.* 309.
Sedum bicorne rotundifolium erectum, radice granulata, et ad caulem tubercula proferens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 474. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 24.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 529.

[redacted]




IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

Zwiebelntragender Steinbrech. W.
Habitat in Italiae *pratis ſaxoſis umbroſis, inque* Norvegia. ♃ (v. ſ.)
Germen *inferum.*
Varietas potius praecedentis, quam ſpecies. Segu. ver. 3. *p.* 207.

32. **SAXIFRAGA** *cernua.*
S. foliis caulinis palmatis petiolatis, caule ſimpliciſſimo unifloro bulbifero. *Oed. dan. t.* 22. *Gunn. norv. n.* 528. *t.* 8. *f.* 2.
S. foliis palmatis, caule ſimplici unifloro. *Fl. lapp.* 172. *t.* 2. *f.* 4. *Hort. cliff.* 167. *Fl. ſuec.* 351. 373.
β. S. foliis reniformibus acutis digitatis, caule ramoſo folioſo. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 163. *n.* 74.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 530.
Hängender Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Lapponicis *frequens.* ♃ (v. ſ.)
Flos *parum nutat.* Folia *caulina glabra, magis palmata et germen ſupra receptaculum, magis quam in antecedente, ut diſtinctiſſima a priore planta. Videtur tamen affinis S. ſibiricae, licet et ab hac diſtincta.* Variat *caule ramoſo.*

33. **SAXIFRAGA** *rivularis.*
S. foliis caulinis palmatis: ſummo florali ovato, caule ſimplici ſubbifloro. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 170. *Gunn. norv. n.* 479. *Flor. dan. t.* 118.
S. foliis radicalibus quinquelobis, florali ovato. *Fl. lapp.* 174. *t.* 2. *f.* 7. *Fl. ſuec.* 352, 374.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 530.
Bach Steinbrech. W.
Habitat ad alpium Lapponicarum *latera et rivulos.* ⊙ (v. ſ.)

34. **SAXIFRAGA** *geranioides.*
S. foliis radicalibus reniformibus quinquelobis multifidis, caulinis linearibus, caule ſubnudo ramoſo. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271.* *Gmel. ſib.* 4. *p.* 171. *n.* 83.
S. foliis radicalibus palmato-quinquelobis, trifidis, lateralibus coaleſcentibus, rameis ſubulatis, laciniis calycinis dilatatis. *Gouan. illuſtr.* 28. *t.* 18. *f.* 2. R
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 531.
Storchſchnabelartiger Steinbrech. W.
Habitat in Pyrenaeis. *Burſ. XVI.* 86. ♃ (v. ſ.)

Abſoluta floreſcentia Calycis *folia elongantur fructu fere longiora. Gouan.* Flores *albi.*

35. SAXIFRAGA *ajugifolia.*

S. foliis radicalibus palmato-quinquepartitis, caulinis linearibus indiviſis, caulibus adſcendentibus multiflo-ris. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 531.

Günſelblättriger Steinbrech. W.

Habitat in Galloprovinciae *montibus.*

Folia *ad radicem palmata quinque partita, lobis ovato-lanceolatis, petiolata.* Caules *adſcendentes filiformes, foliis duobus vel tribus linearibus acutis indiviſis.* Flores *in ſummo caule tres ad quinque pedunculati.* Stolones *antequam folia emittat hirſuti.* Amoen. acad.

36. SAXIFRAGA *ſibirica.*

S. foliis reniformibus palmatis piloſis, caule pedunculisque filiformibus. *Sp. pl.* 577.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 532.

Sibiriſcher Steinbrech. W.

Habitat in Sibiria.

Radiculae *capillares.* Folia *radicalia petiolata, reniformia, ſeptemloba ſ. palmata: lobis ovatis, pilis raris adſperſa, petiolis hirſutis.* Caulis *filiformis, adſcendens, ſemipedalis, debilis, Foliis* 2 *ſ.* 3. *ſeſſilibus, palmatis.* Pedunculi *terminales et laterales longiſſimi, filiformes, bifidi, nudi.* Flos *majuſculus, albus, inferus.*

37. SAXIFRAGA *rupeſtris.* W.

S. foliis caulinis cuneiformibus trilobis dentatis glanduloſo-hirſutis, pedunculis unifloris longiſſimis, caule adſcendente baſi ramoſo. W.

S. (*petraea*) foliis petiolatis palmato-tripartitis, laciniis ſubtrifidis, caule flaccido ramoſiſſimo decumbente, pedunculis longiſſimis monofloris, petalis emarginatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 200. * *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 81. *Hoffm. germ.* 145.

Saxifraga geranioides. *Hoſt. ſynop.* 231.

Felſen Steinbrech. W.

Habitat in Carinthiae *alpibus.* ⊙ (v. ſ.)

Planta foliorum pedunculorum ut et petalorum forma a S. geranioide et adſcendente diſtinctiſſima, etiam a S. tridactylite et petraea, licet forma foliorum et peta-

lorum quodammodo conveniat, diverſa, ut ex deſcriptione bona Wulfenii et icone optima Iacquini patet. W.

38. SAXIFRAGA *Tridactylites.*

S. foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. *Fl. ſuec.* 353, 375. *Gunn. norv. n.* 544. *Scop. carn. n.* 550. *Pollich. pal. n.* 403. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 184. *II.* 469.

S. foliis trifidis baſi anguſtis, caule erecto. *Roy. lugdb.* 457. *Sauv. monſp.* 208.

S. foliis omnibus trilobis baſi anguſtis, caule erecto. *Fl. lapp.* 173. *Hort. cliff.* 168.

S. foliis petiolatis, trilobatis, caule erecto, ramoſo et folioſo. *Hall. helv. n.* 986.

Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285.

Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113. tertia. *Tabern.* 805.

Paronyohia rutaceo folio. *Blackw. t.* 212.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 532.

Dreytheiliger Steinbrech. W.

Habitat in Europae *arenoſis, et alpibus.* ⊙ (v. v.)

39. SAXIFRAGA *petraea.*

S. foliis cuneiformibus, radicalibus integris tridentatisque, caulinis quinquedentatis, ſuperioribus trifidis, pedunculis ſubtrifloris. *Vahl. in Act. Hiſt. Nat. Haf.* 2. 1. *p.* 10. *

S. foliis caulinis palmato-tripartitis: laciniis ſubtrifidis, caule ramoſiſſimo laxo. *Sp. pl.* 578. *Gunn. norv. n.* 427. *t.* 9. *f.* 1-3. *Fl. dan. t.* 680.

Saxifraga tridactylites *β. Sp. pl. ed.* 1. *p.* 404. *Fl. ſuec.* 353, 375. *Fl. lapp.* 173.

S. (*adſcendens*) caule erecto firmo foliisque ſubcoriaceis cuneiformibus, apice tri aut quinquedentatis villoſo-viſcidis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 197. *t.* 11. *et* 12. *f.* 1. 2. *

Saxifraga adſcendens. *Allion. pedem. n.* 1537. *t.* 22. *f.* 3.

Saxifraga hypnoides. *Scop. carn. n.* 499. *t.* 16.

S. (*Scopolii*) foliis inferioribus integris, caulinis trifidis, caule ſuberecto. *Villars proſp.* 47.

S. foliis palmatis, caule denſe folioſo et florigero. *Allion. ſpec. ped. p.* 17. *t.* 3. *f.* 1.

S. caule folioſo multifloro, foliis palmatis hirſutis. *Hall. helv. n.* 987.

S. pyrenaica tridactylites latifolia. *Tournef. inſt.* 253.

Sedum tridactylites alpinum caule folioſo. *Bauh. pin.* 284.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 533.
Klippen Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Lapponiae, Norvegiae, Helvetiae, Salisburgi, Sabaudiae, Carinthiae. ☉ (v. ſ.)
Affinis nimium S. tridactyliti, etiam viſcida, ſed Caulis ramoſiſſimus. Folia lata, palmata, tripartita, inciſa. Corollae quadruplo majores.

40. SAXIFRAGA *adſcendens.*

S. foliis palmato-tripartitis, laciniis ſubtrifidis, caule ramoſo adſcendente. *Vahl. in Act. Hiſt. Nat. Haf.* 2. 1. *p.* 12.*
S. foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule adſcendente ſubvilloſo. *Sp. pl.* 579.
S. (*petraea*) foliis radicalibus palmato-quinquepartitis, lobis lateralibus coaleſcentibus multifidis, caule paniculato laxo. *Gouan. illuſt.* 29. *t.* 17. *f.* 3. *mala.*
Saxifraga decipiens. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 31. *Hoffm. germ.* 145.
S. caule folioſo ramoſo, foliis glabris palmatis. *Hall. helv. n.* 990.
S. alba petraea. *Pon. bald. in Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 337.
Sedum tridactylites alpinum majus album 1. *Bauh. prod.* 131. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 28.
Sedum tridactylites alpinum majus. 3. *Bauh. prodr.* 131. *Burſ. XVI.* 89.
Sanicula aizoides alpina trifido folio major alba. *Pluk. alm.* 331. *t.* 222. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 534.
Aufwärtsſteigender Steinbrech. W.
Habitat in Pyrenaeis, Baldo, Taurero Raſtadienſi, Hercynia. ♃ (v. v.)

Planta *viſcoſa, undique folioſa, caulibus floriferis tantum e ſummitate, nec ut S. petraeae (cui proxima) undique ramoſiſſima in faſciculum.*

Stolones *in hac ſpecie ſemper obſervavi ut in S. hypnoide, quas nunquam in petraea vidi; praeterea multo robuſtior,* floribus *copioſioribus majoribus, plerumque brevius pedunculatis.* Vahl. l. c.

Figura Gouani non optima vix a S. geranioide diverſa. Ceterum haec valde S. hypnoidi affinis. W.

***41. SAXIFRAGA** *moſchata.*

S. foliis radicalibus aggregatis integris trifidisque acutis linearibus, caule viſcoſo ſubracemoſo, petalis calyci aequalibus. W.

S. (*moſchata*) foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque una cum caule glutinoſis hirſutis, floribus longe pedunculatis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 414. *Wulfen in Iacq. miſc.* 2. *p.* 128. *t.* 21. *f.* 21. *

S. (*exarata*) foliis palmato-trifidis, ſuperne lineatis hirſutis, caule adſcendente multifloro petalis trinervoſis. *Villars proſp.* 47. *Allion. ped. n.* 1539. *t.* 88. *f.* 2.

Sedulum quod Moſchatella alpina lutea vocari poteſt. *Geſn. faſc.* 25. *t.* 6. *f.* 31.

Tridactylites alpina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 754.

Biſamduftiger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Carinthiacis, Salisburgenſibus, Sabaudicis *et* Delphinatus. ♃ (v. ſ.)

***42. SAXIFRAGA** *muſcoides.*

S. foliis radicalibus aggregatis integris trifidisque oblongis obtuſis, caule filiformi ſubbifloro, petalis vix calyce longioribus. W.

S. (*muſcoides*) foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, ſcapo gracili ſuberecto paucifloro, floribus citrinis ſubſeſſilibus. *Wulfen in Iacq. miſc.* 2. *p.* 125. *

Saxifraga ceſpitoſa. *Scop. carn. n.* 494. *t.* 14.

S. foliis integris et trifidis, caule ſubnudo paucifloro. *Hall. helv. n.* 988.

S. pyrenaica foliis partim integris, partim trifidis. *Hall. opuſc.* 292. *tab.* 1. *Segu. veron.* 3. *p.* 205. *et* 1. *p.* 451. *t.* 9. *f.* 4.

Lebermoosartiger Steinbrech. W.

Habitat in alpibus Carnioliae, Helvetiae, *inque* Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

A. S. caeſpitoſa licet ſimillima diſtincta: foliis *tenuioribus*, caule *filiformi et* parvitate *floris*. W.

43. SAXIFRAGA *caeſpitoſa.*

S. foliis radicalibus aggregatis linearibus obtuſis trifidis incisis, caule erecto ſubmultifloro, petalis calyce duplo longioribus. W.

S. foliis radicalibus aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto, ſubnudo ſubbifloro. *Fl. ſuec.* 2. *n.*

376. *Oed. dan. t.* 71. *Gunn. norv. n.* 1047. *t.* 7. *f.* 3. 4. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 290. *
S. foliis petiolatis trifidis, caule ſubfolioſo viſcido. *Hall. helv. n.* 989.
Sedum tridactylites alpinum minus. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 131.
β. S. (*groenlandica*) foliis caulinis palmato-multifidis ſparſis: laciniis acutis, caule erecto. *Sp. pl.* 578. *Gunn. norv. n.* 689. *t.* 7. *f.* 1.
S. tridactylites groenlandica, caulibus valde folioſis. *Dill. elth.* 337. *t.* 353. *f.* 3. 9.
γ. S. (*pedemontana*) caule erecto ſubnudo, foliis trilobis et tridentatis, caulinis palmatis. *Allion. pedem. n.* 1540. *t.* 21. *f.* 5. 6. *
Saxifraga hypnoides. *Allion. pedem. n.* 1538. *t.* 21. *f.* 4. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *p.* 534, 535.
Raſen Steinbrech. W.
Habitat in ſummis Europae *alpibus, inque* Groenlandia. ♃ (v. ſ.)

44. SAXIFRAGA *tricuſpidata.*
S. foliis radicalibus aggregatis cuneiformibus ciliatis acute tridentatis, caule adſcendente racemoſo, petalis lanceolatis calyce triplo longioribus. W.
S. foliis lanceolatis, radicalibus congeſtis tricuſpidatis, caulibus adſcendentibus multifloris. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 522.
S. foliis radicalibus denſiſſime imbricatis concavo-cuneiformibus ciliatis tricuſpidatis, caule adſcendente nudiuſculo paniculato. *Rottb. Act. Hafn.* 10. *p.* 446. *t.* 6. *Fl. dan. t.* 976. *Gunn. norv. n.* 1046.
Dreyſpitziger Steinbrech. W.
Habitat in Groenlandia. ♃
Accedit parum, quoad foliorum formam, ad praecedentem, ſed florem fert S. Hirculi. W.

**** *Foliis lobatis; Caulibus procumbentibus.*

45. SAXIFRAGA *Cymbalaria.*
S. foliis caulinis cordatis trilobis integrisque, caulibus procumbentibus. *Sp. pl.* 579.
S. exigua, foliis cymbalariae. *Buxb. cent.* 2. *p.* 40. *t.* 45. *f.* 2.
Geum orientale Cymbalariae folio molli et glabro, flore magno albo. *Tournef. Cor.* 18. *itin. ed. germ.* 3. *p.* 348. *t.* 32. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 536.
Cymbelblättriger Steinbrech. W.
Habitat in Oriente.

46. SAXIFRAGA *hederacea.*
S. foliis caulinis ovatis lobatis, caule filiformi flaccido *Sp. pl.* 579.
S. cretica annua minima, hederaceo folio. *Tournef. cor.* 18
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 536.
Epheublättriger Steinbrech. W.
Habitat in Creta. ☉

*47. SAXIFRAGA *orientalis.*
S. foliis ſubrotundis quinquelobis caule ramoſiſſimo procumbente. W.
S. foliis radicalibus rameisque quinquelobis ſeptemlobisve ſummis integerrimis bifidisve, caule ramoſiſſimo basi procumbente. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 9. *t.* 34. *
Geum orientale rotundifolium ſupinum flore aureo. *Tournef. cor.* 18.
Orientaliſcher Steinbrech. W.
Habitat in Oriente.
Similis S. Cymbalariae, tamen diverſa; an vero ſatis diſtincta a S. hederacea? W.

*48. SAXIFRAGA *cuneata.* W.
S. foliis inferioribus petiolatis cuneiformibus quinquelobis, caulinis ſeſſilibus lanceolatis, caule adſcendente paniculato. W.
S. (*cuneifolia*) foliis cuneatis quinquelobis, caulinis lanceolatis, floribus paniculatis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 25. 248. *
Dreyeckiger Steinbrech. W.
Habitat in Hiſpaniae *montibus frigidis prope Caſtell fort.* ♃
Corolla *alba.* Germen *inferum.* W.

49. SAXIFRAGA *hypnoides.*
S. foliis caulinis linearibus integris trifidisve, ſtolonibus procumbentibus, caule erecto nudiuſculo. *Oed. dan. t.* 348. *Mill. dict. n.* 12.
S. procumbens, foliis linearibus integris trifidisque. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 453. *Sauv. monſp.* 208. *Gort. gelr.* 248.
Sedum alpinum trifido folio. *Bauh. pin.* 284. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 479. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 26.
Sedum alpinum VII. *Cluſ. pann. p.* 491. R.

β. Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidis et quinquefidis. *Roy. lugdb.* 454. *Sauv. monſp.* 208.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 586.
Liegender Steinbrech. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaicis, Weſtmorlandicis. ♃ (v. ſ.)
Planta *viſcoſa.* Folia *longius petiolata.* Stolonibus *gemmiferis variat.*

888. TIARELLA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 765.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta: petalis integris. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis: valvula altera majore.

1. TIARELLA *cordifolia.*
T. foliis cordatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *Mill. dict. n.* 1.
Mitella nudo ſcapo. *Hort. cliff.* 167.* *Roy. lugdb.* 459. *Gron. virg.* 160.
Cortuſa americana, flore ſpicato, petalis integris. *Herm. par.* 129. *t.* 129.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 539.
Herzblättriger Spitzhut. W.
Habitat in America *et* Aſia *ſeptentrionali.* ♃

2. TIARELLA *trifoliata.*
T. foliis ternatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 17. *Mill. dict. n.* 2.
Mitella foliis ternatis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 351.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 540.
Dreyblättriger Spitzhut. W.
Habitat in Aſia *boreali. G. Demidoff.* ♃

889. MITELLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 766.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala, calyci inſerta: petalis pinnatifidis. *Capſ.* 1-locularis, 2-valvis: valvulis aequalibus.

1. MITELLA *diphylla.*
M. foliis cordatis ſubtrilobis dentatis, ſcapo diphyllo. W.
M. ſcapo diphyllo. *Hort. cliff.* 167.* *Roy. lugdb.* 459. *Cold. noveb.* 96. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 1. *n.* 59.

Cortuſa americana altera, floribus minutim fimbriatis. *Mentz. pug. t.* 10.
Cortuſa americana, ſpicato flore, petalis fimbriatis. *Herm. par.* 130.
Sanicula ſ. Cortuſa indica, flore ſpicato fimbriato. *Dodart. mem.* 299.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 540.
Zweyblättriger Biſchofshut. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃ (v. v.)

*2. MITELLA *cordifolia.*

M. foliis cordatis ciliato-dentatis, ſcapo ſubnudo. W.
M. (*cordifolia*) ſcapo ſubnudo, foliis cordatis crenato-dentatis hiſpidis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 185. * *illuſt. gen. t.* 373. *f.* 3.
Herzblättriger Biſchofshut. W.
Habitat in Aſia *boreali?* ♃

3. MITELLA *nuda.*

M. foliis reniformibus repandis ciliatis, ſcapo nudo. W.
M. ſcapo nudo. *Amoen. acad.* 2. *p.* 352. *Amm. Act. petrop.* 2. *p.* 352. *Mill. dict. n.* 2.
M. (*reniformis*) repens, ſcapo nudo, foliis reniformibus. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 185. * *illuſt. gen. t.* 373. *f.* 2.
M. ſcapo nudo, corollarum petalis fimbriatis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 175. *t.* 63. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 541.
Nacktſtieliger Biſchofshut. W.
Habitat in Aſia *boreali.* ♃

890. SCLERANTHUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 767.

Cal. 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Sem.* 2, calyce incluſa.

1. SCLERANTHUS *annuus.*

S. calycibus fructus patulis. *Fl. ſuec.* 348, 377. *Oed. dan. t.* 504. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 39. *t.* 6. *f.* 2. *R. Leers. herb. n.* 310. *Pollich. pal. n.* 404. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 467.
S. floribus patulis. *Hall. helv. n.* 1551.
Scleranthus. *Hort. cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 215.
Knauel annuum. *Scop. carn. n.* 501. *Rupp. jen.* 3.

Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Bauh. pin.* 281.
Polygonum, anguſtiſſimo et gramineo folio, minus repens. *Bauh. pin.* 281. (*ſed mixtum*)
Polygonum minus alterum. *Tabern. hiſt.* 1217.
Polygonum Germanis Knawel. *Trag.* 393.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 542.
Jähriger Knauel. W.
Habitat in Europae *arvis arenoſis.* ☉ (v. v.)
Calycinis *laciniae acutae, viæ albido-marginatae.* Stamina 5 ſ. 7. Leers *l. c.*

2. SCLERANTHUS *perennis.*

S. calycibus fructus clauſis. *Fl. ſuec.* 349, 378. *Gmel. ſib.* 3. *t.* 6. *f.* 1. *Pollich. pal. n.* 405. *Leers. herb,* 311. *Kniph. cent.* 10. *n.* 76. *Flor. dan. t.* 563. *Hoffm. germ.* 145. *Roth. germ. I.* 183. *II.* 468.
S. floris ſegmentis erectis. *Hall. helv. n.* 1550.
Knauel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3. *p.* 160. *t.* 5. *f.* 1.
Polygonum minus polycarpon. *Tabern. hiſt.* 1215.
Alchimilla gramineo folio, majori flore. *Vaill. pariſ.* 4. *t.* 1. *f.* 5.
β. Polygonum cocciferum. *Cam. epit.* 691. R.
Polygonum polonicum cocciferum. *Bauh.* 3. *p.* 378. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 543.
Dauernder Knauel. W.
Habitat in Europae *campis apricis arenoſis.* ♃ (v. v.)
Calycis *laciniae obtuſae, albido-marginatae.* Semen *conſtanter unicum in hoc et praecedente, nec duo.* Leers *l. c.*

3. SCLERANTHUS *polycarpus.*

S. calycibus fructus patentiſſimis ſpinoſis, caule ſubvilloſo. *Amoen. acad.* 4. *p.* 313. *
Polycarpus. *Dalech. hiſt.* 444.
Polygonum montanum, vermiculatae foliis. *Bauh. pin.* 281.
Vermiculata nova planta. *Col. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 543.
Vielſaamiger Knauel. W.
Habitat Monſpelii *et in* Italia. ☉

891. GYPSOPHILA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 768.

Cal. 1-phyllus, campanulatus, angulatus. *Petala* 5, ovata, ſeſſilia. *Capſ.* globoſa, 1-locularis.

1. GYPSOPHILA *repens.*

G. foliis lanceolatis, ſtaminibus corolla emarginata brevioribus. *Ger. prov.* 409. *t.* 15. *f.* 2. *Hoffm. germ.* 146. *Iacq. auſtr.* 5. *p.* 4. *t.* 407. *Roth. germ. I.* 185. *II.* 471.

Saponaria radice lignoſa, maxima, foliis pulpoſis, petalis emarginatis. *Hall. helv. n.* 905.

Saponaria caule ſimplici, foliis ſubulatis planis, ex alis ramuloſis. *Hort. cliff.* 166.

Saponaria foliis glaucis pulpoſis anguſtis heteromallis. *Hall. Rupp. jen.* 117.

Alſine orientalis altiſſima, gramineo folio, flore albo. *Buxb. cent.* 3. *p.* 32. *t.* 60.

Caryophyllus alpinus Linariae foliis, floribus variegatis. *Boccon. muſ.* 23. *t. Hall.* R.

Caryophyllus ſaxatilis, foliis gramineis minor. *Bauh. pin.* 211. *Burſ. XI.* 126.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 544.

Kriechendes Gypskraut. W.

Habitat in Sibiriae, Auſtriae, Helvetiae, Pyrenaeorum *montibus.* ♃ (v. ſ.)

2. GYPSOPHILA *proſtrata.*

G. foliis lanceolatis laevibus, caulibus diffuſis, piſtillis corolla campanulata longioribus. *Mill. dict. n.* 3.

Alſine anguſtifolia caryophylloides multiflora glabra purpuraſcens, radice aſtragaliti. *Pluk. alm.* 22. *t.* 75. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 545.

Liegendes Gypskraut. W.

Habitat in alpibus Europaeis? ♃ (v. ſ.)

Caules *plures, diffuſi, laeves, teretes, ſubpedales, ad genicula rufeſcentes.* Folia *lanceolata, glabra.* Panicula *brachiata, trichotoma: pedunculo intermedio ſimpliciore ad triangulum recto.* Corolla *alba: Petalis obtuſis, patentibus, apice canaliculatis.* Stamina *corolla dimidio breviora.* *Antherae flavae.* Styli *corolla paullo longiores.* *Simillima G. repenti, ſed* dif-

fert *Radice vix repente; Caulis geniculis minus purpuraſcentibus. Calycis foliolis non carinatis. Corollis minoribus albis, nec ſubrubentibus. Antheris flavis. Stylis divergentibus, petalo longioribus. Foliis minus carnoſis.*

3. GYPSOPHILA *paniculata.*

G. foliis lineari-lanceolatis, inferioribus ſcabris, ſtaminibus minutis, ſtylis corolla longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 84.

G. foliis lanceolatis ſcabris, corollis revolutis, floribus dioicis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 23. *Mill. dict. n.* 5. *Kniph. cent.* 10. *n.* 50. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 26. *t. app.* 1.

Alſine fruteſcens, caryophylli folio, flore parvo albo. *Gerb. tanaiſ.* 15.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 546.

Riſpenblütiges Gypskraut. W.

Habitat in Sibiriae, Tatariae *deſertis ſabuloſis,* Tawrow, Bielogrod. ♃ (v. v.)

Folia *margine ſcabra, acuta.* Stamina *in fundo floris ſterilia latent.* Petala *revoluta, minora quam in congeneribus.* Styli *longiores corolla, incurvi. Mas mihi non viſus.*

4. GYPSOPHILA *viſcoſa.*

G. foliis ovato-lanceolatis laevibus baſi cordatis amplexicaulibus, internodiis ramorum medio viſcoſis, petalis retuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 85.

G. (*viſcoſa*) foliis lanceolatis, internodiis caulis, ramorum et pedunculorum medio viſcoſis, petalis emarginatis. *Murr. comment. goetting.* 1783. *p.* 9. *t.* 3. *

Klebriges Gypskraut. W.

Habitat in Oriente. ☉ (v. v.)

5. GYPSOPHILA *adſcendens.*

G. foliis lanceolato-linearibus, caulibus proſtratis, corolla ſtaminibus et piſtillis ejusdem longitudinis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 415. *Iacq. hort.* 2. *t.* 138.

Aufwärtsſteigendes Gypskraut. W.

Habitat - - - - - -

6. GYPSOPHILA *altiſſima.*

G. foliis lanceolatis ſubtrinerviis, caulibus rectis. *Sp. pl.* 582.

Lychnis caulibus dichotomis, corymbis faſtigiatis, foliis lanceolatis trinerviis. *Gmel. ſib* 4. *p.* 443. *t.* 60.

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis faſtigiatis, foliis lanceolatis, caule adſcendente. *Hort. upſ.* 107.
Caryophyllus alpinus craſſo linariae folio. *Bocc. muſ.* 23. *t.* 5. *f.* 3.
Caryophyllus ſaxifragus, foliis gramineis minor. *Bauh. pin.* 211.
Lychnis alpina linifolia, multiflora, perampla radice. *Tournef. inſt.* 328.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 546.
Höchſtes Gypskraut. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Differt a G. Struthio magnitudine dupla vel quadrupla omnium partium: ſtructura eadem, tamen diverſa ſpecies. Caulis erectus, ſeſquipedalis. Folia longitudine et latitudine digiti.

***7. GYPSOPHILA** *arenaria.*

G. foliis linearibus ſubcarnoſis glabris planis, caule corymboſo, petalis integris. W.
Gypſophila arenaria. *Waldſtein et Kitaibel. pl. rar. Hung.*
Sand Gypskraut. W.
Habitat in arenoſis Hungariae. ♃ (v. ſ.)

Praecedenti ſimillima, ſed folia *anguſtiora linearia avenia, et* petala *integra; ceterum habitu convenit. Conſtanter vero faciem ſervat. Deſcriptionem hujus fuſiorem expectamus in opere futuro practioſo de Waldſtein et Kitaibel, qui ambo multa nova obſervarunt vegetabilia in itineribus per Hungariam quotannis inſtitutis.* W.

8. GYPSOPHILA *Struthium.*

G. foliis linearibus carnoſis: axillaribus confertis teretibus. *Loefl. it.* 73.
Saponaria caule ſimplici, foliis linearibus ex alis foliorum confertis teretibus. *Hort. cliff.* 166. *Roy. lugdb.* 444.
Saponaria lychnidis folio, floſculis albis. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis hiſpanica Kali folio, multiflora. *Tournef. inſt.* 338.
Kali vermiculatum, albo globoſo flore. *Barr. rar.* 64. *t.* 119. *Bocc. muſ.* 2. *p. t.* 122.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 547.
Salzkrautblättriges Gypskraut. W.
Habitat in Hiſpania. ♃ (v. ſ.)

Caulis *inferne fruticoſus*; *ex alis foliorum rudimenta foliacea.* Folia *carnoſa, ſemiteretia internodiis longiora. Saponis loco Veteribus et hodie Hiſpanis.*

9. **GYPSOPHILA** *faſtigiata.*

G. foliis lanceolato-linearibus obſolete triquetris laevibus obtuſis ſecundis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 23. *Fabric. helmſt.* 2. *p.* 189. *Mill. dict. n.* 2. *Mattuſch. ſil. n.* 302. *Hoffm. germ.* 146. *Roth. germ. I.* 185. *II.* 471.

Saponaria foliis pulpoſis, linearibus, caule umbellato erecto, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 906.

Lychnis gypſophila. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 144. *t.* 61. *f.* 1.

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis faſtigiatis, foliis linearibus, caule adſcendente. *It. gotl.* 282. *Fl. ſuec.* 346, 379. *Sauv. monſp.* 145.

Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis pulpoſis linearibus. *Hall. jen.* 117. *t.* 2. *f.* 1.

Caryophyllus ſaxatilis, floribus gramineis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211.

Polygonum majus erectum anguſtifolium, floribus candidis. *Mentz. pug. t.* 2. *f.* 2.

Symphytum petraeum. *Thal. harc.* 115.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 548.

Langſtieliges Gypskraut. W.

Habitat in Gotlandiae, Boruſſiae, Helvetiae, Harcyniae *rupibus.* ♃ (v. f.)

Caulis *in hac, non in* G. proſtrata, *ante floreſcentiam procumbit, hinc folia ſecunda.*

10. **GYPSOPHILA** *perfoliata.*

G. foliis ovato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus. *Mill. dict. n.* 4.

Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis angulatis. *Hort. cliff.* 165.

Spergula multiflora, foliis inferioribus ſaponariae, ſuperioribus behen ſimilibus. *Dill. elth.* 368. *t.* 276. *f.* 357.

β. Gypſophila (*tomentoſa*) foliis lanceolatis ſubtrinerviis tomentoſis, caule pubeſcente. *Sp. pl.* 583. *Amoen. acad.* 4. *p.* 271.*

Linum ſylveſtre latifolium, flore albicante. *Barr. ic. t.* 1002.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 548.

Durchwachſenes Gypskraut. W.

Habitat in Hiſpania *et* Oriente. ♃

Folia *oleracea, ſubcarnoſa, lanceolata: inferiora ſcabra; ſuperiora glaberrima.*

11. GYPSOPHILA *muralis.*

G. foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 23. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 125. *Pollich. pal. n.* 406. *Kniph. cent.* 12. *n.* 51. *Hoffm. germ.* 146. *Roth. germ. I.* 185. *II.* 471.

Saponaria foliis filiformibus, caule diffuſo, brachiato. *Hall. helv. n.* 903.

G. foliis linearibus planis, pedunculis ſimplicibus capillaribus longis unifloris, petalis emarginatis. *Gerard. prov.* 408. *

Saponaria calycibus pentaphyllis, corollis crenato-emarginatis, foliis ſubulatis planis. *Fl. ſuec.* 347, 380.

Saponaria foliis linearibus. *Fl. lapp.* 171.

Caryophyllus minimus muralis. *Bauh. pin.* 211.

Lychnis parva paluſtris, foliis acutis lanceolatis, floſculis purpureis. *Mentz. pug. t.* 7. *f.* 4.

Spergula folio Knawel, flore purpuraſcente minor. *Eph. Nat. Cur. cent.* 6. *p.* 273. *t.* 4. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 549.

Gemeines Gypskraut. W.

Habitat in Germania, Suecia, Helvetia *ad vias et inter ſtipulas.* ♂ (v. v.)

Similis *G. Saxifragae, at caret ſquamis calycinis.*

12. GYPSOPHILA *rigida.*

G. foliis linearibus planis, caule dichotomo; pedunculis bifloris, petalis emarginatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 24. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 142. *n.* 39.

Saponaria caule dichotomo, foliis ſubulatis planis. *Hort. cliff.* 445. *Roy. lugdb.* 445.

Saponaria caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato, floribus ſparſis. *Sauv. monſp.* 145.

Tunica minima. *Dalech. hiſt.* 1191.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 550.

Steifes Gypskraut. W.

Habitat Monſpelii *et forte in* Belgio. ♃ (v. ſ.)

13. GYPSOPHILA *Saxifraga.*

G. foliis linearibus, calycibus angulatis: ſquamis quatuor, corollis emarginatis. *Willich. obſ. n.* 64. *Hoffm. germ.* 146. *Roth, germ. I.* 185. *II.* 472.

Tunica calycibus pelviformibus. *Hall. helv. n.* 902.

Tunica Saxifraga. *Scop. carn. n.* 506.
Dianthus Saxifragus. *Spec. pl.* 1. *p.* 413.
Dianthus radice repente, ramis decumbentibus, foliis ſubulatis. *Roy. lugdb.* 444.
Betonica coronaria ſ. Tunica minima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 337. *Hall.*
Caryophyllus ſaxifragus ſtrigoſior ſ. Caryophyllus ſylveſtris, flore minimo. *Bauh. pin.* 211.
Lychnis pumila caryophyllata, flore rubello, italis Haemorrhoidalis aldrovando. *Barr. rar.* 64. *t.* 998.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 550.
Steinbrechartiges Gypskraut. W.
Habitat in Auſtria, Helvetia, Gallia. ♃ (v. v.)

Caulis *palmaris, erectus, filiformis, dichotomus.* Folia *linearia, acuta.* Calyx *cinctus foliolis* 4, *tubo dimidio brevioribus.* Petala *integerrima, emarginata, incarnato-pallida, baſi ſtriis* 3 *purpureis, obſoletis.*

892. SAPONARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 769.

Cal. 1-phyllus, nudus. *Petala* 5, unguiculata. *Capſ.* oblonga, 1-locularis.

1. SAPONARIA *officinalis.*

S. calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *Hort. upſ.* 106. *Mat. med.* 117. *Roy. lugdb.* 444. *Gron. virg.* 160. *Gort. gelr.* 245. *Flor. dan. t.* 543. *Ludw. ect. t.* 170. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 17. *Pollich. pal. n.* 407. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 185. *II.* 473.
S. major laevis. *Bauh. pin.* 206.
S. vulgaris. *Cam. epit.* 152. *Blackw. t.* 113.
S. foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, floribus tubuloſis umbellatis. *Hall. helv. n.* 908.
Lychnis (*officinalis*) floribus digynis, corymboſis; capſulis quadrivalvibus. *Scop. carn. n.* 510.
Bootia vulgaris. *Neck. gallob. p.* 193.
β, Saponaria *hybrida. Mill. dict. n.* 2.
S. concava anglica. *Bauh. pin.* 206. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 548. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 52.
Gentiana folio convoluto. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 521.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 552.
Gemeines Seifenkraut. W.

Habitat in Europa *media.* ♃ (v. v.)

Hybrida *varietas ſingularis, inſtar alterius Peloriae Antirrhini, qua ex Saponaria tranſiit in monopetalam Gentianam, reperta in Spineis, Lichbarrow, Northamtonſhire Angliae, a Gerardo, amplius ibi non occurrit teſte Mortono, forte etiamnum alicubi in Hortis Curioſorum aſſervata, quae ſemine non propagatur.*

2. SAPONARIA *Vaccaria.*

S. calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 166. *Hort. upſ.* 107. *Roy. lugdb.* 443. *Guett. ſtamp.* 287. *Sauv. monſp.* 153. *Pollich. pal.* 408. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 186. *II.* 473.

S. calycibus pyramidatis, quinquangularibus, foliis ovatis, connatis. *Hall. helv. n.* 907.

Lychnis Vaccaria. *Scop. carn.* 2. *n.* 511.

Saponaria ſegetalis. *De Neck. gallob. p.* 194.

Myagrum Vaccaria quorundam. *Tabern. p.* 866.

Lychnis ſegetum rubra, foliis perfoliatis. *Bauh. pin.* 204.

Vaccaria. *Dod. pempt.* 104.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 554.

Acker Seifenkraut W.

Habitat inter ſegetes Galliae, Germaniae, Helvetiae, Orientis. ⊙ (v. v.)

3. SAPONARIA *cretica.*

S. calycibus quinquangularibus ſtriatis, caule erecto ſubdichotomo, foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 584.

Saxifraga altera. *Alp. exot.* 292. *t.* 291.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 554.

Cretiſches Seifenkraut. W.

Habitat in Cretae *aridis.*

Caulis *brachiatus ſ. dichotomus, teres, villoſo-viſcidus anguſtus, pedalis.* Folia *lineari-ſubulata, laevia.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, ſtricti.* Flos *erectus.* Calyx *quinquangularis angulis ſtriis tribus, monophyllus, oblongus, acutus, inter dentes membranaceus.* Petala *parva, integra.*

4. SAPONARIA *porrigens.*

S. calycibus cylindricis pubeſcentibus ramis divaricatiſſimis, fructulis pendulis. *Syſt. Nat.* 347. *Iacq. hort.* 2. *p.* 49. *t.* 109.

Silene porrigens. *Syſt. Nat.* 3. *p.* 230.

Silene (*porrigens*) caule paniculato villoſo, pedunculis

axillaribus filiformibus ſolitariis patentibus. *Gouan. illuſtr.* 29.

Lychnis chalepenſis annua, foliis parum hirtis anguſtis, carneis, pediculis infirmis triuncialibus, capſulis fere rotundis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 541. *fig. mala.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 555.

Weitäſtiges Seifenkraut. W.

Habitat in Oriente. ⊙ (v. v.)

Caulis *bipedalis, erectus, articulatus, rigidulus, inferne glaber, ſuperne pubeſcenti-viſcidus:* Ramis *divaricatiſſimis.* Folia *lanceolata: inferiora glabra; ſuperiora ſub ramificationibus pubeſcentia viſcida.* Pedunculi *axillares, ſolitarii, uniflori, capillares, laxi, patentes, glabri, longitudine foliorum; dum fructiferi penduli.* Calyx *oblongus, tubuloſus, pubeſcenti-viſcidus.* Petala *absque corona, ſubincarnata, emarginata laciniis brevibus.* Stamina *alba, tubo breviora.* Germen *ovatum.* Styli *diſtantes.* Stigmata *ſimplicia.*

5. SAPONARIA *illyrica.*

S. calycibus ſubcylindricis, caule erecto viſcido purpuraſcente: ramis alternis, corollis punctatis. *Mant.* 70.

S. caule dichotomo hirſuto, floribus faſtigiatis, corollis patentibus, petalis integris tripunctatis. *Ard. ſpec.* 2. *p.* 24. *t.* 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 556.

Illyriſches Seifenkraut. W.

Habitat in Illyria. *D. Arduini.*

Planta *erecta ſpithamaea, tenera, viſcoſo-pubeſcens.* Folia *lineari-lanceolata, glabra.* Calyces *ſemiquinquefidi, margine membranacei.* Petala *integra, alba: punctis* 3 *purpureis.* Antherae *violaceae.*

6. SAPONARIA *Ocymoides.*

S. calycibus cylindricis villoſis, caulibus dichotomis procumbentibus. *Sp. pl.* 585. *Iacq. auſtr.* 5. *p.* 39. *tab. app.* 23. *Cavan. ic.* 2. *p.* 29. *t.* 134. *

S. caulibus decumbentibus, nodoſis, foliis ovato-lanceolatis, calycibus tubuloſis hirſutis. *Hall. helv. n.* 909.

S. minor quibusdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 344.

Lychnis vel Ocymoides repens montanum. *Bauh. pin.* 206. *Scheuch. alp.* 7. *p.* 514.

Ocymoides repens, polygoni folio. *Lob. ic. p.* 341.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 556.

Rundblättriges Scifenkraut. W.
Habitat in Helvetiae, Italiae, Monſpelii *petroſis*, *umbroſis*. ♃ (v. ſ.)

7. SAPONARIA *orientalis*.
S. calycibus cylindricis villoſis, caule dichotomo erecto patulo. *Hort. upſ.* 106. *n.* 2. * *Mill. dict. n.* 5.
S. caule dichotomo, foliis lanceolatis petiolatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Roy. lugdb.* 445.
Lychnis orientalis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 512.
Lychnis orientalis annua ſupina, antirrhini folio, flore minimo purpuraſcente. *Tournef. cor.* 25. *Dill. elth.* 205. *t.* 167. *f.* 204.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 557.
Orientaliſches Seifenkraut. W.
Habitat in Oriente, Carniolia ⊙ (v. ſ.)
Similis praecedenti; huic Folia lineari-lanceolata, illi lanceolato-ovata. Calyces *fructus ovati*, *adſperſi punctis elevatis piliferis.* Petala *acute emarginata absque coronula.* *

8. SAPONARIA *lutea*.
S. calycibus teretibus cauleque hirtis, petalis obovatis integerrimis, floribus corymboſis, foliis lineari-lanceolatis canaliculatis. *Smith. ſpicil. bot. tab.* 5. *
S. calycibus teretibus, corollis coronatis, floribus ſubumbellatis, foliis ſublinearibus canaliculatis. *Sp. pl.* 585. *Allion. pedem. n.* 1560. *t.* 23. *f.* 1.
S. foliis gramineis, congeſtis, floribus umbellatis, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 904.
Lychnis floribus umbellatis ochroleucis, petalis ovatis, filamentis nigris. *All. ſpecim. pedem.* 29. *t.* 5. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 557.
Gelbes Seifenkraut.
Habitat in alpibus Helvetiae, Sabaudiae, *inque monte* Ceniſio. ♃ (v. ſ.)
Folia *ſuperiora*, *inprimis calyces pubeſcunt.*

*9. SAPONARIA *bellidifolia*.
S. calycibus teretibus hirtis, caule glabro, petalis linearibus crenatis, foliis ſpathulatis. *Smith. ſpicil. bot.* 5.
Lychnis lutea montana globulariae capite et facie. *Barr. ic.* 498.
Lychnis rubra globulariae capite et facie montana. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 75. *t.* 62. *f.* 1.
Globularia lutea montana. *Colum. ecphr.* 1. *p.* 152. *t.* 153.

Bellis montana, globoſo luteo flore. *Bauh. pin.* 262.
Maſslieblättriges Seifenkraut.
Habitat in Italiae *montium jugis altiſſimis.* ♃

Folia *radicalia ſpathulata ſunt cum mucrone, Globulariae ſimillima.* Caules *S. lutea triplo altiores glabri.* Stamina *flava nec violacea.* Petala (*ex icone Columnae*) *linearia emarginato-crenata.* Smith l. c.

893. DIANTHUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 770.

Cal. cylindricus, 1-phyllus: baſi ſquamis 4. *Petala* 5, unguiculata. *Capſ.* cylindrica, 1-locularis.

* *Flores aggregati.*

1. DIANTHUS *barbatus.*

D. floribus aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis ovato-ſubulatis tubum aequantibus, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 155. *Hort. upſ.* 165. *Roy. lugdb.* 444. *Sauv. monſp.* 144. *Mill. dict. n.* 7. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I. p.* 186. *II.* 474.

Tunica barbata. *Scop. carn. n.* 502.

Caryophyllus hortenſis barbatus latifolius *Bauh. pin.* 208.

Thyrſis. *Renal. ſpec.* 47.

β. Caryophyllus barbatus hortenſis anguſtifolius. *Bauh. pin.* 209.

Armerius flos alter. *Dod. pempt.* 176.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 559.

Bart Nelke. W.

Habitat in Carniolia, Germania. ♃ (v. v.)

2. DIANTHUS *carthuſianorum.*

D. floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, involucro oblongo ariſtato capitulo breviore, foliis linearibus trinerviis. W.

D. floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ariſtatis tubo brevioribus, foliis linearibus trinerviis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 299.

D. floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubum ſubaequantibus, foliis trinerviis. *Hort. upſ.* 105. *Pollich. pal. n.* 409. *Kniph. cent.* 7. *n.* 22. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 186. *II.* 475.

Tunica faſciculis trifloris ramos terminantibus, ſtipulis ariſtatis maximis. *Hall. helv. n.* 899.
Tunica carthuſianorum. *Scop. carn. n.* 504.
Dianthus floribus aggregatis, ſquamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *Guett. ſtamp.* 284.
Caryophyllus ſylveſtris vulgaris latifolius. *Bauh. pin.* 209.
Caryophyllus arvenſis, calyculo florum numeroſo. *Loeſ. pruſſ.* 37. *f.* 7.
Caryophyllus montana, 1. *Tabern.* 287.
β. Caryophyllus ſylveſtris, flore rubro plurimo de ſummo caule prodeunte. *Segu. ver.* 434. *t.* 8. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 560.
Feld Nelke. W.
Habitat in Germaniae, Italiae, Sibiriae, Helvetiae, Carnioliae, Siciliae *ſterilibus apricis.* ♃ (v. v.)

Differt a D. barbato Foliis dimidio anguſtioribus, rigidioribus, trinerviis nec uninerviis. Caule parum ſcabro, nec laeviſſimo. Petalis diſtantibus, ſupra villoſis, nec glabris. Piſtillis tubo longioribus.

*3. DIANTHUS *atrorubens.*

D. floribus aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, involucro ovato ariſtato longitudine capituli, foliis lineari-lanceolatis enerviis. W.
D. (*atrorubens*) floribus aggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis tubo brevioribus, foliis connatis ſtriatis. *Allion. ped. n.* 1545.* *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 467.
Caryophyllus ſylveſtris, flore rubro plurimo de ſummo caule prodeunte. *Segu. veron.* 1. *p.* 434. *t.* 7. *f.* 2.*
Kopfförmige Nelke. W.
Habitat in Italiae *et* Tauriae *aridis apricis.* ♃ (v. v.)

Simillimus D. Carthuſianorum, differt vero: floribus *denſe capitatis ſubſeſſilibus,* foliis *involucri ovatis ariſtatis longitudine floris interdum et capitulo longioribus, nec oblongis ariſtatis flore brevioribus,* petalis *glabris nec piloſis,* foliis *latioribus enerviis, ſiccatis tantum ſtriatis, nunquam vero trinerviis, denique* caule *altiore.* W.

4. DIANTHUS *ferrugineus.*

D. floribus aggregatis, petalis bifidis: laciniis tridentatis. *Mant.* 563. *Mill. ic. t.* 81. *f.* 2.
Caryophyllus montanus umbellatus, floribus variis luteis ferrugineis italicus. *Barr. rar.* 648. *t.* 497.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 561.
Roſtfarbene Nelke. W.
Habitat in Aprutio Italiae. ♂

Simillimus *D. praecedenti, ſed caule anguſtiore; foliis magis gramineis et magis carinatis; Flores ſimiliter faſciculati calyce communi ſcarioſo. Sed differt:* 1. Squamis *his cum ariſtis longitudine corollae (in carthuſiano brevioribus.)* 2. Petalis *bifidis, utrinque tridentatis, ſubtus rufis, intus flavicantibus: laminis longitudinem calycis non aequantibus; at D. carthuſianorum Petala non emarginata, ſ. bifida, ſed rotundata, dentata, utrinque laete purpurea.*

5. DIANTHUS *Armeria.*

D. floribus aggregatis faſciculatis: ſquamis calycinis lanceolatis villoſis tubum aequantibus. *Hort. cliff.* 165. *Fl. ſuec.* 345. 381. *It. gotl.* 301. *Roy. lugdb.* 443. *Sauv. monſp.* 144. *Mill. dict. n.* 6. *Pollich. pal. n.* 410. *Flor. dan. t.* 230. *Hoffm. germ.* 147. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 475.
Tunica floribus umbellatis ſquamis calycinis hirſutis mucronatis, tubum aequantibus. *Hall. helv. n.* 900.
Caryophyllus barbatus. *Seguier. t.* 7. *f.* 4.
Caryophyllus barbatus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 208.
Armeria ſylveſtris altera. *Lob. ic.* 448.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 562.
Büſchel Nelke. W.
Habitat in ſterilibus Gotlandiae, Germaniae, Galliae, Italiae, Helvetiae, Daniae. ☉ (v. v.)

Petala acuminata, uno alterove dente notata.

6. DIANTHUS *japonicus.*

D. floribus aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis acutis ciliatis tubo brevioribus. *Thunb. jap.* 183. *t.* 23. *
Japaniſche Nelke. W.
Habitat in Japonia. ♃ (v. ſ. ſ. fl.)

Ab omnibus diſtinctus foliis ovatis. W.

7. DIANTHUS *prolifer.*

D. floribus aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis tubum ſuperantibus. *Oed. dan. t.* 221. *Pollich. pal. n.* 411. *Gmel. ſib* 4. *p.* 135. *Mill. dict. n.* 8. *Kniph. cent.* 7. *n.* 23. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 476.
Tunica prolifera. *Scop. carn. n.* 503.
Dianthus floribus aggregatis, capitulo m[illegible]no, ſquamis

calycinis obtuſis magnis. *Hort. upſ.* 106. *Sauv. monſp.* 144.

Caryophyllus ſylveſtris prolifer. *Bauh. pin.* 209. *Segu. veron.* 26. *t.* 7. *f.* 1.

Caryophyllus ſylveſtris annuus, multis capſulis ſimul junctis donatus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 563.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 562.

Sproſſende Nelke. W.

Habitat in Germaniae *et auſtralioris* Europae *paſcui ſterilibus.* ⊙ (v. v.)

Cum ſequenti ab Hallero conjungitur. R.

* * *Flores ſolitarii, plures in eodem caule.*

8. DIANTHUS *diminutus.*

D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis octonis florem ſuperantibus. *Leers herb. n.* 322. *Mill. dict. n.* 14. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 477.

Caryophyllus ſylveſtris prolifer, flore ſingulari. *Tourneſ. inſt.* 352. *Dillen. gieſs.* 148. *Reyg. ged. p.* 117.

Caryophyllo prolifero affinis, unico ex quolibet capitulo flore. *Bauh. pin.* 219.

Caryophyllus ſylveſtris minimus. *Tabern. hiſt.* 290.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 563.

Kleinblütige Nelke. W.

Habitat in Germania, Helvetia. ⊙ (v. ſ.)

Nata *D. proliferi, eique nimis affinis, an pro Specie agnoſcenda?* Folia *anguſtiora.* Caulis *ramoſus.* *Flores terminales ſimplices, nec aggregati.* Calyx *paribus* 4 *ſquamarum, quarum interiores per gradus majores obtuſiores.* Corolla *breviſſima, vix extra tubum prominens; adeoque fructificatio D. proliferi, ſed non aggregata, verum ſimplex.*

Eſt forte ſola varietas praecedentis. W.

9. DIANTHUS *Caryophyllus.*

D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis ovatis acutis breviſſimis, petalis crenatis imberbibus. W.

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubrhombeis breviſſimis, petalis crenatis imberbibus. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 299.

D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. *Mat. med.* 117. *Roy. lugdb.* 443. *Sauv. monſp.* 143. *Mill. dict. n.* 3. *Regn. bot.*

α. Dianthus *coronarius*.
Caryophyllus hortenſis ſimplex, flore majore. *Bauh. pin.* 208. *Blackw. t.* 85.
β. Caryophyllus altilis major. *Bauh. pin.* 207.
γ. Caryophyllus maximus ruber et variegatus. *Bauh pin.* 209.
δ. Dianthus *imbricatus*.
Caryophyllus - - - flore pleno ex ſquamis calycinis longiſſime imbricatis. *Hort cliff. l. c. Knorr. del.* 1. *t. N.* 12.
Caryophyllus ſpicam frumenti referens. *E. N. C. cent.* 3. *p.* 368. *t.* 9. *Hort. cliff.* 164. *Phil. bot.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 564.
Garten Nelke. W.
Habitat in Italia. ♃ (v. v.)
Varietas δ. *maxime ſingularis eſt.*

10. DIANTHUS *ſylveſtris.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis breviſſimis ovatis, exterioribus acutis, interioribus obtuſiſſimis, petalis crenatis imberbibus. W.
D. (*ſylveſtris*) caulibus ſubunifloris, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis, foliis anguſtiſſimis rigidis ſubulatis ſupra ſulcatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 237. * *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 82.
Dianthus Caryophyllus ε. inodorus. *Sp. pl.* 588.
Tunica ramis uni- et bifloris, petalis laevibus, ſtipulis calycinis breviſſimis. *Hall. helv. n.* 896.
Caryophyllus ſylveſtris biflorus. *Bauh. pin.* 209. *prod.* 104.
Caryophyllus ſylveſtris flore rubro inodoro, calyce oblongo cum brevibus unguibus. *Segu. veron.* 435. *t.* 7. *f.* 3.
Wilde Nelke. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Carnioliae, Carinthiae. ♃ (v. ſ.)

11. DIANTHUS *pomeridianus.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ovatis acutis breviſſimis, tubo apice tantum ſtriato, petalis emarginatis ſubintegerrimis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.
D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis binis cordatis breviſſimis, corollis emarginatis ſubintegerrimis. *Sp. pl.* 1673.

Caryophyllus ſylveſtris et ſaxatilis, flore magno lacteo ſubtus ad ſpadiceum vergente. *Tournef. cor.* 23.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 565.
Orientaliſche Nelke. W.
Habitat Conſtantinopoli. *Forskoehl*; *in* Palaeſtina. *Haſſelquiſt.* ♃

Herba *ſimillima D. Caryophyllo.* Radix *vix ſe multiplicans.* Caulis *ramis tribus quatuorve ſimplicibus, longis, unifloris.* Calycis *ſquamae tantum duae, breves acutae non acuminatae.* Corolla *lutea, ſubtus virescenti-albida.* Petala *lateribus revoluta, hinc convexa nec dilatata, ſed diſtantia, calycis tubo breviora, obtuſiſſima, parum emarginata, linea exarata.* Stamina *longitudine calycis, alba.* Piſtilla *demum excreſcunt in longitudinem corollae.* Flos *aperitur hora diei duodecima cum dimidia, clauditur noctis hora decima.*

12. DIANTHUS *deltoides.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ovato-lanceolatis acutis ſubbinis, foliis obtuſiuſculis ſubpubeſcentibus, petalis crenatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.
D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Fl. ſuec.* 342, 382. *Sauv. monſp.* 143. *Mill. dict. n.* 1. *Pollich. pal. n.* 412. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 477.
D. floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis tubo parum minoribus, corollis ſerratis punctatis. *Zinn. goett.* 196.
Caryophyllus minor repens noſtras. *Raj. hiſt.* 988. *Dill. elth.* 402.
Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius. *Bauh. pin.* 209.
Betonica coronaria ſ. Caryophyllus minor, folio viridi nigricante, repens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 3[illegible]9.
β. D. (*glaucus*) floribus ſolitariis ſquamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. *Mill. dict. n.* 3. *Willich. obſ. n.* 65. *Pall. it.* 1. *p.* 193.
Tunica ramoſior, flore candido cum corona purpurea. *Dill. elth.* 400. *t.* 298. *f.* 348.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 595. 596.
Deltafleckige Nelke. W.
Habitat in paſcuis et nemoribus Europae. ♃ (v. v.)

13. DIANTHUS *albens.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis emarginatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 90.
D. (*incurvus*) floribus ſolitariis, ſquamis calycinis quaternis ovatis breviſſimis, petalis integris. *Thunb. prod.* 81.
Weiſsliche Nelke. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. f.)
Petala *ſupra alba, ſubtus ex viridi albentia, apice utrinque violacea. Differt a D. deltoide* s. petalis *vix crenatis et abſentia circuli purpurei.* Ait. l. c.

14. DIANTHUS *crenatus.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſenis lanceolatis, corollis crenatis. *Thunb. prod.* 81.
Gekerbte Nelke. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

15. DIANTHUS *chinenſis.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis patulis foliaceis tubum aequantibus, petalis crenatis, foliis lanceolatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.
D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis ſubulatis patulis tubum aequantibus, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *Hort. upſ.* 104. * *Roy. lugdb.* 443. *Mill. dict. n.* 10.
Caryophyllus ſinenſis ſupinus, leucoii folio, flore unico. *Tournef. act.* 1705. *p.* 348. *f.* 5. *Mill. ic.* 81. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 567.
Chineſiſche Nelke. W.
Habitat in China. ☉

16. DIANTHUS *monſpeliacus.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis rectis tubo parum brevioribus, corollis multifidis caule erecto. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis longitudine tubi, corollis multifidis, caule erecto. *Syſt. nat.* 13. *p.* 308.
D. floribus ſolitariis: ſquamis calycinis ſubulatis tubum aequantibus, petalis multifidis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 313. * *Sp. pl.* 2. *p.* 588.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 567.
Franzöſiſche Nelke. W.
Habitat Monſpelii, Veronae. ♃

*17. DIANTHUS *libanotis.*

D. floribus ſubſolitariis, ſquamis calycinis ſenis lanceolatis patulis tubo brevioribus, petalis multifidis barbatis, foliis lanceolatis, caule erecto. W.

D. floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ſenis acuminatis recurvis, corollis multifido-capillaribus fauce barbatis, caule erecto. *Billard. pl. ſyriae* 1. *p.* 14. *t.* 5.*

Libanons Nelke. W.

Habitat in altis montibus Libani. ♃

18. DIANTHUS *plumarius.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis obtuſiſſimis muticis, corollis multifidis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 300.

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis multifidis fauce pubeſcentibus. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 135. *Weig. rug. n.* 278. *Scop. carn. n.* 505. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 187. *II.* 478.

Tunica foliis glaucis patentibus, floribus ſerratis, faucibus lanuginoſis. *Hall. helv. n.* 897.

D. floribus ſolitariis, petalis multifidis, baſi canaliculatis. *Hort. upſ.* 105.* *Sauv. monſp.* 143.

D. floribus ſolitariis, corollis lacero-partitis, ſquamis calycinis ovatis acutis. *Fl. ſuec.* 344.

D. petalis multifidis. *Fl. lapp.* 170. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 443.

Caryophyllus ſylveſtris flore laciniato ſine corniculis odoro. *Bauh. pin.* 210.

Caryophyllus barbatus anguſtifolius. *Seguier. t.* 8? *Hall.* R.

Caryophyllus ſylveſtris, floribus lanuginoſis hirſutis. *Bauh. pin.* 210.

Caryophyllus ſylveſtris V. ſpecies alia. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 284.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 568.

Feder Nelke. W.

Habitat in Europae *et* Canadae *paſcuis nemoroſis.* ♃ (v. v.)

Folia *rore caeſio glauca.*

*19. DIANTHUS *crinitus.*

D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ovalibus mucronatis ſubdivergentibus tubo triplo brevioribus, petalis

multifidis imberbibus. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2, *p.* 300.
Caryophyllus orientalis minimus tenuiſſime laciniatus, flore purpureo. *Tournef. cor.* 23.
Haarförmige Nelke. W.
Habitat in Oriente. W.
Variat flore albo. Tournefort.
Caules *ſpithamaei laeves.* Folia *linearia anguſtiſſima breviſſima obtuſiuſcula laevia.* Flores *duo vel quatuor in caule erecti.* Calyx *tubo gracili ſtriato, dentibus lanceolatis rectis acutiſſimis, ſquamis ad baſin quatuor exacte ovalibus, dorſo ſtriatis, mucrone brevi patente.* Petala *anguſta, limbo ad baſin usque irregulariter multifido-capillaceo, imberbi.* Smith. l. c.

20. DIANTHUS *ſuperbus.*
D. floribus ſolitariis paniculatis, ſquamis calycinis breviſſimis acuminatis, petalis multifido-capillaribus, caule erecto. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 301.
D. floribus paniculatis, ſquamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Amoen. acad.* 4. *p.* 272.* *Fl. ſuec.* 2. *p.* 383. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 40. *t.* 25. *Oed. dan. t.* 578. *Mill. dict. n.* 13. *Pall. it.* 2. *p.* 569. *Pollich. pal. n.* 413. *Hoffm. germ.* 148. *Kniph. cent.* 11. *n.* 39. *Roth. germ. I.* 188. *II.* 478.
Tunica petalis minutiſſime laciniatis. *Hall. helv. n.* 898.
Tunica montana altiſſima, flore tenuiſſime laciniato. *Rupp. jen.* 2. *p.* 118.
Caryophyllus ſimplex alter, flore laciniato odoratiſſimo. *Bauh. pin.* 210.
Caryophyllus ſylveſtris VI. *Cluſ. hiſt.* 284.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 569.
Stolze Nelke. W.
Habitat in Gallia, Germania, Dania. ♂ (v. v.)
Flores *fragrantiſſimi, imprimis nocte.*

*21. DIANTHUS *attenuatus.*
D. floribus ſolitariis, ſquamis calycinis brevibus lanceolatis acuminatis ſubſenis, tubo apice attenuato, petalis crenatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 301.
Verdünnte Nelke. W.
Habitat in maritimis Galliae *meridionalis.* ♃
Caules *diffuſi baſi lignoſi tortuoſi ramoſiſſimi, rami floriferi adſcendentes pedales folioſi teretes glabri, apice in ramulis 2 vel 3 diviſi, unifloris.* Folia *ſubula-*

la mucronato-pungentia glauca margine ſcabra, caulina internodiis breviora. Flores *carnei inodori.* Calyx *ſquamis ſex ad baſin, quarum interiores ſaepe margine membranaceae, tubo ſtriato, apicem verſus ſenſim attenuato, dentibus erectis margine membranaceis.* Corolla *parva crenata imberbis.* Smith. l. c.

22. DIANTHUS *pungens.*

D. floribus ſolitariis, caulibus paucifloris, ſquamis calycinis breviſſimis mucronatis patentibus, tubo gibbo, petalis integris. *Smith. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 301.

D. caule ſuffruticoſo, foliis lineari-ſubulatis, petalis integris. *Mant.* 240.

D. maritimus, foliis pungentibus. *Du Cheſne mſs.*

β. D. (*hiſpanicus*) caule ſubunifloro, ſquamis calycinis ovatis, petalis linearibus integerrimis. *Aſſo ſynop. n.* 371. *t.* 3.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 573.

Stechende Nelke. W.

Habitat in Hiſpaniae *maritimis.* ♃ (v. v.)

Caules *ſuffruticoſi alternatim denſe ramoſi.* Folia caulina *baſi connato-vaginantia conferta, vaginis tegentia ramulos*; ramea *leviter connexa, vaginis diſtantibus*: omnia *linearia planiuſcula anguſta acuminata ſubpungentia.* Pedunculi *ex apice ramulorum lateralium, pedicellis* 1-3 *floris.* Calycis *ſquamae* 4 *lanceolatae, calyce paulo breviores.* Petala *integerrima: laminis longitudine unguium.*

23. DIANTHUS *virgineus.*

D. floribus ſolitariis, caulibus paucifloris, ſquamis calycinis breviſſimis obtuſiſſimis binis, petalis crenatis. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 302.

D. caule ſubunifloro, corollis crenatis, ſquamis calycinis breviſſimis, foliis ſubulatis. *Sp. pl.* 590. *Mill. dict. n.* 2. *Pall. itin.* 1. *p.* 43. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 34. *tab. app.* 15.

D. (*rupeſtris*) floribus ſolitariis, ſquamis calycinis obtuſiſſimis binis, petalis crenatis. *Lin. ſuppl.* 240.

Caryophyllus ſylveſtris repens multiflorus. *Bauh. pin.* 209. *Burſer XI.* 99.

Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.

Houttuyn Lin Pfl. Syſt. 6. *p.* 591.

Jungfern Nelke. W.

Habitat Monſpelii, *inque* Auſtria, Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Radix *perennis.* Folia *radicalia copioſa erecta, in ceſpitem imbricata acuminata, facie Statices ferme.* Caules *aliquot ſpithamaei,* 4 *articulis ſimpliciſſimis conſtantes, foliis minoribus et ſummis minimis ex vagina perfoliata ortis.* Calycis *ſquamae latae ovatae acutae breviſſimae, paribus remotis.* Corollae *limbus dimidio brevior tubo calycis, rotundatus crenatus.* Flos *unicus in caule, interdum et alter ex ala folii ſupremi.* Folia *linearia anguſtiſſima triquetra canaliculata rigidula, in ceſpitem connata, margine carinaque ſcabra.* Caulis *filiformis proſtratus uni-ſ. biflorus.* Flores *remoti odori.* Calycis *ſquamae tantum duae orbiculatae appreſſae.* Petala *ſanguinea crenata, nec plumoſa aut villoſa.* Styli *duo exſerti recurvati.* Lin. ſuppl.

*** Caule *unifloro herbaceo.*

24. **DIANTHUS** *arenarius.*

D. caulibus ſubunifloris: ſquamis calycinis ovatis obtuſis, corollis multifidis, foliis linearibus. *It. gotl.* 318. *Fl. ſuec.* 343, 384. * *Mill. dict. n.* 11. *Grim. iſen. in Nov. Act. A. M. C. vol.* 3. *app. p.* 312. *Hoffm. germ.* 148. *Roth. germ. I.* 188. *II.* 479.

D. caule ſimplici unifloro. *Monnier. obſ.* 152.

D. foliis brevibus, ſquamis muticis, caule unifloro. *Sau. meth.* 143.

Tunica arenaria. *Scop. carn. n.* 508.

Caryophyllus ſylveſtris. 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 282.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 596.

Sand Nelke. W.

Habitat in Europae *frigidioris arena mobili.* ♃ (v. ſ.)

Affinitatem hujus ſummam cum D. plumario docet Petalorum faux; Petala *magis oblonga, diviſa et lacera ultra medium diſci (illi vero tantum multifida) baſi macula livida acuta, pilis purpuraſcentibus adſperſa.*

25. **DIANTHUS** *repens.* W.

D. caule unifloro, ſquamis calycinis binis ovatis acuminatis patulis longitudine fere tubi, petalis dentatis, radice repente. W.

Kriechende Nelke. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Radix *filiformis horizontalis repens per intervalla ſemiuncialia faſciculos foliorum et caules emittens.* Fo-

lia *linearia margine ſcabra ut in reliquis ſpeciebus.* Flos *in caule digitali ſimpliciſſimo unicus terminalis.* Calyx *brevis ſtriatus, baſi ſquamis binis ovatis acuminatis, longitudine fere tubi calycini, apice patulis, munitus.* Petala *calyce duplo longiora, longe unguiculata, dentata glabra.* W.

*26. DIANTHUS *caeſius.*

D. caulibus ſubunifloris, ſquamis calycinis ſubrotundis brevibus, petalis crenatis pubeſcentibus, foliis margine ſcabris. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 302. *Sowerb. bot. angl. t.* 62.

Dianthus glaucus. *Hudſ. angl.* 185.

Tunica rupeſtris, folio caeſio molli, flore carneo. *Dill. elth.* 401. *t.* 298. *t.* 385.

Armeriae ſpecies flore in ſummo caule ſingulari. *Raj. ſynop.* 336.

Graublättrige Nelke. W.

Habitat in montoſis Angliae, Helvetiae. ♃

Radix *lignoſa.* Caules *plures ſpithamaei erecti ſimplices glabri quadranguli, conjugationibus foliorum duabus vel tribus, uniflori vix unquam biflori.* Folia *lineari-lanceolata obtuſiuſcula glauca margine ſcabra.* Calycis *ſquamae tubo triplo breviores ovato-ſubrotundae obtuſe mucronatae ſtriatae.* Petala *carnea obtuſe duplicato-crenata, baſi lineata atque barbata.* Smith l. c.

*27. DIANTHUS *ceſpitoſus.*

D. caulibus unifloris, corollis integris, calycinis ſquamis quatuor lanceolatis, foliis trigonis. *Thunb. prod.* 81.

Raſen Nelke. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

*28. DIANTHUS *ſcaber.*

D. caulibus unifloris, ſquamis calycinis quaternis lanceolatis, petalis crenatis. *Thunb. prod.* 81.

Scharfe Nelke. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

29. DIANTHUS *alpinus.*

D. caule unifloro, petalis crenatis, ſquamis calycinis exterioribus foliaceis tubum ſubaequantibus. *Smith. Act. Soc. Linn. Lond.* 2. *p.* 302.

D. caule unifloro, corollis crenatis: ſquamis calycinis exterioribus tubum aequantibus, foliis linearibus obtu-

ſis. *Mill. dict. n. 12. Jacq. auſtr. t. 52. Pall. it. 3. p. 34.*
Caryophyllus pumilus latifolius. *Bauh. pin. 209. prodr.* 104. *Burſ. XI.* 95.
Caryophyllus ſylveſtris, flore magno inodoro hirſuto. *Bauh. pin.* 209.
Caryophyllus ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 283. *f.* 1. *bon.*
β. D. (*glacialis*) floribus ſolitariis ſubacaulibus, ſquamis calycinis elongatis acuminatis tubum ſuperantibus, foliis linearibus flore longioribus. *Haenke in Jacq. Collect.* 2. *p.* 84. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 570.
Alpen Nelke. W.
Habitat in Stiria, Auſtria, Sibiria. ♃ (v. f.)
Radix *lignoſa, exſerens caules plures.* Caulis *longitudine digiti, articulis tribus conſtans.* Folia *caulis linearia, obtuſiuſcula, plana, obtuſa, vel verſus terram, ubi ceſpites conſtituunt, lanceolato-linearia.* Calycis *ſquamae exteriores longitudine tubi calycis; interiores dimidio breviores.* Corolla *magna.* Petala *calycis longitudine, rotunda, dentibus breviſſimis numeroſis crenata, fauce parum villoſa.*

30. DIANTHUS *pumilus.*

D. acaulis, foliis linearibus. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 32. *
D. (*uniflorus*) ſcapo breviſſimo unifloro, foliis linearibus. *Forſk. cat. pl. arab. p.* 111. *n.* 284.
Niedrige Nelke. W.
Habitat in Arabia *felici.* ♃
Planta *caeſpitoſa.* Folia *ad terram congeſta linearia acuta plabra ſemipollicaria.* Scapus *ſubnullus.* Flores *ſeſſiles ſolitarii.* Calyx *longitudine foliorum glaber ſtriatus, ſquamis 6 oblongis acuminatis flore brevioribus, exterioribus minoribus.* Petala *dentata.* Vahl. l. c.

**** *Fruteſcentes.*

31. DIANTHUS *arboreus.*

D. caule fruticoſo, foliis oblongis ſubcarnoſis, ſquamis calycinis numeroſis obtuſis arcte imbricatis breviſſimis. *Smith Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 303.
D. caule fruticoſo, foliis ſubulatis, petalis ſerratis. *Sp. pl.* 590.
Caryophyllus arboreſcens creticus. *Bauh. pin.* 208. *prodr.* 104.

Betonica coronaria arborea cretica. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 328.

ß. D. (*fruticoſus*) caule fruticoſo, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 591.

Caryophyllus graecus arboreus, leucoii folio peramaro. *Tournef. cor.* 23. *itin.* 1. *p.* 183. *t.* 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 572.

Baumartige Nelke. W.

Habitat in Creta, Graecia. ♄ (v. ſ.)

*32. DIANTHUS *juniperinus.*

D. caule fruticoſo, foliis ſubulatis, ſquamis calycinis ſubquaternis obovatis mucronato-pungentibus patulis tubo duplo brevioribus. *Smith. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 303.

Caryophyllus creticus arboreus, juniperi folio. *Tournef. cor.* 23.

Caryophyllus ſylveſtris arboreus. *Alp. exot.* 39. *t.* 38?

Wachholderblättrige Nelke. W.

Habitat in Creta. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus, corticerimoſo lacero, ramoſiſſimus.* Ramuli *apice denſe folioſi, floriferi elongati, cum oppoſitionibus 2 vel 3 tantum foliorum, internodiis multo breviorum; teretes glabri.* Folia *ſubulata anguſtiſſima, mucronato-pungentia canaliculata, margine laevi.* Flores *bini vel terni in apicibus ramulorum pedicellati parvi.* Calycis *ſquamae obovatae obtuſae, vix ſtriatae, margine apiceque membranaceae, mucrone pungenti divaricato brevi terminatae, tubo duplo breviores; tubus ſtriatus dentibus acutis, haud membranaceis.* Petala *crenata et inciſa.* Styli *exſerti capillares.* Smith. l. c.

TRIGYNIA.

894. CUCUBALUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 771.

Cal. inflatus. *Petala* 5, unguiculata, absque corona ad faucem. *Capſ.* 3-locularis.

1. CUCUBALUS *Behen.*

C. calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſulis trilocularibus, corollis ſubnudis. *Fl. ſuec.* 360, 385.

Mill. dict. n. 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 136. *Pollich. pal. n.* 415. *Leers herb. n.* 333. *Gunn. norv. n.* 8. *Hoffm. germ.* 149. *Kniph. cent.* 12. *n.* 36. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 491.

C. floribus trigynis, calycibus glabris, capſulis trilocularibus. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 448.

C. calycibus ovatis hermaphroditis. *Fl. lapp.* 180.

Viſcago caule brachiato, nodoſo, calycibus inflatis venoſis. *Hall. helv. n.* 913.

Lychnis floribus trigynis pendulis; calycibus ovatis, inflatis, venoſis; capſula ſemitriloculari. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 502. *n.* 4. *ed.* 2. *n.* 514.

Lychnis ſylveſtris, quae Behen album vulgo. *Bauh. pin.* 205. *Knorr. del.* 2. *t. L.* 4. *Blakw. t.* 268.

Papaver ſpumeum. *Lob. ic.* 340.

Herba articularis. *Tabernaem.* 298. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 575.

Aufgeblaſener Taubenkropf. W.

Habitat in Europae *ſeptentrionalis pratis ſiccis.* ♃ (v. v.)

Varietas Feminea *in Horto upſalienſi frequens. Haec hermaphrodito minor.* Calyces *exacte ovati, magis obſcuri, nec oblongo-ovati.* Corolla *minor.* Stamina *corolla dimidio breviora terminata tuberculo absque antheris.* Styli 3. *ſ.* 5. *corolla longiores, declinati.* Planta *utraque fertilis.*

Calyces *venis nonnunquam deſtituti tuncque fere albi. Gmel.* Capſula *ſexfariam apice dehiſcit.* Leers l. c.

2. CUCUBALUS *fabarius.*

C. foliis obovatis carnoſis. *Roy. lugdb.* 448. *Mill. dict. n.* 5.

Lychnis maritima ſaxatilis, folio anacampſerotis. *Tournef. cor.* 24. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 214.

Behen album ſ. Polemonium ſaxatile, fabariae folio, ſiculum. *Bocc. muſ.* 133. *t.* 92.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 576.

Dickblättriger Taubenkropf. W.

Habitat in Sicilia. ♃

3. CUCUBALUS *viſcoſus.*

C. floribus lateralibus undique decumbentibus, caule indiviſo, foliis baſi reflexis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 386. * *Scop. carn. n.* 518. *Hoffm. germ.* 150.

C. foliis amplexicaulibus, floribus verticillatis, pedunculis erectis. *Roy. lugdb.* 448?

Lychnis montana viſcoſa noctiflora hirſuta latifolia alba, floribus absque appendicibus. *Till. piſ.* 105.

Lychnis orientalis maxima, bugloſſi folio undulato. *Tournef. cor.* 24. *itin.* 2. *p.* 361. *t.* 361.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 577.

Klebriger Taubenkropf. W.

Habitat in Suecia, Italia, Anglia, Ararat, Carniolia. ♂ (v. ſ.)

4. CUCUBALUS *ſtellatus.*

C. foliis quaternis. *Hort. upſ.* 110. *Mill. dict. n.* 7.

Drypis foliis quaternis. *Cold. noveb.* 106.

Silene foliis quaternis. *Gron. virg.* 50.

Lychnis caryophyllaeus virginianus, gentianae foliis glabris quatuor ex ſingulis geniculis caulem amplexantibus, flore amplo fimbriato. *Raj. hiſt.* 1895.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 578.

Sternblättriger Taubenkropf. W.

Habitat in Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)

Petala, *absque corona, quadrifida, lobis bipartitis.*

5. CUCUBALUS *aegyptiacus.*

C. floribus erectis, petalis emarginatis retroflexis: utrinque denticulo notatis. *Mant.* 385. *Haſſelq.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 579.

Aegyptiſcher Taubenkropf. W.

Habitat in Aegypto.

Caulis *debilis, ramoſus, ad terram ſparſus.* Folia *linearia (non glabra:) juniora baſi ciliata.* Flores *axillares, ſolitarii, ſeſſiles.* Calyx *cylindricus: in fructu obovatus,* 10-*gonus interſtitiis membranaceis, dentibus parvis.* Petala *minuta, vix calyce longiora.* Styli *ſaepe* 4. *Latourelle.*

6. CUCUBALUS *italicus.*

C. petalis ſemibifidis, calycibus clavatis, panicula dichotoma erecta, genitalibus declinatis, caule erecto. *Iacq. obſ.* 4. *p.* 12. *t.* 79.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 579.

Italiäniſcher Taubenkropf. W.

Habitat in Italia. ♂ (v. v.)

Folia *lanceolata, obtuſiuſcula, ſecunda.* Caulis *praeſertim inferne, tomento vix conſpicuo incanus.* Panicula *dichotoma, floribus pedunculatis, erectis.* Ca-

lyces *erecti*, *clavati*, *exarati ſulcis decem*. Petala *ſemibifida*, *latiuſcula*, *alba*, *ſubtus plumbea*. Stamina *alba*.

7. CUCUBALUS *multiflorus*.

C. petalis bifidis, caule ſimpliciſſimo, corymbis multifloris oppoſitis, calycibus clavatis ſtriatis, foliis ſcabris, caulinis linearibus, radicalibus ſpathulatis. W.

C. (*multiflorus*) foliis ſcabris, radicalibus ſubſpathulatis, panicula elongata contracta ſtricta, floribus hermaphroditis, calyce clavato, deorſum pubeſcente, pedunculo longiore, petalis bifidis, capſula longitudine thecapodii. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 142.

Vielblütiger Taubenkropf. W.

Habitat in Hungaria. ♂ (v. v.)

Caulis *apex refert paniculam ſtrictam verticillatam, e corymbis compoſitam. In planta ſpontanea corymbi ſunt pauciflori.* Calyx *eſt ſcaber.* Capſula *globoſa longiſſime pedicellata, pedicello longitudine capſulae.* W.

8. CUCUBALUS *fruticuloſus*.

C. petalis bifidis revolutis, pedunculis alternis unifloris, foliis lineari-lanceolatis, caule fruteſcente. W.

Cucubalus fruticuloſus. *Pall. itin.* 2. *app. n.* 110. *tab. T.* *

Strauchartiger Taubenkropf. W.

Habitat in montibus Altaicis Sibiriae. ♄

9. CUCUBALUS *tataricus*.

C. petalis bipartitis, floribus ſecundis decumbentibus, pedunculis oppoſitis ſolitariis erectis, caule ſimpliciſ- [illegible] *Hort. upſ.* 111. * *Gort. ingr.* 68. *Gmel. ſib.* 4.

Ly[illegible]tentrionalium, foliis hyſſopi, floribus uno verſu [illegible]itis albis. *Hall. goett.* 33. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 579.

Tatariſcher Taubenkropf. W.

Habitat in Tartaria, Ruſſia. ♃ (v. v.)

10. CUCUBALUS *ſibiricus*.

C. petalis emarginatis, floribus ſubverticillatis: verticillis umbellatis aphyllis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 140. *n.* 34.

Viſcago foliis imis petiolatis ovatis, floribus paniculatis, petalis emarginatis. *Hall. goett.* 1. *p.* 150. *fig. bona.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 580.

Sibiriſcher Taubenkropf. W.

Habitat in deſertis Tacorow; *inter* Woroniz *et* Bielgrod. ♃ (v. ſ.)
Stamina flore longiora.

11. CUCUBALUS *catholicus.*

C. petalis bipartitis, floribus paniculatis, ſtaminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upſ.* 111.*
C. (*glutinoſus*) petalis bipartitis, calycibus clavatis, paniculâ dichotoma patentiſſima, genitalibus rectis. *Retz. obſ.* 2. *p.* 18?
Silene foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato, floribus nutantibus tenuiſſimis. *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis viſcoſa altiſſima, flore muſcoſo, ocymaſtri facie. *Cupan. cath.* 110.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 581.
Sicilianiſcher Taubenkropf. W.
Habitat in Italia, Sicilia. ♃ (v. ſ.)
Calyces fuſci, nitidi.
Cucubalus glutinoſus Retzii parum ab hoc differre videtur. W.

12. CUCUBALUS *molliſſimus.*

C. petalis ſemibifidis, panicula dichotoma, caule foliisque holoſericeis: radicalibus ſpatulatis. *Sp. pl.* 593.
Lychnis maritima pulverulenta, folio carnoſo. *Tournef. inſt.* 338.
Lychnis erecta, veronicae foliis. *Bocc. muſ.* 170. *t.* 118?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 581.
Weichblättriger Taubenkropf. W.
Habitat in Italiae *maritimis.* ♃
Panicula *viſcida ramulis trifloris.* Flores *erecti, albi.* Ungues *corollae calyce longiores.*

13. CUCUBALUS *Otites.*

C. petalis linearibus indiviſis undulatis glabris, floribus dioicis, pedunculis glabris, caule paniculato. W.
C. floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis. *Hort. cliff.* 272. *Roy. lugdb.* 445. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 141. *Mill. dict. n.* 9. *Scholl. barb. n.* 346. *Oed. dan. t.* 518. *Kniph. cent.* 12. *n.* 37. *Hoffm. germ.* 150. *Roth. germ. I.* 192. *II.* 492.
C. (*Otites*) foliis ſubſpathulatis ſcabris, caule paniculato, pedicellis umbellatis glabris calyce longioribus, floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis undulatis nudis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 142. *

Viſcago floribus verticillatis, ſpicatis, ſexu diſtinctis, petalis linearibus, *Hall. helv. n.* 920.
Lychnis Otites. *Scop. carn. n.* 515.
Lychnis viſcoſa, flore muſcoſo. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis ſylveſtris ſeſamoides minor, flore muſcoſo. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 2.
Seſamoides magnum ſalmanticum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 295.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 682.
Acker Taubenkropf. W.
Habitat in Germania, Valleſia, Anglia, Helvetia, Gallia, Sibiria. ♃ (v. v.)
Mas Flore *majore, calyce ſubrubro. Otites Lychnitis, ſylveſtris genus. Tabern* 820.
Femina. Flore *minori, calyce viridi. Lob. adverſ.* 370. *ic.* 453.
Hermaphroditam *plantam legit* Scholler *eamque ex Tataria habuit.* Haller. R.

14. CUCUBALUS *parviflorus.*
C. petalis linearibus indiviſis planis ciliatis, floribus dioicis, pedunculis pubeſcentibus, caule paniculato. W.
C. (*parviflorus*) foliis lanceolatis ſcabris, caule paniculato, pedicellis umbellatis pubeſcentibus calyce longioribus, floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis planis ciliatis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 143.
Kleinblütiger Taubenkropf. W.
Habitat in Hungaria. ♃ (v. v.)
Simillimus praecedenti, tamen characteribus indicatis conſtanter diverſus. W.

15. CUCUBALUS *reflexus.*
C. floribus ſpicatis alternis ſecundis ſubſeſſilibus, petalis ſubbipartitis obſoletis. *Sp. pl.* 594.
Silene floribus ſpicatis alternis ſecundis ſubſeſſilibus, corollis obſoletis nudis. *Hort. upſ.* 112.*
Lychnis ſylveſtris alba, ſpica reflexa. *Magn. monſp.* 171. *t.* 170.
Lychnis meridionalium annua hirſuta, floribus uno verſu diſpoſitis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 544. *Raj. hiſt.* 996.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 583.
Zurückgebogener Taubenkropf. W.
Habitat Monſpelii. ♃
Confer. Silene mutabilis, *cujus an ſola varietas?*

16. CUCUBALUS *Saxifragus.*
C. petalis bifidis, calycibus ſtriatis, terminalibus ſubſeſ-

ſilibus; lateralibus pedunculatis. *Mant.* 71. *Schreb. dec.* 9. *t.* 5.
Lychnis orientalis minima, caryophylli folio, calyce purpuraſcente ſtriato. *Tournef. cor.* 24.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 684.
Steinbrechartiger Taubenkropf. W.
Habitat in Oriente. ♃ (v. ſ.)

Caulis palmaris, *foliolis linearibus.* Flos *terminalis, ſeſſilis.* Flores *laterales oppoſiti, pedunculati.* Calyx *omnis inter duo foliola ſeſſilis, e quorum alis ſaepe novi petioli prodeunt, ideoque non ſquamis* 2 *more Dianthi.*

*17. CUCUBALUS *ſpergulifolius.* W.

C. petalis bifidis, calycibus inflatis ſtriatis glanduloſo-ſcabris, panicula ſecunda, foliis linearibus verticillatis. W.
Lychnis orientalis caryophylli holoſtei folio. *Tournef. cor.* 24.
Sparkblättriger Taubenkropf. W.
Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

Caulis *fere ſexuncialis teres nodoſus pubeſcens.* Folia *verticillata linearia villoſo-mucronata, mucrone obtuſo, margine ſcabra, baſi ciliata.* Panicula *terminalis ſecunda.* Calyces *ovati inflati ſtriati angulati pubeſcentes glandulis breve pedicellatis ſcabri.* Petala *bifida alba, ut in ſicco ſpecimine videtur non coronata. A Silene polyphylla abunde diſtinctus.* W.

*18. CUCUBALUS *polygonoides.* W.

C. petalis emarginatis, calyce cylindraceo pentagono piloſo, floribus capitatis, foliis ellipticis utrinque acutis. W.
Lychnis graeca pumila umbellifera, polygoni folio, flore albo cum circulo purpureo. *Tournef. cor.* 24.
Knötrigartiger Taubenkropf. W.
Habitat in inſula Naxo. ♃ (v. ſ.)

Radix *craſſa ratione plantae.* Caules *decumbentes ramoſi.* Rami *ſesquiunciales erecti teretes hirti.* Folia *utrinque piloſo-hirta, inferiora lanceolata, reliqua elliptica, magnitudine Serpilli ſed anguſtiora, utrinque attenuata acuta.* Flores *in ramorum apice ſeſſiles capitati.* Capitula 3-*ad ſexflora.* Calyx *hirſutus cylindraceus quinquangularis.* Petala *emarginata. Nul-*

lam coronam ad petalorum baſin in ſicco ſpecimine obſervavi. W.

895. SILENE.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 772.

Cal. ventricoſus. *Petala* 5, unguiculata, coronata ad faucem. *Capſ.* 3-locularis.

* *Floribus ſolitariis lateralibus.*

1. SILENE *anglica.*

S. hirſuta, petalis integerrimis, floribus erectis, fructibus reflexis pedunculatis alternis. *Hort. upſ.* 113. *Kniph. cent.* 8. *n.* 87.
Viſcago ceraſtii foliis, vaſculis pendulis anglica. *Dill. elth.* 417. *t.* 309. *f.* 398.
Lychnis ſylveſtris hirſuta annua, flore minore albo. *Vaill. pariſ.* 121. *t.* 16. *f.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 585.
Engliſche Silene. W.
Habitat in Anglia, Gallia. ⊙

Petala *in hac non crenata, in ſequente et emarginata et crenata.* Folia *inferiora obovato-lanceolata verſus baſin ciliata.* Calyces *non piloſi, ſed angulis muricatis: aculeis reflexis vix conſpicuis.*

2. SILENE *luſitanica.*

S. hirſuta, petalis dentatis indiviſis, floribus erectis, fructibus divaricato-reflexis alternis. *Hort. upſ.* 113. *Hort. cliff.* 172.
S. floribus alternis, petalorum limbis integris crenatis. *Hort. cliff.* 172.
Viſcago hirſuta luſitanica, ſtellato flore. *Dill. elth.* 420. *t.* 311. *f.* 401.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 586.
Portugiſiſche Silene. W.
Habitat in Luſitania. ⊙ (v. v.)

Calyces *fructus horizontaliter reflexi, valde piloſi.* Corolla *indiviſa, crenata, incarnata.*

3. SILENE *quinquevulnera.*

petalis integerrimis ſubrotundis, fructibus erectis alternis. *Hort. cliff.* 171. *Hort. upſ.* 113. *Roy. lugdb.* 446. *Mill. dict. n.* 1. *Hoffm. germ.* 151.

S. ſpica incurva uno verſu florida, foliis imis ſpathulatis. *Sauv. monſp.* 146.
Lychnis vulnerata. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 524.
Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor. *Bauh. pin.* 206.
Lychnis hirſuta, flore eleganter variegato. *Raj. hiſt.* 997.
Lychnis hirſuta minor, flore variegato. *Dod. mem.* 4. *p.* 291.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 586.
Fünfleckige Silene. W.
Habitat in Hiſpania, Luſatia, Italia, Gallia, Sibiria, Carniolia. ☉ (v. v.)

Calyces *fructus erecti; piloſi, viſcidi.* Petala *obtuſa, vix emarginata, integerrima, purpurea margine pallido.*

*4. SILENE *ciliata.* W.

S. petalis bipartitis obtuſis, calycibus clavatis pubeſcentibus apice ciliatis alternis erectis. W.
Lychnis parvo flore calyce ſtriato purpuraſcente. *Tournef. cor.* 24.
Gefranzte Silene. W.
Habitat in Creta. (v. ſ.)

Radix *ſimplex perpendicularis filiformis.* Caules *ſubramoſi plures e radice adſcendentes digitales teretes pubeſcentes.* Folia *radicalia ſubrotundo-ſpathulata pubeſcentia.* Folia *caulina oblonga acuta pubeſcentia.* Flores *erecti axillares alterni breviſſime pedunculati.* Calyx *pubeſcens clavatus decemſtriatus, dentibus margine ciliato-piloſis.* Petala *calyce majora profunde bipartita, laciniis obovatis.* Corona *bipartita.* Capſula *elliptica pedicellata.* Flos *major praecedente.* W.

*5. SILENE *ſericea.*

S. petalis bifidis, floribus oppoſitis pedunculatis erectis, foliis oblongo-ſpathulatis ſericeo-incanis. W.
S. (*ſericea*) foliis acuminatis ſucculentis hirſutis lucidis, flore carneo. *Allion. pedem. n.* 1573. *t.* 79. *f.* 3. *
Seidenartige Silene. W.
Habitat in maritimis ſabuloſis agri Pedemontani. ☉

6. SILENE *nocturna.*

S. floribus ſpicatis alternis ſecundis ſeſſilibus, petalis bifidis. *Mill. dict. n.* 2.
S. foliis lanceolatis, caule ramoſo et floribus ſecundis erectis, calycibus hirſutis. *Roy. lugdb.* 447.
Viſcago hirta noctiflora, floribus obſoletis ſpicatis. *Dill. elth.* 420. *t.* 310. *f.* 400.

Lychnis ſylveſtris hirſuta elatior ſpicata lini colore. *Barr. ic.* 10. *t.* 27. *f.* 1.
Lychnis ſylveſtris nocturna piloſa, floribus unius ordinis dilute purpureis. *Cup. cath.* 119. *Raj. ſuppl.* 480.
Lychnis ſegetum meridionalium annua hirta, floribus albis uno verſu diſpoſitis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 346. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 587.
Nächtliche Silene. W.
Habitat in Hiſpania, Monſpelii, Penſylvania. ⊙ (v. v.)
Folia *inferiora obovata, concava, rigida.* Flores *ſeſſiles, ex bracteis oppoſitis alterni, alternatim florentes.* Petala *alba, bifida, majuſcula, ſubtus vireſcentia, nec poſt antheſin rubra. Similis Cucubalo reflexo, ſed caule ramoſiore altiore, Petalis extra calycem patentibus.*

7. SILENE *gallica.*
S. floribus ſubſpicatis alternis ſecundis, petalis indiviſis, fructibus erectis. *Sp. pl.* 595.
Viſcago foliis ellipticis, calycibus lineatis, viſcidis, petalis ovatis. *Hall. helv. n.* 914.
Viſcago hirta gallica, flore parvo carneo, petalis integris. *Dill. hort. elth.* 419. *t.* 310. *f.* 399.
Silene hirſuta, foliis ſeſſilibus oblongo-cuneiformibus obtuſis, calycibus ſtriatis, fructibus erectis alternis. *Dalib. pariſ.* 129.
Lychnis ſylveſtris hirſuta annua, flore minore carneo, *Vaill. pariſ.* 121. *t.* 16. *f.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 588.
Franzöſiſche Silene. W.
Habitat in Helvetia, Gallia. ⊙ (v. v.)

8. SILENE *ceraſtoides.*
S. hirſuta, petalis emarginatis, fructificationibus erectis, calycibus ſubſeſſilibus ſubpiloſis. *Sp. pl.* 595.
Lychnis ceraſtoides. *Scop. carn. n.* 522.
Silene hirſuta, petalis emarginatis, fructibus erectis alternis hirſutis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 1. *p.* 417.
S. rigidula. *Amoen. acad.* 4. *p.* 313. *
Viſcago ceraſtii foliis, vaſculis erectis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 416. *t.* 309. *f.* 307.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 588.
Hornkrautartige Silene. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙

*** Floribus lateralibus confertis.*

9. **SILENE** *mutabilis.*

S. petalis bifidis, calycibus angulatis pedunculatis, foliis lanceolato-linearibus. *Amoen. acad* 4. *p*. 314.*

Lychnis flore albo minimo. *Raj. hiſt*. 906.

Lychnis arvenſis minor anglica. *Raj. hiſt*. 1004.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p*. 589.

Veränderliche Silene. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙

Affinis Cucubalo *reflexo, cum qua conjungit Raj. hiſt.* 664, *ſed ſata utraque diverſam ſeſe mihi oſtendebat.*

*10. **SILENE** *chlorantha.* W.

S. petalis linearibus bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, foliis radicalibus margine ſcabris. W.

S. (*chlorantha*) radice perenni, foliis oblongis acutis glabris margine ſcabris, radicalibus petiolatis, panicula elongata nutante, calyce cylindraceo glabro, laciniis obtuſiuſculis, petalis linearibus bifidis, capſula thecaphoro longiore. *Ehr. Beitr*. 7. *p*. 145.

Cucubalus (*chloranthus*) ſcapis ſubaphyllis, floribus ſecundis, petalis linearibus bifidis, foliis radicalibus petiolatis oblongis acutis. *Willd. prod. Fl. berol. n*. 477. *t*. 5. *f*. 9.* *Hoffm. germ*. 150. *Roth. germ. I*. 193. *II*. 492.

Viſcago nocturna non viſcoſa herbaceo flore. *Dill. elth*. 425. *t*. 316. *f*. 408.

Lychnis ſylveſtris ſeſamoides major, flore obſoleto viridi. *Menz. pug. t*. 2. *f*. 1. *mala.*

Grüne Silene. W.

Habitat in Marchia Electorali. ♃ (v. v.)

11. **SILENE** *nutans.*

S. petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante. *Oed. dan. t*. 242. *Pollich. pal. n*. 417. *Reyg. ged*. 2. *p*. 84. *Gunn. norv. n*. 1109. *Gmel. ſib*. 4. *p*. 138. *Leers. herb. n*. 333. *Hoffm. germ*. 151. *Roth. germ. I*. 192. *II*. 494.

Viſcago foliis lanceolatis hirſutis, floribus paniculatis nutantibus. *Hall. helv. n*. 915.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce ſtriato, corolla involuta. *Hort. cliff*. 171. *Fl. ſuec*. 366, 588.*

Lychnis nutans. *Scop. carn*. 2. *n*. 525.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Bauh. pin*. 205.

Lychnis ſylveſtris, albo flore. *Tabern.* 293. *Cluſ. pann.* 328. *hiſt.* 290, 291. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 589.
Hängende Silene. W.
Habitat in Europae *pratis aridis.* ♃ (v. v.)
Petala *apice crenata.* Datur *varietas pleno flore.* Capſula *ſexfariam dehiſcit.* Leers. *l. c.*

12. SILENE *amoena.*

S. petalis bifidis: coronula ſubcoadunata, floribus ſecundis, pedunculis oppoſitis trifloris, ramis alternis. *Sp. pl.* 596.
S. petalis bifidis coronatis: corolla coadunata, calycibus erectis raris piloſis. *Hort. upſ.* 114.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 590.
Angenehme Silene. W.
Habitat in Tataria. ♃
Caules *diffuſi, laeviuſculi, adſcendentes. Rami alterni, divaricati, breviores.* Folia *ſupra glabra.* Racemus *ſecundus: pedunculis oppoſitis, trifloris.* Calyces *angulis* 10 *purpuraſcentibus villoſis.* Petala *alba, ſemibifida: Nectarii lamellis bifidis, patulis, ſtria alba.*

13. SILENE *paradoxa.*

S. floribus racemoſis, calycibus decem-ſulcatis viſcidis, floribus aliis ſtaminibus exſertis, aliis incluſis. *Sp. pl.* 1673.
Lychnis viſcoſa peregrina noctiflora odorata. *Zanon. hiſt. t.* 109.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 591.
Sonderbare Silene. W.
Habitat in Italia. ♃ (v. v.)
Statura *Silenes nutantis, ſed quadruplo major.* Folia *lineari-lanceolata, canaliculata.* Caules *ſubincani: alii florentes ſeſquipedales; alii ſteriles breveſque pro futuro anno.* Flores *racemoſi:* Pedunculis *lateralibus trifloris, viſcidis.* Calyces *ſubcylindrici, decemſulcati angulis viſcidis.* Corollae *purpuraſcentes, aliis albidae, noctu explicatae et odorae:* Petala *bifida, ſubcrenata: corona acuta, ſubſerrata.* Piſtilla *et ſtamina cum antheris in aliis plantis primum prodeunt iisque divaricatis. In aliis plantis Piſtilla mox prodeunt, ſtamina vero inter tubum floris effoeta haerent.* Rami *inter flores valde viſcoſi.*

14. SILENE *fruticoſa.*

S. petalis bifidis, caule fruticoſo, foliis lato-lanceolatis, panicula trichotoma. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 5. *n.* 84.

S. caule folioſo fruticoſo, foliis lineari-lanceolatis acutis glabris, capſulis ovatis. *Vir. cliff.* 38. *Hort. cliff.* 171. *n.* 4. *Hort. upſ.* 111. *n.* 2. *Roy. lugdb.* 446.

Lychnis myrtifolia behen albo ſimilis. *Bauh. pin.* 205.

Ocymoides fruticoſum. *Cam. hort. t.* 33.

Saponaria fruteſcens, acutis foliis, ex ſicilia. *Bocc. ſic.* 58. *t.* 30.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 592.

Strauchartige Silene. W.

Habitat in Sicilia. ♄ (v. v.)

15. SILENE *bupleuroides.*

S. petalis bifidis, floribus pedunculatis oppoſitis bractea brevioribus, foliis lanceolatis acutis glabris. *Sp. pl.* 598. *Mill. dict. n.* 17.

S. caule folioſo herbaceo, foliis lanceolatis acutis glabris, calycibus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 446.

Lychnis orientalis, bupleuri folio. *Tournef. cor.* 2. *it.* 2. *p.* 139. *t.* 154.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 546.

Haſenöhrleinartige Silene. W.

Habitat in Perſia. ♂ (v. v.)

*16. SILENE *longiflora.*

S. petalis bifidis, floribus paniculatis erectis, pedunculis oppoſitis bractea longioribus, calycibus longiſſimis glabris. W.

S. (*longiflora*) radice perenni, foliis lanceolato-linearibus glabris, caulibus paniculatis glabris, pedunculis calyce brevioribus, calyce ſubclavato glabro baſi exciſo, petalis bifidis, capſula thecaphoro breviore. *Ehr. Beitr.* 7. *p.* 144.

S. (*juncea*) petalis bipartitis integris laciniis divaricatis, fructibus oppoſitis clavatis erectis. *Roth. catalect.* 1. *p.* 54. *

Langblütige Silene. W.

Habitat in Hungaria. ♃ (v. v.)

17. SILENE *gigantea.*

S. petalis bifidis, foliis radicalibus cochleariformibus obtuſiſſimis, floribus ſubverticillatis. *Mill. dict. n.* 18.

S. foliis obverſe ovatis craſſis, limbis corollae bifidis a ſole revolutis. *Wach. ultr.* 391.
Lychnis graeca, ſedi arboreſcentis folio et facie, flore albo. *T. Walth. hort.* 32. *t.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 593.
Hohe Silene. W.
Habitat in Africa. ♂, ſ. ♄ (v. v.)

Folia *prioris anni, maxima.* Caulis *poſterioris anni, bipedalis, ſimplex: articulis inferioribus brevibus, villoſis; ſuperioribus longiſſimis, nudis, viſcoſo-glutinoſis.* Folia *inferiora obovata, carnoſa, fragilia, concava, pubeſcentia, ſeſſilia.* Pedunculi *communes oppoſiti, horizontaliter patentes, breviſſimi, dichotomi.* Calyces *pubeſcentes.* Corollae *virides corona obſoleta, ut fere nulla quaſi Cucubali generis, ſed tamen aliquali.* Flores *noctu tantum explicati.*

18. SILENE *craſſifolia.*

S. petalis emarginatis, foliis ſuborbiculatis carnoſis hirſutis, racemo ſecundo. *Sp. pl.* 597.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 594.
Dickblättrige Silene. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂

Caulis *bipedalis, firmus, hirſutus:* Ramis *alternis.* Folia *orbiculata ſ. obovata, obtuſiſſima, Portulacae, craſſa, carnoſa, utrinque piloſa: vix extimi pollicis magnitudine.* Racemus *terminalis, ſecundus,* Flores 8 ſ. 12, *triſti colore; calycibus hirſutis: bracteis ovatis.* Petala *emarginata, rite coronata.* Piſtilla *tria.*

19. SILENE *viridiflora.*

S. petalis ſemibifidis, foliis ovatis ſcabriuſculis acutis, panicula elongata ſubaphylla. *Mill. dict. n.* 5. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 142. *Kniph. cent.* 12. *n.* 89.
S. foliis lanceolatis, caule paniculato nudo, floribus erectis. *Hort. cliff.* 171. *Roy lugdb.* 446.
Lychnis ocymaſtri facie, flore viridi. *Herm. parad.* 199. *t.* 199.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 594.
Grünblütige Silene. W.
Habitat in Luſitania. ♂ (v. v.)

Planta *pedalis et ultra.* Caules *erecti, teretes, pubeſcentes, geniculis incraſſatis.* Folia *lanceolato-ovata, pubeſcentia, viridia, acuta.* Rami *alterni.* Panicula *brachiata pedunculis dichotomis, paucifloris.*

Calyces nutantes, cylindrici, angulis decem viſcoſis, uti pedunculi. Flores *albido-vireſcentes: petalis ſemibifidis lobis recurvatis, linearibus.* Stamina *longitudine tubi*, Piſtilla *longitudine petalorum.*

*** *Floribus ex dichotomia caulis.*

20. SILENE *conoidea.*

S. calycibus fructus globoſis acuminatis ſtriis triginta, foliis glabris, petalis [illegible]. *Hort. upſ.* 110. *Sauv. monſp.* 146. *Mill. dict.* [illegible]. *Hoffm. germ.* 151. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 494.

Cucubalus calycibus conicis ſtriatis. *Hort. cliff.* 171. *Roy. lugdb.* 448.

Lychnis glabra annua, foliis oblongis mucronatis, flore amplo rubello, capſula oblonga pyramidali. *Moriſ. hiſt. 2. p.* 542. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 6.

Lychnis ſylveſtris latifolia, calycibus turgidis ſtriatis. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 288.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 595.

Halbkegelförmige Silene. W.

Habitat inter ſegetes Hiſpaniae. ⊙ (v. v.)

21. SILENE *conica.*

S. calycibus fructus conicis ſtriis triginta, foliis mollibus, petalis bifidis. *Hort. upſ.* 110. *Iacq. vind.* 77. *obſ.* 38. *auſtr. t.* 253. *Scop. carn. n.* 521. *Pollich. pal. n.* 418. *Hoffm.* 151. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 495.

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia, calycibus turgidis ſtriatis. *Bauh. pin.* 205.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 596.

Kegelfrüchtige Silene. W.

Habitat in Germania, Hiſpania, Galloprovincia, Oriente. ⊙ (v. v.)

*22. SILENE *bellidifolia.*

S. calycibus cylindraceo-conicis pubeſcentibus erectis, petalis bifidis, racemis geminatis terminalibus ſecundis, flore intermedio pedunculato, foliis lanceolatis pubeſcentibus. W.

S. calycibus fructus ovatis villoſis, foliis piloſis ſubaſperis, petalis bifidis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 421. *Iacq. hort.* 3. *t.* 81.

Maßliebblättrige Silene. W.

Habitat - - - - ⊙ (v. v.)

*23. **SILENE** *dichotoma.*

S. calycibus ovatis viſcoſo-piloſis erectis, petalis bifidis, racemis geminatis terminalibus ſecundis, flore intermedio pedunculato, foliis petiolatis ovato-lanceolatis, baſi ciliatis. W.

S. foliis ellipticis ſubquinquenerviis petiolatis ſcabris, caule dichotomo deorſum pubeſcente, flore primario ex dichotomia, reliquis ſpicato-racemoſis ſolitariis ſecundis nutantibus, calyce decangulari ſcabro, petalis bifidis crenatis, capſula erecta thecaphoro longior. *Ehr. Beitr.* 7. *p.* 144.

Gabelförmige Silene. W.

Habitat in Hungaria. ☉ ♂ (v. v.)

*24. **SILENE** *veſpertina.*

S. calycibus clavatis pubeſcentibus erectis, petalis bifidis, corona connata, racemis geminatis terminalibus ſecundis, flore intermedio pedunculato, foliis obovato-lanceolatis baſi ciliatis. W.

S. petalis bifidis, nectario connato, floribus alternis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 31. *

Abend Silene. W.

Habitat - - - - ☉ (v. ſ.)

25. **SILENE** *Behen.*

S. calycibus glabris ovatis venoſo-reticulatis, capſulis trilocularibus. *Sp. pl.* 599.

Lychnis veſicaria cretica, parvo flore purpuraſcente. *Dill. elth.* 427. *t.* 317. *f.* 409.

Lychnis cretica, parvo flore, calyce ſtriato purpuraſcente. *Tournef. cor.* 24.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 596.

Aufgeblaſene Silene. W.

Habitat in Creta. ☉ (v. v.)

Differt a Cucubalo Behen corona corollae, petalorum laminis vix ½ longitudine calycis, radice annua, corollis purpuraſcentibus, antheris albis. Calyx obtuſus. Flores nutantes, pedunculo e dichotomia, flore ipſo breviore.

26. **SILENE** *ſtricta.*

S. petalis emarginatis, calycibus glabris reticulato-venoſis acuminatis pedunculo longioribus, caule dichotomo ſtricto. *Amoen. acad.* 4. *p.* 314. *

S. caule ſubdichotomo, floribus erectis ſubſeſſilibus, foliis lanceolatis piloſo-viſcidis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 158.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 597.
Steife Silene. W.
Habitat in Hiſpania *et* Toloſae. ☉

27. SILENE *pendula.*
S. calycibus fructiferis pendulis inflatis: angulis decem ſcabris. *Hort. upſ.* 109. * *Mill. dict. n.* 7.
Cucubalus floribus trigynis erectis, fructibus pendulis, calycibus ſtriis decem criſpis. *Hort. cliff.* 170.
β. Cucubalus floribus trigynis erectis, calycibus fructus pendulis anguloſis. *Hort. cliff.* 171.
Viſcago hirſuta ſicula, lychnidis aquaticae facie, ſupina. *Dill. elth.* 421. *t.* 312. *f.* 404.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 597.
Hängende Silene. W.
Habitat in Creta *et* Sicilia. ☉ (v. v.)

28. SILENE *baccifera.*
S. calycibus fructiferis cernuis inflatis laevibus, capſulis coloratis, ramis divaricatis. W.
Silene baccifera. *Roth. germ. I.* 192. *II.* 493.
Cucubalus (*bacciferus*) calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. *Sp. pl.* 591. *Mill. t.* 112. *Pollich. pal. n.* 414. *Hoffm. germ.* 149.
Cucubalus caule ramoſo, floribus trigynis, fructu colorato globoſo. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upſ.* 109. *Roy. lugdb.* 448. *Sauv. monſp.* 152.
Viſcago baccifera, petalis ſerratis. *Hall. helv. n.* 912.
Lychnis baccifera. *Scop. carn. n.* 517.
Lychnanthus volubilis. *Gmel. act. petrop.* 1759. *vol.* 14. *p.* 525. *t.* 17. *f.* 1.
Alſine ſcandens baccifera. *Bauh. pin.* 250.
Alſine repens. *Dod. pempt.* 403.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 574.
Beerentragende Silene. W.
Habitat in Tatariae, Germaniae, Galliae, Helvetiae, Italiae *nemoribus, ſepibus.* ♃ (v. v.)

*29. SILENE *maritima.* W.
S. calycibus fructiferis erectis inflatis reticulato-ſtriatis, petalis bifidis, caule repente. W.
S. (*uniflora*) petalis bifidis crenatis, calycibus inflatis teretibus glabris venoſo-reticulatis, pedunculis terminalibus ſolitariis unifloris. *Roth. catalect.* 1. *p.* 52. *
Silene amoena. *Hudſ. angl.* 188.
Cucubalus littoralis. *Donn. ind. horti cantab. p.* 51.
Cucubalus Behen β. *Sp. pl.* 591. *Fl. dan. t.* 857.

Lychnis maritima repens. *Bauh. pin.* 225. *Itin. gotl.* 192.
Lychnis maritima anglicana. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 357.
Lychnis perennis anguſtifolia marina anglica procumbens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 535. *ſ.* 5. 20. *f.* 2.
Meerſtrands Silene. W.
Habitat in maritimis Angliae, Norvegiae, Gotlandiae. ♃ (v. v.)

Locis ſterilibus apex ramorum eſt uniflorus, fertilioribus vero triflorus, cum flore pedunculato in dichotomia caulis. Similis Cucubalo Beheni, tamen pluribus notis diverſa. W.

30. SILENE *procumbens*.

S. calycibus inflatis ſubdecemangularibus ſcabris, petalis emarginatis, caule procumbente, foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis. W.
S. calycibus ovatis inflatis erectis obſolete decemangularibus, petalis ſubauriculatis bifidis, caule procumbente. *Murr. comment. goett.* 1784. *et* 1785. *p.* 83. *t.* 2. *
S. petalis emarginatis, calycibus inflatis anguloſis rugoſis ſcabris, pedunculis terminalibus. *Roth. catal. bot.* 1. *p.* 55. *
Liegende Silene. W.
Habitat in Sibiria. ♃

31. SILENE *noctiflora*.

S. calycibus decemangularibus: dentibus tubum aequantibus, caule dichotomo, petalis bifidis. *Mill. dict. n.* 8. *Pollich. pal. n.* 419. *Hoffm. germ.* 151. *Roth. germ. I.* 193. *II.* 495.
Viſcago foliis ovato-lanceolatis, hirſutis, caule brachiato, calycibus venoſis. *Hall. helv. n.* 911.
Cucubalus calycibus, fructus ovatis erectis: angulis decem alternis venoſis. *Hort. upſ.* 109. * *Fl. ſuec.* 2. *n.* 389. *Sauv. monſp.* 146.
Lychnis noctiflora. *Schreb. ſpic. p.* 31. *Bauh. pin.* 205. *Raj. hiſt.* 994.
Ocymoides noctiflorum. *Comm.* 109. *t.* 34.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 598.
Nachtblütige Silene. W.
Habitat in Suecia, Germania. ☉ (v. v.)

Hanc plantam pro Lychnide calyculis ſtriatis *Bauhinum habuiſſe ſuſpicatur cl. la Chenal, qui iſtam nunquam repererit. Hall. l. c.* R.

Calyces *admodum viſcidi dentibus longioribus, quam in reliquis.*

*32. SILENE *ornata.*

S. calycibus fructus oblongis carinatis piloſis, petalis bifidis, foliis lanceolatis pubeſcentibus viſcoſis planis, caule viſcido. *Ait. Kew.* 2. *p.* 96. *Curt. mag.* 382.

Dunkelfarbige Silene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂ (v. v.)

Corolla *ſaturate ſanguinea.* W.

*33. SILENE *undulata.*

S. calycibus fructus clavato-cylindricis piloſis, petalis bifidis, foliis lanceolatis pubeſcentibus undulatis, caule adſcendente. *Ait. Kew.* 2. *p.* 96.

Wellenblättrige Silene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂ (v. v.)

34. SILENE *virginica.*

S. calycibus floris cylindricis villoſis, panicula dichotoma. *Sp. pl.* 600.

Lychnis flore ſimplici ſpecioſo coccineo, foliis oblongis acuminatis adverſis, caule viſcoſo. *Gron. virg.* 151.

Lychnis viſcoſa virginiana, flore amplo coccineo ſ. Muſcipula regia. *Pluk. alm.* 231. *t.* 203. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 598.

Virginiſche Silene. W.

Habitat in Virginia. ♃

Planta *polymorpha. Flores facie* Lychnis *dioicae albae, at ſaturate rubri*; *Calyces anguſtiores quam in congeneribus, hirſuti.* Stamina *cum ſtylis extra florem prominentia.* Caulis *nunc ſimplex digiti longitudine, terminatus floribus in faſciculum collectis, nunc pedalis apice trichotomus, pedunculo intermedio ſemper unifloro.* Folia *oblonga ſ. lato-lanceolata, ut in Gomphrena globoſa.*

35. SILENE *antirrhina.*

S. foliis lanceolatis ſubciliatis, pedunculis trifidis, petalis emarginatis, calycibus ovatis. *Roy. lugdb.* 447.

S. petalis bilobis coronatis, floribus erectis, foliis ſubciliatis. *Hort. upſ.* 114.

S. corymbo dichotomo, floribus pedunculatis, ramis alternis erectis, foliis lanceolatis integerrimis. *Gron. virg.* 50.

Viſcago americana noctiflora, anthirrhini folio. *Dill elth.* 442. *t.* 313. *f.* 403.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 599.

Löwenmaulartige Silene. W.

Habitat in Virginia, Carolina. ⊙ (v. v.)

*36. SILENE *ſedoides.*

S. glanduloſo-piloſa, calycibus clavatis, petalis emarginatis foliis oblongo-obovatis ſubcarnoſis. W.

Silene ſedoides. *Jacq. collect. ſuppl.* 112. *t.* 14. *f.* 1. *

Lychnis cretica maritima minima portulacae ſylveſtris folio. *Tournef. cor.* 24.

Sedumartige Silene. W.

Habitat in Creta. ⊙ (v. v.)

*37. SILENE *apetala.* W.

S. calycibus ovatis pubeſcentibus, floribus apetalis, foliis lanceolatis pubeſcentibus. W.

Blumenblattloſe Silene. W.

Habitat - - - - ⊙ (v. v.)

Ab omnibus Silenes ſpeciebus floribus clandeſtinis defectu petalorum diſtincta. Tota pubeſcens. Caulis *teres ſexuncialis ramis ſimplicibus oppoſitis.* Folia *inferiora obovato-lanceolata, ſuperiora lanceolata, ſumma linearia.* Pedunculi *ſolitarii in dichotomia caulis longitudine calycis.* Calyx *erectus oblongo-ovatus decemſtriatus.* Capſula *breve pedicellata.* W.

38. SILENE *rubella.*

S. erecta laevis, calycibus ſubgloboſis glabris venoſis, corollis inapertis. *Hort. upſ.* 112. *

Viſcago luſitanica, flore rubello vix conſpicuo. *Dill. elth.* 324. *t.* 314. *f.* 406.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 599.

Röthliche Silene. W.

Habitat in Luſitania, Oriente. ⊙

39. SILENE *inaperta.*

S. caule dichotomo paniculato, calycibus laevibus, petalis breviſſimis emarginatis, foliis glabris lanceolatis. *Sp. pl.* 600.

Viſcago laevis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. *t.* 315. *f.* 407.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 600.

Ungeöffnete Silene. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙ (v. ſ.)

Stamina ſaepe 5 et corolla absque limbo.

*40. SILENE *clandeſtina.*

S. calycibus ovatis decemangulatis pubeſcentibus, petalis bifidis erectis calyce parum longioribus, foliis oblongo-lanceolatis ciliatis. W.

Silene clandeſtina. *Iacq. collect. ſuppl.* 111. *t.* 3. *f.* 3. *
Heimlichblühende Silene. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙
Similis S. apetalae ſed diverſa calyce angulato, praeſentia *petalorum et* foliis *ciliatis.*

41. SILENE *portenſis.*

S. caule dichotomo paniculato, calycibus ſtriatis, petalis bifidis, foliis linearibus. *Sp. pl.* 600.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 600.
Porter Silene. W.
Habitat in Luſitania. *Loefl.* ⊙
Habitus S. inapertae, at Folia anguſtiora et Calyces longitudinaliter ſtriati. Planta *ſpithamaea, brachiata, dichotoma.* Folia *linearia, acuta, glabra.* Pedunculi *filiformes, anguſtiſſimi, longi, erecti, e dichotomia caulis uniflori.* Calyces *clavati, longi, purpuraſcentes, ſtriis alternis albis.* Stamina *longitudine fere corollae. An Silenes inapertae ſola varietas? Amoen. acad.* 3. *p.* 409.

42. SILENE *cretica.*

S. erecta laevis, calycibus erectis decemangularibus, petalis bifidis. *Hort. upſ.* 112. *
Viſcago foliis inferioribus bellidis, ſuperioribus tunicae, calyce ſtrictiore et turgidiore. *Dill. elth.* 422. *t.* 314. *f.* 404, 405.
Lychnis viſcoſa, foliis inferioribus bellidi ſimilibus, flore minimo carneo ſ. rubro. *Magn. hort.* 126.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 601.
Cretiſche Silene. W.
Habitat in Creta. ⊙ (v. v.)
Caulis *dichotomo-paniculatus, patens, filiformis: articulis viſcidis.* Calyces *glabri.* Flores *amoene purpurei petalis ſemibifidis, erecto-patulis.*

43. SILENE *Muſcipula.*

S. petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis glabris. *Mill. dict. n.* 1. *Pall. it.* 2. *p.* 110.
S. floribus triſtylis, foliis lanceolatis ſeſſilibus, capſulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monſp.* 145.
Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra alterna. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 289.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 601.

Fliegenfangende Silene. W.
Habitat in Hiſpania, G. Narbonenſi.

44. SILENE *polyphylla.*
S. foliis faſciculatis ſetaceis: ramorum florentium oppoſitis. *Sp. pl.* 601. *Roy. lugdb.* 447.
Lychnis ſylveſtris, plurimis foliolis ſimul junctis. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris VIII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 290.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 602.
Vielblättrige Silene. W.
Habitat in Pannonia, Auſtria, Bohemia. ♃ (v. ſ.)

**** *Floribus terminalibus.*

45. SILENE *Armeria.*
S. floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris, petalis integris. *Hort. upſ.* 110. *Oed. dan. t.* 559. *Mill. dict. n.* 12. *Kniph. cent.* 8. *n.* 88. *Roth. germ. I.* 293. *II.* 496. *Hoffm. germ.* 151.
Viſcago foliis glabris, ovato-lanceolatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 916.
S. foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus faſciculatis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 446. *Sauv. monſp.* 153.
Lychnis viſcoſa purpurea latifolia laevis. *Bauh. pin.* 205.
Armerius flos quartus. *Dod. pempt.* 176.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 602.
Garten Silene. W.
Habitat in Anglia, Gallia, Helvetia. ☉ (v. v.)

46. SILENE *orchidea.*
S. petalis bilobis, laminis baſi utrinque proceſſus ſubulato-auctis, foliis laevibus, inferioribus ſubrotundo-ſpathulatis, petiolis ciliatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 98.
S. floribus faſciculatis faſtigiatis, petalis quadrifidis, foliis ovatis glabris. *Lin. ſuppl.* 241.
S. (*Atocion*) calycibus fructigeris clavatis, petalis ſemibilobis, faſciculo florum terminali dichotomo, foliis obovatis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 421. *Iacq. hort.* 3. *p.* 19. *t.* 32.*
Lychnis graeca bellidis folio verna, flore parvo dilute purpuraſcente. *Tournef. cor.* 24.
Ragwurzblütige Silene. W.
Habitat in Oriente. ☉ (v. v.)
Caulis *erectus dichotomus ſuperne ſubviſcoſus inferne*

ramoſus. Folia *oleracea glabra, inferiora ſpathulata glanduloſo-ciliata, ſuperiora ſeſſilia.* Flores *terminales dichotomi faſciculati faſtigiati.* Calyx *erectus clavatus.* Corolla *amoene purpurea, faſcia alba, fauce coronata.* Petala *ovata-bifida, baſi utrinque … faucem dente ſ. lacinia tenuiore.*

47. SILENE *aegyptiaca.*

S. petalis emarginatis utrinque dentatis, foliis ſubtomentoſis. *Lin. ſuppl.* 241.

Aegyptiſche Silene. W.

Habitat in Aegypto.

Caulis *herbaceus palmaris brachiatus leviſſime tomentoſus.* Folia *obovata, baſi anguſtata vix carnoſa laevia acutiuſcula.* Flores *terminales, unus alterve, pedunculati erecti.* Calyx *clavatus ſubpubeſcens, dentibus brevibus.* Petala *obcordata ſ. emarginata obtuſa incarnata calyce breviora, dente utrinque acuto, adeoque quadrifida.* Coronula *breviſſima obtuſa emarginata.* Stamina *decem in fauce.* Styli *tres obliqui.*

*48. SILENE *Cateſbaei.*

S. calycibus cylindraceis, petalis quadrifidis acutis, panicula terminali, foliis lanceolatis. W.

S. (*Cateſbaei*) floribus magnis purpureo-rubris, petalis laciniatis, calycibus cylindricis, panicula ſubtrichotoma, foliis laevibus lato-lanceolatis. *Walt. carol.* 141.

Lychnis viſcoſa virginiana flore amplo coccineo, ſeu Muſcipula regia. *Pluk. phytog. t.* 203. *f.* 1. *Cateſb. carol.* 2. *p.* 54. *t.* 54.

Schlitzblättrige Silene. W.

Habitat in Carolina. ♃

Petala *profunde bifida et utrinque ad latus dente inſtructa.* W.

*49. SILENE *cordifolia.*

S. calycibus pubeſcentibus angulatis cylindraceis, petalis bifidis, floribus terminalibus, foliis ſubrotundis acutis nervoſis piloſis. W.

S. (*cordifolia*) caule ſimplici, foliis ovatis acutis, floribus ſubſeſſilibus terminalibus, petalis ſemibifidis. *Allion. pedem. n.* 1581. *t.* 23. *f.* 3.

Herzblättrige Silene. W.

Habitat in ſaxoſis Pedemontani *et* Nicaeenſis *comitatus.* ♃

*50. SILENE *chloraefolia.*

S. calycibus glabris clavatis, petalis ſemibifidis, foliis glaucis, inferioribus ovalibus ſummis cordatis amplexicaulibus. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 13. *t.* 13.*

Lychnis orientalis viſcoſa centaurei lutei folio, flore longiſſimo. *Tournef. cor.* 24.

Chlorablättrige Silene. W.

Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

51. SILENE *alpeſtris.*

S. petalis quadridentatis, caule dichotomo, capſulis ovato-oblongis, foliis lineari-lanceolatis glabris erectis, pedunculis viſcidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 98.

Silene alpeſtris. *Iacq. auſtr.* 1. *p.* 60. *t.* 96.

Lychnis (*alpeſtris*) petalis quadrifidis coronatis, foliis recurvis. *Lin. ſuppl.* 244.

Lychnis quadrifida. *Scop. carn. n.* 519.

Lychnis viſcoſa alba anguſtifolia major. *Bauh. pin.* 205.

Lychnis ſylveſtris decima. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 291.

Caryophyllus minimus humilis alter exoticus, flore candido amoeno. *Lob. ic.* 445.

Alpen Silene. W.

Habitat in Auſtriae *alpibus.* ♃ (v. ſ.)

Radix *perennis.* Caules *ſpithamaei erecti laeves.* Folia *lineari-lanceolata laevia.* Flores *e panicula dichotoma.* Calyx *laevis, dentibus obtuſis.* Petala *quadrifida alba longitudine calycis.* Capſula *calyce longior.*

52. SILENE *rupeſtris.*

S. floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis. *Fl. ſuec.* 367, 390. *It. W. goth.* 144. * *Gmel. ſib.* 4. *p.* 139. *Hoffm. germ.* 151. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 85. *

S. floribus erectis laxe diſtantibus, caule dichotomo. *Fl. lapp.* 183.

Viſcago foliis lanceolatis, caulibus brachiatis, calycibus infundibuliformibus, floribus laxe umbellatis, erectis. *Hall. helv. n.* 917.

Alſine alpina glabra. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118. *Oed. dan. t.* 4. *Raj. hiſt.* 1003, 1031.

Auricula muris alpina glabra. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 360.

Caryophyllus holoſteus alpinus gramineus. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104. *Burſ. XI.* 117.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 603.

Felſen Silene. W.

Habitat in montibus aridis Sueciae, Helvetiae. ♂ (v. ſ.)
Varietas β. foliis linearibus in umbra nata.

53. SILENE *Saxifraga.*

S. caulibus ſubunifloris, pedunculis longitudine caulis, foliis glabris, floribus hermaphroditis femineisque, petalis bifidis. *Sp. pl.* 602. *Iacq. collect.* 2. *p.* 37. *

Lychnis floribus trigynis erectis, capſulis trilocularibus, foliis linearibus. *Scop. carn.* 1. *p.* 503. *n.* 6. *ed.* 2. *n.* 500.

Caryophyllus ſaxifragus. *Bauh. pin.* 211.

Saxifraga antiquorum quibusdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 338.

Lychnis minor ſaxifraga. *Segu. ver.* 431. *t.* 6. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 604.

Steinbrechartige Silene. W.

Habitat in montibus cretaceis Galliae, Italiae, Carnioliae. ♃ (v. ſ.)

Radix *lignoſa, ramoſa.* Caules *plures, digitales, glabri.* Folia *oppoſita, linearia, acuta, glabra, per 4 ad 6 oppoſitiones.* Pedunculus *terminalis, filiformis longitudine caulis; raro pedunculus alter lateralis.* Flos *unicus.* Calyx *clavatus, glaber.* Petala *bifida limbo calyce breviore, ſubtus rubro.*

54. SILENE *valleſia.*

S. caulibus ſubunifloris decumbentibus, foliis lanceolatis tomentoſis longitudine calycis. *Sp. pl.* 603. *Mill. dict. n.* 9. *Allion. pedem. n.* 1574. *t.* 23. *f.* 2.

Viſcago foliis ovato-lanceolatis, tomentoſis, caulibus unifloris. *Hall. helv. n.* 910.

Lychnis pumila ſaxatilis alpina, flore carneo, folio craſſo molli tomentoſo. *Amoen. acad.* 1. *p.* 158. *Bocc. muſ.* 65. *t.* 54.

Lychnis maritima pinguis e corſica. *Bocc. muſ. t.* 34. *cui folia latiora breviora.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 604.

Walliſer Silene. W.

Habitat in alpibus Valleſiacis, Valdenſibus. ♃ *Allioni* (v. ſ.)

Caules *procumbentes, palmares, filiformes, lignoſi.* Folia *lanceolata, ſuperne latiora conſiſtentia, acuta, tomentoſa, glutinoſa, confertim oppoſita.* Pedunculus *terminalis, ſolitarius, uniflorus, longitudine floris.* Flos *erectus:* Petala *bifida, baſi limbi ſubauriculata, noctu odora.* Calyx *clavatus ſtriis* 10 *elevatis*

fuſceſcentibus: dentes parvi, obtuſi; abſoluta floreſcentia triplo major clavatus ſcarioſus inflatus ut Behen.

55. SILENE *pumilio.*

S. caulibus unifloris ſubdiphyllis, petalis repandis, foliis lineari-lanceolatis. W.

S. (*pumilio*) caulibus unifloris, floribus maximis, calyce ſubcoriaceo, ventricoſo-campanulato hirſuto. *Wulfen. in Iacq. collect.* 2 *p.* 126 *t.* 10. * *Iacq. auſt.* 5. *app. t.* 2.

Cucubalus (*pumilio*) caulibus unifloris flore brevioribus. *Mant.* 71.

Lychnis pumilio. *Scop. carn. n.* 513.

Betonica coronaria. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 337.

Caryophyllus ſylveſtris VII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 283.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 584.

Niedrige Silene. W.

Habitat in alpibus Italiae, Moraviae, Carinthiae. ♃ (v. ſ.)

Folia *radicalia in ceſpitem congeſta linearia obtuſa laevia.* Caules *ſimpliciſſimi breviſſimi uniflori, ſaepe triarticulati.* Calyx *oblongus campanulatus patulus obtuſus pubeſcens longitudine caulis.*

56. SILENE *acaulis.*

S. acaulis depreſſa, petalis emarginatis. *Fl. lapp.* 184. *Fl. ſucc.* 368, 387. *Ced. dan. t.* 21. *Hoffm. germ.* 151. *Allion. pedem. n.* 1583. *t.* 79. *f.* 1.

Viſcago foliis gramineis, caule breviſſimo unifloro. *Hall. helv. n.* 919.

Lychnis acaulis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 516.

Cucubalus acaulis. *Gunn. norv. n.* 117.

Lychnis alpina pumila, folio gramineo. *Bauh. pin.* 206. *Dill. elth.* 206. *t.* 167. *f.* 206.

Muſcus alpinus, lychnidis flore. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.

Caryophyllus pumilus alpinus VII. *Cluſ. pann.* 329. *Hall.*

Lychnis ocymoides muſcoſa, ſtrictiore, et latiore folio. *Barr. ic.* 379. 380. *Hall.*

β. S. (*exſcapa*) flore ſeſſili fructibus ſubrotundis. *Allion. pedem.* 1584. *t.* 79. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 605.

Stielloſe Silene. W.

Habitat in alpibus Lapponicis, Auſtriacis, Helveticis, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Herba *Bryo ſimilis.*

896. STELLARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 773.

Cal. 5-phyllus, patens. *Petala* 5, bipartita. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

1. STELLARIA *nemorum.*

S. foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 391. *Scop. carn. n.* 532. *Kniph. cent.* 10. *n.* 86. *Flor. dan.* 271. *Hoffm. germ.* 152. *Roth. germ. I.* 190. *II.* 485.

Myoſotis foliis petiolatis, cordatis, tubis ternis. *Hall. helv. n.* 886. *a.*

Alſine nemorum. *Schreb. ſpicil.* 30.

Alſine altiſſima nemorum. *Bauh. pin.* 250.

Alſine montana hederacea maxima. *Col. ecphr.* 1. *p.* 289. *t.* 290.

β. Alſine montana latifolia, flore laciniato. *Bauh. pin.* 250. *Rupp. jen.* 109.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 606.

Wald Sternmiere. W.

Habitat in Europae *nemoribus.* ♃ (v. v.)

Affinis *Ceraſtii aquatici.*

2. STELLARIA *dichotoma.*

S. foliis ovatis ſeſſilibus, caule dichotomo, floribus ſolitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *Sp. pl.* 603. *Pall. it.* 1. *p.* 72. *it.* 3. *p.* 343. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 14. *t.* 14.*

Alſine petalis emarginatis, foliis ex cordato-ovatis acutis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 149.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 606.

Gabeläſtige Sternmiere. W.

Habitat in alpibus Sibiricis. ⊙

Rami divaricati, dichotomi. Pedunculi fructiferi toti reflexi.

Facies *fere Alſines mediae.* Petala *longitudine calycis.* W.

3. STELLARIA *radians.*

S. foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis quinquepartitis. *Sp. pl.* 603.

Alſine foliis ſalignis margine ſcabris, petalis ſemiquinquefidis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 146.

Alſine ſaxatilis, anguſto et oblongo ſalicis folio, flore albo tenuiſſime laciniato. *Amm. ruth.* 83. *t.* 10.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p. 607.
Strahlenblütige Sternmiere. W.
Habitat in Sibiriae *uliginoſis.*

4. STELLARIA *bulboſa.*

S. foliis ovato-lanceolatis ſubtus aveniis, caule ſubramoſo, pedunculo unifloro, radice filiformi repente bulbifera. W.
S. (*bulboſa*) foliis lanceolato-ovatis, caule ſubdichotomo, pedunculis unifloris, radice repente bulbifera. *Wulfen in Iacq. collect. 3. p. 21.* * *Iacq. ic. rar. 3. t. 468. Hoffm. germ. 153.*
Zwiebeltragende Sternmiere. W.
Habitat in alpibus Carinthiae *locis umbroſis humidis.* ♃ (v. ſ.)

Planta *primo intuitu ſimillima Trientali europaeae.* Caulis *quandoque uno alterove ramo inſtructus.* Folia *ſuperne venoſa inferne avenia.* Pedunculi *uniflori longi, plerumque terminales, interdum et unus alterve axillaris obſervatur.* W.

5. STELLARIA *Holoſtea.*

S. foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis. *Gmel. ſib. 4. p. 145. Pollich. pal. n. 420. Fl. dan. t. 698. Kniph. cent. 10. n. 85. Scop. carn. n. 534. Hoffm. germ 152. Roth. germ. I. 191. II. 486.*
Alſine foliis lanceolatis. *Hort. cliff. 172. Fl. ſuec. 371, 392.*
Alſine foliis gramineis ciliatis. *Hall. helv. n. 884.*
Caryophyllus holoſteus arvenſis, flore majore. *Bauh. pin. 210.*
Gramen. *Fuchſ. hiſt. 136.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. p. 608.
Groſsblütige Sternmiere. W.
Habitat in Europae *nemoribus.* ♃ (v. v.)

Caulis *ſuperne dichotomo-paniculatus.* Pedunculi *uniflori e dichotomia caulis.* Petala *calyce triplo longiora.* W.

6. STELLARIA *graminea.*

S. foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis, petalis calycis longitudine. W.
S. foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Gmel. ſib. 4. p. 145. t. 61 f. 2. Pollich. pal. n. 421. Fl. dan. t. 414. et 415. Kniph. cent. 10. n. 84. Scop. carn. n. 535. Roth. germ. I. 191. II. 487.*

S. (*arvenſis*) foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis minoribus, petalis ultra medium bipartitis. *Hoffm. germ.* 152. *Ehrh. herb.* 126.
Alſine foliis linearibus. *Fl. lapp.* 189, 393. *Fl. ſuec.* 372. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.
Alſine foliis lanceolatis, lineatis, petiolis ramoſis. *Hall. helv. n.* 882.
Gramini Fuchſii Leucanthemo affinis et ſimilis herba. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 361. R.
Caryophyllus arvenſis glaber, flore minore. *Bauh. pin.* 210.
Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.
β. S. (*Dilleniana*) caule flaccido, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis terminalibus bifloris, petalis bipartitis. *Moench. haſſ. n.* 364. *t.* 6.* *Fl. dan. t.* 414. *Hoffm. germ.* 152. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 489.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 608.
Grasartige Sternmiere. W.
Habitat in ſiccis juniperetis ſepibus tectis Europae. ♃ (v. v.)

*7. STELLARIA *paluſtris.*
S. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus paniculatis, petalis bipartitis calyce majoribus. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 548.
S. (*paluſtris*) foliis linearibus integerrimis, floribus duplo majoribus ſemibifidis. *Hoffm. germ.* 152.
Stellaria graminea β. *Sp. pl.* 604.
Alſine folio gramineo anguſtiore paluſtris. *Dill. app.* 69.
Caryophyllus holoſteus arvenſis medius. *Raj. ſynop.* 347.
Waſſer Sternmiere. W.
Habitat in paludibus Europae. ♃ (v. v.)
Folia *glauca.* Flores *majores quam in praecedente ſpecie.* W.

*8. STELLARIA *craſſifolia.*
S. foliis oblongo-lanceolatis craſſiuſculis glaucis, pedunculis unifloris ſolitariis axillaribus, petalis calyce majoribus, caule erecto. W.
S. (*craſſifolia*) foliis ovato-lanceolatis ſeſſilibus integerrimis craſſiuſculis glabris, pedunculis ſolitariis ex dichotomiis, florentibus erectis, fructiferis reflexis, foliolis calycinis ovato-lanceolatis petalis multo brevioribus. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 60. *Timm. prod. n.* 299. *Hoffm. germ.* 153.
Dickblättrige Sternmiere. W.

Habitat in pratis humidis Germaniae. ⊙ (v. ſ.)

*9. STELLARIA *Alſine.*

S. foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis ſubgeminatis uni-multifloriſve, petalis calyce brevioribus, caule decumbente. W.

S. (*Alſine*) caule diffuſo ramoſo, foliis ſeſſilibus, pedunculis lateralibus, petalis calyce brevioribus anguſtiſſimis bipartitis. *Hoffm. germ.* 153. *t.* 5.

S. (*fontana*) foliis oppoſitis ovali-lanceolatis, petalis bipartitis calyce brevioribus, pedunculis unifloris. *Wulfen in Jacq. Collect.* 1. *p.* 327. *

S. (*uliginoſa*) caule diffuſo procumbente ramoſiſſimo, foliis lanceolatis baſi ciliatis anguſtioribus, pedunculis ternis lateralibus, intermedio unifloro, lateralibus dichotomis paucifloris. *Roth. germ. I.* 191. *II.* 489.

S. (*aquatica*) foliis lanceolatis, petalis bipartitis calycem longitudine aequantibus. *Poll. palat. n.* 422.

S. (*Dilleniana*) foliis lanceolatis integerrimis, caule procumbente. *Leers. herb. n.* 331.

S. (*hypericifolia*) foliis ovato-lanceolatis integerrimis, pedunculis ſolitariis. *Wigg. primit. p.* 34. *Allion. pedem. n* 1720.

Stellaria graminea γ. *Sp. pl.* 604.

Stellaria lateriflora. *Krock. ſileſ. n.* 673. *t.* 4.

Alſine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 881.

Alſine foliis lanceolatis, caulibus procumbentibus ramoſiſſimis. *Gerard. prov.* 403.

Alſine hypericifolia. *Vaill. pariſ.* 9.

Alſine aquatica media. *Bauh. pin.* 251.

Alſine longifolia uliginoſis proveniens locis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 365.

Caryophyllus holoſteus anguſtifolius. *Bauh. pin.* 210. *prod.* 104. *n.* 6. *Burſ. XI.* 2.

Sumpf Sternmiere. W.

Habitat in Germaniae, Auſtriae, Helvetiae, Galliae, Italiae, Angliae *paludibus.* ⊙ (v. v.)

*10. STELLARIA *undulata.*

S. foliis oblongis undulatis, caule angulato, floribus axillaribus. *Thunb. jap.* 185.

Wellenblättrige Sternmiere. W.

Habitat in Japonia *juxta vias.*

Caulis *decumbens herbaceus tenellus.* Rami *angulati*

erecti parum ramuloſi debiles glabri palmares. Folia *oppoſita ſeſſilia oblonga acuta undulata glabra, longitudine internodiorum ſemiunguicularia.* Flores *axillares et terminales bini ternique pedunculati.* Pedunculi *capillares uniflori foliis longiores.* Calyx *glaber.* Thunb. l. c.

11. STELLARIA *ceraſtoides.*

S. foliis oblongis pubeſcentibus, caule decumbente, pedunculis unifloris geminatis erectis, petalis calyce majoribus. W.

S. foliis oblongis, pedunculis ſubbifloris. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 394.* *Gunn. norv. n.* 951. *t.* 6. *f.* 2. *Fl. dan.* 92. *Act. hafn.* 10. *t.* 3. *f.* 12. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 59. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 15. *t.* 15.*

Ceraſtium refractum. *Allion. pedem. n.* 1728.

Ceraſtium (*trigynum*) foliis lineari-ellipticis hirſutis, caule ſuberecto bifloro, floribus trigynis. *Vill. delph.* 3. *p.* 645. *t.* 46.

Myoſotis foliis glabris lanceolatis, petiolis infractis *Hall. helv. n.* 890.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 609.

Hornkrautartige Sternmiere. W.

Habitat in alpibus Lapponiae, Helvetiae, Galliae. ♃ (v. ſ.)

*12. STELLARIA *multicaulis.* W.

S. foliis lanceolatis glabris, ramis erectis ſimpliciſſimis, pedunculo ſubſolitario terminali, petalis calyce majoribus. W.

S. (*ceraſtoides*) foliis ſubpulpoſis obtuſe lanceolatis, caulibus proſtratis, iterato radicatis, ramis annuis erectis ſubtrifloris, pedunculis tandem infractis. *Wulfen in Jacq. Collect.* 1. *p.* 254. *t.* 19.*

Vielſtielige Sternmiere. W.

Habitat in alpibus Carinthiae. ♃ (v. ſ.)

Planta *a praecedente diverſiſſima.* Radix *repens filiformis.* Rami *vel* caules *ſimpliciſſimi erecti numeroſi e radice.* Folia *glabra.* Pedunculi *terminales ſolitarii gemini vel terni erecti. Differt praecipue a praecedente*: glabritie *foliorum et* pedunculis *terminalibus, quum illa pedunculos binos ſub apice caulis procumbentis erectos proferat, denique* habitu *diſtincta.* W.

*13. STELLARIA *humifuſa.*

S. foliis ovatis ſubſecundis ſeſſilibus, caulibus procum-

bentibus tetragonis, pedunculis ſolitariis abbreviatis. *Swartz Nov. Act. holm.* 1789. *p.* 111. *t.* 4. *f.* 1.*
S. (*humifuſa*) caulibus pluribus in orbem ſparſis procumbentibus, foliis ſecundis ovatis apice conniventibus. *Rottb. Act. Haf.* 10. *p.* 447. *t.* 4. *Fl. dan. t.* 978.
S. (*humifuſa*) foliis ovatis, floribus ſolitariis breviter pedunculatis, petalis bifidis, caulibus diffuſis procumbentibus. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 550.
Liegende Sternmiere. W.
Habitat in alpibus Sueciae, Norvegiae. ⊙
Petala *calyce paulo majora.* W.

14. STELLARIA *biflora*

S. foliis ſubulatis, ramis bipartitis, petalis emarginatis, calycibus ſtriatis. *Swarz Nov. Act. holm.* 1788. *p.* 36. *t.* 1. *f.* 1.*
S. foliis ſubulatis, ſcapis ſubbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calycibus ſtriatis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 395.*
Sagina ramis erectis bifloris. *Fl. lapp.* 158. *Fl. dan. t.* 12. *Rottb. Act. Haf.* 10. *t.* 3. *f.* 11.
Moehringia ſcapis bifloris. *Fl. ſuec.* 1. *n.* 316? *Amoen. acad.* 2. *p.* 264?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 609.
Zweyäſtige Sternmiere. W.
Habitat in alpibus Lapponicis. ♃ (v. ſ.)

Planta *parva, facie Saginae.* Folia *radicalia ſubulata, in acervum congeſta.* Caules *digitales, filiformes, maxima parte nudi: ſuperne bifidi in* 2 *pedunculos ſubjecto pari foliorum: altero pedunculo, in medio, foliolis duobus.*

Petala *leviter tantum emarginata, itaque Arenariis proxima, magnitudine calycis.* W.

15. STELLARIA *groenlandica.*

S. caulibus decumbentibus ſubbifloris, foliis linearibus baſi ſubciliatis, petalis emarginatis, fructibus globoſis. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 552.
Groenländiſche Sternmiere. W.
Habitat in Groenlandia.

Planta *pollicaris.* Folia *ſubcarnoſa, nonnulla e caulinis margine pilis longis ciliata.* Flores *ratione plantae magni.* Calyces *nudi, foliolis ovatis obtuſis.* Petala *minime bifida, vix emarginata.* Retz. l. c.

16. **STELLARIA** *Arenaria.*

S. foliis ſpathulatis, caule erecto bifido, ramis alternis, petalis emarginatis. *Sp. pl.* 604.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 610.
Sandkrautartige Sternmiere. W.
Habitat in Hiſpania. ☉

Radix *fibroſa.* Caulis *erectus, teres, ſpithamaeus, pilis patulis pubeſcens et ſubglutinoſus.* Rami *alterni, longitudine fere caulis.* Folia *ſeſſilia, ſpathulata, apice ovato, baſin verſus linearia anguſtiora, ſubtus et margine piloſa, ſupra vero vix manifeſte. Primus* flos *e dichotomia caulis; reliqui ex alis ramorum alterni. Omnes majuſculi.* Pedunculi *recti, foliis longiores.* Calyx *viſcoſus uti tota planta, apicibus purpuraſcens, uti etiam folia floralia.* Corolla *campanulata, calyce longior, alba, obtuſiſſima petalis vix manifeſte emarginatis.* Stamina *alba, longitudine calycis. Antherae caeruleſcentes.* Germen *globoſum.* Styli *tres, longitudine ſtaminum.*

*17. **STELLARIA** *ſcapigera.*

S. acaulis, foliis lineari-lanceolatis trinerviis, pedunculis radicalibus unifloris. W.
Stiellofe Sternmiere. W.
Habitat - - - - ♃ (v. ſ.)

Accepi ſub hoc nomine ſpecimen hujus plantae, cujus patria mihi ignota. Folia *ſunt ad radicem conferta ſemiuncialia lineari-lanceolata acuminata leviſſime trinervia, margine ſcabra.* Pedunculi *radicales erecti ſeſquiunciales filiformes uniflori.* Calycis *foliola lanceolata margine ſubmembranacea acuta trinervia.* Petala *linearia ad baſin usque bifida longitudine calycis.* Stamina *petalis breviora.* Germen *globoſum.* Styli *tres filiformes.* Flos *ceterum magnitudine Stellariae gramineae.* W.

897. ARENARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 774.

Cal. 5-phyllus, patens. *Petala* 5, integra. *Capſ.* 1-locularis, polyſperma.

1. **ARENARIA** *peploides.*

A. foliis ovatis acutis carnoſis. *Fl. ſuec.* 375, 396. *Fl.*

lapp. 149. *It. oel.* 151. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 160. *t.* 64. *Fabric. helmſt. p.* 184. *Reyg. ged.* 1. *p.* 119. *Hoffm. germ.* 153. *Roth. germ. I.* 188. *II.* 480.
Honkenya peploides. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 181.
Alſine litoralis, foliis portulacae. *Bauh. pin.* 251. *Loeſ. pruſſ.* 12. *t.* 2.
Telephium maritimum, portulacae folio. *Buxb. act. petrop.* 3. *p.* 271.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 611.
Dickblättriges Sandkraut. W.
Habitat ad littora maris Europaei *borealia.* ♃ (v. v.) Glandulae *receptaculo.*

2. ARENARIA *tetraquetra.*
A. foliis ovatis carinatis recurvis quadrifariam imbricatis. *Sp. pl.* 605. *Allion. pedem. n.* 1718. *t.* 89. *f.* 1.
Caryophyllus ſaxatilis ericaefolius ramoſus repens. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 125. *Burſ. XI.* 135.
β. Gypſophila (*aggregata*) foliis mucronatis recurvatis, floribus aggregatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 581. *Amoen. acad.* 3. *p.* 25. *Schreb. in Nov. Act. Acad. N. C. IV. p.* 140. *Mill. dict. n.* 1.
Saponaria calycibus pentaphyllis, floribus aggregatis, foliis mucronatis, canaliculatis, recurvis. *Hort. upſ.* 107.
Caryophyllus ſaxatilis, ericae foliis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211. *prodr.* 105. *Raj. hiſt.* 1033. *Magn. monſp.* 53. *t.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 612.
Viereckiges Sandkraut. W.
Habitat in Pyrenaeis, Monſpelii. ♃ (v. ſ.)
Caules *digitales, plures, ſimpliciſſimi.* Folia *carinata, recurvata, canaliculata, mucronata, margine cartilaginea, ſtriata, glabra, breviſſima, approximata, baſi ſubciliata et connata.* Capitulum *florum pedunculatum, faſtigiatum, ſubquinqueflorum floribus ſeſſilibus.* Calyx 5-*phyllus: foliolis lanceolatis: exterioribus majoribus.* Petala 5, *ſeſſilia, oblonga, obtuſa lineata.* Styli 3. Capſ. 1-*locularis,* 5-*valvis.* Semina *plura.* D. Schreber.

3. ARENARIA *biflora.*
A. foliis obovatis obtuſis, caulibus procumbentibus, pedunculis bifloris lateralibus. *Mant.* 71. *Gouan. illuſtr.* 30. *Allion. ped. n.* 1699. *t.* 44. *f.* 1. *et t.* 64. *f.* 3.

A. foliis ſubcoriaceis obovatis baſi ciliatis, caulibus proſtratis ramoſiſſimis diffuſis, pedunculis lateralibus ſubbifloris, petalis calyce longioribus. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 250.* *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 83. *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 158.*
Alſine caule erecto proſtrato, foliis ovatis. *Hall. helv. n.* 877.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 612.
Zweyblütiges Sandkraut. W.
Habitat in Europae *auſtralis alpinis.* ♃ (v. ſ.)
Caules *procumbentes.* Folia (*Serpilli*) *ſubrotunda ſ. obovata, laevia, obtuſa.* Pedunculi *laterales, foliis duplo longiores, bifidi et biflori:* Bracteis 2, *linearibus ad diviſionem, ut et in altero pedicello.* Calyces *ovati.* Petala *alba.* Capſulae *ſubgloboſae.*

4. ARENARIA *lateriflora.*
A. foliis ovatis obtuſis, pedunculo laterali bifloro. *Sp. pl.* 615. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 159. *n.* 68.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 612.
Seitenblütiges Sandkraut. W.
Habitat in Sibiria.
Caulis *digitalis, filiformis, ſimpliciſſimus.* Folia *ovata, obtuſa, ſubpetiolata, glabra.* Pedunculus *axillaris unicus, longus, bifidus.* Corolla *calyce longior.*

5. ARENARIA *trinervia.*
A. foliis ovatis acutis petiolatis nervoſis. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 374, 397.* *Roy. lugdb.* 471. *Oed. dan. t.* 429. *Gort. ingr.* 71. *Pollich. pal. n.* 423. *Hoffm. germ.* 154. *Roth. germ. I.* 188. *II.* 480.
Alſine foliis ovato-lanceolatis, trinerviis. *Hall. helv. n.* 878.
Alſine plantaginis folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 364.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 613.
Dreynerviges Sandkraut. W.
Habitat in Europae *ſylvis.* ☉ (v. v.)

6. ARENARIA *ciliata.*
A. foliis ovatis nervoſis ciliatis acutis. *Sp. pl.* 608. *Oeder. dan. t.* 346. *Iacq. miſc.* 2. *p.* 367.*
A. foliis oblongo-obovatis ſubpetiolatis ciliatis, corollis calyce majoribus, perianthii foliolis lanceolatis ſubnervoſis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 245. *t.* 16. *f.* 2.* *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 162.*

Alſine ſerpilli folio, multicaulis et multiflora. *Segu. ver.* 1. *p.* 421. *t.* 5. *f.* 2.
β. Arenaria norvegica. *Gunn. norv. n.* 1100. *t.* 9. *f.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 614.
Gefranztes Sandkraut. W.
Habitat in alpibus Rhaeticis *et* Leontinis. ♃ (v. ſ.)
Cum A. multicauli *combinat Haller.*

7. ARENARIA *balearica.*
A. foliis ovatis lucidis ſubcarnoſis, caule repente, pedunculis unifloris. *Syſt. nat.* 12. *app.* 230. *l'Herit. ſtirp.* 1. *p.* 29. *t.* 15.*
A. muſcoſa. *Medic. in Act. palat. vol.* 3. *phyſ. p.* 202. *t.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 614.
Moosartiges Sandkraut. W.
Habitat in inſulis Balearibus. *Gerard. Zoega.* ♃ (v. v.)
Caules *proſtrati, repentes, radicantes, ſubpubeſcentes, ramoſi, pollicares.* Folia *petiolata, confertiuſcula, patentia, ovata, ſubcarnoſa, enervia, lucida a pilis raris vix conſpicuis paginae ſuperioris.* Pedunculi *ſolitarii, e ramificationibus caulis, erecti, caule vix longiores, ſubpubeſcentes; inferne inſtructi pari foliorum.* Calyx *concavus, rufeſcens, pubeſcens.* Corolla *magnitudine et facie Spergulae nodoſae.* Petala *obovata, integerrima, obtuſa, patentia, unguiculata.* Stamina *et* Piſtilla *etiam alba, longitudine calycis ſ. petalis dimidio breviora.* Germen *globoſum, viride.*
Media *quaſi inter* A. ciliatam *et* multicaulem, *ſed* Pedunculi *longi,* Fructus *cernui.*

8. ARENARIA *multicaulis.*
A. foliis ovatis enerviis, ſeſſilibus acutis: corollis calyce majoribus. *Sp. pl.* 605.
A. foliis pulpoſo-ſubcoriaceis ovato-lanceolatis ſeſſilibus ciliatis, corollis calyce majoribus, perianthii foliolis ovato-lanceolatis ſubenerviis. *Wulfen. in Iacq. Collect.* 1. *p.* 248. *t.* 17. *f.* 1.*
A. foliis ovatis nervoſis. *cet. Amoen. acad.* 1. *p.* 162. *n.* 155.
Alſine foliis ovato-lanceolatis ciliatis, petalis calyce majoribus. *Hall. helv. n.* 876. *t.* 17.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 615.
Vielſtieliges Sandkraut. W.

Habitat in alpibus Helveticis, Auſtriacis, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Folia *magis minusve ciliata.* Flos *maximus.* *Iacq.* Arenariae *ciliatae varietatem faciunt Haller, Gerard.*

9. ARENARIA *ſerpillifolia.*

A. foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. *Fl. ſuec.* 373, 398. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451. *Pollich. pal. n.* 424. *Leers herb. n.* 325. *Gunn. norv. n.* 564. *Hoffm. germ.* 154. *Roth. germ. I.* 189. *II.* 481.

Alſine foliis ovato-lanceolatis, ſubhirſutis, petalis calyce brevioribus. *Hall. helv. n.* 875.

Stellaria ſerpillifolia. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 544.

Alſinanthemum. *Mich. hort.* 109.

Alſine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 251.

Alſine minor. *Fuchſ. hiſt.* 23. *Tabernaem. p.* 708.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 615.

Quendelblättriges Sandkraut. W.

Habitat in Europae *ſylvis glareoſis.* ⊙ (v. v.)

In hac et in A. *trinervia* Petala *calyce dimidio breviora;* Capſula *cernua pedunculo horizontali, ut in Stellariis, apice ſexfariam dehiſcens.* Leers. l. c.

*10. ARENARIA *procumbens.*

A. foliis lineari-lanceolatis, caulibus proſtratis villoſis, petalis calyce brevioribus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 50. *t.* 33.*

A. (*geniculata*) foliis linearibus, floribus paniculatis pubeſcentibus, petalis calyce brevioribus. *Poiret. it. ed. germ.* 2. *p.* 196.*

Cherleria ſedoides. *Forſk. cat. pl. aegypt. p.* 66. *n.* 241.

Liegendes Sandkraut. W.

Habitat in ruderatis Tuneti *inque* Aegypto. ♃ (v. ſ.)

Ab A. montana differt: caulibus *omnibus floriferis proſtratis, nec floriferis erectis,* corollis *quadruplo minoribus,* petalis *calyce brevioribus.* Vahl. l. c.

*11. ARENARIA *polygonoides.*

A. foliis linearibus, caulibus procumbentibus, pedunculis bifloris terminalibus erectis, calycum ſubviſcidorum foliolis enerviis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 241. *t.* 15. * *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 165. *

Stellaria ciliata. *Scop. carn. n.* 536. *t.* 17.

Alſine foliis linearibus obtuſis, calycibus viſcidis. *Hall. helv. n.* 863.

Alſine polygonoides, foliis brevibus, flore albo. *Segu. veron.* 3. *p.* 177. *t.* 4. *f.* 1.
Knöterigartiges Sandkraut. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Carinthiae. ☉ (v. ſ.)

12. ARENARIA *triflora.*

A. foliis lanceolato-ſubulatis ciliatis, ramis ſubtrifloris, petalis lineatis obtuſis. *Mant.* 240. *Cavan. ic.* 3. *p.* 26. *t.* 249. *f.* 2. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 616.
Dreyblütiges Sandkraut. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃

Caules *palmares, copioſi, diffuſi, adſcendentes, teretes, ſubpubeſcentes: ramis alternis, erectis.* Folia *lanceolato-ſubulata (juniperina), patentia, acuminata, ciliata, ſubtus pubeſcentia. Floralia ovato-lanceolata, ſubtus piloſa.* Pedunculi *terminales, plures, teretes, pubeſcentes, articulis caulinis longiores, triflori.* Pedicellus *intermedius aphyllus: laterales longiores.* Bracteae 2, *ovatae, ciliatae; extus pubeſcentes.* Calyx *ovatus, acutus, erectus, pubeſcens.* Petala *obovata, oblonga, calyce duplo longiora, patentia, obtuſa, alba, lineata.* Stamina *alba.* Piſtillum *viride ſtaminibus brevius.*

13. ARENARIA *montana.*

A. foliis lineari-lanceolatis ſcabris, caulibus ſterilibus longiſſimis procumbentibus. *Amoen. acad.* 1. *p.* 272. *
Alſine foliis linearibus acuminatis, petalis florum integris calyce duplo longioribus. *Monn. obſ.* 127.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 616.
Berg Sandkraut. W.
Habitat in Galliae *auſtralis montibus.* ♃ (v. ſ.)

Flores *maximi.* Fructus *penduli.*

Allionii planta eſt diverſa. W.

14. ARENARIA *rubra.*

A. foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Fl. ſuec.* 376, 399. *Neck. gallob. p.* 198. *Pall. it.* 1. *p.* 170. *Pollich. pal. n.* 425. *Moench. haſſ. n.* 359.
Alſine foliis linearibus, ſtipulis ovato-lanceolatis argenteis. *Hall. helv. n.* 872.

α. A. *rubra, campeſtris.*

A. (*rubra*) caulibus proſtratis, foliis oppoſitis filiformibus internodiis duplo brevioribus, calycibus capſulis

aequalibus. *Roth. germ. I.* 189. *II.* 481. *Hoffm. germ.* 154.

Alſine, ſpergulae facie, minor ſ. Spergula minor, ſubcaeruleo flore. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 119.

Polygonum foliis gramineis, ſpergulae capitulis. *Loeſ. pruſſ.* 203. *t.* 63.

Spergula purpurea. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 722. Hall. R.

β. A. *rubra, marina. Flor. dan. t.* 740.

A. (*marina*) caulibus proſtratis, foliis oppoſitis linearibus carnoſis longitudine internodiorum, calycibus capſula dimidio brevioribus. *Roth. germ. I.* 189. *II.* 482. *Hoffm. germ.* 154.

Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. *Hort. cliff.* 173. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 451.

Spergula marina noſtras. *Raj. hiſt.* 1024.

Alſine ſpergulae facie media. *Bauh. pin.* 251.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 617.

Rothblühendes Sandkraut. W.

Habitat α *in* Europae *arenoſis collibus*, β *in litoribus marinis.* ☉ (v. v.)

Varietas β. *glabra, foliis pedunculisque pubeſcenti-viſcidis.* Evigilat *hora* 9. Calyx *tegit dimidiam capſulam.*

Stamina 4, 5, 7, 8, 10 *obſervantur.* R.

Varietas a. *campeſtris, piſtilla* 3 *et* 5, *ſtamina* 5; *antheris gemellis. Hall. l. c. et Fabric. butisb. p.* 59. R.

15. ARENARIA *media.* †

A. foliis linearibus carnoſis, ſtipulis membranaceis, caulibus pubeſcentibus. *Sp. pl.* 606. *Ait. Kew.* 2. *p.* 102.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 618.

Mittleres Sandkraut. W.

Habitat in Gallia, Anglia. ☉

Simillima A. rubrae maritimae, *ſed minus ramoſa, caulibus magis adſcendentibus, pubeſcentibus.* Folia *carnoſa, linearia, acutiuſcula, ſupra depreſſiuſcula, ſubtus convexa, pubeſcentia.* Flores *albi, petalis calyce vix majoribus.* Semina *margine membranaceo cincta.*

Dubie propono plantam, quam Botanici germanici, ob ſynonyma falſa, cum Spergula pentandra conjunxere, et quam Hudſonius in Flora anglica p. 193. *pro varietate Arenariae rubrae declarat; videtur tamen a binis nominatis plantis diverſa.* W.

16. ARENARIA *bavarica.*

A. foliis ſemicylindricis carnoſis obtuſis, petalis lanceolatis, pedunculis terminalibus ſubbinatis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 315. *

Alſine alpina, foliis teretibus obtuſis, flore albo. *Segu. veron.* 1. *p.* 429.

Saxifraga bavarica. *Raj. hiſt.* 1033.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 618.

Bayerſches Sandkraut. W.

Habitat in Bavaria, Baldo, Sibiria. ♃

17. ARENARIA *gypſophiloides.*

A. foliis linearibus: radicalibus ſetaceis, panicula ſubpubeſcente, petalis lanceolatis. *Schreb. Act. Nov. Acad. N. C. tom. IV, p.* 139. *

Alſine orientalis, caryophylli folio, flore parvo albo. *Tournef. cor.* 17.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 619.

Gypſkrautartiges Sandkraut. W.

Habitat in Oriente. ♃

Statura *A. ſaxatilis.* Caulis *erectus, ſemipedalis, laevis, articuli* 7 *ſ.* 8. Folia radicalia *copioſa, tenuiſſima ſ. ſetacea:* Caulina *majora, linearia, articulis longiora.* Panicula *terminalis, brachiata, dichotoma, ſubfaſtigiata, pedicellis ultimis ſubvilloſis.* Calyx *ovatus, duriuſculus, mucronatus.* Petala *lanceolata, alba, calyce triplo longiora.*

18. ARENARIA *cucubaloides.*

A. foliis linearibus margine ſcabris, panicula dichotoma pubeſcente, petalis obovatis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 17. *t.* 17. *

Alſine orientalis caryophylli folio, viſcoſa, flore magno albo. *Tournef. cor.* 17.

Alſine viſcoſa, longiſſimis et anguſtiſſimis foliis. *Amman. ruth.* 66?

Taubenkropfartiges Sandkraut. W.

Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

Differt ab A. gypſophiloide, floribus *triplo majoribus,* petalis *obovatis nec lanceolatis.* Smith. l. c.

19. ARENARIA *dianthoides.*

A. foliis linearibus margine ſcabris, bracteis ventricoſis pedunculos ſuperantibus. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 16. *t.* 16. *

Alſine orientalis caryophylli folio, flore magno in capitulum congeſto. *Tournef. cor.* 17.
Nelkenartiges Sandkraut. W.
Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

20. ARENARIA *ſaxatilis.*
A. foliis ſubulatis, caulibus paniculatis, calycis foliolis ovatis obtuſis. *Sp. pl.* 607.
Alſine foliis linearibus, petalis calyce longioribus. *Hall. helv. n.* 867.
Arenaria foliis ſubulatis, calycinis laciniis membrana ipſis latiore acutis obtuſis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 281.
Spergula foliis aciformibus denſis, ramis ramoſis ſubnudis. *Sauv. monſp.* 45.
Alſine ſaxatilis et multiflora, capillaceo folio. *Vaill. pariſ.* 7. *t.* 2. *f.* 3. *Hall. opuſc.* 113.
Alſine caryophylloide tenuifolia, flore albo punctato. *Pluk. alm.* 22. *t.* 7. *f.* 3.
Anthyllis lychnitis annua. *Barr. ic.* 580.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 619.
Felſen Sandkraut. W.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Sibiria. ♃

*21. ARENARIA *caeſpitoſa.*
A. foliis ſubulatis, caulibus paniculatis, calycis foliolis ſtriatis acuminatis margine membranaceis, pedunculis pubeſcentibus. W.
Arenaria ceſpitoſa. *Ehrh. herb.* 55. *Hoffm. germ.* 155.
Arenaria ſaxatilis. *Roth. germ. I.* 190. *II.* 484.
Alſine ſaxatilis et multiflora capillaceo folio. *Hall. goett. it. hercyn.* 15.
Alſine foliis conjugatis anguſtis linearibus, petalis integris. *Zinn. goett.* 195.
Raſenbildendes Sandkraut. W.
Habitat in Hercynia *in rupibus ſchiſti* Goslarienſibus. ♃ (v. v.)
Diſtinguo hanc cum Ehrharto a praecedente, cui ſimillima, ob calyces *acuminatos, nec obtuſos.* W.

22. ARENARIA *verna.*
A. foliis ſubulatis, caulibus paniculatis, calycibus acuminatis ſtriatis. *Mant.* 72. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 2. *t.* 404.
Alſine glabra, tenuiſſimis foliis, floribus albis. *Herm. parad.* 12. *t.* 12.
Alſine puſilla, pulchro flore, tenuiſſima. *Raj. hiſt.* 1033.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 620.

Frühlings Sándkraut. W.
Habitat in alpibus Europae *auſtralioris.* ♃ (v. v.)
Differt ab A. ſaxatili Caulibus *vix palmaribus, pilis raris adſperſis*; Pedunculis *piloſis*; Calycibus *acutis.*

23. ARENARIA *hiſpida.*
A. foliis ſubulatis ſubtus hiſpidis. *Sp. pl.* 608.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 620.
Rauhes Sandkraut. W.
Habitat Monſpelii *in monte calcaris.*
Habitus *Spergulae.* Caules *ſimplices, pilis raris adſperſi.* Folia *oppoſita, ſubulata, plana, ſubtus pilis raris hiſpida.* Panicula *primum dichotoma, mox alternis pedunculis ramoſa.*

*24. ARENARIA *verticillata.* W.
A. foliis ſubulatis ſpinoſis floribusque verticillatis. W.
Alſine orientalis frutiçoſa ſaxatilis foliis et floribus verticillatis. *Tournef. cor.* 18.
Wirtelblütiges Sandkraut. W.
Habitat in Armenia *inter* Ezeram *et* Tocat. ♄ (v. ſ.)
Rami *teretes lignoſi pubeſcentes nodoſi.* Folia *ſubulata rigida apice mucronata* 3 *vel* 4 *confertim ex uno puncto provenientia, hinc faſciculata, et faſciculi ſunt oppoſiti, inde facies verticillata.* Pedunculi *quadriflori ſubcapitati axillares, ex oppoſitis foliorum faſciculis, formant verticillum.* Calycis *foliola lineari-ſubulata pungentia.* Petala *alba lanceolata.* W.

25. ARENARIA *juniperina.*
A. foliis ſubulatis ſpinoſis, caulibus erectis, calycibus ſtriatis, capſulis oblongis. *Mant.* 72. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 35. *t.* 35. *
Alſine orientalis fruticoſa camphoratae folio. *Tournef. cor.* 18.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 621.
Wachholderartiges Sandkraut. W.
Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)
Facies *A. ſaxatilis.* Caules *ſemipedales, ſtricti, laeves.* Folia *ſubulata, rigida, ſtricta, mucronato-ſpinoſa.* Flores *paniculati.* Calyces *oblongi, acuti, quinquenervii.* Petala *lanceolata, alba.* Capſulae *oblongae, calyce paulo longiores.*

26. ARENARIA *tenuifolia.*
A. foliis ſubulatis, caule paniculato, capſulis erectis, petalis calyce brevioribus lanceolatis. *Pollich. pal. n.*

427. *Fl. dan. t.* 389. *Hoffm. germ.* 155. *Roth. germ. I.* 190. *II.* 485.

Arenaria foliis ſubulatis, calycinis laciniis membrana ipſis anguſtiore auctis acutiſſimis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 282.

Alſine tenuifolia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 364. *Vaill. pariſ.* 7. *t.* 3. *f.* 1.

β. Alſine (*viſcoſa*) caule paniculato foliisque pubeſcentibus, petalis capſulisque calyce pubeſcente brevioribus *Schreb. ſpicil. p.* 30.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 621.

Dünnblättriges Sandkraut. W.

Habitat in Germania, Helvetia, Gallia, Anglia, Italia. ⊙ (v. v.)

Calycis *foliola multum acuminata ſ. ariſtata, ſubtus lineis* 2 *viridibus picta.* Petala *lato-lanceolata, calyce* $\frac{1}{2}$ *breviora.* Folia *ſubulata, baſi connata.*

27. ARENARIA *laricifolia.*

A. foliis ſetaceis, caule ſuperne nudiuſculo, calycibus ſubhirſutis. *Sp. pl.* 607. *Iacq. auſt.* 3. *p.* 39. *t.* 272.

Alſine foliis linearibus, anguſtiſſimis, calycibus tubuloſis, villoſis. *Hall. helv. n.* 869.

Stellaria laricifolia. *Scop. carn. n.* 541. *t.* 18.

Alſine ſaxatilis, laricis folio, minor et minori flore. *Magnol. hort.* 11. *t.* 11.

Auricula muris pulchro flore, folio tenuiſſimo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 360. *Hall.*

Alſine alpina, junceo folio. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.

Lychnoides, juniperi folio, perennis. *Vaill. pariſ.* 121.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 622.

Lerchenbaumblättriges Sandkraut. W.

Habitat in montoſis Helvetiae, Genevae, Pariſiorum, Monſpelii. ♃ (v. v.)

Calyx *oblongus, lineatus, cylindricus, pubeſcens.*

28. ARENARIA *recurva.*

A. foliis lineari-ſubulatis ſulcatis recurvis ſecundis, caulibus procumbentibus, pedunculis ſubbifloris terminalibus erectis, calycibus ſtriatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 244. *t.* 6. *f.* 1. *

A. (*recurva*) foliis radicalibus congeſtis recurvis ſubulatis, caule ſimplici ſubtrifloro. *Allion. pedem. n.* 1713. *t.* 89. *f.* 3.

Alſine foliis ſulcatis recurvis, radicalibus linearibus congeſtis, caulinis lanceolatis. *Hall. helv. n.* 868.
Krummblättriges Sandkraut. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Italiae, Auſtriae, Moraviae. ♃ (v. ſ.)

*29. ARENARIA *lanceolata.*
A. foliis lineari-lanceolatis trinerviis margine ſcabris appreſſis, calycibus lanceolatis nervoſis. W.
Arenaria lanceolata. *Allion. pedem. n.* 1715. *t.* 26. *f.* 5.*
Lanzettenblättriges Sandkraut. W.
Habitat in alpibus Valdenſibus. ♃ (v. ſ.)

30. ARENARIA *ſtriata.*
A. foliis linearibus erectis appreſſis, calycibus oblongis ſtriatis. *Am. acad.* 4. *p.* 315.* *All. ped. n.* 1712. *t.* 26. *f.* 4.
Arenaria laricifolia. *Villars. delph.* 3. *p.* 629. *t.* 47.
Auricula muris pulchro flore, folio tenuiſſimo. *Bauh. pin.* 3. *p.* 361.
Caryophyllus ſaxatilis, polygoni minoris folio et facie. *Burſ. IX.* 129.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 623.
Geſtreiftes Sandkraut. W.
Habitat in alpibus Auſtriae *et* Vallis *auguſtae.* ♃ (v. ſ.)

*31. ARENARIA *filifolia.*
A. caulibus ſuffruticoſis dichotomis, foliis ſetaceis, pedunculis terminalibus ſimplicibus unifloris. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 33. *t.* 12. *
A. (*filifolia*) foliis filiformibus liberis. *Forſk. deſcr.* 211.
Fadenblättriges Sandkraut. W.
Habitat in Arabia. ♃

32. ARENARIA *faſciculata.*
A. foliis ſubulatis, caule erecto ſtricto, floribus faſciculatis, petalis breviſſimis. *Iacq. auſtr.* 2. *t.* 182.
A. caule paniculato ſtricto dichotomo, foliis ſubulatis ſtriatis, calycibus acuminatis nervoſis ſtriatis. *Gouan. illuſtr.* 30. R.
Stellaria rubra. *Scop. carn. n.* 538. *t.* 17. *ſec. Iacq.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 623.
Büſchligtes Sandkraut. W.
Habitat Monſpelii. *D. Gouan*; *in* Auſtria, Carniolia. ⊙ (v. v.)

Radix *annua.* Caulis *palmaris, pubeſcens.* Folia *linearia, acuminata, erecta, ſubciliata.* Flores *faſciculati, dichotomi, pedicellis breviſſimis.* Calyx *ere-*

atus: Foliolis ſubulatis, erectis, ſtriatis, ſubciliatis, longis. Petala *ovato-oblonga, alba, minutiſſima.* Antherae *didymae, globoſae.* Capſula *calyce dimidio brevior.* Habitus *Minuartiae.*

Planta *diſtincta ab* Alſine mucronata, *quae tenera, debilis, longa; accedit figura aliquatenus ad Hall. helv. t. 7. f. 2. ſed Folia caulis floresque longiora, rigidiora craſſiora (in mea) omnia. Plura vide ſub Alſine mucronata. Spec. plant. 1. p. 1512.*

*33. ARENARIA *auſtriaca.*

A. foliis linearibus, ramis erectis, pedunculis terminalibus longiſſimis binis, petalis obtuſis emarginatis. W.

A. (*auſtriaca*) caulibus ſuffruticoſis proſtratis inde herbaceis et erectis, foliis ſubulatis, floribus geminis, petalis emarginatis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 425. *Iacq. auſt.* 3. *t.* 270. *Allion. pedem. n.* 1708. *t.* 64. *f.* 2.

Arenaria triflora. *Vill. delph.* 3. *p.* 623. *t.* 47.

β. Stellaria (*biflora*) caulibus proſtratis ramoſiſſimis, ramis annuis erectis longiſſime bifloris, foliis linearibus acutis, calycibusque dorſo trinerviis, petalis calyce longioribus crenato-bifidis. *Iacq. Collect.* 1. *p.* 251. *t.* 18.*

Stellaria caule flaccido, foliis linearibus, pedunculis axillaribus ſubbifloris, altero ebracteato. *Gouan. illuſt. p.* 30.

Oeſtreichſches Sandkraut. W.

Habitat in Auſtriae *et* Italiae *alpibus.* ♃ (v. ſ.)

Varietas β. ut ex ſpecimine ſicco video, vix niſi foliis rigidioribus, diverſa. W.

34. ARENARIA *grandiflora.*

A. foliis ſubulatis planis ſtrictis: radicalibus confertis, caulibus unifloris. *Sp. pl.* 608. *All. ped. n.* 1711. *t.* 10. *f.* 1.

A. foliis lanceolatis, cauliculis multifloris, foliolis calycinis inaequalibus, exterioribus cordato-ovatis latioribus. *Gouan. illuſtr. n.* 30.

Arenaria juniperina. *Vill. delph.* 3. *p.* 624.

Alſine foliis ſulcatis, argute lanceolatis, petiolis unifloris. *Hall. helv. n.* 874.

Alſine uniflora et grandiflora, foliis acuminatis glabris, petalis integris. *Allion. ſpec. pedem.* 49. *t.* 10. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 624.

Groſsblütiges Sandkraut. W.

Habitat in montibus Neocomenſium, *alpibus* Valdenſium, Ceniſii, Monſpelii. ♃ (v. ſ.)

Calycis *foliola caulinis latiora*, *ſtriis pluribus*, *rigida*. Capſulae *oblongae*, *longitudine calycis*. Varietas *caule trifloro miſſa a D. Turra*.

35. ARENARIA *liniflora*.

A. caulibus erectis inferne ramoſis ſuffruticoſis, foliis ſubulatis, floribus geminis. *Lin. ſuppl.* 241.

A. foliis ſubulatis, caulibus ſuffruticoſis, floribus geminis. *Syſt. veg. p.* 355. *Iacq. Coll.* 2. *p.* 107. *t.* 3. *f.* 3.

Arenaria ſtriata. *Vill. delph.* 3. *p.* 630. *t.* 47.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 624.

Leinblütiges Sandkraut. W.

Habitat in Europa *auſtrali*. ♃

Caules *breves*, *diſtorti*, *perennantes*. Rami *annui*, *ſimpliciſſimi*, *erecti*. Folia *ſubulata*, *acuta*, *laevia*. Pedunculi *terminales*, *ſaepius* 2, *uno poſt alterum*. Calyx *foliolis lanceolatis* : *ſtriis* 2. Petala *obovata*, *alba*.

Caules *perennantes breves plures ramoſi diſtorti*. Rami *erecti ſimpliciſſimi teretes ſpithamaei*. Folia *ſubulata ſ. linearia teretia acuta laevia*. Pedunculi *terminales uniflori ſubpubeſcentes bini*, *unus poſt alterum*. Calyx *foliolis lanceolatis biſtriatis ſubpubeſcentibus*. Corolla *magnitudine Lini alba*. Petala *ovata obtuſa ſtriata*, *calyce duplo longiora*. Stamina piſtillaque *alba longitudine calycis*. Lin. ſuppl.

Differt ab A. grandiflora, foliis *non plano-gramineis*, calyce *foliolis non multiſtriatis*, caule *multo longiore*, *baſique ſuffruticoſo*.

*36. ARENARIA *Gerardi*. W.

A. foliis lineari-ſubulatis trinerviis, floribus geminis terminalibus, calycinis foliolis acuminatis margine membranaceis trinerviis. W.

Arenaria liniflora. *Iacq. auſt.* 5. *t.* 445.

A. foliis linearibus erectis ſubtus ſtriatis, floribus faſtigiatis inaequaliter pedunculatis. *Gerar. prov.* 405. *t.* 15. *f.* 1.

Gerardiſches Sandkraut. W.

Habitat in Auſtriae *et* Galliae *alpibus*. ♃ (v. ſ.)

Differt ab A. grandiflora: glabritie *partium*, caule *bifloro et aliis notis*. *Ab A. liniflora diverſa*: caulibus *brevioribus*, calycibus *acuminatis*, petalis *calyce parum longioribus et toto habitu*. *Synonymum Gerardi*, *a Linnaeo perperam ſub A. juniperina adductum re vera huc pertinere videtur*. W.

898. CHERLERIA.

Gen. pl. edit. Schreb. n. 775.

Cal. 5-phyllus. *Nectaria* 5, biſida, petaloidea. *Antherae* alternae, ſteriles. *Capſ.* 3-locularis, 3-valvis, triſperma.

1. CHERLERIA *ſedoides.*

Cherleria. *Hall. helv. n.* 859. *t.* 29. *opuſc.* 300. *t.* 1. *f.* 3. *Segu. ver.* 3. *p.* 180. *t.* 4. *f.* 3. *Iacq. auſtr. t.* 284. *Scop. carn. n.* 531.

Knawel affinis. *Hall. comm. nor.* 1736. *hebd.* 13. *t.* 1. *f.* 5. R.

Lychnis alpina, muſcoſis foliis denſius ſtipatis, floribus parvis, calyce duriore. *Pluk. alm.* 233. *t.* 42. *f.* 8.

Sedum montanum perpuſillum luteum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 14.

Sedum montanum perpuſillum, luteolis floribus. *Park. theatr.* 728.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 625.

Sedumartige Cherlerie. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Valeſiae, Gotthardo, Auſtria, Carniolia. ♃ (v. ſ.)

Folia *oppoſita, linearia, margine ſcabra, baſi connata in vaginam; a caſu foliorum remanent vaginae cum carina foliorum, quibus caulis inferne obveſtitur; hinc affinitas Caryophyllorum.*

*899. DEUTZIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 776.

Cal. campanulatus 5-fidus. *Petala* 5 obtuſa indiviſa. *Filamenta* trifida. *Capſ.* triariſtata 3-locul. 3-valv. baſi dehiſcens polyſperma.

*1. DEUTZIA *ſcabra.*

D. ſcabra. *Thunb. Diſſ. Nov. Pl. Gen.* 1. *p.* 20. *tab.* 1.* *Thunb. jap.* 185. *t.* 24. *

Joro. *Kaempf. amoen.* 854.

Scharfe Deutzie. W.

Habitat in Japonia. ♄

Rami *oppoſiti.* Folia *oppoſita ovata acuminata ſerrata venoſa ſcaberrima.* Racemi *terminales.* W.

*900. BRÜNNICHIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 777.

Cal. ventricoſus 5-fidus. *Cor.* o. *Capſ.* trigona unilocularis monoſperma.

*1. BRÜNNICHIA *cirrhoſa.*

B. cirrhoſa. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 214. *t.* 45. *f.* 2.
Rankende Brünnichie. W.
Habitat in Bahama.

901. GARIDELLA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 778.

Cal. 5-phyllus, petaloideus. *Nectaria* 5, bilabiata, bifida. *Capſ.* 3, connexae, polyſpermae.

1. GARIDELLA *Nigellaſtrum.*

Garidella. *Hort. cliff.* 170. *Hort. upſ.* 108. *Roy. lugdb.* 481. *Mill. dict. Kniph. cent.* 10. *n.* 45.
G. foliis tenuiſſime diviſis. *Garid. prov.* 203. *t.* 39.
Nigellaſtrum raris et foeniculaceis foliis. *Magn. hort.* 143. *t.* 143.
Nigella cretica, folio foeniculi. C. B. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 516. *ſ.* 12. *t.* 18. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 626.
Nigellenartige Garidelle. W.
Habitat in Galloprovincia. ☉ (v. v.)

902. MALPIGHIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 779.

Cal. 5-phyllus baſi extus poris binis melliferis. *Petala* 5, ſubrotunda, unguiculata. *Filamenta* baſi cohaerentia. *Drupa* 1-locularis tripyrena, nucibus monoſpermis.

1. MALPIGHIA *glabra.*

M. foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis umbellatis. *Hort. cliff.* 169. *Hort. upſ.* 108. *Roy. lugdb.* 459. *Mill. dict. n.* 1. *et ic. t.* 181. *f.* 2. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 406. *t.* 234. *f.* 1.*

M. fruticoſa erecta, foliis nitidis ovatis acuminatis, floribus umbellatis, ramulis gracilibus. *Brown. jam.* 230.
Ceraſus jamaicenſis, fructu tetrapyreno. *Comm. hort.* 1. *p.* 145. *t.* 75.
Arbor baccifera, folio ſubrotundo, fructu ceraſino ſulcato rubro polypyreno: oſſiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hiſt.* 2. *p.* 106. *t.* 207. *f.* 2. *Raj. dendr.* 74.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 645.
Glatte Malpighie. W.
Habitat in Jamaica, Braſilia, Surinamo, Curaſſao. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Umbellae *pedunculatae*, 4-*florae*. Pedicelli *geniculo unico.* Calyx 5-*phyllus, incurvus, baſi ſubtus glandulis foliorum*: 1, *nulla*; 2, 3. *proximis priori, unica*; 4, 5, *geminis glandulis.* Petala 5, *unguiculata, ſubcordata, ciliata, patentia.* Styli 3. Stigmata *ſimplicia cum guttula.*

*2. MALPIGHIA *biflora.*
M. foliis oblongis integerrimis utrinque acutis glabris, pedunculis bifloris. W.
M. (*biflora*) foliis ovato-lanceolatis acutiſſimis, pedunculis bifloris. *Lamarck encyclop.* 4. *p.* 303. *
M. (*punicifolia*) foliis ovatis acutis glabris, pedunculis bifloris. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 406. *t.* 234. *f.* 2. *
Zweyblütige Malpighie. W.
Habitat in ſylvis Americae *calidioris.* ♄

3. MALPIGHIA *punicifolia.*
M. foliis ovatis integerrimis glabris, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 609. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 303. *
M. foliis ovatis integerrimis glabris. *Hort. upſ.* 108.
Malpighia fruticoſa erecta, ramulis gracilibus patentibus, floribus ſolitariis. *Brown. jam.* 230.
Malpighia mali punici facie. *Plum. gen.* 46. *t.* 166. *f.* 2.
Ceraſus americana, myrti conjugatis foliis, fructu acerbo tetrapyreno. *Pluk. alm.* 94. *t.* 157. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 646.
Granatblättrige Malpighie. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*4. MALPIGHIA *faginea.*
M. foliis oblongo-ovatis integerrimis, ſubtus ſericeo-nitentibus, pedunculis tripartito-umbellatis. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 850. *
Buchenblättrige Malpighie. W.

Habitat in inſula Grenada Americes. ♄

*5. MALPIGHIA *glanduloſa.*

M. foliis ovato-ellipticis acuminatis integerrimis glabris, baſi biglanduloſis, racemis axillaribus. W.

M. foliis lanceolatis acuminatis baſi biglanduloſis: floribus racemoſis monogynis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 411. *t.* 239. *f.* 2.*

β. M. (*glandulifera*) foliis ovatis ſubintegerrimis, utrinque pilis decumbentibus obſeſſis, racemis axillaribus, pedicellis ſuperne glandula truncata inſtructis. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 469. *Collect.* 4. *p.* 207. *et Collect. ſuppl. tab.* 5. *f.* 3.

Drüſige Malpighie. W.

Habitat in Antillis; β. *in ſylvis ad* Caracas. ♄

Varietas β. *differt modo* foliis *latioribus pubeſcentibus uniglanduloſis.* W.

*6. MALPIGHIA *tuberculata.*

M. foliis ovato-lanceolatis integerrimis ſubpubeſcentibus, racemis lateralibus, ramis tuberculatis. W.

M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, utrinque parciſſime piloſis, racemis axillaribus, ramis tuberculatis. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 54. *t.* 104.*

Warzige Malpighie. W.

Habitat ad Caracas Americes. ♄

7. MALPIGHIA *nitida.*

M. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus monogynis. W.

M. foliis lanceolatis integerrimis glabris, ſpicis lateralibus. *Sp. pl.* 609. *Swartz obſ.* 180.*

M. foliis lanceolatis acuminatis eglanduloſis utrinque nitidis, floribus racemoſis monogynis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 411. *t.* 239. *f.* 1.*

M. foliis oblongo-ovatis utrinque nitidis, racemis axillaribus. *Iacq. amer.* 136.

M. humilis et minus diviſa, foliis ovatis nitidis, baccis durioribus. *Brown. jam.* 230.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 647.

Glänzende Malpighie. W.

Habitat in Jamaicae *apricis cretaceis.* ♄

Stylus *unicus. Iacq.*

*8. MALPIGHIA *Armeniaca.*

M. foliis ovato-oblongis acutis integerrimis coriaceis glabris, racemis axillaribus. W.

M. foliis ovato-lanceolatis magnis, ſpicis longis axillaribus, fructu armeniaco. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 410. *t.* 238.*
Apricoſenfrüchtige Malpighie.
Habitat in regno Peruviano *in* Chancae *provincia.* ♄
Fructus *facie, magnitudine et colore refert Prunum Armeniacam* W.

*9. MALPIGHIA *dubia.* †
M. foliis oblongis acutiuſculis integerrimis glabris, racemis axillaribus terminalibusque, ramis punctatis. W.
M. foliis ovato-acutis cartilagineis glabris, floribus racemoſis minimis, ramis punctatis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 413. *t.* 242.*
Zweifelhafte Malpighie. W.
Habitat in inſula St. Dominici. ♄
Fructus *adhuc ignotus, forte Baniſteriae ſpecies.* W.

10. MALPIGHIA *urens.*
M. foliis oblongo-ovatis: ſetis decumbentibus rigidis, pedunculis unifloris aggregatis. *Mill. dict. n.* 4. *et ic. t.* 181. *f.* 1. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 407. *t.* 235. *f.* 1.*
M. foliis oblongis hiſpidis, racemis alaribus. *Brown. jam.* 229.
M. latifolia, folio ſubtus ſpinoſo. *Plum. gen.* 46. *t.* 167. *f.* 1.
Meſpilus americana, folio lato ſubtus ſpinoſo, fructu rubro. *Tournef. inſt.* 642.
Arbor baccifera, folio oblongo ſubtiliſſimis ſpinis ſubtus obſito, fructu ceraſino ſulcato polypyreno: oſſiculis canaliculatis. *Sloan. jam.* 172. *hiſt.* 2. *p.* 106. *t.* 207. *f.* 3. *Raj. dendr.* 74.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 648.
Brennende Malpighie. W.
Habitat in America *calidiore.* (v. ſ. ſ. fl.)
Folia *ovato-oblonga, integerrima, ſubpetiolata, adſperſa, imprimis ſubtus, ſetis rigidis adpreſſis pungentibus, geminis: altera anteriore.* Stipulae *utrinque* 2. Flores *axillares utrinque* 4, *pedunculis unifloris, geniculo inſtructis.*

11. MALPIGHIA *anguſtifolia.*
M. foliis lineari-lanceolatis: ſetis utrinque decumbentibus rigidis, pedunculis umbellatis. *Sp. pl.* 610. *Mill. dict. n.* 7. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 408. *t.* 236. *f.* 1.*
M. (*linearis*) foliis lanceolato-linearibus, ſetis decumbentibus utrinque rigidis. *Jacq. amer. p.* 135.

M. anguſtifolia, folio ſubtus ſpinoſo. *Plum. gen.* 46
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 649.
Schmalblättrige Malpighie. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*12. MALPIGHIA *caneſcens.*
M. foliis oblongis obtuſis pubeſcentibus, racemis axillaribus compoſitis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 105.
Graue Malpighie. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

13. MALPIGHIA *craſſifolia.*
M. foliis obovatis acutis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis ovatis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 610. *Aubl. guj.* 1. *p.* 457. *t.* 182.* *Swartz obſ.* 181.
M. arborea, foliis ſubrotundis alternis inferne ſublanuginoſis, ſpicis craſſis compoſitis terminalibus. *Brown. jam.* 231.
M. latifolia, cortice ſanguineo. *Barr. aequin.* 72?
β. M. (*Moureila*) foliis ovatis ſubtus tomentoſis, floribus luteis ſpicatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 459. *t.* 183. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 412. *t.* 241.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 650.
Dickblättrige Malpighie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

Arbor. Foliis *ovatis palmaribus craſſis ſubpetiolatis integerrimis, ſupra pubeſcentibus, ſubtus tomentoſis, ſaepius alternis.* Racemi *terminales longi tomentoſi.*

*14. MALPIGHIA *ſpicata.*
M. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus ſubtomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis lanceolatis. deſuper ferrugineis, ſpicis terminalibus, petalis haſtatis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 409. *t.* 237.*
Aehrentraubige Malpighie. W.
Habitat in inſula St. Dominici. ♄

*15. MALPIGHIA *altiſſima.*
M. foliis oblongis acuminatis obtuſis integerrimis, ſetis decumbentibus tectis, ſubtus tomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis, floribus al-

bis ſpicatis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 455. *t.* 181. * *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 413.
Höchſte Malpighie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

16. MALPIGHIA *verbaſcifolia.*
M. foliis obovatis acutis integerrimis utrinque tomentoſis, racemis terminalibus. W.
M. foliis lanceolato-ovatis tomentoſis integerrimis, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 610. *Aubl. guj.* 1. *p.* 460. *t.* 184. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 411. *t.* 240.
M. humilis, verbaſci folio et facie, caule craſſiſſimo. *Barr. aequin.* 71.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 650.
Müllenblättrige Malpighie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄
Folia *lanceolato-ovata, in petiolos deſinentia,* pedalia, *villoſa, ſubtus denſiſſimo tomento veſtita.* Racemi *terminales, longi, villoſi.*

*17. MALPIGHIA *lucida.*
M. foliis obovatis cuneiformibus integerrimis aveniis nitidis, racemo terminali. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 852. * *Mill. dict.*
Polirte Malpighie. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

*18. MALPIGHIA *coriacea.*
M. foliis ovatis acutis integerrimis utrinque glabris, racemis terminalibus ſpicatis. *Swartz prod.* 74. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 854. *
M. arborea, floribus ſpicatis, foliis ovatis acuminatis. *Brown. jam.* 236.
Tiliae affinis laurifolia, arbuti floribus albis racemoſis, odoratis, fructu pentagono. *Sloan. jam.* 136. *hiſt.* 2. *p.* 20. *t.* 163. *f.* 1.
Lederblättrige Malpighie. W.
Habitat in fruticetis montium Jamaicae *auſtralis.* ♄

19. MALPIGHIA *aquifolia.*
M. foliis lanceolatis dentato-ſpinoſis ſubtus hiſpidis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 409. *t.* 236. *f.* 2.
M. ilicifolia. *Mill. dict. n.* 8. *deſcriptio n.* 9.
M. anguſtis et acuminatis aquifolii foliis. *Plum. gen.* 46 *ic.* 168. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 651.

Hülſenblättrige Malpighie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

20. MALPIGHIA *coccifera.*

M. foliis ſubovatis dentato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 408. *t.* 235. *f.* 2. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 470. *Collect.* 2. *p.* 311.*

M. humilis, ilicis cocciglandiferae foliis. *Plum. gen.* 46. *ic.* 168. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 652.

Stachelblättrige Malpighie. W.

Habitat in Ameria *calidiore.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Planta *junior profert folia elliptica absque dentibus ſpinoſis, qualem depinxit Lamarck illuſt. gen. t.* 381. *f.* 2. W.

903. BANISTERIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 780.

Cal. 5-partitus, baſi extus poris binis melliferis. *Petala* ſubrotunda, unguiculata. *Filamenta* baſi cohaerentia. *Samarae* 3, 1-ſpermae apice ſimpliciter alatae.

1. BANISTERIA *anguloſa.*

B. foliis cordatis panduriformibus anguloſis, petiolis biglanduloſis, umbella terminali. W.

B. foliis ſinuato-anguloſis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 426. *t.* 252.*

Acer ſcandens, folio anguloſo. *Plum. ſpec.* 18.

Clematis anguloſo folio, aceris fructu. *Plum. amer.* 77. *t.* 92. *Raj. ſuppl.* 328.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 591.

Eckige Baniſterie. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

2. BANISTERIA *palmata.* †

B. foliis cordatis quinquelobo-palmatis, ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis. W.

B. caule volubili, foliis palmatis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 430. *t.* 257. *f.* 2.*

Handförmige Baniſterie. W.

Habitat in inſula St. Domingo. ♄

3. BANISTERIA *ſagittata.* †

B. foliis haſtato-ſagittatis, lobis truncatis, ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis. W.

B. caule volubili, foliis ſagittatis magnis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 430. *t.* 257. *f.* 3. *

Pfeilblättrige Baniſterie. W.

Habitat in inſula St. Domingo. ♄

*4. BANISTERIA *auriculata.*

B. foliis cordato-ſagittatis glabris, petiolis biglanduloſis, umbella terminali. W.

B. caule volubili, foliis ſubſagittatis glabris, lobis rotundatis, floribus umbellatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 428. *t.* 255. *

Ampferblättrige Baniſterie. W.

Habitat in Braſilia *prope* Rio Janeiro. ♄

*5. BANISTERIA *ciliata.*

B. foliis orbiculato-cordatis ciliato-denticulatis glabris, petiolis biglanduloſis, umbella terminali. W.

B. foliis cordato-ſubrotundis auriculatis glabris, margine ciliatis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 364. * *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 427. *t.* 254. *

Gefranzte Baniſterie. W.

Habitat in Braſilia. ♄

6. BANISTERIA *emarginata.*

B. foliis ellipticis ſubcordatis obtuſis emarginatis mucronatis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis, racemis terminalibus axillaribusque. W.

B. foliis ovatis ſubcordatis apice emarginato-cuſpidatis, deſuper tomentoſis, floribus racemoſo-corymboſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 425. *t.* 249. *

Ausgerandete Baniſterie. W.

Habitat in America. W.

Caulis *dichotomus.* Racemi *corymboſi in apice ramorum et in dichotomia caulis.* W.

7. BANISTERIA *Quapara.*

B. foliis ovatis acutis, ſubtus tomentoſis, umbella pedunculata axillari. W.

B. foliis ovatis, ſubtus tomentoſis, floribus corymboſis, ſeminibus erectis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 464. *t.* 186. * *Cavan. diſſ. p.* 425. *t.* 250. *

Winkeldoldige Baniſterie. W.

Habitat ad pratorum margines Gujanae. ♄

*8. BANISTERIA *ſinemarienſis.*

M. foliis ovatis acuminatis glabris ſetis adpreſſis tectis, umbellis racemoſis axillaribus. W.

β. foliis ovatis acuminatis, floribus luteis corymboſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 462. *t.* 185. * *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 425. *t.* 251. *

Sinemarienſiſche Baniſterie. W.

Habitat in Gujana *ad pratorum margines.* ♄

Racemi *axillares ex umbellis pedunculatis compoſiti.* W.

. BANISTERIA *purpurea.*

B. foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis glabris, racemis axillaribus terminalibusque. W.

B. foliis ovatis, ſpicis lateralibus, ſeminibus erectis. *Sp. pl.* 611. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 423. *t.* 246 *f.* 1.*

B. foliis pinnatis: foliolis ovatis, ſpicis lateralibus, ſeminibus erectis. *Mill. dict. n.* 7.

Acer ſcandens, pſeudoacaciae folio, flore purpuraſcente. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 15.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 592.

Purpurfarbene Baniſterie. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ.)

10. BANISTERIA *microphylla.* †

B. foliis ellipticis utrinque rotundatis glabris, racemis terminalibus ſubpaniculatis. W.

B. foliis oblongis obtuſis rigidis, racemis terminalibus. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 7. *t.* 56. *

Kleinblättrige Baniſterie. W.

Habitat in Carolina? ♄

11. BANISTERIA *chryſophylla.*

B. foliis elliptico-ovatis acutis ſubtus tomentoſis, corymbis axillaribus. W.

B. foliis ovato-oblongis acutiuſculis, verſus apicem obſolete ſinuatis, ſubtus tomentoſo-nitidis aureis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 364. *

B. ramis tuberculatis, foliis ovato-acutis, deſuper tomentoſo-aureis, [illegible] longiſſimis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 422. *t.* 245. *

B. foliis oblongis acutis, ſuperne repandulis, ſupra glaberrimis, ſubtus tomentoſo-nitidiſſimis, floribus paniculatis axillaribus. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 55. *t.* 105. *

Goldblättrige Baniſterie. W.

Habitat in Braſilia *etiam ad* Caracas. ♄

12. BANISTERIA *laurifolia.*

B. foliis ovato-oblongis rigidis, racemis terminalibus. *Sp. pl.* 611. *Mill. dict. Swartz obſ.* 182. *

Acer ſcandens, foliis laurinis. *Sloan. jam.* 137. *hiſt.* 2. *p.* 26. *Raj. dendr.* 94.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 592.

Lorbeerblättrige Baniſterie. W.

Habitat in Jamaicae *et* Hiſpaniolae *fruticetis montium.* ♄

*13. BANISTERIA *coerulea.*

B. foliis elliptico-ovatis acutis glabris, racemis terminalibus paniculatis. W.

B. foliis ovatis acutis, racemis axillaribus brachiatis, capſulis trinis monopteris divaricatis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 363. *

B. ramis tuberculatis, foliis ovato-acutis coriaceis, racemis florum axillaribus. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 421. *t.* 243. *

Acer ſcandens foliis citri, flore coeruleo ſpicato. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 14.

Blaue Baniſterie. W.

Habitat in inſulis Jamaica *et* St. Dominici. ♄

*14. BANISTERIA *nitida.*

B. foliis lanceolatis ſubtus argenteis, racemis terminalibus paniculatis. W.

B. foliis ovato-oblongis integerrimis ſubtus nitidis, panicula terminali folioſa. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 364. * *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 422. *t.* 244. *

Silberglänzende Baniſterie. W.

Habitat in Braſilia. ♄

*15. BANISTERIA *muricata.*

B. foliis ovatis ſubtus tomentoſis, racemis paniculatis terminalibus, ſamaris quinque aculeatis. W.

B. foliis ovato-acutis ſubtus tomentoſis, florum racemis axillaribus, ſcrotulis muricatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 423. *t.* 246. *f.* 2. *

Stachelfrüchtige Baniſterie. W.

Habitat in Peru. ♄

Samara *quaelibet baſi quinque aculeis brevibus eſt armata.* W.

*16. BANISTERIA *leona.*

B. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis reticulato-venoſis glabris, ramis paniculatis terminalibus. W.

B. ramis tuberculatis, foliis ovatis apice acuminatis co-

riaceis, floribus paniculatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 424. *t.* 247. *
Netzblättrige Baniſterie. W.
Habitat in Sierra Leone. ♄

*17. BANISTERIA *ſericea.* †
B. foliis ellipticis obtuſis cuſpidatis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis, racemis paniculatis terminalibus. W.
B. ramis ancipitibus, foliis ovatis ſubtus tomentoſis, petiolis biglanduloſis, floribus racemoſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 429. *t.* 258. *
Seidenartige Baniſterie. W.
Habitat in Braſilia. ♄

*18. BANISTERIA *ferruginea.*
B. foliis ovatis acuminatis ſubtus ferrugineis, racemis paniculatis, ramulis ſquamoſis. W.
B. foliis ovato-acuminatis ſubtus ferrugineis, floribus paniculatis, horum ramulis ſtipulatis, ſtipulis imbricatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 424. *t.* 248. *
Roſtfarbene Baniſterie. W.
Habitat in Braſilia *ad* Rio Janeiro. ♄

*19. BANISTERIA *longifolia.*
B. foliis oblongis acuminatis rigidis nitidis, panicula terminali, ramis patentiſſimis. *Swartz prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 856. *
Langblättrige Baniſterie. W.
Habitat in Caribaeis *in* St. Luciae. ♄

20. BANISTERIA *dichotoma.*
B. foliis ovatis, racemis dichotomis. *Sp. pl.* 612.
B. foliis ovatis, ramis dichotomis, ſeminibus extrorſum tenuioribus, introrſum lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *
B. (*convolvulifolia*) foliis ovatis acumine productis glabris, floribus umbellatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 428. *t.* 256? *
Acer ſcandens, convolvuli folio, flore ex aureo cinereo. *Plum. ſpec.* 18. *ic.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 593.
Gabelförmige Baniſterie. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

*21. BANISTERIA *ovata.*
B. foliis ovato-lanceolatis ſubtus ſubvilloſis, petiolis biglanduloſis, ramis divaricatis, umbellis terminalibus. W.

B. caule volubili, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus umbellatis, involucris ſtipulaceis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 429. *t.* 257. *f.* 1. *
Eyförmige Baniſterie. W.
Habitat in inſula St. Dominici. ♄

22. BANISTERIA *fulgens.*
B. foliis ſubovatis ſubtus tomentoſis, racemis brachiatis, pedunculis umbellatis. *Sp. pl.* 612.
B. foliis ovatis, ramis ramoſis, ſeminibus extrorſum tenuioribus, introrſum lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *
B. foliis orbiculatis, petiolis biglandulis, ſeminibus unialatis rugoſis, racemis ſubumbellatis alaribus. *Brown. jam.* 231.
Triopteris americana ſcandens, fructu fulgente majore aureo. *Pluk. mant.* 185.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 594.
Ausgebreitete Baniſterie. W.
Habitat in America. ♄

*23. BANISTERIA *heterophylla.* W.
B. foliis ſubtus tomentoſis orbiculato-cordatis, ramis divaricatis ſubrotundis, petiolis biglanduloſis, umbella terminali ſeſſili. W.
B. (*fulgens*) caule volubili, foliis orbiculatis ſubtus tomentoſis ſericeis, petiolis biglanduloſis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 426. *t.* 253. *
Baniſteria fulgens. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 363. *
Acer ſcandens minus apocyni facie, folio ſubrotundo. *Sloan. jam.* 138. *hiſt* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 2. *Raj. dendr.* 94.
Verſchiedenblättrige Baniſterie. W.
Habitat in Jamaica, St. Domingo, Guadalupe.

24. BANISTERIA *brachiata.*
B. foliis ſubovatis, ramis brachiatis, ſeminibus introrſum anguſtioribus. *Sp. pl.* 612.
B. foliis ſubovatis, ramis ramoſis, ſeminibus introrſum tenuioribus nullam lacinulam emittentibus. *Hort. cliff.* 169. *
B. foliis ovatis acuminatis, floribus laxe ſpicatis, ramis diffuſis ſcandentibus. *Mill. dict.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 594.
Ausgebreitete Baniſterie. W.
Habitat in America.

904. HIRAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 781.

Cal. 5-phyllus, absque poris melliferis. *Pet.* ſubrotunda, unguiculata. *Filamenta* baſi cohaerentia. *Samarae* 3, 1-ſpermae bialatae ſ. ala circumdatae.

1. HIRAEA *reclinata.*

H. foliis ſimplicibus obovatis obtuſis ſuperne pubeſcentibus, inferne glabris. W.

Hiraea. *Jacq. amer.* 137. *t.* 176. *f.* 42.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 595.

Zurückgebogene Hiraea. W.

Habitat Carthagenae *in ſylvis.* ♄

*2. HIRAEA *odorata.* W.

H. foliis ſimplicibus ovatis acutis ſuperne glabris, inferne tomentoſis. W.

Wohlriechende Hiraea. W.

Habitat in Guinea. ♄ (v. ſ.)

Folia *oppoſita ovata acuta integerrima venoſa ſuperne atro-viridia glabra, inferne tomento flaveſcenti villoſo adpreſſo tecta.* Racemi *copioſi ad ramorum apicem in omnium foliorum axillis formant paniculam foliaceam terminalem.* Pedunculi *et* Pedicelli *pubeſcentes.* Flores *non vidi, ſecundum Clariſſ. Iſert, fragrantes.* Fructus *exacte ſequentis ſpeciei.* W.

*3. HIRAEA *pinnata.*

H. foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-oblongis alternis utrinque glabris. W.

Flabellaria paniculata. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 436. *t.* 264.*

Gefiederte Hiraea. W.

Habitat in Sierra Leone. ♄

905. TRIOPTERIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 782.

Cal. 5-partitus baſi extus poris 2 melliferis. *Petala* ſubrotunda unguiculata. *Filamenta* baſi cohaerentia. *Samarae* 3, 1-ſpermae 3-ſ. 4-alatae.

1. TRIOPTERIS *jamaicenſis.*

T. foliis oblongis acuminatis venoſis nitidis, racemis

compoſitis terminalibus laxis, fructibus trialatis. *Swartz obſ.* 183. *
Triopteris jamaicenſis. *Sp. pl.* 612.
Triopteris. *Hort. cliff.* 169. *
Baniſteria capſulis trialatis, foliis ovato-acuminatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 231.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 596.
Jamaiſcher Dreyflügel. W.
Habitat ad ſepes Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄
Caulis *volubilis*. Fructus *Baniſteriae*. Capſulae 3, *diſtinctae, monoſpermae, trialatae.*

*2. TRIOPTERIS *indica*. W.

T. foliis ſubrotundo-ovatis ſubcordatis acuminatis nitidis glabris, racemis compoſitis terminalibus, fructibus trialatis. W.
Indiſcher Dreyflügel. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Folia *oppoſita petiolata quadriuncialia ſubrotundo-ovata acuminata, baſi leviter cordata integerrima utrinque glabra, ſuperne nitida.* Petioli *pubeſcentes eglanduloſi.* Folia *juniora pubeſcentia.* Panicula *e racemis compoſita terminalis ſtricta.* Pedunculi, pedicelli *et* calyces *pubeſcentes.* Samarae *tres trialatae.* Alae *obtuſae glabrae, aequales venoſae.* W.

*3. TRIOPTERIS *ovata*.

T. foliis ovatis obtuſiuſculis ſubcordatis glabris, petiolis biglandulоſis, racemis compoſitis terminalibus, fructibus trialatis. W.
T. (*ovata*) foliis ovatis ſubcordatis integerrimis glabris, floribus paniculatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 431. *t.* 259. *
Eyförmiger Dreyflügel. W.
Habitat in inſula St. Dominici. ♄

*4. TRIOPTERIS *rigida*.

T. foliis ſubrotundis acutis marginatis lineatis coriaceis, racemis compoſitis axillaribus, fructibus trialatis. *Swartz. prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 859. *
Steifer Dreyflügel. W.
Habitat in fruticetis montoſis Hiſpaniolae. ♄
Proxima T. jamaicenſi, ſed foliis *rotundioribus rigidiſſimis lineatis diverſiſſima.* Swartz l. c.

*5. TRIOPTERIS *acutifolia*.

T. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, panicula terminali, fructibus quadrialatis, alis aequalibus. W.

Tetrapteris (*acutifolia*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, floribus paniculatis terminalibus. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 433. *t.* 261. *
Spitzblättriger Dreyflügel. W.
Habitat in Cajenna. ♄

*6. TRIOPTERIS *acuminata*. W.

T. foliis oblongis acuminatis glabris, umbellis paniculatis terminalibus, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. W.
Tetrapteris (*mucronata*) foliis ovatis mucronatis glabris, floribus umbellatis. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 434. *t.* 262. *f.* 2. *
Langzugeſpitzter Dreyflügel. W.
Habitat in Cajenna. ♄

Folia *ſunt acuminata, acumine producto, nec mucronata.* W.


*7. TRIOPTERIS *buxifolia*.


T. foliis oblongis obtuſiuſculis glabris, umbella terminali, fructibus quadrialatis, alis ſubaequalibus. W.
Tetrapteris (*buxifolia*) foliis ovatis ſubſeſſilibus parvis, floribus umbellatis terminalibus. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 434. *t.* 262. *f.* 1. *
Buchsbaumblättriger Dreyflügel. W.
Habitat in Antillis. ♄

*8. TRIOPTERIS *citrifolia*.

T. foliis ovato-oblongis acutis glabris, umbellis axillaribus pedunculatis, fructibus quadrialatis, alis binis inferioribus brevioribus. W.
T. foliis oblongis integris utrinque glabris, racemis axillaribus, ramis dichotomis, capſulis quadrialaribus. *Swartz prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 857. *
Tetrapteris (*inaequalis*) foliis ovato-acutis ſubcordatis glabris, floribus umbellatis, alis inferioribus brevioribus. *Cavan. diſſ.* 9. *p.* 433. *t.* 260. *
Acer ſcandens tricoccos folio citri, flore luteo maiore. *Plum. ic.* 9. *t.* 16.
Citronenblättriger Dreyflügel. W.
Habitat in ſylvis montium Jamaicae. ♄

[redacted]










IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



6"





Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

906. ERYTHROXYLON.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 783.

Cal. turbinatus. *Cor.* petalis baſi ſquamula nectarifera emarginata. *Stam.* baſi connexa. *Drupa* 1-locularis.

1. ERYTHROXYLON *areolatum.*

E. foliis obovatis mucronatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. W.

E. foliis obovatis mucronatis, ramulis brevibus floriferis ſquamoſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 59.

E. foliis obovatis, floribus lateralibus. *Swartz obſ.* 184.*

E. foliis obovatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 397.

E. carthagenenſe. *Jacq. amer.* 134. *t.* 87. *f.* 1.*

E. foliis ellipticis lineis binis longitudinalibus ſubtus notatis, faſciculis florum ſparſis. *Brown. jam.* 278. *t.* 38. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 653.

Weichſtachliges Rothholz. W.

Habitat in maritimis arenoſis circa Carthagenam. ♄ (v. ſ.)

*2. ERYTHROXYLON *hypericifolium.*

E. foliis obovatis emarginatis, pedunculis lateralibus ſubſolitariis flore triplo longioribus. W.

E. foliis obovatis emarginatis, ramis floriferis, pedunculis axillaribus ſolitariis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 60.*

E. foliis obovatis obtuſis emarginatis, ramulis compreſſis punctato-ſcabris, pedunculis capillaceis unifloris ſolitariis axillaribus. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 590.*

E. foliis numeroſis ovatis, ramis punctato-ſcabris, pedunculis longis capillaribus, fructu triloculari. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 403. *t.* 230.*

β. foliis duplo minoribus non emarginatis. *Cavan. l. c. t.* 230. *f.* x.

Johanniskrautblättriges Rothholz. W.

Habitat in inſula Mauritii et Borbon. ♄

Pedunculi *ſunt ſolitarii vel geminati.* W.

*3. ERYTHROXYLON *buxifolium.*

E. foliis obovatis mucronatis, pedunculis axillaribus ſolitariis longitudine floris. W.

E. foliis obovatis integerrimis, nervo medio ſupra elevato, pedunculis axillaribus brevibus ſolitariis baſi utriculatis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 590.*

E. foliis lanceolato-ovatis, nervo ſupra protuberante in ſetulam terminato, floribus axillaribus ſolitariis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 403. *t.* 231. *f.* 1.*
Buchsbaumblättriges Rothholz. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄
Folia *ſubtus glauca ut in praecedentibus, ſed diſtinctum:* ramulis *longioribus,* ſquamis *ſparſis lanceolatis longitudine petioli et notis ſupra indicatis.* W.

*4. ERYTHROXYLON *ferrugineum.*
E. foliis ellipticis retuſis ſubtus ferrugineis, pedunculis ſolitariis axillaribus longitudine floris. W.
E. foliis ovatis ſaepius emarginatis, ſquamulis imbricatis, floribus ſolitariis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 404. *t.* 131. *f.* 2.*
Braunblättriges Rothholz. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄
Eſt varietas praecedentis ſecundum Clariſſ. Lamarck, ſed foliorum forma et colore diſtinctiſſimum. W.

*5. ERYTHROXYLON *rufum.*
E. foliis oblongis obtuſis baſi attenuatis, pedunculis lateralibus aggregatis flore duplo longioribus. W.
E. foliis oblongis obtuſiſſimis baſi acutis, axillis multifloris, ſquamis ovatis acutis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 33.*
E. foliis ovatis coriaceis inferne rufis, ſquamulis imbricatis, axillis multifloris. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 404. *t.* 232.*
Rothbraunes Rothholz. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

6. ERYTHROXYLON *havanenſe.*
E. foliis oblongis obtuſis baſi acutis, pedunculis axillaribus ſubgeminatis longitudine floris. W.
E. foliis ellipticis, floribus axillaribus. *Swartz obſ.* 185.
E. foliis ovatis. *Iacq. amer.* 135. *t.* 87. *f.* 2.*
E. (*ovatum*) foliis ovatis, ſquamulis imbricatis, floribus ſubſolitariis, drupa gibboſa. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 404. *t.* 233.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 655.
Havanſches Rothholz. W.
Habitat Havanae *in rupeſtribus maritimis.* ♄

*7. ERYTHROXYLON *Coca.*
E. foliis oblongis obtuſiuſculis venoſis, ſubtus trilineatis, pedunculis lateralibus ſparſis flore brevioribus. W.
E. foliis ovatis acutis ſubtrilineatis, ramulis crebre tuberculoſis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 389.*

E. foliis ovatis, lineis duabus ſubtus notatis, ramulis crebre tuberculatis. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 402. *t.* 229. *
Myrto ſimilis indica fructu racemoſo. *Bauh. pin.* 469.
Coca. *Cluſ. exot.* 177. 340. *Hernand. mex.* 302.
Peruvianiſches Rothholz. W.
Habitat in Peru. ♄
Folia *venoſa, ſubtus vero, utrinque ad coſtam mediam a baſi ad apicem excurrit linea nervoſa.* W.

*8. ERYTHROXYLON *Sideroxyloides.*
E. foliis oblongis acutiuſculis baſi attenuatis, pedunculis lateralibus ſparſis longitudine floris. W.
E. foliis ovato-oblongis obtuſiuſculis, ramis ſcabris apice compreſſis, pedunculis ſubternis axillaribus. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *
E. foliis obovatis, ramis tuberculatis, ſquamulis acutis, axillis paucifloris. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 401. *t.* 228. *
Arbor indica pruni ſylveſtris folio, corni maris fructu longiore. *Pluk. amalth.* 21.
Santalum nigrum. *Pluk. amalth.* 187. *t.* 442. *f.* 3. *
Eiſenholzartiges Rothholz. W.
Habitat in inſula Borbon. ♄

*9. ERYTHROXYLON *ſquamatum.*
E. foliis oblongis acuminatis baſi attenuatis, ramulis floriferis nudis, pedunculis confertis flore triplo longioribus. W.
E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis obtuſis, ramulis ſquamoſis floriferis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 60. *t.* 63. *
E. foliis ovatis acuminatis, ramulis ſquamoſis, drupis acutis. *Swartz. prod.* 75. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 861. *
Schuppiges Rothholz. W.
Habitat in Cajenna *inque* Caribaeis. ♄ (v. ſ.)

*10. ERYTHROXYLON *macrophyllum.*
E. foliis oblongis acutis baſi attenuatis, pedunculis axillaribus aggregatis longitudine floris. W.
E. foliis ellipticis acuminatis, axillis multifloris, ſquamis lanceolato-ſubulatis ſemiamplexicaulibus ſtriatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 33. *
E. foliis ellipticis acutis, floribus axillaribus lateralibusque aggregatis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 60. *
E. foliis lanceolatis longiſſimis, ſquamulis amplexicaulibus ſtriatis, axillis multifloris, fructu triloculari. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 401. *t.* 227. *

Groſsblättriges Rothholz. W.
Habitat in Cajenna. ♄

11. ERYTHROXYLON *laurifolium.*
E. foliis lanceolatis acutiuſculis, ramulis floriferis nudis terminalibus, pedunculis aggregatis confertis flore triplo longioribus. W.
E. foliis ovato-lanceolatis, ramulis ſquamis amplexicaulibus acutis concavis ſparſis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *
E. foliis lato-lanceolatis, ſquamis acutis concavis, floribus glomeratis terminalibus. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 400. *t.* 226. *
Lorbeerblättriges Rothholz. W.
Habitat in inſula Mauritii. ♄

12. ERYTHROXYLON *longifolium.*
E. foliis lanceolatis obtuſis, pedunculis axillaribus ſubaggregatis flore duplo longioribus. W.
E. foliis oblongis glabris integerrimis, pedunculis ſubſolitariis. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 390. *
E. foliis oblongis craſſis nitidis, ſquamulis acutis deciduis, floribus axillaribus. *Cavan. diſſ.* 8. *p.* 399. *t.* 225. *
Langblättriges Rothholz. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

PENTAGYNIA.

907. AVERRHOA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 784.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, ſuperne patentia. *Stam.* annulo nectarifero inſerta, alterna breviora. *Pomum* 5-gonum, 5-loculare.

1. AVERRHOA *Bilimbi.*
A. foliolis ovato-lanceolatis, fructibus oblongis obtuſangulis. W.
A. caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtuſangulis. *Fl. zeyl.* 177. *
A. foliis pinnatis cum impari, foliolis ovato-lanceolatis ſubaequalibus. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 373. *t.* 219. *
Blimbingum teres. *Rumph. amb.* 1. *p.* 118. *t.* 36.

Bilimbi. *Rheed. mal.* 3. *p.* 55. *t.* 45. 46. *Raj. hiſt.* 1449.
Burm. zeyl. 147. *ind.* 106.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 656.
Bilimbi Averrhoa. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

2. AVERRHOA *Carambola.*

A. foliolis ovatis inaequalibus acuminatis, fructibus oblongis acutangulis. W.
A. axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis. *Fl. zeyl.* 178. * *Bruce. Act. Angl.* 1785. *p.* 356.
A. foliis impari-pinnatis, foliolis ovato-acutis, terminali majore, fructuum angulis acutis. *Cavan. diſſ.* 7. *p.* 374. *t.* 220. *
Mala goenſia fructu octangulari pomi vulgaris magnitudine. *Bauh. pin.* 433.
Prunum ſtellatum. *Rumph. amb.* 1. *p.* 115. *t.* 35.
Tamara Tonga ſ. carambolas. *Rheed. mal.* 3. *p.* 51. *t.* 43. 44. *Raj. hiſt.* 1449. *Burm. zeyl.* 148. *ind.* 106.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 658.
Carambola Averrhoa. W.
Habitat in India. (v. ſ.)

*908. IONCQUETIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 785.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* pentacocca unilocularis 5-valvis 5-ſperma. *Sem.* arillata.

1. IONCQUETIA *paniculata.* W.

Tapirira gujanenſis. *Aubl. ſ.* 1. *p.* 470. *t.* 188. *
Riſpenblütige Joncquetie. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis* Sinemarienſibus. ♄

Arbor *quinquagintapedalis.* Folia *alterna impari-pinnata, foliolis oblongis acuminatis integerrimis venoſis glabris.* Flores *parvi albi terminales paniculati.* W.

909. SPONDIAS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 786.

Cal. 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo 5-loculari.

1. SPONDIAS *Mombin.*

S. foliis petiolo communi compreſſo. *Syſt. veg.* 357. *Loef. it.* 209.

S. purpurea. *Spec.* 2. *p.* 613. *Mill. dict. n.* 1.
S. (*Myrobalanus*) racemis ſparſis, foliis multo brevioribus. *Iacq. amer.* 139. *t.* 88.
Spondias diffuſa, foliis plurimis minoribus pinnatis, penna compreſſa ſulcata, floribus praecocibus. *Brown. jam.* 228.
Myrobalanus minor, folio fraxini alato, fructu purpureo oſſiculo magno fibroſo. *Sloan. jam.* 182. *hiſt.* 2. *p.* 126. *t.* 219. *f.* 3. 4. 5. *Raj. dendr.* 43.
Prunus americana, oſſiculo magno ex filamentis lignoſis reticulatim inflato. *Pluk. alm.* 307. *t.* 218. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 664.
Flachſtielige Mombinpflaume. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

. SPONDIAS *Myrobalanus.*

S. petiolis teretibus: foliolis nitidis acuminatis. *Syſt. veg.* 357.
S. (*Mombin*) racemis terminalibus longitudine folia aequantibus. *Iacq. amer.* 138.
S. lutea. *Spec. pl. p.* 613. *Mill. dict. n.* 2.
Spondias. *Hort. cliff.* 484.
Hobo. *Loefl. it.* 209. *
S. foliolis plurimis pinnatis ovatis, racemis terminalibus, cortice interno rubente. *Brown. jam.* 229.
Monbin arbor, folio fraxini, flore luteo racemoſo. *Plum. gen.* 44.
Myrobalanus folio fraxini alato, fructu luteo, oſſiculo magno fibroſo. *Sloan. jam.* 181. *hiſt.* 2. *p.* 125. *t.* 219. *f.* 1. 2. *Raj. dendr.* 43.
Prunus americana. *Mer. ſurin.* 13. *t.* 13. *bona.*
Prunus braſilienſis, fructu racemoſo ligno intus pro oſſiculo. *Raj. hiſt.* 1154.
Acaja et Ibametara. *Marcgr. braſ.* 29.
Arbor nuci juglandi ſimilis 5. ſ. Hobos. *Bauh. pin.* 417.
ß. Spondias foliis paucioribus pinnatis ovatis nitidis. *Brown. jam.* 229.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 656.
Rundſtielige Mombinpflaume. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

3. SPONDIAS *Mangifera.* W. †

S. foliolis oblongis integerrimis panicula racemoſa. W.
Mangifera (*pinnata*) foliis pinnatis, floribus decandris. *Lin. ſuppl.* 156. *Retz. obſ.* 5. *p.* 4.

Mongoartige Mombinpflaume. W.
Habitat in India. *Koenig.* ♄

Folia *pedalia cum impari pinnata, foliolis oblongis integerrimis.* Panicula *racemoſa magna.*

Planta *adhuc obſcura, an eadem ac Spondias amara Lamarck encycl.* 4. *p.* 245. *quam depinxit Rheed. mal.* 1. *tab.* 50? W.

*4. SPONDIAS *dulcis.*

S. petiolis teretibus ſexjugis, foliolis ſerratis coſtatis. *Forſt. prod. n.* 198. *pl. eſcul. p.* 33. *

S. (*cytherea*) foliis remote ſerratis, fructibus loculis ab axi remotis. *Lamarck encycl.* 4. *p.* 245. * *illuſt. gen. t.* 384. *Sonnerat itin.* 2. *p.* 222. *t.* 123. *

Süſse Mombinpflaume. W.
Habitat in Societatis *inſulis, nunc etiam in inſula* Mauritii. ♄

*910. ROBERGIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 787.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Drupa* nuce monoſperma, putamine bivalvi.

*1. ROBERGIA *fruteſcens.*

Rourea fruteſcens. *Aubl. guj.* 1. *p.* 467. *t.* 187. *
Strauchartige Robergie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Frutex *quinquepedalis.* Folia *alterna impari-pinnata quadrijuga, foliolis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis venoſis ſuperne glabris, inferne tomentoſis.* Foliola *inferiora minora.* Flores *albi.* Panicula *corymboſa axillaris et terminalis folio multo brevior.* W.

911. CNESTIS.

Juſſ. gen. ed. Uſteri p. 411.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 5, bivalves monoſpermae.

*1. CNESTIS *glabra.*

C. foliis pinnatis, foliolis ovatis petiolatis utrinque glabris, racemulis faſciculatis brevibus et tenuibus. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 22. * *illuſt. gen. t.* 387. *f.* 1.

Glatte Spaltfrucht. W.
Habitat in inſula Mauritii *et* Borbonia. ♄

*2. CNESTIS *polyphylla.*
C. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis ſubvilloſis breviſſime petiolatis, racemulis tomentoſis, capſulis obtuſiſſimis. *Lamarck. encycl. 3. p. 22.* illuſt. gen. t. 387. f. 2.*
Vielblättrige Spaltfrucht. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

*3. CNESTIS *corniculata.*
C. foliis pinnatis, foliolis oblongo-acuminatis, nervo medio villoſo, capſulis oblongis acutis corniculatis tomentoſis prurientibus. *Lamarck. encycl. 3. p. 22.* *
Gehörnte Spaltfrucht. W.
Habitat in Sierra Leone. ♄

*4. CNESTIS *trifolia.*
C. foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis ſuperne laevibus, panicula terminali. *Lamarck. encycl. 3. p. 23.**
Dreyblättrige Spaltfrucht. W.
Habitat in Sierra Leone. ♄

Affinis videtur Connaro pentagyno, tamen diverſa. Binas adhuc hujus generis ſpecies poſſidere credo, quas ob fructus defectum non indicavi. Altera in Guinea creſcens fert folia pinnata, foliolis ſubtus flavo-tomentoſis; altera ex India orientali foliis pinnatis glabris, profert flores paniculatos. Ceterum hoc genus Fagaris et Zanthoxylis eſt proximum. W.

912. COTYLEDON.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 788.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamae* nectariferae 5, ad baſin germinis. *Capſ.* 5.

1. COTYLEDON *orbiculata.*
C. foliis ovato-ſpathulatis obtuſis cum acumine laevibus, floribus paniculatis. *Ait. Kew. 2. p. 106.*
C. foliis orbiculatis carnoſis planis integerrimis, caule fruticoſo. *Kniph. cent. 6. n. 31.*
α. foliis ovato-ſpathulatis, caudice erecto. *Ait. l. c.*
C. foliis ſubrotundis planis integerrimis. *Hort. cliff. 276. Roy. lugdb. 454. Sp. pl. 2. p. 614.*
Sedum africanum fruteſcens incanum, orbiculatis foliis

Herm. lugdb. 549. *t.* 551. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 474. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 39.

β. foliis oblongo-ſpathulatis, caudice erecto. *Ait. l. c.*

γ. foliis orbiculato-ſpathulatis, caule erecto. *Ait. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 597.

Kreisblättriges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

2. COTYLEDON *paniculata.*

C. foliis oblongo-ovatis ſeſſilibus, floribus divaricato-paniculatis, caule fruticoſo ramoſo. *Thunb. prod.* 83.

C. fruticoſa, foliis oblongo-ovatis ſeſſilibus, panicula divaricata ramoſa. *Lin. ſuppl.* 242.

C. (*orbiculata γ.*) foliis ovato-ſpathulatis, caule ramoſiſſimo divaricato. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106?

Riſpenblütiges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*3. COTYLEDON *faſcicularis.*

C. foliis cuneiformibus faſciculatis terminalibus, caudice incraſſato, ramis carnoſis ſubconicis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106.

C. fruteſcens, folio oblongo viridi, floribus ramoſis pendulis reflexis. *Burm. afr.* 41. *t.* 18.

Büſchelblättriges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*4. COTYLEDON *cuneata.*

C. foliis cuneatis carnoſis hirtis, floribus paniculatis hirſutis. *Thunb. prod.* 83.

Keilblättriges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

5. COTYLEDON *ſpuria.*

C. foliis ſpathulatis obtuſis cum acumine nudis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 106.

C. foliis ſpathulato-lanceolatis carnoſis integerrimis, caule fruticoſo. *Sp. pl.* 614. *Mill. dict. n.* 9.

Sedum africanum teretifolium, flore hemerocallidis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 474. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 40.

Cotyledon africana fruteſcens, folio longo et anguſto, flore flaveſcente. *Comm. rar.* 23. *t.* 23.

C. acaulon, foliis ad radicem ſeſſilibus oblongis anguſtis, floribus pendulis reflexis. *Burm. afr.* 43. *t.* 19. *f.* 1.

C. africana, foliis depreſſis cruciatis. *Walth. hort.* 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 598.

Baſtard Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Caulis *craſſiſſimus ramis obtuſis, apice tantum folioſis.* Folia *naturaliter oppoſita; monſtroſa variant alterna, ſpathulato-lanceolata, carnoſa, obtuſa, petiolata.* Scapus *terminalis, pedalis, ſubumbellato-divaricatus.* Flores *nutantes, flaveſcentes: Limbo revoluto, intus conſperſo atomis rubris.* Stamina *tubo paulo longiora.* Antherae *rubrae.*

*6. COTYLEDON *purpurea.* †

C. foliis lineari-oblongis carnoſis glabris, floribus paniculatis. *Thunb. prod.* 83.

Purpurfarbenes Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*7. COTYLEDON *teretifolia.*

C. foliis carnoſis ſubteretibus hirſutis, floribus paniculatis, caule hirſuto. *Thunb. prod.* 83.

Rundblättriges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

8. COTYLEDON *cacalioides.*

C. foliis teretibus, floribus paniculatis, caule fruticoſo. *Thunb. prod.* 83.

C. foliis teretibus, floribus corymboſis, caule fruticoſo. *Lin. ſuppl.* 242.

Peſtwurzartiges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Flores *lutei referunt Cacaliam.*

9. COTYLEDON *reticulata.*

C. foliis teretibus, floribus reticulato-paniculatis, caule fruticoſo. *Thunb. prod.* 83.

C. caule fruticoſo, foliis teretibus, floribus reticulato-corymboſis. *Lin. ſuppl.* 242.

Netzſtieliges Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Refert Staticem reticulatam.

10. COTYLEDON *papillaris.*

C. foliis oppoſitis tereti-ovatis, floribus corymboſis. *Lin. ſuppl.* 242.

C. foliis carnoſis oppoſitis tereti-ovatis glabris, floribus pedunculatis. *Thunb. prod.* 83.

Warzentragendes Nabelkraut. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

11. COTYLEDON *mamillaris.*
C. foliis alternis tereti-ovatis, floribus alternis ſubſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 242.
C. foliis alternis tereti-ovatis glabris, floribus alternis pedunculatis. *Thunb. prod.* 85.
Zitzenförmiges Nabelkraut. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

12. COTYLEDON *hemiſphaerica.*
C. foliis ſuborbiculatis furfure punctatis ſubtus convexis, floribus ſubſeſſilibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 107.
C. foliis ſemigloboſis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 445. *Mill. dict. n.* 4. *Fabric. helmſt.* 267.
C. capenſis, folio ſemiglobato. *Dill. elth.* 112. *t.* 95. *f.* 111.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 599.
Halbkugelförmiges Nabelkraut. W.
Habitat in Aethiopia. ♄ (v. v. ſ. fl.)

13. COTYLEDON *triflora.*
C. foliis obovato-carnoſis integris, floribus ſpicatis ternis ſeſſilibus. *Thunb. prod.* 85.
C. foliis obovatis integris, floribus ſubpedunculatis ternis. *Lin. ſuppl.* 242.
Dreyblütiges Nabelkraut. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

*14. COTYLEDON *coccinea.*
C. foliis obovatis acutis carnoſis, ſpica folioſa terminali. W.
C. foliis ſubſpathulatis acutis carnoſis, floribus ſpicatis ſeſſilibus. *Cavan. ic.* 2. *p.* 54. *t.* 170. *
Scharlachblütiges Nabelkraut. W.
Habitat - - - - ♄
Folia *inferiora obovata acuta petiolata, ſuperiora et floralia lanceolata ſeſſilia.* W.

*15. COTYLEDON *Malacophyllum.*
C. foliis lanceolatis acutis carnoſis, ſpica cylindrica terminali aphylla. W.
Cotyledon Malacophyllum. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 88. *tab. O. f.* 1. *
Weichblättriges Nabelkraut. W.
Habitat in Davuriae *alpibus.* ⊙
Similis Craſſulae ſpinoſae quae et hujus videtur generis. W.

16. COTYLEDON *ſerrata.*
C. foliis ovalibus crenatis, caule ſpicato. *Sp. pl.* 614. *Mill. dict. n.* 3.
Cotyledon foliis radicalibus lanceolatis crenatis: caulinis ſubulatis. *Hort. cliff.* 497. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon cretica, folio oblongo fimbriato. *Dill. elth.* 113. *t.* 95. *f.* 112.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 600.
Geſägtes Nabelkraut. W.
Habitat in Creta, Sibiria.

17. COTYLEDON *Umbilicus.*
C. foliis peltatis crenatis, caule ſubſimplici, floribus pendulis, bracteis integris. *Hudſ. angl.* 194. *Ait. Kew.* 2. *p.* 107.
C. foliis peltatis. *Vir. cliff.* 39. *Roy. lugdb.* 454.
Cotyledon Umbilicus β. tuberoſa. *Sp. pl.* 615.
C. vera, radice tuberoſa. *Bauh. hiſt.* 6. *p.* 683.
C. major. *Bauh. pin.* 285. *Raj. hiſt.* 1878.
C. umbilicus veneris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 63. *Blachw. t.* 263.
Sedum luteum murale ſpicatum, folio umbilicato rotundo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 470. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 4.
β. C. (*peltatum*) herbacea, foliis radicalibus longe petiolatis rotundis peltatis repandis concavis glabris, caulinis ſuperioribus rhombeis dentatis, caule erecto maculato ſimplici, floribus racemoſis pendulis, corolla cylindrica punctata. *Wendl. obſ.* 49.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 600.
Gemeines Nabelkraut. W.
Habitat in Luſitania, Hiſpania, Anglia. ♃ (v. ſ.)

*18. COTYLEDON *lutea.*
C. foliis peltatis crenatis, caule ſubſimplici, floribus erectis, bracteis dentatis. *Hudſ. angl.* 194. *Ait. Kew.* 2. *p.* 107.
Cotyledon Umbilicus α. repens. *Sp. pl.* 615.
C. foliis cucullato-peltatis ſerrato-dentatis alternis, caule ramoſo, floribus erectis. *Gron. orient.* 141.
C. flore luteo, radice repente. *Dod. mem.* 265. *t.* 73.
C. radice tuberoſa longa repente. *Moriſ. prael.* 257. *Raj. hiſt.* 1878.
C. luteum umbilicatum ſpicatum radice repente majus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 471.
Gelbes Nabelkraut. W.

Habitat in Europa *auſtrali*, Oriente. ♃

*19. COTYLEDON *lanceolata*.

C. foliis lanceolatis apice ſerratis, panicula villoſa, floribus quadrifidis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51.

C. (*lanceolata*) foliis lanceolatis ſeſſilibus ſubcarinatis apice ſerratis carnoſis. *Forſk. deſcr.* 89. *

Lanzettenblättriges Nabelkraut. W.

Habitat in Arabia.

Habitu, inflorefcentia corollisque ovatis flavis ſimilis C. laciniatae; diverſa: foliis *lanceolatis*, caule, pedunculis, calycibus, corollis*que villoſis*. Vahl. l. c.

20. COTYLEDON *laciniata*.

C. foliis laciniatis, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 455. *Mill. dict. n.* 10. *Kniph. cent.* 2. *n.* 19.

C. afra, folio craſſo lato laciniato, floſculo aureo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 288. *t.* 288.

Telephium africanum, anguſtiori folio, flore aurantiaco. *Pluk. alm.* 362. *t.* 228. *f.* 3.

Telephium indicum. *Bont. jav.* 132.

Planta anatis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 275. *t.* 95.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 602.

Schlitzblättriges Nabelkraut.

Habitat in Aegypto, India. ♄ (v. v.)

Stamina *octo*.

*21. COTYLEDON *alternans*.

C. foliis orbiculato-ſpathulatis integerrimis, floribus paniculatis glabris quadrifidis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51.

Cotyledon orbiculata. *Forſk. cat. arab. p.* 112.

Wechſelblütiges Nabelkraut. W.

Habitat in Arabia.

Tota glabra. Pedunculi *partiales alterni, nec oppoſiti.* Corolla *ovata C. laciniatae membranacea, ſuperne anguſtata, laciniis lanceolatis flavo-rubentibus.* Vahl. l. c.

*22. COTYLEDON *nudicaulis*.

C. foliis ſpathulato-ovatis, cymae floribus quadrifidis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 429. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51.

Cotyledon integra. *Medic. comm. palat.* 3. *p.* 200. *t.* 9.

C. (*aegyptiaca*) foliis ſubrotundis concavis obſolete crenatis, floribus paniculato-cymoſis erectis quadrifidis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 142. *

C. (*deficiens*) foliis rotundis ſubcrenatis, floribus tetradynamiis. *Forſk. deſcr.* 89. *

Nacktſtieliges Nabelkraut. W.
Habitat in Aegypto. ♄

Caulis *in ſummitate ſubnudus.* Folia *praeter dictam figuram obſolete ſerrata baſi linearia.* Inflorescentia *cymoſa, pedunculis dichotomis.* Calyx *et* corolla *extus pubeſcens, limbo ſupra coccineo, ſubtus pallidiori.* Stamina *octo.* Murr. l. c.

23. COTYLEDON *hiſpanica.*

C. foliis oblongis ſubteretibus, floribus faſciculatis. *Loefl. it. t.* 1.
C. maritima, ſedi folio, flore carneo, fibroſa radice. *Tournef. inſt.* 90.
C. hiſpanica, ſedi teretifolii folio, flore umbellato rubro, fibroſa radice. *Minuart. ſched.* 3.
C. paluſtris, ſedi folio, floribus rubris longioribus. *Shaw. afr.* 177.
β. Cotyledon paluſtris, ſedi folio, floribus luteis brevioribus. *Shaw. afr.* 178. *f.* 178.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 603.
Spaniſches Nabelkraut. W.
Habitat in Africa, Oriente, Hiſpania. ♂

Radix *fibroſa.* Caulis *ſimplex, teres, erectiuſculus, digitalis.* Folia *oblonga, teretiuſcula, obtuſiuſcula, ſeſſilia, ſubpiloſa, ſupra planiuſcula rufo-punctata.* Flores *faſciculati corymbo terminali.* Corollae *infundibuliformes: extus rufeſcentes, ſubpiloſae. Limbo quinquepartito, plano, acuto, ſupra incarnato, ſtriis tribus purpuraſcentibus et apice purpureo.* Filamenta *craſſiuſcula, prominula. Antherae minimae.* Calyx *brevis.* Facies *herbae eſt Sedi albi.*

24. COTYLEDON *viſcoſa.*

C. foliis teretibus, racemis terminalibus villoſo-viſcoſis, caule ramoſo. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51. *
Cotyledon Mucizonia. *Orteg. monogr. Madrit.* 1772. *c. figura. Iacq. Collect. ſuppl.* 112. *t.* 13. *f.* 2. *
C. (*hiſpida*) foliis carnoſis glaucis ovato-oblongis teretiuſculis, floribus campanulatis ſubcorymboſis terminalibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 141. *
Klebriges Nabelkraut. W.
Habitat in montoſis Hiſpaniae *verſus* Toledum. ⊙

913. SEDUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 789.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamae* nectariferae 5, ad baſin germinis. *Capſ.* 5.

* *Planifolia.*

1. SEDUM *verticillatum.*
S. foliis quaternis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 252. *t.* 4. *f.* 14.
S. aparines facie, tauromontanum. *Raj. extr.* 233. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 629.
Wirtelblättriges Sedum. W.
Habitat in Europa *maxime auſtrali et* Sibiria. ♃
Caulis *pedalis erectus teres.* Folia *lanceolata vix digitum longa aequaliter ſerrata laevia acutiuſcula minus carnoſa.* Racemi *axillares parvi ſolitarii.* Flores *in ſuo genere parvi,* calyce *quinquedentato,* petalis *quinque,* ſtaminibus *decem,* piſtillis *quinque.* Amoen.

2. SEDUM *Telephium.*
S. foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. *Mat. med.* 111. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 171. *Mill. dict. n.* 14. *Pollich. pal. n.* 428. *Flor. dan. t.* 686. *Ludw. ect. t.* 200. *Blackw. t.* 191. *Kniph. cent.* 4. *n.* 76. *Knorr. del.* 1. *t. F.* 5. *Hoffm. germ.* 155. *Roth. germ. I.* 194. *II.* 497.
S. foliis confertis ſerratis, umbellis denſis terminalibus. *Hall. helv. n.* 954.
S. foliis planis, ovatis, ſerratis; cymis lateralibus, corymboſis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 491. *n.* 2. *ed.* 2. *n.* 553.
S. foliis planiuſculis patentibus ſerratis, corymbo terminali. *Hort. cliff.* 176. *Fl. ſuec.* 386, 400. *Roy. lugdb.* 456.
Telephium vulgare. *Bauh. pin.* 287.
Telephium album. *Fuchſ. hiſt.* 800.
β. Sedum Telephium, *purpureum.*
Telephium purpureum majus. *Bauh. pin.* 287. *Kniph. cent.* 4. *n.* 77. *Pollich. l. c.*
γ. Telephium purpureum minus. *Bauh. pin.* 287. *prodr.* 133
δ. Telephium latifolium peregrinum. *Bauh. pin.* 287.
ε. Sedum Telephium, *maximum.*
S. foliis ovatis, dentatis, conjugatis, umbellis alaribus. *Hall. helv. n.* 955. *diſtincta ſpecies.* R.

Telephium hiſpanicum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 66.
Anacampſeros maxima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 682. *Blackw. t.* 191.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 629.
Knolliges Sedum. W.
Habitat in Europae *ſiccissimis.* ♃ (v. v.)

3. SEDUM *Anacampſeros.*

S. foliis cuneiformibus baſi attenuatis ſubſeſſilibus, caulibus decumbentibus, floribus corymboſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 108.
S. foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymboſis. *Sp. pl.* 616. *Mill. dict. n.* 16. *Hoffm. germ.* 156.
S. caule procumbente, foliis ovatis integerrimis. *Hall. helv. n.* 956.
S. foliis ſpathulatis indiviſis, umbella terminali. *Sauv. monſp.* 77.
Telephium repens, folio deciduo. *Bauh. pin.* 287.
Telephium VI. Cepaea plancii. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 67.
Telephium minus ſempervirens. *Lob.* 340.
Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſempervirens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 682.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 631.
Rundblättriges Sedum. W.
Habitat in Gallo-provinciae *rupibus, alpibus* Aquilejenſibus. ♃ (v. v.)
Folia *hyeme decidua.*

*4. SEDUM *divaricatum.*

S. foliis cuneiformi-rhombeis emarginatis petiolatis, caulibus ramoſis, paniculis terminalibus divaricatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 108.
Ausgebreitetes Sedum. W.
Habitat in Madera. ♄

5. SEDUM *Aizoon.*

S. foliis lanceolatis ſerratis planis, caule erecto, cyma ſeſſili terminali. *Mill. dict. n.* 13. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 173.
S. foliis planis ſerratis, corymbo folioſo. *Hort. upſ.* 116.*
Anacampſeros flore flavo. *Amm. ruth.* 96. *t.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 631.
Gelbes Sedum. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

6. SEDUM *hybridum.*

S. foliis cuneiformibus concavis ſubdentatis aggregatis,

ramis repentibus, cyma terminali. *Hort. upſ.* 116. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 171. *n.* 85. *t.* 67. *f.* 1.

S. foliis cuneiformibus ſubconcavis obtuſe ſerratis, caulibus obliquis, axillis baſeos et propaginum radicantibus, cyma terminali. *Murray comm. nov. Goett. Tom.* 6. *p.* 35. *t.* 5.

S. minus repens, chamaedryos foliis, e ſingulis foliorum alis radices agens. *Amm. ruth.* 93.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 632.

Gamanderblättriges Sedum. W.

Habitat in Tataria *ad radices montium uralenſium*, Trapezunti. ♃ (v. v.)

7. SEDUM *populifolium.*

S. foliis planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 109.

S. foliis petiolatis cordatis dentatis, floribus paniculatis. *Lin. ſuppl.* 242. *Pall. itin.* 3. *p.* 732. *t. O. f.* 2. *

Pappelblättriges Sedum. W.

Habitat in Sibiriae *alpibus* Saianenſibus. ♄ (v. v.)

Caulis *fruticoſus ramoſus erectus patulus laevis pedalis.* Folia *alterna petiolata remota, ad ramificationes tantum petiolata cordata dentata obtuſa carnoſa glabra.* Paniculae *breves nec foliis longiores.* Calyx *parvus.* Petala *lanceolata ſeſſilia alba immaculata patentia.* Antherae *rubrae.*

8. SEDUM *ſtellatum.*

S. foliis planiuſculis angulatis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456. *Mill. dict. n.* 11. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 194. *II.* 498. *Retz. obſ.* 5. *p.* 25. *

S. foliis ſubrotundis, caule ramoſo, floribus in alis ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 957.

S. echinatum vel ſtellatum, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 680.

Sempervivum tertium. *Col. phytob.* 32. *t.* 11.

Cotyledon ſtellata. *Bauh. pin.* 295.

Aizoon peregrinum. *Camer. hort. p.* 7. *ic.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 632.

Sternförmiges Sedum. W.

Habitat in Italia, Gallia, Helvetia. ⊙ (v. ſ.)

*9. SEDUM *alſinefolium.*

S. foliis planis ovatis, caule paniculato, petalis obtuſis. W.

Sedum alſinefolium. *Allion. ped. n.* 1740. *t.* 22. *f.* 2.

S. erectum ramoſum, foliis planis, floribus albis longe pedunculatis. *Allion. ſpec. ped. p.* 15. *t.* 3. *f.* 2.
Mierenartiges Sedum. W.
Habitat in locis umbroſis lapidoſis Pedemontii. ♂

10. SEDUM *Cepaea.*

S. foliis planis lanceolatis, caule ramoſo, floribus paniculatis, petalis acutis ariſtatis. W.
S. foliis planis, caule ramoſo, floribus paniculatis. *Hort. cliff.* 176. * *Roy. lugdb.* 456. *Sauv. monſp.* 76. *Mill. dict. n.* 12. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 194. *II.* 499. *Allion. ped. n.* 1741.
S. caulibus paniculatis, foliis ovatis, planiuſculis. *Hall. helv. n.* 958.
S. annuum album, oblongo portulacae minoris folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 37.
Cepaea. *Bauh. pin.* 288. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 68. *Camer. epit.* 673. *Matth.* 933.
β. Sedum galioides. *Allion. ped. n.* 1742. *t.* 65. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 633.
Portulacblättriges Sedum. W.
Habitat Monſpelii, Genevae, Halae *ad lacum ſalſum.* ⊙ (v. f.)

Varietas β. differt tantum foliis inferioribus ternis, et floribus rubicundis. W.

11. SEDUM *libanoticum.*

S. foliis radicalibus faſciculatis ſpathulato-lanceolatis, caule ſubnudo ſimpliciſſimo. *Sp. pl.* 617.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 633.
Libanons Sedum. W.
Habitat in Palaeſtina. *Haſſelquiſt.* ♃

Facies ſempervivi montani. Folia *radicalia faſciculata, ſpathulato-lanceolata, acuta, glabra integerrima.* Caulis *ad latus radicis, adſcendens, ſemipedalis, ſimpliciſſimus, inferne adſperſus Foliis linearibus, acutis.* Racemus *terminalis, longitudine caulis: Pedicellis ſparſis, ſaepius bifloris.* Capſulae *non divergentes, calyce cinctae.*

** *Teretifolia.*

12. SEDUM *daſyphyllum.*

S. foliis oppoſitis ovatis obtuſis carnoſis, caule infirmo, floribus ſparſis. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. hort. t.* 153. *Scop. carn. n.* 555.

S. foliis conicis, obtuſis, glaucis, reticulatis, caule ramoſo-viſcido. *Hall. helv. n.* 961.
S. foliis cordato-ovatis compreſſis ſaepius oppoſitis, floribus ſparſis. *Sauv. monſp.* 8.
S. foliis ſemigloboſis ſubovatis ſeſſilibus quadrifariam imbricatis. *Wachend. ultr.* 391.
S. parvum, folio circinato, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 691.
S. minus, folio circinato. *Bauh. pin.* 283. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 473. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 35.
Aizoon daſyphyllum. *Dalech. hiſt.* 1133.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 634.
Bereiftes Sedum. W.
Habitat in Helvetia, Luſitania, Hiſpania, Italia. ⊙ (v. ſ.)
Folia *reti venarum rubrarum adſperſa. Hall.*
Stamina 12; Styli 6. *Iacq.*

13. SEDUM *reflexum.*

S. foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis: inferioribus recurvatis. *Fl. ſuec.* 2. *p.* 1296. *Oed. dan.* 113? *Mill. dict. n.* 8. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 499. *Leers herb. n.* 335. *Pollich. pal. n.* 429. *Hoffm. germ.* 156.
S. foliis ſemiteretibus, acutis, ariſtatis, caule ſupremo multifido umbellato. *Hall. helv. n.* 967.
S. minus V. *Cluſ.* 60.
S. minus luteum, folio acuto. *Bauh. pin.* 283.
β. S. minus luteum ramulis reflexis. *Bauh. pin.* 283.
γ. S. criſpum. *Munting.* 561. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 635.
Zurückgebogenes Sedum. W.
Habitat in Europa *ad montium radices.* ♃ (v. v.)
Folia *viridia, tenuius ſubulata, inferiora recurvata uti hamus.*
Petalis 6, 7, 8, 9, *cum totidem germinibus, duploque ſtaminum ſaepiſſime ludit.* Leers. *l. c.* R.

*14. SEDUM *virens.*

S. foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis, floribus cymoſis, petalis calyce lanceolato ſesquilongioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 110.
Grünes Sedum. W.
Habitat in Luſitania. ♃

15. SEDUM *rupeſtre.*

S. foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis glaucis, floribus cy-

moſis, petalis calyce duplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 110.

S. foliis ſubulatis quinquefariam confertis baſi ſolutis, floribus cymoſis. *Hort. cliff.* 176. *It. gotl.* 178. *Fl. ſuec.* 388. *Roy. lugdb.* 466. *Gort. gelr.* 268. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 557. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ.* I. 195. *II.* 501.

S. rupeſtre repens, foliis compreſſis. *Dill. elth.* 343. *t.* 256. *f.* 333.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 635.

Felſen Sedum. W.

Habitat ad radices montium Europae. ♃ (v. v.)

Folia glauca, craſſius ſubulata, quinquefariam imbricata.

A Sempervivo ſediformi *differt* foliis *paulatim in acutum apicem attenuatis*; petalis *luteis et magna parte caulium ſuperius, donec bene floreat, ſemper nutante.* R.

*16. SEDUM *ſaxatile.*

S. foliis ſparſis ſemiteretibus obtuſis baſi ſolutis, caule ramoſo decumbente. *Wiggers primit.* 35. *Roth. germ. II.* 500. *Hoffm. germ.* 156. *Allion. ped. n.* 1746. *t.* 65. *f.* 6.

Sedum rupeſtre. *Fl. dan.* 59. *Moench. haſſ. n.* 370. *Gunn. norv. n.* 636.

S. (*Oederi*) foliis ſemiteretibus ſparſis baſi ſolutis, caule ramoſo adſcendente, floribus cymoſis. *Retz. prod. Fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 562.

S. (*rubens*) foliis ovatis alternis ſeſſilibus remotis, caule proſtrato baſi ramoſo, floribus terminalibus ſubumbellatis, pedunculis ſimpliciſſimis. *Haenke it. Sudet. p.* 114.

S. (*alpeſtre*) foliis teretibus, floribus ſubumbellatis, floribus luteis. *Villars proſp.* 49.

S. caule ramoſo proſtrato, foliis teretibus ramoſis, floribus longe ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 964.

S. ſaxatile teretifolium, floſculis luteis, conceptaculis ſeminum ſtellatis et viridantibus. *Scheuch. it.* 6. *p.* 462.

S. alpinum ſileſiacum. *Schwenkf. ſileſ.* 195.

S. minimum luteum non acre. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 695.

Stein Sedum. W.

Habitat in alpibus Norvegiae, Helvetiae, *in monte* Cenifio, *in* Sudetis, *inque* Haſſiae *rupibus.* ⊙ (v. ſ.)

*17. SEDUM *quadrifidum.*
S. foliis ſparſis teretibus obtuſis, caule ſimplici, floribus umbellatis tetrapetalis. W.
Sedum quadrifidum. *Pall. it.* 3. *app. n.* 90. *t. P. f.* 1. *
Vierblättriges Sedum. W.
Habitat in rupibus Aſiae *ſumme borealis.* ♃
Flores *flavi.* W.

18. SEDUM *hiſpanicum.*
S. foliis linearibus tereti-depreſſis ſparſis, cyma patula, floribus hexapetalis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 111.
S. foliis teretibus acutis: radicalibus faſciculatis, cyma pubeſcente. *Amoen. acad.* 4. *p.* 273. * *Mill. dict. n.* 4. *Reiner et Hohenwarth. it.* 1. *p.* 168. *t.* 4. *
S. hiſpanicum, folio glauco acuto, flore albido. *Dill. elth.* 342. *t.* 256. *f.* 332.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 636.
Spaniſches Sedum. W.
Habitat in Hiſpania *inque* Carinthia. ♃ (v. ſ.)

*19. SEDUM *lineare.*
S. foliis tereti-linearibus oppoſitis, cyma trifida. *Thunb. jap.* 187.
Linienblättriges Sedum. W.
Habitat in Japonia *in regione* Fakoniae.
Caulis *glaber ſimplex raro ramoſus.* Folia *oppoſita amplexicaulia tereti-linearia acuta glabra patentia pollicaria.* Flores *cymoſi lutei.* Cyma *compoſita trifida flore intermedio ſeſſili.* Thunb. l. c.

*20. SEDUM *coeruleum,*
S. foliis oblongis alternis obtuſis baſi ſolutis, cyma bifida glabra. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 51. *
S. vermiculare pumilum glabrum, floribus parvis caeruleis. *Shaw. it. p.* 46. *n.* 550. *f.* 550.
Blaues Sedum. W.
Habitat in fiſſuris rupium ad Manub Tuneti.
Diverſum a Sedo coeruleo Lin. Mant. 251, *quod poſtea in ſyſtemate omiſit, et cujus deſcriptionem tantum ex Willichii opere aſſumpſerat. Thunbergius nullam Sedi ſpeciem in capite bonae ſpei obſervavit.* W.

21. SEDUM *album.*
S. foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa. *Hort. cliff.* 177. *Fl. ſuec.* 387,

402. *Roy. lugdb.* 457. *Mill. dict. n.* 1. *Pollich. pal. n.* 430. *Flor. dan. t.* 66. *Blackw. t.* 428. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 501.
S. caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramoſis, floribus petiolatis. *Hall. helv. n.* 959.
S. foliis teretibus, compreſſis, acutis; cyma trifida; floribus pedunculatis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 491. *ed.* 2. *n.* 556.
S. minus teretifolium album. *Bauh. pin.* 283.
Vermicularis ſ. Illecebra major. *Lob. iſt.* 205.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 636.
Weiſses Sedum. W.
Habitat in Europae *petris.* ♃ (v. v.)

22. SEDUM *acre.*
S. foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. *Hort. cliff.* 177. *Fl. ſuec.* 389. 403. *Mat. med.* 118. *Roy. lugdb.* 456. *Mill. dict. n.* 5. *Pollich. pal. n.* 431. *Hoffm. germ.* 157. *Knorr. del.* 2. *t. S.* 12. *f.* 1. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 502.
S. foliis conicis, confertis, caulibus ramoſis, ſupremis trifidis. *Hall. helv. n.* 966.
S. minus VIII. cauſticum. *Cluſ.* 61. R.
S. minimum. *Tabern.* 844. *Blackw. t.* 232. R.
Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.
Illecebra ſ. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 637.
Scharfes Sedum. W.
Habitat in Europae *campis ſicciſſimis ſteriliſſimis.* ♃ (v. v.)

23. SEDUM *ſexangulare.*
S. foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſexfariam imbricatis. *Fl. ſuec.* 390, 404. * *Mill. dict. n.* 9. *Pollich. pal. n.* 432. *Hoffm. germ.* 157. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 502.
S. foliis teretibus, ternatis, caulibus ſimplicibus trifidis. *Hall. helv. n.* 965.
S. foliis teretibus, obtuſis, patulis; cyma trifida; floribus ſolitariis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 491. *n.* 4. *ed.* 2. *n.* 558.
Sempervivum minus vermiculatum inſipidum. *Bauh. pin.* 284.?
Sempervivum minimum. *Cam. epit.* 856.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 638.

Sechseckiges Sedum. W.
Habitat in Europae *borealis campis apricis ſiccis.* ♃ (v. v.)

Folia *ſexſariam imbricata, evidentiſſime in planta ante floreſcentiam.* Rami *nunquam copioſi, ut ceſpitem conſtituant.* Flores *in ſingulo cymae ramo raro ultra tres.*

*24. SEDUM *anglicum.*

S. foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis alternis, cyma ramoſa bifida. *Hudſ. angl.* 196. *Ait. Kew.* 2. *p.* 111. *Retz. prod. ſcand. ed.* 2. *n.* 567.
Sedum annuum. *Gunn. norv. n.* 331.
S. minimum non acre, flore albo. *Raj. ſynop.* 270. *t.* 12. *f.* 2.
Engliſches Sedum. W.
Habitat in rupibus Weſtmorlandicis, Cornubienſibus, Walliae, Norvegiae. ♃ (v. ſ.)

Radix *ramoſa perennis.* Caulis *procumbens teres foliatus glaber ramoſus rubeſcens, ramis alternis.* Folia *alterna ſubtrifariam imbricata adnato-ſeſſilia ſubovata acutiuſcula, ſuperne planiuſcula, ſubtus gibba, pulpoſa nuda.* Cyma *ramoſa bifida ſubrecurva.* Flores *ſeſſiles ſecundi.* Corolla *alba ſeu purpuraſcenti-alba.* Capſulae *purpuraſcentes.* Hudſ. l. c.

25. SEDUM *annuum.*

S. caule erecto ſolitario annuo, foliis ovatis ſeſſilibus gibbis alternis, cyma recurva. *Fl. ſuec.* 391, 405. * *Mill. dict. n.* 7.
S. minimum non acre, flore albo. *Raj. angl.* 3. *p.* 270. *t.* 12. *f.* 2. *figura tenuis.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 639.
Jähriges Sedum. W.
Habitat in Europa *boreali.* ☉ (v. v.)

Simile *S. antecedenti, ſed* Folia *rubicunda et planta annua.* Flores *ſimiliter lutei.*

*26. SEDUM *pubeſcens.*

C. pubeſcens, foliis oblongis obtuſis ſupra planiuſculis, cyma bifida, petalis lanceolatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 52.*
Behaartes Sedum. W.
Habitat in fiſſuris rupium Tuneti.

27. SEDUM *villoſum.*

S. foliis oblongis ſupra planiuſculis pedunculisque axilla-

ribus ſubunifloris pubeſcentibus, petalis ovatis obtuſiuſculis. *Vahl. ſymb. 2. p.* 52.

S. caule erecto, foliis planiuſculis, pedunculisque ſubpiloſis. *Mill. dict. n.* 10. *Leers. herb. n.* 339. *Pollich. pal. n.* 433. *Moench. haſſ. n.* 374. *Mattuſch. ſil. n.* 323. *Fl. dan. t.* 24. *Kniph. cent.* 3. *n.* 83. *Doerr. naſſ. p.* 211. *Hoffm. germ.* 157. *Roth. germ. I.* 196. *II.* 503.

S. hirſutum et viſcidum, foliis linearibus, obtuſis, planiuſculis. *Hall. helv. n.* 962.

S. paluſtre ſubhirſutum purpureum. *Bauh. pin.* 283.

S. minus III. ſ. paluſtre. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 59.

S. paluſtre II. *Cluſ.*

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 639.

Haariges Sedum. W.

Habitat in pratis paludoſis Germaniae, Angliae, Galliae, Pyrenaeis. ⊙ (v. ſ.)

Pedunculi *laterales* 1-*ſ.* 2-*flori*; Flores *purpurei. Hall.*

28. SEDUM *atratum.*

S. caule erecto, floribus corymboſis faſtigiatis. *Iacq. auſt.* 1. *t.* 8. *Hoffm. germ.* 157.

S. caule folioſo, erecto, umbellato, humillimo, foliis teretibus. *Hall. helv. n.* 963.

S. ſaxatile, atrorubentibus floribus. *Bauh. pin.* 238. *prodr.* 132. *Scheuchz. it.* 1. *p.* 48. *t.* 6. *f.* 34. *Segui. ver.* 3. *p.* 207.

S. ſaxatile, variegato flore. *Bauh. prodr.* 132. *Hall.* R.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 6. *p.* 640.

Schwärzliches Sedum. W.

Habitat in Helvetiae, Italiae *alpibus. Allioni.* ⊙ (v. ſ.)

Diverſiſſime planta a Craſſula *rubente.* Caulis *erectus, pollicaris, ramis ad radicem duobus oppoſitis, altitudine caulis.* Folia *oblonga, baſi ſoluta.* Pedunculi *alterni, uniflori, in corymbum faſtigiatum digeſti.* Calyces *atro-purpuraſcentes.* Petala *alba, ovata, longitudine calycis.* Stamina *decem.* Germina *atropurpuraſcentia.*

*29. SEDUM *nudum.*

S. foliis ſparſis oblongo-cylindraceis obtuſis, caulibus fruticoſis ramoſiſſimis, ramis tortuoſis, cymis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 112.

Nacktäſtiges Sedum. W.

Habitat in Madera. ♄ (v. v.)

914. PENTHORUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 790.

Cal. 5-fidus. *Petala* nulla ad quinque. *Capſ.* 5-cuſpidata, 5-locularis.

1. PENTHORUM *ſedoides.*
Penthorum. *Gron. virg.* 51. * *Act. upſ.* 1744. *p.* 12. *t.* 2. *Mill. dict.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 641.
Sedumartiges Fünfſpitzenkraut. W.
Habitat in Virginia. ♃ (v. v.)
Caulis *herbaceus, diffuſus, ſeu rectus, angulatus, angulis ſcabris.* Rami *alterni, cauli ſimiles.* Folia *alterna, ſubpetiolata, ſerrata, vix carnoſa, utrinque viridia.* Pedunculus *terminalis ſpicis aliquot revolutis.* Flores *alterni, pedicellati, adſcendentes.* Calyx 5-10-*fidus: laciniis alternis ſaepius majoribus.* Stamina 10, *alba.* Antherae *rubicundae.* Styli *nulli.*

915. BERGIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 791.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* 1, globoſa, 5-toruloſa, 5-locularis, 5-valvis: valvulis petaloideis. *Sem.* plurima.

1. BERGIA *verticillata.* W.
B. foliis lanceolatis apice denticulatis, floribus verticillatis. W.
B. (*capenſis*) foliis lanceolatis ſ. ellipticis, floribus verticillatis. *Lin. ſuppl.* 243.
Bergia capenſis. *Mant.* 241. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 50.
Pola-tſjira. *Rheed. mal.* 9. *p.* 153. *t.* 78.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 643.
Wirtelblütige Bergie. W.
Habitat in India *orientali.* (v. ſ.)
Statura *Ammanniae.* Caulis *ſimpliciſſimus, ſemipedalis, craſſitie pennae columbinae, erectus, laevis, ſubſucculentus.* Folia *oppoſita, ſubpetiolata, lanceolata obtuſiuſcula tenuiſſime ſerrata, laevia, patentia.* Flores *verticillati, ſubſeſſiles, copioſiſſimi, confertiſſimi.* Capſulae *valvulae poſt maturitatem perſiſtentes formant quaſi florem pentapetalum rotatum.*

Mutavi nomen triviale, quum planta non creſcat ad Promontorium bonae ſpei, ſed in India orientali. W.

2. BERGIA *glomerata.*

B. foliis obovatis crenulatis, floribus glomeratis. *Lin. ſuppl.* 243. *Thunb. prod.* 82.

Knaulblütige Bergie. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

Diverſa a praecedente: foliis *minutis glomeratis itidem crenulatis*, floribus *minutis glomeratis*, caule *magis diffuſo ramoſo.*

916. SURIANA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 792.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Styli* inſerti lateri interiori germinum. *Sem.* 5, nuda.

1. SURIANA *maritima.*

Suriana. *Hort. cliff.* 592. *Iacq. amer.* 140. *Mill. dict. Swartz. obſ.* 185.* *Forſt. prod. n.* 199. *Lamarck illuſt. gen. t.* 389.

Thymelaeae facie frutex maritimus tetraſpermus. *Sloan. jam.* 2. *p.* 29. *t.* 162. *f.* 4.

Suriana foliis portulacae anguſtis. *Plum. gen.* 37. *ic.* 249. *f.* 1.

S. maritima, foliis lanceolatis, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 190.

Arbor americana, ſalicis folio, frondoſa bermudienſis. *Pluk. alm.* 44. *t.* 241. *f.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 668.

Meerſtrands Suriane, W.

Habitat in Americae *calidioris maritimis.* ♄

Stamina *huic* 10 *adſcripſit Iacquin.*

917. GRIELUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 793.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Filamenta* perſiſtentia. *Pericarpia* 5, monoſperma.

1. GRIELUM *tenuifolium.*

Geranium (*grandiflorum*) pedunculis ſimplicibus uniflo-ris, foliis tripartito-multifidis linearibus tomentoſis. *Burm. ger.* 1. *Spec. pl.* 2. *p.* 958.

Geranium fruteſcens incanum, flore magno luteo dentato. *Burm. afr.* 88. *t.* 34. *f.* 1.
Ranunculo-Platycarpos. *Burm. afr* 145. *t.* 53.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 643.
Dünnblättriges Grielum. W.
Habitat in Aethiopia. ♃

Frutex. Folia *Abrotani, incana, ſubtomentoſa, alterna.* Pedunculi *uniflori absque bracteis.* Calyces *glabri.* Corollae *luteae.*

918. OXALIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 794.

Cal. 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Stam.* inaequalia 5 breviora exteriora baſi connata. *Capſ.* angulis dehiſcens, 5-gona.

* *Foliis ſimplicibus.*

1. OXALIS *monophylla.*

O. acaulis, ſcape unifloro, foliis ellipticis obtuſis, filamentis glabris. W.
O. (*monophylla*) ſtipitata ſimplicifolia ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 35. *p.* 56. *t.* 79. *f.* 3. *
O. foliis ovatis indiviſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 1. *
O. ſcapo unifloro, foliis ſimplicibus. *Mant.* 241.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 644.
Einblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Radix *bulboſa.* Folia *radicalia petiolata ſimplicia,* (*nec ternata*), *ovata ſ. obovata* (*Bellidis*) *integerrima tenera nuda.* Petioli *foliis longiores.* Scapi *filiformes plures uniflori aphylli.* Flos *folio major ſimilis O. Acetoſellae.*

***2. OXALIS** *lepida.*

O. acaulis ſcapo unifloro, foliis obovatis ſubretuſis, filamentis glanduloſo-piloſis ſimplicibus. W.
O. (*lepida*) ſtipitata ſimplicifolia, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 34. *p.* 55. *t.* 21. *
Niedlicher Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Corolla *albida.* W.

*3. OXALIS *roſtrata.*

O. acaulis ſcapo unifloro, foliis obovatis retuſis, filamentis interioribus apice roſtratis piloſo-glanduloſis, antheris lateralibus. W.

O. (*roſtrata*) ſtipitata ſimplicifolia, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 36. *p.* 57. *t.* 22. *

Schnabelfädiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *dilute violaceo-albida.* W.

Hae tres ſpecies habitu, foliis, bulbo floribusque adeo ſibi ſimiles ſunt, ut aegre diſtingui poſſint. Genitalia *vero differunt quam maxime. Praeter longitudinem diverſam ſtylorum ſunt in O. lepida* filamenta *interiora gibboſa denticulata inaequalia, exteriora autem omnium breviſſima. In O. monophylla* filamenta *ſunt edentula et aequalia. Talia etiam ſunt in O. roſtrata, ſed hic apice ſingulariter roſtrata, qua nota differt ab omnibus mihi viſis Oxalidibus.* Iacq. l. c.

** *Foliis binatis.*

*4. OXALIS *aſinina.*

A. acaulis ſcapo unifloro, foliis binatis lanceolatis margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W.

O. (*aſinina*) ſtipitata, binatifolia, foliolis lanceolatis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 38. *p.* 59. *t.* 24. *

Eſelsohrblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Corolla *magna flava.* Filamenta *interiora glanduloſa.* Petioli *breviſſime alati.* Scapus *foliis longior.* W.

*5. OXALIS *lanceaefolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis binatis ternatisque margine cartilagineis ſcabris, petiolis alatis. W.

O. (*lanceaefolia*) ſtipitata, foliis binatis ternatisque, ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis. *Iacq. Oxal. n.* 40. *p* 61. *t.* 26. *

Lanzenblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* Petioli *breviſſime alati.* Scapus *longitudine foliorum.* W.

*6. OXALIS *leporina.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis binatis ellipticis emarginatis, margine cartilagineis denticulatis, petiolis alatis. W.

O. (*leporina*) ſtipitata binatifolia, foliolis lanceolatis, ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis. *Iacq. Oxal. n.* 39. *p.* 60. *t.* 25. *

Haſenohrblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *alba margine rubicunda.* Filamenta *interiora glanduloſa.* Folia *glauca.* Ala *petiolorum ovata.* Scapus *foliis longior.* W.

*7. OXALIS *criſpa.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis binatis ſubrotundo-obovatis emarginatis, margine undulatis petiolis ſubrotundo-alatis. W.

O. (*criſpa*) ſtipitata binatifolia, foliolis obverſe ovatis criſpis. *Iacq. Oxal. n.* 37. *p.* 58. *t.* 23. *

Krauſer Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *inter maximas hujus generis alba.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* Ala *petiolorum ſubrotundo-ovata magna.* Folia *margine cartilaginea crenata undulata.* Scapus *foliis longior.* W.

*** *Foliis ternatis, ſcapo unifloro.*

*8. OXALIS *fabaefolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis obovatis emarginatis mucronatis, petiolis alatis. W.

O. (*fabaefolia*) foliolis obverſe-ovatis planis, petiolis alatis. *Iacq. Oxal. n.* 41. *p.* 63. *t.* 27. *

Bohnenblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *ampla flava.* Filamenta *glanduloſa.* Scapus *foliis longior.* Ala *petiolorum ſubrotunda.* W.

*9. OXALIS *laburnifolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtuſis foliolo intermedio baſi attenuato, petiolo ſemitereti compreſſo, calycibus margine glanduloſo-piloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*laburnifolia*) foliolo medio ſublanceolato, lateralibus oblique oblongis, ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis. *Iacq. Oxal. n.* 42. *p.* 63. *t.* 28. *

Bohnenbaumblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Planta *pubeſcens.* Petioli *compreſſi ſemiteretes, nudi, ut in affinibus ſpeciebus, purpuraſcentes.* Sca-

pus *foliis longior medio binis bracteis minutis inſtructus.* Calycis *foliola pubeſcentia margine piloſo-glanduloſa.* Corolla *flava.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

*10. OXALIS *ſanguinea.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtuſis, foliolo intermedio baſi attenuato, petiolo ſemitereti compreſſo, calycibus ſimpliciter piloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*ſanguinea*) foliolo medio ſublanceolato, lateralibus oblique oblongis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 43. *p.* 64. *t.* 29. *

Blutigblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Planta *ſubpubeſcens.* Petioli *compreſſi ſemiteretes purpuraſcentes.* Folia *juniora ſanguinea.* Scapus *longitudine foliorum medio bracteis binis inſtructus.* Calycis *foliola pubeſcentia, nec glanduloſa.* Corolla *ſaturate flava.* Filamenta *interiora hiſpida.* W.

*11. OXALIS *ambigua.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis, foliolis oblongis obtuſis, intermedio cuneiformi, calycinis foliolis aequalibus ciliato-piloſis apice bimaculatis, ſtylis ſtaminibus longioribus. W.

O. (*ambigua*) ſtylis longiſſimis, foliolis immaculatis planis, calycinis foliolis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 59. *p.* 80. *t.* 43. *

Zweifelhafter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *piloſiuſcula ciliata plana.* Corolla *alba fundo flaveſcente.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

*12. OXALIS *undulata.*

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis, foliolis oblongis obtuſis undulatis, intermedio cuneiformi, calycinis foliolis piloſis punctatis, unico ſpathulato majore, ſtylis ſtaminibus longioribus. W.

O. (*undulata*) ſtylis longiſſimis, foliolis immaculatis undulatis, foliolo uno calycis ſpathulato. *Iacq. Oxal. n.* 60. *p.* 81. *t.* 44. *

Wellenförmiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *piloſiuſcula ciliata margine undulata.* Corolla *alba fundo flavo.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

***13. OXALIS *fuſcata*.**

O. acaulis ſcapo unifloro, foliis ternatis maculatis oblongis obtuſis, foliolo intermedio cuneiformi-ſubrotundo, calycinis foliolis aequalibus interrupte biſtriatis, ſtylis ſtaminibus longioribus. W.

O. (*fuſcata*) ſtylis longiſſimis, foliolis utrinque maculatis. *Iacq. Oxal. n.* 61. *p.* 82. *t.* 45.*

Braunfleckiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *piloſa ſubretuſa utrinque maculata.* Corolla *alba fundo flaveſcente.* Stamina *interiora glanduloſa. Valde affinis O. ambiguae et forte varietas.* W.

***14. OXALIS *glanduloſa*.**

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtuſis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque glanduloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*glanduloſa*) ſtylis intermediis, foliis calycibusque capitate ciliatis. *Iacq. Oxal. n.* 62. *p.* 83. *t.* 46.*

Drüſiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia, petioli *et* calyces *glandulis pedicellatis tecti.* Scapus *longitudine foliorum.* Corolla *alba fundo flavo.* Stamina *interiora glanduloſa.* W.

***15. OXALIS *tricolor*.**

O. acaulis, ſcapo unifloro, foliis ternatis oblongis obtuſis, foliolo intermedio cuneiformi, calycibusque ſimpliciter piloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*tricolor*) ſtylis intermediis, ciliis ſimplicibus. *Iacq. Oxal. n.* 63.

α. corolla interne flava. *Iacq. l. c. p.* 84. *t.* 47.*

β. corolla interne alba. *Iacq. l. c. p.* 85. *t.* 48.

Dreyfarbiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Similis praecedenti, ſed ſcapus *longior, et* pili *foliorum et calycis ſimplices nec glandula inſtructi. In varietate α.* foliola *ſunt longiora cuneiformia,* corolla *interne flava, externe alba rubro-marginata. In varietate β. eſt* corolla *interne alba fundo flavo, externe alba rubro-marginata.* W.

***16. OXALIS *rubro-flava*.**

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis parum longiore erecto,

foliis ternatis lanceolato-oblongis retuſis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*rubro-flava*) ſtylis breviſſimis, foliolis immaculatis, ſcapis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 65. *p.* 87. *t.* 50. *

Gelbrother Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Foliola *magis lanceolata quam in binis ſequentibus,* ſcapusque *parum foliis longior.* Corolla *flava externe rubro-marginata.* Stamina *interna glanduloſa.* W.

*17. OXALIS *flaccida.*

O. acaulis ſcapo unifloro foliis duplo longiore nutante, foliis ternatis oblongis retuſis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*flaccida*) ſtylis breviſſimis, foliolis immaculatis, ſcapis flaccidis. *Iacq. Oxal. n.* 66. *p.* 88. *t.* 51. *

Welkſchaftiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Corolla *alba fundo flava externe rubro-marginata.* Filamenta *interiora glanduloſa. A praecedente ſcapo flaccido nutante multo longiore diſtincta.* W.

*18. OXALIS *exaltata.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis duplo longiore ſtricto, foliis ternatis ellipticis emarginatis ſubtus villoſis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*exaltata*) ſtylis breviſſimis, foliolis fuſco-maculatis, ſcapis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 64. *p.* 86. *t.* 49. *

Steifſchaftiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Foliola *in binis praecedentibus ſunt pubeſcentia ſed non inferne tam denſe villoſa.* Scapi *ſtricti.* Corolla *minor alba fundo flava, externe rubro-marginata.* Filamenta *interiora hiſpida. Parvitate foliolorum etiam ab antecedentibus diſtincta.* W.

*19. OXALIS *variabilis.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore flaccido, foliis ternatis ſubrotundis, foliolo intermedio cuneiformi, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*variabilis*) ſtylis breviſſimis, foliolis immaculatis leviſſime emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 67. *p.* 89. *t.* 52. *

O. (*purpurea*) β. foliis totis viridibus limbo albo. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 8. *p.* 13. β.

β. flore rubro. *Iacq. l. c. p.* 90. *t.* 53.*
Veränderlicher Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *ſubrotunda piloſa.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa. In varietate α.* calycis *foliola ſunt margine glanduloſa et apice piloſa et* corolla *incarnato-alba. In varietate β. ſunt* calyces *ſimpliciter piloſi et* corolla *roſacei coloris.* W.

*20. OXALIS *grandiflora.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis breviore erecto, foliis ternatis ſubrotundis, foliolo intermedio cuneiformi, petalis truncatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*grandiflora*) ſtylis breviſſimis, foliolis ſubtus ſaepe ſanguineis vix emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 68. *p.* 91. *t.* 54.*

Groſsblütiger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *candida fundo flaveſcente, petalis truncatis. A praecedente magnitudine floris, et ſcapo ſtricto breviore diſtincta.* W.

*21. OXALIS *ſulphurea.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis ſubrotundis, calycinis foliolis margine clavato-piloſis apice reflexis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*ſulphurea*) ſtylis breviſſimis, filamentis edentulis, calyce ciliato. *Iacq. Oxal. n.* 77. *p.* 100. *t.* 63.*

Mattgelber Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *ſubtus ſanguinea aureo-punctata.* Scapus *longitudine foliorum.* Calycis *foliola apice reflexa margine glandulis pedicellatis et pilis clavatis inſtructa.* Corolla *pallide ſulphurea vel albo-luteſcens.* Filamenta *interiora hiſpida.* W.

*22. OXALIS *purpurea.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis ſubrotundis, petiolis teretibus, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*purpurea*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis petiolis teretibus, foliolis immaculatis. *Iacq. Oxal. n.* 70. *p.* 93. *t.* 56.*

β. O. (*laxula*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis,

petiolis teretibus, foliolis ſaepe ſubtus purpuraſcentibus. *Iacq. Oxal. n.* 71. *p.* 94. *t.* 57. *
Oxalis purpurea. *Thunb. diſſ. de Oxal. n.* 8. *p.* 13. *var.* 2. γ.
Purpurfarbener Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *ſubrotunda leviſſime retuſa, ciliata. In* α. corolla *purpurea fundo flavo, in* β. corolla *alba fundo flavo et* folia *interdum ſubtus fuſco-ſanguinea. In binis varietatibus ſunt* filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* W.

*23. OXALIS *breviſcapa.*

O. acaulis, ſcapo unifloro petiolis duplo breviore, foliis ternatis ſubrotundis, petiolis compreſſo-planis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*breviſcapa*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis, petiolis craſſis compreſſis. *Iacq. Oxal. n.* 72. *p.* 95. *t.* 58. *

Kurzſchaftiger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *ſubtus ſanguinea punctata.* Scapus *breviſſimus.* Corolla *alba fundo flaveſcente.* Staminibus *interioribus glanduloſis.* W.

24. OXALIS *ſpecioſa.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis ſubrotundis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*ſpecioſa*) ſtylis longiſſimis, foliolis ſupra immaculatis, ſubtus ſanguineis et aureo punctatis. *Iacq. Oxal. n.* 74. *p.* 97. *t.* 60. *

O. (*purpurea*) ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis ſubrotundis ciliatis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 8. *p.* 12. *var.* 1. α.

O. (*purpurea*) ſcapo unifloro, foliis ternatis emarginatis ciliatis. *Sp. pl.* 621. *Mill. dict. n.* 5. *Fabr. helmſt.* 244.

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice bulboſa. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458. *Sp. pl.* 1. *p.* 433. *Ehret. pict. t.* 10. *f.* 2.

Oxalidi affinis planta bulboſa africana, flore purpureo magno. *Breyn. cent.* 102. *t.* 46.

Oxys bulboſa africana rotundifolia, caulibus et floribus purpureis amplis. *Commel. hort.* 1. *p.* 41. *t.* 21.

β. O. (*ſuggillata*) ſtylis longiſſimis, foliolis adultis ſub-

tus totis et ſupra ad oras lividis. *Iacq. Oxal. n.* 75. *p.* 98. *t.* 61.*

Oxalis purpurea. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 8. *p.* 13. *var.* 2. 8.
Oxys bulboſa trifolia hirſuta, flore albido. *Burm. afr.* 67. *t.* 27. *f.* 3.

γ. O. (*rigidula*) ſtylis longiſſimis, foliolis immaculatis. *Iacq. Oxal. n.* 73. *p.* 96. *t.* 59. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 646.
Prächtiger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *obcordata obſolete emarginata, etiam ſubtus glabra tenuiſſime ciliata ſubcuneiformi-rotundata.* Scapi *uniflori longitudine foliorum.* Petioli *piloſi.* Calyx *pubeſcens.* Corolla *majuſcula campanulata quinquepartita purpuraſcens tubo flavo.* Filamenta *quinque exteriora breviora baſi connata, dente diſtinguente ſingula interiora.* Stigmata *plumoſa proſtrata, extra* filamenta *longiora.*

Staminum *fabrica in omnibus fere eadem, exceptis paucis ſpeciebus, quae dentibus diſtinguentibus in ſtaminibus exterioribus carent.* W.

In varietate α corolla *purpurea fundo flavo, et* folia *ſubtus purpurea punctata;* β. corolla *alba fundo flaveſcente et* folia *inferne et ſuperne margine livido-ſanguinea;* γ. corolla *alba fundo et margine petalorum externe flavo,* folia *immaculata et* ſcapi *longiores.* W.

25. OXALIS *Acetoſella.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum, radice articulata. W.
O. ſtylis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 91. *p.* 11[illegible] 1.*
O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obco[illegible] loſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 5. *p.* 9. *
O. ſcapo unifloro, foliis ternatis obcordatis, radice dentata. *Syſt. veg.* 360. *Roth. germ. I.* 200. *II.* 516. *Hoffm. germ.* 157.
O. ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſo-articulata. *Hort. cliff.* 175. *Fl. ſuec.* 385. 406. *Roy. lugdb.* 458. *Mat. med.* 118. *Pollich. pal. n.* 434.
O. foliis ternatis ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 194.
Oxys ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſe articulata. *Hall. helv. n.* 928.
Oxys trifolium acetoſum floribus lacteis. *Tabern.* 525.
Lujula. *Blackw. t.* 308.

Trifolium acetoſum vulgare. *Bauh. pin.* 330. *Dod. pempt.* 578.
β. Oxys flore ſubcoeruleo. *Tournef. inſt.* 88.
γ. Oxys flore purpuraſcente. *Tournef. inſt.* 88.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 645.
Gemeiner Sauerklee. W.
Habitat in ſylvis nemoribusque umbroſis Europae, Japoniae. ♃ (v. v.)

*26. OXALIS *magellanica.*

O. acaulis, ſcapo unifloro longitudine petioli, foliis ternatis obcordatis carnoſis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum, radice fibroſa. W.
O. (*magellanica*) ſcapis unifloris, foliolis ſubrotundis emarginatis carnoſis. *Forſt. comment. goett.* 9. *p.* 33. *
Magellaniſcher Sauerklee. W.
Habitat in Terra del Fuego *locis irriguis.* ♃

*27. OXALIS *marginata.*

O. acaulis, ſcapo unifloro petiolis dimidio breviore, foliis ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*margiuata*) ſtylis intermediis, filamentis edentulis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 85. *p.* 108. *t.* 68. *
Randblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Foliola *ſubrotundo-obcordata ciliata inferne ſanguinea viridi marginata.* Calycis *foliola apice reflexa, margine pilis clavatis ciliata.* Corolla *alba fundo flaveſcente.* Filamenta *interiora hiſpida.* W.

*28. OXALIS *pulchella.*

O. acaulis, ſcapo unifloro petiolis triplo breviore, foliis ternatis obcordatis, calycinis foliolis clavato-ciliatis apice reflexis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.
O. (*pulchella*) ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis. *Iacq. Oxal. n.* 86. *p.* 109. *t.* 69. *
Schöner Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Foliola *ſubtus ſanguinea aureo-punctata.* Corolla *alba ramis rubicundis, fundo flaveſcente. Simillima praecedenti, diverſa tamen:* ſcapo *breviore,* longitudine *ſtylorum et* ſtaminibus *interioribus glanduloſis.* W.

*29. OXALIS *obtuſa*.

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis denſe piloſis, calycinis foliolis apice rotundato-obtuſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*obtuſa*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis inaequalibus, foliolis calycinis rotundato-obtuſis. *Iacq. Oxal. n.* 83. *p.* 106. *t.* 79. *f.* 1. *

Oxalis lanata. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 6. *p.* 11. *α*.

Stumpfkelchiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *denſe pubeſcentia*. Corolla *rubra*. Calyx *piloſus, foliolis obtuſiſſimis*. Filamenta *glabra*. W.

30. OXALIS *lanata*.

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis villoſis, calycinis foliolis acutis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*lanata*) ſtylis breviſſimis, filamentis gibboſe denticulatis aequalibus, foliolis utrinque hirſutiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 81. *p.* 104. *t.* 77. *f.* 2. *

O. (*lanata*) ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis hirſutis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 6. *p.* 10. *β*.

O. (*lanata*) ſcapo unifloro, foliis ternatis obcordatis tomentoſis. *Lin. ſuppl.* 244. * (*excluſo Raji ſynonymo et floris colore.*)

Haariger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *lanata*. Corolla *alba*. Calyx *villoſus, foliolis acutis*. Filamenta *exteriora et interiora hirta*. W.

*31. OXALIS *truncatula*.

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis duplo longiore, foliis ternatis foliolis triangularibus margine villoſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*truncatula*) ſtylis longiſſimis, foliolis truncatis. *Iacq. Oxal. n.* 76. *p.* 99. *t.* 62. *

Dreyeckigblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *cuneiformia truncata ſubtus livida, margine villoſa*. Corolla *lilacina fundo albido*. Filamenta *interiora glanduloſa*. W.

*32. OXALIS *ſtrumoſa*.

O. acaulis, ſcapo foliis breviore, foliis ternatis obcorda-

tis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus ſub apice ſtrumoſis. W.

O. (*ſtrumoſa*) ſtylis breviſſimis, filamentis denticulatis aequalibus, foliolis utrinque maculatis. *Iacq. Oxal. n.* 79. *p.* 102. *t.* 64. *

Knopfgrifflicher Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *obcordata ſuperne fuſco-maculata, inferne ſordide ſanguinea.* Corolla *alba fundo flavo, petalis externe margine rubris.* Stamina *interiora glanduloſa.* Styli *ſub ſtigmate inferne tuberculo inſtructi.* W.

33. OXALIS *punctata.*

O. acaulis, ſcapo foliis longiore, foliis ternatis obcordatis punctatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*punctata*) ſtylis breviſſimis, filamentis denticulatis inaequalibus, foliolis ſubtus coloratis et aureo punctatis. *Iacq. Oxal. n.* 82. *p.* 105. *t.* 66. *

O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis punctatis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 3. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 3. *

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis obcordatis punctatis. *Lin. ſuppl.* 243.

Punctirter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis verſus montem tabularem.* ♃ (v. ſ.)

Foliola *obcordata utrinque excavato-punctata, inferne rubra, aureo-punctata.* Corolla *albido-rubicunda fundo flavo.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* W.

*34. OXALIS *luteola.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis obcordatis piloſis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*luteola*) ſtylis breviſſimis, filamentis denticulatis aequalibus, foliolis utrinque immaculatis et villoſulis. *Iacq. Oxal. n.* 80. *p.* 103. *t.* 65. *

Gelblicher Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *obcordata piloſa.* Corolla *flava.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

*35. OXALIS *macrogonya.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis breviore, foliis ternatis

obcordatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*macrogonya*) ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis, ſtipite ſubterraneo. *Jacq. Oxal. n.* 87. *p.* 110. *t.* 70. *

Langgegliederter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *obcordata margine ciliata.* Scapi *articulus ad baſin longior quam in reliquis.* Corolla *flava.* Filamenta *interiora glandulosa.* W.

*36. OXALIS *fallax.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis piloſiuſculis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*fallax*) ſtylis intermediis, filamentis denticulatis aequalibus. *Jacq. Oxal. n.* 84. *p.* 107. *t.* 67. *

Betrüglicher Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Simillima praecedenti, ſed: articulus *ſcapi breviſſimus,* ſcapus *longior et* ſtyli *breviores.* Corolla *flava.* W.

*37. OXALIS *tenella.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis glabris, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*tenella*) ſubcauleſcens, corollis campanulatis, filamentis edentulis, foliolis obverſe cordatis. *Jacq. Oxal. n.* 32. *p.* 53. *t.* 19. *

Zarter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *obcordata glabra.* Calycis *foliola acuta.* Corolla *pallide violacea fundo flavo.* Filamenta *interiora et exteriora glanduloſa.* W.

*38. OXALIS *minuta.*

O. acaulis, ſcapo foliis longiore, foliis ternatis lineari-lanceolatis acutis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*minuta*) foliolis lanceolatis acutis, ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis. *Jacq. Oxal. n.* 44. *p.* 65. *t.* 79. *f.* 2. *

O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis oblongis glabris. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 2. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 3. *

Kleinſter Sauerklee. W.

Habitat in campis arenoſis Cap. b. ſpei *verſus montem* tabularem. ♃
Corolla *alba fundo flavo.* Filamenta *glabra.* W.

*39. OXALIS *puſilla.*
O. ſubcauleſcens, ſcapo unifloro longitudine foliorum, foliis ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*puſilla*) filamentis denticulatis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 58. *p.* 79. *t.* 42. *
Niedriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Saepe *acaulis, interdum vero caulis parum elongatus decumbens.* Foliola *glauca lineari-cuneiformia truncata emarginata.* Corolla *alba pallide incarnata.* Filamenta *glabra.* W.

**** *Foliis ternatis, ſcapo multifloro.*

40. OXALIS *compreſſa.*
O. acaulis, ſcapo bifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, petiolis planis compreſſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.
O. (*compreſſa*) foliis ternatis ſubtus hirſutis, petiolis compreſſis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 19. *p.* 40. *t.* 78. *f.* 3. *
O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis ciliatis, petiolis compreſſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 7. *p.* 11. *
O. ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis, petiolis dilatato-planatis. *Lin. ſuppl.* 243.
Flachſtieliger Sauerklee. W.
Habitat in campis arenoſis humidis Cap. b. ſpei. ♃
Scapi *biflori.* Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* W.

41. OXALIS *ſericea.*
O. acaulis, ſcapo umbellifero foliis longiore, floribus nutantibus, foliis ternatis obcordatis ſericeis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*ſericea*) foliis ternatis tomentoſis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 13. *p.* 34. *t.* 77. *f.* 1. *
O. ſcapis umbelliferis, foliis ternatis tomentoſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 13. *p.* 16. *
O. cauleſcens, pedunculis umbelliferis, foliolis obcordatis tomentoſis. *Lin. ſuppl.* 243.
Seidenartiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *inter montem* tabularem *et* leonis. ♃
Calycis *foliola acuminata.* Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* W.

*42. OXALIS *megalorhiza.*
O. acaulis, ſcapo umbellifero foliis breviore, floribus erectis, foliis ternatis obcordatis, radice craſſa multicipite. W.
O. (*megalorhiza*) foliis ternatis, radice multicipite. *Iacq. Oxal. n.* 12. *p.* 33. *
Oxys luteo flore radice craſſiſſima. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 734. *t.* 25. *
Groſswurzliger Sauerklee. W.
Habitat in Peru *locis montoſis.* ♃
Ab omnibus radice diſtincta. W.

*43. OXALIS *tetraphylla.*
O. acaulis, ſcapo umbellifero longitudine foliorum, floribus nutantibus, foliis ternatis quaternisve obcordato-triangularibus glabris, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.
O. (*tetraphylla*) ſcapis umbelliferis, foliis ternatis et quaternatis, foliolis cordatis inferne glaucis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 19. *t.* 237. *
Vierblättriger Sauerklee. W.
Habitat in Mexico. ♃
Folia *glabra e tribus vel quatuor foliolis compoſita.* Corolla *rubro-violacea.* W.

44. OXALIS *violacea.*
O. acaulis, ſcapo bifido umbellifero, floribus nutantibus, foliis ternatis obcordatis glabris, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*violacea*) foliis ternatis obſolete villoſis, ſtylis breviſſimis, filamentis interioribus aequalibus, floribus clauſis cernuis expanſis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 14. *p.* 35. *t.* 80. *f.* 2.
O. ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, calycibus calloſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 10. *p.* 13. *
O. ſcapo umbellifero, foliis ternatis obcordatis, calycibus apice calloſis. *Sp. pl.* 621. *Iacq. hort.* 2. *p.* 84. *t.* 180.
O. caule aphyllo, flore purpureo, radice tuberoſa rotunda. *Gron. virg.* 161.

Oxys purpurea virginiana, radice lilii more nucleata. *Plum. alm.* 274. *t.* 102. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 646.
Violetter Sauerklee. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♃ (v. ſ.)
Scapus *apice bifidus, ramis apice umbellatis, et flos ſolitarius pedunculatus in dichotomia.* Corolla *violacea.* Stamina *hirta.* W.

45. OXALIS *caprina.*

O. acaulis, ſcapo umbellifero paucifloro, floribus erectis, foliis ternatis obcordato-bilobis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*caprina*) foliis ternatis glabris ſemibilobis, ſtylis breviſſimis, filamentis interioribus inaequalibus, floribus erectis. *Iacq. Oxal. n.* 15. *p.* 36. *t.* 76. *f.* 1. *

O. (*caprina*) ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus erectis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 11. *p.* 13. *

O. (*Pes caprae*) ſcapo umbellifero, foliis ternatis ſubbipartitis apice ſubtus calloſis. *Sp. pl.* 622. *

O. radice fibroſa, foliis triphyllis cordatis ſubtus incanis, florum petiolis longiſſimis. *Burm. afr.* 73. *t.* 28. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 648.
Ziegenfuſsblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *copioſe.* ♃
Flores *erecti.* Corolla *violacea fundo flavo.* Stamina *piloſa.* W.

*46. OXALIS *cernua.*

O. acaulis, ſcapo umbellifero multifloro, floribus cernuis, foliis ternatis obcordato-bilobis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*cernua*) foliis ternatis glabris, ſtylis breviſſimis, filamentis interioribus aequalibus, floribus clauſis cernuis, expanſis erectis. *Iacq. Oxal. n.* 16. *p.* 37. *t.* 6. *

O. (*cernua*) ſcapis umbelliferis, foliis ternatis glabris, floribus plerisque clauſis cernuis. *Thunb. diſſ. n.* 12. *p.* 14. *t.* 2. *f.* 2. *

O. ſcapo umbellifero, foliis ternatis bipartitis. *Mill. ic.* 2. *p.* 130. *t.* 195. *f.* 1.
Hängender Sauerklee. W.
Habitat copioſiſſime ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)
Corolla *flava.* Filamenta *glabra.* W.

*47. OXALIS *dentata.*

O. acaulis, ſcapo ſubbifloro, foliis ternatis obcordatis,

calycinis foliolis apice tridentatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*dentata*) foliis ternatis, petiolis teretibus, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 17. *p.* 83. *t.* 7. *

Gezähnter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Scapi *bi-tri-ſ. quadriflori, floribus inapertis nutantibus.* Corolla *pallide incarnata.* Filamenta *interiora piloſa glanduloſa.* W.

*48. OXALIS *livida.*

O. acaulis, ſcapo bifloro, foliis ternatis obcordato-bipartitis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*livida*) foliis ternatis glabriuſculis, ſcapis bifloris, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 18. *p.* 39. *t.* 8. *

Blaublättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *profunde bipartita ſubtus violacea.* Corolla *incarnata.* Filamenta *interiora glanduloſa.* W.

***** *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, cauleſcentes, caule inferne nudo.*

*49. OXALIS *ciliaris.*

O. caule erecto inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis longiore, foliis ternatis oblongis emarginatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*ciliaris*) ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis, foliolis oblongis obtuſis. *Iacq. Oxal. n.* 45. *p.* 66. *t.* 30. *

Gefranzter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *oblonga obtuſa emarginata ſubtus piloſa, margine ciliata.* Petioli *baſi dilatati longe ciliati.* Corolla *purpurea fundo luteo.* Stamina *hiſpida.* W.

*50. OXALIS *arcuata.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculis unifloris petiolorum longitudine, foliis ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*arcuata*) foliis lineari-oblongis emarginatis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 46. *p.* 67. *t.* 31. *

Gebogener Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *lineari-oblonga baſi parum attenuata emargi-*

nata. Corolla *violacea.* Filamenta *hiſpida, exteriora et interiora inaequalia.* W.

*51. OXALIS *linearis.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis breviore, foliis ternatis linearibus emarginatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*linearis*) filamentis edentulis, ſtylis longiſſimis, corollis caryophyllaeis. *Iacq. Oxal. n.* 47. *p.* 68. *t.* 32. *

Linienblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *violacea fundo flavo.* Filamenta *glabra, interiora inaequalia.* W.

*52. OXALIS *cuneata.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis breviore, foliis ternatis cuneiformibus emarginatis piloſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*cuneata*) filamentis edentulis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 55. *p.* 76. *t.* 40. *

Keilblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Differt a praecedente: foliis *piloſis*, foliolis *cuneiformibus, brevioribus et latioribus*, corolla *alba fundo flavo infundibuliformi nec hypocrateriformi*, laminis *petalorum ſubrotundis nec ovatis acutiuſculis*, filamentis *glanduloſis, interioribus et exterioribus aequalibus.* W.

*53. OXALIS *cuneifolia.*

O. caule decumbente inferne nudo, pedunculo unifloro petiolis breviore, foliis ternatis lineari-cuneiformibus piloſis emarginatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*cuneifolia*) filamentis edentulis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 56. *p.* 77. *t.* 41. *

Keilförmiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Simillima praecedenti, caule, foliis, et floris colore, differt tantum: Filamentis *glanduloſis, interioribus inaequalibus et* ſtylis *filamentis brevioribus.* W.

*54. OXALIS *glabra.*

O. caule inferne nudo breviſſimo erecto, pedunculo unifloro foliis duplo longiore, foliis lineari-cuneiformibus

emarginatis ciliatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*glabra*) filamentis denticulatis, ſtylis longiſſimis. *Jacq. Oxal. n.* 57. *p.* 78. *t.* 76. *f.* 3. *

O. (*glabra*) caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis oblongis emarginatis glabris. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 17. *p.* 19. *t.* 2. *f.* 1. *

Glatter Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *in collibus arenoſis infra montem* tabularem. ♃

Corolla *purpurea fundo flavo.* Filamenta *glabra.* Foliola *lenti ſubjecta margine ciliata et una ſerie punctorum inſtructa.* W.

*55. OXALIS *bifida.*

O. caule inferne nudo erecto ſubramoſo, pedunculo unifloro foliis duplo longiore, foliis ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*bifida*) ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis, ſtipite exſerto ſubramoſo, foliolis ſemibifidis, corolla campanulata. *Jacq. Oxal. n.* 89. *p.* 112. *t.* 79. *f.* 4.

O. (*bifida*) caule erecto glabro, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis ſemibifidis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 16. *p.* 18. *t.* 1. *f.* 2. *

Zweytheiliger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei *ad foſſarum latera montis* Diaboli. ♃

Foliola *biloba glabra.* Corolla *violacea fundo flavo.* Filamenta *hirta.* W.

*56. OXALIS *filicaulis.*

O. caule inferne nudo decumbente ſubramoſo, pedunculo unifloro, foliis duplo longiore, foliis ternatis cuneiformibus emarginato-bifidis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*filicaulis*) ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obverſe cordatis ſemibifidis, ſtylis intermediis, ſtipite exſerto ſubramoſo. *Jacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 42. *t.* 205. *

Fadenſtieliger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *biloba glabra atroviridia.* Corolla *violacea, fundo flaveſcente.* Filamenta *glabra.* W.

57. OXALIS *longiflora.* †

O. caule inferne nudo ſimplici, pedunculo unifloro, foliis ternatis bipartitis. W.

O. ſcapo unifloro, foliis ternatis ſemibifidis, lobis lanceolatis. *Sp. pl.* 621. *Thunb. Oxal. n.* 90. *p.* 113.

Langblütiger Sauerklee. W.

Habitat in Virginia.

Caulis *nudus ſimplex ſquamis aliquot adſperſus, e radice per terram exit terminatus umbella ex foliis novem et flore unico.* Folia *petiolata ternata, foliolis ſeſſilibus plus quam ſemibifidis, lobis lanceolatis.* Pedunculus *uniflorus, in medio ſtipularum pari notatus.* Flos *unicus longus.*

Planta *minus nota a ſolo Linnaeo viſa.* W.

58. OXALIS *natans.*

O. caule inferne nudo nutante, pedunculis unifloris foliorum longitudine, foliis ternatis obcordatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*natans*) ſtylis breviſſimis, filamentis edentulis, calyce ad oras glabro, foliis natantibus. *Iacq. Oxal. n.* 78. *p.* 101. *t.* 76. *f.* 2. *

O. (*natans*) ſcapis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis glaucis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 4. *p.* 9 *t.* 1. *f.* 4. *

O. (*natans*) ſcapo unifloro, foliis ternatis natantibus. *Lin. ſuppl.* 243.

Schwimmender Sauerklee. W.

Habitat in aquis Cap. b. ſpei *prope fluvium* Breede rivier *infra* Roode Sand. ♃

Caulis *filiformis tenuiſſimus pro aquae profunditate, apice folioſus.* Folia *alterna conferta ternata petiolata laevia patentia.* Foliola *ſubrotunda integerrima uno alterove interdum emarginato ſeſſilia.* Petioli *communes vix foliorum longitudine.* Scapi *inter folia uniflori, longitudine foliorum.* Calyx *ſimplex.* Petala *alba baſi flaveſcentia.*

Filamenta *glabra.* W.

*59. OXALIS *convexula.*

O. caule inferne nudo decumbente, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis ſubrotundis punctatis, ſtipulis dilatatis acuminatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*convexula*) ſtylis intermediis, filamentis edentulis, foliolis convexis. *Iacq. Oxal. n.* 69. *p.* 92. *t.* 55.

Bogigblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *ſubrotunda convexa ſubcarnoſa punctata vix emarginata.* Stipulae *magnae connatae acuminatae.* Corolla *roſea fundo flavo.* Filamenta *glanduloſa.* W.

60. OXALIS *verſicolor.*

O. caule inferne nudo declinato, pedunculo unifloro foliis lon[illegible] foliis ternatis linearibus emarginatis apice bipu[illegible], ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*verſicolor*) filamentis denticulatis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 51. *p.* 72. *t.* 36. *

O. (*verſicolor*) caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis linearibus calloſis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 19. *p.* 21. *

O. pedunculis unifloris, caule ramoſo, foliis paſſim verticillatis linearibus emarginatis apice ſubtus barbatis. *Syſt. N. ed.* 13. *p.* 318.

O. caule ramoſo, pedunculis unifloris, foliis paſſim verticillatis linearibus emarginatis, apice ſubtus calloſis. *Sp. pl.* 2. *p.* 622.

O. caule ſimplici pedunculo unifloro abbreviato, foliis filiformibus ſubramoſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 434.

Oxys africana foliis tenuiſſimis in ſummitate caulis. *Raj. ſuppl.* 598.

β. *ſylveſtris*, minor ſtaminibus edentulis. W.

Oxalis verſicolor. *Iacq. Oxal. tab.* 77. *f.* 4.

Oxys africana foliis tenuiſſimis, flore amplo verſicolore. *Pluk. amalth.* 169. *t* 434. *f.* 5.

γ. O. (*gracilis*) filamentis edentulis, ſtylis longiſſimis, corollis campanulatis. *Iacq. Oxal. n.* 48. *p.* 69. *t.* 33. *

O. bulboſa, anguſtifolia, caule folioſo, flore rubro. *Burm. afr.* 66. *t.* 27. *f.* 2.

Oxys bulboſa africana anguſtifolia, flore rubro obſoleto amplo. *Raj ſuppl.* 548.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 650.

Bunter Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Planta *varians colore floris et ſtaminibus denticulatis edentulisque. In varietate* α. corolla *eſt alba rubro-marginata, interdum etiam rubra,* folia *ſunt anguſto-linearia. In varietate* β. caulis *eſt puſillus,* corolla *alba et rubro-marginata. In varietate* γ. folia *parum*

latiora et corolla *pallide roſea. Varietas β. ab O. lineari*, petalis *ſubrotundis*, pedunculis *longioribus et* ſtaminibus *interioribus aequalibus*, foliisque *glabris non ciliatis eſt diſtinctiſſima.* W.

*61. OXALIS *elongata.*

O. caule inferne nudo declinato, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*elongata*) filamentis denticulatis, ſtylis breviſſimis, petalis emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 52. *p.* 73. *t.* 37. *

β. O. (*miniata*) filamentis edentulis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 50. *p.* 71. *t.* 50. *

γ. O. (*amoena*) ſcapis unifloris, foliis ternatis linearibus, calycibus obtuſis, filamentis denticulatis inaequalibus, ſtylis breviſſimis. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 42. *t.* 206. *

Langſtieliger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *linearia ut in praecedente, totus habitus fere idem, ſed* ſtyli *diverſi. In varietate α.* corolla *eſt alba tenuiſſime rubro-marginata, leviſſime emarginata,* ſtaminaque *denticulata*; *in β.* corolla *miniata acutiuſcula,* ſtamina *edentula et* folia *latiora. Ceterum conveniunt ambo* ſtylo *et* filamentis *interioribus inaequalibus.* W.

*62. OXALIS *reclinata.*

O. caule inferne nudo ſubramoſo reclinato, pedunculo unifloro foliis longiore, foliis ternatis lineari-cuneiformibus emarginatis apice bipunctatis, calycinis foliolis adpreſſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*reclinata*) filamentis edentulis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 49. *p.* 70. *t.* 34. *

Zurückgebogener Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Caulis *longus debilis declinatus uno alterove ramo.* Folia *ſubverticillata.* Calycis *foliola adpreſſa apice ſphacelata.* Corolla *pallide miniata, petalis obtuſis.* Filamenta *hiſpida, interiora inaequalia.* W.

*63. OXALIS *polyphylla.*

C. caule inferne nudo erecto ſubramoſo, pedunculo unifloro petiolis duplo longiore, foliis ternatis linearibus emarginatis apice bipunctatis, calycinis foliolis apice reflexis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*polyphylla*) filamentis gibboſo-denticulatis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 54. *p.* 75. *t.* 39. *
Oxalis verſicolor. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 225. *Icon. rar.* 3. *t.* 473.
O. bulboſa trifolia, foliis linearibus obtuſis, flore externe rubro interne carneo. *Burm. afr.* 65. *t.* 27. *f.* 1.
Vielblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Foliola *anguſtiſſima linearia apice manifeſte punctis binis calloſis inſtructa.* Calyces *apice reflexi.* Corolla *roſea, petalis oblongis obtuſis.* Filamenta *glanduloſa, interiora inaequalia.* W.

****** *Foliis ternatis, pedunculis unifloris, caulescentes, caule folioſo.*

*64. OXALIS *tenuifolia.*

O. caule erecto folioſo, pedunculo unifloro foliis triplo longiore, foliis ternatis breve petiolatis linearibus emarginatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. (*tenuifolia*) filamentis denticulatis, ſtylis breviſſimis, petalis integerrimis. *Iacq. Oxal. n.* 53. *p.* 74. *t.* 38. *
Dünnblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *petiolata, petioli longitudine foliorum* Corolla *alba margine rubra.* Filamenta *interiora glanduloſa inaequalia.* W.

*65. OXALIS *macroſtylis.*

O. caule erecto folioſo ramoſo, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis ſeſſilibus, foliolis linearibus emarginatis, corollis hypocrateriformibus, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.
O. (*macroſtylis*) corollis caryophyllaeis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 22. *p.* 43. *t.* 9. *
Langgriffiicher Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *ſeſſilia piloſiuſcula ciliata.* Corolla *purpurea fundo flavo; ungues petalorum in tubum quaſi cohaerent et ſunt magis quam in reliquis elongatae; laminae oblongae obtuſae explanatae ut totum corollam hypocrateriformam repraeſentet.* Filamenta *hiſpida.* Styli *ſtaminibus et unguibus petalorum longiores et aperto*

flore, quod non in reliquis cognitis, mox in conſpectum veniunt. W.

66. OXALIS *hirta.*

O. caule erecto folioſo ramoſo, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis ſubſeſſilibus, foliolis lineari-cuneiformibus retuſis, corollis campanulatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*hirta*) corollis campanulatis, ſtylis longiſſimis, filamentis edentulis aequalibus. *Jacq. Oxal. n.* 26. *p.* 47. *t.* 13. *et* 77. *f.* 3.*

O. (*hirta*) caule erecto hirto, pedunculis unifloris, foliis ternatis ſubſeſſilibus, foliolis oblongis emarginatis glabris. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 18. *p.* 20.*

O. (*hirta*) caule ramoſo, pedunculis unifloris, foliis ſeſſilibus, foliolis lanceolatis. *Sp. pl.* 623.

O. caule ramoſo, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, floribus lateralibus ſolitariis. *Roy. lugdb.* 532.

O. radice bulboſa foliis anguſtis ternis hirtis, flore purpureo. *Burm. afr.* 70. *t.* 28. *f.* 1.

Oxys bulboſa africana, flore purpureo, foliis piloſis pedunculis parvis. *Seb. muſ.* 1. *p.* 33. *t.* 22. *f.* 11.

Oxys africana bulboſa dorycnii monſpelienſis parvis foliis, floribus purpureis amplis. *Pluk. amalth.* 164. *t.* 434. *f.* 7.

O. africana bulboſa flore purpureo, caule folioſo. *Raj. ſuppl.* 599.

β. O. (*hirtella*) corollis campanulatis, ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis inaequalibus. *Jacq. Oxal. n.* 27. *p* 48. *t.* 14.*

O. (*ſeſſilifolia*) pedunculis unifloris, caule ſimpliciſſimo, foliis ternatis pubeſcentibus, foliolis indiviſis. *Mant.* 241.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 651. 652.

Rauher Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

In varietate α. *eſt* corolla *violacea fundo flavo*, filamenta *edentula interiora hiſpida aequalia, interdum etiam inaequalia; in varietate* β. corolla *pallide caerulea fundo flavo*, filamenta *denticulata glanduloſa, interiora inaequalia.* W.

*67. OXALIS *tubiflora.*

O. caule erecto ſubramoſo folioſo hirto, foliis ternatis ſubſeſſilibus lineari-cuneiformibus, pedunculo uni-

floro foliis multoties longiore, corollis hypocrateriformibus, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

α. O. (*tubiflora*) corollis caryophyllaeis, ſtylis breviſſimis, filamentis inaequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 23. *p.* 44. *t.* 10.*

β. O. (*caneſcens*) corollis caryophyllaeis, ſtylis breviſſimis, filamentis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 24. *p.* 45. *t.* 11.*

Röhrenblütiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

In varietate α. corolla *purpurea fundo flavo, petalis acutiuſculis.* Filamenta *hiſpida interiora et exteriora inaequalia.* *In varietate β.* corolla *pallide violacea, tubo flaveſcente, petalis obtuſis*, filamenta *hiſpida interiora et exteriora aequalia*, foliola *latiora glauceſcentia*, *et* caulis *ramoſior*. W.

*68. OXALIS *ſecunda.*

O. caule folioſo ramoſo declinato, ramis ſecundis, pedunculo unifloro foliorum longitudine, foliis ternatis ſubſeſſilibus lineari-cuneiformibus, corollis hypocrateriformibus, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*ſecunda*) corollis caryophyllaeis, ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 25. *p.* 46. *t.* 12.*

Einſeitiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *lilacina fundo albido.* Filamenta *glabra interiora inaequalia.* W.

*69. OXALIS *multiflora.*

O. caule ramoſo folioſo erecto, pedunculis unifloris foliis multoties longioribus, foliis ternatis ſubſeſſilibus, corollis campanulatis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*multiflora*) corollis campanulatis, ſtylis breviſſimis foliolis cuneiformibus. *Iacq. Oxal. n.* 28. *p.* 49. *t.* 15.*

Oxalis hirta varietas. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 223. *Icon. rar.* 3. *t.* 472.

Vielblütiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

*70. OXALIS *rubella.*

O. caule ramoſo folioſo erecto, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis ſubſeſſilibus lineari-cuneiformibus, corollis campanulatis obtuſis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*rubella*) corollis campanulatis, ſtylis intermediis, filamentis edentulis. *Iacq. Oxal. n.* 29. *p.* 50. *t.* 16. *
Oxalis hirta. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 232. *Icon. rar.* 3. *t.* 471.
O. radice fibroſa, caulibus ramoſis, foliis ternatis anguſtis, florum petiolis longiſſimis. *Burm. afr.* 71. *t.* 28. *f.* 2.
Röthlicher Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)
Corolla *purpurea fundo flavo, petalis obtuſis.* Filamenta *interiora hiſpida inaequalia.* W.

*71. OXALIS *roſacea.*
O. caule folioſo ſimplici decumbente, pedunculo unifloro foliis multoties longiore, foliis ternatis ſubſeſſilibus oblongo-cuneiformibus, corollis campanulatis acutiuſculis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*roſacea*) corollis campanulatis, ſtylis intermediis, filamentis gibboſe denticulatis. *Iacq. Oxal. n.* 30. *p.* 51. *t.* 17. *
Roſenartiger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)
Simillima praecedenti, ſed caulis *ſimplex decumbens,* foliola *multo latiora,* corolla *roſea, petala acutiuſcula,* filamenta *interiora et exteriora hiſpida, denticulata.* W.

*72. OXALIS *repens.*
O. caule folioſo ramoſo decumbente radicante, pedunculo ſubbifloro petiolorum longitudine, foliis ternatis obcordatis, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*repens*) caule proſtrato radicante, pedunculis ſubbifloris, ſtylis ſubintermediis. *Iacq. Oxal. n.* 11. *p.* 32. *t.* 78. *f.* 1*
O. (*repens*) caule repente, pedunculis unifloris, foliis ternatis foliolis obcordatis hirtis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 14. *p.* 16. *t.* 1. *f.* 5. *
Oxalis ſtricta. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 6. *t.* 51. *f.* 2.
Kriechender Sauerklee. W.
Habitat locis aquoſis Cap. b. ſpei, Madagaſcariae, Zeylonae. (v. ſ.)
Pedunculi *plerumque uniflori, rarius biflori.* Corolla *flava campanulata.* Filamenta *glabra.* W.

*73. OXALIS *reptatrix.*
O. caule folioſo erecto ſimplici, pedunculo unifloro foliis

longiore, foliis ternatis ſubrotundis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*reptatrix*) ſubcauleſcens, corollis campanulatis, filamentis denticulatis, foliolis ſubrotundis. *Iacq. Oxal. n.* 33. *p.* 54. *t.* 20. *

Wuchernder Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Caulis *breviſſimus foliis alternis longe petiolatis obſitus.* Radix *repens bulbifera.* Corolla *albida ſubincarnata fundo flavo.* Filamenta *glanduloſa.* W.

*74. OXALIS *diſticha.*

O. caule baſi ramoſo adſcendente folioſo, pedunculis unifloris foliorum longitudine, foliis ternatis obcordatis glabris, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.

O. (*diſticha*) corollis campanulatis, ſtylis intermediis, petiolis alate ſtipulatis. *Iacq. Oxal. n.* 31. *p.* 52. *t.* 18.*

Zweyzeiliger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Stipulae *amplae membranaceae obtuſae connatae.* Corolla *pallide flava fundo albicante.* Filamenta *glabra.* W.

75. OXALIS *incarnata.*

O. caule erecto ramoſo glabro folioſo, pedunculis unifloris longitudine petiolorum, foliis ternatis obcordatis glabris, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*incarnata*) ſtylis longiſſimis, filamentis denticulatis, ſtipite exſerto longiſſimo ramoſo. *Iacq. Oxal. n.* 88. *p.* 111. *t.* 71. *

O. caule bulbifero, pedunculis unifloris, foliis ternatis, foliolis obcordatis glabris. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 15. *p.* 18. *

O. pedunculis unifloris, caule ramoſo bulbifero, foliis paſſim verticillatis, foliolis obcordatis. *Sp. pl.* 2. *p.* 622.

O. pedunculis unifloris, caule dichotomo. *Sp. pl.* 1. *p.* 433.

O. caule bulbifero. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.

Oxys bulboſa aethiopica minor, folio cordato, flore ex albido-purpuraſcente. *Comm. hort.* 1. *p.* 43. *t.* 22.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 651.

Fleiſchfarbigblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

Folia *reſpective ad lucem ſubtus incarnata.* Bulbi *ex alis poſt floreſcentiam naſcuntur.*

Corolla *violaceo-alba.* Filamenta *glanduloſa.* W.

******** *Foliis ternatis pedunculis multifloris; cauleſcentes.*

*76. OXALIS *conorhiza.* †

O. caule erecto folioſo, pedunculo foliis longiore bifloro, foliis ternatis obcordatis. W.

O. (*conorhiza*) caule erecto, foliis obverſe cordatis, pedunculis ſubbifloris. *Iacq. Oxal. n.* 6. *p.* 26. *

Oxys ampliſſimo flore luteo. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 733. *t.* 24. *

Kegelwurzlichter Sauerklee. W.

Habitat in Paraguay *in vaſta planitie ad ſeptentrionem fluminis* de la Plata. ♃

*77. OXALIS *crenata.* †

O. caule folioſo erecto, pedunculo umbellifero foliis longiore, foliis ternatis obovatis, corollis crenatis. W.

O. (*crenata*) caule erecto, foliis obverſe cordatis, pedunculis umbelliferis, petalis crenatis. *Iacq. Oxal. n.* 7. *p.* 27. *

Oxys lutea annua floribus dentatis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 49. *t.* 24. *

Gekerbtblumiger Sauerklee. W.

Habitat in Peru. ☉

*78. OXALIS *lateriflora.*

O. caule baſi nudo ſubramoſo adſcendente, pedunculis umbellatis lateralibus, foliis ternatis, foliolis cuneiformibus emarginato-bilobis, corollis obtuſis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*lateriflora*) cauleſcens ſuberecta, foliolis obverſe cordato-bifidis, pedunculo umbellifero caulino. *Iacq. hort. Schoenb.* 2. *p.* 41. *t.* 204. *

Seitenblütiger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Foliola *fere biloba glabra.* Pedunculi *longiſſimi ex nuda parte inferiore caulis.* Corolla *violacea fundo flaveſcente.* Filamenta *hiſpida.* W.

*79. OXALIS *Dillenii.* †

O. caule erecto folioſo hirto, pedunculo umbellifero foliis longiore, foliis ternatis obcordatis corollis emarginatis. W.

O. (*Dillenii*) caule erecto, foliolis obverſe cordatis, pedunculis ſubumbelliferis, petalis emarginatis. *Iacq. Oxal. n.* 8. *p.* 28. *

Oxys lutea americana humilior et annua. *Dill. elth.* 2. *p.* 298. *t.* 221. *

Dilleniſcher Sauerklee. W.

Habitat in Carolina, Guadeloupe. ⊙ (v. ſ.)

Vidi tantum plantam fructiferam a b. M. Iſert mecum communicatam. Pedunculi *ſunt uni-bi-tri-et quinqueflori.* Pedunculi *proprii ſeu partiales ſunt reflexi inde pedunculus communis geniculatus evadit.* Fructus *eſt cylindraceus acuminatus piloſus.* W.

80. OXALIS *ſtricta*.

O. caule erecto ramoſo, pedunculo umbellifero petiolis breviore, foliis ternatis obcordatis, corollis obtuſis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. W.

O. caule erecto, foliis obverſe cordatis, pedunculis umbelliferis, petalis integerrimis. *Iacq. Oxal. n.* 9. *p.* 29. *t.* 4. *

O. caule erecto herbaceo, pedunculis umbelliferis. *Thunb. Oxal. n.* 21. *p.* 22. *

O. pedunculis umbelliferis, caule ramoſo erecto. *Sp. pl.* 624. *Gron. virg.* 161. *Brown. jam.* 231.

O. (*ambigua*) caule repente, foliis ternatis, petiolis ſemiteretibus exſtipulatis, laminis emarginatis, corollae laciniis obovatis integerrimis, ſtylis altitudine filamentorum longiorum patulis. *Saliſb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 242. *t.* 23. *f.* 4.

Oxalis corniculata. *Fl. dan. t.* 873. *Hoffm. germ.* 157. *Roth. germ. I.* 200. *II.* 517. *Pollich. pal. n.* 413.

Oxys americana erectior. *Tournef. inſt.* 80.

Trifolium acetoſum corniculatum luteum. *Sloan. cat.* 90.

Trifolium acetoſum corniculatum luteum majus rectum indicum ſ. virgineum. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 184. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

Steifer Sauerklee. W.

Habitat in Virginia, Jamaica, *inque* Europa. ♃ (v. v.)

81. OXALIS *corniculata*.

O. caule ramoſo decumbente radicante, pedunculo ſubumbellato petiolis breviore, foliis ternatis obcordatis, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. W.

O. caule decumbente herbaceo, pedunculis umbelliferis. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 20. *p.* 22. *
O. caule proſtrato radicante, pedunculis bifloris, ſtylis ſubaequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 10. *p.* 30. *t.* 5. *
O. pedunculis umbelliferis, caule ramoſo diffuſo. *Hort. cliff.* 175. *Hort. upſ.* 116. *Roy. lugdb.* 158. *Sauv. monſp.* 173. *Scop. carn. n.* 562. *Hoſt. ſynop.* 250.
O. (*puſilla*) caule repente, foliis ternatis, petiolis tereriuſculis baſi ſtipulatis, laminis emarginatis, corollae laciniis obcuneiformibus, apice eroſulis, ſtylis vix altitudine filamentorum longiorum faſtigiatis. *Salisb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 243. *t.* 23. *f.* 5. *
Oxys caule ramoſo diffuſo, petiolis alaribus paucifloris umbellatis. *Hall. helv. n.* 929.
Oxys flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 248.
Oxys lutea. *Bauh. hiſt. p.* 388.
Trifolium acetoſum corniculatum. *Bauh. pin.* 330.
Trifolium luteum minus repens etiam procumbens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 183. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 652.
Gehörnter Sauerklee. W.
Habitat in Anglia, Hiſpania, Italia, Sicilia, Helvetia, Carniolia, Japonia. ☉

82. OXALIS *Plumieri.* †

O. caule erecto folioſo, pedunculo umbellifero quadrifloro foliorum longitudine, foliis ternatis ovatis, foliolo intermedio longe petiolato. W.
O. (*Plumieri*) caule erecto, foliolis oblongis, pedunculis umbellatis. *Iacq. Oxal. n.* 3. *p.* 23. *
O. (*fruteſcens*) pedunculis umbelliferis, caule fruticoſo, foliis ternatis ovatis, intermedio petiolato. *Sp. pl.* 624. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 22. *p.* 22. *
O. caule erecto fruticoſo, foliis ternatis impari maximo. *Mill. dict.* 7.
Oxys lutea fruteſcens, trifolii bituminoſi facie. *Plum. ſpec.* 2. *ic.* 213. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 654.
Plumieriſcher Sauerklee. W.
Habitat in America *meridionali.*
Flores *lutei penduli. Miller.*

*83. OXALIS *pentantha.*

O. caule erecto ramoſo folioſo, pedunculo umbellifero foliis breviore, foliis ternatis piloſis, foliolis lateralibus

ſubrotundis emarginatis, intermedio petiolato obovato obtuſo, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*pentantha*) caule erecto, foliolis obverſe ovatis, ſtylis breviſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 1. *p.* 21. *t.* 1.*

Fünfblütiger Sauerklee. W.

Habitat ad Caracas *in* America.

Pedunculi *quinqueflori*. Corolla *lutea*. Filamenta *interiora hiſpida*. W.

*84. OXALIS *rhombifolia*.

O. caule erecto ramoſo folioſo, pedunculo umbellifero trifloro longitudine foliorum, foliis ternatis pubeſcentibus rhombeo-ovatis, foliolis ſeſſilibus, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*rhombifolia*) caule erecto, foliolis rhombeis, ſtylis longiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 2. *p.* 22. *t.* 2. *

Rautenförmiger Sauerklee. W.

Habitat in Caracas *in* America.

Filamenta *interiora hiſpida*. W.

*85. OXALIS *roſea*. †

O. caule erecto ramoſo foliſo, pedunculo foliis multo longiore bifido racemoſo, foliis ternatis obcordatis foliolis ſeſſilibus. W.

O. (*roſea*) caule erecto, foliolis obverſe cordatis, pedunculis diviſis racemoſis. *Iacq. Oxal. n.* 5. *p.* 25. *

Oxys roſeo flore erectior vulgo Culle. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 733. *t.* 23 *

Roſenfarbener Sauerklee. W.

Habitat in Chili *locis humidis.*

86. OXALIS *Barrelieri*.

O. caule erecto ramoſo foliſo, pedunculo longitudine foliorum bifido racemoſo, foliis ternatis ovato-lanceolatis, foliolo intermedio petiolato, ſtylis longitudine ſtaminum interiorum. W.

O. caule erecto, foliolis oblongis, pedunculis bifidis racemoſis, ſtylis aequalibus. *Iacq. Oxal. n.* 4. *p.* 24. *t.* 3.*

O. caule ramoſo erecto, pedunculis bifidis racemiferis. *Sp. pl.* 624.

Trifolium acetoſum americanum rubro flore. *Barr. rar.* 64. *t.* 1139. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 63. *t.* 51.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 655.

Traubenblütiger Sauerklee. W.

Habitat in Gujana, Braſilia *et ad* Caracas. ☉ (v. ſ)

Corolla *albo-incarnata*, *petalis tribus ſuperioribus baſi flavo-maculatis*. Filamenta *glanduloſa*. W.

******** *Foliis digitatis.*

*87. OXALIS *Burmanni.* †

O. acaulis, ſcapo umbellifero, foliis digitatis. W.

O. (*Burmanni*) foliis digitatis. *Iacq. Oxal. n.* 20. *p.* 41.*

O. bulboſa pentaphylla, et hexaphylla floribus magnis luteis copioſis. *Burm. afr.* 74. *t.* 29. *

Burmanniſcher Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

88. OXALIS *tomentoſa.*

O. acaulis, ſcapo unifloro petiolorum longitudine, foliis digitatis, foliolis lanceolato-cuneiformibus emarginatis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*tomentoſa*) ſtylis longiſſimis, foliolis ſubtus hirſutiſſimis. *Iacq. Oxal. n.* 96. *p.* 119. *t.* 81.*

O. foliis multifidis hirtis. *Thunb. Oxal. n.* 25. *p.* 24. *

O. ſcapo unifloro, foliis digitatis tomentoſis. *Lin. ſuppl.* 244.

Oxys parva africana, flore magno candicante, lupini foliis argenteo-ſericeis. *Pluk. amalth.* 164. *t.* 350. *f.* 3.

Vielhaariger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *utrinque tomentoſa, foliolis duodecim ad viginti obovatis.* Calyx *lanceolatus.* Corolla *alba ſ. flaveſcens.* Filamenta *interiora hirta.* W.

*89. OXALIS *lupinifolia.*

O. acaulis, foliis digitatis lanceolatis acutiuſculis, petiolis compreſſis, ſcapo longitudine petiolorum unifloro, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.

O. (*lupinifolia*) ſtylis breviſſimis, calyce glabro, foliolis planis. *Iacq. Oxal. n.* 92. *p.* 115. *t.* 72. *

Feigbohnenblättriger Sauerklee. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Calycis *foliola glaberrima.* Corolla *lutea fundo albicante.* Filamenta *glanduloſa.* W.

*90. OXALIS *pectinata.*

O. acaulis, ſcapo unifloro longitudine petiolorum, foliis digitatis lineari-lanceolatis obtuſis, calycis foliolis aequalibus adpreſſis, ſtylis ſtaminibus interioribus longioribus. W.

O. (*pectinata*) ſtylis longiſſimis, foliolis glabris. *Iacq. Oxal. n.* 95. *p.* 118. *t.* 75.*

O. bulboſa ſimplici caule fere aphyllo, flore luteo. *Burm. afr.* 81. *t.* 30. *f.* 1?
Langblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Calyces *glaberrimi.* Corolla *flava.* Filamenta *glanduloſa.* W.

*91. OXALIS *flabellifolia.*

O. acaulis, ſcapo unifloro petiolis longiore, foliis digitatis linearibus emarginatis, calycis foliolis apice reflexis, unico majore ſpathulato, ſtylis ſtaminibus interioribus brevioribus. W.
O. (*flabellifolia*) ſtylis intermediis. *Iacq. Oxal. n.* 94. *p.* 117. *t.* 74. *
Fächerblättriger Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Calycis *foliola glabra apice reflexa, unicum maximum ſpathulatum obtuſum.* Corolla *flava.* Filamenta *glanduloſa.* W.

92. OXALIS *flava.*

O. acaulis, ſcapo unifloro foliorum longitudine, foliis digitatis linearibus canaliculatis acutis, ſtylis ſtaminibus exterioribus brevioribus. W.
O. ſtylis breviſſimis, calyce capitate ciliato, foliolis canaliculato-conniventibus. *Iacq. Oxal. n.* 93. *p.* 116. *t.* 73. *
O. foliis multifidis glabris. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 24. *p.* 23. *
O. ſcapo unifloro, foliis ternatis bipartitis. *Sp. pl.* 621.
O. bulboſa anguſtis digitatis foliis, flore ſolitario luteo. *Burm. afr.* 68. *t.* 27. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 647.
Gelber Sauerklee. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei *inter montem* Leonis *et* Diaboli. ♃
Calyces *margine glanduloſi.* Corolla *flava.* Filamenta *glanduloſa.* W.

********* *Foliis pinnatis.*

93. OXALIS *ſenſitiva.*

O. ſcapo umbellifero, foliis pinnatis. *Fl. zeyl.* 180. * *Iacq. Oxal. n.* 21. *p.* 42. *t.* 78. *f.* 4. *Thunb. Diſſ. de Oxal. n.* 24. *p.* 26. *

Okoides malabarica ſenſitiva, caule viridi glabro, flore luteo majore. *Garc. angl.* 1730. *p.* 379. *t.* 2.
Herba mimoſa malabarenſium. *Zan. hiſt.* 199. *t.* 61.
Herba ſentiens. *Rumph. amb.* 5. *p.* 301. *t.* 104. *f.* 2.
Herba viva foliis polypodii. *Bauh. pin.* 259. *Cluſ. exot.* 290.
Todda vaddi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 33. *t.* 19.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 649.
Reizbarer Sauerklee. W.
Habitat in India *orientali.* (v. ſ.)
Corolla *lutea.* Filamenta *hiſpida.* Styli *filamentis interioribus breviores.* Stigmata *emarginata.* W.

919. AGROSTEMMA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 795.

Cal. 1-phyllus, coriaceus. *Petala* 5, unguiculata: *Limbo* obtuſo, indiviſo. *Capſ.* 1-locularis.

1. AGROSTEMMA *Githago.*

A. hirſuta, calycibus corollam aequantibus petalis integris nudis. *Pollich. pal. n.* 436. *Roth. germ. I.* 198. *II.* 511. *Flor. dan. t.* 576. *Kniph. cent.* 5. *n.* 8. *Hoffm. germ.* 158.
Agroſtemma. *Hort. cliff.* 175. *Fl. ſuec.* 383. 407. *Roy. lugdb.* 449.
Lychnis calycibus longiſſime caudatis. *Hall. helv. n.* 926.
Lychnis Agroſtemma. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 136.
Lychnis (*Githago*) floribus pentagynis; petalis nudis, calyce brevioribus. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 505. *n.* 9. *ed.* 2. *n.* 527.
Lychnis ſegetum. *Tabernaem. p.* 293.
Lychnis ſegetum major. *Bauh. pin.* 204. *Knorr. del.* 2. *t. L.* 10.
Lolium. *Fuchſ. hiſt.* 127.
β. *nicaeenſis* calycibus corolla multo longioribus, petalis albis. W.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 656.
Gemeine Rhade. W.
Habitat inter Europae *ſegetes.* ☉ (v. v.)

2. AGROSTEMMA *Coronaria.*

A. tomentoſa, foliis ovato-lanceolatis, petalis emargi-

natis coronatis ſerratis. *Mill. dict. n.* 3. *Willich. illuſtr. n.* 29. *Kniph. cent.* 12. *n.* 3. *Knorr. del.* 1. *t. R.* 20. *Hoffm. germ.* 158.

α. floribus ſimplicibus rubris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 115.

Lychnis tomentoſa, calycibus coſtatis longe petiolatis. *Hall. helv. n.* 925.

A. tomentoſa, foliis ovato-lanceolatis, petalis integris coronatis. *Hort. upſ.* 115. *Sp. pl.* 2. *p.* 625.

Coronaria. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.

Lychnis coronaria dioſcoridis ſativa. *Bauh. pin.* 203.

Lychnis. *Cam. epit.* 569.

β. floribus ſimplicibus albis. *Ait. l. c.*

γ. floribus plenis. *Ait. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 657.

Garten Rhade. W.

Habitat in Italia, Helvetia. ♂ (v. v.)

Naturalis planta corolla alba medio rubra eſt.

3. AGROSTEMMA *Flos jovis.*

A. tomentoſa, petalis emarginatis. *Mill. dict. n.* 4. *Pollich. pal. n.* 437. *Hoffm. germ.* 158. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 512.

Lychnis tomentoſa, umbellis paucifloris, petalis cordatis. *Hall. helv. n.* 924.

Lychnis coronaria alpina, flore purpureo. *Barrel. ic.* 1005. *Bocc. muſ. t.* 42. *Hall.* R.

Lychnis coronaria ſylveſtris. *Bauh. pin.* 204. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 540. *ſ.* 5. *t.* 36. *f.* 2.

Lychnis umbellifera montana helvetica. *Zan. hiſt.* 128. *t.* 51. *Raj. hiſt.* 993.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 658.

Doldentraubige Rhade. W.

Habitat in Helvetia, Palatinatu. ♃ (v. v.)

Flores *corymboſi.*

4. AGROSTEMMA *Coeli roſa.*

A. glabra, foliis lineari-lanceolatis, petalis emarginatis coronatis. *Hort. upſ.* 115. *Mill. dict.* 2.

Lychnis pſeudo-melanthiis ſimilis africana glabra anguſtifolia. *Herm. lugdb.* 391. *t.* 393.

Lychnis ſegetum, Nigellaſtrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 543. *ſ.* 5. *t.* 22. *f.* 32.

Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc. ſic.* 27.

Pſeudo-Melanthium glabrum ſiculum. *Raj. hiſt.* 999.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 659.
Glattblättrige Rhade. W.
Habitat in Sicilia, Oriente. ⊙ (v. v.)

920. LYCHNIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 796.

Cal. 1-phyllus, oblongus, laevis. *Petala* 5, unguiculata: Limbo ſubbifido. *Capſ.* 5-locularis.

1. LYCHNIS *chalcedonica.*

L. floribus faſciculatis faſtigiatis. *Hort. cliff.* 174. *Hort. upſ.* 115. *Roy. lugdb.* 449. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 144.
*. Lychnis hirſuta, flore coccineo, major. *Bauh. pin.* 203.
Flos conſtantinopolitanus. *Dod. pempt.* 178.
β. L. hirſuta flore candido major. *Tournef. inſt.* 334.
γ. L. chalcedonica flore pleno miniato ſeu aurantiaco. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 211.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 660.
Scharlachrothe Lychnis. W.
Habitat in omni Ruſſia. ♃ (v. v.)

2. LYCHNIS *Flos cuculi.*

L. petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. *Hort. cliff.* 174. *Fl. ſuec.* 384, 408. *Roy. lugdb.* 139. *Hall. helv. n.* 921. *Oed. dan. t.* 590. *Pollich. pal. n.* 438. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 145. *Leers. herb. n.* 349. *Pollich. pal. n.* 438. *Kniph. cent.* 11. *n.* 65. *Hoffm. germ.* 156. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 512.
L. floribus pentagynis; petalis laciniatis. *Scop. carn.* 1. *p.* 504. *n.* 8. *ed.* 2. *n.* 528.
Caryophyllus pratenſis. *Tabern.* 291.
Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici ſ. Flos cuculi. *Bauh. pin.* 210.
β. Caryophyllus pratenſis, flore pleno. *Bauh. pin.* 210. *Mill. ic.* 169. *f.* 2.
Odontites Plinii. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 292, 293.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 661.
Kuckucks Lychnis. W.
Habitat in pratis Europae *humidiuſculis.* ♃ (v. v.) Capſula *unilocularis.* Leers. *l. c.*

*3. LYCHNIS *coronata.*

L. glabra, floribus axillaribus terminalibusque ſolitariis, petalis laciniatis. *Thunb. jap.* 187. *

L. (*grandiflora*) floribus axillaribus terminalibusque ſolitariis, petalis inaequaliter crenatis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 84. *Collect.* 1. *p.* 149. *

Groſsblütige Lychnis. W.

Habitat in China, Japonia. ♃ (v. v.)

4. LYCHNIS *quadridentata.*

L. petalis quadridentatis, caule dichotomo, foliis glabris recurvis. *Syſt. veg.* 362. *Hoffm. germ.* 158. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 515.

Silene (*quadrifida*) petalis quadrilobis, caule dichotomo, floribus pedunculatis, foliis glabris recurvis. *Sp. pl.* 2. *p.* 602. *Iacq. auſtr. t.* 120.

Viſcago foliis teneris recurvis, petalis quadrifidis. *Hall. helv. n.* 918.

Cucubalus quadrifidus. *Sp. pl.* 1. *p.* 414.

Lychnis alpina, foliis anguſtis reflexis, petalis quadripartitis. *Segu. veron.* 3. *p.* 186. *t.* 5. *f.* 1.

Lychnis ſaxatilis, linariae folio, glabra, flore albo, petalis tricuſpidatis, ſemine limbo fimbriato. *Till. piſ.* 106.

Alſine alpina glabra, folio reflexo. *Pluk. alm.* 23. *t.* 75. *f.* 5. *Hall.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 662.

Vierzähnige Lychnis. W.

Habitat in Italiae, Helvetiae, Auſtriae *montibus, etiam* Halae *Saxonum.* ☉ (v. ſ.)

Piſtilla 4, ſ. 5, *rarius* 3; *hinc Lychnidis potius ſpecies. Mygind.*

5. LYCHNIS *Viſcaria.*

L. petalis integris. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 142. *Mill. dict. n.* 2. *Scop. carn. n.* 529. *Pollich. pal. n.* 439. *Kniph. cent.* 12. *n.* 69. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 200. *II.* 515.

L. foliis lanceolatis, floribus verticillatis, ſpicatis. *Hall. helv. n.* 927.

Silene floribus pentagynis, capſulis quinquelocularibus. *Hort. cliff.* 172. *Fl. ſuec.* 364, 409. *Roy. lugdb.* 445.

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. *Bauh. pin.* 205.

L. ſylveſtris IV. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 289.
L. ſylveſtris purpurea. *Tabern.* 294.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 663.
Klebrige Lychnis. W.
Habitat in Europae *ſeptentrionalis pratis ſiccis.* ♃ (v. v.)

6. LYCHNIS *alpina.*

L. glabra, floribus denſis umbellato-capitatis, petalis bifidis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 613.
L. petalis bifidis, floribus tetragynis. *Oed. dan. t.* 65. *Mill. dict. n.* 6.
L. foliis linearibus lanceolatis, floribus umbellatis capitatis. *Hall. helv. n.* 922. *t.* 17.
L. petalis bifidis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 410.* *Sp. pl.* 2. *p.* 626.
Silene floribus corymboſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. *Roy. lugdb.* 447.
Silene lapponica alpina, facie viſcariae. *Fl. lapp.* 185.*
Silene floribus in capitulum congeſtis. *Hall. helv.* 1. 376. *t.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 664.
Alpen Lychnis. W.
Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibiricis, Pyrenaicis. ♃ ♂ (v. ſ.)

Petala *incoronata, ſemibifida, acuta.* Calyx *unguibus obtuſis, concavis.* Bracteae *ſubdiaphanae.* Flores *in thyrſum collecti.* Styli *quatuor.*

*7. LYCHNIS *magellanica.*

L. ſubvilloſa, foliis linearibus gramineis, petalis apice bifidis calyce campanulato vix longioribus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 613.*
Magellaniſche Lychnis. W.
Habitat in freto Magellanico. ♃

Folia *Statices Armeriae.* Flores *quandoque ſolitarii in apice caulis, ſaepius vero faſciculati et bracteis ſuffulti.* Lamarck l. c.

8. LYCHNIS *ſibirica.*

L. petalis bifidis, caule dichotomo, foliis ſubhirtis. *Mill. dict. n.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 664.
Sibiriſche Lychnis. W.
Habitat in Sibiria. *Gmel.* ♃

Statura *Silenes rupeſtris, ſed* radix *perennis*; Folia *minus glabra; et* Styli 5 *diſtingunt plantam.*

*9. LYCHNIS *laeta.*

L. petalis bifidis, floribus ſolitariis, foliis lineari-lanceolatis glabris, calycibus decemcarinatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 118.
Angenehme Lychnis. W.
Habitat in Luſitania. ⊙ (v. ſ.)

10. LYCHNIS *dioica.*

L. floribus dioicis. *Hort. cliff.* 171. *Fl. ſuec.* 361, 411. *Roy. lugdb.* 448. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 137. *Mill. dict. n.* 3. *Pollich. pal. n.* 440. *Kniph. cent.* 11. *n.* 64. *fem. Leers. herb. n.* 350. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 199. *II.* 513.
L. floribus ſexu diſtinctis. *Hall. helv. n.* 923.
Cucubalus caule compoſito, calycibus oblongo-ovatis. *Fl. lapp.* 182.
Lychnis ſylveſtris ſ. aquatica purpurea ſimplex. *Bauh. pin.* 204.
Lychnis ſylveſtris noctiflora alba ſimplex, calyce ampliſſimo. *Till. piſ.* 105. *t.* 41. *f.* 1.
Melandrium plinii genuinum. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 394. mas.
Ocymaſtrum rubrum. *Tabernaem. p.* 299.
β. Cucubalus floribus hermaphroditis pentagynis, capſulis unilocularibus. *Hort. cliff.* 170.
Lychnis alba. *Mill. dict. n.* 4.
Lychnis ſylveſtris alba ſimplex. *Bauh. pin.* 204.
γ. Lychnis alba multiplex. *Bauh. pin.* 204.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 665.
Gemeine Lychnis. W.
Habitat in Europae *frigidae pratis ſucculentis.* ♃ (v. v.)

Variat floribus hermaphroditis, licet rarius.

Capſula 1-*locularis, apice* 10-*fariam dehiſcens.* Ludit *petalis* 4. Leers l. c.

Varietas rubra eſt ſpecies diſtincta, nam per plures annos ſaepius diſſeminata et continuo culta faciem non mutavit; differt ab alba praecipue hirſutie omnium partium. W.

11. LYCHNIS *apetala.*

L. calyce inflato, corolla calyce breviore, caule ſubunifloro, flore hermaphrodito. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 137.

Cucubalus caule ſimpliciſſimo unifloro, petalis calyce brevioribus. *Fl. ſuec.* 363, 412.

Cucubalus caule ſimpliciſſimo unifloro, corolla incluſa. *Fl. lapp.* 181. *t.* 12. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 666.

Blumenblattloſe Lychnis. W.

Habitat in alpibus Lapponicis, Sibiricis. ♃ (v. f.)

In Sibiria planta caule multifloro lecta eſt. Haec hermaphrodita.

921. CERASTIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 797.

Cal. 5-phyllus. *Petala* bifida. *Capſ.* 1-locularis, apice dehiſcens.

* *Capſulis oblongis.*

1. CERASTIUM *perfoliatum.*

C. foliis connatis. *Hort. cliff.* 173. *Hort. upſ.* 115. *Roy. lugdb.* 450. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 148. *n.* 49. *t.* 62. *f.* 1. *Mill. dict. n.* 5. *Kniph. cent.* 5. *n.* 22.

Myoſotis orientalis perfoliata, lychnidis folio. *Tournef. cor.* 18. *Dill. elth.* 295. *t.* 217. *f.* 284.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 667.

Durchwachſenes Hornkraut. W.

Habitat in Graecia, Sibiria. ⊙ (v. v.)

2. CERASTIUM *vulgatum.*

C. foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffuſis. *Fl. ſuec.* 2. 415. *Pollich. pal. n.* 441. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 507. *Hoffm. germ.* 159.

C. floribus decandris, petalis ſubtridentatis calyce majoribus. *Loefl. it.* 143. *

Myoſotis foliis ovato-lanceolatis, petalis calycis longitudine. *Hall. helv. n.* 893.

Myoſotis arvenſis hirſuta, parvo flore albo. T. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 1.

Alſine hirſuta, magno flore. *Bauh. pin.* 251.

Auricula muris quorundam, flore parvo, vaſculo tenui longo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 359.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 668.

Gemeinſtes Hornkraut. W.

Habitat in Scaniae *et* Europae *auſtralioris pratis, arvis.* ⊙ (v. v.)

Simile C. viſcoſo, ſed denſo caeſpite creſcens.

*3. CERASTIUM *anomalum.*

C. erectum piloſo-viſcoſum, foliis linearibus, petalis calyce longioribus, floribus trigynis. W.

Ceraſtium anomalum. *Waldſtein et Kitaibel. pl. rar. hung.*

Dreygriffliges Hornkraut. W.

Habitat in Hungaria. ⊙ (v. ſ.)

Tota planta pilis apice glanduloſis viſcidis obſita. Caulis *erectus ſemipedalis et ultra.* Folia *radicalia lineari-ſpathulata petiolata, caulina linearia ſeſſilia.* Pedunculi *uniflori ex dichotomia caulis.* Petala *calyce paulo longiora bifida.* Stamina *decem.* Styli *conſtanter tres.* Capſula *oblonga ſexdentata. Habitu et viſcoſitate ſimile ſequenti, tamen diverſum:* foliis *linearibus,* petalis *calyce majoribus, et* ſtylis *tribus. A Stellaria ceraſtoide diverſiſſima.* W.

4. CERASTIUM *viſcoſum.*

C. erectum piloſo-viſcoſum, foliis oblongis obtuſis, petalis calyce brevioribus. W.

C. erectum villoſo-viſcoſum. *Hort. cliff.* 174. *Fl. ſuec.* 379, 414. *Roy. lugdb.* 450. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 152. *Pollich. pal. n.* 442. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 508.

C. corolla calyci aequali. *Fl. lapp.* 193.

Myoſotis hirſuta et viſcoſa. *Hall. helv. n.* 895.

Myoſotis hirſuta altera viſcoſa. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 1. 3.

Alſine hirſuta altera viſcoſa. *Bauh. pin.* 251.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 663.

Klebriges Hornkraut. W.

Habitat in Europae *pratis macilentis.* ⊙ (v. v.)

Stamina *ſubinde quinque. Hall. l. c.*

5. CERASTIUM *ſemidecandrum.*

C. decumbens piloſum, foliis oblongis obtuſis, petalis calyce brevioribus. W.

C. floribus pentandris, petalis emarginatis. *Hort. cliff.* 172. *Fl. ſuec.* 382, 416. * *It. oel.* 17. *Roy. lugdb.* 450. *Gron. virg.* 51. *Gort. gelr.* 90. *Pollich. pal. n.* 443. *Hoffm. germ.* 159. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 508.

C. corolla calyce breviore. *Fl. lapp.* 193.
C. hirſutum minus, parvo flore. *Raj. angl.* 3. *p.* 348. *t.* 15. *f.* 1.
Myoſotis caule ſimplici, foliis ovatis hirſutis. *Hall. helv. n.* 894.
Centunculus ſemidecander. *Scop. carn. ed.* 5. *n.* 549.
Myoſotis arvenſis hirſuta minor. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 669.
Schutt Hornkraut. W.
Habitat in campis apricis ſteriliſſimis Europae *borealis*. ⊙ (v. v.)

Filamenta *huic* 5 *ſterilia*, 5 *antherifera.*

Stamina 5 *ad* 10 *et* Styli 3 *et* 5. *Gerard.* Stamina 5, *et Styli* 3. *Hall.* Stam. 10, *omnia antherifera cum* Stylis *quinque numerat Scopoli.* Stylos *quinque videt Pollich.* R.

6. CERASTIUM *pentandrum.*

C. floribus pentandris, petalis integris. *Loefl. it.* 142. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 669.
Fünffädiges Hornkraut. W.
Habitat in Hiſpania.

Planta *minima*, *ſimilis G. ſemidecandro*, *a quo differt: colore viridi nec incano. Staminibus* 5 *fertilibus; nec* 5 *aliis anthera deſtitutis.* Stylis *quinque.* Petalis *calyce longe brevioribus lanceolatis acutis; nec acute emarginatis.*

7. CERASTIUM *arvenſe.*

C. foliis lineari-lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce majoribus. *Fl. ſuec.* 381, 417. *Hoffm. germ.* 159. *Pollich. pal. n.* 444. *Kniph. cent.* 8. *n.* 24. *Flor. dan. t.* 626. *Roth. germ. I.* 198. *II.* 509.
C. foliis calycibusque hirſutis. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 450.
Myoſotis foliis linearibus lanceolatis, petalis calyce duplo longioribus. *Hall. helv. n.* 889.
Centunculus arvenſis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 548.
Myoſotis arvenſis hirſuta, flore majore. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 30. *f.* 4.
Caryophyllus arvenſis hirſutus, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Holoſteum caryophylleum. *Tabern.* 232.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 670.
Acker Hornkraut. W.
Habitat in Scania *et auſtraliori* Europa. ♃ (v. v.)

*8. CERASTIUM *lineare.*

C. foliis lineari-lanceolatis acutis pubeſcentibus, petalis calyce majoribus acutis bifidis. W.
C. (*lineare*) foliis linearibus flaccidis ariſtatis, pedunculis ſubunifloris tomentoſis, capſulis oblongis. *Allion. pedem.* 2. *app. p.* 365. *t.* 88. *f.* 4.
Linienblättriges Hornkraut. W.
Habitat in rupibus ſubhumidis alpium Valdenſium *et montis* Ceniſii. ♃

9. CERASTIUM *dichotomum.*

C. foliis lanceolatis, caule dichotomo, capſulis erectis calyce longioribus. W.
C. foliis lanceolatis, caule dichotomo-ramoſiſſimo, capſulis erectis. *Roy. lugdb.* 450. *Mill. dict. n.* 3. *Murray. prodr.* 155. *Hoffm. germ.* 160.
Lychnis ſegetum minor. *Bauh. pin.* 204.
Alſine corniculata. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 184.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 671.
Gabelförmiges Hornkraut. W.
Habitat inter ſegetes Hiſpaniae. ⊙ (v. v.)

*10. CERASTIUM *longifolium.* W.

C. foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, pedunculis fructiferis horizontalibus, capſulis longitudine calycis. W.
Myoſotis orientalis longiſſimo folio. *Tournef. cor. p.* 18.
Langblättriges Hornkraut. W.
Habitat in Armenia. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *erectus dichotomus teres piloſo-viſcoſus.* Folia *linearia acuta longitudine internodiorum ſeſſilia utrinque hirta.* Pedunculi *ex dichotomia caulis erecti, fructiferi horizontaliter fere patentes.* Calyx *hirtus, foliolis margine membranaceis.* Petala *calyce breviora.* Capſula *oblonga apice decemdentata calycis longitudine.* W.

11. CERASTIUM *alpinum.*

C. foliis ovato-lanceolatis, caule diviſo, capſulis oblongis. *Gmel. ſib.* 1. *p.* 150. *n.* 52. *Gunn. norv. n.* 438. *Fl. dan. t.* 6.

C. foliis ovato-lanceolatis, caule dichotomo ſubtrifloro, capſulis oblongis cylindraceo-incurvis decemdenticulatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 3. *p.* 19. *

C. foliis ovato-lanceolatis, corollis calyce majoribus. *Fl. ſuec.* 380, 418.

C. foliis lanceolato-ovatis, caule ſubunifloro. *Roy. lugdb.* 451.

C. corolla calyce majore. *Fl. lapp.* 192.

Myoſotis foliis ovato-lanceolatis, ſubhirſutis, petalis calyce duplo longioribus. *Hall. helv. n.* 888.

Centunculus alpinus. *Scop. carn. n.* 550.

Alſine myoſotis facie lychnis alpina, flore amplo niveo, repens. *Raj. angl.* 3. *p.* 349. *t.* 15. *f.* 2.

β. glabrum. *Fl. dan. t.* 979.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 671.

Alpen Hornkraut. W.

Habitat in alpibus Europae. ♃ (v. ſ.)

Variat *foliis glabris et ſubhirſutis.*

** *Capſulis ſubrotundis.*

12. CERASTIUM *repens.*

C. foliis lanceolatis, pedunculis ramoſis, capſulis ſubrotundis. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 12. *n.* 25. *Hoffm. germ.* 160. *Roth. germ. II.* 510.

C. caule perenni procumbente, foliis lanceolatis tomentoſis. *Roy. lugdb.* 450.

C. perenne procumbens. *Hort. cliff.* 174.

Stellaria repens. *Scop. carn. n.* 547.

Myoſotis arvenſis, polygoni folio. *Vaill. par.* 141. *t.* 30. *f.* 5.

Ocymoides lichnitis reptante radice. *Col. phytob.* 115. *t.* 31.

Lychnis incana repens. *Bauh. pin.* 206.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 672.

Kriechendes Hornkraut. W.

Habitat in Gallia, Italia, Carniolia. ♃ (v. v.)

Petala *ſaepe* 4-*fida ſ.* 5-*fida. Mygind.*

13. CERASTIUM *ſtrictum.*

C. foliis linearibus acuminatis glabris, pedunculis unifloris ſubtomentoſis, capſulis globoſis. *Sp. pl.* 629. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 65. *

Myoſotis foliis linearibus glabris. *Hall. helv. n.* 89.

Alſine alpina ſubhirſuta, lineariae folio. *Scheuch. alp.* 2. *p.* 130.

Caryophyllus holoſteus alpinus, foliis ſtrictiſſimis glabris acutis, flore magno. *Burſ. XI.* 119.

Caryophyllus holoſteus alpinus gramineus. *Bauh. pin. prodr.* 104. *Hall.*

Centunculus anguſtifolius. *Scop. carn. n.* 551. *t.* 19. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 673.

Steifes Hornkraut. W.

Habitat in alpibus Auſtriacis, Helveticis. ♃ (v. ſ.)

Facies Auriculae muris pulchro flore, folio tenuiſſimo 1. *B.* 3. *p.* 360, *ſed* Flos *Arenariae montanae.* Folia *linearia, acuminatiſſima, ſtricta, glabra.* Caules *glabri, procumbentes.* Pedunculus *uniflorus ſ. biflorus, in medio Bracteis duabus, brevibus, lanceolatis, latioribus; ſubtomentoſus uti Calyx.*

14. CERASTIUM *ſuffruticoſum.*

C. caule perenni procumbente, foliis lineari-lanceolatis ſubhirſutis. *Sp. pl.* 629.

Myoſotis tenuiſſimo folio rigido. *Tournef. inſt.* 205.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 673.

Strauchartiges Hornkraut. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

15. CERASTIUM *maximum.*

C. foliis lanceolatis ſcabris, petalis crenatis, capſulis globoſis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 150. *n.* 51. *t.* 62. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 673.

Gröſtes Hornkraut. W.

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ☉

16. CERASTIUM *aquaticum.*

C. foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, fructibus pendulis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 413. *Gunn. norv. n.* 1036. *Pollich. pal. n.* 445. *Leers. herb. n.* 347. *Hoffm. germ.* 160. *Roth. germ. I.* 198. *II.* 511.

Alſine foliis ovato-cordatis, imis petiolatis, tubis quinis. *Hall. helv. n.* 885.

Stellaria aquatica. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 546.

Alſine major. *Bauh. pin.* 250. *Camer. epit.* 851. *Tabern.* 713.

Alſine paluſtris. *Tabern.* 707. R.

Alſine maxima ſolanifolia. *Menz. pug.* 2. *t.* 1. *f.* 3.

β. Alſine media decaſtemon. *Fl. dan. t.* 438.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 674.
Waſſer Hornkraut. W.
Habitat ad littora lacuum Europae. ♃ (v. v.)
Affinis *Stellariae nemorum.*
Filamenta 10; Styli 5, *ſaepe* 6. *Pol[illegible]ch l. c.* Styli *ſemper quinque. Leers. l. c.* R.

*17. CERASTIUM *dioicum.*

C. hirtum viſcidum, foliis lanceolatis, floribus dioicis, petalis calyce triplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 120.
Getrenntes Hornkraut. W.
Habitat in Hiſpania. ♃

18. CERASTIUM *latifolium.*

C. foliis ovatis ſubtomentoſis, ramis ſubunifloris, capſulis globoſis. *Sp. pl.* 629.
C. foliis oblongo-ovatis obtuſis hirſutis, ramis annuis flaccidis ſubbifloris, capſulis ex ovali baſi cylindraceo-corniculatis decemfidis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 256. *
Myoſotis foliis tomentoſis ovatis. *Hall. helv. n.* 887.
Caryophyllus holoſteus alpinus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 675.
Breitblättriges Hornkraut. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Sabaudiae, Auſtriae. ♃ (v. ſ.)
Caules *proſtrati, ramoſi, ad angulos rectos divaricati.* Flores *magni.* Calyces *campanulati.*
Procumbit. Cauliculi *biflori.* Flores *albi. Haller.*

19. CERASTIUM *tomentoſum.*

C. foliis oblongis tomentoſis, pedunculis ramoſis, capſulis globoſis. *Sp. pl.* 629. *Mill. dict. n.* 2.
C. foliis lanceolato-linearibus ſubhirſutis, corolla calycem ſuperante. *Sauv. monſp.* 142.
Myoſotis foliis linearibus tomentoſis. *Hall. helv. n.* 891? R.
Caryophyllus holoſteus tomentoſus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
β. Caryophyllus holoſteus tomentoſus anguſtifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 675.

Filziges Hornkraut. W.
Habitat in Granada. ♃ (v. ſ.)
Folia *tomentoſo - alba.*

20. CERASTIUM *manticum.*

C. glabrum, caule ſtricto, foliis lanceolatis, pedunculis longiſſimis, capſulis globoſis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 315. *
Alſine caule nodoſo, ramoſo, foliis lanceolatis, lineatis, petiolis longiſſimis. *Hall. helv. n.* 883. R.
Alſine caryophylloides glabra, florum pediculis longiſſimis. *Segu. veron.* 3. *p.* 178. *t.* 4. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 676.
Veroneſiſches Hornkraut. W.
Habitat Veronae, *in* Helvetia. ⊙ (v. ſ.)
Caulis *erectus, ſimplex, pedalis, panicula trifida.*

922. SPERGULA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 798.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, integra. *Capſ.* ovata, 1-locularis, 5-valvis.

1. SPERGULA *arvenſis.*

S. foliis verticillatis, floribus decandris. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 377, 419. *Roy. lugdb.* 451. *Hamel. cult.* 6. *p.* 149. *t.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 153. *Gunn. norv n.* 20. *Pollich. pal. n.* 446. *Scop. carn. n.* 542. *Hoffm. germ.* 160. *Roth. germ. I.* 195. *II.* 504.
Alſine foliis verticillatis, ſeminibus rotundis. *Hall. helv. n.* 873.
Alſine floribus decandris, pentagynis; foliis verticillatis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 499. *n.* 8.
Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp.* 190.
Spergula. *Dod. pempt.* 527.
Alſine Spergula dicta major. *Bauh. pin.* 251.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 676.
Acker Spark. W.
Habitat in Europae *agris.* ⊙ (v. v.)
Filamenta *decem, ſaepe* 6, 7. *Pollich l. c.*
Stamina 5. 7. 8. 10. *Scop. l. c.* R.

2. SPERGULA *pentandra.*

S. foliis verticillatis, floribus pentandris. *Loefl. it.* 43

Roth. germ. I. 196. *II.* 505. *Hoffm. germ.* 160. *Moench. haſſ. n.* 376. *Weber. ſpic. fl. goett. p.* 14.
Alſine (*marginata*) foliis verticillatis, ſeminibus marginatis. *Schreb. ſpicil. p.* 31.
Stellaria pentandra. *Scop. carn. n.* 543.
Arenaria media. *Pollich. pal.* 426.
Arenaria teretifolia verna, flore albo, ſemine limbo foliaceo cincto. *Rupp. jen.* 2. *p.* 118.
Alſine Spergulae facie minima, ſeminibus marginatis. *Vaill. pariſ.* 8.
Spergula annua, ſemine foliaceo nigro circulo membranaceo albo cincto. *Dill. giſſ.* 46. *E. N. C. cent.* 5. *ſ.* 6. *p.* 275. *t.* 4. *Moriſ. blaeſ.* 228.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 678.
Fünffädiger Spark. W.
Habitat in Germania, Gallia, Anglia, Hiſpania. ⊙ (v. v.)

Simillima *omnino praecedenti, ſed magis glabra, floribus pentandris.*

Planta *tota pubeſcens.* Caulis *erectus, digitalis.* Folia *verticillata, ſex octove.* Stamina 5. Semina *nigricantia albo et membranaceo margine cincta.* Moench. *l. c.*

3. SPERGULA *nodoſa.*

S. foliis oppoſitis ſubulatis laevibus, caulibus ſimplicibus. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 153. *Reyg. ged.* 1. *p.* 124. *Pollich. pal. n.* 447. *Roth. germ. I.* 196. *II.* 505. *Fl. dan. t.* 96. *Kniph. cent.* 11. *Hoffm. germ.* 161.
S. foliis oppoſitis, pedunculis ſimplicibus. *Hort. cliff.* 173. *Fl. ſuec.* 378, 420. *Roy. lugdb.* 451.
Alſine foliis ſuperioribus faſciculatis, imis conjugatis. *Hall. helv. n.* 871.
Stellaria nodoſa. *Scop. carn. n.* 545.
Arenaria. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 720. *Raj. hiſt.* 1033.
Alſine nodoſa germanica. *Bauh. pin.* 251.
Alſine paluſtris, ericae folio, polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 4.
Polygonum, foliis gramineis, alterum. *Loeſ. pruſſ.* 204. *t.* 64.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 678.
Knotiger Spark. W.

Habitat in Europae *frigidioris campis ſubhumidis.* ♃ (v. v.)

4. SPERGULA *laricina.*

S. foliis oppoſitis ſubulatis ciliatis faſciculatis. *Sp. pl.* 631. *Smith ic. ined.* 1. *p.* 18. *t.* 18. *

Alſine foliis oppoſitis linearibus rigidis faſciculatis, baſi ciliatis, petalis integris, calyci aequalibus. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 155. *n.* 61.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 679.

Lerchenblättriger Spark. W.

Habitat in Sibiria.! ♃

5. SPERGULA *ſaginoides.*

S. foliis oppoſitis linearibus laevibus, pedunculis ſolitariis longiſſimis, floribus pentandris, caule repente. *Swartz in Act. nov. holm.* 1789. *p.* 38. *t.* 1. *f.* 2. *

S. foliis oppoſitis linearibus laevibus, pedunculis ſolitariis longiſſimis, caule repente. *Sp. pl.* 631. *Gouan. illuſtr. p.* 31.

Alſine foliis gramineis, ſaepe faſciculatis, pedunculis longis nudis unifloris. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 157. *n.* 64. R.

Alſine foliis linearibus connatis, pediculis longiſſimis unifloris. *Hall. helv. n.* 862.

Alſine alpina repens. *Mich. hort. p.* 5.

Alſine tenuifolia, pedunculis florum longiſſimis. *Vaill. pariſ.* 8. *Sauv. monſp.* 142. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 680.

Langſtieliger Spark.

Habitat in Helvetiae, Galliae, Sibiriae, Sueciae *alpibus.* ♃ (v. ſ.)

Caulis *procumbens, pollic.* 2 *altus.* Folia *linearia, oppoſita, ad genicula faſciculata.* Pedunculi *ſimpliciſſimi, longiſſimi, laterales ſine bracteis.* Flores *cernui.*

*6. SPERGULA *ſubulata.*

S. foliis oppoſitis ſubſecundis lineari-ſubulatis carinatis ciliatis, floribus decandris. *Swartz in nov. Act. holm.* 1789. *p.* 39. *t.* 1. *f.* 3. *

Spergula ſaginoides. *Retz. obſ.* 1. *p.* 19. 2. *p.* 18. 3. *p.* 32. *Curt. lond. Hoffm. germ.* 161. *Roth. germ. I.* 197. *II.* 506.

Spergula laricina. *Lightf. ſcot.* 1. *p.* 244. *Hudſ. angl.* 203. *Fl. dan. t.* 858.

S. (*laricina*) foliis oppoſitis ſubulatis viſcido-villoſis ciliatisque, axillis faſciculatis. *Wulfen in Iacq. Collect.* 2. *p.* 207. *
Pfriemförmiger Spark. W.
Habitat in paſcuis Germaniae, Angliae, Daniae, Sueciae. ⊙ (v. ſ.)

Planta Wulfeni eſt forte eadem licet petala calyce majora dixerit, quae illo minora ſunt. W.

*7. SPERGULA *glabra.* W. †

S. foliis oppoſitis faſciculatis filiformibus glabris, floribus decandris, petalis calyce majoribus. W.
Spergula ſaginoides. *Allion. pedem. n.* 1735. *t.* 64. *f.* 1.
Habitat in paſcuis umbroſis alpium Valdenſium. ♃

D E C A G Y N I A.

923. NEURADA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 799.

Cal. 5-partitus. *Petala* 5. *Capſ.* infera, 10-locularis, 10-ſperma, aculeata.

1. NEURADA *procumbens.*

Neurada. *Hort. upſ.* 117. *Forſk. deſer. p.* 90. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 393.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 691.
Liegender Dornknopf. W.
Habitat in Aegypto, Arabia, Numidia. ⊙

Herba *tota albicans, arachnoideo-tomentoſa.* Cotyledones *ſagittatae.* Caules *depreſſi, rigidi, teretes, palmares et ultra.* Rami *ex ſingulis alis inferioribus.* Folia *alterna, petiolata, ovata, plicata, eroſo-ſinuata, ſupra minus alba ſ. tomentoſa.* Flores *axillares, ſubſeſſiles.*

Serenda *cum calyce fructuque integro in aridiſſimis.*

Caulis *videtur fruticoſus.* Calyx *non* 5-*fidus, ſed multipliciter imbricatus. Forskoehl. l. c.* R.

924. PHYTOLACCA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 800.

Cal. 0. *Petala* 5, calycina. *Bacca* ſupera, 10-locularis, 10-ſperma.

1. PHYTOLACCA *octandra.*

P. floribus octandris octagynis. *Sp. pl.* 631.
P. mexicana, baccis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 218. *t.* 239. 308.
Iamma goba. *Kaempf. amoen.* 828. *t.* 829.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 692.
Achtfädige Kermesbeere. W.
Habitat in Mexico. ♃ (v. v.)

Statura Ph. decandrae. Folia *albidiora.* Pedunculus *communis breviſſimus. Pedicelli breves, ut fere nulli.* Calyx *[illegible]. Corolla alba, omnino plana, nec concava.* Stamina *et Styli octo.* Fructus *ruber.*

2. PHYTOLACCA *ſtricta.*

P. floribus octandris heptagynis, foliis lanceolatis mucronatis. *Hoffm. Comment. goett.* 12. *p.* 27. * *tab.* 3.
P. (*heptandra*) floribus heptandris hexagynis, foliis lanceolatis. *Retz. obſ.* 6. *p.* 29.*
Steife Kermesbeere. W.
Habitat in America. ♃ (v. v.)

3. PHYTOLACCA *abyſſinica.*

P. floribus decandris pentagynis. *Hoffm. Comment. goett.* 12. *p.* 28. * *tab.* 2.
P. (*dodecandra*) floribus penta-decandris penta-octogynis. *l'Herit. ſtirp.* 1. 143. *t.* 69. * *Ait. Kew.* 2. *p.* 123.
Abyſſiniſche Kermesbeere. W.
Habitat in Abyſſinia. ♄ (v. v.)

4. PHYTOLACCA *decandra.*

P. floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upſ.* 117. *Gron. virg.* 161. *Roy. lugdb.* 222. *Mat. med.* 118. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 7. *Blackw. t.* 515. *Mill. illuſtr. Regn. bot.*
P. floribus petiolatis decemfidis. *Hall. helv. n.* 1007.
P. vulgaris. *Dill. elth.* 318. *t.* 339. *f.* 3 9. *Mill. dict. n.* 1.
Solanum racemoſum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 693.
Gemeine Kermesbeere. W.
Habitat in Virginia *et in* Helvetia. ♃ (v. v.)

5. PHYTOLACCA *icoſandra.*
P. floribus icoſandris decagynis. *Sp. pl.* 631.
P. ſpicis florum longiſſimis, radice annua. *Mill. dict. n.* 2. *ic.* 138. *t.* 207.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 694.
Zwanzigfädige Kermesbeere. W.
Habitat in India *orientali.* ♃ (v. v.)

Caulis *tripedalis herbaceus ſed perennans paucis ramis ſubdiviſus.* Folia *ſtrictiora acutiora.* Pedunculus *inferne triqueter, at intra racemum multangularis ſed in hac ſcaber.* Pedicelli *inferiores ſaepe triflori.* Flores *albi.* Stamina *certe in inferioribus floribus viginti.* Bacca *ſaturate purpurea.*

6. PHYTOLACCA *dioica.*
P. floribus dioicis. *Sp. pl.* 632. *Mill. dict. n.* 4. *l'Herit. ſtirp.* 1. *p.* 145. *t.* 70.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 695.
Baumartige Kermesbeere. W.
Habitat in America *auſtrali.* ♄

Caulis *perfecte fruticoſus.* Folia *exacte ovata glabra, magnitudine* Populi nigrae, *longius petiolata.* Flores *ut in reliquis, ſed dioici polyandri.*

Ankündigung.

Ich halte mich überzeugt, daſs eine nicht geringe Anzahl von Aerzten den Verlust von *Pyl's* Zeitschriften für die öffentliche und gerichtliche Arzneiwissenschaft lebhaft empfunden und aufrichtig bedauert haben wird. Diese Ueberzeugung und der verdiente Beifall, der seinen Sammlungen zu Theil ward, läſst mich hoffen, daſs man den Versuch eine ähnliche Zeitschrift herauszugeben, nicht misbilligen wird. Ich fühle zwar den Abstand, zwischen dem verstorbenen *Pyl* und mir, in Rücksicht auf Kenntnisse und Talente, sehr lebhaft; da ich indessen durch meine persönliche Lage, durch die Verhältnisse worin ich zu stehen das ehrenvolle Glück habe, und durch die Erlaubniſs meiner hohen Chefs, die Acten des Ober-Collegii medici und Ober-Collegii sanitatis, auf eben die Art, wie es *Pyl* gethan hat, zu diesem Zweck zu benutzen, mich im Stande sehe, dem unwiderstehlichen Drange, so viel an mir ist, zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse beizutragen, nachzugeben, so darf ich hoffen, daſs dieses Unternehmen nicht ganz misglücken wird.

Demnach kündige ich hierdurch eine neue medicinische Zeitschrift unter dem Titel:

MEDICINISCHE EPHEMERIDEN
von Berlin.

an.

Der Plan, den ich dabei zu Grunde lege; weicht in so fern von dem des Magazins und Repertoriums für die gerichtliche und öffentliche Arzneiwissenschaft des verstorbenen *Pyl* ab, daſs ich diese neue Zeitschrift, wenn gleich vorzüglich, doch nicht ausschlieſsend, diesen Theilen der Wissenschaft widmen, und denselben beträchtlich erweitern, und ausdehnen werde.

Alles was auf den praktischen Theil der Arzneiwissenschaft Bezug hat, und ausübende Aerzte allgemein interressiren kann, soll in diese Ephemeriden aufgenommen werden, und zu seiner Zeit, je nachdem es der Raum verstatten wird darin Platz finden, wobei ich jedoch bemüht seyn werde, daſs die Mannichfaltigkeit der Gegenstände ihrer Gründlichkeit, und ihrem innern Werthe nicht entgegen stehe.

Folgende Angabe der Rubriken wird meine Absicht in ein helleres Licht setzen, und zugleich den Plan des Werks selbst enthalten.

I. Wetterbeobachtungen.
II. Herrschende Krankheiten.
III. Merkwürdige Krankheitsfälle, chirurgische Operationen und Leichenöffnungen.
IV. Verzeichniſs der in Berlin Gebornen und Verstorbenen, sowohl nach den Wochen, als nach den Krankheiten.
V. Verzeichniſs derjenigen Personen, welche daselbst ein sehr hohes Alter erreicht haben.
VI. Zustand der Medicin und Chirurgie, öffentliche Anstalten, Veränderungen, Beförderungen, Todesfälle und Biographien von Aerzten.

VII. Beiträge zur medicinischen Polizey, Actenauszüge, Verordnungen etc.

VIII. Beiträge zur gerichtlichen Arzneiwissenschaft, Actenauszüge, etc.

IX. Kurze Nachrichten, Anecdoten.

Ob ich gleich einen nicht geringen Vorrath von Materialien in Bereitschaft habe, so hängt dennoch das Daseyn und die Fortdauer dieser Zeitschrift vorzüglich von der gefälligen Mitwirkung meiner hochgeehrten Herren Kollegen in der Nähe und Ferne ab. Ich fordere sie daher gehorsamst und auf das angelegentlichste auf, mein Unternehmen durch ihren Beitritt zu befördern, und dadurch den innern Werth desselben zu erhöhen; nur mit blos theoretischen Abhandlungen, und mit persönlichen Streitigkeiten muſs ich sie ersuchen, mich zu verschonen. Jene, so hoch ich sie auch schätze, gehören nicht in meinen Plan; diese werde ich immer für unwürdige Mittel, das Interresse einer Zeitschrift zu erhöhen, ansehen.

Von diesen medicinischen Ephemeriden erscheint vierteljährig ein Heft von acht bis zehn Bogen in 8vo mit lateinischen Lettern gedruckt, in einem farbigen Umschlage. Der preis eines jeden Hefts beträgt 12 Gr. Pr. Courant. Das erste Heft erscheint zu Ostern. Vier Hefte machen einen Jahrgang aus. Die Beiträge erbitte ich mir unter der Adresse: der Nauckschen Buchhandlung zu Berlin, aus.

Ich erbiete mich, wegen des zu bestimmenden Honorars mit den Herrn Einsendern in freundschaftliche Erörterung zu treten.

Formey,
königl. Leibarzt, Obermedicinalrath und Oberstabsmedicus.

Nachschrift. Der Güte des Königl. LeibarztesHerrn Formey, verdanke ich den Verlag obiger Zeitschrift. Ich würde meine Zeitgenossen und den Gegenstand selbst herabzuwürdigen glauben, wenn ich noch etwas über den Werth und das zu hoffende Interesse derselben hinzufügen wollte, da der bloſse Gedanke an Berlin — die zahlreiche Menge von Bewohnern dieser Hauptstadt — ihre vielen und treffliche Medicinalanstalten, verbunden mit einer bedeutenden Anzahl hier versammelter zum Theil sehr berühmter Aerzte, und endlich der Name des Herausgebers allein schon zu Erwartungen berechtigt, die im Stande sind, dem denkenden und praktischen Arzte, die interessante Aussicht auf ein weitläuftiges Feld von Erfahrungen, in dem ausübenden Theile seiner Kunst zu eröffnen.

Wenn mir indes erlaubt seyn mag, in merkantilischer Rücksicht noch etwas hinzufügen zu dürfen? so ist es der Wunsch: diese periodische Schrift so schnell als möglich in Umlauf zu bringen. Ich schlage daher den Weg der Subscription vor und ersuche alle diejenigen, welche dieses Journal zu besitzen wünschen, mich mit Einsendung ihrer Namen zu beehren, um sie dieser Schrift vordruckenlassen zu können.

Nauk,
Buchhändler und Verleger.

Ankündigung.

Schon vor einiger Zeit machte ich, um Concurrenz zu vermeiden, im Intell. Bl. der a. L. Z. bekannt, daſs ich:

A System of comparative Anatomy und Physiology by B Harwood, Professor of Anatomy in the University of Cambridge, 4.

übersetzen wolle.

Ich freue mich jetzt dem medicinischen und naturhistorischen Publikum anzeigen zu können, daſs das erste Heft dieses Werkes, unter dem Titel:

System

einer

vergleichenden Anatomie und Physiologie

von

B. Harwood.

Professor der Anatomie auf der Universität zu Cambridge.

auf Ostern 1799 wirklich übersetzt herauskommen werde.

Der Werth dieses *Harwoodschen* Werks ist dem deutschen Publikum schon durch mehrere Anzeigen bekannt.

Dies erste Heft enthält die Abhandlung über das Hirn und die Nerven, und über die Geruchswerkzeuge der verschiedenen Thierklassen. Damit das deutsche Publikum aber wisse, was künftig noch zu erwarten sey, so übersetze ich folgende Anzeige vom dem Inhalte dieses Werkes, aus der Zeitschrift: *the brittisch Critik*, for Jan. 1797.

1. Einleitung.
2. Allgemeine Analogien, welche durch alle Thierklassen Statt finden. Besondere Analogien.
3. Knochenlehre: Knochen der Thiere mit den menschlichen verglichen, und Verschiedenheiten derselben.
4. Das Blut der Thiere verglichen. Geschichte der Transfusion. Resultat einer Menge von Versuchen, welche zu Cambridge über diesen Gegenstand gemacht sind. Leichte Methode dieser Operation. Bemerkungen über das Einspritzen verschiedener Flüſsigkeiten in die Venen der Thiere, und über den Erfolg einiger neuerlich gemachten Versuche.
5. Herzen und Respirationsorgane der vierfüſsigen Thiere, Vögel, Fische und Amphibien. Verschiedenheiten ihres Baues, ihrer Verrichtungen u. s. w.
6. Vergleichung der Respiration und des Blutumlaufs dieser verschiedenen Thierklassen.
7. Untersuchung und Vergleichung der Zähne fleischfressender und pflanzenfressender Thiere.

8. Ueber die Verdauungswerkzeuge. Vergleichung des Magenſaftes und des Verdauungsvermögens der Thiere.
9. Vom Saugadersysteme.
10. Vom Hirn und Nervensysteme.
11. Vergleichung der Sinneswerkzeuge. Verschiedenheiten im Baue des Auges, Ohren, der Nase verschiedener Thiere, und Wirkungen solcher Verschiedenheiten auf die Lebensart u. s. w. der Thiere selbst.
12. Vergleichung der Zeugungstheile bei den verschiedenen Thierklassen und Untersuchung der verschiedenen Arten ihrer Empfängniſs (impregnation)
13. Beschluſs.

Die Ordnung des Plans wurde durch die Schwierigkeit Zeichner und Kupferstecher zu den verschiedenen Gegenständen zu verschaffen, geändert: dabei ist aber nichts verloren, denn jeder Abschnitt macht für sich ein ganzes aus.

Was die Uebersetzung betrift, so werde ich sie versprochenermaſsen mit Anmerkungen und Zusätzen vermehren, welche sich theils auf eigene Untersuchungen, theils auf Entdeckungen und Beobachtungen anderer gründen. Alles wesentliche was *Vicq d'Azyr*, *Monro*, u. a. über das Hirn, *Scarpa*, u. a. über das Geruchswerkzeug der Thiere gesagt haben, ist angeführt. Wo der Verfasser Gegenstände zu kurz berührt, oder auch meiner Meinung nach hie und da wesentliche Dinge ganz übergangen hat, habe ich zu ergänzen gesucht. Was ich dabei geleistet, mögen die Leser in der Folge selbst beurtheilen. Die Kupfertafeln werden von Herrn *Glasbach* in Berlin, einem schon bekannten Künstler, sauber nachgestochen. Sobald ein zweites Heft in England erscheint, soll die Uebersetzung desselben möglichst schnell nachfolgen.

Braunschweig,
den 12ten December 1798.

C. St. W. Wiedemann,
Professor zu Braunschweig.

Der Verlag des obigen Werks ist mir von Herrn Professor Wiedemann überlaſsen worden, und ich nehme darauf Subscription an. Der Preis eines jeden Hefts kann zwar wegen Ungewiſsheit der Bogenzahl und der beträchtlichen Menge von Kupfern noch nicht bestimmt werden, doch sollen diejenigen denen es gefällt mir ihre Namen binnen hier und Monat May einzusenden — auſser den ersten und besten Kupferabdrücken, noch andere wesentliche Vortheile erhalten; die Namen der Subscribenten werden dem Werke vorgedruckt.

Berlin, im Januar 1799.

Nauk,
Buchhändler.

g des Ma-
hiere.

denheiten
chiedener
heiten auf

chiedenen
nen Arten

vierigkeit
egenstän-
verloren,
s.
verspro-
ermehren,
heils auf
en. Alles
das Hirn,
ere gesagt
le zu kurz
d da we-
ergänzen
er in der
rden von
Künstler,
England
st schnell

lemann,
schweig.

r Wiede-
ubscription
Ungewiſs-
on Kupfern
en denen es
y einzusen-
cken, noch
der Subscri-

k,
dler.

S

L

SPECIES PLANTARUM.

Tomus II. Pars II.

QK91
.S7
1797
v.4

Claſſis XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

927. BOCCONIA *Cor.* o. *Cal.* 2-phyllus, inferus. *Capſ.* 2-valvis, 1-ſperma.

925. ASARUM. *Cor.* o. *Cal.* 3-fidus, ſuperus. *Capſ.* 6-locularis.

955. STERCULIA. *Cor.* o. *Cal.* 5-partit. *Nectar.* ſtaminiferum. *Germen* pedicellatum. *Capſ.* 5.

931. RHIZOPHORA. *Cor.* 4-partita. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Sem.* 1, clavatum receptaculo carnoſo.

938. GARCINIA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, inferus. *Bacca* 8-ſperma, coronata.

943. CRATAEVA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus, inferus. *Bacca* 2-locularis, pedicellata.

928. DODECAS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 1-locul. 4-valvis.

932. CRENAEA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Capſ.* 5-locularis polyſperma.

939. HALESIA. *Cor.* 4-fida. *Cal.* 4-dentatus, ſuperus. *Pericarp.* 4-ſpermum, 4-angulatum.

933. APACTIS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* o. *Stam.* 16.

926. TOMEX. *Cor.* 5-petala. *Cal.* o. *Involucrum.* 4-5-phyllum. 5-12-florum. *Bacca* 1-ſperma.

945. EURYA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* duplex. *Capſula* 5-locularis.

944. TRIUMFETTA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, inferus. *Capſ.* 4-locul. 2-ſperma, muricata.

946. PEGANUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, inferus. *Capſ.* 3-locul. *Stam.* 15.

954. KLEINHOFIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyll. *Nectar* ſtaminiferum. *Germen* pedicellatum. *Capſ.* 5-angularis inflata.

948. NITRARIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Drupa* 1-ſperma. *Stam.* 15.

941. ARISTOTELIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 3-locularis.

16175

937. GRANGERIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus. *Drupa* monoſperma.
936. VATICA. *Cor.* 5-petala. *Anth.* 15-quadriloculares: loculis interioribus brevioribus.
947. HUDSONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 3-phyllus, inferus. *Capſ.* 1-locularis. 3-valvis. 3-ſperma.
942. CANELLA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 3-lobus, inferus. *Bacca* 1-locul. 2-ſ. 4-ſperma. *Nectarium* antheriferum.
949. PORTULACA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-fidus, inferus. *Capſ.* 1-locul. circumſciſſa.
950. TALINUM. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 1-locularis, trivalvis. *Sem.* arillata.
951. LYTHRUM. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 12-fidus, inferus. *Capſ.* 2-locularis.
952. CUPHEA. *Cor.* 6-petala, inaequalis. *Cal.* 6-dentatus, inaequalis. *Capſ.* 1-locul. ante maturitatem dehiſcens.
953. GINORIA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* 6-fidus, inferus. *Capſ.* 1-locul. 4-valvis.
934. BLAKEA. *Cor.* 6-petala. *Cal.* fruct. 6-phyllus: *Floris* ſuperus indiviſus. *Capſ.* 6-locularis. *Antherae* connexae.
929. AGATHOPHYLLUM. *Cor.* 6-petala. *Cal.* truncatus. *Drupa.* monoſperma.
935. BEFARIA. *Cor.* 7-petala. *Stam.* 14. *Bacca.* exſucca, 7-locularis.
930. BASSIA. *Cor.* 8-fida. *Stam.* 16. *Drupa.* 5-ſperma.
940. DECUMARIA. *Cor.* 10-petala. *Cal.* 10-phyllus, ſuperus.

† *Cleome viſcoſa, dodecandra. Chlora dodecandra. Samyda pubeſcens, ſerrulata. Rivina octandra. Paſſerina capitata.*

D I G Y N I A.

956. HELIOCARPUS. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* 2-locul. 1-ſperma, compreſſo-radiata.
957. AGRIMONIA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-fidus. *Sem.* 1. ſ. 2.

T R I G Y N I A.

958. RESEDA. *Cor.* petalis multifidis. *Cal.* partitus. *Capſ.* 3-locularis, hians.

960. VISNEA. *Cor.* petalis ellipticis. *Cal.* 5 - phyll. *Nux.*
959. EUPHORBIA. *Cor.* petalis peltatis. *Cal.* ventricoſus. *Capſ.* 3 - cocca.

TETRAGYNIA.

962. APONOGETON. *Cor.* o. *Cal.* o. *Capſ.* 4.
961. CALLIGONUM. *Cor.* o. *Cal.* 5 - partitus. *Nux.* monoſperma.

† *Tormentilla erecta. Reſedae aliquot.*

PENTAGYNIA.

963. GLINUS. *Cor.* o, niſi ſetulae. *Cal.* 5 - phyllus *Capſ.* 5 - locul.
964. BLACKWELLIA. *Cor.* 15 - petala. *Cal.* 5 - fid. *Capſ.* 1 - locul. polyſperma.

† *Reſeda pupuraſcens.*

DODECAGYNIA.

965. SEMPERVIVUM. *Cor.* 12 - petala. *Cal.* 12 - partitus. *Capſ.* 12.

† *Aliſma cordifolia.*

MONOGYNIA.

925. ASARUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 801.

Cal. 3. ſ. 4-fidus, germini inſidens. *Cor.* 0. *Capſ.* coriacea, coronata.

1. ASARUM *europaeum.*
A. foliis reniformibus obtuſis binis. *Mat. med.* 119. *Roy. lugdb.* 207. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 16. *Mill. dict. n.* 1. *et ic. t.* 53. *Willich. obſ n.* 23. *Scop. carn. n.* 563. *Pollich. pal. n.* 448. *Mönch. haſſ. n.* 388. *Flor. dan. t.* 633. *Ludw. ect. t,* 182. *Blackw. t.* 383. *Hoffm. germ.* 161. *Roth. germ. I.* 202. *II.* 518.
A. foliis reniformibus ſubhirſutis. *Hall. helv. n.* 1547.
A. foliis ſubcordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. ſuec.* 392; 421. *Guett. ſtamp.* 198.
Aſarum. *Bauh. pin.* 197. *Cam. epit.* 19.
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 7. *p.* 2.
Europäiſche Haſelwurz. W.
Habitat in Europae *nemoribus.* ♃ (v. v.)

2. ASARUM *canadenſe,*
A. foliis reniformibus mucronatis. *Mill. dict. n.* 2. *et illuſtr. ſyſt.* *Thunb. jap.* 190.
Aſarum latifolium.. *Saliſb. prod chap. allert.* 344.
A. foliis ſubcordatis petiolatis. *Gron virg.* 52.
A. canadenſe, mucronato folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 511. *ſ.* 13. *t.* 7. *f.* 4.
A. canadenſe *Corn. canad.* 24. *t,* 25.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 3.
Canadiſche Haſelwurz. W.
Habitat in Canada. ♃

An varietas praecedentis? ſic ſuadent Folia bina, disſuadent alia.

Folia *utrinque minutiſſime pubeſcentia.* Germen *obſolete trigonum,* Calyx *foliolis inferne incurvis cavis, ſuperne plus minus patentibus, planiuſculis, marginibus revolutis.* Filamenta *vix altitudine ſtigmatum.* Salisb. l. c.

2. ASARUM *virginicum.*
A. foliis cordatis obtuſis glabris petiolatis. *Gron. virg.* 162. *Mill. dict. n.* 3. *Thunb. jap.* 190.

A. virginianum, piſtolochiae foliis ſubrotundis, cyclaminis more maculatis. *Pluk. alm.* 53. *t.* 78. *f.* 2. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 511. *ſ.* 17. *t.* 7. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 3.
Virginiſche Haſelwurz. W.
Habitat in Virginia, terra Mariana, Carolina. ♃

*926. TOMEX.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 802.

Involucrum 4-5-phyllum. *Cal.* 0. *Cor.* 5-petala. *Nectar* ſquamae 5, inter ſtamina inferiora. *Bacca* 1-ſperma.

*1. TOMEX *japonica.* †
T floſculis corollatis, foliis ſubtus tomentoſis. W.
Tomex japonica. *Thunb. jap.* 190.
Japaniſcher Tomex. W.
Habitat in Japonia ♄

Caulis *arboreus excelſus ramoſus, plusquam orgyalis.* Rami *et* ramuli *tomentoſi ultimi angulati.* Folia *alterna petiolata oblonga obtuſa integerrima erecta, parallelo-nervoſa (venoſa? W.); ſupra glabra viridia, ſubtus incano-tomentoſa palmaria, junioribus minoribus.* Petioli *angulati ſtriati tomentoſi pollicares.* Flores *axillares in capitulum collecti pedicellati dioici.* Pedunculi *angulati ſtriati ſolitarii tomentoſi bracteati ſemiunguiculares.* Bracteae *oppoſitae prope baſin minutae tomentoſae.* Pedicelli *intra capitulum breviſſimi quini raro ſex uniflori tomentoſi ſemilineam longi.* Fructus *et* foemineos *flores nunquam vidi.* Thunb. l. c.

*2. TOMEX *Tetranthera.* W.
T. floſculis corollatis, foliis glabris. W.
Tetranthera laurifolia *Jacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 59. *t.* 113.
Lorbeerblättriger Tomex. W.
Habitat in China. ♄

Rami *teretes flaveſcentes, juniores hirti.* Folia *alterna petiolata oblongo-obovata obtuſa integerrima venoſa glabra, nervo medio ſub lente villoſiuſculo.* Petioli *ſemiunciales hirti.* Pedunculi *laterales in nuda rami junioris parte bi-usque quinqueflori.* Involucrum *tetraphyllum, foliolis ſubrotundis concavis pubeſcentibus multiflorum, flores circiter* 12 *pedi-*

cellatos continens. Pedicelli *florum hirti.* Calyx *nullus.* Corolla *pentapetala alba, petalis apice ſubdenticulatis.* Nectaria *clavata viridia ſtaminibus breviora.* Filamenta 12 - 17 *ſubulata piloſa.* Antherae *oblongae planae, loculis quatuor diſtinctis ſeggregatis.* Germen *oblongum.* Stylus *breviſſimus.* Stigma *ſimplex.* Bacca *globoſa rubra, magnitudine Ribetis rubri, monoſperma.* W.

*3. TOMEX *Sebifera.* W.

T. floſculis apetalis, foliis glabris. W.

Berrya chinenſis. *Klein in Litt.*

Sebifera glutinoſa. *Loureiro cochin.* 783. *

Laurus (*involucrata*) foliis obovatis, umbellis involucratis. *Retz obſ.* 6. *p.* 27. *

Tallow Tree. *Anglor.*

Talgbringender Tomex. W.

Habitat in ſylvis Cochinchinae, Chinae. ♄ (v. ſ.)

Arbor *grandis.* Rami *teretes noduloſi, cortice flaveſcenti nitido tecti.* Ramuli *tenui pube induti.* Folia *ſparſa petiolata obovata obtuſa, vel etiam oblongo-lanceolata obtuſa, integerrima venoſa glabra.* Petioli *unciales pubeſcentes.* Pedunculi *tetragoni tri- vel quinqueflori pubeſcentes axillares et laterales.* Pedicelli *florum tetragoni valde hirti.* W.

Sequentem deſcriptionem partium fructificantium in recenti planta factam mecum communicavit amicus cariſſimus D. Klein: Involucrum *tetraphyllum, foliolis ovatis concavis extus tomentoſis, includens floſculos apetalos* 8 - 10 *breviter pedicellatos.* Calyx *nullus niſi margo pedicelli integerrimus piloſus floſculorum.* Corolla *nulla.* Nectarium *corpuſcula ad baſin filamentorum ſita.* Filamenta 12 *ad* 15 *filiformia piloſa.* Antherae *oblongae ovatae ſulcatae.* Germen *ovatum ſtaminibus arcte cinctum.* Stylus *filiformis ſtaminibus duplo longior.* Stigma *incraſſatum excavatum margine reflexo.* Bacca *monoſperma globoſa.* W.

927. BOCCONIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 803.

Cal. diphyllus. *Cor.* o. *Stylus* bifidus. *Capſ.* 2-valvis, 1-ſperma.

1. BOCCONIA *fruteſcens.*

B. foliis oblongis ſinuatis. W.

Bocconia. *Hort. cliff.* 202. *Iacq. amer.* 146. *Mill. dict. Willich. obſ. n.* 35. *Swartz obſ.* 187. *
B. ramoſa, ſphondyli folio tomentoſo. *Plum. gen.* 55. *Trew. ehr. t.* 4.
B. ramoſa, foliis majoribus ſinuatis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 244.
Chelidonium arboreum, foliis quercinis. *Sloan. jam.* 82. *hiſt.* 1. *p.* 195. *t.* 125.
Cocoxihvitl. *Hernand. mex.* 158.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 601.
Straucartige Bocconie. W.
Habitat in Mexico, Iamaica, Cuba, Domingo. ♄ (v. ſ.)
Petala *nulla.* Stamina *ſex.* Willich. l. c. R.

*2. BOCCONIA *cordata.*

B. foliis cordatis ſublobatis. W.
Herzblättrige Bocconie. W.
Habitat in China? ♄

Folia *ſubtus glauca ut in praecedente, ſed ſubrotunda cordata, obſolete lobata, obtuſe dentata nervoſo-venoſa.* Panicula *elongata pedata, ramis ſimplicibus nec diviſis.* Calyx *albus, ut in praecedente, ſed major.* Stamina *numeravi* 24. Stylus *nullus.* Stigma *bilamellatum ſeſſile.* W.

928. DODECAS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 804.

Cal. 5-fidus corollifer superus. *Petala* 5. *Capſ.* 1-locul. 4-valv. polyſperma calyce coronata.

1. DODECAS *ſurinamenſis.*

D. ſurinamenſis. *Lin. ſuppl.* 245.
Surinamiſche Dodecas. W.
Habitat in Surinamo. C. G. *Dalberg.* ♄

Frutex *Lycii barbari facie laevis ſubtetragonus, ramis oppoſitis brevibus.* Folia *oppoſita obovato-oblonga ſ. cuneata ſubpetiolata laevia obtuſa integerrima.* Stipulae *nullae.* Pedunculi *axillares uniflori breves ſolitarii longitudine calycis.* Bracteae *binae minutae ſub calyce.* Calyx *ante explicationem tetragonus quadrivalvis inferne turbinatus teres.* Petala *calyci inſerta, ad diviſuras.* Stamina *receptaculo inſerta juxta germen, nec calyci.*

[redacted]




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



*929. AGATHOPHYLLUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 1754.

Cal. minimus truncatus. *Petala* 6 calyci inſerta. *Drupa* ſubgloboſa. *Nux* ſemiquinquelocul. 1-ſperma. *Nucleus* 5-lobus.

*1. AGATHOPHYLLUM *aromaticum.* W.

Evodia Ravenſura. *Gaert. ſem. 2. p. 101. t. 103. f. 2.*
Ravenſura aromatica. *Sonnerat. itin. ind. ed. germ 2. p. 177. t. 127.* *
Gewürzhaftes Gutblatt. W.
Habitat in inſula Madagaſcar. ♄

Arbor *craſſa, cortice aromatico rufo, ligno inodoro gravi.* Folia *petiolata alterna obovata obtuſa coriacea integerrima glabra, inferne glauceſcentia venoſa.* Flores *parvi in corymbis terminalibus.* W.

930. BASSIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 805.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 8-fida, tubo inflato. *Stamina* 16. *Drupa* 5-ſperma.

1. BASSIA *longifolia.*

B. foliis lanceolatis, pedunculis unifloris longiſſimis horizontalibus axillaribus congeſtis. W.
B. longifolia. *Mant.* 563.
Ilippe Malabaris. *Koenig. mſſ.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt 3. *p.* 606.
Langblättrige Baſſie. W.
Habitat in Malabaria. ♄ (v. f.)

Arbor *procera:* Ramis *ultimis recurvis, craſſiuſculis, griſeo-pubeſcentibus.* Folia, *in extremis ramulis, alterna, approximata, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima, acuta, venoſa, nuda, ſemipedalia, decidua.* Petioli *teretiuſculi, breves.* Pedunculi *axillares* 1-5, *ſimplices, filiformes, uniflori erecti: poſt floreſcentiam elongati, penduli.*

*2. BASSIA *latifolia.*

B. foliis ellipticis acutis, pedunculis unifloris nutantibus terminalibus congeſtis. W.
Baſſia latifolia. *Roxb. corom* 1. *p.* 20. *t.* 19. *
Mahwah Tree. *Act. ſoc. Bengal.* 1. *p.* 300.
Breitblättrige Baſſie. W.

Habitat in montibus Indiae *orientalis.* ♄

*3. BASSIA *obovata.*

B. foliis obovatis, pedunculis congeſtis terminalibus unifloris. *Forſt. prod. n.* 200.

Stumpfblättrige Baſſie. W.

Habitat in inſula Tanna. ♄

931. RHIZOPHORA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 806.

Cal. 4-partitus. *Cor.* 4-partita. *Sem.* 1, longisſimum, baſi carnoſum.

1. RHIZOPHORA *conjugata.*

R. foliis ovato-oblongis obtuſiuſculis integerrimis, calycibus ſeſſilibus, fructibus cylindraceo-ſubulatis. *Fl. zeyl.* 181.*

Anonyma. *Herm. piet.* 279. *Burm. ind.* 108. R. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 1. *p.* 672.

Gepaarter Wurzelbaum. W.

Habitat in India. ♄

2. RHIZOPHORA *gymnorhiza.*

R. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, radice terrae ſuperimpoſita. *Sp. pl.* 634.

R. calycum laciniis perſiſtentibus patentibus verſus fructum incurvatis. *Wachend. ult.* 89.

Mangium celſum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 102. *t.* 68.

Candel. *Rheed mal.* 6. *p.* 27. *t.* 31. 32. *Raj. hiſt.* 1769. *Burm. ind. p.* 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 5. *p.* 673.

Hoher Wurzelbaum. W.

Habitat in Indiae *ripis ſalſis.* ♄

3. RHIZOPHORA *Candel.*

R. foliis obtuſis, pedunculis bigeminatis folio longioribus, fructibus ſubulatis. *Sp. pl.* 634.

Tsierou-Candel. *Rheed. mal.* 6 *p.* 63. *t.* 25. *Raj. hiſt.* 1770. *Burm. ind.* 108.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 675.

Pfriemenfrüchtiger Wurzelbaum. W.

Habitat in Indiae *ſalſis.* ♄

4. RHIZOPHORA *Mangle.*

R. foliis acutis, fructibus ſubulato-clavatis. *Sp. pl.* 634.

R. pedunculis bifidis trifidisque, fructibus ſubulato-clavatis. *Iacq. amer.* 141. *t.* 89.

R. ſegmentis calycum perſiſtentibus reflexis, fructu acuminato. *Wach. ultr.* 90.
R. utrinque brachiata, foliis elliptico-ovatis: ſummis ramis diſpoſitis. *Brown. jam.* 211.
Mangle arbor pyrifolia, fructu oblongo tereti, ſummis ramis radicoſa. *Pluk. alm.* 241. *t.* 204. *f.* 3.
Candela americana foliis laurinis. *Cateſb. car.* 2. *p.* 63. *t.* 63.
Mangle aquatica, foliis ſubrotundis et punctatis. *Plum. gen.* 13.
Mangle pyri foliis, cum ſiliquis longis ficui indicae affinis. *Bauh hiſt.* 1. *p.* 415. *Sloan. jam.* 155. *hiſt.* 2. *p.* 63. *Rai. hiſt.* 1772.
Mangium calendarium *Rumph. amb.* 3. *p.* 108. *t.* 71. 72.
Peekandel. *Rheed.* 6 *p.* 91. *t.* 34. *Raj. hiſt.* 1770.
Margue Guapariba. *Piſ. braſ. l.* 4. *c.* 87. *R.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 675.
Gemeiner Wurzelbaum. W.
Habitat in paludibus Caribaearum, Malabariae. ♄ (v. ſ.)
Folia *oppoſita. petiolata, coſtata.* Cal. 4-*fidus. Petala* 4. Stamina 8.

5. RHIZOPHORA *cylindrica.*

R. fructibus cylindricis obtuſis. *Sp. pl.* 635:
Karil-Candel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 59. *t.* 33. *Raj. hiſt* 1770.
Mangium minus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 106. *t.* 69. *Burm. ind.* 108.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 682.
Walzenfrüchtiger Wurzelbaum. W.
Habitat in uliginoſis Malabariae. ♄

*932. CRENAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 807.

Cal. 4-fidus corollifer. *Petala* 4. *Capſ.* 5-locularis polyſperma.

*1. CRENAEA *maritima.*

C. maritima. *Aubl. guj.* 1. 523. *t.* 209. *
Meerſtrands Kerbling. W.
Habitat in maritimis Gujanae. ♃
Caules *e radice plures tetragoni nodoſi.* Folia *ſubpetiolata oppoſita obovato-lanceolata integerrima venoſa glabra.* Flores *albi parvi in corymbis*

pauciſloris axillaribus. Bracteae *binae lanceolatae parvae oppoſitae in quolibet pedunculo.*

*933. A P A C T I S.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 808.

Cal. 0. *Petala* 4 crenata inaequalia. *Germen* ſuperum. *Fructus.* - - - -

*1. APACTIS *japonica.* †
A. japonica. *Thunb. jap.* 191. *
Japaniſche Apactis. W.
Habitat in Japonia. ♄

Arbor. Folia *alterna petiolata ovata ſerrata baſi integerrima glabra.* Flores *in ultimis ramulis racemoſi.* Racemi *ſaepe ovati, excreſcentes magis oblongi.* Pedunculus *et* pedicelli *villoſo-ſcabri.* Thunb. l. c.

934. B L A K E A.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 810.

Cal. inferus 6-phyllus: ſuperus integer. *Pet.* 6. *Capſ.* 6-locularis, polyſperma.

1. BLAKEA *trinervia.*
B. bicalyculata, foliis trinerviis, transverſim ſubtiliſſime ſtriatis. *Lin. ſuppl.* 246. *Swartz obſ.* 188. *
B. foliis ellipticis trinerviis, nitidis, floribus lateralibus. *Brown jam.* 323. *t.* 35.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 607.
Dreynervige Blakie. W.
Habitat in lamaica. ♄

Folia *oblongo-ovata, petiolata, integerrima, coriacea, oppoſita, trinervia: nervis ſubtus protuberantibus nigricantibus.* Flores *oppoſiti, ſolitarii.*

2. BLAKEA *triplinervia.*
B. ecalyculata, foliis triplinerviis, pedunculis axillaribus ſubtrifloris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 61.
B. ecalyculata, foliis tripilnerviis. *Lin. ſuppl.* 246.
B. foliis triplinerviis, coſtatis. *Amoen. acad. p.* 257.
B. (*quinquenervia*) foliis ovato-oblongis acuminatis quinquenerviis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 525. *t.* 210. *
Dreyfachrippige Blakie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Arbor 16-*pedalis*. Folia *oppoſita petiolata, tripli-nervia ſpithamaea, ſubtus itidem coſtata et nervo marginali.* Pedunculi *triflori.* Flores *magnitudine Punicae diſtincti, absque perianthio infero.* Perianthium *campanulatum 3-5-fidum coriaceum receptaculo a peripheria ad centrum ſtriato perſiſtens.* Petala *circiter 7 ovato-oblonga calyci inſerta ſeſſilia lutea, intus alba carnoſa.* Filamenta *circites* 12 *ſ.* 15 *ſubcylindrica calyci inſerta, deſinentia in antheras.* Antherae *ovatae compreſſae parallelae incurvae, dorſo planiuſcutae corolla breviores, quaſi truncatae, non concatenatae, e filamentis continuatae et non filamentis inſidentes.* Germen *inferum.* Stylus *clavatus teres longitudine petalorum deflexus ad latus inferius corollae, extra circulum ſtaminum.* Stigma *capitatum ſtriatum.* Bacca *ſubrotunda multilocularis coronata calyce, diſco concavo, annulo crenato, centro umbilicato.* Semina *minuta.* Fructus *luteus ſapidus. Raro flos in Herbario conſervari poteſt, quia frangatur.*

*3. BLAKEA *pulverulenta.*

B. ecalyculata, foliis triplinerviis, racemo terminali. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 61. *

Beſtaubte Blakie. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Folia *elliptica acuminata integerrima, utrinque glabra, exceptis nervis ſubtus.* Vahl. l. c.

935. BEFARIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 811.

Cal. 7-fidus. *Petala* 7. *Stam.* 14. *Bacca* 7-locularis, polyſperma.

1. BEFARIA *reſinoſa.*

B. foliis ovatis, floribus congeſtis. *Lin. ſuppl.* 246.
Icon. *Mutis amer. v.* 1. *t.* 8.

Harzige Befarie. W.

Habitat in Nova Granada. *Mutis.* ♄

Arbor *ramis proliferis, cortice rudi, tenello ſubpubeſcente.* Folia *ſparſa ſubpetiolata ovata laevia perennia integerrima, longitudine pollicaria.* Flores *e ſummitate ramorum congeſti: pedunculis pubeſcentibus unifloris, in racemis minime elongatis.* Corolla

purpurea valde reſinoſa ſ. viſcoſa. Stamina *prope baſin pubeſcentia.*

2. BEFARIA *aeſtuans.*

B. foliis lanceolatis, floribus racemoſis. *Lin. ſuppl.* 247.
B. aeſtuans. *Mant.* 242.
Icon. *Mutis amer. v.* 1. *t.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 608.
Heiſse Befarie. W.
Habitat in Nova Granada. *Mutis.* ♄

Frutex *biorgyalis: Ramis teretiuſculis, patentibus.* Folia *ſaepius alterna, conferta obovata ſ. oblonga, obtuſa, integerrima, avenia, nitida, ſubtus tomentoſa.* Petioli *breviſſimi, planiuſculi.* Flores *axillares, pauci; terminales plurimi.* Pedunculi *racemoſi: Pedicellis teretibus, hirſutis.* Corollae *incarnatae.* Plantam *non ipſe vidi.* Mant.

Similis B. reſinoſae, altior. Folia *ſimilia B. reſinoſae, ſed lanceolata.* Pedunculi *racemoſi, pedicellis longitudine floris nec ut in B. reſinoſa brevioribus.* Suppl.

Befariae ſaporem peculiarem amarum habent. Affinitas cum Rhododendris. Suppl.

936. VATICA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 812.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Antherae* 15, ſeſſiles, 4-loculares.

1. VATICA *chinenſis.*

V. chinenſis. *Mant.* 242. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 36. *t.* 36. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 609.
Chineſiſche Vatica. W.
Habitat in China. ♄

Statura *accedit ad* Toberam *Kaempf. amoen.* 797. *aut Citrum.* Rami *ſtriati, ſ. angulati, ſubtomentoſi.* Folia *alterna, petiolata, cordato-ovata, integerrima, utrinque glabra, venoſa, alterne nervoſa, ſpithamaea, latitudine palmaria.* Flores *paniculati, praecipue terminales, magnitudine Citri.*

*937. GRANGERIA.

Juſſ. gen. ed. Uſt. 376.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Stamina* 15. *Drupa* ſubtriquetra. *Nux* triquetra oſſea monoſperma.

*1. GRANGERIA *borbonica.*

G. borbonica. *Lamarck. encyclop.* 3. *d.* 20. * *illuſt. gen. t.* 427.
Borboniſche Grangerie. W.
Habitat in inſula Borbonia. ħ
Arbor *magnitudine Quercus cortice albicante.* Folia *alterna petiolata ovata integerrima glabra venoſa.* Stipulae *binae ſubulatae.* Racemi *ſesquiunciales terminales et axillares.* Flores *parvi albi.* Lamarck. l. c.

938. GARCINIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 813.

Cal. 4-phyllus, inferus. *Petala* 4. *Bacca* 8-ſperma, coronata *Stigmate* peltato.

1. GARCINIA *Mangoſtana.*

G. foliis ovatis, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 182. *Mill. dict.*
Mangoſtans. *Garc. act. angl.* 431. *t.* 1. *Bont. jav.* 115.
Mangoſtana. *Rumph. amb.* 1. *p.* 132. *t.* 43.
Laurifolia javanenſis. *Bauh. pin.* 461. *Raj. hiſt.* 1662.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 687.
Wohlſchmeckende Mangoſtane. W.
Habitat in Iava. ħ

2. GARCINIA *celebica.*

G. foliis lanceolatis, pedunculis trifloris. *Sp. pl.* 635.
Mangoſtana celebica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 134. *t.* 44.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 689.
Celebiſche Mangoſtane. W.
Habitat in India. ħ

3. GARCINIA *Cambogia.*

G. foliis ellipticis acutis, floribus ſolitariis terminalibus ſubſeſſilibus. W.
Mangoſtana Cambogia. *Gaert. ſem.* 2. *p.* 106. *t.* 105.
Cambogia Gutta. *Sp. pl.* 728. *Amoen. acad.* 1. *p.* 402. *Fl. zeyl.* 195. *Mat. med.* 135. *Blackw. t.* 392.
Coddam-pulli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 41. *t.* 24.

Carcapuli. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 105. *Raj. hiſt.* 1661.
Carcapuli Acoſtae, fructu malo aureo ſimili. *Pluk. alm.* 81.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 5.
Guttabringende Mangoſtane. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

4. GARCINA *cornea.*

G. foliis lanceolatis aveniis, pedunculis unifloris cernuis. *Syſt. veg.* 368.
Lignum corneum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 55. *t.* 30.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 690.
Hornartige Mangoſtane. W.
Habitat in India. ♄

Obſ. Mangium ſylveſtre *Rumph. amb.* 3. *p.* 77. *t.* 30. *diſtincta ſpecies videtur.*

939. HALESIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 814.

Cal. 4-denatus, ſuperus. *Cor.* 4-fida. *Nux* 4-angularis, 2-ſperma.

1. HALESIA *tetraptera.*

H. foliis ovatis acuminatis, venis ſubtus piloſis, alis fructus aequalibus. *Willd. arb.* 137. *
H. foliis lanceolato-ovatis: petiolis glanduloſis. *Sp. pl.* 636. *Mill. dict. n.* 1.
H. foliis ovatis acuminatis argute ſerratis, fructu tetraptero. *Cavan. diſſ.* 6. *p.* 338. *t.* 186. *
H. fructibus membranaceo-quadrangulatis. *Ellis act. angl. v.* 51. *p.* 931. *t.* 22. *f. A.*
Frutex padi foliis ſerratis, floribus monopetalis albis campaniformibus, fructu craſſo tetragono. *Catesb. car.* 1. *p.* 64. *t.* 64.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 610.
Vierflüglige Haleſie. W.
Habitat in Carolina. ♄ (v. v.)

2. HALESIA *diptera.*

H. foliis oblongo-ovatis obtuſe acuminatis, utrinque viridibus, ſubtus molliſſimis, alis fructus alternatim majoribus. *Willd. arb.* 138. *
H. foliis ovatis: petiolis laevibus. *Sp. pl.* 636. *Mill. dict. n.* 2.
H. foliis ovatis acutis ſerratis, fructibus bialatis, pedunculis elongatis. *Cavan. diſſ.* 6. *p.* 338. *t.* 187. *
H. fructibus alatis. *Ellis act. angl. v.* 51. *t.* 931. *f. B.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. p. 611.
Zweyflüglige Haleſie.
Habitat in Carolina. *D. Garden.* ♄ (v. v.)

Folia *hujus ſextuplo majora praecedentis, nec ſubtus ſubtomentoſa.* Fructus *mucronatus alis duabus oppoſitis magnis; duabus minutis. Ordine naturali proxima Styraci.*

Nullas glandulas *in Haleſiae ſpecierum petiolis obſervavi. Differt haec ſecundum obſervationes meas a praecedente:* foliis *duplo majoribus, apice vix acuminatis, ſubtus tactu molliſſimis a pilis parvis nudo oculo inviſibilibus,* fructus *alis inaequalibus binis majoribus, mucrone fructus, qui eſt ſtylus perſiſtens, breviore obtuſo.* W.

940. DECUMARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 815.

Cal. 10-phyllus, ſuperus. *Petala* 10. *Capſ.* 8-ſ. 9-locularis polyſperma.

1. DECUMARIA *barbara.*

D. foliis omnibus ovatis, caule ſcandente. W.
Decumaria barbara. *Sp. pl.* 1663.
Tinus flore pleno. *Willich. obſ.* 1762. *p.* 40. *Schreb. Nov. Act. Upſal. vol.* 1. *p.* 87.
Cluſia foliis venoſis. *Fabric. helmſt.* 2. *p.* 293.
Cluſia minor. *Kniph. cent.* 2. *n.* 15.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3 *p.* 612.
Gemeine Decumarie. W.
Habitat in Carolina. ♄ (v. v.)

Rami *inconditi, geniculis nodoſis radicantes.* Folia *oppoſita, petiolata, obovata, coriacea, venoſa, verſus baſin remote ſerrata.* Stipulae *nullae.* Gemmae *pubeſcentes.* Panicula *corymboſa, terminalis.* Flores *Tiliae ſimiles, albidi, odoratiſſimi.* Calyx *dentibus* 8 *ſ.* 16, *ſuperus.* Fructus *in Europaeorum hortis ignotus. An dioica?*

Caulis *tri-ſ. quadripedalis ſcandens.* W.

*2. DECUMARIA *ſarmentoſa.*

D. foliis inferioribus rotundatis, ſuperioribus ovato-lanceolatis, caule ſarmentoſo. *Boſc in Act. hiſt. nat. Pariſ.* 1. *p.* 76. *t.* 4.

Forſythia (*ſcandens*) caule geniculato altiſſime ſcandente radicante, foliis ſimplicibus oppoſitis petiolatis acumi-

nato-ovatis apice dentatis, ſupra laevibus, pagina inferiore marginibus petiolisque ſubtomentoſis, floribus albis odoratis, bracteis ſubulatis in corymbis trichotomis terminalibus. *Walt. carol.* 154.
Kletternde Decumarie. W.
Habitat in Carolinae *uliginoſis.* ♄

*941. ARISTOTELIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 816.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Styl.* trifidus. *Bacca* trilocularis. *Sem.* bina.

*1. ARISTOTELIA *Macqui.*

A. Macqui *l'Herit ſtirp.* 1. *p.* 31. *t.* 16.* *Ait. kew.* 2. *p.* 146. *Willd. arb.* 27.*
Chiliſche Ariſtotelie. W.
Habitat in Chili. ♄ (v. v.)

Frutex *octopedalis ramoſus.* Folia *oppoſita ſempervirentia ovata nitida ſerrata trinervia venoſa.* Flores *albi in racemis axillaribus 2-ſ. 4-floris.* W.

942. CANELLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 817.

Cal. 3-lobus. *Petala* 5. *Antherae* 16, adnatae, *Nectario* urceolato. *Bacca* unilocularis 2-ſ. 4-ſperma.

1. CANELLA *alba.*

C. alba. *Murr. ſyſt. veg.* 443. *Swartz. obſ.* 190.* *Swartz. in Act. ſoc. Lin. Lond.* 1. *p.* 96. *t.* 8.*
Winterania Canella. *Sp. pl.* 2. 636. *Lin. ſuppl.* 247.
Winterania. *Hort. cliff.* 488. *Mat. med.* 119.
Winteranus cortex. *Blackw. t.* 206.
Laurus foliis enerviis obovatis obtuſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 371.
Canella foliis oblongis obtuſis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. *t.* 37. *f.* 3.
Pſeudo-Caſſia cinnamomea aromatica. *Bauh. pin.* 409.
Caſſia lignea jamaicenſis, laureolae foliis ſubcinereis cortice piperis modo acri. *Pluk. alm.* 89. *t.* 81. *f.* 1.
Caſſia cinnamomea ſ. Cinnamomum ſylveſtre barbadenſium. *Pluk. alm.* 89. *t.* 161. *f.* 7.
Arbor baccifera laurifolia aromatica, fructu viridi caly-

culato racemoſo. *Sloan. jam.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 87. *t.* 191. *f.* 2. *Catesb. carol.* 2. *p* 50. *t.* 50.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 691.
Weiſser Canellbaum. W.
Habitat in interioribus ſylvis Indiae *occidentalis.* ♄

943. CRATAEVA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 818.

Cor. 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

1. CRATAEVA *gynandra.*
C. inermis, foliis integerrimis, floribus gynandris. *Sp. pl.* 636. *Swartz. obſ.* 191. *
C. arborea triphylla, foliis ovatis glabris, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 246.
Anona trifolia, flore ſtamineo, fructu ſphaerico ferrugineo ſcabro minori, allii odore. *Sloan. cat.* 206. *hiſt* 2. *p.* 170. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 78.
Arbor americana triphylla, numeroſis ſtaminibus purpureis apicibus praeditis, floris umbilicum occupantibus. *Pluk. phyt.* 147. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 694.
Weſtindiſche Crataeve. W.
Habitat in Jamaicae *fruticetis aridis.* ♄
Differt a. *C. Tapia foliis tenuibus nec craſſis. Petalis lanceolatis nec ovatis; imprimis vero quod columna longitudine calycis attollat ſtamina, ut in Cleome gynandra. Piſtillum in meis non aderat.*

2. CRATAEVA *Tapia.*
C. foliolis ovatis acuminatis, petalis ovato-ſubrotundis obtuſis germinibus globoſis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 61. *
C. inermis, foliis integerrimis: foliolis lateralibus baſi antica brevioribus. *Sp. pl.* 637. *Mill. dict. n.* 1.
C. inermis. *Fl. zeyl.* 211. *Sp. pl.* 1. *p.* 444. *Hort. cliff.* 484.
Apioſcorodon ſ. Arbor americana triphyllos, allii odore, poma ferens. *Pluk. alm.* 34. *t.* 137. *f.* 7.
Malus americana trifolia, fructu pomi aurantii inſtar colorato. *Comm. hort.* 1. *p.* 129. *t.* 67.
Tapia arborea triphylla. *Plum. gen.* 22. *t.* 21. *R.*
Tapia *Marggr. braſ.* 89. *Piſ. braſ.* 68. *t.* 69. *R.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 694.

Spitzblättrige Crataeve. W.
Habitat in Indiis. ♄ (v. ſ.)

Flos *etiam in hac, ut in C. gynandra, eſt germine ſtipitato more Cleomes gynandrae.*

*3. CRATAEVA *obovata.*

C. foliis petalisque obovatis, germine oblongo. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 61. *

Stumpfblättrige Crataeve. W.
Habitat in Madagaſcar. ♄

An modo varietas C. Tapiae? vix credo, differt: figura *foliolorum et petalorum*, foliolis *baſi ſubaequalibus*, petalis *longius unguiculatis*, calycis *laciniis oblongis*, filamentis *longioribus*, germine *oblongo. Ceterum habitus reliquorum.* Vahl. l. c.

*4. CRATAEVA *religioſa*

C. foliolis petalisque lanceolato-ellipticis utrinque acutis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 62. *

C. (*religioſa*) inermis foliolis ſubaequalibus. *Forſt. prodr. n.* 203. *pl. eſcul.* 45 *

Niirvala. *Rheed. mal.* 3. *p.* 49. *t.* 42. *Raj. hiſt.* 1644.

Lanzettenblättrige Crataeve. W.
Habitat in India *orientali inque* Societatis *inſulis.* ♄

5. CRATAEVA *Marmelos.*

C. ſpinoſa, foliis ſerratis. *Fl. zeyl.* 212. *Mill. dict. n.* 2.

Cucurbitifera trifolia ſpinoſa medica, fructu pulpa cydonii aemula. *Pluk. alm.* 125. *t.* 170. *f.* 5.

Cydonia exotica. *Bauh. pin.* 425.

Bilanus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 197. *t.* 81.

Covalam. *Rheed. mal.* 3. *p.* 37. *t.* 37. *Burm. ind.* 109.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 696.

Dornige Crataeve. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

Calyx 5-*fidus.* Petala *nulla? Millero* 5. Stamina 60. An *diſtincti Generis?*

Folia *omnium ſpecierum ſunt ternata.* W.

944. TRIUMFETTA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 819.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* hiſpida, in 4 diſſiliens.

1. TRIUMFETTA *Lappula.*

T. foliis baſi emarginatis, floribus ecalyculatis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 327.

T. floribus calyce deſtitutis. *Jacq. amer* 146.
T. foliis baſi emarginatis. *Hort. cliff.* 210.* *Hort. upſ.* 148 *Roy. lugdb.* 476. *Mill. dict.*
T. fructu echinato racemoſo. *Plum. gen.* 50. *ic.* 255.
Lappula bermudenſis althaedoides ſpicata, fructu o bi-culari majore. *Pluk. alm.* 206. *t.* 245. *f.* 7.
Agrimonia lappacea inodora, folio ſubrotundo dentato. *Sloan. jam.* 9. *hiſt.* 1. *p.* 211. *Raj. ſuppl.* 247.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 5.
Kelchloſe Triumfette. W.
Habitat in Jamaica, Braſilia, Bermudis. ♄
Singulare *quod calyx nullus ſit.*

*2. TRIUMFETTA *glanduloſa.*

T. floribus completis, foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentoſo-incanis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 62.
Triumfetta glanduloſa. *Forſk. cat. arab. n.* 297.
Drüſige Triumfette. W.
Habitat in Arabia *felici*, India. ♄ (v. ſ.)
Rami *lignoſi teretes villoſi.* Folia *petiolata alterna frequentia tripollicaria, ſuperne verſus ſenſim minora, utrinque pilis ſtellatis molliter villoſa, ſupra viridiora, ſecundum nervos lineata, ſubtus incana ſerrata, ſerraturis infimis foliorum ſuperiorum glanduloſis, baſi integra.* Petioli *breves, e pilis ſtellatis villoſi.* Stipulae *ſubulatae.* Flores *ex alis foliorum ſuperiorum.* Germen *ſetis minutis tectum. A T. velutina differt:* foliis *duplo anguſtioribus extrorſum verſus non anguloſis, acutis nec acuminatis,* pilis *ſubtus magis diſtinctis,* ſtipulis *ſetaceo-ſubulatis.* Vahl. l. c.

3. TRIUMFETTA *Bartramia.*

T. foliis baſi integris indiviſis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 327.
Bartramia *Fl. zeyl.* 174. *Sp. pl.* 1. *p.* 389.
Lappula benghalenſis tetraſpermos, ribeſii folio, echinis orbiculatis ad foliorum ortum plurimis ſeſſilibus. *Pluk. alm.* 206. *t.* 41. *f.* 5.
Agrimonia maderaſpatana, folio rotundo ſingulari ſubtus incano. *Pet. gaz.* 31. *t.* 42. *f.* 10.
Lappago amboinica. *Rumph. amb.* 6. *p.* 59. *t.* 25. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 5.
Bartramiſche Triumfette. W.
Habitat in India. ☉ (v. ſ.)

*4. TRIUMFETTA *velutina.*

T. floribus completis, foliis ovatis ſubangulatis acuminatis, ſubtus tomentoſo-incanis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 62.*

Weichblättrige Triumfette. W.
Habitat in inſulae Mauritii.

*5. TRIUMFETTA *procumbens.*
T. foliis ſubrotundo-cordatis ſubtrilobis tomentoſis, caule procumbente. *Forſt. prodr. n.* 204.
Liegende Triumfette. W.
Habitat in Societatis *inſulis.*

*6. TRIUMFETTA *hirta.*
T. floribus completis, foliis trilobis, paniculae terminalis ramis dichotomis hirtis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 63.*
Rauhe Triumfette. W.
Habitat in St. Martham Americae. ♄
Folia *ſupra glabra ſeptemnervia, oculo armato pilis ſtellatis tecta.* Vahl. l. c.

7. TRIUMFETTA *ſemitriloba.*
T. foliis ſemitrilobis, floribus completis. *Mant.* 73.
T. fructibus calyculatis; foliis ſemitrilobis. *Iacq. amer.* 147.
T. villoſa, foliis inferioribus angulato-ovatis ſerrato-dentatis, floribus ternatis, faſciculis geminatis folio ſuboppoſitis. *Brown. jam.* 233.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 6.
Dreylappige Triumfette. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. ſ.)
Simillima *T. Lappulae, ſed* flores *calyce inſtructi.*

*8. TRIUMFETTA *grandiflora.*
T. foliis ſubcordato-ovatis integris ſerratis piloſiuſculis, floralibus lanceolatis, ramis hirtis, floribus completis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 34.*
Groſsblütige Triumfette. W.
Habitat in Montſerrat. ♄
A reliquis mihi notis ſpeciebus differt, corollis *duplo vel triplo majoribus.* Vahl. l. c.

*9. TRIUMFETTA *macrophylla.*
T. foliis ovato-cordatis integris inaequaliter ſerratis acuminatis tomentoſis baſi glandulosis, floribus completis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 34.*
Groſsblättrige Triumfette W.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Similis T. Lappulae, cum vero flores calyculati, nec ecalyculati ut in illa, diverſum eſſe credo. A T. rhombeaefolia tomentoſitate *et* figura *foliorum dignoſcitur.* Vahl. l. c.

*10. TRIUMFETTA *rhombeaefolia.*
T. foliis rhomboideis, ſummis lanceolato-ovatis, floribus completis. *Swartz. prod.* 76. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 863. *
T. (*rhomboidea*) floribus calyculatis, foliis rhombeo-ovatis. *Iacq. amer.* 147. *t.* 90. *
Rauthenförmige Triumfette. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄

11. TRIUMFETTA *annua.*
T. foliis ovatis indiviſis, rarius lobatis. *Mant.* 73.
T. foliis oblongo-ovatis obtuſis ſerratis, petiolis longiſſimis. *Mill. ic.* 199. *t.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 7.
Jährige Triumfette. W.
Habitat in India *orientali.* ⊙

*945. EURYA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 820.

Cal. duplex, exterior 2-phyllus, interior 5-phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* 5-locul. polyſperma.

*1. EURYA *japonica.*
E. japonica. *Thunb. jap.* 191. *t.* 25. *
Fiſakaki. *Koempf. am. exot.* 5. *p.* 778.
Japaniſcher Weitaſt. W.
Habitat in Iaponiae *montibus.* ♄
Folia *alterna petiolata oblonga acuminata emarginata ſempervirentia glabra venoſa reticulata dentata, baſi integerrima attenuata.* Flores *parvi bini pedunculati cernui axillares petiolo breviores.* W.

946. PEGANUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 821.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, ſ. o. *Capſ.* 5-locularis, 3-valvis, polyſperma.

1. PEGANUM *Harmala.*
P. foliis multifidis, caule herbaceo. W.
P. foliis multifidis. *Hort. upſ.* 144. *Gron. orient.* 165. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 177. *n.* 96. *Fabric. helm. p.* 228. *Willich. obſ. n.* 50. *Mill. dict. n.* 1. *Giſecke ic. faſc.* 1. *n.* 11. *Blackw. t.* 310.

Peganum. *Hort. cliff.* 206. *Hort. upſ.* 1 *Roy. lugdb.* 461.
Ruta ſylveſtris, flore magno albo. *Bauh. pin.* 336.
Harmala. *Dod. pempt.* 121.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 613.
Gemeine Harmala. W.
Habitat in arena Madriti, Alexandriae, Cappadociae, Galatiae, Sibiriae. ♃ (v. v.)
Petala 5. Stam. 15. *Fabric. l. c.* R.
Calycis *foliola baſi utrinque dente ſubulato inſtructa.* W.

*2. PEGANUM *crithmifolium.*

P. foliis multifidis, caule fruteſcente. *Retz. obſ. p.* 34.
Bacillenblättrige Harmala. W.
Habitat ad mare Caſpium ♄
Similis P. Harmalae, ſed: caulis 3-4-*pedalis perennans ſempervirens*, Flores *minores*, Calyx *ſimplex flore brevior. In P. Harmala eſt* caulis *annuus herbaceus vix ſesquipedalis*, flores *majores*, calycis *foliola diviſa corolla longiora.* Retz. l. c.

*3. PEGANUM *retuſum.*

P. foliis cuneiformibus, caule fruticoſo. *Vahl.* 3. *p.* 63 *
P. (*retuſum*) foliis ſubcarnoſis ſeſſilibus cuneiformibus retuſis. *Forſk. deſcr.* 211.
Keilblättrige Harmala. W.
Habitat in Aegypto. ♄

4. PEGANUM *dauricum.*

P. foliis oblongis acutis, caule herbaceo. W.
P. foliis indiviſis. *Sp. pl.* 638.
Ruta foliis ſimplicibus alternis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 176. *t.* 68. *f.* 1.
Harmala montana daurica perennis multicaulis, polygalae folio, flore albo. *Amm. ruth.* 91.
β. Harmala montana, polygalae foliis, floribus luteis. *Amm. ruth.* 92.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 13. *p.* 614.
Flachsblättrige Harmala. W.
Habitat in Sibiria. ♃

947. HUDSONIA.

Gen. pl. ed. chreb. n. 822.

Cor. 5-petala. *Cal.* 3-phyllus, tubuloſus. *Stam.* 15. *Capſ.* 1-locularis, 3-valvis, 3-ſperma.

1. HUDSONIA *ericoides.*

H. ericoides. *Mant.* 74. *Berg. act. holm.* 1778. *p.* 18. *t.* 2.*

Ericaeformis ſuffrutex virginianus, floribus exiguis, vaſculo ſeminali oblongo trifariam diviſo. *Pluk. mant.* 88.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 615.

Heidekrautartige Hudſonie. W.

Habitat in Virginia. ♄

Frutex *facie et habitu Ericae.* Ramuli *filiformes, ſparſi, imbricati.* Foliis *ſubulato-aceroſis, hirſutis; tenellis hirſutioribus, incanis, unde quaſi adſperſi gemmis foliaceis, quae ultimi ramuli.* Pedunculi (*e gemmis foliorum*) *ſolitarii, filiformes, foliis longiores.* Calyx *erectus, pubeſcens.*

948. NITRARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 823.

Cor. 5-petala, petalis apice fornicatis. *Cal.* 5-fidus. *Stam.* 15. *Drupa* 1-ſperma.

1. NITRARIA *Schoberi.*

N. foliis integerrimis obtuſis. W.

Nitraria. *Act. nov. petrop.* 7. *p.* 315. *t.* 10. *Murray. prodr.* 191. *f.* 2. *Pall. it.* 1. *p.* 384. *Lerche in Nov. Act. A. N. C. tom.* 5. *app, p.* 162. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 80. *t.* 50. *f. A.**

Oſyris foliis obtuſis. *Hort. upſ.* 295. *Gmel. ſibir.* 2. *p.* 237. *t.* 98.

Caſia fructu nigro. *Amm. ruth.* 256.

β. foliis latioribus, baccis rubris, nuce conica et caule inermi. W.

O. Schoberi. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 79. *t.* 50. *f. B.**

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 616.

Ganzblättriger Salpeterſtrauch. W.

Habitat in campis ſalſis Sibiriae *inter* Irtim *et* Ob *flu-*

vios, ad lacus ſalſos circa Jeniſeam *fluvium; β. vero ad mare* Caſpium. ♄

Stamina 15. *Murray l. c.*

Varietas β. eſt forte ſpecies diſtincta; hinc ulterius examinanda. W.

2. NITRARIA *tridentata.*

N. foliis apice tridentatis. W.

N. (*tridentata*) ramis ſpinoſis, foliis carnoſis. *Desfont. in Uſteri Annal.* 16. *p.* 101.

Nitrariae Schoberi varietas. *Pall. roſſ. p.* 80. *t.* 50. *f. C.?*

Dreyzähniger Salpeterſtrauch. W.

Habitat in maritimis regni Tunetani. ♄

949. PORTULACA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 824.

Cor. 5-petala. *Cal.* 2-fidus. *Capſ.* 1-locularis, circumſciſſa.

1. PORTULACA *oleracea.*

P. foliis cuneiformibus, floribus ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Gron. virg.* 59. *Hort. upſ.* 147. *Mat. med. p.* 119. *Dalib. par.* 168. *Sauv. monſp.* 168. *Brown. jam.* 233. *Scop. carn. n.* 564. *Pollich. pal. n.* 449. *Blackw t.* 287. *Hoffm. germ.* 161. *Roth. germ. I.* 202. *II.* 518.

P. foliis dilatatis laevibus, ſeſſilibus, confertis. *Hall. helv. n.* 968.

P. foliis cuneiformibus verticillatis ſeſſilibus, floribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 207.

P. anguſtifolia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 288.

P. ſylveſtris. *Matth. epit.* 258. R.

P. ſylveſtris minor. ſ. ſpontanea. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 678. R.

β. Portulaca latifolia ſativa. *Bauh. pin.* 288.

P. domeſtica. *Lob. ic.* 388.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 8.

Gemeiner Portulac. W.

Habitat in Europa, India, *Inſ.* Aſcenſionis, America. ⊙ (v. v.)

Capſula *circumſciſſa.* Horologi florae vigilias 11-12 habet.

Piſtilla *quinque habere. Haller. Scop.* Stamina 8 *ad*

15. *Haller.* Stamina 6 *ad* 12 *et plura. Stigma* 4-*partitum. Gmel. it.* 3. *p.* 395, R.

2. PORTULACA *piloſa.*

P. foliis ſubulatis alternis: axillis piloſis, floribus ſeſſilibus terminalibus. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 4. *n.* 64.

P. foliis lienearibus acutis, caule procumbente piloſo. *Roy. lugdb.* 473.

P. curaſſavica, anguſto longo lucidoque folio, procumbens. *Comm. hort.* 1. *p.* 9. *t.* 5.

P. curaſſavica lanuginoſa procumbens. *Herm. par.* 215. *t.* 215.

P. lanuginoſa procumbens, vermiculatae foliis americana. *Pluk. alm.* 304. *t.* 247. *f.* 7. *Volk. norib.* 341. *t.* 341.

Anacampſeros ſupina minor, foliis lineraribus turgidis, floribus ſummis ramulis confertis. *Brown. jam.* 234.

β. P. curaſſavica lanuginoſa, pſylii folio, erectior et elatior, flore dilutius rubente. *Herm. par.* 214. *t.* 214.

P. curaſſavica lanuginoſa, kali folio, erectior et elatior. *Pluk. alm.* 303. *t.* 105. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 9.

Haariger Portulac. W.

Habitat in America *meridionali.* ⊙ (v.v.)

Folia *alterna, ſed terminalia ſ. floralia octo in orbem digeſta.* Flores *ſeſſiles, terminales, calyce bifido;* Staminibus *quindecim;* Stylo *quinquefido,* Capſula *circumſciſſa.*

3. PORTULACA *quadrifida.*

P. bracteis quaternis, floribus quadrifidis, caule geniculis piloſis. *Mant.* 73. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 356. *t.* 17. *f.* 4. *

P. linifolia. *Forſk. aegypt. p.* 92. R.

P. lanuginoſa procumbens, flore luteo. *Herm. par.* 216.

Sedum minus arabicum, flore luteo, foliis planis mucronatis. *Pluk. mant.* 169.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 10.

Viertheiliger Portulac. W.

Habitat in Aegypto. ⊙

Radix *fibroſa.* Caules *proſtrati, numeroſi, oleracei, teretes, laeves, alterni, ramoſi, ſemipedales, geniculis radicantibus piloſis.* Folia *oppoſita, patentia, diſtantia, ovato-lanceolata, carnoſa, laevia, ſeſſilia integerrima, ſubtus concava, adſperſa micis diapha-*

nis. Petioli *florentes terminales, adulti laterales facti, uniflori, ſuperne incraſſati, longitudine foliorum, terminati.* Bracteis *quaternis ſ. cruciatis, patentibus foliis ſimilibus.* Flos *ſeſſilis, flavus, cinctus pilis albis, ut genicula.* Perianthium *bivalve, membranaceum, ovatum.* Corolla 4-*partita, ovato-oblonga, marceſcens.* Filamenta 8, *ſetacea, baſi extrorſum curvata, longitudine corollae.* Antherae *ſubrotundae.* Piſtillum: *Germen inferum, rotundatum:* Stylus *cylindricus, ſuperne craſſior, longitudine ſtaminum.* Stigmata 4. *oblonga obtuſa, recurvata, pubeſcentia.* Capſula *ovata, leviter tetragona, acutiuſcula, unilocularis, circumſciſſa.* Semina *plura, ſubrotunda, muricata.* H. V.

4. PORTULACA *halimoides.*

P. foliis oblongis carnoſis, caule corymboſo, floribus ſeſſilibus. *Sp. pl.* 639.

P. erecta, ſedi minoris facie, capitulo tomentoſo. *Sloan. jam.* 88. *hiſt.* 1. *p.* 205. *t.* 129. *f.* 3.

Halimus minimus, foliis oblongis ſucculentis tumentibus, ſummis ramulis denſiſſime ſitis. *Brown. jam.* 206.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 10.

Meldenartiger Portulac. W.

Habitat in Iamaica. ⊙

Calyx *diphyllus.* Capſula *circumſciſſa.*

5. PORTULACA *meridiana.*

P. foliis ellipticis carnoſis planis, geniculis piloſis, floribus ſeſſilibus terminalibus. *Lin. ſuppl.* 248.

Mittagblütiger Portulac. W.

Habitat in India *orientali.* ⊙ (v. v.) H. U.

Caules *ſtatura Sedi acris filiformes herbacei repentes articulati teretes laxi rubentes.* Genicula *pilis aliquot adſperſa radicantia.* Folia *elliptico-lanceolata laevia ſubcarnoſa terminalia oppoſita etiam quaterna.* Flores *lutei terminales ſolitarii ſeſſiles, cincti lana foliisque quatuor.* Calyx *bivalvis tenerrimus, foliolis ovatis acutis rubicundis.* Stamina 4-8 *numero inconſtantia. Floret hora duodecima per diem.*

Genus novum ex hac conſtituit b. m. Parens et Meridianam *vocavit; at differentia non tanta mihi viſa, quin cum Portulaca combinari poſſet, conſentiente affinitate. Polymorphum valde eſt Portulacae genus quoad fructificationem et numerum partium ſi itaque una ſepararetur ſpecies, ſeparandae etiam plures.*

*950 TALINUM.

Juſſ. gen. ed. Uſt. p. 346.

Cor. 5-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 3-valvis polyſperma. *Semina* arillata.

1. TALINUM *triangulare.*

T. foliis planis canaliculatis cuneiformibus emarginatis mucronatis, racemo ſimplici pedunculo triquetro. W.
Rülingia (*triangularis*) foliis obovatis planiuſculis, racemo ſimplici, pedunculo triquetro. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 134.
Portulaca (*racemoſa*) foliis obovatis planiuſculis, racemo ſimplici triquetro. *Sp. pl.* 2. *p.* 640.
Portulaca (*triangularis*) pedunculis multifloris, triangularibus, *Iacq. amer.* 147. *obſ.* 1. *p.* 35. *t.* 23.
Chamaeciſtus americana, portulacae folio, flore albo. *Herm. parad.* 21.
Helianthemum fruteſcens, portulacae folio. *Plum. ſpec.* 7. *t.* 150. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 11.
Dreyeckiges Talinum. W.
Habitat in America *ad maris littora.* ♄
Calyx *diphyllus.* Capſ. *trivalvis.*

*2. TALINUM *craſſifolium.*

T. foliis planis obovatis mucronatis, corymbo elongato, pedunculis triquetris. W.
Portulaca (*craſſifolia*) foliis lanceolatis planis, racemis triquetris caule erecto. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 466 *Iacq. hort.* 3. *t.* 52.
Dickblättriges Talinum. W
Habitat - - - - ♄ (v. v.)
Simile praecedenti, differt foliis *longioribus latioribus non emarginatis,* floribus *in corymbo paucifloro (nec in racemo ſimplici) collectis,* corollis *rubris nec flavis,* caule *erecto nec decumbente. Ceterum* calyx *eſt diphyllus et* capſula *trivalvis.* W.

3. TALINUM *Anacampſeros.*

T. foliis ovatis ſubtus convexo-gibbis, racemo ſimplici, pedunculo tereti. W.
Rülingia (*Anacampſeros*) foliis ovatis gibbis, racemo ſimplici, pedunculo tereti. *Ehrh. Beit.* 3. *p.* 133.
Portulaca (*Anacampſeros*) foliis ovatis gibbis pedunculo multifloro, caule fruticoſo. *Mill. dict. n.* 3.

Anacampſeros foliis ovatis convexis acutiuſculis. *Hort. upſ.* 146.
Anacampſeros foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 207. *Roy. lugdb.* 412.
Telephiaſtrum folio globoſo. *Dill. elth.* 375. *t.* 281. *f.* 363.
Portulaca africana ſempervirens, flore rubicundo. *Comm. hort.* 2. *p.* 177. *t.* 89. *Raj. ſuppl.* 507.
Oxalis affinis planta aphylla mammillaris. *Burm. afr.* 76. *t.* 30. *f.* 2. *vitiata.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 12.
Nabelkrautartiges Talinum. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Axillae foliorum piloſae ſunt, et Folia ſucculenta conjungunt hanc cum Portulacis, quamvis ſtamina plurima et Capſula trivalvis. Calyx diphyllus eſt.

4. TALINUM *patens.*

T. foliis ovatis planis, panicula terminali, pedunculis dichotomis. W.
Bülingia (*patens*) foliis lanceolato-ovatis planis, panicula ramoſa. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 135.
Portulaca (*patens*) foliis lanceolato-ovatis planis, panicula ramoſa, calycibus diphyllis. *Jacq. hort. t.* 151.
P. (*paniculata*) floribus paniculatis. *Jacq. amer.* 148.
β. Talinum (*reflexum*) foliis lanceolato-ovatis ſeſſilibus oppoſitis, florum panicula ramoſa. *Cavan. ic.* 1. *p.* 1. *t.* 1.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 12.
Riſpenblütiges Talinum. W.
Habitat in America. ♄ (v. v.)

Caulis *pedalis, flexilis:* Ramis *alternis, laevibus, tetragonis; inferioribus longioribus.* Folia *alterna, ſubpetiolata, lanceolato-ovata, ſubſucculenta, ſemipollicaria, integerrima, carinata fragilia.* Panicula *terminalis, elongata; pedicellis filiformibus, dichotomis.* Calyx *diphyllus, ruber.* Petala 5, *ovata, rubra.* Antherae *luteae.* Styli 3. Capſula *globoſa,* 1-*locularis,* 3-*valvis: valvulis duplicatis.* Semina *plura, nigra.*

Diſtincta *omnino a T.* fruticoſo, *cui flores albi et calyx* 5-*phyllus.*

In varietate α. caulis *eſt perennis, et* petala *rubra, in* β. *vero* caulis *eſt annuus et* petala *flava an varietates?* W.

*5 TALINUM *cuneifolium.*

T. foliis cuneiformibus, panicula terminalis, pedunculis trifloris. W.

Portulaca (*cuneifolia*) foliis cuneiformibus planis, pedunculis inferioribus racemi trifloris, calycibus diphyllis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 33.

Orygia (*portulacifolia*) foliis alternis cuneatis glabris. *Forſk. deſcr.* 103 *

Keilblättriges Talinum. W.

Habitat in Arabia *felici.* ♄

Affinis T. patenti, dignoſcitur ab illo, pedunculis *craſſioribus, inferioribus apice* floribus *ternis pedicellatis.* Vahl. l. c.

Calyx *diphyllus.* Corolla *violaceo-rubra.* Capſula *trivalvis.* W.

*6. TALINUM *decumbens.*

T. foliis obovatis planis mucronatis, racemis axillaribus, calycibus pentaphyllis, caule decumbente. W.

Portulaca (*decumbens*) foliis obovatis mucronatis, calycibus pentaphyllis, caule fruticoſo decumbente. *Vahl. ſymb.* 1 *p.* 33. *

Orygia (*decumbens*) caule decumbente fruticoſo, foliis ovatis acutis ſubfarinoſis. *Forſk. deſcr.* 103. *

Liegendes Talinum. W.

Habitat in Arabia *felici.* ♄

Calyx *pentaphyllus.* Corolla *polypetala rubro-violacea.* Capſula *quinquevalvis.* W.

7. TALINUM *fruticoſum.*

T. foliis obovatis planis emarginatis, corymbo terminali, calycibus pentaphyllis, caule erecto. W.

Portulaca (*fruticoſa*) foliis obovatis, planiuſculis, pedunculis racemoſis, calycibus pentaphyllis, caule fruticoſo. *Syſt. Veg. p.* 371.

P. (*paniculata*) foliis ovatis planis, panicula racemoſa, *Spec. pl.* 2. *p.* 640. *

P. americana latifolia erecta, floribus albis. *Comm. hort.* 1. *p.* 7. *t.* 4.

Portulacae facie maritima fruticoſa erecta americana. *Sloan. jam.* 87. *hiſt.* 1. *p.* 205.

Anacampſeros foliis radicalibus mollibus ovatis glabris, ſcapo aſſurgenti paniculato. *Brown. jam.* 234.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 13.

Strauchartiges Talinum. W.

Habitat in Americae *maritimis.* ♄
Calyx pentaphyllus. Capſula trivalvis. Flores *albi.*

951. LYTHRUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 825.

Cal. 12-dentatus. *Petala* 6, calyci inſerta. *Capſ.* 2-locularis, polyſperma.

1. LYTHRUM *Salicaria.*

L. foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 565. *Pollich. pal. n.* 450. *Blackw. t.* 520. *Flor. dan. t.* 671. *Kniph. cent.* 5. *n.* 55. *Hoffm. germ.* 162. *Roth. germ. I.* 203. *II.* 510.

L. foliis oppoſitis. *Hort. cliff.* 178. *Fl. ſuec.* 393; 422. *Roy. lugdb.* 458. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 122.

L. foliis verticillatis. *Fl. lapp.* 197.

Salicaria foliis lanceolatis, ſubhirſutis, floribus ſpicatis. *Hall. helv. n.* 854.

Lyſimachia ſpicata purpurea. *Bauh. pin.* 246.

Lyſimachia purpurea communis major. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 51.

β. Blattaria rubra ſpicata major, folio ſubrotundo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 490. *ſ.* 5. *t.* 10. *f.* 11.

γ. Lyſimachia trifolia ſpicata purpurea. *Bocc. muſ.* 167.

δ. Lyſimachia quadrifolia purpurea, mollioribus et longioribus foliis. *Bocc. muſ.* 167.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 14.

Gemeiner Weiderich. W.

Habitat in Europa *ad ripas aquarum.* ♃ (v. v.)
Folia *terna, quaterna rarius. Pollich. l. c.*

2. LITHRUM *virgatum*

L. foliis oppoſitis lanceolatis, panicula virgata, floribus dodecandris ternis. *Sp. pl.* 642, *Gmel. ſib.* 4. *p.* 175. *Hoffm. germ.* 162.

L. (*auſtriacum*) foliis oppoſitis lineari-lanceolatis ſubſeſſilibus nitidis. *Iacq. vind.* 243. *auſt. t.* 7.

Salicaria glabra ramoſiſſima, longiſſimis et anguſtiſſimis foliis. *Amm. ruth.* 89.

Salicaria glabra, longioribus et anguſtioribus foliis. *Amm. ruth.* 88.

Lyſimachia rubra non ſiliquoſa. *Bauh. pin.* 246.

Lyſimachia rubra 2. ſ. minor. *Cluſ. hiſt. p.* 51.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 15.
Ruthenförmiger Weiderich. W.
Habitat in Auſtria, Sibiria, Tartaria. ♃ (v. ſ.)

Caulis *paniculatus, ramis alternis, longis.* Flores 2. ſ. 3. *pedicellati, ex ſingula ala alterna racemi.* Variat *rarius foliis alternis.*

*3. LYTHRUM *acuminatum.* W.

L. foliis oppoſitis lanceolato-acuminatis, racemo elongato, pedunculis ſolitariis. W.
Salicaria orientalis ſalicis folio acutiſſimo et glabro. *Tournef. cor.* 18.
Langſpitziger Weiderich. W.
Habitat in Iberia. ♃. (v. ſ.)

Caulis *bipedalis erectus ramo uno alterove inſtructus.* Folia *oppoſita ſeſſilia lanceolata baſi attenuata, apice valde acuminata glabra, margine ſcabra integerrima, parum venoſa; intermedia majora bipollicaria et ultra.* Folia *floralia lineari-lanceolata, ſumma ſubulata calyce breviora.* Flores *pedunculati axillares oppoſiti ſolitarii, in ſummo caule interdum bini.* Calyx *cylindraceo-clavatus ſtriatus* 12 *breviſſime dentatus.* Petala *ſex lanceolata acuta.* Stamina *longitudine corolla.* Caulis *ſumma pars ob folia floralia anguſtiſſima minuta format racemum ſemipedalem elongatum tenuem.* W.

Diverſiſſima a praecedente, licet habitu quemadmodum conveniat: foliis *longioribus magis acuminatis margine ſcabris*, floribus *anguſtiſſimis*, pedunculis *ſolitariis*, calycibus *anguſtioribus*, petalisque *lanceolatis. W.*

4. LYTHRUM *triflorum.*

L. glaberrimum, foliis oppoſitis ſubſeſſilibus lanceolatis integris, pedunculis axillaribus oppoſitis, capitulo trifloro. *Lin. ſuppl.* 249.
Dreyblumiger Weiderich. W.
Habitat in America. ♃.

A reliquis facile diſtinguitur: pedunculis *filiformibus terminatis,* bracteis *binis lanceolatis canaliculatis patentibus flore longioribus, inter quas* flores *tres aequales brevius pedicellati coerulei parvi.*

5. LYTHRUM *verticillatum.*

L. foliis oppoſitis ſubtomentoſis ſubpetiolatis, floribus verticillatis lateralibus. *Sp. pl.* 641. *Mill. dict. n.* 6.

L. foliis oppoſitis, floribus verticillatis. *Gron. virg.* 52.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 16.
Wirtelblütiger Weiderich. W.
Habitat in Virginia.
Pedunculi *multiflori, breviſſimi.*

6. LYTHRUM *petiolatum.*
L. foliis oppoſitis linearibus petiolatis, floribus dodecandris. *Sp. pl.* 641. *Mill. dict. n.* 7.
Lythrum foliis petiolatis. *Gron virg.* 52.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 17.
Geſtielter Weiderich. W.
Habitat in Virginia.

7. LYTHRUM *racemoſum.*
L. diffuſum, foliis oppoſitis petiolatis ovatis, racemis terminalibus, floribus oppoſitis. *Lin. ſuppl.* 250.
Traubenblütiger Weiderich. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ *Mutis.*
Planta *ſuffruticoſa diffuſa.* Folia *ovata integerrima venoſa.* Racemi *ex dichotomia ſ. terminales longi.* Flores *remoti per paria oppoſiti, longi, pedicellati erecti bracteati.* Bracteae *ovatae.* Apices *ramulorum,* Calyces *et* Pedicelli *piloſo-viſcidi.*

*8. LYTHRUM *ciliatum.*
L. foliis oppoſitis petiolatis ovatis glabris margine ciliatis, racemis terminalibus, floribus ſubſecundis decandris. *Swartz prodr.* 76. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 868. *
Gefranzter Weiderich. W.
Habitat in montibus altis petroſis Jamaicae auſtralis. ♄ (v. ſ.)
Proximum L. racemoſo, ſed differt: foliis *ciliatis,* floribus *racemoſis, breviter pedunculatis ebracteatis ſubſecundis.* Swartz l. c.

9. LYTHRUM *Pemphis.*
L. fruticoſum hirſutum, foliis oppoſitis oblongis integris, floribus axillaribus pedunculatis ſolitariis, capſula circumſciſſa uniloculari. *Lin. ſuppl.* 249. *Forſt. prodr. n.* 205.
Pemphis acidula. *Forſt. gen. n.* 34. *t.* 34.
Mangium porcellanicum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 126. *t.* 84.
Strauchartiger Weiderich. W.
Habitat ad littora maris inſularum Zeylonae *et* Teauteae. ♄

C 2

Frutex *canus.* Folia *approximata in ſummitate ramorum.* Calyx 12-*dentatus, denticulis inaequalibus.* Petala 6 *calyci inſerta alba.* Stamina 12. Capſula *turbinata unilocularis circumſciſſa.*

Genus videtur diverſum ob fructum unilocularem circumſciſſum, ſed ſi una valeret differentia ad genus ſeparandum, nimis multiplicarentur genera: Botanicus, quantum permittat differentia generica, genera naturalia ſeparare non debet.

10. LYTHRUM *dipetalum.*

L. hiſpido-viſcoſum, foliis ternis ſ. oppoſitis ſeſſilibus ovatis, floribus axillaribus nutantibus dipetalis. *Lin. ſuppl.* 250.

Zweyblättriger Weiderich. W.

Habitat in America. *Mutis.* ♄

Frutex *hiſpido-viſcoſus fuſcus.* Rami *alterni.* Folia *ſeſſilia ovato-oblonga integerrima, utrinque hiſpiditate ſcaberrima, ſupra ſplendentia; inferiora verticillata, quarterna, terna; ramulorum oppoſita.* Flores *axillares pedicellati nutantes.* Calyx *linearis hiſpidus viſcoſus.* Petala *bina majora, margini ſuperiori calycis inſerta erecta obovata violacea ſ. coerulea. Floribus ſpecioſa et diſtincta planta.*

11. LYTHRUM *lineare.*

L. foliis oppoſitis linearibus; floribus oppoſitis hexandris. *Sp. pl.* 641. *Mill. dict. n.* 8.

L. foliis linearibus, floribus hexandris ſolitariis. *Gron. virg.* 162.

Habitat in Virginia.

Caulis *filiformis erectus angulatus,* Foliis *oppoſitis linearibus, terminatus* Spica *majore et duabus lateralibus minoribus compoſitis ex floribus oppoſitis remotis, ſub ſingulis folium.* Facies *L. Hyſſopifoliae.*

12. LYTHRUM *Parſonſia.*

L. foliis oppoſitis ovalibus, floribus ſeſſilibus alternis hexandris, caule diffuſo. *Sp. pl.* 641. *Swartz obſ.* 193.*

Parſonſia herbacea, foliis ovatis oppoſitis, floribus ſingularibus foliis ad alterum latus interpoſitis. *Brown. jam.* 199. *t.* 21. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 18.

Ausgebreiteter Weiderich. W.

Habitat in Jamaicae *et* Hiſpaniolae *aridis.* ♃

Caules *proſtrati.* Folia *ſubſeſſilia, nuda, integerrima, trinervia.* Racemi *alterni.* Flores *ſolitarii, alterni, ſeſſiles.*

13. LYTHRUM *Melanium.*

L. foliis oppoſitis ovatis, floribus alternis ſubdecandris, caule proſtrato. *Sp. pl.* 641. *Swartz obſ.* 193.*

Melanium herbaceum reclinatum, foliis ovatis oppoſitis, floribus ſingularibus ad alas alternas. *Brown. jam.* 217.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 18.

Liegender Weiderich. W.

Habitat in Jamaica. ♃

*14. LYTHRUM *cordifolium.*

L. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus cordatis acutis ſcabris, racemis terminalibus axillaribusque, floribus decandris. *Swartz prodr.* 76. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 866. *

Herzblättriger Weiderich. W.

Habitat in Domingo *in ſylvis interioribus.* ♄

15. LYTHRUM *Hyſſopifolia.*

L. foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Hort. upſ.* 118. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 566. *Iacq. auſtr. t.* 133. *Scholl. barb. n.* 372. *Pollich. pal. n.* 451 *Hoffm. germ.* 162. *Roth. germ. I.* 203. *II.* 520.

L. foliis alternis. *Hort. cliff.* 178. *Sauv. monſp.* 53. *Roy lugdb.* 458 *Gort. gelr.* 271.

Salicaria foliis linearibus, floribus in alis ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 855. R.

Salicaria hyſſopi folio latiore. *Hall. Rupp. jen.* 147. *t.* 6. *f.* 3.

Hyſſopifolia. *Bauh. pin.* 218.

β. Lyſimachia linifolia purpureo-caerulea. *Bauh. pin.* 246.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 19.

Iſopblättriger Weiderich. W.

Habitat in Germaniae, Helvetiae, Angliae, Galliae *inundatis.* ⊙ (v. v.)

Caules *proſtrati, rigiduli, ramoſi, virgati.* Folia *alterna, ſeſſilia, lineari-lanceolata, obtuſa, integerrima.* Flores *axillares, ſolitarii.* Calyx *tubuloſus dentibus* 5 *ſ.* 6, *patulis.* Petala 6, *purpurea, baſi alba.* Stamina 6, *calyce breviora.*

16. LYTRHUM *Thymifolia.*

L. foliis alternis linearibus, flo... ..us tetrapetalis. *Sp. pl.* 642. *Lerche in nov. Act. A. N. C. V. app.* 186. *Hoff. germ.* 162.

L. foliis linearibus. *Sauv. monſp.* 49.

Pentagloſſum linifolium. *Forſk. aegypt. p.* 11.

Salicaria minima tenuifolia. *Tournef. inſt.* 254.

Salicaria hyſſopi folio anguſtiore. *Buxb. hal.* 290.*

Hyſſopifolia minor ſ. potius thymifolia maritima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 792.

Polygonum aquaticum minus. *Barr. ic.* 773. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 19.

Thymianblättriger Weiderich. W.

Habitat in Italiae et G. Narbonenſis *vliginoſis, in* Hircania. *Lerche.* ⊙ (v. v.)

Petala 4, *ſtamina* 2, *calyx* 4-*dentatus.* Folia *lineari-lanceolata, alterna, ima oppoſita.* Flores *ſolitarii, axillares, ſeſſiles.* Calyx *ſtipulis* 2 *lateralibus fulcitus.* Caulis *erectus.*

Forte ſola praecedentis varietas? W.

*952. CUPHEA.

Iacq. hort. 2. *p.* 83.

Cal. 6 dentatus inaequalis. *Petala* 6 inaequalia calyci inſerta. *Capſ.* 1-locularis; conceptaculo triquetro.

1. CUPHEA *viſcoſiſſima.*

C. viscoſiſſima. *Iacq. hort.* 2. *p.* 83. *t.* 177. *Roth. beytr.* 1. *p.* 124. *Ait. Kew.* 2. *p.* 129.

Balſamona Pinto. *Vandell. faſc. p.* 15. *t.* 3.

Lythrum (*Cuphea*) foliis oppoſitis ovato-oblongis ſcabriuſculis, floribus dodecandris. *Lin. ſuppl.* 249.

Klebrige Cuphea. W.

Habitat in Braſiliae *umbroſis humentibus.* ⊙ (v. v.)

Radix *fibroſa annua.* Caulis *herbaceus teres erectus pedalis pubeſcenti-viſcidus purpuraſcens.* Rami *alterni ſimplices.* Folia *oppoſita petiolata ovato-oblonga integerrima laevia.* Flores *purpurei laterales, breviſſime pedunculati ſolitarii decumbentes.* Calyx *monophyllus cylindricus* 12 *ſtriatus,* 6 *dentatus, dente ſuperiore latiore, baſi ſuperiore producta, pubeſcenti-viſcidus.* Corolla 6 *petala, petalis calycis fauci inſer-*

tis, ſuperioris lateris duobus majuſculis. Nectarium *ſquamula reflexa intra gibbum calycis.* Stamina 12, *in fauce calycis.* Capſula *oblongiuſcula unilocularis.* Semina *plura lentiformia tandum nigra.* Capſula *una cum calyce ante maturitatem longitudinaliter rumpitur et exit adſcenditque* receptaculum *ſeminum cum immaturis ſeminibus a latere interiori, ut nuda matureſcant, more Phrymae.*

953. GINORIA

Gen. plant. edit. Schreb. n. 826.

Cal. 6-fidus. *Petala* 6. *Capſ.* 1-locularis, 4-valvis, colorata, polyſperma.

1. GINORIA *americana.*

G. americana. *Sp. pl.* 642. *Iacq. amer.* 148. *t.* 91.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 618.
Americaniſche Ginorie. W.
Habitat in Cuba *ad ripas fluviorum rupeſtres et glareoſas.* ♄
Frutex *pulcher habitu Myrti.*

954. KLEINHOFIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 827.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Nectar.* campanulatum 5-dentatum ſtaminiferum columnae germinis adnatum. *Germen* pedicellatum. *Capſula* 5-angularis 5-locularis inflata, loculis monoſpermis.

1. KLEINHOFIA *Hoſpita.*

K. Hoſpita. *Sp. pl.* 1365. *Cavan. diſſ.* 5. *p.* 288. *t.* 146.*
Cati-marus. *Rumph. amb* 3. *p.* 177. *t.* 113.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. p. 4. 251.
Herzblättrige Kleinhofie. W.
Habitat in Java, Amboina *inque inſulis* Philippinis. ♄
Kleinhof. horti Bot. cultor in Java.

Arbor foliis *alternis petiolatis cordatis acuminatis vix ſerratis nudis.* Flores *quodammodo affines Ayeniae.* Fructus *Cardioſpermi: e floris receptaculo* columna *declinata, apice adſcendens ultra apicem ſupremi*

petali, ferens: Nectarium *campanulatum minimum intra quod* Stamina *et* Piſtillum.

955. STERCULIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 828.

Cal. 5-partitus. *Cor.* 0. *Nectar* campanulatum 5-dentatum ſtaminiferum columnae germinis adnatum. *Germen* pedicellatum. *Capſulae* 5, uniloculares interiori latere dehiſcentes polyſpermae.

*1. STERCULIA *lanceolata.*

S. foliis lanceolatis, capſulis oblongis. W. †
S. (*lanceolata*) foliis lanceolatis, capſulis kermiſinis pauciſpermis. *Cavan. diſſ.* 5 *p.* 287. *t.* 144. *f.* 1. *
Lanzettenblättriger Stinckbaum. W.
Habitat in China. ♄

2. STERCULIA *Balanghas.*

S. foliis ovato-lanceolatis, capſulis obovatis. W.
S. foliis ovatis integerrimis alternis petiolatis, floribus paniculatis. *Sp. pl.* 1430. *Fl. zeyl.* 350. *Cavan. diſſ.* 5. *p.* 286. *t.* 143. *
Nux malabarica ſulcata mucilaginoſa fabacea. *Pluk. alm.* 266.
Clompanus minor. *Rumph. amb.* 3. *p.* 169. *t.* 107.
Cavalam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 89. *t.* 49. *Raj. hiſt.* 1754.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 381.
Eyförmiger Stinckbaum. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

Fructus *nutans quinquelobus: lobis reflexis, more Paeoniae dehiſcentibus.*

*3. STERCULIA *crinita.*

S. foliis ovatis trilobisve, capſulis baſi crinitis. W.
S. (*crinita*) foliis ovatis integerrimis alternatim ſparſis, fructus baſi crinita. *Cavan. diſſ.* 5. *p.* 285. *t.* 142. *
S. (*Ivira*) hermaphrodita, foliis ovatis trilobisve, floribus paniculatis, capſulis quinque. *Swartz prodr.* 98.
Ivira pruriens. *Aubl. guj.* 2. *p.* 694. *t.* 279. *
Borſtiger Stinckbaum. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis, inque* India *occidentali.* ♄

* 4. STERCULIA *cordifolia.*

S. foliis cordatis obſolete trilobis, capſulis acuminatis tomentoſis. W.

S. foliis cordatis latis acuminatis ſeptemnerviis valde venoſis, pericarpio extus tomentoſo, intus ſetoſo. *Cavan. diſſ.* 5. *p.* 286. *t.* 144. *f.* 2. *

Herzblättriger Stinckbaum. W.

Habitat in Senegal. ♄

*5. STERCULIA *colorata.*

S. foliis quinquelobis, lobis acuminatis, calycibus cylindraceo-clavatis, capſulis oblongis glabris coloratis. W.

Sterculia colorata. *Roxb. corom.* 1. *p.* 26. *t.* 25. *

Scharlachrother Stinckbaum. W.

Habitat in Indiae *orientalis montibus.* ♄

Calyces *cylindraceo-clavati apice dentati coccinei.* Capſulae *magnae rubrae.* W.

*6. STERULIA *urens.*

S. foliis quinquelobis, lobis acuminatis, calycibus campanulatis, capſulis ovatis hiſpidis. W.

Sterculia urens. *Roxb. corom.* 1. *p.* 25. *t.* 24. *

Brennender Stinckbaum. W.

Habitat in Indiae *orientalis montibus.* ♄

Folia *praecedentis Aceris ſaccharini facie, ſed multo majora pubeſcentia.* Calyx *viridis campanulatus apice dentatus.* Bracteae *lineares ad baſin pedunculorum, quod non in reliquis ſpeciebus.* Capſulae *virides hiſpidae.* W.

7. STERCULIA *platanifolia.*

S. foliis palmato-quinquelobis calycibus rotatis reflexis. W.

S. hermaphrodita, foliis cordatis lobatis, floribus paniculatis. *Lin. ſuppl.* 423. *Cavan. diſſ.* 5. *p.* 288. *t.* 145. *et diſſ.* 6. *p.* 352. * *Vahl ſymb.* 1. *p.* 80. *

Firmiana. *Marſili in Act. acad. patav.* 1. *p.* 106. *t.* 1. 2.

Culhamia. *Forſk. deſcr. p.* 96.

Hibiſcus (*ſimplex*) foliis cordatis trilobis repandis integerrimis. *Sp. pl.* 977.

Outom-chu. *Le Comte mem. de la Chine* 1. *p.* 241. *c. fig.*

Ou tong chu. *Du Halde chin.* 2. *p.* 149. *c. fig.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 152.

Platanblättriger Stinckbaum. W.

Habitat in Japonia, China. ♄ (v. v. ſ. fl.)

Arbor *altiſſima.* Folia *magna alterna in ſummitatibus ramorum conferta longe petiolata cordata integerrima trilobata ſ. quinquelobata: ſinubus rotundatis obtuſiuſculis, glaberrima, quiquenervia.* Panicula *magna lignea ſubpulverulenta.* Flos *magnitudine S. foetidae* (*eſt multo minor W.*) Calycis *laciniae extus canae, intus glabrae luteſcentes.* Columna *ſtaminum calyce brevior terminata antheris plurimis ovatis, quae tegunt baſin, quamvis columnae inſideant.* Germen *angulatum canum.* Stylus *filiformis canus.* Stigma *emarginatum.*

8. STERCULIA *foetida.*

S. foliis digitatis. *Sp. pl.* 1431. *Fl. zeyl.* 349. *Cavan. diſſ.* 5. *p.* 284. *t.* 141.* *Sonnerat itin. ind. ed. germ.* 2. *p.* 183. *t.* 132. *

Nux zeylanica folio multifido digitato. *Pluk. alm.* 266. *t.* 208. *f.* 3.

Clompanus major. *Rumph. amb.* 3. *p.* 168. *t.* 107.

Karil. *Rheed. mal.* 4. *p.* 75. *t.* 36. *Raj. hiſt.* 1564.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 382.

Gefingerter Stinckbaum. W.

Habitat in India. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

DIGYNIA.

956. HELIOCARPUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 829.

Cal. 4-phyllus. *Petala* 4. *Styli* ſimplices. *Capſ.* 2-locularis, compreſſa, utrinque longitudinaliter radiata.

1. HELIOCARPUS *americana.*

Heliocarpus. *Hort. cliff.* 211. *t.* 16.* *Trew. ehret. t.* 45. *Mill. dict.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 620.

Amerikaniſche Sonnenfrucht.

Habitat in Vera Cruce. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

957. AGRIMONIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 830.

Cal. 5-dentatus altero obvallatus. *Petala* 5. *Sem.* 2, in fundo calycis.

1. AGRIMONIA *Eupatoria.*

A. fructibus hiſpidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis oblongo-ovatis, ſpicis elevatis, petalis calyce duplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 129.

A. foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. *Mat. med.* 120. *Hort. cliff.* 179. *Fl. ſuec.* 394, 423. *Hort. upſ.* 118. *Roy. lugdb.* 240. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 293. *Dalib. pariſ.* 139. *Oed. dan.* 588. *Blackw. t.* 21. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 145. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 567. *Pollich. pal. n.* 452. *Ludw. ect. t.* 29. *Kniph. cent.* 5. *n.* 7. *Hoffm. germ.* 163. *Roth. germ. I.* 203. *II.* 321.

A. foliis pinnatis, pinnis alterne minimis. *Hall. helv. n.* 991.

Eupatorium veterum ſ. Agrimonia. *Bauh. pin.* 351.

Eupatorium. *Fuchſ. hiſt.* 244. *Camer. epit.* 756. *Mill. ic.* 15.

Agrimonia (*minor*) foliis caulinis pinnatis, foliis obtuſis dentatis. *Mill. dict. n.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 21.

Gemeiner Odermennig. W.

Habitat in Europae *pratis, viis.* ♃ (v. v.)

*2. AGRIMONIA *odorata.*

A. fructibus hiſpidis, foliis pinnatis, foliolis oblongis, inferioribus diminutis, petalis calyce duplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 130. *Mill. dict. n.* 3.

Agrimonia odorata. *Camer. hort* 7.

Eupatorium odoratum. *Lob. adverſ.* 308.

Wohlriechender Odermennig. W.

Habitat in Italia. ♃ (v. v.)

3. AGRIMONIA *repens.*

A. fructibus hiſpidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis oblongis, ſpicis ſubſeſſilibus, petalis calyce triplo longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 130.

A. foliis caulinis pinnatis: impari ſeſſili, fructibus hiſpidis. *Sp. pl.* 643. *Mill. dict. n.* 4.

A. orientalis humilis, radice craſſiſſima repente, fructu in ſpicam brevem et denſam congeſto. *Tournef. cor.* 21.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 22.

Kriechender Odermennig. W.

Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

Affinis nimium A. Eupatoriae, ſed Caules *breviores, craſſiores, hirſuti.* Stipulae *longitudine interſtitiorum, reflexae, fere totum obumbrant caulem.* Foliorum *impar non pedicellatum.* Spica *brevis, denſa, ſeſſilis,* Bracteis *longitudine florum.*

*4. AGRIMONIA *parviflora.*

A. fructibus hiſpidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis plurimis lanceolatis, petalis calyce ſeſquilongioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 130.

Kleinblütiger Odermennig. W.

Habitat in America boreali. ☉ (v. v.)

5. AGRIMONIA *Agrimonoides.*

A. foliis caulinis ternatis, fructibus glabris. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 179. *Roy. lugdb.* 241. *Mill. dict. n.* 5. *Scop. carn.* 2. *n.* 568. *Hoffm. germ.* 163.

Agrimoniae ſimilis. *Bauh. pin.* 321.

Agrimonoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 145. *t.* 144. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 179. *Barr. ic.* 612.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 23.

Dreyblättriger Odermennig. W.

Habitat in Italiae, Carnioliae *nemoribus umbroſis humentibus.* ♃ (v. ſ.)

Stamina ſaepe vix ultra 8.

TRIGYNIA.

958. RESEDA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 831.

Cal. 1-phyllus, partitus. *Petala* lacinata. *Capſ.* ore dehiſcens, 1-locularis.

1. RESEDA *Luteola.*

R. foliis lanceolatis integris baſi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis. *Mill. dict. n.* 8. *Necker. gal.*

lob. p. 210. *Pollich. pal. n.* 453. *Willich. obſ. n.* 40. *Blackw. t.* 283. *Kniph. cent.* 5. *n.* 74. *Hoffm. germ.* 163. *Roth. germ. I.* 203. *II.* 522.

R. foliis ellipticis, obtuſe lanceolatis, undulatis, calycibus quadrifidis. *Hall. helv. n.* 1058.

R. foliis ſimplicibus lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 212. *Vir. cliff.* 49. *Fl. ſuec.* 439, 424. *Roy. lugdb.* 483. *Dalib. pariſ.* 160.

Luteola herba ſalicis folio. *Bauh. pin.* 100.

Lutum herba. *Dod. pempt.* 80.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 24.

Wau-Reſede. W.

Habitat in Europa *ad vias et pagos.* ⊙ (v. v.)

Folia *ad baſin utrinque denticulum habent calloſum.*

2. RESEDA *caneſcens.*

R. foliis lanceolatis undulatis piloſis. *Syſt. veg.* 448. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 52. *

R. (*hexagyna*) foliis lanceolatis repandis undulatis, floribus hexagynis. *Forſk. deſcr.* 92. *

R. foliis ſubulatis ſparſis. *Sauv. monſp.* 48. *Mill. dict.* 7.

R. foliis ſimplicibus oblongis integris. *Guett. ſtamp.* 1. *p.* 225.

R. alba minor. *Bauh. pin.* 100.

Seſamoides ſalmanticum parvum. 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 296. *t.* 295.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 26.

Graue Reſede. W.

Habitat in Salmantica. ♃

Radix *perennis.* Caulis *pedalis, erectiuſculus, piloſus, pilis albis.* Rami *ex alis ſuperioribus ſeriores.* F[illegible]*a, ſeſſilia, lanceolata, carina piloſa, vix cili.* [illegible]*egerrima absque dente, undulata.* Racemus [illegible]: Floribus *albis.* Antherae *luteae* 11. Germin[illegible] *inſidentia ſtipiti communi.*

Synonyma Sauvageſii et Cluſii forte ad aliam incognitam ſpeciem ſpectant. W.

4. RESEDA *glauca.*

R. foliis linearibus baſi dentatis, floribus tetragynis. *Sp. pl.* 644.

R. lineariae foliis. *Bauh. pin.* 100. *prodr.* 41. *Burſ. IV.* 88.

R. linariae folio, glaucum pyrenaicum, flore ſtamineo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 601. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 4.

R. linariae folia pyrenaica, glauco folio. *Pluk. alm.* 317. *t.* 107. *f.* 2. *Raj. ſuppl.* 511.
Luteola pumila pyrenaica, linariae folio. *Tournef. inſt.* 424.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 27.
Meergrüne Reſede. W.
Habitat in Pyrenaeis. ♃ (v. v.)

*4. RESEDA *dipetala.*

R. foliis linearibus integerrimis, floribus tetragynis dipetalis, petalis indiviſis. *Aiton. Kew.* 2. *p.* 132. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 52.
R. (*capenſis*) caule fruticoſo, foliis linearibus ternis apice mucronatis. *Burm. prodr. cap.* 13.
Flachsblättrige Reſede. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂ (v. ſ.)
Facies *R. ſeſamoides.* Caulis *ſuffruticoſus erectus ramoſus.* Rami *teretes ſparſi glabri.* Folia *ſparſa linearia unguicularia craſſiuſcula acuta glabra.* Racemus *terminalis.* Flores *remotiuſculi.* Calycis *foliola ſex minuta albo-marginata.* Petala *cuneata integerrima.* Vahl. l. c.

5. RESEDA *purpuraſcens.*

R. foliis linearibus obtuſis, floribus pentagynis. *Sp. pl.* 644.
R. alba minor. 1. *Bauh. pin.* 100. *Raj. hiſt.* 1054.
Seſamoides ſalmanticum parvum. 1 *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 296.
Seſamoides foliis craſſis, floribus ex herbaceo purpuraſcentibus. *Tournef. inſt.* 424.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 27.
Röthliche Reſede. W.
Habitat in collibus Salmanticis, Monſpelii.

6. RESEDA *Seſamoides.*

R. foliis lanceolatis integris, fructibus ſtellatis. *Sp. pl.* 644.
Seſamoides fructu ſtellato. *Tournef. inſt.* 424.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 27.
Sternſamige Reſede. W.
Habitat Monſpelii *in Horto Dei.*

7. RESEDA *fruticuloſa.*

R. foliis pinnatis apice recurvatis, floribus tetragynis, calycibus quinquepartitis patentibus, caule baſi fruticoſo.

Sp. pl. 645. *Iacq. Collect.* 3. *p.* 195.* *Icon. rar.* 3. *t.* 474.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 28.
Strauchartige Reſede. W.
Habitat in Hiſpania. ♃

Radix *ſ. caulis ſupra terram perennans, craſſitie ſaepe duplo pollicis, breviſſimus, e cuius apice* Caules *plures, adſcendentes, laeves ſtriis elevatis.* Folia *pinnata: pinnis 5 ſ. 7, lanceolatis, decurrentibus, fere undatis, laevibus, apice recurvatis.* Spicae *plures, alternae, verſus caulis apicem primores.* Petala 6 *ſ.* 5, *alba, trifida, calyce majora.* Stamina 11, *quaſi media inter R. undatam et albam.*

8. RESEDA *alba.*

R. foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus ſexpartitis. *Hort. upſ.* 149. *Mill. dict.* 5. *Willich. obſ. n.* 41. *Hoff. germ.* 163. *Roth. germ. I.* 204. *II.* 522.
R. foliis pinnatis integerrimis. *Hort. cliff.* 212.
R maxima. *Bauh. pin.* 100. *Lob. hiſt.* 110.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 28.
Weiſse Reſede. W.
Habitat Monſpelii *in* Hiſpania. ⊙ (v. v.)

9. RESEDA *undata.*

R. foliis pinnatis undulatis, floribus trigynis tetragynisve. *Mill. dict. n.* 4. *Kniph. cent.* 9. *n.* 84. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 52.
R. (*decuſſiva*) foliis decuſſive pinnatis, foliolis ſubaequalibus, floribus trigynis. *Forſk. cat. pl. aegypt. p.* 66.
R. minor foliis inciſis. *Barr. rar.* 78. *t.* 588.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 29.
Wellenblättrige Reſede. W.
Habitat in Hiſpania. ♃ (v. v.)

Caulis *pedalis, ſtriato-angulatus, ſtrictus.* Folia *radicalia et caulina pinnata: foliolis lanceolatis, decurrentibus, acutis, undatis: alternis minoribus, erectioribus. Superiora folia excludunt foliola alterna minora.* Racemi *terminales.* Calyx 5-*partitus.* Petala 5, *trifida, alba.* Antherae *lutae,* 10. Piſtilla *in aliis floſculis* 3, *in aliis* 5. Capſulae *kujus generis maximae.*

10. RESEDA *lutea.*

R. foliis omnibus trifidis: inferioribus pinnatis. *Hort. cliff.* 212. *Hort. upſ.* 149. *Roy. lugdb.* 483. *Dalib.*

pariſ. 159. *Gort. gelr.* 310. *Mill. dict. n.* 1: *et.* 2. *Jacq. auſt. t.* 352. *Scop. carn. n.* 569. *Pollich pal. n.* 454. *Gmel. tub. p.* 137. *Moench. haſſ. n.* 393. *Mattuſch. ſil. n.* 338. *Hoffm. germ.* 163. *Roth. germ. I.* 204. *II.* 523.

R. hexapetala, foliis pinnatis, undulatis, calyce ſexfido. *Hall. helv. n.* 1056.

R. vulgaris. *Bauh. pin.* 100. *Raj. hiſt.* 1053.

R. lutea. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 467.

β. Reſeda gallica criſpa. *Bocc. ſic.* 77. *t.* 41. *f.* 3.

R. maſſilienſis, foliis latioribus criſpis. *Pluk. alm.* 317. *t.* 55. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 30.

Gelbe Reſede. W.

Habitat in Europae *auſtralioris montibus cretaceis.* ⊙ (v. v.)

Folia *ſaepius undulata.*

11. RESEDA *Phyteuma.*

R. foliis integris trilobisque, calycibus ſexpartitis maximis. *Hort. cliff.* 412. *Dalib. pariſ.* 159. *Mill. dict. n.* 3. *Jacq. auſt. t.* 132. *Willich. in nov. Act. A. N. C. tom.* 4. *p.* 107. *Scop. carn.* 2. *n.* 570.

R. foliis radicalibus integris, caulinis integris et ſemitrilobis, calycibus ſexfidis, florem ſuperantibus. *Hall. helv. n.* 1057.

R. floribus trigynis, calycibus maximis hexaphyllis. *Hort. upſ.* 150.

R. minor vulgaris. *Tournef. inſt.* 423.

Reſedae affinis Phyteuma. *Bauh. pin.* 100. *prodr.* 42. *t.* 42. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 306. *quoad iconem.*

Erucago apula trifida quinquefolia. *Col. ecphr.* 267. *t.* 269.

β. Reſeda minor vulgaris: folio minus inciſo. *Tournef. inſt.* 423.

γ. Reſeda minor vulgaris, foliis integris. *Tournef. inſt.* 423.

Phyteuma. *Bauh. pin.* 3. *p.* 386. *fig.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 31.

Kleine Reſede. W.

Habitat in Gallia, Italia, Oriente, Auſtria, Helvetia. ⊙

12. RESEDA *mediterranea.*

R. foliis integris trilobisque, calycibus flore brevioribus.

Mant. 564. *Iacq. collect.* 1. *p.* 147. * *Icon. rar.* 3. *t.* 475. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 53.

R. (*tetragyna*) tetragyna alba, foliis lanceolatis repandis, interdum baſi pinnatim inciſis calycis dente ſupremo aequali. *Forſk. deſcr.* 90. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 31.

Mittländiſche Reſede. W.

Habitat in Palaeſtina. ⊙ (v. v.)

Caulis *pedalis, adſcendens ſ. erectus, ſuperne ramoſus, ſcaber.* Folia *inferiora lanceolata, alterna, indiviſa, ſubtus ſcabra; caulina ſuperiora trifida.* Racemus *terminalis, longus, erectus.* Calyx *hexaphyllus, breviſſimus, linearis, patens.* Corolla *hexapetala, alba: Petala* 2 *ſuperiora tripartita: media minore;* 2 *laterialia bipartita: inferiore minore;* 2 *infima linearia.* Stamina *pallida.* Germen *tricuſpidatum, calyce vix longius.* Styli *nulli.* Stigmata *ſimplicia.*

13. RESEDA *odorata.*

R. foliis integris trilobisque, calycibus florem aequantibus. *Weig. obſ. bot. p.* 30. *obſ.* 15. *Kniph. cent.* 10 *n.* 73.

R. foliis integris trilobisque, floribus tetragynis. *Mill. dict. t.* 217.

R. foliis integris, floribus odoratis. *Hall. goett.* 95. *Zinn. goett.* 123.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 32.

Gemeine Reſede. W.

Habitat in Aegypto ♂ (v. v.)

Simillima R. Phyteumae, ſed Folia *magis undulata.* Calyces *corolla non longiores.* Rami *declinati, ſetis vagis adſperſi.* Flores *triſtes ambroſiaci, ſaepius tetragyni.* Petalorum *laciniae laterales in hac, intermediae vero in R. phyteumate, breviores.*

959. EUPHORBIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 823.

Cor. 4-ſ. 5-petala, calyci inſidens. *Cal.* 1-phyllus, ventricoſus. *Capſ.* 3-cocca.

* *Fruticoſae, aculeatae.*

1. EUPHORBIA *antiquorum.*

E. aculeata ſubnuda triangularis articulata: ramis paten-

tibus. *Hort. cliff.* 196.* *Hort. upſ.* 138. *Fl. zeyl.* 199. *Roy. lugdb.* 194. *Amoen. acad.* 3. *p.* 106.* *Mill. dict. n.* 1. *Forſkaehl. aegypt. p.* 93. *Blackw. t.* 339.

Euphorbium antiquorum verum. *Comm. hort.* 1 *p.* 23. *t.* 12.

Schadidacalli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 81. *t.* 42.

β. Euphorbia aculeata nuda triangularis articulata, ramis erectis. *Mill. dict.*

Euphorbium trigonum et tetragonum ſpinoſum, ramis compreſſis. *Iſn. act.* 120.

Tithymalus aizoides triangularis et quadrangularis articuloſus et ſpinoſus, ramis compreſſis. *Comm. prael.* 55. *t.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 34.

Wahre Wolfsmilch. W.

Habitat in India ♄

Stamina *tantum* 5 *numerat Forſkaehl.* l. c. R.

2. EUPHORBIA *canarienſis.*

E. aculeata nuda ſubquadrangularis, aculeis geminatis uncinatis, floribus ſubſeſſilibus. W.

E, aculeata nuda ſubquadrangularis, aculeis geminatis, *Hort. cliff.* 196.* *Hort. upſ.* 138. *Roy. lugdb.* 194. *Amoen. acad.* 3. *p.* 107.* *Mill. dict. n.* 2. *Blackw. t.* 340. *f.* 1.

Tithymalus aizoides fruticoſus canarienſis aphyllus quadrangularis et quinquangularis, ſpinis geminis aduncis atro-nitentibus armatus. *Comm. hort.* 2. *p.* 207. *t.* 104.

Tithymalus aizoides lactifluus ſ. Euphorbia canarienſis quadrilatera et quinquelatera, cerei effigie. *Pluk. alm.* 370. *t.* 320. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 35.

Canariſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Canariis. ♄

Flos *infra par aculeorum, ſeſſilis, utrinque* Bractea *breviore ovata concava viridi.* Calyx *clauſus laciniis* 5, *conniventibus, purpureis.* Petala 5, *extra calycem poſita, obſcure purpurea, ſeſſilia, carnoſa, integra, obtuſiſſima.*

*3. EUPHORBIA *viroſa.* W. †

E. aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis ſubulatis, flore pedunculato. W.

Euphorbia. *Patterſon. itin. ed. germ. p.* 60. *t.* 9. 10.
Giftigſte Wolfsmilch. W.
Habitat in interioribus regionibus Cap. b. ſpei. ♄

Similis praecedenti, ſed diſtincta: margine *angulorum caulis plano,* aculeis *multo longioribus ſubulatis rectis, et* flore *pedunculato. Convenit vero floris ſtructura, ad baſin floris ſunt* bracteae *binae ellipticae obtuſae, et petala ſunt obtuſiſſima.* W

4. EUPHORBIA *heptagona.*

E. aculeata nuda ſeptemangularis: ſpinis ſolitariis ſubulatis floriferis. *Hort. cliff.* 196.* *Roy. lugdb.* 194. *Amoen. acad.* 3. *p.* 109.* *Mill. dict. n.* 6.
Euphorbium heptagonum, ſpinis longiſſimis in apice frugiferis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 258. *t.* 258.
Euphorbium capenſe, ſpinis longis ſimplicibus. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 4. *t.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 36.
Siebeneckige Wolfsmilch. W.
Habitat in Aethiopia. ♄

5. EUPHORBIA *mammillaris.*

E. aculeata ſeminuda, angulis tuberculatis ſpinis interſtinctis, tuberculis junioribus folio inſtructis. W.
E. aculeata nuda: angulis tuberoſis ſpinis interſtinctis. *Amoen. acad.* 3. 108. *Mill. dict. n.* 8.
Euphorbium polygonum, aculeis longioribus ex tuberculorum internodiis prodeuntibus. *Iſn. act.* 1720. *p.* 386.
Tithymalus aizoides africanus, validiſſimis ſpinis ex tuberculorum internodiis provenientibus. *Comm. prael.* 59. *t.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 36.
Zitzenförmige Wolfsmilch.
Habitat in Aethiopia. ♄

Differt ab Heptagona, angulis duplicatis toruloſis; ſpinae ſolitariae inter ſingula tubercula longitudinaliter digeſta. Flores *non vidi; an ex ſpinarum apice, ut heptagonae?*

6. EUPHORBIA *cereiformis.*

E. aculeata nuda multangularis, ſpinis ſolitariis ſubulatis. *Roy. lugdb.* 195. *Amoen acad.* 2. *p.* 108. *Mill. dict. n.* 9. *Kniph. cent.* 10. *n.* 41.
Euphorbium cerei effigie, caulibus gracilioribus. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 258.

Euphorbium aphyllum anguloſum, florum coma denſiſſima. *Burm. afr.* 19. *t.* 9. *f.* 3.
Tithymalus africanus ſpinoſus, cerei effigie. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245. *Pluk. alm.* 370. *t.* 231. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 37.
Fackeldiſtelartige Wolfsmilch. W.
Habitat in Aethiopia. ♄

7. EUPHORBIA *officinarum.*

E. aculeata nuda multangularis; aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upſ.* 138. *Roy. lugdb.* 195. *Amoen. acad* 3. *p.* 107. *. *Mat. med. p.* 120. *Mill. dict. n.* 4. *Blackw. t.* 340. *f.* 2. *Regn. bot.*
Euphorbium polygonum ſpinoſum, cerei effigie. *Iſnard. act.* 1720. *p.* 500. *t.* 10.
Euphorbium cerei effigie, caulibus craſſioribus ſpinis validioribus armatum, *Comm. hort.* 1. *p.* 21. *t.* 11. *Seb. theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 2.
Euphorbium. *Bauh. pin.* 387.
β. Kolquall. *Bruce. itin. ed. angl. app. p.* 41. *c. fig. ed. germ.* 5. *p.* 52. *t.* 10. 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 37.
Harzbringende Wolfsmilch. W.
Habitat in Aethiopia et Africa *calidiore.* ♄ (v. v.)

Varietas β. *angulis caulis repandis differre videtur, ſed ex brevi confuſaque deſcriptione Clariſſ. Bruce, non liquet, an ſit diſtincta ſpecies, vel varietas.* W.

*8. EUPHORBIA *triaculeata.*

E. aculeata nuda, caule tereti ſulcato, aculeis ternis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 53.
E. (*triaculeata*) caule tereti ſeptemſulcato, floribus ternis ſeſſilibus ex ala aculeorum. *Forſk. deſcr.* 94. *
Dreyſtachliche Wolfsmilch. W.
Habitat in Arabia felici *ad urbem* Muſa *frequens in planitie ſubhumida.* ♄

Aculeus *intermedius pollicaris, laterales quintuplo minores recurvi.* Vahl. l. c.

9. EUPHORBIA *nereifolia.*

E. aculeata ſeminuda, aculeis geminatis, angulis oblique tuberculatis ſuperne folioſis, foliis oblongis. W.
E. aculeata ſeminuda: angulis oblique tuberculatis. *Hort. cliff.* 196. * *Hort. upſ.* 139. *Fl. zeyl.* 200. *Roy. lugdb* 194. *Amoen. acad.* 3. *p.* 109. * *Mill. n.* 5.

Euphorbium afrum ſpinoſum, foliis latioribus non ſpinoſis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 18. *t.* 9. *f.* 1.
Tithymalus aizoides arboreſcens ſpinoſus, caudice angulari, nerii folio. *Comm. prael.* 22. 56. *t.* 6. *Bradl. ſucc.* 3. *p.* 10. *t.* 28.
Tithymalus indicus ſpinoſus, nerii folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 25. *t.* 13.
Ligularia. *Rumph. amb.* 4. *p.* 88. *t.* 40.
Ela Calli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 83. *t.* 43.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 40.
Oleanderblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in India. ♄ (v. v. ſ. fl.)

*10. EUPHORBIA *Hyſtrix.*

E. caule tereti ſeminudo, ſuperne folioſo, foliis lanceolato-linearibus, pedunculis unifloris perſiſtentibus demum ſpinoſis. W.
E. (*Hyſtrix*) imbricata, tuberculis folio lanceolato-lineari inſtructis, pedunculis unifloris axillaribus ſpineſcentibus. *Iacq. hort. ſchoenb.* 2. *p.* 43. *t.* 207. *
E. (*loricata*) aculeata ſeminuda, caule tereti ſquamoſo baſi ſpinis ſolitariis muricato, foliis lanceolato-linearibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 412. *
Tithymalus africanus arboreſcens, ſquamato caule ſpinoſus. *Pluk. alm.* 370. *t.* 230. *f.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 344. *Petiv. gazoph. t.* 86. *f.* 519.
Vieldornige Wolfsmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Planta *primi anni eſt inermis, ſecundi vero ſpinoſa, quum* pedunculi *longiſſimi uniflori poſt floris fructusque caſum perſiſtant, et in ſpinas mutentur, ut in Hedyſaro cornuto.* W.

*11. EUPHORBIA *tribuloides.*

E. aculeata ſeminuda quadrangularis, baſi diphylla, foliis petiolatis ſpathulatis. W.
E. (*tribuloides*) humillima diphylla aculeata quadrangularis, ſpinis geminatis patentibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 412. *
Bürzeldornartige Wolfsmilch. W.
Habitat in Canariis ♄

Caulis *e radice fuſiformi ortus, eſt biuncialis craſſitie unciali et paulo ultra, ovatus carnoſus quadrangularis et baſi foliis binis oppoſitis petiolatis ovato-ſpathulatis, breve marceſcentibus ſuffultus.* Aculei

ad angulorum marginem conferti geminati albidi. Lamarck. l. c.

*12. EUPHORBIA *ſtellata.* W. †

E. caulibus digitalibus nudis aggregatis flexuoſis aculeatis, aculeis geminatis. W.

Euphorbe a chenilles. *Vaill. itin. ed. germ. Francof.* 4. *p.* 245. *t.* 11.

Sternförmige Wolfsmilch. W.

Habitat in interioribus regionibus Cap. b. ſpei. ♄

Radix *tuberoſa magnitudine pugni.* Caules *ex apice plures digitales decumbentes flexuoſi cylindracei obtuſi, baſi attenuati, laeves, et ſerie duplici tuberculorum ſuperne inſtructi.* Aculei *bini breves e quolibet tuberculo.* W.

*13. EUPHORBIA *cucumerina.* W. †

E. aculeata elliptica obtuſa ſulcata, aculeis ſubſolitariis, pedunculis ſubtrifloris. W.

Euphorbe a concombre. *Vaill. itin. ed. germ. Francof.* 3. *p.* 410. *t.* 5.

Gurckenförmige Wolfsmilch. W.

Habitat in interioribus Cap. b. ſpei *regionibus.* ♄

Facies totius plantae eſt Cucumeris ſativi. Caulis *eſt ellipticus carnoſus obtuſus, porcis pluribus exaratus.* Aculei *ſolitarii et geminati ſubulati.* Pedunculi *in apice caulis videntur bi- et triflori.* W.

* * *Fruticoſae, inermes.* Caulis *nec dichotomus, nec umbelliferus.*

*14. EUPHORBIA *meloformis.*

E. inermis ſubgloboſa multangularis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 135.

Euphorbe a cote de melon. *Vaill. itin. ed. germ. Francof.* 4. *p.* 245. *t.* 12.

Melonenförmige Wolfsmilch. W.

Habitat in Cap. b. ſpei. *interioribus regionibus.* ♄

Caudex *carnoſus ſubgloboſus, diametro triunciali, glaber multangulatus:* porcae 8, 10 *vel plures baſi latae carinatae:* carinae *floriģerae, cicatricibus pedunculorum glanduliſque alternatim notatae.* Pedunculi *cylindracei craſſitie pennae columbinae articulati, villis breviſſimis adſperſi, plerumque primum trichotomi, dein dichotomi, raro ſimplices.* Bracteae *ad di-*

viſuras pedunculorum et ad baſin ſinguli floris oppoſitae oblongae acutiuſculae adſperſae lineam longae. Calyx *monophyllus campanulatus bracteis paulo longior, limbo quinquefido:* laciniae *ovatae obtuſae inflexae concavae.* Petala *quinque, calyci inter lacinias inſerta, ſubrotundo-reniformia obtuſiſſima, laciniis calycis duplo majora patentia carnoſa convexa poris raris pertuſa viridia.* Filamenta *viginti et quod excurrit, receptaculo inſerta calyce paulo longiora ſubulata villoſa.* Antherae *flavae didymae.* Piſtillum *nullum.* Act. l. c.

15. EUPHORBIA *Caput Meduſae.*

E. inermis imbricata, tuberculis folio lineari inſtructis, floribus ſubpedunculatis petalis palmatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 135.

E. inermis imbricata, tuberculis foliola lineari inſtructis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upſ.* 139. *Roy. lugdb.* 195. *Amoen acad.* 3. *p.* 110. *Mill. dict. n.* 8.

E. inermis ramoſa tuberculata, calycum laciniis externis ſupra planis ſubquadridentatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 413. *

Planta lactaria africana. *Comm. hort.* 1. *p.* 33. *t.* 17.

Tithymalus aizoides africanus, ſimplici ſquamato caule, *Comm. prael.* 57. *t.* 7.

β. Euphorbium anacanthum, anguſto Polygoni folio. *Iſnard. Act. pariſ.* 1720. *p.* 586. *Breyn. prodr.* 29. *t.* 19.

γ. Euphorbium humile procumbens, ramis ſimplicibus copioſis, caule craſſiſſimo tuberoſo. *Burm. afr.* 20. *t.* 10. *f.* 1.

δ. Euphorbium procumbens, ramis plurimis ſimplicibus ſquamoſis, foliis deciduis. *Burm. afr.* 17. *t.* 8.

ε. Euphorbium procumbens, ramis geminatis, caule glabro oblongo cinereo. *Burm. afr.* 18. *t.* 9. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 41.

Meduſenhaupt-Wolfsmilch. W.

Habitat in Aethiopia. ♄ (v. v.)

Diſtinctiſſima planta petalis palmatis.

*16. EUPHPORBIA *tuberculata.*

E. inermis imbricata, tuberculis compreſſis acutis foliolo lineari inſtructis, floribus longe pedunculatis, petalis palmatis. W.

E. (*tuberculata*) inermis imbricata, tuberculis patentiſ-

ſimis acutis foliolo lineari inſtructis, floribus pedunculatis, petalis palmatis. *Iacq. hort. Schoenbr.* 2. *p.* 43. *t.* 208.
Knotige Woſsmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*17. EUPHORBIA *Anacantha.*

E. inermis imbricata, tuberculis foliolo ſubrotundo inſtructis, floribus terminalibus ſoli[illegible] ſeſſilibus, petalis palmatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 13[illegible] [illegible] *dict. n.* 7.
E. (*tridentata*) inermis ramoſa ſubtub[illegible]ulata, calycum laciniis externis ſupra concavis coloratis tridentatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 413. *
Euphorbium anacanthum ſquamoſum, lobis florum tridentatis. *Iſnard. Act. pariſ.* 1720. *p.* 387. *n.* 12. *et p.* 392. *tab* 11.
Euphorbium erectum aphyllum, ramis rotundis, tuberculis tetragonis. *Burm. afr.* 16. *tab.* 7. *f.* 2.
Dreyzähnige Wolfsmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*18. EUPHORBIA *Clava.*

E. inermis imbricata, tuberculis foliolo lanceolato inſtructis, floribus pedunculatis, petalis integerrimis. *Ait. Kew* 2. *p.* 156.
E. (*Clava*) inermis fruticoſa, foliis ſpathulato-linearibus, pedunculis axillaribus unifloris bracteatis. *Iacq. ic.* 1. *t.* 85. *Collect.* 1. *p.* 104. *
E. (*canaliculata*) inermis, caule ſimplici craſſo tuberculato, foliis linearibus acutis canalicu[illegible]tis, pedunculis unifloris. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 413. *
Euphorbium acaulon erectum tuberoſum, linearibus foliis, flore ac fructu foliaceis. *Burm. afr.* 12. *t.* 6. *f.* 1.
Tithymalus aizoides africanus ſimplici ſquamato caule, chamaenerii folio. *Commel. praelud.* 58. *t.* 8.
Keulenförmige Wolfsmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*19. EUPHORBIA *bupleurifolia.*

E. inermis capitata imbricata, tuberculis ſubrhombeis, foliis lanceolatis petiolatis, pedunculis unifloris, petalis integerrimis, bracteis flore longioribus. W.
E. inermis ſubacaulis, foliis l[illegible]is. *Iacq. hort. Schoenbr.* 1. *p.* 55. *t.* 106. *
Haſenoehrleinblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*20. EUPHORBIA *lophogona.*

E. inermis caule pentagono alato, foliis lanceolato-ſpathulatis, umbella dichotoma terminali. W.

E. (*lophogona*) inermis ſeminuda, caule ſimplici pentagono, angulis membranaceis et quaſi criſtatis, foliis lanceolato-ſpathulatis, umbella dichotoma terminali. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 414.

Flügelſtielige Wolfsmilch. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄

Similis Euphorbiae neriifoliae ſed abunde diſtincta: magnitudine, aculeorum *defectu*, caule *alato-angulato, et* infloreſcentia. Radix *ramoſa fibroſa.* Caulis *pedalis et ultra, ſimpliciſſimus fruticoſus craſſitie digiti, baſi cylindraceus, ſuperne ſpiraliter quinquangularis, angulis membranaceis laciniatis.* Folia *in ſummitate duntaxat caulis oblonga obtuſa ſpathulata, baſi anguſtata quadri-ſeu ſexpollicaria glabra.* Pedunculus *terminalis bipollicaris bis vel ter dichotome diviſus.* Umbellae *ſex vel octoflorae terminales.* Bracteae *binae ſubrotundae mucronatae albae petaliformes ad cujusque floris baſin.* Lamarck. l. c.

21. EUPHORBIA *mauritanica.*

D. inermis ſeminuda fruticoſa filiformis flaccida, foliis alternis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upſ.* 140. *Roy. lugdb.* 195. *Amoen. acad.* 3. *p.* 111.* *Gron. orient.* 160. *Mill. dict. n.* 16.

Tithymalus aphyllus mauritaniae. *Dill. elth.* 384. *t.* 289. *f.* 373.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 42.

Mauritaniſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Africae *maritimis.* ♄ (v. v.)

*22. EUPHORBIA *piſcatoria.*

E. inermis fruticoſa ſtricta, umbellis quinquefidis terminalibus, involucellis oblongis, foliis lanceolatis laevibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 137.

Fiſcher-Wolfsmilch. W.

Habitat in Madera *et* Canariis. ♄ (v. ſ.)

*23. EUPHORBIA *balſamifera.*

E. inermis fruticoſa ſtricta, capitulo terminali, foliis lanceolatis laevibus glaucis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 137.

Balſamiſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Canariis. ♄

24. **EUPHORBIA** *Tirucalli.*

E. inermis ſeminuda fruticoſa filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. *Hort. cliff.* 197. *Hort. upſ.* 139. *Fl. zeyl.* 197. *Roy. lugdb.* 195. *Amoen. acad.* 3. *p.* 111.* *Mill. dict. n.* 14.
Tithymalus indicus fruteſcens. *Comm. hort.* 1. *p.* 27. *t.* 14.
Tithymalus arboreſcens, caule aphyllo. *Pluk. phyt.* 319. *f.* 6.
Oſſifraga lactea. *Rumph. amb.* 7. *p.* 62. *t.* 29.
Tiru Calli. *Rheed. mal.* 8. *p.* - - . *t.* 44.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 43.
Malabariſche Wolfsmilch. W.
Habitat in India. ♄

*25. **EUPHORBIA** *laurifolia.*

E. inermis foliis lanceolato-oblongis glabris, pedunculis axillaribus trifloris. W.
E. ſeminuda, foliis ſparſis confertis lanceolato-oblongis integerrimis laevibus, pedunculis axillaribus trifloris. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 415.*
Lorbeerblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in Peru. ♄

Fructus *magnitudine et facie Hippomanes biglanduloſae glabri.* Lamarck. l. c.

*26. **EUPHORBIA** *pyrifolia.*

E. inermis, foliis lanceolato-oblongis mucronatis glabris, pedunculis ſubumbellatis. W.
E. inermis, foliis lanceolato-ovalibus integerrimis petiolatis mucronatis laevibus, pedunculis longis nudis ſubumbellatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 415.*
Birnenblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in inſula Mauritii. ♄

Pedunculi *bipollicares nudi interdum uniflori, flore uno alterove ad baſin prolifero interdum 3 ſ. 5 flori umbellati interdum et umbella baſi eſt prolifera.* Capſulae *glabrae.* Lamarck. l. c.

27. **EUPHORBIA** *Tithymaloides.*

E. inermis fruticoſa, foliis diſtiche alternis ovatis. *Hort. cliff.* 198.* *Roy. lugdb.* 95. *Amoen. acad.* 3. *p.* 111.* *Iacq. amer.* 149. *t.* 92.
E. tithymaloides, *myrtifolia.*
E. (*myrtifolia*) inermis fruticosa, foliis alternis ovato-acutis planis ſublucidis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 416.*

Tithymalus (*myrtifolius*) foliis ovatis acuminatis. *Mill. dict. n.* 1.
Tithymalus curaſſavicus myrtifolius, flore coccineo mellifluo. *Herm. par.* 234. *t.* 234.
Tithymalus curaſſavicus myrtifolius, flore papilionaceo coccineo parvo. *Comm. hort.* 1. *p.* 31. *t.* 16. *Pluk. alm.* 369. *t.* 230. *f.* 2.
β. Euphorbia *padifolia.*
E. (*anacampſeroides*) inermis fruticoſa, foliis alternis obovatis obtuſis, ſubtus acute carinatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 416.*
Tithymalus (*laurocera ſifolius*) foliis oblongo-ovatis obtuſis ſucculentis. *Mill. dict. n.* 2.
Tithymaloides laurocerafi folio non ſerrato. *Dill. elth.* 383. *t.* 288. *f.* 372.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 44. *t.* 51. *f. B.*
Saftige Wolfsmilch. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

28. EUPHORBIA *heterophylla.*

E. inermis, foliis ſerratis panduriformibus, ſummis lanceolatis, floribus terminalibus ſubumbellatis. W.
E. inermis, foliis ſerratis petiolatis difformibus ovatis lanceolatis panduriformibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 112. *Mill. dict. n.* 30.
Tithymalus heterophyllus. *Plum. ic.* 250. *t.* 251. *f.* 3.
Tithymalus curaſſavicus, ſalicis et atriplicis foliis variis, caulibus viridantibus. *Pluk. alm.* 369. *t.* 112. *f.* 6.
Tithymalus curaſſavicus, ſalicis et atriplicis foliis hirſutis, caulibus ſubrubentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 336.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 46.
Verſchiedenblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

*29. EUPHORBIA *cyathophora.*

E. inermis, foliis panduriformibus ovatis, floribus terminalibus ſubumbellatis, involucellis coloratis. W.
E. (*cyathophora*) umbella trifida multifida appendice calycino cyathiformi, foliis plerisque panduriformibus, infimis caulinis ovatis. *Murr. comment. goett.* 7. *p.* 81. *t.* 1.*.
E. (*cyathophora*) umbella trifida ſubdichotoma, foliis panduraeformibus. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 480.
Euphorbia heterophylla. *Iacq. Collect.* 1. *p.* 157.*

Geigenblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. v.)
Hanc poſt E. heterophyllam indicavi ob affinitatem et infloreſcentiam, revera non exacte umbellatam. Diſtincta a praecedente foliis *ſuperioribus nunquam lanceolatis. Variat involucris rubris et albis.* W.

*30. EUPHORBIA *nudiflora.*

E. inermis fruticoſa, foliis ovatis integerrimis, cyma axillari nuda. W.
E. (*nudiflora*) ſubtrichotoma, foliis integerrimis ovatis, ſubundulatis pedunculis cymoſis ramoſis, caule fruticoſo. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 479. *Collect.* 3. *p.* 180. *
Nacktblütige Wolfsmilch. W.
Habitat - - - ♄
Frutex *humanae altitudinis ramis ſaepius trichotomis.* Folia *oppoſita et terna ovata margine ſubundulata glabra.* Cymae *ramoſae in foliorum axillis absque involucris.* Petala *ſubrotunda tenuiſſima crenata.* Styli *connati.* Capſulae *glabrae.* W.

31. EUPHORBIA *cotinifolia.*

E. foliis oppoſitis ſubcordatis petiolatis emarginatis integerrimis, caule fruticoſo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 112. *Mill. dict. n.* 17. *Kniph. cent.* 2. *n.* 24.
E. inermis, caule fruticoſo, foliis oppoſitis ſubcordatis emarginatis, petiolis folio longioribus. *Hort. cliff.* 198. *Roy. lugdb.* 196.
Tithymalus curaſſavicus, folio cotini triphyllos, petalis florum ſerratis. *Pluk. alm.* 369. *t.* 230. *f.* 3.
Tithymalus arboreus curaſſavicus, cotini folio. *Seb. theſ.* 1. *p.* 75. *t.* 46. *f.* 4.
Tithymalus arboreus americanus, cotini folio. *Comm. hort.* 1. *p.* 29. *t.* 15.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 47.
Perrückenbaumblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in Curaſſao. ♄ (v. v.)

*32. EUPHORBIA *mellifera.*

E. foliis ſparſis lanceolatis acutis laevibus, pedunculis dichotomis, capſulis muricatis. *Ait. Kew.* 3. *p.* 493.
Honigbringende Wolfsmilch. W.
Habitat in Madera. ♄ (v. v.)
Caulis *fruticoſus laevis.* Folia *alterna lanceolata utrinque attenuata integerrima glabra, iis Nerii Ole-*

andri ſimillima, coſtata, coſta media ſubtus elevata, in junioribus piloſa. Corymbus *terminalis multiflorus, pedunculis inferioribus et ſummis trifidis, intermediis bifidis.* Flores *aurantii coloris.* Petala *reniformia indiviſa.* Styli *tres, apice bifidi.* Stigmata *capitata.* Capſulae *verrucoſae.* W.

*33. EUPHORBIA *glabrata.*

E. inermis fruteſcens ramoſa, foliis oppoſitis cordato-ovatis, acutis glabris integerrimis. *Swartz prodr.* 96. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 870.* *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 53.*

E. dichotoma, foliis ovatis integerrimis oppoſitis, caule geniculato, pedunculis capitatis axillaribus. *Houſt. cat* 213.

Peplis fruticoſa maritima geniculata. *Sloan. cat.* 82. *hiſt.* 2. *p.* 198.

Glatte Wolfsmilch. W.

Habitat in littoribus petroſis Jamaicae, *inque aliis inſulis* Caribaeis. ♄ (v. ſ.)

Non lacteſcit. Swartz l. c.

*34. EUPHORBIA *linarifolia.* W.

E. inermis fruteſcens, foliis ſparſis lanceolatis mucronatis, flore ſolitario terminali involucro triphyllo cincto, capſulis muricatis. W.

E. (*linifolia*) fruticoſa inermis, foliis ſparſis lanceolatis mucrone innocuo terminatis, terminalibus ternis. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 86. *Collect.* 1. *p.* 135.*

Löwenmaulblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in - - - ♄ (v. ſ.)

Folia *oppoſita et alterna lanceolata obtuſa breviſſimo mucrone inſtructa.* Capſulae *e ſquamis truncatis muricatae.* W.

*35. EUPHORBIA *linifolia.*

E. inermis ſuffruticoſa, foliis infimis oppoſitis ovalibus, reliquis alternis linearibus, pedunculis ſubquinis terminalibus, capſulis glabris. W.

E. (*linifolia*) caule ſuffruticoſo, foliis oppoſitis alternisque lineari-lanceolatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 53.*

Flachsblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in inſula St. Dominici. ♄

*36. EUPHORBIA *cuneata.*

E. fruticoſa, foliis obovatis, pedunculis lateralibus trifloris. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 53.*

Keilblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in Arabia *felici.* ♄
Capſula *villoſa.* Petala *obovata truncata.* Vahl. l. c.

37. EUPHORBIA *ocymoidea.*
E. inermis herbacea ramoſa, foliis ſubcordatis integerrimis petiolo brevioribus, floribus ſolitariis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 112. *Mill. dict. n.* 32.
E. inermis, foliis ſubcordatis obtuſis integerrimis petiolatis, caule ramoſo erecto. *Roy. lugdb.* 199.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 47.
Baſilicumartige Wolfsmilch. W.
Habitat in Campechia. *Houſt.*

*** *Dichotomae (umbella bifida aut nulla.)*

*38. EUPHORBIA *laevigata.*
E. fruteſcens ramoſa, foliis oppoſitis oblongis obtuſis integerrimis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 54.
Meergrüne Wolfsmilch. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Tota glabra. Caulis *inermis.* Rami *apice dichotomi ter vel quater diviſi.* Folia *breviter petiolato unguicularia articulis ramuorm longiora, altero latere baſeos breviora anguſtiora, apice mucrone minuto terminata laevia avenia glauca viridia.* Pedunculi *ſuperne ex dichotomia ramulorum ſolitarii.* Flores *parvi.* Capſula *glabra laevis magnitudine ſeminis, Coriandri.* Vahl. l. c.

39. EUPHORBIA *origanoides.*
E. dichotoma, foliis ſerrulatis ovatis obtuſis trinerviis, panicula terminali, caulibus ſimplicibus. *Amoen. acad.* 2. *p.* 114.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 48.
Doſtartige Wolfsmilch. W.
Habitat in Inſula Aſcenſionis. ♃
Planta refert ita Origanum, ut primo intuitu nequeat non pro eo agnoſci.
Caulis *ſimplex ſpithamaeus teres articulatus.* Folia *rotundo-ovata trinervia ſeſſilia glabra ſerrulata, paginae ſuperioris latere exteriori purpuraſcente.* Rami *nulli.* Panicula *ut in Origano terminat caulem.* Amoen. acad.

*40. EUPHORBIA *Atoto.*
E. dichotoma, foliis ovatis integerrimis umbella terminali. *Forſt. prodr. n.* 207.

Südſee-Wolfsmilch. W.
Habitat in Societatis *inſulis.*

41. EUPHORBIA *hypericifolia.*

E. dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 113.* *Mill. dict. n.* 31. *Swartz obſ.* 194.*

E. inermis, foliis ovalibus oppoſitis hinc ſerratis uniformibus, ramis alternis, caule erectiuſculo. *Hort. cliff.* 198. *Hort. upſ.* 143.* *Roy. lugdb.* 196.

E. minima reclinata, foliolis ovatis denticulatis, floribus ſubumbellatis terminalibus lateralibusque. *Brown. jam.* 235.

Tithymalus americanus, floſculis albis. *Comm. prael.* 60. *t.* 60.

Tithymalus erectus acris, parietariae foliis glabris, floribus ad caulium nodos conglomeratis. *Sloan. jam.* 82. *hiſt.* 1. *p.* 197 *t.* 126.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 48.

Johanniskrautblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in Indiae *occidentalis cultis.* ⊙ (v. v.)

*42. EUPHORBIA *proſtrata.*

E. dichotoma, foliis ovalibus obſolete ſerratis, pedunculis axillaribus ſubtrifloris, caulibus diffuſis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 139.

Liegende Wolfsmilch.
Habitat in India *occidentali.* ⊙

Caules *herbacei ſpithamaei procumbentes teretes ramoſi rubicundi.* Folia *oppoſita breviſſime petiolata obtuſiuſcula glabra obſolete trinervia, ſupra viridia ſubtus glauceſcentia trilinearia.* Flores *axillares breviter pedicellati ſaepe terni, interdum ſolitarii.* Petala *purpurea.* Ait. l. c.

*43. EUPHORBIA *roſea.*

E. dichotoma diffuſa, foliis obovatis obliquis baſi ſubcordatis apice denticulatis, pedunculis unifloris axillaribus. W.

E. dichotoma, foliis obovatis baſi obliquis apice denticulatis, caule depreſſo diffuſo. *Retz. obſ.* 4. 26.*

Roſenfarbige Wolfsmilch. W.
Habitat in Indiae orientalis *arenoſis.* ⊙ (v. ſ.)

Variat valde magnitudine. Folia *avenia inferiora latiora et majora.* Flores *axillares in ramorum apice.*

Calyx *purpureus*. Petala *lineari-obovata obtuſa roſea*. Germen *papillis minutiſſimis obſitum*. Capſula *junior etiam papilloſa, adulta vero glabra*. W.

44. EUPHORBIA *maculata*.

E. dichotoma, foliis ſerratis oblongis piloſis, floribus axillaribus ſolitariis, ramis patulis. *Iacq. hort t.* 186. *Kniph. cent.* 8. *n.* 39.

Tithymalus ſ. Chamaeſyce altera virginiana, foliis crenatis et macula fuſca eleganter notatis. *Pluk. alm.* 372. *t.* 65. *f.* 8.

Chamaeſyce. *Sloan. jam.* 83. *hiſt.* 1, *p.* 198.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 49.

Gefleckte Wolfsmilch. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ⊙ (v. v.)

Caules *dichotomi*; *Ramis alternis, patentibus, ſupra purpuraſcentibus*. Folia *ovali-oblonga, trinervia, ſubpiloſa, ſerrata, altero latere maxima parte integerrima, tenera adhuc planta notata macula fuſca*. Flores *axillares, ſolitarii, parvi, calyce rufo*. Fructus *laevis*. *Similis E. hypericifoliae*.

*45. EUPHORBIA *ſcordifolia*.

E. dichotoma, foliis ovatis obliquis obtuſis crenatis hirſutis, pedunculis axillaribus unifloris, petalis ſerratis, capſula hirſuta. W.

E. (*ſcordifolia*) dichotoma hirſuta, foliis crenulatis ſubovatis obtuſis, pedunculis unifloris ſolitariis. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 476. *Collect.* 113. *.

Gamanderblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Africa *ad* Senegal? ⊙

Petala *ſubrotundo-truncata apice dentata*. Styli *breviſſimi*. Capſula *hirſuta*. W.

*46. EUPHORBIA *picta*.

E. dichotoma, foliis ovatis hirſutis petiolatis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris, petalis ovatis, capſulis glabris. W.

E. (*picta*) dichotoma villoſa, foliis repandis ovatis pictis acutis, pedunculis unifloris ſolitariis, caule erecto. *Iacq. ic. rar. t.* 477. *Collect.* 3. *p.* 178. *

Habitat in inſula Venezula. ♃ (v. ſ.)

Folia *albo-maculata*. Petala *ovata integerrima alba*. Styli *ſex albi*. W.

47. EUPHORBIA *hirta.*

E. dichotoma, foliis ſerrulatis ovatis acuminatis, pedunculis capitatis axillaribus, caulibus piloſis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 114.* *Iacq. Collect. ſuppl.* 160. *t.* 11. *f.* 1.

E. inermis, foliis oppoſitis ovalibus ſerratis uniformibus, pedunculis capitatis axillaribus. *Fl. zeyl.* 197.*

E. reclinata minor ſubhirſuta, foliis ſerratis. *Brown. jam.* 234.

Tithymalus botryoides zeylanicus, cauliculis villoſis. *Burm. zeyl.* 223. *t.* 104.

Eſula eſculenta. *Rumph. amb.* 6. *p.* 54. *t.* 23. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. p. 7 50.

Knopförmige Wolfsmilch. W.

Habitat in India. ⊙

Planta Illuſt. Iacquini non eſt varietas ſequentis, differt enim: caule *proſtrato,* foliis *ſtrigoſo-piloſis non obliquis,* capitulis *florum ſemper ſolitariis.* W.

48. EUPHORBIA *pilulifera.*

E. dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis, pedunculis bicapitatis axillaribus, caule erecto. *Amoen. acad.* 3. *p.* 115. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 478 *Collect.* 2. *p.* 361.*

Tithymalus botryoides erectus, florum capitulis conjugatis et longiori pediculo inſidentibus. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 1. *Pet. gaz. t.* 80. *f.* 14.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 50.

Pillentragende Wolfsmilch. W.

Habitat in India. ⊙ (v. ſ.)

*49. EUPHORBIA *braſilienſis.*

E. ramoſiſſima dichotoma, foliis ellipticis oblongis oppoſitis ſerrulatis, racemulis terminalibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 420.*

Braſiliſche Wolfsmilch.

Habitat in Braſilia.

Caulis *herbaceus decempollicaris pubeſcens.* Folia *obliqua, ramea multo minora.* Corymbi *terminales.* Calyx *fuſco-ruber campanulatus.* Petala *ſubrotunda alba.* Germen *pubeſcens.* Lamarck. l. c.

50. EUPHORBIA *hyſſopifolia.*

E. dichotoma, foliis ſubcrenatis linearibus, floribus faſciculatis terminalibus, caule erecto. *Sp. pl.* 651.

E. dichotomo erecta tenuis, foliis linearibus, floribus quaſi umbellatis terminalibus. *Brown. jam.* 235.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 51.
Iſopblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in America.

51. EUPHORBIA *thymifolia.*

E. dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis, capitulis axillaribus glomeratis ſubſeſſilibus, caulibus procumbentibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 115.

Tithymalus foliis oppoſitis oblique cordatis obtuſis ſerratis, pedunculis multifloris. *Fl. zeyl.* 198.

Tithymalus indicus annuus dulcis, floribus albis, caulibus viridantibus et rubentibus. *Pluk. alm.* 272. *t.* 113. *f.* 2.

Tithymalus humilis ramoſiſſimus hirſutus, foliis thymi ſerratis. *Burm. zeyl.* 225. *t.* 105. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 51. *t.* 52. *f.* 1.
Thymianblättrige Wolfsmilch. W.

β. Euphorbia nodoſa. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 52. *t.* 52. *f.* 2.

Habitat in India. ☉ (v. ſ.)

52. EUPHORBIA *parviflora.*

E. ſubdichotoma, foliis ſerratis oblongis glabris, floribus ſolitariis, caule erectiuſculo alterne ramoſo. *Sp. pl.* 652.

Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis glabris integris. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 52.
Kleinblütige Wolfsmilch. W.
Habitat in India. ☉ (v. ſ.)

Folia *ſaepe macula fuſca.* Calyces *purpurei.* Petala *alba.*

53. EUPHORBIA *caneſcens.*

E. dichotoma foliis integris ſubrotundis piloſis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Sp. pl.* 652. *Cavan. ic.* 1. *p.* 46. *t.* 63.* *Iacq. Collect. ſuppl.* 115. *t.* 2 *f.* 3.*

Tithymalus exiguus villoſus nummulariae folio. *Tournef. inſt.* 87.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 53.
Graue Wolfsmilch. W.
Habitat in Hiſpania. ☉ (v. ſ.)

Affinis nimis E. Chamaeſyces, ſed tota undique albo-villoſa. Folia abſolete emarginata, obſolete crenata, In Siphilitide *infuſum.*

54. **EUPHORBIA** *Chamaeſyce.*

E. dichotoma, foliis crenulatis ſubrotundis glabris, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 115. * *Swartz obſ.* 196. * *Hoffm. germ.* 164. *Roth. germ. I.* 204. *II.* 523.

E. inermis, foliis oblique cordatis ſerrulatis uniformibus, ramis alternis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 198. * *Roy. lugdb.* 196. *Gmel ſib.* 2. *p.* 237. *Gron. orient.* 160.

E. minima rufeſcens, foliolis ſubrotundis nitidis oppoſitis, ramulis floriferis foliatis ad alas alternans. *Brown. jam.* 236.

Chamaeſyce. *Bauh. pin.* 293. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 187.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 53.

Niedrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Europae *auſtralis*, Sibiriae, Meſopotamiae et Indiae *occidentalis aridis.* ⊙ (v. ſ.)

Caulis *depreſſus*, *dichotomus.* Folia *oppoſita*, *ſubrotunda*, *laevia*, *ſubcrenulata*, *emarginata*, *baſi antica anguſtiore.* Flores *e dichotomia* Calyx *rufus.* Petala *alba*, *crenata.* Fructus *mihi laevis.*

*55. **EUPHORBIA** *granulata.*

E. foliis oppoſitis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Vahl. ſymb.* 2. *p* 54. *

E. (*granulata*) foliis oppoſitis oblongis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis. *Forſk. deſcr.* 94. *

Körnige Wolfsmilch. W.

Habitat in Arabia *felici.*

56. **EUPHORBIA** *Peplis.*

E. dichotoma, foliis integerrimis ſemicordatis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 115. *Gron. orient.* 163. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 54. *

E. (*dichotoma*) foliis oppoſitis integris lanceolatis ſeſſilibus. *Forſk. deſcr.* 93. *

E. foliis ſubrotundis obtuſis, floribus ſolitariis in foliorum alis. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 420.

Tithymalus Peplis. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 583.

Peplis maritima, folio obtuſo. *Bauh pin.* 293.

Peplis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 187. *Cam epit.* 970.

Peplion. *Dalech hiſt.* 970.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 54.

E 2

Meerſtrands-Wolfsmilch. W.
Habitat in Narbonae, Hiſpaniae, Carniolae *maritimis.* ⊙ (v. ſ.)

57. EUPHORBIA *polygonifolia.*
E. foliis oppoſitis integerrimis lanceolatis obtuſis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 116. * *Iacq. Collect. ſuppl.* 114. *t.* 13. *f.* 3. *
E. procumbens, ramulis alternis, foliis lanceolato-linearibus, floribus ſolitariis. *Gron. virg.* 58.
E. minima ramoſiſſima anguſtifolia. *Raj. ſuppl.* 431.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 54.
Knötrigblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in Canada, Virginia. ⊙

*58. EUPHORBIA *linearis.*
E. dichotoma, foliis oppſitis linearibus integerrimis, pedunculis ſolitariis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 32.
Linienblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in inſula St. Crucis. (v. ſ.)
Caulis *teres nudus articulatus dichotomus.* Folia *oppoſita anguſto-linearia biuncialia integerrima acumine parvo.* Petala *integra.* Capſulae *laeves.* Retz. l. c.

59. EUPHORBIA *graminea.*
E. dichotoma, foliis lanceolato-ellipticis petiolatis integerrimis, caule erecto, pedunculis dichotomis. *Mant.* 74.
E. (*graminea*) dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis lanceolatis, pedunculis dichotomis, caule erecto. *Iacq. amer.* 151. *obſ.* 1. *p.* 5. *t.* 31. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 55.
Wieſen-Wolfsmilch. W.
Habitat in Carthagenae *gramineis udis.*
Corollae *albae.*

60. EUPHORBIA *Ipecacuanhae.*
E. dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto. *Amoen. acad.* 3. *p.* 117. *
Tithymalus, flore exiguo viridi apicibus flavis, antequam folia emittit florens. *Gron. virg.* 58.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 55.
Brechenmachende Wolfsmilch. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♃

61. EUPHORBIA *portulacoides.*

E. dichotoma, foliis integerrimis ovalibus retuſis, pedunculis axillaribus unifloris folia aequantibus, caule erecto. *Amoen. acad.* 3. *p.* 117. *

Tithymalus perennis, portulacae folio. *Few. peruv.* 707. *t.* 2.?

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 56.

Portulacblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Philadelphia. *Kalm.* ♃

*62. EUPHORBIA *adiantoides.*

E. ramoſiſſima, ramis alternis filiformibus dichotomis, foliis ovalibus et rhombeo-ſubrotundis, petiolis pedunculisque capillaceis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 422.

Krullfarrenartige Wolfsmilch. W.

Habitat in Peru.

Planta *tenera facie Adianti Capilli Veneris.* Caulis *pedalis tenuis glaber, ramis alternis filiformibus et dichotomis.* Folia *glabra integerrima petiolo longo capillari ſuffulta, caulina alterna elliptica et majora; ramea oppoſita rhombeo-ſubrotunda ſetaceo-mucronata.* Pedunculi *ſolitarii uniflori terminales capillares in ultima ramorum dichotomia.* Calyces *turbinati ciliati.* Capſulae *globoſae trigonae pubeſcentes.* Lamarck. l. c.

63. EUPHORBIA *myrtifolia.*

E. dichotoma, foliis integerrimis ſubrotundis emarginatis ſubtus incanis, floribus ſolitariis, caule erecto. *Sp. pl.* 643. *Swartz obſ.* 197. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 56.

Myrtenblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat ad Jamaicae *montibus frigidioribus.* ♄

*64. EUPHORBIA *imbricata.*

E. umbella dichotoma bifida, involucellis ſubrotundis mucronatis, foliis obovatis imbricatis ſerrulatis, caule fruticuloſo. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 54.

Dachziegelblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Luſitania. ♄

Fruticulus *palmaris vel parum ultra baſi ramoſus, rami ſimplices teretes foliis tecti, denticulati, poſt caſum foliorum glabri uti tota planta.* Folia *ſeſſilia conferta, undique imbricata cuneata parva bilinearia mucronata: ſuperne denticulata, inferne integerrima.* Umbella *terminalis bis bifida.* Involucra *pentaphylla oblonga*

integerrima. Involucella *diphylla rotundiora.* Petala *integerrima.* Stamina *numeroſa:* Filamenta *albida.* Vahl. l. c.

*65. EUPHORBIA *elliptica.*

E. ſubpubeſcens, foliis alternis ovato-ellipticis ſubdentatis petiolatis ſummis oppoſitis, umbella bifida. *Lamarck. encycl.* 2. *p* 422.*

Elliptiſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Peru ⊙

Caulis *ſesquipedalis et ultra, erectus ſimplex vel ramoſus ſtriatus.* Folia *ſesquipollicaria elliptica ſubdentata pubeſcentia, ſuperiora oppoſita.* Involucella *baſi rubro-maculata.* Umbella *bifida vel potius racemi bini approximati breves, interdum et tertius racemus vel ramus umbellae accedit, tunc rami ſunt parum alterni.* Pedunculi *breviſſimi.* Capſulae *glabrae.* Lamarck. l. c.

*66. EUPHORBIA *rubra.*

E. umbella bifida ſimplici terminali, foliis cuneiformi-obcordatis imbricatis. W.

E. (*rubra*) foliis cuneatis emarginatis imbricatis, umbellis bifidis, corollis pentapetalis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 21. *t.* 34. *f.* 1.*

Euphorbia exigua. γ. *Sp. pl.* 654.

Tithymalus exiguus ſaxatilis. *Bauh. pin.* 291. *prodr.* 132. *Magn. monſp.* 259. *t.* 258. *Burſ. XVI.* 55.

Rothe Wolfsmilch. W.

Habitat in collibus Hiſpania *et* Galliae *auſtralis.* ⊙

Tota planta rubeſcens. Petala *lunata rubra.* W.

*67. EUPHORBIA *herniariaefolia.* W.

E. umbella trifida ſimplici, foliis ſubrotundo-ovatis acutis pubeſcentibus imbricatis. W.

Tithymalus creticus ſupinus herniariae folio. *Tournef. cor.* 1.

Bruchkrautblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Creta (v. ſ.)

Caulis *ſemipedalis et ultra ramoſus, ut videtur decumbens.* Rami *alterni teretes pubeſcentes.* Folia *conferta fere imbricata ſuboppoſita, vix manifeſta petiolata, parva Herniariae, ovata acuta utrinque pubeſcentia.* Umbella *ſeſſilis terminalis ſimpliciſſima trifida.* Involucrum *triphyllum foliolis forma foliorum caulinorum ſed majoribus.* Involucella *diphylla.* Capſulae *pubeſcentes.* W.

* * * * *Umbella trifida.*

68. EUPHORBIA *Peplus.*

E. umbella trifida: dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 117.* *Gmel. ſib.* 2. *p.* 236. *Pollich. pal. n.* 455. *Retz. obſ.* 3. *p.* 32. *Hoffm. germ.* 164. *Roth. germ. I.* 204. *II.* 524.

Tithymalus foliis rotundis, ſtipulis floralibus cordatis, petalis argute corniculatis. *Hall. helv. n.* 1049.

Euphorbia foliis obverſe ovatis integerrimis, umbella univerſali trifida triphylla, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Fl. ſuec.* 437, 426.* *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 156.

Peplus ſ. Eſula rotunda. *Bauh. pin.* 292. *Lob. ic.* 362.

Peplus. *Fuchſ. hiſt.* 603. *Dod. pempt.* 375. *Tabernaem.* 597.

β. Peplis minor. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 670.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 57.

Garten-Wolfsmilch. W.

Habitat in Europae *cultis oleraceis.* ⊙ (v. v.)

Petala *lunata.*

Varietas β. *venit in hortis noſtris ſub nomine E. minimae, ſed mihi non diverſa videtur, licet duplo ſit minor.* W.

69. EUPHORBIA *falcata.*

E. umbella trifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis mucronatis, foliis lanceolatis obtuſiuſculis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 118. *Pollich. pal n.* 456. *Iacq. auſtr. t.* 121. *Hoffm. germ.* 164. *Roth. germ. I.* 204. *II.* 524.

Tithymalus annuus ſupinus, folio rotundiore acuminato. *Tournef. inſt.* 87.

Pithyuſa minor ſubrotundis et acutis foliis. *Barrel. ic.* 751.

Tithymalus Eſula exigua chalepenſis ramoſior, foliis latioribus lintriformibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 339.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 58.

Zugeſpitzte Wolfsmilch. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙ (v. ſ.)

70. EUPHORBIA *exigua.*

E. umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 118.* *Pollich. pal.* 457. *Flor. dan. t.* 592. *Weig. obſ. bot. p.* 31. *Hoffm. germ.* 164. *Roth. germ. I.* 205. *II.* 525.

Tithymalus foliis linearibus, ſtipulis lanceolatis ariſtatis. *Hall. helv. n.* 1048.

α. Euphorbia *exigua, acuta.*

E. inermis, foliis alternis linearibus acutis, umbella univerſali trifida, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 143.* *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 157. *Gort. gelr.* 304.

Tithymalus ſ. Eſula exigua. *Bauh. pin.* 291.

Eſula minima Tragi. *Dalech. hiſt.* 1656.

β. Euphorbia *exigua, retuſa.*

E. (*retuſa*) foliis lineari-retuſis, involucellis lanceolatis. *Cavan. ic.* 1. *p.* 21. *t.* 34. *f.* 3*

Tithymalus ſ. Eſula exigua, foliis obtuſis. *Buh. pin.* 291. *prodr.* 132.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 59.

Kleine Wolfsmilch. W.

Habitat in Luſatia, Gallia, Helvetia, Hiſpania *inter ſegetes*; β. Monſpelii, Hiſpaniae in ſaxoſis. ⊙ (v. v.)

Petala *lunata.* Fructus laevis.

Umbella *ſaepe* 4-*et* 5-*fida.* Weig. l. c.

*71. EUPHORBIA *obliterata.*

E. umbella trifida, foliis oblongis trapezoideis ſerratis pubeſcentibus, altera baſeos parte obliteratis. *Swartz prodr.* 76. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 872.*

E. (*obliterata*) umbella trifida, foliis oblongis ſerratis, altera baſeos parte obliteratis. *Iacq. amer.* 151.

Schiefe Wolfsmilch. W.

Habitat in ſiccis arenoſis maritimis Jamaicae, Hiſpaniolae.

Planta caulibus *hirſutis lacteſcentibus*, foliis *apice attenuatis.* Iacq. l. c.

Flores *conferti terminales.* Umbella *trifida parva, floribus confertis minutis vireſcentibus.* Involucellum *nullum.* Germina *hirſuta.* Swartz l. c.

*72. EUPHORBIA *ſpathulata.*

E. umbella trifida dichotoma, foliis alternis oblongo-ſpathulatis ſubſerratis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 424.

Spathelblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Braſilia *in* Monte Video.

Planta *glabra, videtur herbacea, pedalis et ultra, ramis brevibus alternis inſtructa.* Folia *alterna ſeſſilia oblongo-ſpathulata ſubſerrata glabra vix uncialia.* Umbella *trifida bis vel ter dichotoma.* Involucrum *tri-*

phyllum, foliolis ovalibus obtuſis. Involucella *ut involucrum ſed minora et acuminata.* Capſulae *glabrae.* Lamarck. l. c.

*73. EUPHORBIA *micrantha.*

E. umbella trifida dichotoma, foliis lanceolato-obvatis ſerratis, involucellis cordatis, petalis integris, capſulis verrucoſis. W.

Euphorbia micrantha. *Stephan. in Litt.*

Feinblütige Wolfsmilch. W.

Habitat in Perſia *boreali.* ⊙ (v. ſ.)

Caulis *teres ſimpliciſſimus pedalis glaber.* Folia *alterna obovato-lanceolata acuta glabra argute ſerrata.* Umbella *trifida dichotoma.* Involucrum *triphyllum ut folia caulina.* Involucella *cordata mucronata ſerrata.* Flores *parvi.* Petala *integra.* Capſula *punctis elevatis obſita.* W.

*74. EUPHORBIA *dracunculoides.*

E. umbella trifida dichotoma, foliis ſparſis linearibus longis integerrimis, involucris et involucellis foliis ſimilibus. *Lamarck. encycl. 2. p. 424.*

Langblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in inſula Mauritii. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *ſex-vel octouncialis ſimplex undique foliis obſitus.* Folia *ſparſa linearia integerrima glabra erecta bipollicaria et binas lineas lata, obtuſa.* Involucrum *et* involucella *foliis ſimilia ſed breviora et acutiora.* Flores *in dichotomia umbellae ſeſſiles.* Capſulae *glabrae.* Lamarck. l. c.

75. EUPHORBIA *tuberoſa.*

E. umbella trifida, involucro tetraphyllo, caule nudo, foliis oblongis emarginatis. *Amoen. acad. 3. p. 117.*

E. inermis, foliis oblongis obtuſis emarginatis. *Roy. lugdb.* 199.

Tithymalus humilis, folio lapathi. *Buxb. cent. 2. p. 27. t. 23.*

Tithymalus tuberoſus acaulos, foliis oblongis cucullatis et planis. *Burm. afr. 9. t. 4.*

Tithymalus africanus humilis, foliis latioribus oblongis tuberoſa radice. *Raj. ſuppl.* 933.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 60.

Knollige Wolfsmilch. W.

Habitat in Aegypto *et* Aethiopia. ♄

* * * * * *Umbella quadrifida.*

76. EUPHORBIA *Lathyris.*

E. umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 120.* *Mat. med.* 121. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 230. *Mill. dict. n.* 18. *Hoffm. germ.* 165. *Roth. germ. I.* 205. *II.* 526.

Tithymalus foliis ellipticis, ſtipulis umbellaribus, quaternis, petalis bicornibus ſucciferis. *Hall. helv. n.* 1044.

E. inermis, foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, umbella univerſali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. *Hort. upſ.* 140.

E. inermis, foliis oppoſitis lanceolatis, umbella univerſali trifida polyphylla, partialibus triphyllis reliquis diphyllis. *Hort. cliff.* 198. *Roy. lugdb.* 196. *Dalib. pariſ.* 155.

Lathyris major. *Bauh. pin.* 293.

Lathyris. *Cam epit.* 968. *Fuchſ. hiſt.* 454. *Mathiol. p.* 1259. *Blackw. t.* 123.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 60.

Kreuzblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Gallia, Italia, Helvetia, Germania, Carniolia *ad agrorum margines.* ♂ (v. v.)

77. EUPHORBIA *terracina.*

E. umbella quadrifida: dichotoma, foliis alternis lanceolatis retuſis mucronatis. *Sp. pl.* 654.

E. umbella quadrifida: bifida, foliolis cuneiformi-linearibus tridentatis. *Allion. corſ.* 209. *t.* 3.?

Tithymalus marinus, folio retuſo, terracinus. *Barr. ic.* 833.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 62.

Spaniſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Hiſpania. *Allſtraemer.* ⊙

Caulis *herbaceus, ultra ſemipedalis, teres.* Folia *alterna, lanceolata, laevia, obliqua, margine ſcabriuſcula, apice retuſa et quaſi truncata mucrone reflexo.* Involucrum *ſubquadriphyllum: foliolis oblongo-ovatis, obtuſis, folio latioribus, vix ſerratis.* Involucella *ovata, baſi truncata.* Petala *flaveſcentia, bi-ſ. tridentata.* Fructus *glabri. Ex inferioribus alis foliorum ramuli ſteriles. Figura* Foliorum *ad Euph. exiguam retuſam prope accedit, ſed in illa lineam lata, huic digiti magnitudine.*

*78. EUPHORBIA *diffuſa.*

E. umbella quadrifida dichotoma, involucellis obtuſis, foliis alternis lineari-cuneiformibus emarginatis mucronatis; caule ramoſo diffuſo. W.

H. (*diffuſa*) umbella quadrifida vel quinquefida dichotoma, caule diffuſiſſimo, foliis cuneiformibus integerrimis alternis. *Iacq. ic rar.* 1. *t.* 88. *Miſc.* 2. *p.* 311. * *Hoſt. ſynop.* 260. *

Vieläſtige Wolfsmilch. W.

Habitat in Auſtriae *arvis.* ⊙

Valde affinis E. exiguae E. *retuſae, ſed excepto numero variante radiorum umbellae diſtincta involucellis obtuſis; a praecedente magnitudine, foliis glabris et habitu diverſa.* W.

79. EUPHORBIA *Apios.*

E. umbella quadrifida: bifida, involucellis reniformibus: primis obcordatis. *Syſt. veg.* 375.

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis obcordatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 120. *Sp. pl.* 2. *p.* 656. *Mill. dict. n.* 26.

Tithymalus tuberoſa pyriformi radice. *Bauh. pin.* 292.

Tithymalus tuberoſa radice. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 190.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 63.

Cretiſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Creta. ♃

Rami *ſteriles*, Foliis *lineari-lanceolatis obtuſis*: Floriferi *vero ſubrotundo-ovatis.* Umbella 4-*fida*, 2-*fida*, *nec ultra.* Involucrum *univerſale* 4-*phyllum*: *foliolis ſubrotundis, vix acutis.* Involucella *priora foliolis obcordatis; poſteriora reniformibus, vix mucronatis.*

*80. EUPHORBIA *laeta.*

E. umbella quadri-vel quinquefida, bis dichotoma, involucellis primis oblongis, ſuperioribus rhombeo-ſubrotundis, foliis lineari-lanceolatis ſubemarginatis integerrimis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 141.

E. (*divaricata*) umbella trifida vel quadrifida, caule fruticoſo dichotomo. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 87. *Collect.* 1. *p.* 58. *

Seidelbaſtblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat - - - - ♄ (v. ſ.)

Tota planta glabra. Caulis *fruticoſus teres laevis.* Folia *ſparſa ſeſſilia ſesquiuncialia.* Involucra *univerſalia foliis ſimillima.* Involucella *primae dichotomiae*

ovali-oblonga ſubemarginata foliis dimidio breviora; involucella ſecundae dichotomiae et floralia elliptico-ſubrotunda emarginata. Ait. l. c.

* * * * * * *Umbella quinquefida.*

81. EUPHORBIA *geniſtoides.*

E. umbella quinquefida bifida, involucellis ovatis, foliis linearibus erectis, caule fruteſcente. *Mant.* 564. *Berg. cap.* 146.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 64.

Ginſterartige Wolfsmilch. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei ♄

Frutex *erectus: ramis alternis, ſtrictis, ſimpliciſſimis, brevioribus, etiam apice floriferis.* Folia *linearia, confertiuſcula, erecta, glabra, integerrima, parva (minora reliquis, nec majora E. exiguae.)* Umbellae *terminales, ſeſſiles.* Involucrum *teraphyllum: foliolis lanceolatis, longitudine Umbellae quinquefidae.* Involucella *diphylla, ovato-rhombea.* Umbellula *bifida, nec ultra.* Petala *lunata.* Capſulae *glabrae.*

82. EUPHORBIA *ſpinoſa.*

E. umbella ſubquinquefida ſimplici, involucellis ovatis: primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoſo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 120 *

E. inermis fruticoſa, foliis lanceolatis integerrimis, floribus ſolitariis terminalibus, involucris triphyllis. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 196.

E. inermis fruticoſa, ramis ſiccis pungens, foliis ad umbellas ternis ſaepius ovatis, floribus ſolitariis. *Sauv. monſp.* 51.

Tithymalus raguſinus, flore luteo pentapetalo. *Herm. lugdb.* 600. *t.* 601.

Tithymalus maritimus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 291.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 64.

Dornige Wolfsmilch. W.

Habitat in Cretae *et* Galloprovinciae *montibus maritimis.* ♄ (v. ſ.)

Flores *ſaepius ſolitarii.* Capſulae *verrucoſae.* Petala *rotunda.* Rami *ſeneſcentes ſicci et aridi perſiſtunt. unde quaſi ſpinoſa apparet.*

Raguſinam *Hermanni 5-petalam, a ſpinoſa 4-petala diſtinguit Moriſonus; mihi altera tantum viſa.*

83. EUPHORBIA *epithymoides.*

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis denticulatis, foliis integerrimis lanceolatis obtuſis retuſis ſubtus villoſis, capſulis papilloſo-hiſpidis. W.

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis obtuſis ſubtus villoſis. *Sp. pl.* 656. *Iacq. auſtr. t.* 344.

Tithymalus epithymi fructu. *Col. ecphr.* 2. *p.* 52. *t.* 51.

Peplios altera ſpecies. *Bauh. pin.* 292.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 65.

Gelbblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Italia, Auſtria. ♃ (v. ſ.)

Accedit ad E dulcem, ſed Folia magis margine ſcabra et ſubtus villoſa. Fructus hiſpidi, ſetis ſubulatis purpuraſcentibus adſperſi.

*84. EUPHORBIA *villoſa.*

E. umbella quinquefida: ſubtrifida, involucellis ovatis acutis ſubdenticulatis, foliis lanceolatis acutiuſculis margine ſcaberrimis ſubtus villoſis, capſulis glabris verrucoſis. W.

Euphorbia villoſa. *Waldſtein et Kitaibel pl. rar. hung.*

Vielhaarige Wolfsmilch. W.

Habitat in pratis humidis Hungariae. ♃ (v. ſ.)

Maxime affinis praecedenti, convenit enim habitu, *petalis integerrimis foliisque ſeſſilibus integerrimis, at differt:* foliis *acutiuſculis margine ſcaberrimis, radiis umbellae ſubtrifidis* involucellis *acutis, et* fructu *verrucoſo nec papillis elongatis obſito.* W.

Ab E. amygdaloide pro qua vulgo habetur abunde diverſa, involucellis *omnino diſtinctis nec baſi connatis.* Involucella *primae diviſionis umbellae ſunt terna, ultimae vero bina.* W.

85. EUPHORBIA *dulcis.*

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis ſubovatis denticulatis, foliis lanceolatis obtuſis apice denticulatis, capſulis verrucoſis piloſis. W.

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis ſubovatis, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 122. *Iacq. auſtr. t.* 213. *Kniph. cent.* 12. *n.* 42. *Hoffm. germ.* 165. *Roth. germ. I.* 205. *II.* 527.

E. (*dulcis*) umbella quinquefida: bifida, involucellis cordatis denticulatis, foliis lanceolatis ſubintegerrimis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 55?

Tithymalus foliis ellipticis ſerratis, ſtipulis umbellaribus quinis, floralibus fructu aſperrimo. *Hall. helv. n.* 1051. R.
Tithymalus montanus non acris. *Bauh. pin.* 292.
Tithymalus dulcis tuberoſa radice. *Barr. ic.* 909.
Pithyuſa ſ. Eſula minor altera, floribus rubris. *Lob. ic.* 358.
Eſula ſoliſequa. *Riu. t.* 117. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 65.
Süſse Wolfsmilch. W.
Habitat in Germaniae, Helvetiae, Galliae, Italiae *umbroſis* ♃ (v. v.)

Involucella *ſubtiliſſime ſerrata.* Fructus *ruber, muricatus.* Petala *integra.* Variat *foliis villoſis.* Exſiccatione *nigra evadit.*

Primo vere ante evolutionem umbeliae nigreſcit, nec poſtea: Folia *apice denticulata ſubtus pilis raris obſita.* Capſulae *juniores piloſae, adultae verrucoſae interſperſis pilis tectae.* Petala *ut in omnibus affinibus ſunt integra, nec bicornia, ut Clariſſ. Vahl autumat.* W.

*86. EUPHORBIA *ambigua.*

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis obtuſis integerrimis, foliis lanceolatis obtuſis integerrimis, capſulis glabris verrucoſis. W.
Euphorbia ambigua. *Waldſtein et Kitaibel pl. rar. hung.*
Zweifelhafte Wolfsmilch. W.
Habitat in Hungaria. (v. ſ.)

Valde affinis praecedenti sed differre vedetur: foliis *glabris integerrimis*, involucellis *non denticulatis*, capſulis *glabris.* W.

*87. EUPHORBIA *carniolica.*

E. umbella quinquefida: bifida, radiis nutantibus involucellis ovatis integerrimis, foliis lanceolatis acutis integerrimis, capſulis glabris verrucoſis. W.
E. (*carniolica*) umbella quinquefida, radiis nutantibus, involucris, involucellis et foliis lanceolatis. *Iacq. auſt. t.* 14. *Hoſt. ſynop.* 262.*
Tithymalus piloſus. *Scop. carn. n.* 576. *t.* 21.
Kraienſche Wolfsmilch. W.
Habitat in Carnioliae *ſylvaticis alpinis.* ♃ (v. ſ.)

Ab affinibus ſatis diſtincta radiis *umbellae nutantibus.* Folia *ſubtus ut in E. dulci pilis raris tecta.* W.

*88. EUPHORBIA *angulata*.

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis rhombeo-ovatis denticulatis, foliis lanceolatis obtuſis denticulatis, capſulis glabris verrucoſis, caule ſulcato. W.

E. (*angulata*) umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis, caule ſtriato-angulato. *Iacq. ic. rar. t.* 481. *Collect.* 2. *p.* 309.*

Geſtreifte Wolfsmilch. W.

Habitat in Auſtria. ♃ (v. ſ.)

Nimis affinis E. ambiguae, quae et caule angulato gaudet, ſed haec differt: involucellis rhombeo-ovatis denticulatis ut et foliis denticulatis. Folia *ſunt ſubtus pilis ſparſis obſita.* W.

Conveniunt inter ſe ſpecies 82. 83. 84. 85. 86. 87. *ut vix limites obſerventur.* W.

89. EUPHORBIA *Pithyuſa*.

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis involutis retrorſum imbricatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 122.

Tithymalus Pithyuſa. *Scop. carn. n.* 575.

Tithymalus foliis brevibus aculeatis. *Bauh. pin.* 292.

Pithyuſa. *Dalech. hiſt.* 1652.

Tithymalus maritimus, juniperi folio. *Bocc. ſic.* 9. *t.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 337. *ſ.* 10. *t.* 1. *f.* 25.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 66.

Wachholderartige Wolfsmilch. W.

Habitat in arenoſis Hiſpaniae, Italiae, Carnioliae, Maſſiliae. ♃ (v. ſ.)

90. EUPHORBIA *portlandica*.

E. umbella quinquefida: dichotoma, involucellis ſubcordatis concavis, foliis lineari-lanceolatis acutis glabris patentibus. *Sp. pl.* 656. *Hudſ angl.* 183.

Tithymalus montanus, eſulae, folio minor italicus. *Barr. ic.* 822.

Tithymalus maritimus minor. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 313. *t.* 24. *f.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 67.

Engliſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Angliae *comitatu Devonſhire.* ♄ (v. ſ.)

Caules *fruticuloſi, palmares, glabri, teretes, hyeme rubri.* Folia *alterna, ſubſeſſilia, lineari-lanceolata, mucronata, glabra, patentia, baſi ſubtus rubra.* Ramuli *laterales: ex alis inferioribus ſteriles, demum*

excreſcentes et caulem inumbrantes. Umbellae *terminales, quinquefidae, dichotomae, patentes.* Involucrum *foliis ſimile.* Involucella *ſubcordata, concava, mucronata.* Flores *ſubſeſſiles, lutei: Primi et ſecundi maſculi: Petalis muticis, obtuſiſſimis; Reliqui hermaphroditi: Petalis bicornibus.* Fructus *glabri angulis muricatis.*

*91. EUPHORBIA *ſaxatilis.*

E. umbella quinquefida: bifida, involucris cordatis, involucellis reniformibus mucronatis, foliis ſpathulato-linearibus emarginatis aveniis. W.

E. (*ſaxatilis*) umbella quinquefida: bifida, involucris et involucellis cordatis, foliis oblongis glabris. *Murr. ſyſt. veg.* 452. *Iacq. auſt. t.* 345. *Hoſt. ſynop.* 262.

Stein-Wolfsmilch. W.

Habitat in ſaxoſis Auſtriae. ♃ (v. ſ.)

Caules *digitales adſcendentes ſimplices plures e radice.* Folia *glauca avenia emarginata glabra, inferiora oblonga vel obovata.* Petala *obtuſe lunata.* Capſulae *glabrae.* W.

92. EUPHORBIA *Paralias.*

E. umbella ſubquinquefida: bifida, involucellis cordato-reniformibus, foliis ſurſum imbricatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 129. *Hudſ. angl.* 183. *Iacq. hort. t.* 188. *Hoffm. germ.* 165. *Roth. I.* 205. *II.* 527. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 128. *.

E. inermis, foliis ſetaceo-linearibus confertis, umbella univerſali multifida, partialibus ramoſe bifidis. *Hort. cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 193. *Gort. gelr.* 306. *Gron. orient.* 162.

Tithymalus floribus linearibus ariſtatis imbricatis, ſtipulis umbellaribus ovato-lanceolatis, floralibus cordatis. *Hall. helv. n.* 1055

Euphorbia umbella multifida: dichotoma, involucellis cordatis, foliis linearibus, capſulis glabris. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 435. *n.* 11. *ed.* 2. *n.* 581.

Tithymalus maritimus. *Bauh. pin.* 291. *Dod. pempt.* 370. *f.* 1. 2.

Tithymalus paralias. *Cam epit.* 962.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 68.

Dichtblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat in Europae *arena maritima.* ♃ (v. ſ.)

Petala *integra.* Planta *glauca.*

*93. EUPHORBIA *juncea.*

E. umbella quinquefida: dichotoma, foliis involucrisque lineari-lanceolatis acutis, involucellis ovato-oblongis acuminatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 142. *Iacq. hort. ſchoenb.* 1. *p.* 56. *t.* 107. *

Schlanke Wolfsmilch. W.

Habitat in inſula Porto Santo *prope* Maderam. ♃ (v. v.)

Folia *anguſta lineari-lanceolata, in ramis vero ſterilibus anguſtiſſime Pini.* Involucella *oblongo-ovata acuminata.* Flores *parvi.* Petala *ſubrotunda.* Styli *bifidi.* Stigmata *capitata.* Capſulae *glabrae.* W.

94. EUPHORBIA *aleppica.*

E. umbella quinquefida: dichotoma, involucellis ovato-lanceolatis mucronatis, foliis inferioribus ſetaceis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 122. *Mill. dict. n.* 27.

Tithymalus foliis inferioribns capillaceis: ſuperioribus myrto ſimilibus. *Moriſ. hiſt* 3. *p.* 338.

Tithymalus cypariſſius. *Alp. exot.* 65. *t.* 64.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 68.

Aleppiſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Creta, Aleppo. ♃ (v. ſ.)

Folia *inferiora confertiſſima lineari-lanceolata reflexa, ſuperiora lanceolata acuta patentia.* Involucra *et* Involucella *ovato-lanceolata mucronata.* Petala *obtuſe lunata.* Styli *ſimplices.* Stigmata *capitata.* Capſulae *glabrae.* W.

95. EUPHORBIA *pinea.*

E. umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis, foliis linearibus acuminatis confertis, capſulis laeviuſculis. *Syſt. veg.* 376.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 69.

Fichtenblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat

96. EUPHORBIA *ſegetalis.*

E, umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis: ſuperioribus latioribus. *Ger. prov.* 538. *Pall. it.* 1. *p.* 145. *Hoffm. germ.* 165. *Roth. germ. I.* 205. *II.* 528.

E. umbella quinquefida: dichotoma, involucellis cordatis acutis, foliis lineari-lanceolatis, ramis floriferis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 121.* *Hudſ. angl.* 182. *Sp. plant.* 2. *p* 657.

E. inermis, foliis alternis linearibus acutis, partialibus umbellae ovato-rhombeis, petalis bicornibus. *Hort. upſ.* 142.*

E. inermis, foliis linearibus acutis ad umbellam quinis iſoſcelibus, ad umbellulas ter dichotomas ovato-trigonis. *Sauv. monſp.* 46.
Tithymalus annuus, lunato flore, linariae folio longiore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 339. *ſ.* 10. *t.* 2. *f.* 3.
Tithymalus ſegetum longifolius. *Raj. angl.* 3. *p.* 312.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 69.
Acker-Wolfsmilch. W.
Habitat in Mauritania, Ruſſia, Anglia, Gallia, Germania. ⊙ (v. v.)
Petala *lunata.* Fructus *laevis angulis ſcabris, umbella ſaepe longitudine totius plantae.* Involucella *fere ſemiorbiculata.* Rami *etiam floriferi infra umbellam.*

*97. EUPHORBIA *provincialis.* W.
E. umbella quinquefida: bifida, involucellis cordatis mucronatis, foliis oblongis. W.
Euphorbia ſeticornis. *Poiret. it. ed. germ. p.* 195.?
Provencer Wolfsmilch. W.
Habitat in Gallo-provinciae *collibus* ⊙ (v. v.)
Saepius hujus ſemina ſub nomine E. ſegetalis accepi, ſed pluribus notis diverſa eſt, nec cultura mutatur. Caulis *ſimplex pedalis et ultra, ramis aliquot ſterilibus in foliorum axillis ſuperioribus inſtructus.* Folia *ſeſſilia oblonga glabra integerrima obtuſa ſubmucronata.* Umbella *quadri-vel quinquefida tantum bifida nec dichotoma.* Involucrum *pentaphyllum, foliis ovatis acutis.* Involucella *cordata mucronata, lobis baſi ſaepius mucrone donatis.* Petala *roſtrato-lunata.* Styli *bifidi.* Capſulae *omnino laeves, nec angulis ſcabrae.* W.

98. EUPHORBIA *helioſcopia.*
E. umbella quinquefida: bifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis glabris, capſulis laevibus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 55.
E. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 124.* *Pollich. pal. n.* 458. *Kniph. cent.* 12. *n.* 43. *Flor. dan. t.* 725. *Roth. germ. I.* 206. *II.* 529. *Hoff. germ.* 166.
E. foliis crenatis, umbella univerſali quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *Hort. cliff.* 198. *Fl. ſuec.* 436. 425. *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 156.
E. inermis, foliis ſubrotundis crenatis. *Fl. lapp.* 220.
E. umbella quinquefida, trifida: dichotoma, involucellis

ovatis, petalis ſubrotundis, capſulis glabris. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 434. *n.* 9. *ed.* 2. *n.* 579. *ſub.* Tithymalo.
Tithymalus foliis petiolatis, ſubrotundis, ſerratis, ſtipulis rotundis ſerratis. *Hall. helv. n.* 1050.
Tithymalus helioſcopius. *Bauh pin.* 291. *Fuchſ. hiſt.* 811. *Camer. epit.* 963. *Dodon. purg.* 145.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 70.
Sonnenzeiger-Wolfsmilch. W.
Habitat in Europae *cultis.* ☉ (v. v.)
Umbellae radii bis trifidi, dichotomi et involucra foliis ſimila. Petala *integra.* Fructus *laevis.*

99. EUPHORBIA *pubeſcens.*

E. umbella quinquefida: trichotoma, involucellis ſemicordatis, foliis cuneiformibus piloſis ſerrulatis, capſulis muricatis. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 55. *
Tunetaniſche Wolfsmilch. W.
Habitat in cultis Tuneti. (v. ſ.)
Primo intuitu ita ſimilis E. helioſcopiae, ut eandem diceres, folia *enim et modus creſcendi omnino idem; differt vero:* caule *ſuperne,* foliis, pedunculis *et* pedicellis *villoſis,* capſulisque *e tuberculis parvis muricatis.* Vahl l. c.

100. EUPHORBIA *ſerrata.*

E. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis diphyllis reniformibus, foliis amplexicaulibus cordatis ſerratis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 125. * *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 55. * *Iacq. ic.* 3. *t.* 384. *Collect.* 2. *p.* 310. *
E. inermis foliis denticulatis caulinis lanceolatis, umbellarum cordatis. *Hort. cliff.* 200. *Hort. upſ.* 141. * *Roy. lugdb.* 197.
Tithymalus characias, folio ſerrato. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus myrtites valentinus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 189.
β. E. (*retuſa*) umbella trifida, dichotoma, involucris lanceolatis, foliis linearibus retuſis denticulatis, inferioribus minoribus. *Forſk. deſcr.* 93. *Icon. t.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 71.
Geſägte Wolfsmilch. W.
Habitat in Narbona, Hiſpania, Italia, Oriente. ☉ (v. ſ.)

101. EUPHORBIA *verrucoſa.*

E. umbella quinquefida: ſubtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis ſerrulatis villoſis, capſulis verrucoſis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 120. * *Hudſ. angl.* 183. *Hoffm. germ.* 166. *Roth. germ. I.* 206. *II.* 630.

Tithymalus foliis ellipticis ſerratis, ſtipulis umbellaribus quinis, floralibus obtuſe quadrangulis, fructibus undique exaſperatis. *Hall. helv. n.* 1052.

E. inermis, foliis linearibus, umbella univerſali trifida, triphylla, partialibus trifidis, propriis dichotomis diphyllis, foliolis ſubrotundis. *Guett. ſtamp.* 269. *Dalib. pariſ.* 154.

Tithymalus myrſinites, fructu verrucae ſimili. *Bauh. pin.* 291. *Moriſ. hiſt. ſect.* 10. *t.* 3. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 72.

Warzige Wolfsmilch. W.

Habitat in Gallia, Helvetia, Italia, Oriente. ♂

Fructus verrucoſus ſimulque villoſus. Petala *integra.* Caules *decumbentes.*

*102. EUPHORBIA *glauca.*

E. umbella ſubquinquefida: trifida, involucris et involucellis ovatis, foliis ſparſis oblongo-lanceolatis integerrimis, caule fruteſcente. *Forſt. prodr. n.* 208.

Meergrüne Wolfsmilch. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

*103. EUPHORBIA *punicea.*

E. umbella quinquefida; trifida, involucellis ovalibus acuminatis coloratis, capſulis glabris, foliis obovato-lanceolatis ſubtus glaucis. *Swartz prodr.* 76. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 873.* *Ait.* 2. *p.* 143. *Smith. ic. pictae.* 3. *tab.* 3.* *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 484. *Collect.* 2. *p.* 179.*

Schoengefärbte Wolfsmilch. W.

Habitat in petroſis montoſis Jamaicae *interioris.* ♄ (v. ſ.)

104. EUPHORBIA *corollata.*

E. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis foliisque oblongis obtuſis, petalis membranaceis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 122.

E. inermis, foliis lanceolatis obtuſis alternis, ramis floriferis dichotomis, petalis maximis ſubrotundis. *Gron. virg.* 58.

Tithymalus marianus, anguſtis rigidis foliis, ſummo caule ramoſus, foliis atque ramulis ad divaricationes ternis, *Pluk. mant.* 182. *t.* 446 *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 73.

Groſsblütige Wolfsmilch. W.

Habitat in Virginia, Canada.

105. EUPHORBIA *corallioides.*

E. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucel-

lis ovatis, foliis lanceolatis, capſulis lanatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 123. *

E. inermis fruticoſa, foliis lanceolatis, involucro univerſali quinquefido, partialibus trifidis, reliquis bifidis. *Hort. upſ.* 142. * *Roy. lugdb.* 198.

Tithymalus arboreus, caule corallino, folio hyperici, pericarpio barbato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 256.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 73.

Rothſtielige Wolfsmilch. W.

Habitat in Sicilia, Mauritania, Oriente. ♃

106. EUPHORBIA *piloſa.*

E. umbella quinquefida: trifida: bifida, involucris ovatis, petalis integris, foliis laceolatis ſupiloſis apice ſerrulatis. *Sp. pl.* 659.

E. foliis alternis ex ovali-lanceolatis, umbellis diphyllis ſubtrifloris, capſulis erectis muricatis, caule ſimplici. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 226. *t.* 93.

Tithymalus paluſtris villoſus mollior erectus. *Bar. rar.* 41. *t.* 885.

Tithymalus incanus hirſutus. *Bauh. pin.* 262? *prodr.* 135?

Tithymalus Characias pratenſis incanus. *Magn. monſp.* 255.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 74.

Rauhfrüchtige Wolfsmilch. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Habitus exacte E. paluſtris, ut facile pro eadem ſumeretur, eodemque tempore floret, paulo tamen major. Folia *lato-lanceolata, alterna, utrinque vix manifeſte piloſa, apice ita tenuiſſime ſerrata, ut vix obſerventur ſerraturae.* Umbellae *cum umbellulis lateralibus ita coacervatae, ut primaria difficilius eruatur; luteae petalis et involucris.* Flores *primarii maſculi pentapetali; reliqui hermaphroditi tetrapetali: petalis transverſe ovalibus.* Fructus *verrucuſi et pilis albis ſubtiliſſimis adſperſi.* Rami *ſteriles ex alis foliorum inferiorum, ut ex ſummis alis pedunculi umbelluliferi.*

*107. EUPHORBIA *orientalis.*

E. umbella quinquefida: quadrifida: dichotoma, involucellis ſubrotundis acutis, foliis lanceolatis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 123. *Mill. dict. n.* 23.

E. inermis, foliis lanceolatis, involucro univeſali quin-

quefido lanceolato, partiali tetraphyllo ſubrotundo, propriis diphyllis. *Roy. lugdb.* 198.
Tithymalus orientalis, ſalicis folio, caule purpureo, flore magno. *Tournef. cor.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 75.
Orientaliſche Wolfsmilch. W.
Habitat in Oriente.

*108. EUPHORBIA *ſquamoſa.* W.

E. umbella quinquefida, ſubtrifida: bifida, involucellis ſubrotundis mucronatis, foliis oblongis acutis ſubrepandis ſubtus pubeſcentibus, capſulis ſquamoſis. W.
Tithymalus orientalis latiſſimo folio, villoſus, flore lunato. *Tournef. cor.* 2.
Schuppige Wolfsmilch. W.
Habitat in Cappadocia. (v. ſ.)

Caulis *tenuiſſime pubeſcens laevis.* Folia *breviſſime petiolata oblongo-ovata acuta, margine ſubrepanda, ſubtus pubeſcentia.* Umbella *ampla divaricata quinquefida, radiis bi-ſ. trifidis dichotomis.* Involucri *folia iis caulis ſimilia ſed minora.* Involucella *primaria ſubrotundo-ovata acuta, ſecundae diviſionis vero ſubrotunda mucronata.* Petala *lunata.* Capſulae *ſquamis deciduis tectae, glabrae.* W.

109. EUPHORBIA *platyphyllos.*

E. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucris carina piloſis, foliis ſerratis lanceolatis, capſulis verrucoſis. *Syſt. nat.* 10. *p.* 1049. *n.* 42. 47. *Iacq. auſtr. t.* 376. *Schreb. ſpicil. p.* 8. *Pollich. pal. n.* 459. *Kniph. cent.* 9. *n.* 38. *Hoffm. germ.* 166. *Roth. germ. I.* 206. *II.* 531.
E. umbella quinquefida: ſubquadrifida: dichotoma, involucellis primariis tetraphyllis, foliis ſerratis lanceolatis ſeſſilibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 124.
E. inermis foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus ſubſerratis, umbella univerſali quinquefida pentaphylla, partialibus bifidis. *Hort. upſ.* 141. *
E. inermis, foliis lanceolatis, umbella univerſali partialiumque prima quinquefidis: ſecunda trifida: reliquis bifidis. *Roy. lugdb.* 198. *Dalib. pariſ.* 156.
Tithymalus foliis lanceolatis, ſerratis, ſtipulis floralibus cordatis, fructibus aſperis, lineis laevibus diviſis. *Hall. helv. n.* 1053.
Tithymalus arvenſis latifolius germanicus. *Bauh. pin.* 291. *Moriſ. hiſt. ſect.* 10. *t.* 3. *f.* 1.

Tithymalus platyphyllos. *Fuchſ. hiſt.* 813. *Cauſ. hiſt.* 3. *p.* 670.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 76.
Flachblättrige Wolfsmilch. W.
Habitat in agris Galliae, Angliae, Germaniae. ☉ (v. v.)

Caulis *erectus, pedalis, glaber.* Folia *alterna, remota, patentia, lanceolata, glabra, ſerrulata, carina villis rariſſimis: inferiora ſubpetiolata, verſus apicem latiora; ſuperiora baſi emarginata et ſupra baſin ad latera deflexa.* Involucrum *lanceolatum.* Involucella *partialia ovato-oblonga; reliqua ovato-cordata, omnia ſerrulata.* Petala *integra, ſuborbiculata, lutea.* Germina *obſcure verrucoſa. Ex alis foliorum umbellula trifida. Planta ſuperior viridi-flaveſcens.*

Tenellae *adhuc plantae foliis macula rubra e lineolis inſidet.*

*110. EUPHORBIA *literata.*

E. umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis lanceolatis denticulatis pubeſcentibus, capſulis glabris verrucoſis. W.

E. (*literata*) umbella quinquefida: trifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis ſubpiloſis obſolete ſerrulatis, petalis integris, radice annua. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 482. *Collect.* 2. *p.* 340. *

Rothſtreifige Wolfsmilch. W.
Habitat - - - ☉ (v. v.)

Folia *junioris plantae lineis rubris picta. Pro varietate praecedentis antea habui, ſed diverſa videtur* foliis *anguſtioribus pubeſcentibus,* habituque *tenniore. Ab E. piloſa diſtinctiſſima,* radice *annua,* foliis *anguſtioribus maculatis,* fructibusque *non piloſis.* W.

* * * * * * * *Umbella multifida.*

111. EUPHORBIA *Eſula.*

E. umbella multifida: bifida, involucellis ſubcordatis, petalis ſubbicornibus, ramis ſterilibus, foliis uniformibus. *Amoen. acad* 3. *p.* 127. *Pollich. pal n.* 460. *Hoffm. germ.* 166. *Roth germ I.* 206. *II.* 532.

Tithymalus foliis linearibus, petalis emarginatis. *Hall. helv. n.* 1046.

E. inermis, foliis lanceolato-linearibus involucri univerſalis foliis quinis ovato-acutis, partialis ſemiorbiculatis. *Hort. upſ.* 141. *Sauv. monſp.* 47.

E. inermis, foliis ligulatis ad umbellam quinis ovato-oblongis acutis, bracteis trigonis. *Sauv. monſp.* 51.?
Tithymalus foliis pini, forte Doſcoridis Pithyuſa. *Bauh. pin.* 292.
Eſula *Riv. tetr.* 227.
Eſula minor. *Dalech. hiſt.* 1653. *Dod. pempt.* 374. *Blackw. t.* 163 *f.* 1. 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 77.
Gemeine Wolfsmilch. W.
Habitat in Germania, Belgio, Gallio, Helvetia, Carniolia. ♃ (v. v.)

Flores *omnes fertiles*. Petala *flaveſcentia*, 4, *obſolete bicornia*. Fructus *glaber*. Umbellae *caulis laterales dichotomae*.

*112. EUPHORBIA *Gerardiana*.
E. umbella multifida dichotoma, involucellis ſubrotundis, petalis integerrimis ramis nullis. *Murr. ſyſt.* 454. *Iacq. auſt.* 5. *t.* 436. *Hoſt ſynop.* 265. *Hoff. germ.* 167.
E. (*Cajogala*) radice perenni, caule herbaceo, foliis alternis lineari-lanceolatis acutis mucronatis trinerviis, umbella multifida, involucri foliolis lato-lanceolatis, umbellulis dichotomis, involucellis diphyllis, foliolis lato-cordiformibus, petalis integris, fructu glabro. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 102* *Hoffm. germ.* 167.
E. umbella multifida: bifida, involucellis triangulari-cordatis, foliis ſuperioribus latioribus. *Ger. proo.* 540.
Tithymalus amygdaloides anguſtifolius. *Tabern. ic.* 541. *Vaill. pariſ.* 192.
Tithymalus maritimo affinis, lineariae folio. *Bauh. pin.* 291.
Gerardiſche Wolfsmilch. W.
Habitat ad fluviorum et lacuum ripas Galliae, Hannoverae, Mansfeldiae, Bohemiae, Auſtriae. ♃ (v. v.)

113. EUPHORBIA *Cypariſſias*.
E. umbella multifida: dichotoma, involucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus, foliis ſetaceis, caulinis lanceotis: *Amoen. acad.* 3. *p.* 127. *Weig. obſ. bot. p.* 31. *Hoff. germ.* 167. *Roth. germ. I.* 207. *II.* 532. *Pollich. pal. n.* 461. *Kniph. cent.* 12. *n.* 41. *Blackw. t.* 163. *f.* 3.
E. inermis, folius confertis linearibus, umbella univerſali multifida, partialibus dichotomis: foliolis ſubro-

tundis. *Hort. cliff.* 199.* *Hort. upſ.* 142.* *Roy. lugdb.* 197. *Dalib. pariſ.* 155. *Gort. gelr.* 105.

Tithymalus foliis linearibus, ſtipulis numeroſis, floralibus cordiformibus, petalis lunatis. *Hall. helv. n.* 1047

Tithymalus cypariſſius. *Bauh. pin.* 291. *Dalech. hiſt.* 1644.

Tithymalus cypreſſinus. *Tabern. hiſt.* 990.

Eſula degener. *Riu. Hoppe ectyp.* 560. *Hoffm. germ.* 168.

Tithymalus cypariſſias, foliis punctis croceis notatis. *C. B. pin.* 291.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 79.

Cypreſſen-Wolfsmilch. W.

Habitat in Germaniae, Bohemiae, Helvetiae, Gall. Narbonenſis *collibus, viis, ſiccis.* ♃ (v. v.)

Primo *vere umbella ſimilis E. Eſulae; at umbella marceſcente ramuli larerales foliis anguſtiſſimis filiformi-planis excreſcunt Pinum referentes.* Petala *lunata.* Fructus *laevis.* (*Multi capſulas verrucoſas dicunt, quas et ego in meis video.* R.)

*114. EUPHORBIA *nicaeenſis.*

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis cordato-ſubrotundis integerrimis, foliis lanceolatis mucronatis ſubcoriaceis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 63.*

E. umbella multifida; dichotoma, involucellis ſubrotundis cordatis mucronatis, foliis cuneiformibus integerrimis glabris. *Hoſt ſynop.* 267.

E. umbella quinquefida ad decemfidam: dichotoma, involucellis cordato-ſubrotundis, foliis lanceolato-ſpathulatis glaucis. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 485. *Collect.* 2. *p.* 324.*

E. glabra, caule ſubſimplici, umbella quinquefida: bifida, foliis ovatis, capſulis laevibus non ſulcatis. *Allion. ped. n.* 1039. *tab.* 69. *f.* 1.*

Nicaeenſiſche Wolfsmilch. W.

Habitat in comitatu Nicaeenſi, *in* Hiſpania *circa* Pampelonum, *inque* Auſtria *calidiore.* ♃ (v. ſ.)

Umbella *quinquefida, ſaepius vero multifida.* W.

115. EUPHORBIA *myrſinites.*

E. umbella ſuboctifida: bifida, involucellis ſubovatis, foliis ſpathulatis patentibus carnoſis mucronatis margine ſcabris. *Amoen. acad.* 3. *p.* 128.* *Mill. dict. n.* 19.

E. inermis, foliis ſuperioribus reflexis latioribus lanceolatis, umbella univerſali trifida, partialibus bifidis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 141.

E. inermis, foliis ligulatis ſpinula terminatis, ad umbellam duodenis, bracteis trigonis ſpinula terminatis. *Sauv. monſp.* 51.

Tithymalus myrſinites latifolius. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus myrſinites legitimus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 189.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 80.
Südliche Wolfsmilch. W.
Habitat in Calabria, Monſpelii. ♃ (v. ſ.)

Caules *multi, pedales, deflexi, virides, inferne a caſu foliorum cicatriſati.* Folia *alterna, ſpathulata, coriacea, concava, glauco-viridia, patentia, mucronata, margine ſubſcabra, ſuperiora reflexa.* Umbella 7-9 *fida, radiis ſemel bifidis.* Involucrum *univerſale foliolis* 7-9, *ovatis, tenuioribus, acutis;* Involucella *diphylla, ſubcordata latiora, concava, acuta, margine ſubſcabra.* Flores *intra involucella primaria et ſecundaria maſculi, reliqui hermaphroditi.* Calyces *ore ſerrati.* Petala 4, *flava, bicornia apicibus teretibus, nitentia.* Capſulae *glabrae.*

116. EUPHORBIA *paluſtris.*

E. umbella multifida, ſubtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus. *Amoen. acad.* 3. *p.* 126.* *Mat. med.* 121. *Mill. dict. n.* 22. *pall. it.* 1. *p.* 35. *Pollich. pal. n.* 462. *Hoff. germ.* 167. *Roth. germ. I.* 207. *II.* 534.

E. foliis lanceolatis, umbella univerſali multifida polyphylla: partialibus trifidis triphyllis; propriis dichotomis. *Hort. cliff.* 200. *Fl. ſuec.* 438, 427.* *Roy. lugdb.* 108. *Dalib. pariſ.* 153. *Gort. gelr.* 307.

Tithymalus foliis ellipticis, ramis umbellam ſuperantibus, capſulis exaſperatis. *Hall. helv. n.* 1054.

Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Bauh. pin.* 292. *Moriſ. hiſt. ſect.* 10. *t.* 2. *f.* 1.

Eſula major. *Dalech. hiſt.* 1653. *Dodon. purg. p.* 158.
Eſula paluſtris. *Riu. tetr.* 230.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 81.
Sumpf-Wolfsmilch. W.
Habitat in Suecia *auſtrali,* Germania, Belgio. ♃ (v. v.)
Petala *integra.* Fructus *verrucoſus.*

*117. EUPHORBIA *pallida.*

E. umbella multifida: trifida, involucellis ſubrotundis, foliis lanceolatis attenuatis, caule ſimplici, petalis bicornibus, capſulis glabris. W.

Euphorbia amygdaloides. *Lumnitz poſon n.* 468. *deſcriptio. nec diagnoſis.*

Bleiche Wolfsmilch. W.

Habitat in Hungariae *ſylvaticis ſiccis.* ♃ (v. v.)

Caulis *ſimplex absque ramis, in planta culta bipedalis glaber, in ſpontanea pedalis pubeſcens.* Folia *lanceolata utrinque praecipue apicem verſus attenuata, obtuſiuſcula, integerrima, ſubtus glauceſcentia, in culta planta omnino glabra, ſpontanea vero utrinque tenui pube tecta.* Umbella *multifida, radiis ſimpliciter trifidis brevibus, ſaepius vero in ſpontanea quadrifidis.* Involucri *foliola ovata.* Involucella *ſubrotunda acuta fere ad cordatam formam accedentia.* Petala *lunata.* Capſulae *glabrae.* W.

*118. EUPHORBIA *emarginata.*

E. umbella multifida: bifida, involucellis late cordatis, foliis oblongis emarginatis glabris, caule ramoſo, capſulis ſubverrucoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 145.

Ausgerandete Wolfsmilch. W.

Habitat in Italia. ♃ (v. ſ.)

119. EUPHORBIA *hiberna.*

E. umbella ſexfida: dichotoma involucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, capſulis verrucoſis. *Amoen. acad.* 3. *p* 128. *Hudſ. angl.* 185. *Mill. dict. n.* 25. *Lepech. it.* 1. *p.* 221. *Kniph. cent.* 9. *n.* 37.

Tithymalus latifolius hiſpanicus. *Bauh. pin.* 291. *Tabern. hiſt.* 987.

Tithymalus hibernicus, vaſculis muricatis erectis. *Dill. elth.* 287. *t.* 290. *f.* 374.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 82.

Irrländiſche Wolfsmilch. W.

Habitat in Hibernia, Sibiria, Auſtria, Pyrenaeis. ♃

*120. EUPHORBIA *ſalicifolia.* †

E. umbella multifida: dichotoma, involucellis reniformi-cordatis, foliis lanceolatis villoſis. *Hoſt. ſynop.* 267.

Weidenblättrige Wolfsmilch. W.

Habitat ad ſylvarum margines Hungariae. ♃

Caulis *erectus ſtriatus.* Folia *ſeſſilia alternatim ſpar-*

ſa lanceolata, aut ovato-lanceolata, utrinque villoſa, obtuſa glauca. Involucri *foliola foliis aemula ſunt, ſed breviora.* Involucella *ſunt reniformi cordata, apice compreſſa et uti tota pars ſuperior plantae, flaveſcentia.* Calyces *ventricoſi villoſi.* Petala *in omnibus floribus quatuor bicornia glabra.* Capſulae *glabrae rugoſulae.* Hoſt l. c.

121. EUPHORBIA *dendroides.*

E. umbella multifida; dichotoma, involucellis ſubcordatis: primariis triphyllis, caule arboreo. *Amoen. acad.* 3. *p.* 128. *Mill. dict. n.* 20.
Tithymalus myrtifolius arboreus. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus dendroides. *Cam. epit.* 965.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 83.
Baumartige Wolfsmilch. W.
Habitat in Italia, Creta, Inſulis Stoechadum. ♄ (v. ſ.)

Folia *ſparſa anguſtiora lanceolata.* Involucrum *univerſale polyphyllum, partialia prima ſaepius triphylla, reliqua diphylla, obtuſe cordata.* Umbellulae *laterales caulis nullae.* Capſula *glabra*

122. EUPHORBIA *amygdaloides.*

E. umbella multifida: dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtuſis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 126. *Mill. dict. n.* 21. *Hoſt. ſynop.* 266. *Hoffm. germ.* 167.
Euphorbia ſylvatica. *Iacq. auſt. t.* 275. *Scop. carn. n.* 570. *Roth. germ. I.* 206. *II.* 531.
Tithymalus characias amygdaloides. *Bauh. pin.* 290.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 83.
Mandelblättrige Wofsmilch. W.
Habitat in Gallia, Anglia, Germania. ♃ (v. ſ.)

Folia *alterna, remota, tenuia* (*non coriacea rigida*). Caulis *herbaceus, nec lignoſus.* Umbellae *etiam laterales.*

Vaillantius *negat hanc ſeparandam ab E. ſylvatica.*

Hujus umbella etiam quinquefida, ſed a ſequenti abunde diſtincta, caule *herbaceo; a reliquis Euphorbiae ſpeciebus* involucellis *connatis diverſiſſima. E. ſylvatica et E. Characias non creſcunt in Germania.* W.

123. EUPHORBIA *ſylvatica.*

E. umbella quinquefida: bifida, involucellis perfoliatis ſubcordatis acutiuſculis, foliis lanceolatis integerrimis. *Mill. dict. n.* 29.
Tithymalus foliis ellipticis, hirſutis, ſtipulis umbella-

ribus obſcuris, floralibus connatis, petalis lunatis. *Hall. helv. n.* 1045.
Tithymalus toto anno folia retinens. *Bauh. hiſt.* 3. *p* 671.
Tithymalus lunato flore. *Col. ecphr.* 2. *p.* 56. *t.* 57.
Tithymalus ſylvaticus, lunato flore. *Bauh. pin.* 290. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 335. *ſ.* 10 *t.* 1. *f.* 3.
Eſula caule craſſo. *Riv. tetr.* 227.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 84.
Wald-Wolfsmilch. W.
Habitat in Europa *auſtraliori.* ♄ (v. ſ.)

Caules *fruticoſi, proliferi, craſſi.* Folia *piloſa, perennia.* Petala *lunata, eroſa* (*E. Characiae vero integra*).

124. EUPHORBIA *Characias.*

E. umbella multifida: bifida, involucellis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis integerrimis, caule fruteſcente. *Amoen. acad.* 3. *p.* 126.* *Mill. dict. n.* 24. *Kniph. cent.* 1. *n.* 29. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 89. *Collect.* 1. *p.* 57.*
E. inermis, foliis lanceolatis, umbella univerſali multifida partialibus dichotomis, involucris ſemibifidis perfoliatis. *Hort. cliff.* 199. *Hort. upſ.* 142.* *Roy. lugdb.* 197.
Tithymalus characias rubens peregrinus. *Bauh. pin.* 290.
Tithymalus characias. *Cluſ hiſt.* 2. *p.* 188.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 85.
Thal-Wolfsmilch. W.
Habitat in Gallia, Hiſpania, Italia. ♄ (v. v.)

Nimis *affinis E. ſylvaticae et amygdaloidi; varietates a ſpeciebus in his ulterius diſtinguendae a popularibus, mihi tales fuere:*

α. Caulis *fruticoſus, pubeſcens, ramis aliquot ex apice.* Folia *vix manifeſte pubeſcentia.* Involucella *prima bipartita; reliqua perfoliata, bifida.* Petala *integra, retuſa.* Frutex *hirti; huc.*
Tithymalus Characias folio lanuginoſo. *Bauh. pin.* 290.

β. Caulis *fruticoſus, obſolete pubeſcens, ſimplex.* Folia *patentia.* Pedunculi *pubeſcentes.* Petala *lunata, rubra.* Flores *parvi.*

γ. Caulis *fruticoſus, laevis, ſimplex.* Folia *reflexa, glabra, lucida.* Racemus *communis oblongus, ante antheſin nutans.* Pedunculi *glabri.* Involucella *omnia*

perfoliata, bifida. Petala *lunata, denticulata.* Flores *majuſculi.* Fructus *laeves.*

960. VISNEA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 833.

Cal. 5-phyllus inferus. *Cor.* 5-petala. *Stigmata* 3. *Nux* 2-ſ. trilocularis ſemiinfera.

1. VISNEA *Mocanera.*
V. Mocanera. *Lin. ſuppl.* 251.
Mocanera *Canar.*
Canariſche Viſnea.* W.
Habitat in ſylvis montoſis inſularum Canarienſium. ♄ *Franc. Maſſon.*

Frurex *parvus.* Caulis *ſubverrucoſus teres.* Folia *alterna erecta breve petiolata elliptica glaberrima venoſa ſerrata, conſiſtentia Lauri.* Peduuculi *axillares ſolitarii nutantes vix petiolo longiores nudi uniflori.* Flores *parvi.* Corolla *lutea. Flore foecundato erigitur pedunculus, calyx clauditur et incraſſatur, ejusque foliola tria exteriora fuſca piloſa evadunt.*

TETRAGYNIA.

961. CALLIGONUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 834.

Cal. 5-partitus. *Cor.* o. *Filam.* circiter 16, baſi ſubcoalita. *Germen* ſuperum tetraëdrum. *Styli* 4. *Nux* cruſta polyptera ſ. potychaeta unilocularis.

1. CALLIGONUM *Polygonoides.*
C. fructibus cancellatis, ſetis ramoſis rigidis. *l'Herit. in Act. ſoc. Lin. Lond.* 1. *p.* 179. *
C. polygonoides. *Sp. pl.* 748. *Hort. cliff.* 212.
Polygonoides orientale Ephedrae facie. *Tournef. cor.* 47. *Itin.* 2. *p.* 356. *t.* 356.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 38.
Armeniſche Hackenknopf. W.
Habitat in monte Ararat. ♄

*2. CALLIGONUM *comoſum.* †

E. fructibus cancellatis, ſetis ramoſis mollibus. *l'Herit. in Act. ſoc. Lin. Lond.* 1. *p.* 180.

Aegyptiſcher Hackenknof. W.

Habitat in Aegypto, Barbaria. ♄

Varietas forte praecedentis. Plantae *in omnibus ſimillimae ſed in planta Aegyptiaca* fructus *comoſior, ſetis mollioribus, dum* ſetae *diſtinctiſſimae rigidiores in planta Tornefortiana, cujus unicum vidi fructum.* l'Herit. l. c.

3. CALLIGONUM *Pallaſia.*

E. fructibus alatis, alis membranaceis criſpis dentatis. *l'Herit. in Act. ſoc. Lin. Lond.* 1. *p.* 180.* *Ait. Kew.* 2. *p.* 242.

Pallaſia caſpica. *Lin. ſuppl.* 252.

Pallaſia Pteroccus. *Pall. fl. roſſ.* 2. *p.* 70. *t.* 77. 78.*

Pteroccus aphylius. *Pall. itin.* 2. *p.* 738. *t. S.* *

Calligonum polygonoides. *Pall. itin.* 3. *p.* 536.

Caſpiſcher Hackenknopf. W.

Habitat in deſerto inter Volgam *et* Rhymnum *verſus mare* Caſpium. ♄ (v. ſ.)

Frutex *quadripedalis ramoſiſſimus aphyllus articulatus, articulis interceptis ut Ephedrae.* Folia *nulla.* Flores *laterales ad genicula glomerati albi parvi.*

962. APONOGETON.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 835.

Amentum e ſquamis compoſitum. *Cal.* 0. *Cor.* 0. *Capſulae* 4, triſpermae.

1. APONOGETON *monoſtachyon.*

A. ſpica ſimplici, foliis cordato-ovalibus. *Lin. ſuppl.* 214. *Thunb. diſſ. Nov. Pl. gen.* 4. *p.* 73. *c. icone.**

Saururus (*natans*) acaulis, ſcapo monoſtachyo. *Mant.* 227.*

Parya Kelanga. *Rheed. mal.* 11. *p.* 31. *t.* 15.

β. A. (*lineare*) ſpica ſimplici, foliis linearibus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 51.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 403.

Einähriges Aponogeton. W.

Habitat in Indiae *orientalis paludoſis inundatis, frequens inter Oryzam.* ♃ (v. ſ.)

Radix *bulboſa.* Folia *longiſſima petiolata radicalia*

cordata ovalia integerrima laevia natantia fere Potamogetonis natantis. Scapi *flaccidi obſolete trigoni.* Spica *ſimplex ſexangularis ſpatha caduca tecta.* Bracteae *corollae loco duae infra ſingulos floſculos parvae clavatae obtuſiuſculae carnoſae perſiſtentes.* Stamina *ſex ſubulata bracteis longiora.* Germina 3 ſ. 4 *oblonga acuta.* Stylus *germinibus vix brevior.* Stigma *obtuſiuſculum.*

*2. APONOGETON *criſpum.*

A. ſpica ſimplici, foliis enſiformibus criſpis. *Thunb. Diſſ. Nov. Pl. gen. p.* 73.

Krauſes Aponogeton. W.

Habitat in locis depreſſis Zeylona.

Radix *fibrilloſa.* Scapi *lineares foliis triplo longiores flexuoſi erecti glabri.* Folia *petiolata enſiformia acuminata criſpa glabra, petiolis longiora ſpithamaea.* Flores *ſpicati, ſpica interrupta pollicari.* Thunb. l. c.

3. APONOGETON *diſtachyon.*

A. ſpica bifida, foliis lineari-oblongis natantibus, bracteis integris, floribus polyandris. *Ait, Kew.* 1. *p.* 495.

A. ſpica bipartibili, foliis elliptico-lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 215. *Thunb. Diſſ. Nov. Pl. gen.* 4. *p.* 74. *c. icone.* *

Zweyähriges Aponogeton. W.

Habitat in rivulis Cap. b. ſpei. *juxta Paarl.* ♃

Radix *bulboſa.* Folia *longiſſime petiolata radicalia, lanceolato-ovata integerrima laevia natantia Potamogetonis natantis.* Spica *bipartibilis introrſum imbricata.* Flores *albi alterni erecti, bractea ovata excepti.* Stamina *multum variant a* 6 *ad* 12. Piſtilla 3 ſ. 4. Flores *odore fragrantiſſimo.* Bulbi *aſſati eduntur.*

Linnaeus in ſupplemento hanc ſpeciem cum ſequenti confundit, dum Stamina 6. *ad* 12 *variare dicit.* Ait. l. c.

*4. APONOGETON *anguſtifolium.*

A. ſpica bifida, foliis lineari-lanceolatis erectis, bracteis bipartitis, floribus hexandris. *Ait. Kew.* 1. *p.* 495.

Schmalblättriges Aponogeton. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *anguſtiora quam in praecedenti utrinque attenuata.* Raches *pallide rubrae.* Flores *pauci.* Bracteae *albae baſi rubrae, ad baſin fere bipartitae (vel ſi mavis binae) laciniae lineari-oblongae.* Stamina 6, *bracteis ter vel quater breviora.* Styli *tres.* Ait. l. c.

P E N T A G Y N I A.

963. G L I N U S.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 836.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* o. *Nectaria* ſetis bifidis. *Capſ.* 5-angularis, 5-locularis, 5-valvis, polyſperma.

1. GLINUS *lotoides.*

G. caule piloſo, foliis obovatis. *Loefl. it.* 145. *Gron. orient.* 143. *Burm. ind. n.* 2. *t.* 36. *f.* 1.

Alſine lotoides ſicula. *Bocc. ſic.* 21. *t.* 11. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 552.

Alſine heliotropio cognata. *Cup. cath.*

Portulaca baetica, luteo flore, ſpuria aquatica. *Barr. rar.* 478. *t.* 336.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 87. *t.* 52. *f.* 3.

Schotenkleeartiger Glinus. W.

Habitat ab Hiſpania *in* Aſiam, *ad foſſas, locis inundatis.* ⊙

*2. GLINUS *ſetiflorus.*

G. foliis obovatis plicatis, caule fruticoſo, foliolis calycinis ovatis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 64.

G. (*ſetiflorus*) caulibus diffuſis, floribus capitatis axillaribus ſeſſilibus. *Forſk. deſcr.* 95. *

Borſtenblütiger Glinus. W.

Habitat in ſylvis tempore pluvioſo inundatis Arabiae *felicis.* ♄

Habitus reliquorum. Tota planta e pilis denſiſſimis incana, pili longiores quam in G. lotoide. Vahl. l. c.

3. GLINUS *dictamnoides.*

G. foliis orbiculatis tomentoſis planis, caule fruteſcente proſtrato, foliolis calycinis lanceolatis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 64.

G. caule rigoſo, foliis orbiculatis tomentoſis. *Mant.* 243. *Burm. ind.* 113. †

Alſine lotoides, dictamni cretici facie, maderaſpatana. *Pluk. amal.* 10 *t.* 256. *f.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 88. *t.* 52. *f.* 4.

Diptamartiger Glinus. W.

Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

Conf. *Forſk. t.* 12. *f.* 3.

*964. BLACKWELLIA.

Juſſ. gen. ed. Uſteri p. 379.

Cal. 5 - fidus ſemiſuperus. *Cor.* 15 - petala. *Capſ.* 1 - locul. polyſperma.

*1. BLACKWELLIA *integrifolia.*

B. foliis ovatis obtuſis plerisque integerrimis, floribus terminalibus paniculatis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 423.* *Illuſt. gen. t.* 412. *f.* 2.

Ganzblättrige Blackwellie. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

*2. BLACKWELLIA *paniculata.*

B. foliis ovato - ſubrotundis dentatis, floribus paniculatis terminalibus. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 423. *

Vermontea decandra. *Comerſ. herb.*

Riſpenblütige Blackwellie. W.

Habitat in inſula Borbonia. ♄

Valde ſimilis praecedenti, ſed folia *multo minora fere ſubrotunda, dentibus diſtantibus inſtructa,* florum *panicula in ramorum apice magis compoſita et divaricata.* Lamarck l. c.

*3. BLACKWELLIA *axillaris.*

E. foliis ovatis ſubcrenatis, ſpicis axillaribus longis ſimpliciſſimis nutantibus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 423. * *Illuſt. gen. t.* 412. *f.* 1.

Winkelriſpige Blackwellie. W.

Habitat in Madagaſcar. ♄

Spicae *floribus parvis confertis fere ſeſſilibus tomentoſis vel plumoſis, tectae.* Lamarck. l. c.

Affinitas huic generi eſt magna cum Homalio. W.

DODECAGYNIA.

965. SEMPERVIVUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 837.

Cal. 12 - partitus. *Petala* 12. *Capſ.* 12, polyſpermae.

1. SEMPERVIVUM *arboreum.*

S. caule arboreſcente laevi ramoſo, foliis cuneiformibus glabriuſculis ciliatis, ciliis patulis mollibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 147.

S. caule arboreſcente laevi ramoſo. *Sp. pl.* 664.
S. caule inferme nudo laevi ramoſo. *Hort. cliff.* 179. *Hort. upſ.* 118. *Roy. lugdb.* 456. *Mill. dict. n.* 5.
Sedum majus arboreſcens, floſculis candidis. *Bauh. pin.* 282. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 1. *t.* 31.
Sedum majus legitimum. *Cluſ. hiſt* 2. *p.* 58.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 89.
Baumartige Hauswurz. W.
Habitat in Luſitania, Creta, Corcyra, Zacintho. ♄ (v. v.)
Caulis *ſaepe radices filiformes dimittit.* Thyrſus *terminalis:* Racemis *bipartitis: Racemi brachia ramoſa, ſimplicia, recurva:* Floribus *alternis, oppoſitifoliis, pedicellatis, flaviſſimis.* Calyx 1[illegible] *partitus.* Petala 10. Piſtilla 10. Nectarii *ſquamae totidem, ad filamentorum baſin.* Stamina 20.

2. SEMPERVIVUM *canarienſe.*

S. caule fruteſcente, foliis orbiculato-ſpathulatis villoſis, nectariis ſubquadratis truncatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 147.
S. caule foliorum ruderibus lacero, foliis retuſis. *Sp. pl.* 664. *Mill. dict. n.* 6.
S. caule infra folio lacero, foliis cuneiformibus: ſummis ſubrotundis. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 457.
Sedum canarium, foliis omnium maximis. *Comm. hort.* 2. *p.* 189. *t.* 95.
Sedum majus canarium acaulon, pilis ad oras foliorum hiſpidis. *Pluk alm.* 340. *t.* 314. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 362.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 98.
Canariſche Hauswurz. W.
Habitat in Canariis. ♄ (v. v. ſ. [illegible])
Caulis *brevis, ſimplex.*
Petala 9. Stamina 18. Piſtilla 9. Ait. l. c.

*3. SEMPERVIVUM *glutinoſum.*

S. caule fruteſcente, foliis cuneiformibus viſcidis ciliatis, ciliis cartilagineis adpreſſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 147.
Klebrige Hauswurz. W.
Habitat in Madera ♄ (v. v.)
Petala *lutea* 8 *vel* 9. Stamina 16 *ſeu* 18. Piſtilla 8 *vel* 9. Ait. l. c.

*4. SEMPERVIVUM *glanduloſum.*

S. caule fruteſcente, foliis orbiculato-ſpathulatis margine glutinoſis, glandulis globoſis, nectariis cuneiformibus truncatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 148.

Drüſige Hauswurz. W.
Habitat in Madera. ♄

5. SEMPERVIVUM *tectorum.*

S. foliis ciliatis, propaginibus patulis, floribus dodecandris dodecagyniis, nectariis cuneiformibus carunculatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 148.

S. foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Mat. med.* 121. *Mill. illuſtr. Syſt. Pollich. pal. n.* 464. *Flor. dan. t.* 601. *Blackw. t.* 366. *Hoffm. germ.* 168. *Roth. germ. I.* 208. *II.* 536.

Sedum roſulis glabris, ciliatis, petalis quatuordecim conglutinatis, lanceolatis hirſutis. *Hall. helv. n.* 949.

Sempervivum majus. *Neck. gallob. p.* 213.

Sedum tectorum. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 559.

Sempervivum foliis radicalibus carnoſis ciliatis, caulinis imbricatis membranaceis, corymbo racemoſo reflexo. *Hort. cliff.* 179. *Fl. ſuec.* 395, 428. *Roy. lugdb.* 457.

S. majus alterum ſ. Barba jovis. *Dod. pempt.* 127.

Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 91.

Gemeine Hauswurz. W.

Habitat in Europae *tectis et collibus.* ♃ (v. v.)

6. SEMPERVIVUM *globiferum.*

S. foliis ciliatis, propaginibus globoſis. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. auſtr.* 5. *p* 50. *tab. app.* 40. *Knorr. del.* 2. *t. S.* 4. *Doerr. naſſ. p.* 212. *Hoffm. germ.* 168. *Roth. germ. II.* 536.

S. foliis radicalibus in globum congeſtis ciliatis, propaginibus globoſis. *Hort. cliff.* 180. *Roy. lugdb.* 457.

S. petalis fimbriatis, ſobole compacta. *Schmid. ic.* 95. *t.* 26 *

Sedum roſulis hirſutis ciliatis, petalis ſubulato-lanceolatis duodenis. *Hall. helv. n.* 950.

Sedum majus vulgari ſimile, globulis decidentibus. *Moriſ.* 3. *p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 18

Sedum vulgari magno ſimile. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 688.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 92.

Kugelknoſpige Hauswurz. W.

Habitat in Rutheno. *D. Gmelin*; Auſtria, Germania. ♃ (v. v.)

Petala 6. Stamina 6. Piſtilla 6. *Iacq. Mygind.* Petala 12, *ſubulato-lanceolata, flava, hirſuta, ciliata. Haller.*

*7. SEMPERVIVUM *villoſum.*

S. foliis ſpathulato-cuneiformibus obtuſis villoſis, nectariis palmatis, laciniis ſubulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 148.

Haarige Hauswurz. W.

Habitat in Madera. ⊙.

Petala 8 *flava.* Stamina 12-16. Piſtilla 8. Ait. l. c.

*8. SEMPERVIVUM *tortuoſum.*

S. foliis obovatis ſubtus gibbis villoſis, nectariis bilobis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 148.

Gedrehte Hauswurz. W.

Habitat in Canariis. ♄

Petala 8 *flava.* Stamina 16. Piſtilla 8. Ait. l. c.

*9. SEMPERVIVUM *ſtellatum.*

S. caule herbaceo pubeſcente, foliis ſpathulatis ſparſis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 1. *p.* 251.

Sedum petraeum rotundifolium, flore luteo ſtellato montis Baldi. *Segn. veron.* 2. *p.* 360. *t.* 17.

Sternförmige Hauswurz. W.

Habitat in rupibus montis Baldi. ⊙

Tota planta in ſtatu minimo repraeſentat S. arboreum; ſed eſt laxior et magis diffuſa. Ab hoc vero ſatis diſtinctum; radice *annua,* caule *herbaceo pubeſcente, et* panicula *divaricata.* Flores *flavi cum charactere Sempervivi exacte conveniunt.* Smith l. c.

10. SEMPERVIVUM *arachnoideum.*

S. foliis pilis intertextis, propaginibus globoſis. *Mill. dict. n.* 4. *Knorr. del.* 2. *t. S.* 8. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 51. *tab. app.* 42.

S. foliis radicalibus in globum congeſtis: villis reticulatim connexis. *Hort. cliff.* 180.* *Roy. lugdb.* 457.

S. petalis integris, ocellis turuloſis. *Schmidel. icon. p.* 149. *t.* 38.*

S. rubrum montanum gnaphaloides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 291.

Sedum roſulis araneoſis, calveſcentibus, petalis connatis nervoſis. *Hall. helv. n.* 952.

Sedum montanum tomentoſum. *Bauh. pin.* 294.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 93.

Spinnewebenartige Hauswurz. W.

Habitat in alpibus Italiae, Helvetiae, Pyrenaeis. ♃ (v. v.)

Petala 9, *purpurea;* Varietas *S. montani. Haller.* Foliorum *faſciculi contracti, obtecti pilis longis. Gerard.*

11. SEMPERVIVUM *hirtum*.

S. foliis caule petalorumque apicibus hirtis. *Amoen. acad.* 4. *p* 273. * *Hoffm. germ.* 168.
Sedum majus montanum, foliis dentatis. *Bauh. pin.* 283. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 688.
Cotyledon altera montana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 63.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 94.
Rauhblutige Hauswurz. W.
Habitat in Helvetia, in Tauero *raſtadienſi.* ♃
Petala 6; Stamina 12; Piſtilla 6 *Mygind.*

12. SEMPERVIVUM *montanum*.

S. foliis integerrimis, propaginibus patulis. *Mill. dict. n.* 3. *Mattuſch. ſil.* 345. *Hoffm. germ.* 169. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 50. *tab. app.* 41.
Sedum foliis ſemipatulis hirſutis, petalis novenis ſubhirſutis. *Hall helv. n.* 951.
Sedum alpinum, rubro magno flore. *Bauh. pin.* 284.
Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus. *Bauh. pin.* 283.
Sedum minus, flore rubente. *Beſl. eyſt. vern.* 6. t. 8. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 94.
Berg-Hauswurz. W.
Habitat in rupibus Helvetiae, Sileſiae. ♃ (v. l.)
Foliorum *faſciculi expanſi*, *pilis diſtituti. Gerard.*

13. SEMPERVIVM *ſediforme*.

S. foliis ſparſis, inferioribus teretibus; ſuperioribus depreſſis. *Syſt. Veg.* 379. *Iacq. hort.* 1. *p.* 35. *t.* 81.
β. Monſtroſum. *Iacq. miſc.* 1. *p.* 133. *t.* 5. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 95.
Sedumartige Hauswurz. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♃
Petala *albida.* Caules *omnes perpetuo et conſtanter ſtrictiſſime ſtant erecti.* Iacq.

*14. SEMPERVIVUM *monanthos*.

S. foliis teretibus clavatis confertis, pedunculis nudis ſubunifloris, nectariis obcordatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 149.
Einblütige Hauswurz. W.
Habitat in Canariis. ♃ (v. v.)
Numerus partium fructificationis variat a quinario ad octonarium. Ait l. c.

Claſſis XII.

I C O S A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

966. CACTUS. *Cal.* ſuperus, 1-phyllus. *Cor.* multifida. *Bacca* 1-locul. polyſperma.

972. EUGENIA. *Cal.* ſuperus, 4-partitus. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 1-locularis, 1-ſperma.

967. PHILADELPHUS. *Cal.* ſuperus, 5-ſ. 4-partitus. *Cor* 5-ſ. 4-petala. *Stigma* 4-fidum. *Capſ.* 5-4-locul. polyſperma.

968. LEPTOSPERMUM. *Cal.* ſuperus 5-fidus. *Petala* 5 unguiculata ſtaminibus longiora. *Stigma* capitatum. *Capſ.* 4-ſ. 5-loculaais.

969. FABRICIA. *Cal.* ſuperus 5-fidus. *Petala* 5 ſeſſilia. *Stigma* capitatum. *Capſ.* multilocularis.

970. METROSIDEROS. *Cal* ſuperus 5-fidus. *Petala* 5. *Stam* longiſſima exſerta. *Stigma* ſimplex. *Capſ.* 3-ſ. 4-locularis.

971. PSIDIUM. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 1 locularis, polyſperma.

973. MYRTUS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* ſub 5-petala. *Bacca* 3-locularis, polyſperma.

980. PUNICA. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Pomum* 10-loculare, polyſpermum.

985. ROBINSONIA. *Cal.* ſuperus 5-dentatus. *Petala* 5. *Bacca* ſtriata 7-locularis.

974. CALYPTRANTHES. *Cal.* ſuperus truncatus operculo tectus. *Cor.* o. *Bacca* 1-locul. 1-4-ſperma.

975. EUCALYPTUS. *Cal.* ſuperus truncatus operculo tectus. *Cor.* o. *Capſ.* 4-locularis polyſperma.

978. FOETIDIA. *Cal.* ſuperus 4-fidus. *Cor.* o. *Capſ.* 4-locularis lignoſa.

986. SONNERATIA. *Cal.* inferus 6-fidus. *Petala* 6. *Bacca* multilocularis, loculis polyſpermis.

981. AMYGDALUS. *Cal.* inferus 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo foraminoſo.

982. PRUNUS. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo integro.



IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



984. CHRYSOBALANUS. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucleo ſulcato.

983. PLINIA. *Cal.* inferus 4-ſ. 5-partitus. *Cor.* 4-ſ. 5-petala. *Drupa* ſulcata.

976. BANARA. *Cal.* inferus 4-fidus. *Petala* 4. *Bacca* 1-locularis polyſperma.

977. ANTHERYLIUM. *Cal* inferus 4-partitus. *Petala* 4. *Capſ.* 1-locularis 3-valvis polyſperma.

979. SCOLOPIA. *Cal.* inferus 3-ſ. 4-partitus. *Petala* 3. ſ. 4. *Bacca* 1-locularis. *Semina* arillata.

† *Cleome icoſandra.*

DIGYNIA.

987. CRATAEGUS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 2-ſperma.

988. WALDSTEINIA. *Cal.* 10-fidus, laciniis alternis. *Petala* 5. *Semina* 2 obovata.

TRIGYNIA.

989. SORBUS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 3-ſperma.

990. SESUVIUM. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* nulla. *Capſ.* 3-locularis, circumſciſſa.

† *Spiraea opulifolia.*

TETRAGYNIA.

† *Tetragoniae aliquot. Meſembryanthemum.*

PENTAGYNIA.

993. TETRAGONIA. *Cal.* ſuperus, 5-ſ. 4-fidus. *Cor.* o. *Peric.* nucleo 5. ſ. 4-loculari.

991. MESPILUS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 5-ſperma.

992. PYRUS. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Pomum* 5-loculare, polyſpermum.

994. MESEMBRYANTHEMUM. *Cal.* ſuperus, 5-fidus. *Cor.* multifida. *Capſ.* carnoſa locularis, polyſperma.

995. AIZOON. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* o. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

996. SPIRAEA. *Cal.* inferus, 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* plures congeſtae.

O C T O G Y N I A.

† *Meſembryanthemum calamiforme.*

D E C A G Y N I A.

† *Meſembryanthema aliquot.*

P O L Y G Y N I A.

997. ROSA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Cal.* baccatus, polyſpermus.

998. RUBUS. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* compoſita.

1001. TORMENTILLA. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* 4-petala. *Sem.* 8, mutica.

1003. DRYAS. *Cal.* 8-fidus. *Cor.* 8-petala. *Sem.* plurima: ariſta lanata.

999. FRAGARIA. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima ſupra receptaculum baccatum, decidua.

1000. POTENTILLA. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima, mutica.

1002. GEUM. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima: ariſta geniculata.

1004. COMARUM. *Cal.* 10-fidus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima ſupra receptaculum carnoſum perſiſtens.

1005. CALYCANTHUS. *Cal.* ſquamoſus, corollinus. *Cor.* o. *Sem.* caudata calyce ſucculento.

† *Spiraea Filipendula, Ulmaria. Phytolacca icoſandra. Meſembryanthema aliquot.*

MONOGYNIA.

966. CACTUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 838.

Cal. 1-phyllus, ſuperus, imbricatus. *Cor.* multiplex. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

* *Echinomelocacti ſubrotundi.*

1. CACTUS *mammillaris.*
C. ſubrotundus tectus tuberculis ovatis barbatis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 278. *Mill. dict. n.* 5.
Echino-Melocactus minor lacteſcens; tuberculis ſ. mammillis majoribus. *Herm. par.* 136. *t.* 136.
Ficoides ſ. Melocactus mammillaris glabra ſulcis carens fructum ſuum undique fundens. *Pluk. alm.* 184. *t.* 29. *f.* 1.
Ficoides ſ. Ficus americana ſphaerica tuberculata lacteſcens, flore albo. *Comm. hort.* 1. *p.* 105. *t.* 55. *Bradl. ſucc.* 3. *p.* 11. *t.* 19.
β. Melocactus minimus lanuginoſus et tuberoſus. *Plum. ſpec.* 19. *ic.* 201. *f.* 1.
γ. Ficoides ſ. Melocactus minima lanuginoſa, ſpinis mitioribus, fructu ſparſim egrediente. *Pluk. alm.* 284. *t.* 29. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 622.
Warzentragende Fackeldiſtel. W.
Habitat in Americae *calidioris rupibus.* ♄ (v. v.)

2. CACTUS *Melocactus.*
C. ſubrotundus quatuordecim-angularis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 279. *Mill. dict. n.* 1. *Swartz. obſ.* 198.*
Cactus humilis ſubrotundus ſulcatus et coronatus, ſpinis confertis. *Brown. jam.* 238.
Melocactus indiae occidentalis. *Bauh. pin.* 238.
Echino Melocactus. *Cluſ. exot.* 92. *t.* 92. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 9. *t.* 32.
β. Cactus ſubrotundus 14-angularis: ſpinis longis recurvis albidis. *Mill dict.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 623.
Melonenartige Fackeldiſtel. W.
Habitat in Jamaica, America *calidiore.* ♄

3. CACTUS *nobilis.*

C. ſubrotundus quindecim - angularis, ſpinis latis recurvis. *Mant. p.* 243. *Mill. dict.* †

C. recurvus. *Mill. dict. p.* 490.

Edele Fackeldiſtel. W.

Habitat in Mexico. ♄

Corpus *ſubrotundum angulis* 14 (*nonne* 15? R). Puncta *dorſo angulorum inſident plura, faſciculata ſpinis aceroſis.* Spina, *cuiusvis faſciculi aceroſi medio, magna, recurvata.*

** Cerei *erecti, ſtantes, per ſe.*

*4. CACTUS *cylindricus.*

C. erectus debilis cylindricus non angulatus, ſuperficie ſulcis decuſſatis reticulata. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 533. *

Walzenförmige Fackeldiſtel. W.

Habitat in Peru. ♄ (v. v. ſ. fl.)

5. CACTUS *Pitaiaya.*

D. erectus triangularis. *Iacq. amer.* 151.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 624.

Aufrechte Fackeldiſtel. W.

Habitat Carthagenae *in fruticetis maritimis.* ♄

6. CACTUS *heptagonus.*

C. erectus oblongus ſeptemangularis. *Hort. cliff.* 181. * *Roy. lugdb.* 279.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 625.

Siebeneckige Fackeldiſtel. W.

Habitat in America. ♄ (v. ſ.)

Hiſtoria Cactorum angulatorum, *quorum plurimas ſpecies Plumier in iconibus ſiſtit, etiamnum obſcura permanſit, quam itaque attenti per Indias peregrinatores graphice deſcribant.*

7. CACTUS *tetragonus.*

C. quadrangularis longus erectus: angulis compreſſis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 280. *Mill. dict. n.* 2. *ſub.* Cereo.

Cereus erectus minor, fructu ſpinoſo, coſtarum numero varians. *Herm. par.* 117.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 626.

Viereckige Fackeldiſtel. W.

Habitat in Curaſſao, America *calidiore.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

8. CACTUS *hexagonus.*

C. erectus ſexangularis longus: angulis diſtantibus. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 119. *Roy. lugdb.* 279. *Mill. dict. n.* 1. *ſub* Cereo. *Fabric. helmſt.* 339. *Knorr. del.* 1. *t. F.* 7.

Cereus ſurinamenſis. *Eph. N. C.* 3. *p.* 349. *t.* 7, 8.

Cereus erectus altiſſimus ſurinamenſis. *Herm. par.* 116. *Raj. dendr.* 23.

Cereus erectus maximus americanus hexangularis, flore albo radiato. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 1. *t.* 1.

Melocactus monoclonos, flore albo, fructu atropurpureo. *Plum. ſpec.* 19. *ic.* 119?

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 626.

Sechseckige Fackeldiſtel. W.

Habitat Surinami. ♄

9. CACTUS *pentagonus.*

C. erectus ſubquinquangularis longus articulatus. *Hort. cliff.* 182. *. *Roy. lugdb.* 280.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3 *p.* 627.

Fünfeckige Fackeldiſtel. W.

Habitat in America. ♄

10. CACTUS *repandus.*

C. erectus longus octangularis: angulis compreſſis undatis: ſpinis lana longioribus. *Hort. cliff.* 182. *Roy. lugdb.* 279.

Cactus erectus cylindricus ſulcatus tenuior ſummitate attenuatus, aculeis confertis. *Brown. jam.* 238.

Cereus altiſſimus gracilior, fructu extus luteo, intus niveo ſeminibus nigris pleno. *Sloan. jam.* 197. *hiſt.* 2. *p.* 158. *Raj. dendr.* 22. *Trew. ehret. t.* 14

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 628.

Ausgeſchweifte Fackeldiſtel. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

11. CACTUS *lanuginoſus.*

C. erectus longus ſubnovemangularis: angulis obſoletis, ſpinis lana brevioribus. *Hort. cliff.* 182. *Roy. lugdb.* 279.

Cereus curaſſavicus erectus maximus, fructu rubro non ſpinoſo, lanugine flaveſcente. *Herm. par.* 115. *t.* 115.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 628.

Wollige Fackeldiſtel. W.

Habitat in Curaſſao. ♄

12. CACTUS *peruvianus.*

C. erectus longus ſuboctangularis: angulis obtuſis. *Hort. cliff.* 181. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 279. *Swartz. obſ.* 199.*

C. cylindraceus erectus ſulcatus major ſummitate obtuſus, aculeis confertis. *Brown. jam.* 238.

Cereus erectus, fructu rubro non ſpinoſo. *Herm. par.* 114.

Cereus craſſiſſimus, fructu utrinque rubro. *Sloan. cat.* 196.

Cereus peruvianus ſpinoſus, fructu rubro nucis magnitudine. *Bauh. pin.* 458.

Euphorbii arbor cerei effigie. *Lob. ic.* 2. *p.* 25.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 629.

Peruvianiſche Fackeldiſtel. W.

Habitat in Jamaicae, Peru *apricis aridis maritimis.* ♄ Anguli *ſuperne inermes. Mill.*

13. CACTUS *Royeni.*

C. erectus articulatus novemangularis: articulis ſubovatis, ſpinis lanam aequantibus. *Roy. lugdb.* 279.

Cereus erectus gracilis ſpinoſiſſimus: ſpinis flavis, polygonus, lanugine albo-palleſcente. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 293.

Cereus erectus, fructu rubro non ſpinoſo, lanuginoſus. *Herm. parad.* 115.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 629.

Royenſche Fackeldiſtel. W.

Habitat in America. ♄

* * Cerei *repentes, radiculis lateralibus.*

14. CACTUS *grandiflorus.*

C. repens ſubquinquangularis. *Herm. par.* 120. *Knorr. del.* 1. *t. F.* 6.

C. ſcandens, angulis quinque pluribusque obtuſis. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upſ.* 121.* *Roy. lugdb.* 280.

Cereus ſcandens minor polygonus articulatus. *Mill. icon. t.* 90.

Cereus gracilis ſcandens ramoſus plerumque ſexangularis, flore igenti atque fragranti. *Trew. ehr. t.* 31, 32. *E. N. C.* 1752. *v.* 9. *app.* 184. *t.* 11, 12, 13.

Cereus americanus major articulatus, flore maximo nocte ſe aperiente ſ. ſuaviſſimum odorem ſpirante. *Volk. heſp.* 1. *p.* 133. *t.* 134.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 630.
Groſsblumige Fackeldiſtel. W.
Habitat in Jamaica, Vera Cruce. ♄ (v. v.)

15. CACTUS *flagelliformis.*

C. repens decemangularis. *Mill. dict. n.* 12. *ſub* Cereo *Kniph. cent.* 1. *t.* 12. *Knorr. del.* 1. *t. F.* 8.
C. ſcandens angulis decem obſoletis. *Hort. upſ.* 121.
C. cylindraceus ſulcatus puſillus repens, aculeis ſetaceis confertis. *Brown. jam.* 238.
Cereus minor ſcandens polygonus ſpinoſiſſimus, flore purpureo. *Ehret. ſel.* 2. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 30.
Opuntia minima ſerpens americana. *Sloan. cat.* 197.
Ficoides americanum ſ. Cereus minima ſerpens americana. *Pluk. alm.* 148. *t.* 158. *f.* 6. *Sloan. jam.* 197. *hiſt.* 2. *p.* 158.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 631.
Peitſchenförmige Fackeldiſtel. W.
Habitat in America calidiore. ♄ (v. v.)

*16. CACTUS *pendulus.*

C. pendulus, ramis verticillatis teretibus glabris muticis. *Swartz prodr.* 77. *Fl. ind. occd.* 2. *p.* 876.* *Ait. Kew.* 2. *p.* 153.
C. paraſiticus inermis aphyllus ramoſus propendens, ramulis gracilibus teretibus ſtriatis. *Brown. jam.* 238.
Rhipſalis Caſſutha. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 137. *t.* 28. *f.* 1.
Caſſyta baccifera. *J. Mill. illuſt.*
Hängende Fackeldiſtel. W.
Habitat in ramis arborum altiſſimarum Jamaicae *et* Hiſpaniolae. ♄ (v. v. ſ. fl.)

17. CACTUS *paraſiticus.*

C. repens teres ſtriatus muticus. *Sp. pl.* 668. *Swartz obſ.* 200.
Opuntia minima flagelliformis. *Plum. ſpec.* 6. *ic.* 197. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 932.
Schmarotzer Fackeldiſtel. W.
Habitat in America.

18. CACTUS *triangularis.*

C. repens triangularis. *Iacq. amer.* 152. *Riſler in Act. helv.* 5. *p.* 268. *t.* 2.*
C. triangularis ſcandens articulatus. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upſ.* 121. *Roy. lugdb.* 280.

C. debilis brachiatus aequalis triquetrus ſcandens ſ. repens, ſpinis breviſſimis confertis. *Brown. jam.* 468.
Cereus americanus triangularis radicoſus. *Brad. ſucc.* 1. *p.* 4. *t.* 3. *E. N. C.* 1752. *v.* 9. *app.* 199. *t.* 10. *f.* 14. *E. N. C.* 1754. *v.* 9. *app.* 349. *t.* 3.
Ficoides americanum, ſ. Cereus erectus criſtatus, foliis triangularibus profunde canaliculatis. *Pluk. alm.* 147. *t.* 29. *f.* 3.
Melocactus americanus repens trigonus, flore albo, fructu violaceo. *Plum. ic.* 199, 200?
β. Cactus (*triangularis folioſus*) fructu folioſo, inſipido. *Iacq. amer.* 152. *t.* 181. *f.* 65.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 632.
Dreyeckige Fackeldiſtel. W.
Habitat in Braſilia, Jamaica, Martinica. ♄ (v. v.)
Var. β. Fructus *multo major, nitide coccineus, foliis veſtitus fere integris.* Pulpa *candida, ſubdulcis inſipida, edulis.* Semina *atra, nitida.* Iacq.

* * * * Opuntiae *compreſſae articulis proliferis.*

19. CACTUS *moniliformis.*
C. articulato-prolifer, articulis globoſis ſpinoſis glomeratis. *Sp. pl.* 669.
Melocactus, ex plurimis globulis opuntiae modo naſcentibus, ſpinoſiſſimus. *Plum. ſpec.* 20. *ic.* 198.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 634.
Halsbandförmige Fackeldiſtel. W.
Habitat in America *calidiore.* ♃

20. CACTUS *Opuntia.*
C. articulato-prolifer laxus, articulis ovatis, ſpinis ſetaceis. *Kniph. cent.* 8. *n.* 19. *Knorr. del.* 1. *Tab. F. a.*
C. compreſſus articulatus ramoſiſſimus, articulis ovatis, ſpinis ſetaceis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upſ.* 120. *Gron. virg.* 54. *Roy lugdb.* 280.
C. brachiatus et articulatus, articulis ovatis compreſſis, aculeis longiſſimis confertis. *Brown. jam.* 237.
Opuntia foliis ovatis compreſſis, ſpinis ſetaceis. *Hall. helv. n.* 1099.
Opuntia vulgaris. *Mill. dict.* 1
Opuntia vulgo herbariorum. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 154. *Mill. ic.* 191.
Ficus indica, folio ſpinoſo, fructu majore. *Bauh. pin.* 458.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 634.
Gemeine Fackeldiſtel. W.
Habitat in America, Peru, Virginia, *nunc* in Hiſpania, nia, Italia, Luſitania, Helvetia, Minorca. ♄ (v. v.)

21. CACTUS *Ficus indica.*

C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſetaceis. *Sp. pl.* 669.
C. compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſetaceis. *Hort. cliff.* 283. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 280.
Opuntia articulis ovato-oblongis, ſpinis ſetaceis. *Mill. dict. n.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 636.
Indiſche Fackeldiſtel. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

22. CACTUS *Tuna.*

C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſubulatis. *Mill. dict. n.* 3. *ſub* Opuntia. *Knorr. del.* 2. *t.* O.
C. compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſubulatis. *Hort. cliff.* 183. *Hort. upſ.* 122. *Roy. lugdb.* 280.
C. brachiatus articulatus, articulis oblongo-ovatis compreſſis, caudice tereti erecto ferociſſimo, aculeis brachiorum brevibus confertis. *Brown. jam.* 237.
Tuna major, ſpinis validis flavicantibus, flore gilvo. *Dill. elth.* 396. *t.* 295. *f.* 380.
Opuntia major, folio oblongo rotundo: ſpinis longis et validiſſimis, flore luteo. *Sloan. jam.* 103. *hiſt.* 2. *p.* 149. *t.* 244. *f.* 1.
β. C. (*elatior*) articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſubulatis caule ſubtereti arboreo. *Euphraſ. itin. ed. germ.* 198.
Tuna elatior ſpinis validis nigricantibus. *Dill. elth.* 2. *p.* 395. *t.* 294. *f.* 379.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 636.
Breite Fackeldiſtel. W.
Habitat in Jamaica *et* America *calidiore.* ♄ (v. v.)
Munimenta *urbium in inſula Euſtachii. Iacq. amer.* 92.

23. CACTUS *coccinellifer.*

C. articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis ſubiner-

mibus. *Mill. dict. n.* 6. *ſub* Opuntia. *Knorr. del.* 2. *t. O.* 1.
C. compreſſus articulatus ramoſus, articulis ovato-oblongis ſubinermibus. *Hort. upſ.* 121.
C. brachiatus et articulatus ſubinermis major, articulis oblongis et leviter compreſſis. *Brown. jam.* 237.
Tuna mitior, flore ſanguineo, cochenillifera. *Dill. elth.* 399. *t.* 297. *f.* 383.
Ficus indica major laevis ſpinoſa vermiculos proferens. *Pluk. alm.* 146. *t.* 281. *f.* 2.
Opuntia maxima, folio oblongo rotundo majore ſpinulis nonnullis et innocentibus obſito. *Sloan. jam.* 194. *hiſt.* 2. *p.* 152. *t.* 8. *f.* 1. 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 637.
Cochenillen Fackeldiſtel. W.
Habitat in Jamaica *et* America *calidiore.* ♄

24. CACTUS *curaſſavicus.*

C. articulato-prolifer, articulis cylindrico-ventricoſis compreſſis. *Mill. dict. n.* 7. *ſub* Opuntia. *Knorr. del.* 2, *t. O.* 2.
Cactus tereti-compreſſus articulatus ramoſus. *Hort. cliff.* 182. *Hort. upſ.* 120. *Roy. lugdb.* 280.
Opuntia minima americana ſpinoſiſſima. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 5. *t.* 4.
Ficus indica ſ. Opuntia curaſſavica minima. *Comm. hort.* 1. *p.* 107. *t.* 56.
Ficus indica ſ. Opuntia minor cauleſcens arbuſculae in modum, ramis cineritiis, ſpinoſiſſima. *Pluk. alm.* 147. *t.* 281. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 638.
Curaſſaviſche Fackeldiſtel. W.
Habitat in Curaſſao. ♄ (v. v. ſ. fl.)

*25. CACTUS *ſpinoſiſſimus.*

C. caule erecto compreſſo, ramis oppoſitis bifariis compreſſis, ſpinis ſetaceis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 155. *Martyn. hort. cantabr.* 88.
C. (*ſpinoſiſſimus*) ſuberectus compreſſus, articulis cruciatim diſpoſitis, ſpinis creberrimis longis flaveſcentibus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 537. *
Vielſtachliche Fackeldiſtel. W.
Habitat in Jamaica. ♄ (v. v. ſ. fl.)

*26. CACTUS *alatus.*

C. prolifer, enſiformi-compreſſus crenatus. *Swartz prodr.* 77. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 878. *

C. mitis minor, ſarmento flexili rotundo, frondibus longis compreſſis crenatis, ad crena floridis. *Brown. jam* 237.
Opuntia non ſpinoſa caulescens e crenis foliorum fructum et florem proferens. *Sloan. cat.* 216. *hiſt.* 2. *p.* 159.
Geflügelte Fackeldiſtel. W.
Habitat in truncis et ad radices arborum Jamaicae *frigidioris.* ♄

27. CACTUS *Phyllanthus.*
C. prolifer enſiformi-compreſſus ſerrato-repandus. *Mill. dict. n.* 9. *ſub* Opuntia.
C. foliis enſiformibus obtuſe ſerratis. *Hort. cliff.* 183. *Roy. lugdb.* 281.
C. mitis minor, ſarmento flexili rotundo, frondibus longis compreſſis crenatis, ad crenas floridis. *Brown. jam.* 237.
Cereus ſcolopendri folio brachiato. *Dill. elth.* 73. *t.* 64. *f.* 74.
Opuntia non ſpinoſa minima caulescens, foliis pilosis ſtrictiſſimis e crenis foliorum florem proferens. *Sloan. jam.* 216. *hiſt.* 2. *p.* 159.
Phyllanthos americana, ſinuoſis foliis longis. *Pluk. alm.* 296. *t.* 247. *f.* 5.
Ficus ſ. Opuntia non ſpinoſa, ſcolopendriae folio ſinuato. *Raj. dendr.* 21.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 339.
Dünngliedrige Fackeldiſtel. W.
Habitat in Braſilia, Surinamo, America *meridionali.* ♄ (v. v. ſ. fl.)

28. CACTUS *Pereskia.*
C. caule tereti arboreo: aculeis geminis recurvis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. upſ.* 122.
C. ſarmentoſus foliatus ſpinoſus, ſpinis geminis recurvis, foliis mollibus ovatis. *Brown. jam.* 237.
Pereskia. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 281. aculeata. *Mill. dict.*
Pereskia aculeata, flore albo, fructu flaveſcente. *Plum. gen.* 37. *Dill. elth.* 305. *t.* 227. *f.* 294.
Malus americana ſpinoſa, portulacae folio, fructu folioſo, ſemine reniformi ſplendenti. *Comm. hort.* 1. *p.* 145. *t.* 70.
Portulaca americana latifolia ad foliorum ortum ſinu-

gine obducta, longioribus aculeis horrida. *Pluk. alm.* 135. *t.* 215. *f.* 6.

Groſſulariae fructu majore arbor ſpinoſa, fructu folioſo viridi-albicante. *Sloan. jam.* 165. *hiſt.* 2. *p.* 86. *Raj. dendr.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 639.

Groſsblättrige Fackeldiſtel. W.

Habitat in America *calidiore*, Jamaica, Margaretha. ♄ (v. v. ſ. fl.)

29. CACTUS *portulacifolius.*

C. caule tereti arboreo ſpinoſo, foliis cuneiformibus retuſis. *Sp. pl.* 671.

Opuntia arbor ſpinoſiſſima, foliis portulacae cordatis. *Plum. ſpec.* 6. *ic.* 197. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 640.

Portulacblättrige Fackeldiſtel. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

Fructus hujus minime foliis adſperſus, uti praecedentis.

967. PHILADELPHUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 840.

Cal. 4-ſ. 5-partitus, ſuperus. *Petala* 4 ſ. 5. *Styl.* 4-fidus. *Capſ.* 4-ſ. 5-locularis, polyſperma.

1. PHILADELPHUS *coronarius.*

P. foliis ſubdentatis. *Mill. dict. n.* 1. *Hall. helv. n.* 1100. *Du Ham. arb.* 2. *t.* 83. *Kniph. cent.* 5. *n.* 65. *Hoffm. germ.* 169. *Moench. haſſ. n.* 401. *Willd. arb.* 204. *Roth. germ. I.* 210. *II.* 538.

Philadelphus. *Hort. cliff.* 188. *Hort. upſ.* 122.

Syringa alba ſ. Philadelphus athenaei. *Bauh pin.* 399.

Frutex coronarius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 55.

β. Philadelphus nanus. *Mill. dict. n.* 2. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 6.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 641.

Wohlriechender Pfeifenſtrauch. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

Flos *primarius quinquefidus calyce, corolla, piſtillo, capſula. Phil. bot.* 178. *Petala aeſtivantia obvoluta cum ſole. Gemmis caret.*

Stylus *in calyce florente apice* 4-*fido; in calyce ſeminifero uſque ad baſin* 4-*fidus. Moench. l. c:* Var. β. *flore eſt pleno, ſeu potius flore du-vel triplicato.* Du Roi. *l. c.* R.

2. PHILADELPHUS *inodorus.*

P. foliis integerrimis. *Mill. dict.* 3.

Philadelphus flore albo majore inodoro. *Cateſb. car.* 2. *p.* 84. *t.* 84.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 643.

Geruchloſer Pfeifenſtrauch. W.

Habitat in Carolina. ♄

*968. LEPTOSPERMUM.

Smith. Act. ſoc. Lin. Lond. 3. *p.* 260.

Cal. 5-fidus ſemiſuperus Petala 5-unguiculata ſtaminibus longiora. *Stigma* capitatum. *Capſ.* 4-vel 5-locularis. *Semina* angulosa.

1. LEPTOSPERMUM *ſcoparium.*

L. foliis ovatis mucronatis obſolete trinerviis, calycibus glabris, dentibus membranaceis coloratis. *Smith. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 262.

Melaleuca (*ſcoparia*) foliis alternis mucronatis trinerviis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus. *Wendl. et Schrad. ſert. hannov. p.* 25. *t.* 15. *

Philadelphus (*ſcoparius*) foliis lanceolatis integerrimis rigidis trinerviis, floribus omnibus quinquefidis, laciniis calycinis coloratis deciduis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 156.

α. *linifolia* foliis lanceolatis.

Leptoſpermum ſcoparium. *Forſt. gen.* 36. *n.* 6. *Coock, itin.* 1. *p.* 100. *t.* 22.

Melaleuca (*ſcoparia*) foliis alternis ovatis acutis ſubtrinerviis, floribus terminalibus ſolitariis ſeſſilibus. *Forſt. prodr. n.* 210.

Melaleuca (*ſcoparia*) foliis alternis ovatis acutis trinerviis punctatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Lin. ſuppl.* 343.

Melaleuca ſcoparia α. dioſmatifolia. *Wendl. et Schrad. l. c. t.* 15. *f.* 1.

β. *myrtifolia*, foliis ovato-ellipticis.

Melaleuca ſcoparia β. myrtifolia. *Wendl. et Schrad. l. c. t.* 15. *f.* 2.

Philadelphus floribundus. *Uſteri. et Roemer. Mag.* 7. *Stuck. p.* 177. *t.* 2.
Leptoſpermum ſquarroſum. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 174. *t.* 35.
Beſenartige Südſeemyrte. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄ (v. v.)

*2. LEPTOSPERMUM *Thea.*

L. foliis lineari-lanceolatis ſubmucronatis trinerviis calycibus glabris, dentibus membranaceis coloratis. W.
Melaleuca (*Thea*) ramis pendulis, foliis alternis obovato-lanceolatis trinerviis, floribus lateralibus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Wendl. et Schrad. ſert. hannov. p.* 24. *t.* 14.*
Theegebende Südſeemyrte. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. v. f. fl.)

Affine ſequenti, ſed foliis *mucrone parvo inſtructis trinerviis diſtinctum; a L. attenuato: calycibus glabris* pedunculis*que unifloris diverſum.* W.

*3. LEPTOSPERMUM *flaveſcens.*

L. foliis lineari-lanceolatis obtuſis enerviis, calycibus glabris, dentibus membranaceis nudis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 262.
Gelbliche Südſeemyrte. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

*4. LEPTOSPERMUM *attenuatum.*

L. foliis lanceolato-linearibus acutis trinerviis, calycibus ſericeo-villoſis, dentibus membranaceis coloratis nudiuſculis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 262.
Verdünnte Südſeemyrte. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

Nunquam vivum vidi. Flores *videntur albi, ſunt plerumque bini in pedunculo brevi ſericeo.* Smith. l. c.

*5. LEPTOSPERMUM *lanigerum.*

L. foliis ovato-lanceolatis trinerviis, calycibus ſericeo-villoſis, dentibus foliaceis perſiſtentibus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 263.
Leptoſpermum trinerve. *White itin. p.* 229. *c. icone.*
Philadelphus (*laniger*) foliis oblongis acutis integerrimis pubeſcentibus, calycibus lanatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 156.
Wollige Südſeemyrte. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. f. f. fl.)

Variat foliis *glabris et pubeſcentibus*, calyce *ſericeo et villoſo, villis longis et craſſis.* Smith. l. c.

*6. LEPTOSPERMUM *pubeſcens.* †

L. foliis lanceolato-oblongis piloſis ſubobliquis apice reflexis.

Philadelphus laniger β. piliger. *Ait. Kew.* 2. *p.* 156.

Weichbehaarte Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

*7. LEPTOSPERMUM *parvifolium.*

L. foliis obovatis enerviis, ramulis calycibusque piloſis, dentibus membranaceis coloratis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 263.

Kleinblättrige Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Hollandia.

*8. LEPTOSPERMUM *arachnoideum.*

L. foliis ſubulatis pungentibus, ramulis hirtis, calycibus dentibusque villoſis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 263.

Leptoſpermum arachnoides. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 175. *t.* 35.

Spinnenwebenartige Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

*9. LEPTOSPERMUM *juniperinum.*

L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus, ramulis ſericeis, calycibus glabris, dentibus membranaceis coloratis nudis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 263.

Melaleuca (*tenuifolia*) frutex erectus ramoſus, ramis pendulis piloſis, foliis alternis acutis tenuibus obliquis mucronatis piloſis quinquenervoſis, floribus lateralibus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Wendl. obſ.* 50.

Wachholderblättrige Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*10. LEPTOSPERMUM *baccatum.*

L. foliis lineari-lanceolatis pungentibus, ramulis hirtis, calycibus glabris, dentibus membranaceis coloratis pubeſcentibus, capſula baccata. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 264.

Beerentragende Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

*11. LEPTOSPERMUM *ambiguum.*

L. foliis linearibus apice recurvis, calycibus glabriuſculis, dentibus foliaceis lanceolatis nudis ſtaminibus corolla longioribus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 264.

Zweifelhafte Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Ab omnibus a me examinatis ſpeciebus ſtaminibus *corolla longioribus diverſa, qua natura cum Metroſideris convenit, ſed differt ab his* ſtigmate *capitato charactere Leptoſpermis proprio ut et habitu.* Smith. l. c.

12. LEPTOSPERMUM *virgatum.* †

L. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis enerviis, umbellis terminalibus.

Melaleuca virgata. *Lin. ſuppl.* 343.

Melaleuca (*virgata*) foliis oppoſitis linearibus enerviis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Forſt. prodr. n.* 211.

Leptoſpermum virgatum. *Forſt. gen.* 36. 7.

Myrtus amboinenſis. *Rumph. amb.* 2. *p.* 77. *t.* 18.

Ruthenförmige Südſeemyrte. W.

Habitat in Nova Caledonia. ♄

Folia *pagina inferiori punctis atris reſinoſis tecta. In binis ſpeciminibus hujus plantae, in herbario Linnaeano aſſervatis, vidi* ſtamina *decem* fructumque *uni-vel bilocularem, videtur itaque ſpecies Imbricariae cum duplici ſtaminum numero eſſe. Si vero inpoſterum fructus* 3-*ſ.* 4-*locularis obſervetur, eſſet ſpecies decandra Beckiae, qua cum* foliis *oppoſitis, ut et* magnitudine *habituque floris convenit, quum reliqua Leptoſperma foliis gaudeant alternis; hinc plantae hujus genus futuris obſervationibus eſt determinandum.* Smith. Act. ſoc. Lin. Lond 3. p. 265.

*969. FABRICIA.

Smith. Act. ſoc. Lin. Lond. 3. *p.* 265.

Cal. 5-fidus ſemiſuperus. *Petala* 5 ſeſſilia. *Stigma* capitatum. *Capſ.* multilocularis. *Semina* alata.

*1. FABRICIA *myrtifolia.*

F. foliis lanceolato-obovatis oppoſitis, dentibus calycinis orbiculatis. W.

Fabricia myrtifolia. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 175. *t.* 35. *f.* 4.

Myrtenblättrige Fabricie. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

*2. FABRICIA *laevigata.*

F. foliis obovatis alternis glaucis, dentibus calycinis triangularibus. W.

Fabricia laevigata. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 265.
Glatte Fabricie. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄
Folia *ſunt alterna obovata glabra obſcure* 3-*ſ.* 5-*nervia glauca.* Calycis *dentes triangulares, qui orbiculati ſunt in F. myrtifolia, quae et omnibus partibus duplo major eſt.* Smith. l. c.

*970. METROSIDEROS.

Smith. Act. ſoc. Lin. Lond. 3. *p.* 266.

Cal. 5-fidus ſemiſuperus. *Petala* 5. *Stamina* longiſſima exſerta. *Stigma* ſimplex. *Capſula* 3-vel 4-locularis.

* *Foliis oppoſitis.*

*1. METROSIDEROS *hiſpida.*
M. foliis oppoſitis baſi cordatis amplexicaulibus, ramulis pedunculis calycibusque hiſpidis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 267.
Rauhes Eiſenmaſs. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄
Planta *ſpecioſa, foliis latis ſeſſilibus oppoſitis, ramiſque hiſpidis a reliquis diſtincta.* Flores *flavi, ſtaminibus divaricatis, umbellati,* umbellis *in corymbum magnum terminalem collectis,* pedunculis *hiſpidis pilis rubro-fuſcis tectis ut in Robinia hiſpida.* Smith. l. c.

*2. METROSIDEROS *floribunda.*
M. foliis oppoſitis petiolatis ovato-lanceolatis, panicula brachiata, pedicellis umbellatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 267.
Vielblütiges Eiſenmaſs. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄
Flores *minores quem in praecedente, videntur albi.* Panicula *e ramis decuſſatis, umbella parva terminatis, compoſita.* Pedunculi *hiſpidi interdum glabri.* Smith. l. c.

*3. METROSIDEROS *coſtata.*
M. foliis oppoſitis petiolatis lineari-lanceolatis acuminatis obliquis, panicula brachiato-decompoſita, pedicellis ſubumbellatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 267.

Metroſideros coſtata. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 171. *t.* 34. *f.* 2.
Ribbenfrüchtiges Eiſenmaſs. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

Diſtincta a praecedente: foliis *anguſtioribus longioribus, magis rigidis et nitidis, obliquis vel falcatis,* panicula *irregulari, duplicato-ramoſa,* ramis *terminalibus ſubumbellatis,* floribus *majoribus flaveſcenti-albis.* Smith. l. c.

4. METROSIDEROS *diffuſa.*

M. foliis oppoſitis ovatis venoſis utrinque glabris, paniculis axillaribus terminalibusve, pedicellis oppoſitis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 268.
Melaleuca (*diffuſa*) foliis oppoſitis ovatis acuminatis, pedunculis rameis cymoſis. *Forſt. prodr. n.* 213.
Melaleuca (*lucida*) glabra, foliis oppoſitis ovatis venoſis, paniculis terminalibus, pedicellis oppoſitis bifloris. *Lin. ſuppl.* 342.
Ausgebreitetes Eiſenmaſs. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄

Folia *pagina inferiori trinervia, nervis ante apicem evaneſcentibus.* Flores *lutei.*

5. METROSIDEROS *villoſa.*

M. foliis oppoſitis ovatis venoſis ſubtus pubeſcentibus, thyrſis axillaribus terminalibusve oppoſitis villoſis, floribus ſeſſilibus confertis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 268.
Melaleuca (*villoſa*) tomentoſa, foliis oppoſitis ovatis venoſis, paniculis terminalibus, pedicellis bi-ſ. trifloris. *Lin. ſuppl.* 342.
Melaleuca (*aeſtuoſa*) foliis oppoſitis ovatis obovatisque venoſis (ſubtrinerviis), pedunculis cymoſis terminalibus tomentoſis. *Forſt. prodr. n.* 215.
Leptoſpermum collinum. *Forſt. gen.* 36. *n.* 2.
Metroſideros ſpectabilis. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 172. *t.* 34. *f.* 9.?
Haariges Eiſenmaſs. W.
Habitat in Taheiti. ♄

Simillima M. diffuſae, at illa glaberrima, floribus *luteis; haec vero caule,* petiolis, panicula, pedunculis *et* calyce *tomento albis;* floribus *rubicundis,* ſtaminibus *multo majoribus.*

*6. METROSIDEROS *florida.*

M. foliis oppoſitis obovato-oblongis venoſis glabris, thyrſo terminali, calycibus turbinatis nudis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 269.

Melaleuca (*florida*) foliis oppoſitis oblongo-obovatis venoſis, pedunculis terminalibus cymoſis, calycibus turbinatis. *Forſt. prodr. n.* 114.
Leptoſpermum ſcandens. *Forſt. gen.* 36. *n.* 1.
Dichtblütiges Eiſenmaſs. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♄

Rami *longi thyrſo magno terminati.* Flores *flaveſcentes.* Calyx *valde elongatus forma Caryophyllorum.* Folia *glabra.* Pedunculi *et* Calyces *ſericei, pilis adpreſſis tecti.* Smith. l. c.

*7. METROSIDEROS *glomulifera.*

M. foliis oppoſitis ovatis reticulato-venoſis ſubtus pubeſcentibus, capitulis lateralibus pedunculatis bracteisque tomentoſis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 269.
Kugelblütiges Eiſenmaſs. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

Arbor *ramis teretibus oppoſitis.* Folia *oppoſita brevi petiolo pubeſcenti ſuffulta, ovata, integerrima ſubundulata, venis numeroſis reticulata, ſubtus pubeſcentia.* Flores *vireſcenti-flavi, in capitulo parvo globoſo collecti, pedunculo unciali ſimplici pubeſcenti ſuffulti.* Pedunculi *laterales ſupra inſertionem petioli foliorum ſummorum oppoſiti.* Capitulun *florum binis oblongis pubeſcentibus bracteis ſuffultum.* Smith. l. c.

8. METROSIDEROS *anguſtifolia.*

M. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis nudis, pedunculis axillaribus umbellatis, bracteis lanceolatis glabris. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 270.
Myrtus (*anguſtifolia*) pedunculis umbellatis, foliis lineari-lanceolatis ſubſeſſilibus. *Mant.* 74.
Phillyrea foliis longis ſubtus flavis, fructu deciduo. *Burm. afr.* 237. *t.* 83. *f.* 2.?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 647. *t.* 25. *f.* 2.
Schmalblättriges Eiſenmaſs. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Arbuſcula *ramis teretibus, ramulis tetragonis glabris.* Folia (*Phillyreae anguſtifoliao*) *ſubſeſſilia longa lineari-lanceolata integerrima glabra, internodiis multoties longiora.* Pedunculi *laterales oppoſiti breves internodiis vix longiores apice* Umbellula *ſimplici, rarius compoſita parva multiflora.* Petala *ſubrotunda.* Stamina *multa erecta ſetacea petalis longiora.*

Eſt vera Metroſideri ſpecies, fructus eſt capſula nec bacca, ſimillimus capſulae Melaleucae ſuaveolentis. Gaertneri qui planta nullo modo ſimilis. Burmanni ſynonymum vix huc pertinere videtur, quum fructum, baccam unilocularem monoſpermam eſſe, dixerit. Smith. l. c.

* * *Foliis alternis.*

*9. METROSIDEROS *ciliata.*

M. foliis ſparſis ſuboppoſitis ellipticis obtuſis coriaceis baſi ſubciliatis, corymbis terminalibus piloſis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 271.

Melaleuca (*ciliata*) foliis ſparſis, ſuperioribus ſuboppoſitis oblongis obtuſis ciliatis aveniis enerviis, cymis corymboſis terminalibus. *Forſt. prodr. n.* 217.

Leptoſpermum ciliatum. *Forſt. gen.* 36. *n.* 3.

Gefranztes Eiſenmaſs. W.

Habitat in Nova Caledonia. ♄

Folia *rigida craſſa concava, margine revoluta, iis Celaſtri buxifolii ſimilia, ſed minus nitida, inferne pallida, a venis transverſalibus reticulata, cum coſta media tenui. Clariſſ. Forſter* folia *avenia et enervia deſcripſit, venae forte in recenti planta ſunt minus viſibiles.* Foliorum *baſis*, rami *juniores*, pedunculi, calyx *et* petala *plana, pilis longis patentibus obſita.* Flores *pulchri magni, ſaturate rubri, pauci in corymbo vel umbella terminali.* Fructus *magnus depreſſus trilobus margine calycis altior.* Smith. l. c.

*10. METROSIDEROS *linearis.*

M. foliis ſparſis linearibus canaliculatis acutis rigentibus, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 2. *p.* 273.*

Melaleuca (*linearis*) foliis linearibus carinatis, junioribus villoſis, floribus lateralibus ſeſſilibus confertis. *Wendl. et Schrad. ſert. hannov.* 19. *t.* 11.*

Linienblättriges Eiſenmaſs. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*11. METROSIDEROS *lanceolata.*

M. foliis alternis lanceolatis mucronatis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus pubeſcentibus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 272.*

Metroſideros citrina. *Curt. mag.* 260.

Lanzenblättriges Eiſenmaſs. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*12 METROSIDEROS *ſaligna.*

M. foliis alternis lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis, floribus lateralibus confertis ſeſſilibus glabris. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 272.

Weidenblättriges Eiſenmaſs. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

A praecedente diſtinta: foliis *minus rigidis attenuatis,* floribus *minoribus flaveſcentibus,* calyce petalisque *glabris, neque pubeſcentibus, neque ciliatis.* Smith. l. c.

*13. METROSIDEROS *viminalis.*

M. foliis alternis lineari-lanceolatis, floribus confertis lateralibus pubeſcentibus.

Metroſideros viminalis. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 171. *t.* 34. *f.* 4.

Schlankes Eiſenmaſs. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Differt a praecedente: foliis *lineari-lanceolatis non attenuatis* floribus*que pubeſcentibus.* Smith. Act. ſoc. Lin. Lond. 3. p. 273.

*14 METROSIDEROS *capitata.*

M. foliis ſparſis obovatis mucronulatis, capitulis terminalibus, calycibus ramulisque piloſis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 273.

Kopfförmiges Eiſenmaſs. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Ab omnibus ſpecies, valde diſtincta. Folia *vix quadrilinearia parce venoſa, obſolete crenata vel potius ſcabra e punctis minutis marginalibus.* Flores *capitati in pedunculo brevi.* Calyx *tubuloſus hirſutus, dentibus foliaceis perſiſtentibus.* Petala *parva purpurea.* Stamina *purpurea corolla triplo longiora.* Germen *minutum in fundo calycis.* Stylus *longitudine ſtaminum.* Stigma *parum incraſſatum nec capitatum.* Fructum *maturum non vidi, ſed non dubito fore Metroſideri ſpeciem, quum rudimenta trium valvularum detexerim.* Florum *forma eſt ut in Lythris.* Folia *ſunt punctata parum aromatica.* Smith. l. c.

Leptoſpermi et Metroſideri ſpecies a Clariſ. Salisbury (in prodromo ſtripium in horto ad chapel allerton vagentium) indicatae, ob nimis brevem deſcriptionem heic omiſi. W.

971. PSIDIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 841.

Cal. 5-fidus, ſuperus. *Petala* 5. *Bacca* 1-locularis, polyſperma.

1. PSIDIUM *pyriferum.*
P. foliis ellipticis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis unifloris. W.
P. foliis lineatis obtuſiuſculis unifloris. *Mill. dict.* 1. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 6.
P. caule quadrangulo. *Hort. cliff.* 148. *Fl. zeyl.* 192.
Guajava foliorum angulis quadrangulis, fructu oblongo. *Trew. ehr. t.* 43.
Guajava alba dulcis. *Comm. hort.* 1. *p.* 121. *t.* 63. *Mer. ſurin.* 19. *t.* 19.
Guajavos fructu pallido dulci. *Burm. zeyl.* 112.
Cujavus domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 140. *t.* 47.
Pela. *Rheed. mal.* 3. *p.* 31. *t.* 34.
Pſidium fruticoſum, foliis ovatis venoſis, fructu majore. *Browm. jam.* 238.
Malo puniceo affinis pomifera, flore pentapetalo albo, fructu ex toto eſculento majore albo. *Sloan. hiſt.* 2. *p.* 163. Guajava *vulgo.*
Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 1. *p.* 699.
Birnentragender Gujavabaum. W.
Habitat in Indiis. ♄ (v. ſ.)

*2. PSIDIUM *pumilum.*
P. foliis lanceolatis acutis ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris. W.
P. (*pumilum*) foliis lanceolatis lineatis acutis, pedunculis unifloris, fructu globoſo. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 56. *
P. (*anguſtifolium*) foliis lanceolatis lineatis ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 16. *
Cujavillus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 145. *t.* 49.
Niedriger Gujavabaum. W.
Habitat in Zeylona. ♄

*3. PSIDIUM *aromaticum.*
P. foliis oblongis acuminatis glabris, pedunculis unifloris. W.
P. (*aromaticum*) foliis ovatis acuminatis, fructu dulci ceraſiformi. *Aubl. guj.* 1. *p.* 485. *t.* 191. *

Gewürzhafter Gujavabaum. W.
Habitat in ſylvis Cajennae, Gujanae. ♄

*4. PSIDIUM *grandiflorum.*

P. foliis ovatis acuminatis glabris, pedunculis unifloris bracteatis. W.

P. (*grandiflorum*) foliis ovatis acuminatis, fructu parvo quadriloculari. *Aubl. guj.* 1. *p.* 483. *t.* 190. *

Groſsblütiger Gujavabaum. W.

Habitat in ſylvis Cajennae. ♄

Pedunculi *longi uniflori.* Bracteae *binae lanceolatae oppoſitae ſub flore.* W.

5. PSIDIUM *Decaſpermum.*

P. foliis ovatis acuminatis pubeſcentibus, pedunculis unifloris bracteatis. *Forſt. prodr. n.* 219.

P. foliis ovatis acuminatis planis, pedunculis unifloris bracteatis. *Lin. ſuppl.* 252.

Decaſpermum fruticoſum. *Forſt. gen. n.* 37.

Ungenieſsbarer Gujavabaum. W.

Habitat in Societatis *inſulis.* ♄

Frutex *glaber.* Folia *petiolata parva integerrima venoſa non lineata.* Pedunculi *axillares foliis ſesqui breviores bracteati ſericei uniflori.* Bractea *una ſ. altera oblonga.* Flores *parvi albi.* Calyces *ſericei.* Capſula ſ. Bacca *parva globoſa toruloſa, calyce perſiſtente coronata.*

6. PSIDIUM *pomiferum.*

P. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis trifloris. W.

P. foliis lineatis acuminatis, pedunculis trifloris, *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 7.

Guajava alba acida, fructu rotundiore. *Pluk. alm.* 181. *t.* 193. *f.* 4.

Guajaba pomifera indica, pomis rotundis. *Bauh. pin.* 437.

Cujavus agreſtis. *Rumph. amb.* 1. *p.* 142. *t.* 48. *Mer. ſurin.* 57. *t.* 57.

Malacca pela. *Rheed. mal.* 3. *p.* 33. *t.* 35. *Burm. ind. p.* 113.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 703.

Apfeltragender Gujavabaum. W.

Habitat in Indiis. ♄

*7. PSIDIUM *guineenſe.*

P. foliis ovatis integerrimis ſubtus tomentoſis, peduncu-

lis trifloris. *Swartz prodr.* 77. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 881. *
Africaniſcher Gujavabaum. W.
Habitat in inſula Principis *prope* Guineam. ♄

*8. PSIDIUM *montanum.*
P. foliis oblongis acuminatis crenulatis nitidis, pedunculis multifloris. *Swartz prodr.* 77. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 879. *
P. arboreum maximum, foliis ovatis nitidis, ligno fuſco, fibris undulatis. *Brown. jam.* 238.
Berg-Gujavabaum. W.
Habitat in montibus Jamaicae. ♄

972. EUGENIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 842.

Cal. 4-partitus, ſuperus. *Petala* 4. *Bacca* 1-locularis 1-ſperma.

1. EUGENIA *malaccenſis.*
E. foliis integerrimis oblongis, pedunculis ſubquadrifloris lateralibus. W.
E. foliis integerrimis, pedunculis ramoſis lateralibus. *Fl. zeyl.* 187. *Mill. dict. n.* 1.
Perſici oſſiculo fructus malaccenſis rubens. *Bauh. pin.* 441.
Jamboſa domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 121. *t.* 37, 38.
Nati-ſchanibu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 29. t. 18. *Raj. hiſt.* 1748. *Burm. ind.* 114.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 705.
Malacciſcher Jambuſenbaum. W.
Habitat in India. ♄

2. EUGENIA *Jambos.*
E. foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis ſubquadrifloris terminalibus. W.
E. foliis integerrimis, pedunculis ramoſis terminalibus. *Fl. zeyl.* 188. *. *Mill. dict. n.* 2.
Perſici oſſiculo fructus malaccenſis ex candido rubeſcens. *Bauh. pin.* 441.
Jamboſa ſylveſtris alba. *Rumph. amb.* 1. *p.* 127. *t.* 39.
Malacca ſchambu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 27. *t.* 17. *Raj. hiſt.* 1478. *Burm. ind.* 114.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 708.

Gemeiner Jambuſenbaum. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

*3. EUGENIA *baruenſis.*

E. foliis integerrimis ovato-lanceolatis, pedunculis multifloris axillaribus petiolo brevioribus. W.
E. (*baruenſis*) foliis integerrimis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris et aggregatis vel multifloris. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 486. *Collect.* 3. *p.* 183.*
E. pedunculis partialibus elongatis. *Iacq. amer.* 153.
Baruſcher Jambuſenbaum. W.
Habitat in inſula Baru *prope* Carthagenam *in* America. ♄ (v. ſ.)

Pedunculi *ſunt uniflori ſolitarii vel aggregati, ſaepius vero multiflori fere racemoſi, ſemper vero petiolo breviores.* Calyx *ſic dictus inferus, vel potius bracteae, non adſunt.* W.

*4. EUGENIA *floribunda.*

E. foliis integerrimis margine revolutis oblongis acuminatis, pedunculis multifloris axillaribus petiolorum longitudine. W.
Eugenia floribunda. *Weſt. ſt. cruc. p.* 216.
Vielblütiger Jambuſenbaum. W.
Habitat in inſula St. Crucis. ♄ (v. ſ.)

Folia *parva uncialia vel ſeſquiuncialia anguſta elliptica baſi anguſtiora, longiſſime acuminata integerrima, margine revoluta, tenuiſſime venoſa, inferne punctata.* Pedunculi *ſolitarii, aggregati vel multiflori, longitudine petiolorum, baſi bracteati.* Flores *parvi.* W.

*5. EUGENIA *buxifolia.*

E. foliis integerrimis obovato-lanceolatis obtuſis, pedunculis multifloris axillaribus lateralibusque petiolorum longitudine. W.
Myrtus (*buxifolia*) racemulis breviſſimis confertis axillaribus, foliis cuneatis oblongis obtuſis convexiuſculis. *Swartz. prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 899.
Buchsbaumblättriges Jambuſenbaum. W.
Habitat in Hiſpaniolae *ſteriliſſimis campis petroſis verſus mare.* ♄ (v. ſ.)

*6. EUGENIA *axillaris.*

E. foliis integerrimis oblongis acuminatis obtuſis planis, pedunculis axillaribus multifloris petiolorum longitudine. W.
Myrtus (*axillaris*) racemulis multifloris confertis axilla-

ribus breviſſimis, foliis oblongis acuminatis nitidis. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 901. *

Winkelblütiger Jambuſenbaum. W.

Habitat in montoſis Jamaicae. ♄

Differt a Myrto monticola, cui ſtatura proxima: magnitudine, foliis *majoribus magis acuminatis,* racemulis *confertis,* floribus *copioſioribus,* calyce *duplici.* Swartz l. c.

*7. EUGENIA *ſinemarienſis.* †

E. foliis integerrimis ovato-oblongis acuminatis reticulato-venoſis, pedunculis axillaribus terminalibusque multifloris petiolorum longitudine. W.

E. foliis ovatis acuminatis, floribus ſeſſilibus congeſtis terminalibus et axillaribus, fructu rubro triſpermo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 501. *t.* 198.

Sinemariſcher Jambuſenbaum. W.

Habitat in Gujana *ad ripas fluvii* Sinemarienſis. ♄

An Myrtis adnumeranda? W.

*8. EUGENIA *lateriflora.*

E. foliis integerrimis margine revolutis ſubrotundo-ellipticis reticulato-venoſis, floribus ſparſis lateralibus ſeſſilibus. W.

E. floribus lateralibus ſeſſilibus, foliis oblongis integerrimis nitidis ſubtus punctatis. *Vahl. ſymb.* 3. *q.* 64. *

Seitenblütiger Jambuſenbaum. W.

Habitat in inſula St. Crucis. ♄ (v. ſ.)

*9. EUGENIA *crenulata.*

E. foliis repandis ſubrotundis, pedunculis axillaribus ſubtrifloris petiolorum longitudine. W.

Myrtus (*crenulata*) pedunculis ſolitariis axillaribus ſubtrifloris, foliis ſubrotundis crenatis. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 889. *

Gekerbter Jambuſenbaum. W.

Habitat in Hiſpaniolae *fruticetis montoſis.* ♄ (v. ſ.)

*10. EUGENIA *alpina.*

E. foliis integerrimis ellipticis aveniis, pedunculis ſolitariis ſubterminalibus unifloris breviſſimis. W.

Myrtus (*alpina*) pedunculis ſolitariis terminalibus unifloris breviſſimis, foliis ovatis, ramulis quaternis faſtigiatis, caule arboreo. *Swartz prodr.* 77. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 883. *

Gebirgs-Jambuſenbaum. W.

Habitat in Jamaicae *cacumine montium coeruleorum.* ♄ (v. ſ.)

Folia *parva margine revoluta; parum majora quam in Vaccinio oxycocco.* W.

*11. EUGENIA *liguſtrina.*

E. foliis integerrimis lanceolatis baſi anguſtatis obtuſis aveniis, pedunculis unifloris ſolitariis terminalibus. W.

Myrtus (*liguſtrina*) pedunculis ſolitariis ſubſimplicibus terminalibus unifloris, foliis lanceolatis obtuſis convexis lucidis. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 885. *

Liguſterartiger Jambuſenbaum. W.

Habitat in fruticetis depreſſis montium Hiſpaniolae. ♄ (v. ſ.)

12. EUGENIA *Pſeudo-pſidium.*

E. foliis integerrimis ovatis acuminatis, pedunculis unifloris terminalibus lateralibusque pluribus. W.

E. foliis integerrimis, pedunculis unifloris pluribus lateralibus terminalibusque. *Syſt. veg.* 384.

E. foliis integerrimis, pedunculis unifloris axillaribus et terminalibus. *Iacq. amer.* 152. *t.* 93.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 709.

Gujavaartiger Jambuſenbaum. W.

Habitat in Martinica. ♄ (v. ſ.)

Fructus *laevis.*

13. EUGENIA *uniflora.*

E. foliis integerrimis ovato-lanceolatis, pedunculis unifloris ſolitariis lateralibus. W.

E. (*uniflora*) foliis integerrimis cordato-lanceolatis, pedunculis unifloris lateralibus. *Sp. pl.* 673.

Myrtus (*braſiliana*) floribus ſolitariis pedunculis nudis, petalis ſubciliatis. *Sp. pl.* 674.

Plinia (*rubra*) floribus tetrapetalis. *Mant.* 402.

Plinia (*pedunculata*) floribus pedunculatis polyandris. *Lin. ſuppl.* 253.

Eugenia. *Roy. lugdb.* 265.

E. indica, myrti folio deciduo, flore albo, fructu ſuave rubenti molli leviter ſulcato et odoro. *Mich. gen.* 226. *t.* 108.

Myrtus indica, foliis rigeſcentibus latis ac recurvis parum odoratis. *Till. piſ.* 117. *t.* 44.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 710. 714. 715.

Einblütiger Jambuſenbaum. W.

Habitat in Braſilia. ♄ (v. ſ.)

Pedunculi *ſolitarii.*

*14. **EUGENIA** *Patriſii.*

E. foliis integerrimis ovatis acuminatis acutis, pedunculis unifloris geminatis axillaribus, bracteis ſetaceis. W.
E. (*Patriſii*) foliis ellipticis glabris acuminatis acutis, pedunculis unifloris capillaribus axillaribus geminis, terminalibus ſubquaternis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 35. *
Patriſiſcher Jambuſenbaum. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Affinis E. uniflorae, diverſa habitu *et* bracteis *ſetaceis nec ovatis.* Vahl. l. c.

*15. **EUGENIA** *zeylanica.* W.

E. foliis integerrimis oblongis acuminatis coriaceis inpunctatis, pedunculis unifloris filiformibus ſubgeminatis axillaribus lateralibusque. W.
Zeyloniſcher Jambuſenbaum. W.
Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ.)
Folia *oppoſita breve petiolata oblonga baſi anguſtiora apice acuminata obtuſa, coriacea nitida venoſa non punctata.* Pedunculi *uniflori filiformes geminati vel ſolitarii in foliorum axillis vel in ramulis aphyllis.* Bracteae *binae breviſſimae ſubulatae ſub germine. Differt a binis praecedentibus* foliis *coriaceis nec membranaceis*, defectu *punctorum*, bracteis *breviſſimis.* W.

16. **EUGENIA** *cotinifolia.*

E. foliis integerrimis ſubrotundo-obovatis obtuſis, pedunculis unifloris ſubgeminatis lateralibus. W.
E. foliis ovatis obtuſis integerrimis, pedunculis unifloris. *Mant* 243. *Iacq. obſ* 3. *p.* 3. *t.* 53. †
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 710.
Parückenbaumblättriger Jambuſenbaum. W.
Habitat in Cajenna. ♄
Rami *juniores angulati.* Folia *oppoſita, ſubpetiolata, nitida, coriacea.* Pedunculi *axillares*, 1, 2, *ſ.* 3.

*17. **EUGENIA** *latifolia.*

E. foliis integerrimis ovato-oblongis acuminatis reticulato-venoſis, pedunculis unifloris ſubternis axillaribus, fructiferis nutantibus. W.
E. foliis ampliſſimis ovatis acutis, fructu nigro olivaeformi. *Aubl. guj.* 1. *p.* 502. *t.* 199. *
Streifblättriger Jambuſenbaum. W.
Habitat ad agrorum margines Gujanae. ♄

*18. EUGENIA *undulata*.

E. foliis integerrimis ovato-lanceolatis acuminatis margine ſubundulatis, pedunculis unifloris aggregatis ſupraxillaribus. W.

E. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris ſubundulatis, pedunculis lateralibus unifloris aggregatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 36. *

C. foliis ovato-oblongis acuminatis, fructu parvo rubro olivaeformi. *Aubl. guj.* 1. *p.* 508. *t.* 202. *

Wellenblättriger Jambuſenbaum. W.

Habitat in Cajenna, Gujana. ♄

*19. EUGENIA *Mini*.

E. foliis integerrimis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis axillaribus multifloris ſubracemoſis folio brevioribus. W.

E. (*Mini*) foliis lanceolatis, floribus racemoſis, fructu parvo albo ex rubro variegato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 498. *t.* 197. *

Weidenblättriger Jambuſenbaum. W.

Habitat in ſylvis Cajennae *et* Gujanae. ♄

*20. EUGENIA *fragrans*.

E. foliis integerrimis ſubrotundo-ovatis obtuſiuſculis, pedunculis axillaribus multifloris trichotomis longitudine foliorum. W.

Myrtus *fragrans*) pedunculis axillaribus trichotomis ſimplicibusque, foliis ovatis convexiuſculis ſubcoriaceis punctatis glabris, caule arboreo. *Swartz prodr.* 79. *Fl. ind. occid.* 1. *p.* 914. * *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 59. *

E. (*paniculata*) foliis integerrimis ovatis obtuſis, pedunculis paniculatis axillaribus et terminalibus. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 108. *t. f.* 1.?

E. (*montana*) foliis ovatis acutis, floribus terminalibus, fructu parvo albo, punctis rubris notato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 495. *t.* 195.?

Wohlriechender Jambuſenbaum. W.

Habitat in montibus excelſis Jamaicae *auſtralis*. ♄

*21. EUGENIA *punctata*.

E. foliis integerrimis oblongis obtuſis glabris, tenellis ſericeis, pedunculis trifloris axillaribus longitudine foliorum. W.

E. (*punctata*) foliis oblongis utrinque punctatis, pedunculis oppoſitis trifloris longitudine foliorum. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 65. *

Punctirter Jambuſenbaum. W.
Habitat in inſula St. Crucis. ♄ (v. ſ.)

*22. EUGENIA *Cumete.*

E. foliis integerrimis ovatis acuminatis reticulato-venoſis, pedunculis trichotomis axillaribus folio longioribus, floribus pentapetalis. W.
E. (*Cumete*) foliis latis ovatis acuminatis, floribus racemoſis, fructu albo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 479. *t.* 196. *
Netzblättriger Jambuſenbaum. W.
Habitat in ſylvis remotioribus Gujanae. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*23. EUGENIA *gujanenſis.*

E. foliis integerrimis oblongis acutiuſculis, pedunculis trifloris folio brevioribus. W.
E. foliis ovatis obtuſiuſculis ſubpetiolatis, pedunculis ſolitariis bi- et trifloris, fructu monoſpermo. *Aubl. guj.* 1. *p.* 506. *t.* 201. *
Rothfrüchtiger Jambuſenbaum. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis prope montem* Serpent. ♄
Similis E. punctatae, diſtincta tamen: foliis *minoribus acutioribus*, venis *foliorum crebrioribus*, pedunculis *brevioribus*, floribus *minoribus*. W.

24. EUGENIA *caryophyllata.*

E. foliis integerrimis oblongis acutiuſculis, pedunculis trichotomis, paniculis axillaribus et terminalibus, calycibus repandis, fructu elliptico. W.
E. (*caryophyllata*) foliis integris, panicula trichotoma decompoſita. *Thunb. diſſ. de. Caryoph. aromat. p.* 1. *
Caryophyllus aromaticus. *Sp. pl.* 735. *Hort. cliff.* 207. *Mat. med. p.* 136. *Blackw. t.* 338. *Gaert. ſem. p.* 167. *t.* 33. *f.* 2.
Caryophyllus foliis ovato-lanceolatis oppoſitis, floribus terminalibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mill. dict. n.* 1.
Caryophyllus aromaticus fructu oblongo. *Bauh. pin.* 410.
Caryophyllus aromaticus indiae orientalis, fructu clavato monopyreno. *Pluk. alm.* 88. *t.* 155. *f.* 1.
Caryophyllus. *Cluſ. exot.* 16. *Rumph. amb.* 2. *p.* 3. *t.* 1. 2. 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p* 12. *f.* 1.
Gewürznäglein-Jambuſenbaum.
Habitat in Moluccis, *ſolo arid.* no. ♄ (v. ſ.)
Fructus *eſt* Drupa *ſecundum Illuſt. Thunbergii deſcriptionem, Gaertnerus vero* Baccam *monoſpermam ſe-*

mine accoco eſſe contendit. Fructus *nonnulli a me examinati erant*, baccae *monoſpermae*, *nec* drupae. W.

*25. EUGENIA *elliptica.*

D. foliis integerrimis ellipticis acuminatis, pedunculis paniculatis axillaribus et terminalibus, calyce repando, fructibus globoſis. W.

E. (*elliptica*) foliis ellipticis acuminatis, floribus paniculatis, calyce repando, bacca globoſa. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 281. *

Elliptiſcher Jambuſenbaum. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Calyx *clavatus margine repando, nec dentato.* Petala 4 *alba parva decidua.* Stylus *brevis ſtigmate ſimplici.* Bacca *magnitudine Piſi majoris, alba, calyce coronata monoſperma.* Smith. l. c.

*26. EUGENIA *tomentoſa.*

E. foliis oblongis integerrimis ramisque villoſis, racemis axillaribus compoſitis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 37. *

E. foliis ovatis ſubſeſſilibus, floribus racemoſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 504. *t.* 200. *

Filziger Jambuſenbaum. W.

Habitat in Gujana. ♄

*27. EUGENIA *trinervia.*

E. foliis integerrimis ovatis trinerviis glabris, racemis axillaribus oppoſitis ſolitariis, infrafoliaceis geminatis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 36. *

Dreynerviger Jambuſenbaum. W.

Habitat in Cajenna. ♄

28. EUGENIA *acutangula.*

E. foliis crenatis, pedunculis terminalibus, pomis oblongis acutangulis. *Sp. pl.* 673 *Fl. zeyl.* 190. *

Butonica terreſtris rubra. *Rumph. amb.* 3. *p.* 181. *t.* 115.

Tſieria - ſamſtravadi. *Rheed. mal* 4. *p.* 15. *t.* 7. *Raj. hiſt.* 140. *Burm. ind.* 114.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 711.

Eckenfrüchtiger Jambuſenbaum. W.

Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

29. EUGENIA *racemoſa.*

E. foliis crenatis, racemis longiſſimis, pomis ovatis quadrangulis. *Sp. pl.* 673. *Fl. zeyl.* 191. *

Butonica ſylveſtris alba. *Rumph. amb.* 3. *p.* 181. *t.* 116.

Samſtravadi ſ. Caipatſiambu. *Rheed. mal.* 4. *p.* 11. *t.* 6. *Raj. hiſt.* 1479. *Burm. ind.* 115.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 712.
Langtraubiger Jambuſenbaum. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

30. EUGENIA *laurina.* W. †
E. foliis ſerrulatis oblongis glabris, racemis axillaribus conjugatis. W.
Myrtus (*laurinus*) pedunculis racemoſis bracteatis, foliis ovato-lanceolatis ſerrulatis glabris. *Retz. obſ.* 4. *p.* 26.
Laurus ſerrata floribus ſpicatis, ex foliorum alis provenientibus. *Burm. zeyl. p.* 139. *t.* 62. *
Lorbeerartiger Jambuſenbaum. W.
Habitat in Zeylona. ♄

973. MYRTUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 844.

Cal. 5-fidus, ſuperus. *Petala* 5. *Bacca* 2-ſ. 3-locularis polyſperma.

1. MYRTUS *communis.*
M. floribus ſolitariis; involucro diphyllo. *Hort. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 123. *Mat. med.* 122. *Roy. lugdb.* 269. *Scop. carn. n.* 584. *Regn. bot.*
α. Myrtus communis, *romana.*
M. foliis ovatis, pedunculis longioribus. *Mill. dict. n.* 1. *et ic. t.* 184. *f.* 1. *Kniph. cent.* 4. *n.* 52.
M. latifolia romana. *Bauh. pin.* 468.
β. Myrtus communis, *tarentina.*
M. foliis ovatis, baccis rotundioribus. *Mill. dict. n.* 6.
M. minor vulgaris. *Bauh. pin.* 469.
γ. Myrtus communis, *italica.*
M. foliis ovato-lanceolatis acutis, ramis rectioribus. *Mill. dict. n.* 5.
M. communis italica. *Bauh. pin.* 468.
δ. Myrtus communis, *boetica.*
M. foliis ovato-lanceolatis confertis. *Mill. dict. n.* 4.
M. latifolia boetica 2. *Bauh. pin.* 469. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 65. *Blackw. t.* 114.
ε. Myrtus communis, *luſitanica.*
M. foliis lanceolato-ovatis acutis. *Mill. dict. n.* 3.
M. ſylveſtris, foliis acutiſſimis. *Bauh. pin.* 469. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 66. *f.* 1.
ζ. Myrtus communis, *belgica.*

M. foliis lanceolatis acuminatis. *Mill. dict. n. 2.*
M. latifolia belgica. *Bauh. pin.* 469.
ε. Myrtus communis, *mucronata.*
M. foliis lineari-acuminatis. *Mill. dict.*
M. foliis minimis et mucronatis. *Bauh. pin.* 469. *Cluſ. hiſt.* 1. *p* 67.
Houttuyn Lin. Pfl Syſt. 3. *p.* 643.
Gemeine Myrte. W.
Habitat in Europa *auſtrali*, Aſia, Africa. ♄ (v. v.)

*2. MYRTUS *tenuifolia.*
M. pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris, foliis linearibus mucronulatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 280.*
Schmalblättrige Myrte. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄
Folia *oppoſita uncialia et ultra, lineam lata, margine revoluta, ſubtus pubeſcentia.* Pedunculi *ſericei foliis breviores.* Flores *albi ſaepius rubicundi duplo minores quam in M. communi.* Germen *ſericeum.* Calyx *glaber.* Petala *pubeſcentia.* Smith. l. c.

*3. MYRTUS *tomentoſa.*
M. pedunculis unifloris, foliis triplinerviis ſubtus tomentoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 159. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 56.* *et* 3. *p.* 65.
M. (*caneſcens*) floribus ſolitariis ſparſis, foliis ovatis trinerviis tomentoſis, petiolis cauli connatis. *Loureiro. cochin. p.* 381. *
Arbor ſinenſis Canellae folio minore trinervi, prona parte villoſo, fructu Caryophylli aromatici majoris, villis ſimiliter obducto. *Pluk. amalth.* 21. *t.* 372. *f.* 1.
Filzige Myrte. W.
Habitat in China, Cochinchina. ♄

*4. MYRTUS *ceraſina.*
M. pedunculis lateralibus terminalibusque unifloris, foliis oblongis nitidis ſubtus punctatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 57. *
Arbor baccifera myrtifolia latiore fructu nigro ceraſino dipyreno. *Sloan. jam. hiſt.* 2. *p.* 107.
Kirſchartige Myrte. W.
Habitat in inſulis Caribaeis. ♄

*5. MYRTUS *procera.*
M. pedunculis confertis axillaribus unifloris, foliis ova-

tis acuminatis planis glabris, ramis virgatis, caule arboreo. *Swartz prodr.* 77. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 887.*
Hohe Myrte. W.
Habitat in ſylvis Hiſpaniolae *interioribus.* ♄
Foliis *cum M. monticola convenit*, pedunculis *vero florum diſtincta.* Folia *inodora.* Flores *fragrantes*, Swartz l. c.

*6. MYRTUS *bracteata.* W.
M. pedunculis unifloris axillaribus bracteatis, foliis ellipticis glabris punctatis, junioribus ſericeo-pubeſcentibus. W.
Beblätterte Myrte. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Folia *oppoſita petiolata integerrima elliptica, utrinque parum attenuata obtuſa leviſſime venoſa glabra punctata imprimis in pagina inferiore.* Folia *juniora utrinque pilis ſericeis adpreſſis flaveſcentibus tecta.* Pedunculi *uniflori villoſi ſolitarii axillares in ramulis junioribus.* Bracteae *binae lanceolatae piloſae ad baſin germinis.* Germen *pubeſcens.* Calycis *laciniae* 4, *ſubrotundae pubeſcentes ciliatae pellucido-punctatae.* Fructus *mihi ignotus.* W.

7. MYRTUS *biflora.*
M. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis. *Amoen. acad.* 5. *p.* 398.*
Caryophyllus fruticoſus, foliis lanceolatis oppoſitis, floribus geminatis alaribus. *Brown. jam.* 248. *t.* 25. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 716.
Zweyblütige Myrte. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*8. MYRTUS *trinervia.*
M. pedunculis axillaribus trifloris, foliis ovatis acuminatis trinerviis ſubtus tomentoſis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 280.*
Habitat in Nova Hollandia. ♄
Folia *lata pulchra oppoſita ovata acuminata ſubtus tomentoſa trinervia ut in Blakea.* Flores *parvi plerumque* 3 *in pedunculo brevi piloſo furcato. Licet* 4 *ſint calycis laciniae et petala tamen eſt Myrti nec Eugeniae ſpecies.* Bacca *enim continet ſemina multa gibboſo-curvata et eſt unilocularis; germen vero videtur bi-ſ. triloculare.* Smith. l. c.

9. **MYRTUS** *lucida.*
M. pedunculis ſubtrifloris, foliis ſubſeſſilibus lanceolatis attenuatis. *Sp. pl.* 674.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 717.
Glänzende Myrte. W.
Habitat Surinami. *Rolander.* ♄
Folia *ſingulari ſtructura, ex ovato admodum attenuata in apicem lanceolatum.* Flores *pentapetali.*

*10. MYRTUS *laevis.*
M. pedunculis umbellatis, foliis ovatis acuminatis. *Thunb. jap.* 198. *
Glatte Myrte. W.
Habitat in Japonia. ♄
Rami *teretes glabri.* Ramuli *pubeſcentes.* Folia *e geminis alternis ſolitaria; bina vel terna, petiolata ovata acuminata, acute ſerrata venoſa utrinque glabra, ſubtus pallida patentia inaequalia pollicaria et ultra.* Flores *in ramulis terminales umbellati.* Bacca 2-*ſ.* 3-*locularis.* Semina *ſolitaria in ſingulo loculamento. Valde affinis Crataego laevi et villoſae, differt vero a C. villoſa: quod tota glabra,* piſtillo *unico,* foliis *aggregatis; a C. laevi:* piſtillo *unico,* foliis *ovatis tenuibus longe acuminatis.* Thunb. l. c.

*11. MYRTUS *ruſcifolia.* W.
M. pedunculis ſubmultifloris axillaribus, foliis glaberrimis elliptico-ſubrotundis ſupra punctatis. W.
Mäuſedornblättrige Myrte. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Folia *quodammodo iis Ruſci aculeati ſimilia, ſed parum majora, oppoſita breviſſime petiolata conferta elliptico-ſubrotunda obtuſiuſcula integerrima venoſa, ſupra impreſſo-punctata, inferne punctis elevatis obſita.* Folia *juniora pilis rufeſcentibus adpreſſis tecta.* Peduculi *breves axillares conferti* 3-4-*ſ. multiflori pubeſcentes.* Floris *ſtructuram in ſpecimine male ſiccato haud axaminare potui.* Fructus *mihi ignotus.* W.

12. MYRTUS *dioica.*
M. pedunculis trichotomo-paniculatis, foliis oblongis floribus dioicis. *Sp. pl.* 675.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 645.
Getrennte Myrte. W.
Habitat in America. *Miller.* ♄
Folia *oppoſita, lanceolato-ovata craſſa.* Pedunculi

axillares et terminales, brachriato-paniculati, longitudine foliorum. Petala *pauca.*

*13. MYRTUS *lineata.*

M. floribus axillaribus ſubſeſſilibus, foliis ovatis acuminatis rigidis lineatis ſubtus incanis. *Swartz. prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 891. *

Geſtreifte Myrte. W.

Habitat in campeſtribus montium Domingenſium. ♄

*14. MYRTUS *cordata.*

M. floribus axillaribus lateralibusque ſubſeſſilibus, foliis ſeſſilibus cordatis ovatis nitidis. *Swartz. prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 893. * *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 57. *

Herzblättrige Myrte. W.

Habitat in India *occidentali.* (v. ſ.)

*15. MYRTUS *pallens.*

M. racemis terminalibus pubeſcentibus, pedicellis unifloris, foliis lato-lanceolatis attenuatis ſupra punctatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 57. *

Bleiche Myrte. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

*16. MYRTUS *dumoſa.*

M. racemis axillaribus breviſſimis, foliis petiolatis lato-lanceolatis acuminatis acutis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 57. *

Buſchige Myrte. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

*17. MYRTUS *glabrata.*

M. racemulis breviſſimis axillaribus multifloris, foliis ellipticis acuminatis convexis coriaceis glaberrimis. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 903. *

Spitzblättrige Myrte. W.

Habitat in fruticetis montium Hiſpaniolae. ♄ (v. ſ.)

*18. MYRTUS *diſticha.*

M. racemunculis axillaribus multifloris foliis brevioribus, foliis diſtichis deflexis ovato-lanceolatis ramis patentibus. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 894. *

Zweyzeilige Myrte. W.

Habitat in montibus Jamaicae *ſeptentrionalioris.* ♄

*19. MYRTUS *monticola.*

M. racemis multifloris breviſſimis axillaribus ſolitariis, foliis ovatis obtuſatis planis glaberrimis. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 898. *

Berg-Myrte. W.

Habitat in montibus excelſis Jamaicae. ♄. (v. ſ.)

*20. MYRTUS *Gregii.*

M. pedunculis multifloris axillaribus, foliis ellipticis acutis integerrimis ſubtus pubeſcentibus. *Swartz prodr.* 78. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 898. *

Greggia aromatica. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 168. *t.* 33. *f.* 3.

Gregiſche Myrte.

Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. ſ.)

*21. MYRTUS *virgultoſa.*

M. racemis lateralibus terminalibusque, foliis lato-lanceolatis attenuatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 58. *

M. racemis axillaribus terminalibusque paniculatis, pedicellis remotis decuſſatis unifloris, foliis ovato-lanceolatis attenuatis, ramis virgatis, caule arboreo. *Swartz. prodr.* 79. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 905. *

M. foliis ovato-lanceolatis *Plum. amer.* 202. *ic.* 208. *f.* 1.

Vieläſtige Myrte. W.

Habitat in montibus altis Jamaicae. ♄

22. MYRTUS *zeylanica.*

M. racemis axillaribus terminalibusque, pedicellis ſubquadrifloris ovatis attenuatis ſupra punctatis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 58.

M. pedunculis multifloris, foliis ovatis ſubpetiolatis. *Mill. dict. n.* 8.

M foliis ovatis acuminatis obtuſiuſculis. *Fl. zeyl.* 182.

M. zeylanica odoratiſſima, baccis niveis monococcis. *Herm. lugdb.* 434. *t.* 435.

Myrtoides foliis ovatis. *Hort. cliff.* 489. *Roy. lugdb.* 535.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 718.

Zeylaniſche Myrte. W.

Habitat in Zeylona. ♄

*23. MYRTUS *ſplendens.*

M. pedunculis axillaribus ſolitariis trichotomis, foliis ellipticis attenuatis planis venoſis ſcarioſis nitidis, ramis virgatis. *Swartz prodr.* 79. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 907.*

Eugenia (*periplocifolia*) foliis integerrimis acuminato-lanceolatis, pedunculis paniculatis axillaribus et terminalibus *Iacq. collect.* 2. *p.* 108. *t.* 4. *

Langſpitzige Myrte. W.

Habitat in fruticetis montoſis Hiſpaniolae. ♄ (v. ſ.)

24. MYRTUS *adroſaemoides.*

M. racemis axillaribus terminalibusque ſubcompoſitis,

pedicellis trifloris, foliis ovato-oblongis ſeſſilibus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 58. *
M. pedunculis trifido-multifloris, foliis ſubovalibus ſeſſilibus. *Fl. zeyl.* 184. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 719.
Apocynumblättige Myrte. W.
Habitat in Zeylona. ♄

25. MYRTUS *caryophyllata.*
M. pedunculis trichotomis terminalibus, calycibus indiviſis, foliis obovatis impunctatis. *Swartz obſ.* 202. *
M. pedunculis trifido-multifloris, foliis obovatis. *Fl. zeyl.* 183. *Mat. med.* 122.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 720.
Nägleinartige Myrte. W.
Habitat in Zeylona. ♄

*26. MYRTUS *acris.*
M. pedunculis axillaribus terminalibus corymboſisque trichotomis foliis longioribus, foliis ellipticis convexis coriaceis venoſis punctatis, caule arboreo. *Swartz prodr.* 79. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 909.
Myrtus caryophyllata. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 1. *
Caryophyllus folio et fructu rotundo. *Breyn. prodr.* 2.
Caryophyllus aromaticus indiae occidentalis foliis et fructu rotundo. *Pluk. alm.* 188. *t.* 155. *f.* 3.
Caryophyllus foliis oblongo-ovatis oppoſitis, racemis lateralibus et terminalibus. *Brown. jam.* 247.
Caryophyllus racemoſus. *Mill. dict.*
Scharfe Myrte. W.
Habitat in montibus Iamaicae, Antiguae, Barbados. ♄ (v. ſ.)

*27. MYRTUS *coriacea.*
M. pedunculis trichotomis terminalibus, foliis ſubrotundo-ellipticis convexis coriaceis aveniis punctatis utrinque nitidis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 59. * *Swartz Fl. ind. occid.* 2. *p.* 912. *
Myrtus acris. β. *Swartz prodr.* 79.
M. cotini folio. *Plum. ic.* 208. *f.* 2.
Lederartige Myrte. W.
Habitat in inſulis Hiſpaniola, St. Lucia. ♄

28. MYRTUS *Pimenta.*
M. foliis alternis. *Fl. zeyl.* 180. *Mat. med.* 122. *Swartz. obſ.* 202. *
M. calycibus absque appendiculis. *Hort. cliff.* 501.

M. foliis oblongo-ovatis glabris alternis, racemis terminalibus et lateralibus. *Brown. jam.* 247.
M. arborea aromatica, foliis laurinis. *Sloan. jam.* 161. *hiſt.* 2. *p.* 76. *t.* 191. *f.* 1.
Caryophyllus foliis oblongo-ovatis alternis, racemis terminalibus et lateralibus. *Brown. jam.* 247.
Caryophyllus aromaticus americanus, lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. *Pluk. alm.* 88. *t.* 155. *f.* 4.
Piper jamaicenſe. *Raj. hiſt.* 1507. *Blackw. t.* 355. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 722.
Pfefferartige Myrte. W.
Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)
Calyx *fructus inferus quadridentatus; floris vero ſuperus quadripartitus.* Bacca 2-*ſperma.*

*974. CALYPTRANTHES.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 845.

Cal. ſuperus truncatus ante antheſin tectus *operculo* integerrimo deciduo. *Cor.* 0. *Bacca* unilocularis 1-4 ſperma.

1. CAYPTRANTHES *Suzygium.*
C. arboreſcens, pedunculis axillaribus trichotomis patulis, foliis ovatis obtuſis, ramis dichotomis. *Swartz prodr.* 79. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 919.*
Myrtus (*Zuzygium*) pedunculis multifloris, ramis dichotomis, foliis geminis ſubovatis terminalibus. *Amoen acad.* 5. *p.* 398.* *Swartz obſ.* 202.
Suzygium fruticoſum, foliis ovatis nitidis et ramulis ubique jugatis. *Brown. jam.* 240. *t.* 7. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 646.
Gabeläſtige Deckelmyrte. W.
Habitat in maritimis aridis calcareis Jamaicae. ♄

*2. CALYPTRANTHES *guineenſis.* W.
C. arboreſcens, pedunculis axillaribus et terminalibus corymboſis, foliis oblongis utrinque attenuatis reticulatis. W.
Guineaſche Deckelmyrte. W.
Habitat in Guinea. ♄ (v. ſ.)
Folia *oppoſita oblonga ſeu elliptica integerrima, utrinque parum attenuata, ſuperne nitida, reticulato-venoſa.* Corymbi *divaricati in apice caulis et axillis ſupremis foliorum.* Pedunculi *laterales biflori.* W.

3. CALYPTRANTHES *caryophyllifolia.*

C. arborea, paniculis lateralibus, foliis elliptico-ovatis integerrimis. *Willd. in Uſter. neue Annalen* 11. *Stück. p.* 22. *

Eugenia (*caryophyllifolia*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, racemis paniculatis, calyce truncato. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 189. *

Eugenia (*corticoſa*) foliis ovatis acuminatis, racemis corymboſis, filamentis breviſſimis. *Loureiro. cochin. p.* 376. ?

Myrtus (*Cumini*) pedunculis multifloris, foliis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 674. *Fl. zeyl.* 185. *

Jamboſa ceramica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 130. *t.* 41. *Burm. ind.* 115.

Arbor zeylanica cuminum redolens. *Burm. zeyl.* 27.

Caryophyllus langueſcente vi aromaticus, Malabarenſis folio, fructu maximo. *Pluk. alm.* 88. *t.* 274. *f.* 2.

Peria Njara. *Rheed. mal.* 5. *p.* 57. *t.* 29.

Gewürznägleinblättrige Deckelmyrte. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Panicula *in ramis aphyllis praeteriti anni.* W.

*4. CALYPTRANTHES *Jambolana.* W.

C. arborea, paniculis ſubterminalibus, foliis ovatis emarginatis. *Willd. in Uſteri neue Annalen* 11. *Stück. p.* 23. *

Eugenia (*Jambolana*) foliis ovalibus venoſis et tenuiſſime punctatis, racemis paniculatis lateralibus, calyce truncato. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 150.

Jambolana. *Rumph. amb.* 1. *p.* 131. *t.* 42.

Jambolifera pedunculata. *Houttuyn Lin. Pſl.* Syſt. 1. *p.* 462. *tab.* 7. *f.* 2.

Ausgerandete Deckelmyrte. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

5. CALYPTRANTHES *Chytraculia.*

C. arborea, pednuculis terminalibus paniculatis trichotomis tomentoſis, foliis ovatis apice attenuatis. *Swartz prodr.* 79. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 921. *

Myrtus (*Chytraculia*) pedunculis dichotomis paniculatis tomentoſis, foliis geminis ſubovatis terminalibus. *Amoen. acad.* 5. *p.* 398. * *Swartz obſ.* 202.

Chytraculia arborea, foliis ovatis glabris oppoſitis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 239. *t.* 37. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 3. *p.* 646.

Behaartſtielige Deckelmyrte. W.
Habitat in montoſis ſiccis Jamaicae. ♄

*6. CALYPTRANTHES *rigida.*

C. arboreſcens, pedunculis ſolitariis ſubtrifloris, foliis ovatis acutis convexis aveniis rigidis. *Swartz prodr.* 80. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 923.*
Steifblättrige Deckelmyrte. W.
Habitat in ſummis montibus Jamaicae, *ut in excelſo monte* Catharin Hill *parocia* St. Andreae. ♄

*975. EUCALYPTUS.

l'Herit. ſert. angl. 18.

Cal. ſuperus perſiſtens truncatus ante antheſin tectus *operculo* integerrimo deciduo. *Corolla* nulla. *Capſula* quadrilocularis apice dehiſcens polyſperma.

* *operculo conico.*

*1. EUCALYPTUS *robuſta.*

E. operculo conico medio conſtricto calyce latiori, umbellis lateralibus terminalibusque, foliis ovatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 283.
E. (*robuſta*) operculo conico medio conſtricto, umbellis lateralibus terminalibusque, pedunculis pedicellisque compreſſis. *Smith. Nov. Holl. p.* 39. *t.* 13.*
Hohe Schönmütze. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

*2. EUCALYPTUS *pilularis.*

E. operculo conico medio conſtricto longitudine calycis umbellis lateralibus, fructu globoſo, foliis lineari-lanceolatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 284.
Pillentragende Schönmütze. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄

Folia *multo anguſtiora quam in praecedente et* flores *dupla minores; operculum vero calyce duplo latior,* fructus *globoſus.* Fructus *E. robuſtae videtur turbinatus et margine reflexus, ſed immaturum tantum vidi.* Smith. l. c.

*3. EUCALYPTUS *tereticornis.*

E. operculo conico tereti laeviſſimo membranaceo ca-

lyce latiore triploque longiore, umbellis lateralibus ſolitariis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 284.

E. (*tereticornis*) operculo conico tereti laeviſſimo calyce triplo longiori, umbellis lateralibus ſolitariis. *Smith. Nov. Holl. p.* 41.

Rundhörnige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Diſtincta operculo *membranaceo laeviſſimo baſi dehiſcente et calyci annuli ad inſtar adhaerente*, foliisque *lanceolatis obliquis.* Smith. l. c.

*4. EUCALYPTUS *reſinifera*

E. operculo conico tereti coriaceo calyce duplo longiori, umbellis lateralibus ſolitariis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 284.

Eucalyptus reſinifera. *White. itin.* 231. *cum. icon.*

Metroſideros gummifera. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 170. *t.* 34. *f.* 1.

Harzbringende Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Primo intuitu ſimillima praecedenti, ſed attente examinata, differt: operculo *calyce duplo longiore latitudine calycis, nec latiore, craſſo coriaceo, nec membranaceo laeviſſimo, nec baſi calyci adhaerente.* Smith. l. c.

*5. EUCALYPTUS *capitellata.*

E. operculo conico obtuſiuſculo calyceque anguloſo ſubancipiti, capitulis lateralibus ſolitariis, fructu globoſo, foliis ovato-lanceolatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 285.

E. (*capitellata*) operculo conico calyceque anguloſo ſubancipiti, capitulis lateralibus pedunculatis ſolitariis. *Smith. Nov. Holl.* 42.* *White. itin.* 226. *c. icone. fig. a.*

Kopfförmige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

Differt ab omnibus praecedentibus; floribus *capitatis, id eſt absque pedunculis partialibus, umbellatis.* Operculum *eſt longitudine calycis angulatum apice compreſſum.* Folia *ovato-lanceolata rigida obliqua.* Smith l. c.

*6. EUCALYPTUS *ſaligna.*

E. operculo conico acuto calyceque anguloſo ſubancipiti, capitulis lateralibus ſolitariis fructu turbinato, foliis

lineari - lanceolatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 285.

Weidenblättrige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Folia *anguſtiora et minus coriacea quam in omnibus reliquis.* Capitula *parva florum brevi pedunculo ſunt ſuffulta et ſolitaria ad foliorum baſin.* Flores *reliquis ſpeciebus minores.* Operculum *acutum longitudine calycis.* Fructus *turbinatus parum margine reflexus et baſi ſtyli pyramidali coronatus.* Smith. l. c.

* * *Operculo hemiſphaerico.*

*7. EUCALYPTUS *botryoides.*

E. operculo hemiſphaerico ſubmutico, capitulis lateralibus ſolitariis, pedunculis cuneatis compreſſis, fructu turbinato. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 286.

Traubige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Similis binis praecedentibus capitulis *ſolitariis, ſed diſtincta:* operculo *latiore hemiſphaerico apice ſubmucronato.* Flores *coarcti et faſciculo baccarum haud abſimiles.* Pedunculus *communis compreſſus et latus, praecipue apicem verſus.* Folia *lanceolata obliqua.* Smith. l. c.

*8. EUCALYPTUS *haemaſtoma.*

E. operculo hemiſphaerico depreſſo mucronulato, umbellis lateralibus terminalibusque, pedunculis compreſſis, ramulis angulatis, fructu ſubgloboſo. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 286.

Rothrandige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Folia *coriacea lanceolata in acumen lineare longum producta.* Flores *umbellati non capitati,* operculum *depreſſum mucronatum.* Fructus *globoſus apice dehiſcens, oreficio margine lato rubro cincto.* Smith. l. c.

*9. EUCALYPTUS *piperita.*

E. operculo hemiſphaerico mucronulato, umbellis lateralibus ſubpaniculatis ſolitariisve, pedunculis compreſſis, ramulis angulatis. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 286. *Smith. Nov. Holl.* 42. * *White. itin.* 226. *c. icone.*

Pfefferartige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

Diſtincta a praecedente cui ſimillima: foliis *ovatis licet obliqua ſint*, floribus *minoribus in ſuprema ramorum parte copioſis, non in apice ramorum. Paucae* umbellae *ſunt ſolitariae, reliquae in paniculis vel corymbis aggregatae*. Smith. l. c.

*10. EUCALYPTUS *obliqua*.

E. operculo hemiſphaerico mucronulato, umbellis lateralibus ſolitariis, pedunculis ramulisque teretibus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 287. *Nov. Holl.* 43.* *Ait. Kew.* 2. *p.* 157. *l'Herit. ſert. angl.* 18.

Schiefblättrige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. f. ſ. fl.)

*11. EUCALYPTUS *corymboſa*.

E. operculo hemiſphaerico mucronulato, calyce tereti, umbellis corymboſo-paniculatis terminalibus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 287. *Nov. Holl.* 43.

Doldentraubige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

Flores *magni ſpecioſi formant paniculam magnam terminalem ex umbellis compoſitam, qua nota a reliquis diſtincta*. Folia *lanceolata coriacea*. Fructus *turbinatus* calyce *urceolato perſiſtenti. et* ſtylo *in hac cavitate perſiſtenti coronatus*. Smith. l. c.

*12. EUCALYPTUS *paniculata*.

E. operculo hemiſphaerico ſubmutico, calyce anguloſo, umbellis ſubpaniculatis terminalibus. *Smith. Act. ſoc. Lin. Lond.* 3. *p.* 287.

Riſpenblütige Schönmütze. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄

Differt a praecedente: calyce *angulato* operculo *ſubmucronato, et quod omnibus partibus minor ſit*. Umbellae *formant nunquam paniculam amplam ſed parvam; rami inferiores paniculae ſunt axillares*. Smith. l. c.

*976. BANARA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 809.

Cal. inferus 4-fidus. *Corolla* tetrapetala. *Bacca* 1-locularis polyſperma.

*1. BANARA *fagifolia*.

B. fagifolia. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 65.*

B. gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 547. *t.* 217.*

Buchenblättrige Banare. W.
Habitat in Cajenna. ♄

Frutex *ramis teretibus cineraſcentibus.* Folia *alterna oblonga acuminata venoſa glabra ſerrata, ſerraturis ſubtus glanduloſis.* Racemus *terminalis ſimplex pedunculatus palmaris villoſus.* Vahl. l. c.

*977. ANTHERYLIUM.

Rohr. Act. ſoc. Hiſt. Nat. Hafn. 2. *p.* 211.

Cal. inferus 4-partitus. *Cor.* tetrapetala. *Capſ.* 1-locularis trivalvis polyſperma.

*1. ANTHERYLIUM *Rohrii.*
A. Rohrii. *Vahl. Act. ſoc. Hiſt. Nat. Hafn.* 2. 1. *p.* 212. *t.* 8.* *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 60.
Rohriſches Antherylium. W.
Habitat in inſula St. Thomae Indiae *occidetalis.* ♄ (v. ſ.)

Arbor. Rami *terates glabri a caſu foliorum tuberculati.* Ramuli *ſuboppoſiti, inferne teretiuſculi, ſuperne e lineis decurrentibus ſubtetragoni, lateribus duobus oppoſitis convexis, duobus ſulco exaratis.* Folia *petiolata oppoſita et alterna ovata, interdum obovata integerrima ſubemarginata.* Aculeus *brevis ad ſingugulum latus petioli.* Pedunculi 5-8 *axillares uniflori.* Stamina 12-16 *calyci inſerta. Affinis Legnoti.* Vahl. l. c.

*978. FOETIDIA.

Juſſ. gen. ed. Uſteri p. 361.

Cal. ſuperus 4-fidus. *Cor.* 0. *Capſ.* lignoſa 4-locularis, loculis 1-ſ. 2-ſpermis.

*1. FOETIDIA *mauritiana.*
F. mauritiana. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 453.* *Lamarck. illuſt. gen. t.* 419.
Einblütiger Stinckbaum. W.
Habitat in inſula Mauritii. ♄

Arbor *ramis confertis fere verticillatis glabris.* Folia *ſubcoriacea elliptica integerrima ſeſſilia avenia glabra.* Pedunculi *uniflori terminales.* W.

*979. SCOLOPIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 846.

Cal. inferus 3-ſ. 4-partitus. *Corolla* 3-ſ. 4-petala. *Bacca* ſtylo coronata 1-locularis 6-ſperma. *Sem.* arillata.

*1. SCOLOPIA *puſilla.* †
Limonia puſilla. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 279. *t. t.* 58. *f.* 4.
Malus limonia lentiſci folio zeylanica, fructu minimo, uvariae magnitudine. *Pluk. alm.* 239. ?
Khatu-Karundu *Zeylon.*
Niedrige Scolopie. W.
Habitat in Zeylona. ♄

980. PUNICA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 847.

Cal. 5-fidus, ſuperus. *Petala* 5. *Pomum* multiloculare, polyſpermum.

1. PUNICA *Granatum.*
P. foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 134. *Hort. upſ.* 122. *Mat. med.* 123. *Roy. lugdb.* 267. *Gron. orient.* 144. *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 585. *Gmel. it.* 3. *p.* 33. *Ludw. ect. t.* 13. *Blackw. t.* 97. *et* 145. *Kniph. cent.* 2. *n.* 64. *Mill. illuſtr. Regn. bot.*
P. ſpinoſa, foliis nitentibus, ellipticis, integerrimis, floribus ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 1098.
Malus punica ſylveſtris. *Bauh. pin.* 438.
Malus punica ſativa. *Bauh. pin.* 438.
Malus punica. *Cam. epit.* 130. 131.
β. Balauſtia flore pleno majore et minore. *Bauh. pin.* 438. *Knorr. del.* 1. *t.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 648.
Gemeine Granate. W.
Habitat in Hiſpania, Italia, Mauritania, Perſia, Helvetia, Carniolia *ſolo cretaceo.* ♄ (v. v.)

2. PUNICA *nana.*
P. foliis linearibus, caule fruticoſo. *Mill. dict. n* 2. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 204.
P. fruticoſa humilior, ramulis gracilibus patentibus. *Brown. jam.* 239.

P. americana nana I. humillima. *Tourneſ. inſt.* 636. *Du Ham. arb.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 650.
Zwerg-Granate. W.
Habitat in Antillis. ♄ (v. ſ.)
Altitudo *pedum* 5. Folia *breviora, anguſtiora.* Floret *tota aeſtate.*

981. AMYGDALUS.

Gen. plant. et [illegible] *b. n.* 848.

Cal. 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupa* nuce poris perforata.

1. AMYGDALUS *Perſica.*

A. foliorum ſerraturis omnibus acutis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 189. *Hort. upſ.* 123. *Mat. med.* 123. *Roy. lugdb.* 267. *Du Roi. harbk.* 1 *p.* 56. *Ludw. ect. t.* 194. *Knorr. del* 1. *t. P.* 1. *Regn. bot. Willd. arb.* 18.
Perſica vulgaris, *Mill. dict. n.* 1.
Perſica molli carne et vulgaris. *Bauh. pin.* 440.
Perſica rubra. *Cam. epit.* 145. *Blackw. t.* 101.
β. Nuciperſica, quae nucium juglandium faciem repraeſentat. *Bauh. pin.* 440. *Raj. hiſt.* 1516.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 724.
Perſiſche Mandel. W.
Habitat in Perſia. ♄ (v. v.)
Flores *ſeſſiles, gemmales, ſolitarii.* Folia *e gemma terminali, nec infra flores.*
Variat *floribus plenis.* R.

2. AMYGDALUS *communis.*

A. foliorum ſerraturis infimis glandulosis, floribus ſeſſilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 123. *Mat. med.* 123. *Roy. lugdb.* 267. *Gron. orient.* 146. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 48. *Lud. ect. t* 177. *Reg. bot.*
A. foliis glabris, ovato-lanceolatis, ſerratis, imis dentibus et petiolis glandulosis. *Hall. helv. n.* 1078.
Amygdalus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 442.
β. Amygdalus ſativa. *Bauh. pin.* 441. *Mill. ic. t.* 28. *f.* 1. *Du Ham. arb. fruit.* 5. *Kniph. cent.* 6. *n.* 5. *Knorr. del.* 1. *t. M.* 1.
Amygdalus. *Dod. pempt.* 798.

γ. Amygdalus amara. *Tournef. inſt.* 627. *Blackw. t.* 105. *Du Ham. arb. fruit.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 727.
Gemeine Mandel. W.
Habitat in Mauritaniae *ſepibus*, Helvetia. ♄ (v. v.)
Flores *gemmales*, *ſeſſilis ſ. ſubſeſſiles*, *ſaepius bini*. Folia *e gemmis infra et ſupra flores locatis*.
Italis *ignota Catonis aevo: unde Nuces graecae dictae*.

3. AMYGDALUS *pumila*.
A. foliis lanceolatis duplicato-ſerratis. *Willd. arb.* 19.
A. foliis venoſo-rugoſis. *Syſt. Veg.* 385. *Herm. lugdb.* 487. *t.* 489. *Medic. in. obſ. Soc. Lutr.* 1774. *p.* 143. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 53.
A. perſica nana flore carneo pleno. *Pluk. phyt. t.* 11. *f.* 4.
Perſica africana nana, flore incarnato pleno. *Tournef. inſt.* 625. *Mill.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 729.
Niedrige Mandel. W.
Habitat in Africa. ♄ (v. v.)
Rami *laevis*, *bi-ſ. tripedales*, *atropurpurei*. Folia *lanceolata*, *petiolata*, *venoſa*, *rugoſa*. *ſerrulata*. Flores *ad gemmas ſaepius bini*, *ſeſſiles*. Calyx *rufeſcens*. Petala *emarginata*, *incarnata*, *tubo calycis longiora*. Filamenta *magis pallida*. Germen *et Stylus inferne pubeſcens*. Stipulae *lineares*, *profundius ſerratae*. H. V.
Variat *floribus plenis*. Petala *non emarginata*, *ſed acuminata*. R.

4. AMYGDALUS *nana*.
A. foliis ovatis baſi attenuatis ſimpliciter argute ſerratis. *Willd. arb.* 19.
A. foliis baſi attenuatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 124. *Roy. lugdb.* 267. *Mill. dict. n.* 5. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 51. *Du Ham. arb. fruit.* 1. *t.* 3. *Pall. it.* 1. *p.* 81. *Kniph cent.* 6. *n.* 4. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 12. *t.* 6.
Prunus inermis, foliis ex lineari-lanceolatis, calycum laciniis oblongis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 171. *n.* 2.
A. indica nana. *Pluk. alm.* 28. *t.* 11. *f.* 3. *Mill. dict. t.* 28. *f.* 2.
Armeniaca perſicae foliis, fructu exſucco. *Amm. ruth.* 273. *t.* 30. *Burm. ind.* 117.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 730.

Zwerg-Mandel. W.
Habitat in Calmuckia *copioſiſſima.* ♄ (v. v.)

Caules *pedales.* Radix *repens.* Stipulae *lineares.* Folia *lanceolata, ſerrata, laevia, in petiolos deſinentia.* Flores *ſeſſiles, 2. ſ. 3. ſimul, rubri.*

*5. AMYGDALUS *incana.*

A. foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis. W.
A. foliis lanceolatis ſerratis rugoſis ſubſeſſilibus, ſubtus albo-tomentoſis. *Pall.* 1. *p.* 13. *t.* 7. *
Weiſsblättrige Mandel. W.
Habitat in herbidis Caucaſi. ♄

Facies praecedentis, ſed folia anguſtiora ſupra viridia glabra, infra niveo-tomentoſa.

*6. AMYGDALUS *orientalis.*

A. foliis lanceolatis integerrimis argenteis perennantibus petiolo breviore. *Mill. dict. Ait. Kew.* 1. *p.* 162.
Amygdalus argentea. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 102. *
A. orientalis, foliis argenteis ſplendentibus. *Duhamel. arb.* 48.
Silberblättrige Mandel. W.
Habitat in Oriente. ♄ (v. v.)

Folia *vix uncialia oblonga baſi et apice acuta integerrima, utrinque ſericeo-tomentoſa.* W.

982. PRUNUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 849.

Cal. 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupae* nux ſuturis prominulis.

1. PRUNUS *Padus.*

P. floribus racemoſis, racemis pendulis, foliis deciduis duplicato-ſerratis ſubrugoſis, petiolis biglanduloſis. *Willd. arb.* 237.
P. floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglanduloſis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 171. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 188. *Crantz. auſtr.* 1. *p.* 94. *Scop. carn.* 2. *n.* 589. *Pollich. pal. n.* 465. *Flor. dan. t.* 205. *Doerr. naſſ. p.* 264. *Hoffm. germ.* 169. *Roth. germ.* 1. 211. *II.* 538.
Padus glandulis duabus baſi foliorum ſubjectis. *Hort. cliff.* 185. *Fl. ſuec.* 396, 431. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis annuis. *Fl. lapp.* 198.

Padus avium. *Mill. dict. n.* 1.
Padus foliis ovato-lanceolatis ſerratis *Hall. helv. n.* 1086.
Ceraſus racemoſa ſylveſtris, fructu non eduli. *Bauh. pin.* 451. *Tabern.* 988. *Du Ham. arb.* 3.
β. Prunus (*rubra*) floribus racemoſis, racemis erectis, foliis deciduis tenuiſſime duplico-ſerratis laevibus, petiolis biglanduloſis. *Willd. arb.* 237. *t.* 4. *f.* 2. *excluſo ſynonymo.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 731.
Vogel Pflaume. W.
Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Racemi *foliacei infra folia.* Petala *ſerrata ut in ſequenti, nec emarginata ut in Ceraſo.*

Prunus rubra a me in arboret. berol. l. c. deſcripta, eſt ſola hujus varietas, foliorum ſerraturis minoribus et racemis erectoribus. W.

2. PRUNUS *virginiana.*

P. floribus racemoſis, racemis rectis, foliis deciduis duplicato-dentatis laevibus, petiolis ſubquadriglanduloſis. *Willd. arb.* 238. *t.* 5. *f.* 1. *
P. floribus racemoſis, foliis deciduis baſi antice glanduloſis. *Sp. pl.* 677.
Prunus (*rubra*) floribus racemoſis, racemis erectis, foliis deciduis laevibus baſi biglanduloſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 162.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 734. *nomen nec deſcriptio.*
Virginiſche Pflaume. W.
Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

Padi progenies, *ſed verrucae in ramis duplo majores.* Petioli *antice ad apicem binis paribus glandularum.* Foliis *minus ſubtus reticulata et fere glabra.* Petala *orbiculata, nec obovata.* Fructus *quadruplo majores rubri.*

Diſtincta a ſequente, qua cum, ob ſynonyma auctorum falſa, confuſa: foliis *oblongis acuminatis argute inaequaliter duplicato-dentatis utrinque glabris,* petiolis *in foliis adultis binis paribus glandularum inſtructis,* racemis *longioribus, junioribus rectis, ſenioribus inferne jam defloratis laxiuſculis, a praecedente vero diverſa,* foliorum *forma, glandularum petioli diſpoſitione,* floribus *minoribus,* petalis *ſubrotundis. Huc ſine dubio pertinere videtur Prunus rubra Aitoni.* W.

***3. PRUNUS** *ſerotina.*

P. floribus racemoſis, racemis laxis, foliis deciduis ſimpliciter ſerratis, ſerraturis infimis ſubglanduloſis. *Willd. arb.* 239. *t.* 5. *f.* 2. *

P. (*ſerotina*) foliis lato-lanceolatis acuminatis ſimpliciter ſerratis, glaberrimis ſubglanduloſis deciduis, ſerraturis adpreſſo-inflexis, infimis ſaepe petiolo inſidentibus, coſta ſubtus bifariam pubeſcente, racemis ſimplicibus, petalis integerrimis. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 20.

Prunus virginiana. *Mill. dict. n.* 3. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 191. *Wangenh. am.* 34 *t.* 14. *f.* 33

Ceraſus ſylveſtris, fructu nigricante in racemis longis pendulis phytolaccae inſtar congeſtis. *Gron. vi g.* 54 *Roy. lugdb.* 537. *Du Ham. arb.* 5.

Spätblühende Pflaume. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

Dignoſcitur facillime, licet foliorum, forma valde ſit varians, coſta media, ſubtus baſin verſus, barbata. W.

4. PRUNUS *canadenſis.* †

P. floribus racemoſis, foliis deciduis eglanduloſis lato-lanceolatis rugoſis utrinque pubeſcentibus. *Sp. pl.* 678.

Ceraſus racemoſa, foliis amygdalinis, americana. *Pluk. alm.* 97. *t.* 58. *f.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 735.

Canadiſche Pflaume. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄

Rami *laeves.* Folia *lato-lanceolata abſque glandulis, venoſo-rugoſa minusque rigida quam in reliquis, argute ſerrata, utrinque viridia, ad tactum manifeſte villoſa, et baſi in petiolum deſinentia.*

***5. PRUNUS** *elliptica.*

P. floribus racemoſis, foliis ellipticis ſerratis glabris. *Thunb. jap.* 199.

Elliptiſchblättrige Pflaume. W.

Habitat culta in Iaponia. ♄

Caulis *arboreus.* Rami *et* Ramuli *alterni nodoſi albo-punctati rugoſi glabri.* Folia *in ramulis aggregata ſparſa breviter petiolata elliptica obtuſiuſcula venoſa glabra patentia digitalia.* Flores *racemoſi pauci.* Drupa *oblonga magnitudine Paſſulae.* Flores *non vidi.* Thunb. l. c.

*6. PRUNUS *occidentalis.*

P. floribus racemoſis, racemis lateralibus, foliis perennantibus eglanduloſis oblongis acuminatis integerrimis utrinque glabris. *Swartz prodr.* 80. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 925.* *Ait. Kew.* 2. *p.* 163.

Ceraſus latiore folio, fructu racemoſo purpureo majore. *Cateſb. carol.* 2. *p.* 94. *t.* 94.? W.

Amygdalis foliis magnis. *Nicolſ. doming.* 154.

Weſtindiſche Pflaume. W.

Habitat in Antillarum *montibus interioribus.* ♄

*7. PRUNUS *ſphaerocarpa.*

P. floribus racemoſis, racemis axillaribus, foliis perennantibus eglanduloſis integerrimis nitidis, drupis ſubrotundis. *Swartz prodr.* 81. *Fl. ind. occid.* 2. *p.* 927.*

Myrtifolia arbor, foliis latis ſubrotundis, flore albo. *Sloan. jam.* 162. *hiſt.* 2. *p.* 79. *t.* 193. *f.* 1. *mala. Roy. dendr.* 36.

Amygdalus foliis parvis. *Nicolſ. doming.* 145.

Kugelfrüchtige Pflaume. W.

Habitat in montium ſylvis Jamaicae, Hiſpaniolae. ♄ (v. ſ.)

8. PRUNUS *luſitanica.*

P. floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus ovato-lanceolatis ſerratis eglanduloſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 163. *Willd. arb.* 241.*

P. floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus eglanduloſis. *Mill. ic.* 131. *t.* 196. *f.* 1.

Padus luſitanica. *Mill. dict. n.* 5.

Padus foliis glandula deſtitutis. *Vir. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 126. *Roy. lugdb.* 269.

Padus foliis ſempervirentibus ovatis. *Hort. cliff.* 185.

Lauro Ceraſus luſitanica minor. *Dill. elth.* 193. *t.* 159. *f.* 193. *Tournef. inſt.* 628.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 736.

Portugiſiſche Pflaume. W.

Habitat in Luſitania, Penſylvania. ♄ (v. v.)

*9. PRUNUS *caroliniana.*

P. foliis racemoſis, foliis ſempervirentibus oblongo-lanceolatis ſerratis eglanduloſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 163.

Padus (*carolina*) foliis lanceolatis acute denticulatis ſempervirentibus. *Mill. dict. n.* 6. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 198.

Caroliniſche Pflaume. W.
Habitat in Carolina *auſtrali.* ♄

10. PRUNUS *Lauro-Ceraſus.*

P. floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus dorſo bi-glanduloſis. *Mat. med.* 124. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 196. *Blackw. t.* 512. *Willd. arb.* 242.
Padus lauroceraſus. *Mill. dict. n.* 4.
Padus glandulis duabus dorſo foliorum innatis. *Vir. cliff.* 42. *Hort. upſ.* 126. *Roy. lugdb.* 269.
Padus foliis ſempervirentibus lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 185.
Ceraſus folio laurino. *Bauh. pin.* 450.
Lauroceraſus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4. *Cam. hort. t.* 23. *Tournef. inſt.* 627. *Raj. hiſt.* 1549. *Du Ham. arb.* 1. *t.* 133.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 737.
Lorbeerblättrige Pflaume. W.
Habitat in Trapezunte, *unde in* Europam *venit* 1576. ♄ (v. v.)

*11. PRUNUS *paniculata.*

P. floribus paniculatis patulis, foliis ovatis. *Thunb. jap.* 200.
Riſpenblütige Pflaume. W.
Habitat in Iaponia. ♄

Caulis *arboreus totus glaber.* Rami *et* Ramuli *erecti.* Folia *ſparſa petiolata ovata acute ſerrata venoſa glabra inaequalia bipollicaria et ultra.* Petioli *erecti lineam longi.* Flores *paniculati albi.* Panicula *ampla patentiſſima. Differt a P. Mahaleb, cui quodammodo ſimilis:* panicula *florum longe majori et patentiſſima,* floribus *minoribus,* foliis *magis oblongis, inferne attenuatis acuteque ſerratis.* Thunb. l. c.

12. PRUNUS *Mahaleb.*

P. floribus corymboſis terminalibus. foliis ovatis. *Iacq. auſtr. t.* 227. *Crautz. auſtr. p.* 95. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 588. *Pollich. pal. n.* 466. *Hoffm. germ.* 169. *Roth. germ. I.* 211. *II.* 539.
P. floribus corymboſis terminalibus, foliis ſubcordatis petiolis glanduloſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 182.
Ceraſus foliis ſubrotundis ſerratis, pedunculis multifloris. *Hall. helv. n.* 1084.
Ceraſus Mahaleb. *Mill. dict. n.* 4.

Ceraſus foliis ovatis. *Vir. cliff.* 43. *Hort. upſ.* 125. *Roy. lugdb.* 268. crenatis. *Hort. cliff.* 487.
Ceraſus ſylveſtris amara, Mahaleb putata. *Bauh. hiſt.* *Du Ham. arb.* 1. *t.* 55.
Ceraſo affinis. *Bauh. pin.* 451.
Mahaleb. *Cam. epit.* 91.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 740.
Mahaleb-Pflaume. W.
Habitat in Helvetia, Germania. ♄ (v. v.)
Folia conduplicata, ovata, obtuſa, crenata. Stipulae *crenatae dentibus fuſcis.* Corymbus *convexus.* Bracteae *breviſſimae, obtuſiſſimae, ſerratae.*

13. PRUNUS *Armeniaca.*

P. floribus ſeſſilibus, foliis ſubcordatis. *Sp. pl.* 679. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 169. *Willd. arb.* 243.
P. foliis ovato-cordatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 124. *Roy. lugdb.* 268.
Armeniaca. *Mill. dict.* *Blackw. t.* 281.
Armeniaca mala ſ. Mala praecocia priſcorum. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 176. *Camer. epit.* 146.
Mala armeniaca majora. *Bauh. pin.* 442.
Mala armeniaca majora. nucleo dulci. *Bauh. pin.* 442. *Knorr. del.* 1. *t. A.* 2.
β. Malus armeniaca minor. *Bauh. pin.* 442.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 742.
Apricoſen-Pflaume. W.
Habitat in Oriente. ♄ (v. v.)
Folia vernantia convoluta.

14. PRUNUS *ſibirica.*

P. floribus ſeſſilibus, foliis ovatis acuminatis ſimplicibus ſerratis, petiolis eglandulofis. W.
P. floribus ſeſſilibus, foliis ovato-oblongis. *Sp. pl.* 679. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 15. *t.* 8. *
P. inermis foliis ex ovato-cordatis, longe mucronatis, fructu exſucco. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 172.
P. foliis ſeſſilibus, foliis ovato-oblongis, petiolatis glandulofis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 170.
Armeniaca betulae folio et facie, fructu exſucco. *Amm. ruth.* 272. *t.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 744.
Sibiriſche Pflaume. W.
Habitat in Sibiriae *ulterioris montoſis.* ♄

*15. PRUNUS *daſycarpa.*

P. floribus ſeſſilibus, foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis, petiolis glanduloſis. *Willd. arb.* 243. *

P. (*daſycarpa*) foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis, petiolatis glanduloſis, pedunculis ſubſolitariis brevissimis, drupa globoſa pubeſcente. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 90.

Rauhe Pflaume W.

Habitat in Oriente? ♄ (v. v.)

Simili praecedenti, at diverſa foliis *duplicato-ſerratis,* petiolis *glanduloſis. Vulgo nota in hortis ſub titulo gallico: Abricot noir.* W.

16. PRUNUS *pumila.*

P. floribus ſubumbellatis, foliis anguſto-lanceolatis. *Mant.* 75. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 186. *Willd. arb.* 244.

P. ſylveſtris humilior, fructu rubro praecoci minore, radice reptatrice. *Gron. virg.* 2. *p.* 76.

Ceraſus (*canadenſis*) foliis lanceolatis glabris integerrimis, ſubtus caeſiis, ramis patulis. *Mill. ic. t.* 89. *f.* 2.

Ceraſus canadenſis pumila, oblonga anguſtoque folio, fructu parvo. *Du Hamel. arb.* 149. *n.* 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 745.

Niedrige Pflaume. W.

Habitat in Canada. ♄ (v. v.)

Frutex *ſtatura Amygdali nanae.* Radix *repens.* Rami *virgati, pupuraſcentes.* Folia *ſubtus glauca ſ. pallida.* Pedunculi *proprii, uniflori, terni e gemmis lateralibus.* H. U.

*17. PRUNUS *Chamaeceraſus.*

P. umbellis ſeſſilibus, foliis obovatis obtuſiuſculis glabris glanduloſo-ſerratis. W.

P. (*Chamaeceraſus*) pedunculis ab unico ad quinque, umbellis ſeſſilibus, foliis lanceolatis utrinque glaberrimis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 90. *Collect.* 1. *p.* 133. * *Hoffm. germ.* 170.

Prunus Ceraſus ϑ. pumila. *Sp. pl.* 679.

Ceraſus pumila. *Bauh. pin.* 450.

Chamaeceraſus. *Cluſ. hiſt. p.* 64.

β. Prunus (*fruticoſa*) umbellis ſeſſilibus, foliis obovatis glabris ſerratis, ſerraturis infimis glanduloſis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 19. *t.* 8. *B. Gmel. ſib.* 3. *p.* 171.

Strauchartige Pflaume. W.

Habitat in Auſtriae *alpibus α in* Sibiria *ad* Volgam. ♄ (v. ſ.)

Sibirica varietas differt magnitudine ſola foliorum, florum, fructumque. W.

18. PRUNUS *Ceraſus.*

P. umbellis ſubpedunculis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Mat. med.* 124. *Blackw. t.* 449. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 175. *Pollich. p. n.* 467. *Moench. haſſ n.* 403. *Crantz. auſtr.* 94. *Hoff. germ.* 170. *Roth. germ. I.* 211. *II.* 539.

Ceraſus vulgaris. *Mill. dict. n.* 1.

Ceraſus foliis glabris, ſerratis, ovato-lanceolatis, mucrone producto. *Hall. helv. n.* 1083.

Ceraſus foliis ovato-lanceolatis. *Vir. cliff.* 49. *Hort. upſ.* 125. *Roy lugdb.* 267. *Du Ham. arb.* 2. *t.* 56.

α. Ceraſus *caproniana*, ſativa rotunda rubra et acida. *Bauh. pin.* 449.

β. Ceraſus *roſea*, hortenſis, flore roſeo. *Bauh. pin.* 450.

γ. Ceraſus *plena* hortenſis, flore pleno. *Bauh. pin.* 450. *Mill. ic.* 89. *f.* 1.

δ. Ceraſa *dulcia*, alba dulcia. *Bauh. pin.* 450.

ε. Ceraſa *juliana*, carne tenera et aquoſa. *Bauh. pin.* 450.

ζ. Ceraſus *auſtera*, acidiſſima ſanguineo ſucco. *Bauh. pin.* 445.

η. Ceraſus *avium*, racemoſa hortenſis. *Bauh. pin.* 450.

C. hortenſis. *Mill. dict. n.* 2.

θ. Ceraſus hortenſis, flore pleno. *Bauh. pin.* 450. *Mill. dict. n.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 746.

Saure Pflaume. W.

Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Folia *conduplicata.* Stipulae *dentatae.* Bracteae *trifidae, ſerratae: intermedia foliacea.* Gemmae *terminales folioſae, laterales floriferae.*

19. PRUNUS *avium.*

P. umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus conduplicatis. *Fl. ſuec.* 2. *p.* 474. *Hudſ. angl.* 187. *Mat. med.* 125. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 172. *Pollich. pal. n.* 468. *Ludw. ect. t.* 108. *Blackw. t.* 425. *Kniph. cent.* 5. *n.* 73. *Hoffm. germ.* 170. *Roth. germ. I.* 211. *II.* 540.

Ceraſus foliis ovato-lanceolatis, ſerratis, inferne ſubhirſutis, mucrone producto. *Hall. helv. n.* 1082.

Prunus Ceraſus. *Scop. carn.* 2. *n.* 587.

Ceraſus nigra. *Mill. dict. n.* 2.

Ceraſus ſylveſtris, fructu nigro, et rubro. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 220.
Ceraſus major ſ. ſylveſtris, fructu ſubdulci nigro colore inficiente. *Bauh. pin.* 450. *Du Ham. arb. fruit.* 1.
Ceraſus ſylveſtris, ſeptentrionalis anglica, fructu rubro parvo ſerotino. *Raj. hiſt.* 1539.
β. Prunus *duracina.*
Ceraſus craſſa carne dura. *Bauh. pin.* 450.
γ. Prunus *Bigarella.*
Ceraſus ſativa major. *Bauh. pin.* 450.
Ceraſus major, fructu cordato magno. *Raj.* 1538.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 749.
Süſse Kirſche. W.
Habitat in Europa *borealiore.* ♄ (v. v.)

Folia *conduplicata*, *glandula* 1. *ſ.* 2 *in petioli apice.* Umbella *ſeſſilis*, *ſubtriflora*: Floribus *petiolatis.* Involucrum 4-*phyllum.*

Haec floret e ramis antepenultimi, Ceraſus *vero ex ultimi anni ramis.*

Ex urbe Ponti Ceraſa in Italiam, Romam transportata per Lucullum, ex victoria Attica Mithridato victo, ab urbe condita 680.

*20. PRUNUS *ſemperflorens.*

P. floribus racemoſis, calycibus ſerratis, foliis ovatis ſerratis baſi glanduloſis. *Willd. arb.* 247. *
Prunus (*ſemperflorens*) caule arboreſcente, foliis ovato-lanceolatis ſerratis conduplicatis glabris, petiolis eglanduloſis, racemis folioſis pendulis. *Ehrh. Beit.* 7. *p.* 132.
P. (*ſerotina*) racemis elongatis folioſis pendulis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, petiolis eglanduloſis. *Roth. catalect.* 1. *p.* 58.
Ceraſus ſativa aeſtate continue florens et frugeſcens. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 178. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 178.
Ceraſus fructu ſerotino, cum pediculo longiori foliato. *Tournef. inſt.* 626.
Ceraſus racemoſa. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 223.
Immerblühende Pflaume. W.
Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Hybrida forte progenies nunc in hortis noſtris faciem ſuam ſervans. W.

21. PRUNUS *penſylvanica.*

P. umbellis ſubſeſſilibus aggregatis multifloris tandem

paniculaeformibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis glabris baſi biglandulosis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 165. *Willd. arb.* 248.*

P. umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis, ramulis pallide punctatis. *Lin. ſuppl.* 252.

Prunus lanceolata. *Willd. arb.* 240. *t.* 3. *f.* 3.

Penſylvaniſche Pflaume. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄ (v. v.)

Facies *P. Ceraſi, ſed ramuli punctis albidis adſperſi ut in P. virginiana.* Folia *P. Ceraſi lanceolato-ovata ſerrulata laevia, baſi glandulis duabus ſaepe rubris.* Umbellae *ſeſſiles.* Flores *P. Ceraſi minores.*

P. lanceolata a me in arb. berol. l. c. deſcripta, eſt nil aliud, quam haec Pruni ſpecies; vidi hanc ſero autumno cum pedunculorum tantum rudimentis, et flores P. Padi forma et facie eſſe e narratione hortulani habui. In ſequenti vero anno florentem arborem vidi et mox errorem agnovi. Infloreſcentia vero hujus ſpeciei ſaepius elongata eſt, et formam fere racemi habet. W.

*22. PRUNUS *pygmaea.* W.

P. umbellis ſeſſilibus paucifloris, foliis ellipticis acutis baſi biglandulosis glabris. *Willd. arb.* 248.*

Zwerg-Pflaume. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

Frutex *tri-ſ. quadripedalis inermis.* Folia *ovato-elliptica acutiuſcula utrinque glabra, baſi attenuata argute ſerrata, dente ultimo utrinque glandula inſtructo.* Umbellae *ſeſſiles quadri-ſ. quinqueflorae confertae.* Flores *magnitudine P. ſpinoſae.* Fructus *magnitudine piſi majoris, nigri parum ſucculenti.* W.

*23. PRUNUS *nigra.*

P. umbellis ſeſſilibus ſolitariis paucifloris, foliis deciduis ovatis acuminatis, petiolis biglandulosis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 165.

Schwarze Pflaume. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

Diverſiſſima a praecedente. Folia *ovata valde acuminata inaequaliter argute ſerrata utrinque glabra* Umbellae *tri-ſ. quadriflorae.* W.

*24. PRUNUS *aſpera.*

P. floribus ſolitariis terminalibus, folliis ovatis ſerratis aſperis. *Thunb. jap.* 201.

Muk no ki. *Kaempf. amoen.* 799.
Scharfblättrige Pflaume. W.
Habitat in Japonia. ♄.

Rami *et* ramuli *teretes punctati*: Folia *alterna petiolata ovata acuminata ſerrata venoſa utrinque ſcabra, ſubtus pallida patentia bipollicaria.* Petiolus *vix unguicularis ſulcatus.* Flores *in ultimis ramulis terminales ſolitarii.* Drupa *magnitudine piperis globoſo-ovata ſtylo perſiſtente coerulea glabra.* Nux *triquetra dura ovata acutiuſcula.* Nucleus *albidus.* Fructus *edulis.* Folium *pagina ſuprema aſperum ad poliendum adhibetur.* Thunb. l. c.

*25. PRUNUS *japonica.*

P. pedunculis ſolitariis, foliis ovatis acuminatis glabris, ramis inermibus. *Thunb. jap.* 201.
Japaniſche Pflaume. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus totus glaber.* Rami *et* ramuli *alterni teretes cinerei rugoſi erecti.* Folia *alterna petiolata ovata acuminata duplicato-ſerrata utrinque glabra, venoſa patentia pollicaria.* Stipulae *binae ſupra foliaceae ſetaceae longitudine petioli.* Fores *ſolitarii pedunculati.* Pedunculus *infra ramulos uniflorus unguicularis.* Drupa *magnitudine piſi.* Thunb. l. c.

*26. PRUNUS *glanduloſa.*

P. pedunculis ſolitariis, foliis oblongis glanduloſo-ſerratis, ramis inermibus. *Thunb. jap.* 202.
Drüſige Pflaume. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus ramuloſus, omnibus partibus glaber.* Rami *teretes ſtriati cinerei, ramulis ſenſim filiformibus.* Folia *ſparſa petiolata oblonga ſerrata, ſerraturis gladuloſis, patentia, ſubtus venoſo-reticulata unguicularia.* Petioli *foliis multoties breviores.* Flores *ſparſi ſolitarii pedunculati.* Pedunculi *penduli longitudine foliorum.* Calyx *ſubcampanulatus.* Corolla *incarnata. Differt a P. pumila,* foliis *acutis tenuiſſime ſerratis ſubtus concoloribus nec obtuſis ſubintegris et glaucis: a P. inciſa:* foliis *glanduloſo-ſerratis glabris.* Thunb. l. c.

*27. PRUNUS *inciſa.*

P. pedunculis ſolitariis, foliis ovatis inciſo-ſerratis villoſis, ramis inermibus. *Thunb. jap.* 202.

Tiefzähnige Pflaume. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *arboreus parum craſſus debilis orgyalis.* Rami *et* ramuli *alterni flexuoſi glabri cinerei inermes patentes.* Folia *ex apicibus ramulorum plura breviſſime petiolata ovata acute inciſo-ſerrata villoſa, vix unguicularia ſub floreſcentia dein excreſcentia.* Petioli *foliis duplo breviores.* Flores *ex apicibus ramulorum ſolitarii pedunculati incarnati.* Pedunculi *capillares glabri foliis duplo longiores.* Perianthium *cylindricum apice dilatatum glabrum ferrugineum corolla duplo brevius.* Thunb. l. c.

*28. PRUNUS *tomentoſa.*

P. pedunculis ſolitariis, foliis ovatis ſubtus tomentoſis. *Thunb. jap.* 203.
Filzblättrige Pflaume. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *arboreus ramoſus.* Rami *glabri erecti ramuloſi.* Ramuli *alterni patuli tomentoſi.* Folia *alterna petiolata ovata acuta ſerrata venoſa ſupra villoſa ſubtus tomentoſa patentia ſubpollicaria.* Petioli *tomentoſi ſemilineam longi.* Flores *ſolitarii pedunculati.* Drupa *magnitudine piſi.* Thunb. l. c.

29. PRUNUS *domeſtica.*

P. pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Mat. med.* 125. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 160. *Hoffm. germ.* 170. *Roth. germ. I.* 212. *II.* 541.
P. inermis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 186. *Hort. upſ.* 124. *Roy. lugdb.* 268.
Prunus pruna offic. *Crantz. auſt. p.* 94.
P. foliis ſerratis, hirſutis, ovato-lanceolatis, floribus longe petiolatis. *Hall. helv. n.* 1079.
P. ſylveſtris fructu majore. *Vaill. pariſ.* 140.
Prunus. *Bauh. pin.* 443. *Raj. hiſt.* 1526. *Blackw. t.* 309.
β. Prunus *Damaſcena.*
Pruna majora dulcia et parva atro-coerulea. *Bauh. pin.* 443 *n.* 23. *Blackw. t.* 305. *Knorr. del* 1. *t. P.* 2.
γ. Prunus *hungarica.*
Pruna magna craſſa ſubacida. *Bauh. pin.* 443.

δ. Prunus *juliana.*
Pruna oblonga caerulea. *Bauh. pin.* 443.
ε. Prunus *pertigona.*
Pruna nigra, carne dura. *Bauh. pin.* 443.
ζ. Prunus *cerea.*
Pruna coloris cerae ex candido in luteum palleſcente. *Bauh. pin.* 443.
η. Prunus *acinaria.*
Pruna magna rubra rotunda. *Bauh. pin.* 443.
θ. Prunus *maliformis.*
Pruna rotunda flava dulcia mali amplitudine. *Bauh pin.* 443.
ι. Prunus *auguſtana.*
Pruna auguſto matureſcentia minora et auſteriora. *Bauh pin.* 443.
κ. Prunus *praecox.*
Pruna parva praecocia. *Bauh. pin.* 443.
λ. Prunus *cereola.*
Pruna parva ex viridi flaveſcentia. *Bauh. pin.* 443.
μ. Prunus *amygdalina.*
Pruna amygdalina. *Bauh. pin.* 443.
ν. Prunus *galatenſis.*
Pruneoli albi oblongiuſculi acidi. *Bauh. pin* 443.
ξ. Prunus *Brignola.*
Pruna ex flavo rufeſcentia mixti ſaporis gratiſſima. *Bauh. pin.* 443.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 750.
Gemeine Pflaume. W.
Habitat in Europae *auſtralioris locis elevatis.* ♄ (v. v.)
Folia vernantia convoluta. Gemmae *floriferae aphyllae.*

30. PRUNUS *inſiticia.*

P. pedunculis geminis, foliis ovatis ſubtus villoſis convolutis, ramis ſpineſcentibus. *Amoen. acad.* 4. *p.* 273.* *Hudſ. angl.* 186. *Blackw. t.* 305. *Hall. helv. n.* 1081. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 165. *Hoffm. germ.* 170. *Roth. germ. I.* 212. *II.* 541.
P. ſylveſtris major. *Raj. hiſt.* 1528. *Du Ham. arb.* 2. *t.* 41.
Pruna ſylveſtria praecocia. *Bauh. pin.* 444.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 752.
Kriechen-Pflaume, W.
Habitat in Germania, Helvetia, Anglia. ♄ (v. v.).

*31. PRUNUS *ceraſifera.*

P. pedunculis ſolitariis, foliis ellipticis glabris, fructibus pendulis ramis ſubinermibus. *Willd. arb.* 250.*

P. (*ceraſifera*) ramis ſubſpineſcentibus glaberrimis, foliis ellipticis glabris convolutis, pedunculis ſolitariis tenuiſſimis glaberrimis, calyce reflexo, drupa ſubgloboſa pendula. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 17.

Prunus domeſtica ξ. myrobalan. *Sp. pl.* 680.

Prunus domeſtica c. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 164.

P. fructu rotundo nigro-purpureo dulci. *Bauh. pin.* 444.

P. fructu majori, rotundo rubri. *Tournef. inſt.* 622.

Runde Pflaume, W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

32. PRUNUS *ſpinoſa.*

P. pedunculis ſolitariis, foliis elliptico-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, fructibus rectis, ramis ſpinoſis. W.

P. pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis. *Hort. cliff.* 186. *Fl. ſuec.* 397, 432. *Mat. med.* 125. *Roy. lugdb.* 268. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 166. *Scop. carn. n.* 586. *Pollich. pal. n.* 469. *Du Ham. arb.* 2. *p.* 186. *Blackw. t.* 494. *Hoffm. germ.* 170. *Roth. germ. I.* 212. *II.* 541.

P. ramis ſpinoſis pubeſcentibus, foliis ellipticis convolutis ſubtus villoſis, pedunculis ſolitariis ſubpubeſcentibus, calyce patente, drupa globoſa. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 16.

P. Acacia. *Crantz. auſtr. p.* 193.

P. ſpinoſa, foliis glabris, ſerratis, ovato-lanceolatis, floribus breviter petiolatis. *Hall. helv. n.* 1080.

P. ſylveſtris. *Bauh. pin.* 444. *Tabern. ic.* 992.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 755.

Schlehen-Pflaume. W.

Habitat in Europae *collibus apricis* ♄ (v. v.)

*33. PRUNUS *proſtrata.*

P. pedunculis geminis, foliis ovatis inciſo-ſerratis eglandulosis ſubtus tomentoſo-albicantibus, caule proſtrato. *Billard. pl. ſyriac. p.* 15. *t.* 6.*

P. cretica montana minima humifuſa, flore ſuave rubente. *Tournef. cor.* 43.

Liegende Pflaume. W.

Habitat in Cretae *montibus, inque cacumine montis* Libani. ♄

Amygdalis habitu accedit, ſed nux laevis. W.

683. PLINIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 851.

Cal. 5-ſ. 4-partitus. Petala 5 ſ. 4. *Drupa* ſupera, ſulcata.

1. PLINIA *crocea.*
P. floribus pentapetalis. *Mant.* 402.
P. pinnata. *Sp. pl.* 2. *p.* 735.
P. fructu coroceo odorato. *Plum. gen.* 9. *ic.* 225.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 713.
Safranfarbige Plinie. W.
Habitat in America. ♄

Folia *pinnata, abrupta, foliolis circiter* 12, *ovato-lanceolatis, integerrimis.* Flores *ſeſſiles, ſparſi per ramos nudos ſeniores.* Fructus *edulis.*

Planta adhuc obſcura a recentioribus Botanicis nondum obſervata; quae ſecundum characterem incompletum, a Plumiero datum, ſitu germinis ab Eugenia diverſa videtur. W.

984. CHRYSOBALANUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 850.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Stylus* lateralis *Drupae* nux 5-ſulcata, 5-valvis.

1. CHRYSOBALANUS *Icaco.*
Chryſobalanus. *Iacq. amer.* 154. *t.* 94. *Mill. dict. n.* 1.
Frutex folio cotini craſſo in ſummitate deliquium patiente, fructu ovali coeruleo. *Catesb. car.* 1. *p.* 25. *t.* 25.?
Guaiera. *Marcgr. braſ. t.* 2. *c.* 4.
α. Icaco fructu ex albo rufeſcente. *Plum. gen.* 44. *ic.* 158.
β. Icaco fructu nigro. *Plum. gen.* 44.
γ. Icaco fructu purpureo. *Plum. gen.* 44.
Chryſobalanus (*purpurea*) foliis decompoſitis, foliolis ovatis integerrimis. *Mill. dict. n.* 2. R.
δ. Chryſobalanus fruticoſus, foliis orbiculatis alternis, floribus laxe racemoſis. *Brown. jam.* 250. *t.* 17. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 756. *t.* 11. *f.* 2.
Weſtindiſche Icacopflaume. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ.)

Species *an una vel plures vix dixero, quam tantum unica mihi viſa* δ, *quae caule ſcabro non eſt, ſed* Folia

alterna, ſubrotunda, integerrima, ſubemarginata. Flores *paniculati*: Pedunculis *exterius rotundatis, interius planis.*

*985. ROBINSONIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 859.

Cal. 5-dentatus. *Petala* 5. *Bacca* ſtriata 2-locularis, loculis 1-ſpermis. *Sem.* villoſa.

*1. ROBINSONIA *melianthifolia.* W.

Touroulia gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 492. *t.* 194. *
Honigblumenblättrige Robinſonie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Arbor *magna.* Folia *alterna fere Melianthi majoris, impari pinnata, foliolis lanceolato acuminatis argute ſerratis venoſis, ſuperioribus baſi in petiolum communem decreſcentibus.* Stipulae *oblongae acutae parvae.* Flores *flavi minuti in panicula terminali.* Bacca *Ceraſi magnitudine edulis acidula et grati ſaporis.* W.

986. SONNERATIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 853.

Cor. 6-fidus. *Petala* 6-lanceolata. *Bacca* multilocularis, loculis polyſpermis.

1. SONNERATIA *acida.*

S. acida. *Lin. ſuppl.* 252.
Rhizophora (*caſeolaris*) foliis ovatis obtuſis, floribus ſolitariis, fructibus orbiculatis depreſſis mucronatis. *Sp. pl.* 635.
Aubletia caſeolaris. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 379. *t.* 78. *f.* 2.
Pagapate. *Sonnerat. it. nov. guin. p.* 16. *t.* 10. 11.
Mangium caſeolare. *Rumph. amb.* 1. *p.* 111. *t.* 73. 74.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 183.
Säuerliche Sonneratie. W.
Habitat in Moluccis *inque uliginoſis* Nova Guineae. ♄

Arbor. Folia *oppoſita ſubſeſſilia oblonga integerrima Hyperici.* Flores *terminales ſolitariis magni.* Petala *rubra.* Fructus *ſimilis Meſembryanthemi, ſucco acido veſiculoſo.*

D I G Y N I A.

987. CRATAEGUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 854.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera diſperma.

1. CRATAEGUS *coccinea.*

C. ſpinoſa, foliis cordato-ovatis inciſo-angulatis glabris, petiolis calycibusque glandulofis floribus pentagynis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 167. *Willd. arb.* 81.
C. foliis cordatis repando-angulatis ſerratis glabris. *Mill. dict. n.* 4. *Du Roi.* 1. *p.* 159.
C. foliis ovatis repando angulatis ſerratis glabris. *Hort. cliff.* 187. *Hort. upſ.* 126. *Gron. virg.* 54. *Roy. lugdb.* 272. *Du Hamel. arb.* 12.
Meſpilus foliis cordatis ovatis acuminatis, marginibus acute ſerratis, ramis ſpinoſis. *Mill. dict. t.* 170.
Meſpilus, apii folio, virginiana ſpinis horrida, fructu amplo coccineo *Pluk. alm.* 249. *t.* 46. *f.* 4.
Meſpilus ſpinoſa ſ. Oxyacantha virginiana maxima *Angl. hort.* 49. *t.* 13. *f.* 1.
Oxyacantha ſpina ſancta dicta. *Raj. hiſt.* 1799.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 763.
Rother Weiſsdorn. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♄ (v. v.)

Rami *adſperſi punctis vagis.* Spinae *axillares: validae, patentiſſimae, ramorum e rudimentis.* Folia *cuneato-ovata, ſublobata, ſerrata.* Pedunculi *pubeſcentes, corymboſi.*

2. CRATAEGUS *cordata.*

C. ſpinoſa, foliis cordato-ovatis inciſo-angulatis glabris petiolis calycibusque eglandulofis, floribus pentagynis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 168. *Willd. arb.* 82. *
C. (*populifolia*) foliis ſubcordatis trilobis, lobis inciſo-ſerratis, utrinque laevibus, petiolis praelongis laevibus. *Walt. carol. p.* 147.
Meſpilus (*Phaenopyrum*) ſpinoſa, foliis cordatis tri-quinque-ſ. ſeptemfidis ſerratis glabris, floribus corymboſis, ſegmentis calycinis deciduis, fructibus depreſſo-globoſis late umbilicatis, nucibus apice denudatis. *Lin. ſuppl.* 254. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 67.
Meſpilus (*cordata*) foliis cordato-ovatis acuminatis acute

ſerratis, ramis ſpinoſis. *Mill. dict. ic. 119. tab.* 179. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 615.
Meſpilus acerifolia. *Burgsdorf. Anleit. n.* 232.
Ahornblättriger Weiſsdorn. W.
Habitat in America *boreali* ♄ (v. v.)

Arbor *mediocris.* Rami *ſpinoſi albo-maculati.* Folia *cordata trifida, quinquefida ſ. ſeptemfida acuminata, acute ſerrata glabra magnitudine Betulae albae.* Petiolus *tenuiſſimus folio brevior.* Corymbus *compoſitus.* Brateae *ad baſin pedunculorum ſolitariae ſubulatae minimae deciduae.* Flos *Crataegi Oxyacanthae paulo minor.* Dentes *calycini breviſſimi obtuſi, fructu maturo decidui.* Styli *quinque.* Fructus *depreſſo-globoſus ſ. verticilliformis coccineus magnitudine Ribis rubri, umbilico laxo nudo.* Nuces 5 *oſſeae, apicibus umbilicum replentibus nudis.* Floreſcentia *ſerotina et ultima hujus generis.*

3. CRATAEGUS *viridis.*

C. foliis lanceolato-ovatis ſubtrilobis ſerratis glabris caule inermi. *Sp. pl.* 683.
Meſpilus inermis foliis oblongis integris acuminatis ſerratis parvis utrinque viridibus. *Gron. virg.* 163.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 764.
Grüner Weiſsdorn. W.
Habitat in Virginia. ♄

Stipulae ſemicordatae.

Varietas *C. coccineae. Gron. virg.* 76. Variant *certe hae, Americae ſeptentrionalis ſpecies plurimum ſpinis ſ. ſine ſpinis, Stylorum numero, foliorum figura et videntur in natali mixtae. Sed inermis ſunt C. Aria, torminalis et indica.*

Incerta ſpecies, denuo obſervationibus determinanda. W.

*4. CRATAEGUS *pyrifolia.*

C. ſpinoſa inermisve, foliis ovato-ellipticis inciſo-ſerratis ſubplicatis ſubhirtis, calycibus villoſiuſculis, foliolis lineari-lanceolatis ſerratis, floribus trigynis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 168. *Willd. arb.* 83. *
C. (*Leucophleos*) inermis, foliis ovatis inaequaliter ſerratis, baſin verſus integerrimis, ſtylo ſemibifido. *Moench. weiſſenſt. p.* 31. *t.* 2.
Crataegus tomentoſa. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 183.
Crataegus edulis. *Loddiges catal. p.* 8.

Meſpilus laciniata. *Walt. carol. p.* 147. ?
Meſpidus (*Calpodendron*) ſpinoſa, foliis ovalibus acuminatis ſubangulatis ſerratis pubeſcentibus baſi cuneatis, pedunculis multifloris, laciniis calycinis pinnatifidis. fructibus urceolatis. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 67.
Birnenblättriger Weiſsdorn. W.
Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

*5. CRATAEGUS *elliptica.*
D. ſpinoſa, foliis ellipticis inaequaliter ſerratis glabris, petiolis calycibusque glanduloſis, baccis globoſis pentaſpermis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 168.
Ovalblättriger Weiſsdorn. W.
Habitat in America *boreali.* ♄

*6. CRATAEGUS *glanduloſa.*
C. ſpinoſa, foliis obovato-cuneiformibus angulatis glabris nitidis, petiolis ſtipulis calycibusque glanduloſis, baccis ovalibus pentaſpermis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 168. *Willd. arb.* 84. *. *Moench. weiſſenſt. p.* 31.
C. (*ſanguinea*) ſpinoſa, foliis ſeptangulis ſerratis, baſi productis, petiolis ſubmarginatis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 25. *t.* 11.
Meſpilus (*rotundifolia*) ſpinoſa, foliis ſubrotundis ſubangulatis ſerratis glabris ſplendentibus, corymbis multifloris, laciniis calycinis ſerrato-glanduloſis, drupis globoſis. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 20.
Drüſiger Weiſsdorn. W.
Habitat in America *boreali*, *inque* Sibiria. ♄ (v. v.)
In hac ſpecie ſpinae *validae*, *in ſequentibus duabus tenues*, *apice fere incurvo*, *et in flava ſaepe foliolis parvis inſtructae.* Ait. l. c.

*7. CRATAEGUS *flava.*
C. ſpinoſa, foliis obovato-cuneiformibus angulatis glabris nitidis, petiolis ſtipulis calycibusque glanduloſis, baccis turbinatis tetraſpermis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 169.
Meſpilus (*flexiſpina*) foliis ovatis crenatis, ſtipulis ſemicordatis ſerratis, ſpinis foliaceis, floribus ſolitariis. *Moench. weiſſenſt. p.* 62. *t.* 4.
Gelbfrüchtiger Weiſsdorn. W.
Habitat in America *boreali.* ♄

8. CRATAEGUS *parvifolia.*
C. ſpinoſa, foliis cuneiformi-ovatis inciſis ſerratis, foliolis calycinis lanceolatis inciſis longitudine fructus,

floribus pentagynis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 169. *Willd. arb.* 85. *

- C. (*tomentoſa*) foliis cuneiformi-ovatis ſerratis ſubangulatis ſubtus villoſis, ramis ſpinoſis. *Sp. pl.* 682.

C. (*uniflora*) foliis lanceolato-ovatis ſerratis ſubtus villoſis, ſtipulis ſemicordatis, floribus ſolitariis, calycibus foliaceis, ſpinis longiſſimis. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 184.

Meſpilus (*Xanthocarpus*) ſpinoſa, foliis ſubcuneiformibus crenatis, floribus ſolitariis, laciniis calycinis ſubfoliaceis inciſo-ſerratis longis reflexis fructibus ſubturbinatis punctato-verrucoſis. *Lin. ſuppl.* 254.

Meſpilus inermis foliis ovato-oblongis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Gron. virg.* 55.

Meſpilus caroliniana apii folio, vulgari ſimilis major, fructu luteo. *Trew. ehret. t.* 17.

Meſpilus virginiana groſſulariae foliis. *Pluk. phyt. t.* 100. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 766.

Kleinblättriger Weiſsdorn. W.

Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

Fruticulus *rigidus ſpinoſus.* Folia *ſubcuneiformia crenata craſſiuſcula ſubtomentoſa ſesquipollicaria.* Petiolus *breviſſimus.* Pedunculus *ex apicibus ramulorum ſolitarius tomentoſus, longitudine germinis.* Brateae 2-*f.* 3 *lineari-lanceolatae ſerratae diciduae.* Germen *tomentoſum.* Laciniae *calycinae ſubfoliaceae lanceolatae inciſo-ſerratae reflexae germine longiores.* Styli *quinque.* Fructus *ſubturbinatus pallide luteus, verrucis nigripunctatus, profunde umbilicatus, magnitudine drupae Pruni inſiticiae.* Nuces 5 *oſſeae.*

*9. CRATAEGUS *villoſa.*

C. foliis oblongis acuminatis villoſis ſerratis, florum umbella compoſita. *Thunb. jap.* 204. *

Haariger Weiſsdorn. W.

Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus.* Folia *alterna petiolata ovato-oblonga acuminata ſerrata venoſa villoſa bipollicaria.* Flores *terminales umbellati.* Umbella *compoſita.* Styli *duo ſtigmatibus capitatis.* Fructus *villoſus.* Thunb. l. c.

*10. CATRAEGUS *laevis.*

C. foliis ovatis acuminatis glabris ſerratis, florum umbella ſubſimplici. *Thunb. jap.* 204. *

Doldenblütiger Weiſsdorn. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus totus glaber.* Folia *e gemmis alternis 3 vel 4 petiolata ovata acuminata tenuiſſime ſerrata plana glabra, tenuia, patentiſſima inaequalia pollicaria.* Flores *terminales umbellati patentiſſimi.* Umbella *ſubſimplex, rarius radio unico trifido vel racemoſo.* Styli. 2 *ſtigmatibus capitatis.* Thunb. l. c.

*11. CRATAEGUS *glabra.*

C. foliis oblongis acutis glabris serratis, florum panicula compoſita. *Thunb. jap.* 205.*
Glatter Weiſsdorn. W.
Habitat in Japonia. ♄

Differt a binis praecedentibus: foliis *oblongis nec ovatis, ſed craſſioribus et ſempervirentibus,* petalis *baſi villoſis,* panicula *magna compoſita.* Thunb. l. c.

*12. CRATAEGUS *punctata.*

C. ſpinoſa inermisve, foliis obovato-cuneiformibus glabris ſerratis, calycibus ſubvilloſis, foliolis ſubulatis integris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 169. *Willd. arb.* 86.* *Jacq. hort.* 1. *p.* 10. *t.* 28.
Crataegus Crus galli. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 195. *Wangenh. amer.* 52.
Meſpilus (*cuneifolia*) ſpinoſa, foliis ovatis cuneatis in petiolos decurrentibus obſolete angulatis ſerratis vix pubeſcentibus, ſupra glabris, ſubtus venoſo-rugoſis, corymbis multifloris, pedunculis apice incraſſatis, ſegmentis calycinis integerrimis reflexis, drupis ſubgloboſis punctato-verrucoſis florum magnitudine, umbilico depreſſo. *Ehrh. Beitr.* 3. *p.* 21.
Punctirter Weiſsdorn. W.
Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

Variat fructibus rubris et flavis. W.

13. CRATAEGUS *Crus galli.*

C. ſpinoſa, foliis obovato-cuneiformibus ſubſeſſilibus nitidis coriaceis, foliolis calycinis lanceolatis ſubſerratis, floribus digynis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 170. *Willd. arb.* 87.*
C. foliis lanceolato-ovatis ſerratis glabris, ramis ſpinoſis. *Kalm. it.* 1. *p.* 244.
Crataegus lucida. *Wangenh. amer. p.* 53. *t.* 17. *f.* 42.
Meſpilus lucida. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 17.

Meſpilus foliis lanceolatis ſerratis, ſpinis robuſtioribus floribus corymboſis. *Mill. dict. t. 178. f. 2.*

α. ſplendens foliiis obovato-cuneiformibus. *Ait. l. c.*

Meſpilus aculeata pyrifolia denticulata ſplendens fructu inſigni rutilo, virginienſis. *Plum. alm.* 249. *t.* 46. *f.* 1. *Du Ham. arb.* 17. *Hort. angl. t.* 13.

Meſpilus pruni foliis, ſpinis longiſſimis fortibus, fructu rubro magno. *Clayt. virg.* 55.

β. pyracanthifolia foliis oblongo-lanceolatis ſubcuneiformibus. *Ait. l. c.*

γ. ſalicifolia foliis lanceolatis. *Ait. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 765.

Glänzender Weiſsdorn. W.

Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

Folia *ovalia, baſi cuneata, nitida.*

14. CRATAEGUS *indica.*

C. foliis lanceolatis ſerratis, caule inermi corymbis ſquamoſis. *Sp. pl.* 683.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 767.

Indiſcher Weiſsdorn. W.

Habitat in India. ♄

Arbor *magna ramis inermibus.* Folia *lato-lanceolata, obtuſe ſerrata, craſſiuſcula, petiolata.* Corymbi *terminales, pedunculis ſquamoſis, bracteis ſubulatis.*

15. CRATAEGUS *maura.*

C. foliis oblongis apice dentatis. *Lin. ſuppl* 253.

Mauritaniſcher Weiſsdorn. W.

Habitat in Mauritania. *S. M. Wänſtröm.* ♄

Statura et Facies C. Oxyacanthae. Frutex *cortice cinereo* Stipuleae *in meo nullae.* Folia *oblonga S. ſublanceolata obtuſa laevia apice tridentata S. quinquedentata, dentibus acutis.* Flores *in corymbis ramoſis ſimiles C. Oxyacanthae.*

16. CRATAEGUS *Oxyacantha.*

C. foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis glabris, floribus digynis, pedunculis calycibusque ſubglabriuſculis calycinis ſegmentis lanceolatis acutis. W.

C. foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis *Hort. cliff.* 188. *Fl. ſuec.* 399, 434. *Roy. lugdb.* 272. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 176. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 180. *Iacq. auſtr.* 3. *t.* 292. *f.* 2. *Pollich. pal. n.* 472. *Flor. dan. t.* 634. *Blackw. t* 149. *Kniph. cent.* 7. *n.* 17. *Knorr. del.* 1. *t. S. Medic. in*

obſ. Soc. Lutr. 1774. *p.* 294. *Hoffm. germ.* 171. *Roth. germ. I.* 213. *II.* 543.
Meſpilus ſpinoſa, foliis glabris, ſerratis, retuſis, trifidis. *Hall. helv. n.* 1087.
Meſpilus, apii folio, ſylveſtris ſpinoſa ſ. Oxyacantha. *Bauh. pin.* 454.
Oxyacantha ſ. Spina acuta. *Dod. pempt.* 751.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 768.
Gemeiner Weiſsdorn. W.
Habitat in Europae *pratis apricis duris.* ♄ (v. v.)

*17. CRATAEGUS *monogyna.*

C. foliis acutis ſubtrifidis, ſerratis glabris, floribus monogynis, pedunculis calycibusque ſubpubeſcentibus calycinis ſegmentis lanceolatis acuminatis. W.
C. (*monogyna*) foliis ſubtrifidis acutis floribus monogynis. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 465. *Iacq. auſt.* 3. *t.* 292. *f.* 1.
C. (*monogyna*) rubra ſpinoſa, foliis quinquefidis ſerratis, lobis infimis divaricatis, ſtipulis ſemicordatis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 26.
β. C. (*monogyna nigra*) ſpinoſa, foliis quinquefidis inciſis cuneiformibus, ſtipulis lanceolatis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 26. *t.* 12.
γ. floribus ſimplicibus rubris.
δ. floribus plenis.
Einſamiger Weiſsdorn. W.
Habitat in Europae *dumetis, inque* Sibiria. ♄ (v. v.)

Folia *acuta profunde diviſa, et flores conſtanter monogyni,* pedunculi *calycesque plerumque pubeſcentes denique* laciniae *calycinae acuminatae.* W.

*18. CRATAEGUS *pentagyna.*

C. foliis ovatis ſubtrifidis ſerratis, axillis venarum ſubtus villoſis, floribus pentagynis, pedunculis calycibusque pubeſcentibus, calycinis ſegmentis ſubrotundis. W.
Crataegus pentagyna. *Waldſt. et Kitaibel pl. hung.*
Fünfſamiger Weiſsdorn. W.
Habitat in comitatu Syrmienſi Hungariae *inque* Banatu. ♄ (v. ſ.)

Quoad foliorum formam ſimillima praecedenti, ſed diverſa: foliis *ſubtus ad venarum axillas villoſis,* calycinis *dentibus breviſſimis vix conſpicuis ſubrotundis obtuſis, denique* flore *conſtanter pentagyno.* W.

19. CRATAEGUS *Azarolus.*

C. foliis obtuſis ſubtrifidis ſubdentatis pubeſcentibus, ſegmentis calycinis ovatis. W.

C. foliis obtuſis ſubtrifidis ſubdentatis. *Sp. pl.* 683. *Mill. dict. n.* 7. *Willd. arb.* 90. *

Pyrus Azarolus. *Scop. carn.* 2. *n.* 597.

Meſpilus apii folio laciniato. *Bauh. pin.* 453.

Meſpilus Aronia veterum. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 67.

β. Crataegus *Aronia.*

Meſpilus orientalis, apii folio, ſubtus hirſuto. *Pock. orient.* 189. *t.* 85.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 770.

Azarol-Weiſsdorn. W.

Habitat Florentiae, Monſpelii, *in* Carniolia. ♄ (v. v.)

Differre videtur ab Oxyacantha *ſola magnitudine, ut Sorbus domeſtica a ſylveſtri; in hac quadruplo majora omnia; ſpinae in culta pauciores et ſaepe nullae.*

Locula *quina, ut in Pyro.* Scop. l. c. R.

*988. WALDSTEINIA. W.

Willd. Nov. Act. ſoc. Berol. 2. *p.* 105.

Cal. 10-fidus, laciniis alternis minoribus. *Petala* 5. *Semina* 2 obovata.

*1. WALDSTEINIA *geoides.* W.

W. geoides. *Willd. Nov. Act. ſoc. Nat. ſcrut. Berol.* 2. *p.* 106. *t.* 4. *f.* 1. *

Geumartige Waldſteinie. W.

Habitat in ſylvis umbroſis Hungarie. ♃ (v. ſ.)

Folia *radicalia petiolata quinqueloba nervoſo-venoſa ſubpiloſa, lobis obtuſis obſolete trilobis dentatis.* Caulis *adſcendens foliorum longitudine teres ſtriatus piloſiuſculus.* Folia *caulina triloba inciſo-dentata.* Stipulae *oblongae acutae integerrimae.* Pedunculi *bini vel terni terminales filiformes longiſſimi.* Flores *flavi.* Planta *Geo affinis, ſed* piſtillorum *numero,* ſtylisque *deciduis clavatis diſtincta, a Potentillis vero habitu* piſtillorum *numero, et* ſtylorum *forma diverſiſſima.* W.

TRIGYNIA.

989. SORBUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 855.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 3-ſperma.

1. SORBUS *aucuparia.*

S. foliis pinnatis utrinque glabris. *Mat. med.* 126. *Hall. helv. n.* 1091. *ſub* Meſpilo. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 178. *Gunn. norv. n.* 99. *Pollich. pal. n.* 473. *Du Roi. harbk.* 2. *n.* 420. *Blackw. t.* 73. *Willd. arb.* 365. *Hoffm. germ.* 171. *Roth. germ. I.* 213. *II.* 544.

S. foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 188. *Fl. ſuec.* 400, 455. *Roy. lugdb.* 274. *Gron. orient.* 151.

S. foliis pinnatis, fructu pomiformi 5-loculari. *Crantz. auſt. p.* 88. *t.* 1. *f.* 4.

Meſpilus floribus trigynis; foliis pinnatis, glabris. *Scop. carn.* 1. *p.* 584. *n.* 3. *ed.* 2. *n.* 593.

S. aucuparia. *Tournef. inſt.* 634. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 62. *Du Ham. arb.* 2. *t.* 73.

S. ſylveſtris, foliis domeſticae ſimilis. *Bauh. pin.* 415. *Raj. hiſt.* 1457.

S. ſylveſtris. *Cam. epit.* 161.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 772.

Gemeine Ebereſche. W.

Habitat in Europae *frigidioribus*, Libano. ♄ (v. v.)

Styli 3, 4 *totque Semina. Poll. Fructus* 5-*locularis pentaſpermus, licet aliqua ſemina abortiant.* Crantz. l. c. R.

Folia *ſunt ſubtus pubeſcentia, in varietate vero ex America boreali, quae forte ſpecie differt, utrinque glaberrima nec juniora pubeſcentia.* W.

2. SORBUS *hybrida.*

S. foliis ſemipinnatis ſubtus tomentoſis. *Linn. dec.* 6. *Oed. dan. t.* 30. *Willd. arb.* 366. *Hoffm. germ.* 171. *Roth germ. I.* 213. *II.* 545.

Crataegus fennica. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 433. γ.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 775.

Baſtard Ebereſche. W.

Habitat in Gotlandia, Thuringia. ♄ (v. v.)

Statura *et foliatura aliquatenus Pyri Ariae.* Flores, Corymbus *et* Piſtilla 3. *S. aucupariae.*

3. SORBUS *domeſtica.*

S. foliis pinnatis ſubtus villoſis. *Hall. helv. n.* 1092. *Mill. dict. n.* 2. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 423. *Hoffm. germ.* 171. *Roth. germ. I.* 214. *II.* 546.
S. foliis pinnatis, fructu pyriformi 5-loculari. *Crantz auſtr. p.* 87. *t.* 2. *f.* 3.
S. ſativa. *Bauh. pin.* 415. *Edw. av. t.* 211. *Raj. hiſt.* 1456. *Tournef. inſt.* 633. *Blackw. t.* 174.
S. legitima. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 10. *Du Ham. arb.* 1.
S. domeſtica. *Matthiol. dioſc. L.* 1. *c.* 136. *Cam. epit.* 160. *Lob. ic.* 2. *p.* 106.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 775.
Zahme Ebereſche. W.
Habitat in Europae *calidioribus.* ♄ (v. f.)

Fructus magnitudine minoris pomi Mali. Grandaeva *primum frutificat.*

Loculi *quini, raro ſemine completi omnes.* Crantz, l. c. R.

990. SESUVIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 856.

Cal. 5-partitus, coloratus, *Petala* 0. *Capſ.* ovata, trilocularis, circumſciſſa, polyſperma.

1. SESUVIUM *Portulacaſtrum.*

Seſuvium. *Iacq. amer.* 155. *t.* 95. *Swartz obſ.* 204. *
Portulaca foliis lanceolatis convexis, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 1. *p.* 446. *Loefl. ic.* 191. *
Aizoon repens, foliis oblongis turgidis foliis ſeſſilibus ſingularibus ad alas. *Brown. jam.* 241.
Portulaca curaſſavica, anguſto longo lucidoque folio procumbens, floribus rubris. *Pluk. alm.* 303. *t.* 216. *f.* 1. *Herm. par.* 212. *t.* 212.
Portulaca marina latifolia, flore ſuaverubente. *Plum. ſpec.* 6. *ic.* 223. *f.* 2.
Portulaca aizoides maritima procumbens, flore purpureo. *Sloan. jam.* 88. *hiſt* 1. *p.* 204.
Halimus indicus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 165. *t.* 72. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 96.
Portulacartiges Seſuvium. W.
Habitat in Indiae *maritimis.* ☉ (v. ſ.)

PENTAGYNIA.

991. MESPILUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 857.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 5-ſperma.

1. MESPILUS *germanica.*

M. inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 189. *Hort. upſ.* 129. *Mat. med.* 127. *Roy. lugdb.* 270. *Mill. dict. n.* 2. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 409. *Pollich. pal. n.* 474. *Blackw. t.* 154. *Kniph. cent.* 2. *n.* 45. *Ludw. ect. t.* 38. *Hoffm. germ.* 172. *Roth. germ. I.* 214. *II.* 546. *Willd. arb.* 192. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 29. *t.* 13. *f.* 1.

α. *ſtricta* foliis duplicato ſerratis. *Ait. Kew.* 2 *p.* 172.
M. foliis elliptico-lanceolatis ſerratis, calycibus longiſſimis perſiſtentibus. *Hall. helv. n.* 1094.
M. foliis oblongis arguto ſerratis, bacca pyriformi truncata. *Crantz. auſtr.* 80.
M. germanica, folio laurino non ſerrato. *Bauh. pin.* 453.
Meſpilus. *Dod. pempt.* 801.

β. *diffuſa* foliis ſubintegris. *Ait. l. c.*
Meſpilus folio laurino, major. *Bauh. pin.* 453. *Du Ham. arb. frut.* 1. *t.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 778.
Gemeine Miſpel. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

Rami *villoſi.* Folia *ovali-lanceolata; ad apicem ſerrata, ſubvilloſa, Petiolis breviſſimis canaliculatis.* Calyces *terminales, hirſuti, bractea longitudine corollae.*

*2. MESPILUS *japonica.*

M. inermis, foliis obovatis apice ſerratis, ſubtus tomentoſis, racemis paniculatis terminalibus. W.
M. inermis, foliis oblongis apice ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Thunb. jap.* 206.* *Banks.* 5. *Ic. Kaempf. t.* 18.
Bywa. *Kaempf. amoen. p.* 800.

Japaniſche Miſpel. W.
Habitat in Japonia. ♄

3. MESPILUS *Pyracantha.*

M. ſpinoſa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtuſis. *Hort. cliff.* 189. *Vir. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 271. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 596. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 413. *Med. in obſ. Soc. oecon. Lutr.* 1774. *p.* 227. *Willd. arb.* 192. *Pall. roſſ. p.* 29. *t.* 13. *f.* 2.

M. aculeata amygdali folio. *Tournef. inſt.* 642. *Du Ham. arb.* 7.

Oxyacantha Dioſcoridis ſ. Spina acuta, pyri folio. *Bauh. pin.* 454. *Raj. hiſt.* 1459.

Uva urſi. *Dalech. hiſt.* 164.

Rhamnus 3. Dioſcoridis. *Lob. ic.* 2. *p.* 182.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 182.

Immergrüne Miſpel. W.

Habitat in Galloprovinciae, Italiae *ſepibus.* ♄ (v. v.)

4. MESPILUS *Chamae-Meſpilus.*

M. inermis, foliis ovalibus acute ſerratis glabris, floribus corymboſo-capitatis. *Sp. pl.* 685. *Scop. carn. n.* 592. *Mill. dict. n.* 8. *Willd. arb.* 192. *

M. foliis ovatis ſerratis glabris. *Hall. helv. n.* 1090.

Crataegus foliis ovalibus acute ſerratis, glabris, caule inermi. *Iacq. vind.* 243. *auſtr. t.* 231.

Crataegus foliis ovalibus utrinque glabris plicatis indiviſis ſerratis. *Hort. cliff.* 497. *Vir. cliff.* 43. *Roy. lugdb.* 272.

Sorbus fruticoſa, foliis oblongo-ovalibus ſerratis, fructu ovato biloculari. *Crantz. auſtr. p.* 83. *t.* 1. *f.* 3.

Cotoneaſter folio oblongo ſerrato. *Bauh. pin.* 452.

Cotoneaſter forte Geſneri. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 652.

Niedrige Miſpel. W.

Habitat in alpibus Auſtriacis, Pyrenaicis. ♄ (v. v.)

Dum tenera lanata, adultior nuda. Folia *obovata.* Dentes *calycis tubo breviores, in Amelanchier tubo longiores.* Flos *digynus viſus Hallero, Iacquinio, Scopolio.*

Folia *juniora glaberrima absque lanugine, quam tamen ſenſim induunt et in ſenectute iterum abiiciunt. Crantz. l. c.* R.

5. MESPILUS *Cotoneaſter.*

M. inermis, foliis ovatis integerrimis acutiuſculis ſubtus tomentoſis, germinibus glabris, baccis di-vel triſpermis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 174. *Willd. arb.* 194. *

M. inermis, foliis ovatis integerrimis, ſubtus tomentoſis. *Oed. dan t.* 112. *Mill. dict. n.* 7. *Hall. helv. n.* 1093. *Hort. cliff.* 189. *Fl. ſuec.* 403, 438. * *Roy. lugdb.* 271. *Pollich. pal. n.* 476. *Leers. herb. n.* 375. *Scop. carn. n.* 594. *Kniph. cent.* 1. *n.* 58. *Hoffm. germ.* 172. *Roth. germ.* 1. 214. *II.* 548. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 30 *t.* 14.

M. foliis ovato-acuminatis integerrimis ſubtus lanatis, bacca globoſa. *Crantz. auſtr. p.* 81.

Cotoneaſter folio rotundo non ſerrato. *Bauh. pin.* 452.

Chamae Meſpilus Geſneri. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 60.

Chamae Meſpilus Cordi. *Bauh. pin.* 452.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 653.

Quitten-Miſpel. W.

Habitat in Europae *frigidioris colibus apricis, inque* Pyrenaeis, Sibiria *et monte* Ararat. ♄ (v. v.)

Styli *tres;* Bacca 3-*rarius* 4-*ſperma. Pollich l. c. Crantz.* Styli 3-4. Bacca 1-*locularis*, 3-*ſperma.* Grim. *flor. iſen. in Nov. Act. A. N. C. III. app. p.* 321. Styli 3-5 *totque ſemina.* Scop. l. c. R.

6. MESPILUS *tomentoſa.*

M. inermis, foliis ovatis integerrimis obtuſis ſubtus tomentoſis, germinibus lanatis, baccis pentaſpermis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 174.

Meſpilus orientalis. *Mill. dict.*

Wollige Miſpel. W.

Habitat - - - - ♄

992. PYRUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 858.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum, 5-loculare, polyſpermum.

1. PYRUS *arbutifolia*

P. foliis obovatis acuminatis ſerratis, ſubtus tomentoſis, rachi ſupra glanduloſa, floribus corymboſis. *Willd. arb.* 257. *

P. (*arbutifolia*) inermis, foliis ovato-lanceolatis tenuiſ

ſime ſerratis, rachi ſupra glandulifere, corymbo compoſito. *Lin. ſuppl.* 256. *Wangenh. amer.* 89. *t.* 28. *f.* 64.

Meſpilus (*arbutifolia*) inermis, foliis lanceolatis crenatis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 685. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 418.

Crataegus virginiana, foliis arbuti. *Tournef. inſt.* 633. *Mill. dict. t.* 109.

Sorbus virginiana, folio arbuti. *Herm. lugdb.* 578. *t.* 669.

Sorbus aucuparia virginiana foliis arbuti. *Breyn prodr.* 1. *p.* 15.

α. *rubra* fructu rubro.
β. *nigra* fructu nigro.
γ. *alba* fructu albo.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 782.
Sandbeerblättrige Birne. W.
Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

Fruticulus *inermis.* Folia *ovato-lanceolata interdum obovata ſ. cuneiformia, tenuiſſime ſerrata, ſubtus villoſa, ſeſqui-aut bipollicaria, adulta pagina ſuperiori rubra, inferiori lutea.* Rachis *ſupra tota glandulifera.* Glandulae *confertae ſubulato-cylindricae luteo-ruſeſcentes.* Serraturae *apice glanduloſo-cartilagineae.* Stipulae *laterales petiolo adnatae ſubulatae.* Corymbus *compoſitus tomentoſus* 6-12 *florus.* Bracteae *ſubulatae caducae.* Flores *vix magnitudine Crataegi Oxyacanthae.* Petala *obovata alba, extus rubella.* Antherae *rubrae.* Styli *quinque.* Frurtus *ſubgloboſus* 5-*locularis.* Semina *in quovis loculamento* 2, *oblonga fuſca.*

In varietate α *ſunt.* Folia *magis tomentoſa minora.* Fructus *rubri, magnitudine Ribis rubri, acerbi; in* β. Folia *minus tomentoſa.* Fructus *nigri magnitudine fructus Pyri Ariae.*

2. PYRUS *Botryapium.*

P. foliis oblongo-ellipticis cuſpidatis glabris, floribus racemoſis, petalis lineari-lanceolatis, germinibus pubeſcentibus, calycinis ſegmentis glabris. *Willd. arb.* 258.

P. (*Botryapium*) inermis, foliis, ovato-oblongis ſerratis acutis, racemis ſimplicibus elongatis. *Linn. ſuppl.* 255. *Wangenh. amer.* 90. *t.* 28. *f.* 65.

Meſpilus (*canadenſis*) inermis, foliis ovato-oblongis

glabris ſerratis acutiuſculis. *Sp. pl.* 685. *Mill. dict. n.* 6. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 416.
Meſpilus inermis, foliis ſubtus glabris obverſe ovatis. *Gron. virg.* 54. *Du Ham. arb.* 9.
Crataegus racemoſa. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 84.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 653.
Trauben-Birne. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♄ (v. v.)

Arbor 10-ſ. 12-*pedalis inermis.* Folia *ovato-oblonga ſerrata acuta tripollicaria, tomentoſa, aldulta nuda glabra.* Racemi *ſimplices elongati ex apicibus ramulorum.* Pedunculi *tomentoſi.* Bracteae *ſubulato-filiformes villoſae caducae.* Petala *lineari-lanceolata obtuſa.* Styli *quinque.* Fructus *coeruleo-nigricans, magnitndine baccae* Ribis *nigri* 5-*locularis ſucculentus dulcis gratiſſimus.* Semina 10 *interdum pauciora brunea.* Gemmae *P. communis ſ. Populi tremulae, ſquamis interne villoſis.*

*3. PYRUS *ovalis.*

P. foliis ſubrotundo-ellipticis acutis glabris, floribus racemoſis, petalis obovatis, germinibus calycinisque ſegmentis pubeſcentibus. *Willd. arb.* 259. *
Meſpilus (*Amelanchier*) inermis, foliis ovato-lanceolatis crenatis, tenellis tomentoſis, adultioribus laevibus nitidis, floribus corymboſis. *Walt. carol. p.* 184.?
Crataegus ſpicata. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 84.
Rundblättrige Birne. W.
Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

Media inter praecedentem et ſequentem, differt a P. Botryapio: foliis *magnis ſubrotundis,* racemis *brevioribus,* calycinis *ſegmentis pubeſcentibus,* petalis *brevioribus obovatis, diſtincta a P. Amelanchier:* foliis *baſi ſubcordatis adultis glabris,* racemis *longioribus,* calycinis *ſegmentis pubeſcentibus,* petalis *obovatis ciliatis. Non eſt varietas ſequentis.* W.

4. PYRUS *Amelanchier.*

P. foliis ſubrotundo-ellipticis acutis ſubtus pubeſcentibus, floribus racemoſis, petalis lanceolatis, germinibus ſubvilloſis, calycinis ſegmentis glabris. W.
P. (*Amelanchier*) inermis, foliis ovalibus obtuſis ſerratis ſubtus tomentoſis calveſcentibus, ſtipulis lateralibus ſubulatis deciduis, racemo ſimplici paucifloro, petalis

ſublinearibus. *Lin. ſuppl.* 256. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 219.
P. foliis ovatis ſerratis ſubtus tomentoſis calveſcentibus *Hall. helv. n.* 1095.
Meſpilus (*Amelanchier*) inermis, foliis ovalibus ſerratis ſubtus hirſutis. *Sp. pl.* 685. *Mill. dict. n.* 5. *ic.* 178. *f.* 1. *Pollich. pal. n.* 475. *Iacq. auſt.* 3 *p.* 55. *t.* 300. *Hoffm. germ.* 172. *Roth. germ. I.* 214. *II.* 547.
Meſpilus inermis, foliis ovalibus ſerratis acutis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271.
Sorbus (*Amelanchier*) foliis ovalibus ſerratis carinatis fructu globoſo multiloculari. *Crantz. auſtr. p.* 90.
Alni effigie lanato folio minor. *Bauh. pin.* 452.
Vitis idae. *III. Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 62.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 651.
Felſen-Birne. W.
Habitat in Germaniae, Helvetiae, Auſtriae, Galliae, *rupeſtribus.* ♄ (v. ſ.)

Frutex *orgyalis inermis.* Ramuli *praeteriti anni epidermide alba ſoluta tecti.* Folia *ovalia obtuſa ſerrata, juniora ſubtus valde tomentoſa, adulta calveſcentia, vix pollicaria.* Stipulae *laterales petiolo adnatae ſubulatae deciduae.* Racemus *ſimplex* 4-*ſ.* 5-*florus tomentoſus.* Pedunculi *bracteati.* Bracteae *ſubulato-filiformes tomentoſae caducae.* Flores *Botryapii, interiores exteriores paulo ſuperantes.* Petala *lineari-lanceolata obtuſa.* Styli *quinque.* Fructus *coeruleo-nigreſcens magnitudine Ribis rubri* 5-*locularis ſucculentus dulcis ſapidus.* Semina 10, *in quovis loculamento* 2 *fuſca.* Gemmae *ovatae pubeſcentes rufae, ſquamis interne villoſis.*

Folia *ſero autumno tomentum exuunt.* W.

*5. PYRUS *cretica.*

P. foliis ſubrotundis emarginatis mucronatis ſubtus lanatis, floribus racemoſis, petalis lanceolatis, germinibus, calycinisque ſegmentis lanato-tomentoſis. W.
Meſpilus cretica folio circinato et quaſi cordiformi. *Tournef. cor.* 43.
Ceraſus Idea. *Alpin. exot. p.* 3. *t.* 2.
Candiſche Birne. W.
Habitat in monte Ida Cretae. ♄ (v. ſ.)

Simillima praecedenti, ſed folia fere orbiculata emarginata mucronata, groſſius dentata ſubtus magis

villoſa, pedunculi germina *et* laciniae *calycis denſo tomento ſunt tectae.* Fructus *magnitudine Peperis quinquelocularis, loculis diſpermis, et calycinis dentibus lanatis coronati.* W.

6. PYRUS *communis.*

P. foliis ovatis ſerratis, pedunculis corymboſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 174. *Willd. arb.* 260.

P. foliis ſerratis laevibus, floribus corymboſis. *Sp. pl.* 686. *Pollich. pal. n.* 477. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 207. *Scop. carn. n.* 598. *Blackw t.* 453. *Hoffm. germ.* 173. *Roth. germ. I.* 215. *II.* 548.

P. foliis ovato-lanceolatis, ſerratis, glabris. *Hall. helv. n.* 1096.

P. foliis ſerratis, pomis baſi productis. *Hort. cliff.* 190. *Hort. upſ.* 130. *Fl. ſuec.* 401, 436. *Roy. lugdb.* 266.

Sorbus (*Pyrus*) foliis ſerratis, fructu turbinato 5-loculari. *Crantz. auſtr. p.* 93.

α. Pyrus *Pyraſter.*

P. ſylveſtris. *Bauh. pin.* 439. *Dod. pempt.* 351.

β. Pyrus *falerna.*

P. Bergamotta gallis *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 44.

γ. Pyrus *pompejana.*

P. boni criſtiani. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 44.

δ. Pyrus *favonia.*

P. jeſu ſ. moſchatellina rubra. *Bauh. hiſt. p.* 1. 44.

ε. Pyrus *Volema.*

Pyra dorſalia eademque liberalia dicta. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 53.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 784.

Gemeine Birne. W.

Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Varietates hujus 80 *videndas in Milleri dictionario Hortulan.*

7. PYRUS *Pollveria.*

P. foliis ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus corymboſis. *Mant.* 244. *Hoffm. germ.* 173. *Roth. germ. I.* 215. *II.* 549.

Pyrus (*irregularis*) foliis ovatis acute ſerratis, floribus cymoſis. *Onomat. bot.* 7. *p.* 611. *Munchhauſ. hauſvat.* 5. *p.* 246. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 216. *Knoop. Pomolog.* 2. *p.* 38. *t.* 4. R.

P. pollvilleriana. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 59.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 786.

Hambutten-Birne. W.
Habitat in Germania. *L. B. de Munchh.* ♄ (v. v.)

Folia *ovata, ſerrata, ſubtus tomentoſa, etiam pagina ſuperiore praeſertim ſecundum coſtam pubeſcentia.* Petioli *tomentoſi.* Corymbus *elongatus, tomentoſus.* Floribus *numeroſiſſimis, P. communi multo minoribus.*

8. PYRUS *nivalis.*

P. foliis integerrimis, floribus corymboſis. *Lin. ſuppl.* 253.
Pyrus nivalis. *Iacq. auſt.* 2. *p.* 4. *t.* 107.
Schnee-Birne. W.
Habitat in Auſtriae *alpibus.* ♄ (v. ſ.)

Arbor *ramulis craſſiuſculis.* Folia *elliptica ſ. ovalia petiolata integerrima ſubtus ſericea albidaque.* Flores *terminales corymboſi.* Fructus *globoſus acerbiſſimus, ſed maturus putreſcens dulciſſimus.* Iacquin.

9. PYRUS *Malus.*

P. umbellis ſeſſilibus, foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis glabris, unguibus calyce brevioribus, ſtylis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 175. *Willd. arb.* 261.
P. foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Mat. med.* 127. *Mill. illuſtr. Pollich. pal. n.* 478. *Du Roi. harbk. p.* 222. *Scop. carn. n.* 599. *Hoffm. germ.* 173. *Roth. germ. I.* 215. *II.* 549.
P. foliis ovatis acuminatis, ſubtus hirſutis, petiolis florigeris breviſſimis. *Hall. helv. n.* 1097.
P. foliis ſerratis; pomis baſi concavis. *Hort. cliff.* 189. *Hort. upſ.* 130. *Fl. ſuec.* 402, 437. *Roy. lugdb.* 266.
Sorbus (*Malus*) foliis ſerratis, fructu ſphaerico quinqueloculari. *Crantz. auſtr. p.* 93.
Malus (*ſylveſtris*) foliis ovatis ſerratis, caule arboreo. *Mill. dict. n.* 1.

α. Pyrus M. *ſylveſtris.*
Malus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 443. *Dod. pempt.* 690. *Blackw. t.* 178.

β. Pyrus M. *paradiſiaca.*
Malus pumila, quae potius frutex quam arbor. *Bauh. pin.* 433.

γ. Pyrus Mal. *praſomila.*
Malus praſomila. *Bauh. pin.* 433.

. Pyrus M. *rubelliana.*

Malus ſativa, fructu ſanguinei coloris ex auſtero ſubdulci. *Tournef. inſt.* 635. *Blackw. t.* 141.

ε. Pyrus M. *ceſtiana.*

Mala curtipendula dicta. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 21.

ζ. Pyrus M. *cavillea.*

Mala ſativa, fructu magno intenſe rubente, violae odore. *Tournef. inſt.* 635.

η. Pyrus M. *epirotica.*

Poma orbiculata. *Ruell. ſtirp.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 787.

Apfel-Birne. W.

Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

*10. PYRUS *dioica.*

P. foliis ovalibus ſerratis, floribus ſolitariis dioicis, petalis linearibus longitudine calycis. *Willd. arb.* 263.*

P. foliis ovalibus ſerratis, floribus ſolitariis dioicis. *Willd. phytog. faſc.* 1. *p.* 8. *n.* 27. *Moench. weiſſenſt. p.* 87. *t.* 8.

Pyrus apetala. *Münchh. Hausv.* 5. *p.* 247.

Malus non florens, fructificans tamen. *Bauh. pin.* 435.

Grünblühende Birne. W.

Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Forte a praecedente orta. Folia *ſubtus pubeſcentia.* Pedunculi *uniflori in foliorum axillis ad ramorum apicem formant fere umbellam.* Petala *flaveſcenti-viridia linearia longitudine laciniarum calycis.* Stamina *nulla vidi.* Styli 5 *filiformes glabri.* Stigmata *clavata.* W.

*11. PYRUS *ſpectabilis.*

P. umbellis ſeſſilibus, foliis ovali-oblongis ſerratis laevibus, unguibus calyce longioribus, ſtylis baſi lanatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 175. *Willd. arb.* 263.*

Prächtige Birne. W.

Habitat in China. ♄ (v. v.)

*12. PYRUS *prunifolia.*

P. umbellis ſeſſilibus, pedunculis pubeſcentibus, ſtylis baſi lanatis, foliis ovatis acuminatis. *Willd. phytogr. faſc.* 1. *p.* 8. *n.* 26. *Willd. arb.* 264.*

Pyrus Malus β. *Ait. Kew.* 2. *p.* 175.

Crataegus ceraſi folio, floribus magnis. *Mill. ic.* 180. *t.* 269.

Pflaumenblättrige Birne. W.

Habitat in Sibiria? ♄ (v. v.)

13. PYRUS *baccata.*

P. foliis aequaliter ſerrulatis, pedunculis confertis, po-

mis baccatis, calycibus deciduis. *Ait. Kew.* 175. *Willd. arb.* 264.

P. foliis ſerratis, pedunculis confertis, pomis baccatis. *Mant.* 75. *Giſecke ic. faſc.* 1. *n.* 12. *Pall. it.* 3. *p.* 105.

P. foliis ſerratis, umbellis pedunculatis, calycibus deciduis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 23. *t.* 10. *

Crataegus cerafi foliis, floribus magnis. *Amm. ruth.* 274. *t.* 31.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 789.

Beerentragende Birne. W.

Habitat in Sibiria, Dauria *ad* Schilkam *fluvium* ♄ (v. v.)

Arbor *ramis laevibus.* Folia *Corni, ovata, argute ſerrata, utrinque laevia.* Petioli *longitudine folii, baſi annectentes* Stipulas 2, *lineari-lanceolatas.* Pedunculi 4, *filiformes, laeves, axillares, conferti, ſimpliciſſimi, uniflori, longitudine petiolorum.* Germen *inferum, globoſum, glabrum, parvum.* Petala 5, *ſeſſilia, ovalia, concava, alba, majuſcula.* Stamina 20, *piſtillis breviora; Antheris flavis.* Piſtilla 5, *corolla breviora.* Bacca *ſubrotunda, 5-locularis, rubra.* Semina *bina, calloſa.* Calyx *minutus, deciduus.*

Obſ. *Ad* Meſpilum *referrem ob baccas; cum vero Semina in quovis loculo 2. ſint: nec ſolitaria,* Pyri *ſpecies erit, vel nulla diſtinctio inter Pyrum et Meſpilum.* Fructus *figura, conſiſtentia, colore, ſapore Mali aciduli, ſed minutus. Sero matureſcit.* H. U.

14. PYRUS *coronaria.*

P. foliis cordatis inciſo-ſerratis angulatis glabris, pedunculis corymboſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 176. *Willd. arb.* 265. *

P. foliis ſerrato-angulatis, umbellis pedunculatis. *Sp. pl.* 687. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 229.

Pyrus foliis ſerrato-anguloſis. *Sp. pl.* 1. *p.* 480. *Kalm. it.* 3. *p.* 10.

Malus coronaria. *Mill. dict. n.* 2.

Malus ſylveſtris, floribus odoratis. *Gron. virg.* 55. *Du Ham. arb.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 790.

Wohlriechende Birne. W.

Habitat in Virginia. ♄ (v. v.)

Umbella *pedunculata.* Pedunculi *glabri.* Calyces *glabri, interne tomentoſi.* Folia *Mali, ſed magis glabra et argutius ſerrata.*

*15. **PYRUS** *anguſtifolia.*

P. foliis lanceolato-oblongis nitidis dentato-ſerratis baſi attenuatis integris, pedunculis corymboſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 176.

Pyrus coronaria. *Wangenh. amer.* 61. *t.* 21. *f.* 47.

Schmalblättrige Birne. W.

Habitat in America *boreali.* ♄

*16. **PYRUS** *japonica.*

P. foliis cuneatis crenatis glabris, floribus ſolitariis. *Thunb. jap.* 207. *

Buke. *Kaempf. amoen.* 844.

Japaniſche Birne. W.

Habitat in Japonia. ♄

17. **PYRUS** *Cydonia.*

P. foliis integerrimis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 160. *Mat. med.* 127. *Roy. lugdb.* 267. *Kalm. it.* 3. *p.* 107. *Iacq. auſtr. t.* 342. *Ludw. ect. t.* 56. *Kniph. cent.* 6. *n.* 75. *Hoffm germ.* 173. *Roth. germ. I.* 215. *II.* 550. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 231. *Willd. arb.* 266. *

Sorbus (*Cydonia*) foliis rotundis integerrimis, fructu lanato 5-loculari. *Crantz. auſt. p.* 93.

Malus cotonea ſylveſtris. *Bauh. pin.* 435.

β. Malus cotonea major. *Bauh. pin* 434.

γ. Malus cotonea minor. *Bauh. pin.* 434.

Cotonea et Cydonia. *Lob. hiſt.* 580.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 791.

Quitten-Birne. W.

Habiat ad ripas petroſas Danubii, *ad ſepes* Germaniae *quaſi ſponte.* ♄ (v. v.)

Calyx *patens, ſerratus, longitudine corollae.*

Poma *Heſperidum antiquis.*

Variat fructu *oblongo, globoſo et pyriformi, ut et* magnitudine *foliorum. Haec et praecedens ſpecies conveniunt* loculamentis *fructus polyſpermis, ſed non genere differunt.* W.

18. **PYRUS** *ſalicifolia.*

P. foliis lineari-lanceolatis canis ſubtus albo-tomentoſis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 255. *Ait. Kew.* 2. *p.* 176. *Pall. itin.* 3. *p.* 734. *t. N. f.* 3. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 20. *t.* 9. *

P. ſylveſtris orientalis, folio oblongo incano. *Tournef. cor.* 43.

Weidenblättrige Birne. W.

Habitat in Sibiria *inter fluvios* Terec *et* Cumam, *in promontario* Caucaſi *inque* Armenia. ♄

Arbor *primo vere florens.* Fructus *habet pyriformes turbinatos parvos.*

19. PYRUS *Aria.*

P. foliis ſubrotundo-ovatis inciſo-dentatis ſubtus albido-tomentoſis, floribus corymboſis. *Willd. arb.* 267. *

Pyrus (*Aria*) inermis, foliis ovalibus duplicato-ſerratis tomentoſis, corymbis multifloris planis, pomis ſubgloboſis. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 20.

Crataegus (*Aria*) foliis ovatis inciſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Sp. pl.* 681. *Hort. cliff.* 187. *Fl. ſuec.* 398, 433. *Virid. cliff.* 43. *Mat. med.* 126. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv. monſp.* 306. *Fl. dan. t.* 302. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 190. *Pollich. palat.* 470. *Hoffm. germ.* 171. *Roth. germ. I.* 212. *II.* 542.

Meſpilus foliis ovatis ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Hall. helv. n.* 1089.

Meſpilus Aria. *Scop. carn. n.* 591.

Sorbus (*Aria*) foliis ovalibus ſerratis, facie ſplendentibus dorſo tomentoſis, fructu biloculari. *Crantz. auſt.* 1. *faſc.* 1. *t.* 2. *f.* 2.

Alni effigie lanato folio major. *Bauh. pin.* 452.

Aria. *Dalech. hiſt.* 202.

Sorbus alpina. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 65.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 759.

Mehl Birne. W.

Habitat in nemoribus Europae. ♄ (v. v.)

20. PYRUS *intermedia.*

P. foliis ovato-lanceolatis inciſo-lobatis dentatis ſubtus niveo-tomentoſis, floribus corymboſis. *Willd. arb.* 268. *

Pyrus (*intermedia*) inermis, foliis ovalibus inciſo-lobatis ſerratis, ſubtus tomentoſis, corymbis multifloris planis, pomis ſubgloboſis. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 20.

Crataegus Aria β. *Sp. pl.* 681.

Crataegus inermis, foliis ellipticis ſerratis transverſaliter ſinuatis, ſubtus villoſis. *Lin. lapp.* 199.

Oxel-Birne. W.

Habitat in Suecia, Ruſſia. ♄ (v. v.)

Toto habitu a praecedente diverſa. W.

21. PYRUS *torminalis.*

P. foliis cordato-ovatis laciniato-lobatis ſerratis, lobis

infimis divaricatis, floribus corymboſis. *Willd. arb.* 268.

Pyrus (*torminalis*) foliis ſubcordatis ſeptemlobatis, lobis infimis divaricatis. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 92.

Crataegus (*torminalis*) foliis cordatis ſeptangulis, lobis infimis divaricatis. *Sp. pl.* 681. *Mill. dict. n.* 2. *Fl. dan. t.* 798. *Weig. rug. n.* 312. *Pollich. palat. n.* 471. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 187. *Hoffm. germ.* 171. *Roth. germ. I.* 213. *II.* 543. *Iacq. auſt.* 5. *p.* 21. *t.* 443.

Crataegus foliis cordatis acutis, lacinulis acutis ſerratis. *Hort. cliff.* 187. *Roy. lugdb.* 271. *Sauv. monſp.* 286.

Meſpilus foliis ſerratis ſeptilobis, lobis primis divergentibus. *Hall. helv. n.* 1088.

Sorbus (*torminalis*) folio ſeptangulo, fructu ovato-biloculari. *Crantz. auſt. p.* 85. *n.* 2.

Crataegus foliis laciniatis *Tournef. inſt.* 633. *Du Ham. arb.* 1. *t.* 79.

Meſpilus apii folio ſylveſtris non ſpinoſa, ſeu Sorbus torminalis. *Bauh. pin.* 454. *Raj. hiſt.* 1457.

Sorbus torminalis et Crataegus Theophraſti. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 63.

Sorbus torminalis. *Cam. epit.* 162. *Edw. av.* 212. *Blackw. t.* 173.

Sorbus torminalis Plinii. *Lob. ic.* 2. *p.* 100.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 1. *p.* 761.

Elzbeer-Birne. W.

Habitat in Germaniae, Auſtriae, Hungariae, Helvetiae, Angliae, Galliae *et* Orientis *ſylvis.* ♄ (v. v.)

*22. PYRUS *hybrida.*

P. foliis ſubtus pubeſcentibus pinnatis, pinna terminali maxima, pinnatifidis, ſimplicibusque, floribus corymboſis. *Willd. arb.* 269. *

Pyrus (*hybrida*) foliis pinnatis, pinna extima maxima ſubtus lanatis, floribus corymboſis. *Moench. weiſſenſt.* 90. *t.* 6.

Baſtard-Birne. W.

Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Planta *hybrida matre P. arbutifolia et parte Sorbo aucuparia.* Folia *ſunt pinnata, pinnatifida et ſimplicia ſ. indiviſa, coſta media ſuperne glandulis eſt inſtructa.* W.

993. TETRAGONIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 859.

Cal. 3-ſ. 5-partitus. *Petala* o. *Drupa* infera, nuce 3-ſ. 8-loculari.

1. TETRAGONIA *fruticoſa.*

T. fruticoſa, foliis linearibus, fructibus alatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 176.

T. foliis linearibus. *Sp. pl.* 687. *Roy. lugdb.* 250. *Mill. dict. n.* 1. *et ic. t.* 263. *f.* 2. *Hort. cliff.* 126. *Hort. upſ.* 126. *Kniph. cent.* 4. *n.* 87.

T. Tetragonocarpus africana rutilans, foliis longis et anguſtis. *Comm. hort.* 2. *p.* 205. *t.* 103.

Evonymo affinis africana, portulacae folio. *Seb. theſ.* 2. *p.* 13. *t.* 11. *f.* 8.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 655.

Strauchartige Vierecksfrucht. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Alae *foliorum foliolis plurimis ſ. ramorum rudimentis.* Flores *in racemum terminalem digeſti ſ. ſolitarii.*

*2. TETRAGONIA *decumbens.*

T. fruticoſa pruinoſa, foliis obovatis, fructibus alatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 177.

Tetragonia (*decumbens*) foliis ovatis integerrimis, caule fruticoſo decumbente. *Mill. dict. n.* 3. *Ic.* 176. *t.* 263. *f.* 1.

Liegende Vierecksfrucht. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

3. TETRAGONIA *herbacea.*

T. herbacea laevis, foliis ovatis petiolatis, fructibus alatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 177.

T. foliis ovatis. *Sp. pl.* 687. *Roy. lugdb.* 450.

Tetragonocarpos africana, radice magna craſſa et carnoſa. *Comm. hort.* 2. *p.* 203. *t.* 102.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 656.

Krautartige Vierecksfrucht. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃.

Alae *ſaepius ſine ramorum rudimentis.* Pedunculi 3, *uniflori, ex alis foliorum.* Folia *obovato-lanceolata.*

4. TETRAGONIA *hirſuta.*

T. herbacea hirſuta procumbens, foliis ovatis villoſis, floribus axillaribus ternis ſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 258.

Haarige Viereckſfrucht. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. *Thunberg.*

5. TETRAGONIA *ſpicata.*

T. glabra herbacea erecta, foliis inferioribus ovatis, ſupremis lanceolatis glabris, floribus racemoſis. *Lin. ſuppl.* 258.
Aehrenblütige Viereckſfrucht. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. *Thunberg.*

*6. TETRAGONIA *echinata.*

T. herbacea, foliis rhombeo-ovatis, fructibus echinatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 177.
Stachliche Viereckſfrucht. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ☉ ♂ (v. v.)

Caulis *herbaceus prope radicem diviſus in* Ramos *diffuſos, petiolis decurrentibus angulatos, vix pedales.* Folia *ſucculenta patentia uncialia.* Petioli *foliis dimidio breviores.* Pedunculi *axillares ſolitarii filiformes, papulis nitidis tecti purpurei breviſſimi.* Flores *penduli, papulis cryſtallinis pruinoſi.* Calyx 3-ſ. 4-*phyllus, intus e viridi-flavicans.* Stamina *ſaepius* 3 *raro* 4. Germen *ſubtus planum triquetrum, anguli proceſſibus conicis pluribus echinati.* Styli *tres.* Nux *trilocularis.*

*7. TETRAGONIA *expanſa.*

T. herbacea, foliis ovato-rhombeis, fructibus quadricornibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 178.
T. (*expanſa*) herbacea, ramis expanſis elongatis, foliis parabolicis, floribus plerumque ſolitariis, fructu cornuto. *Murr. in comment. goett.* 1783. *p.* 13. *t.* 5.* *Scop. delic. inſub.* 1. *p.* 32. *t.* 14. *Thunb. Act. ſoc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
T. (*halimifolia*) herbacea papuloſa, foliis elliptico-rhombeis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris ſubſolitariis, fructu cornuto. *Forſt. prod. n.* 223. *Forſt. pl. eſc. p.* 67. *n.* 37.*
T. (*halimifolia*) herbacea divaricata, foliis carnoſis alternis petiolatis ſubcordatis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Roth. Abhand. p.* 48. *t.* 8.*
T. (*japonica*) foliis ſubcordatis ovatis punctatis, floribus axillaribus ſolitariis. *Thunb. jap.* 208.*
Demidovia tetragonoides. *Pall. hort. demidor. p.* 150. *tab.* 1.
Ausgebreitete Viereckſfrucht. W.

Habitat in Nova Zeelandia, *inſulis* Amicorum *et* Japonia. ⊙ (v. v.)

*8. TETRAGONIA *cryſtallina.*
T. herbacea pruinoſa, foliis ovatis ſeſſilibus, fructibus, inermibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 178.
T. (*cryſtallina*) foliis ovatis cryſtallino-papilloſis, floribus axillaribus. *l'Herit. ſtirp.* 1. *p.* 81. *t.* 39. *
Cryſtallartige Vierecksfrucht. W.
Habitat in Peru. ⊙

994. MESEMBRYANTHEMUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 860.

Cal. 5-fidus. *Petala* numeroſa, linearia, baſi cohaerentia. *Capſ.* carnoſa, infera, polyſperma.

* *Acaulia.*

1. MESEMBRYANTHEMUM *criniflorum.*
M. acaule, foliis petiolatis ovatis, ſcapis unifloris, corolla pentapetala. W.
M. foliis ovatis, ſcapis unifloris. *Lin. ſuppl.* 259.
Haarblütige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. *D. Montin.*

Planta *magnitudine Bellidis perennis.* Folia *ovato-oblonga petiolata, punctis cryſtallino-papilloſis.* Scapus *pollicaris uniflorus.* Calyx *profunde quinquefidus, laciniis oblongis obtuſiſſimis.* Petala 5 *oblonga pedicellata calyce longiora alba.* Stamina *ſetacea alba longiſſima.*

*2. MESEMBRYANTHEMUM *ſpathulatum.*
M. acaule, foliis petiolatis ſpathulatis papuloſis, ſcapo uniflora. W.
Meſembryanthemum ſpathulatum. *Thunb.*
Spathelblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙ (v. ſ.)

Planta *parva uncialis.* Radix *ſimplex filiformis.* Folia *ſemiuncialia plana lanceolata ſpathulata obtuſa petiolata, utrinque papuloſa.* Scapus *papuloſus teres filiformis longitudine foliorum.* Flos *magnitudine Bellidis albus.* Calyx *campanulatus 5-fidus laciniis oblongis obtuſis, unica majore margine membranaceo.* Petala

numeroſa linearia leviſſime emarginata calyce duplo longiora. Filamenta *calyce breviora.* W.

*3. MESEMBRYANTHEMUM *teſticulare.*

M. acaule foliis quatuor decuſſatis inferne convexis ſuperne planis. W.

M. foliis quatuor decuſſatis ſupra planis. *Ait. Kew.* 2. p. 181. *Haworth. Meſemb.* 133. *n.* 17. *

Hodenförmige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *alba.* W.

4. MESEMBRYANTHEMUM *linguiforme.*

M. acaule, foliis linguiformibus altero margine craſſioribus impunctatis, flore ſeſſili, calyce laevi, petalis emarginatis. W.

M. acaule, foliis linguiformibus altero margine craſſioribus impunctatis. *Sp. pl.* 699. *Hort. cliff.* 219. *n.* 8. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 282. *Mill. dict. n.* 44. *Knorr. del.* 1. *t.* 5. *G. b. n.* 2.

M. (*ſcalpratum*) foliis ſcalpratiformibus latiſſimis, altero margine craſſioribus, baſi interiore cartilagineo-gibboſis calycibus glaberrimis, floribus maximis ſeſſilibus, petalis apice crenulatis. *Haworth Meſemb.* 187. *n.* 47. *

M. folio ſcalprato. *Dill. elth.* 235. *t.* 183. *f.* 224. α.

Ficoides afra acaulos, foliis aloes latiſſimis craſſiſſimis lucidis, flore aureo amplo ſine pedunculo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 292.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 127.

Zungenblättrige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

Folia *uno latere emarginata.* Flores *lutei.* W.

*5. MESEMBRYANTHEMUM *latum.*

M. acaule, foliis linguiformibus obtuſiſſimis altero margine craſſioribus impunctatis, flore ſubſeſſili, petalis acutis. W.

M. (*latum*) foliis linguiformibus breviuſculis latis aequalibus, floribus ſubſeſſilibus. *Haworth Meſemb.* 186. *n.* 46.

Meſembryanthemum linguiforme. β. *Sp. pl.* 699.

M. linguiformi folio latiore. *Dill. elth.* 236. *t.* 184. *f.* 224. *Knorr. del. t. G.* 7. *n.* 2.

Ficoides afra acaulos, foliis latiſſimis craſſiſſimis lucidis conjugatis, flore aureo amplo ſine pedunculo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 292.

Breitblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Aetate ſub cauleſcens evadit. Folia *obtuſiſſima.* Flores *lutei.* W.

*6. MESEMBRYANTHEMUM *obliquum.* W.
M. acaule, foliis linguiformibus apice oblique acutis, coſta laciniarum calycis carinata ciliato-pubeſcente, pedunculo floris longitudine, petalis acutis. W.
M. (*linguiforme*) foliis linguiformibus latis obtuſis, junioribus anguſtis brevioribus, floribus breviſſime pedunculatis, calycibus laciniis ſubtuberculatis carinatis, carinis ciliato-pubeſcentibus. *Haworth Meſembr.* 182. *n.* 45.*
Meſembryanthemum linguiforme. *γ. Sp. pl.* 699.
M. folio linguiformi anguſtiori. *Dill. elth.* 238. *t.* 185. *f.* 226.
Ficoides afra acaulos, foliis latiſſimis craſſiſſimis lucidis conjugatis brevioribus, flore aureo amplo pedunculo brevi. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 292.
Schiefblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Flores lutei. W.

*7. MESEMBRYANTHEMUM *longum.*
M. acaule, foliis linguiformibus apice oblique acutis, coſta laciniarum calycis carinata glabra, pedunculis flore duplo longioribus, petalis acutis. W.
M. (*longum*) foliis linguiformibus longiſſimis ſubaequalibus, pedunculis elongatis. *Haworth Meſembr.* 177. *n.* 43.*
Meſembryanthemum. *δ. Sp. pl.* 699.
M. folio linguaeformi longiore. *Dill. elth.* 238. *t.* 187. *f.* 227. *Knorr. del* 1. *t. G.* 7. *n.* 1.
Langblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Calycis *laciniae carinatae glabrae absque ciliis.* Petala *flava.* W.

8. MESEMBRYANTHEMUM *roſtratum.*
M. acaule, foliis ſemicylindricis connatis externe tuberculatis. *Sp. pl.* 696. *Hort. cliff.* 219. *n.* 23. *Roy. lugdb.* 285. *Mill. dict. n.* 40. *Kniph. cent.* 10. *n.* 61. *Haworth Meſembr.* 152. *n.* 29.*
M. roſtrum ardeae referens. *Dill. elth.* 240. *t.* 186. *f.* 229.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 124.
Schnabelförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Flores *flavi*. W.

*9. MESEMBRYANTHEMUM *compactum*.
M. acaule, foliis connatis punctatis ſemiteretibus apice triquetris ſubreflexis acutis, floribus ſeſſilibus, calyce ſubcylindraceo ſexfido. *Ait. Kew.* 2. *p.* 191.
Dichtblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Flores *flavi*.

10. MESEMBRYANTHEMUM *caninum*.
M. acaule, foliis impunctatis oblongis apice triquetris et dentatis, dentibus obtuſis, floribus pedunculatis, pedunculis foliis multo longioribus. W.
M. (*caninum*) ſubacaule, foliis opacis apice triquetris, floribus pedunculatis, pedunculis longiſſimis baſi bracteatis. *Haworth Meſemb. p.* 159. *n.* 34. *
Meſembryanthemum ringens α caninum. *Sp. pl.* 698.
M. ſubacaule, foliis ciliato-dentatis. *Hort. cliff.* 218. *Mill. dict. n.* 39. *ic. t.* 77. *f.* 2.
M. rictum caninum referens. *Dill. elth.* 241. *t.* 188. *f.* 231.
Ficoides capenſis humilis, folio triangulo prope ſummitatem dentato, flore luteo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 8. *t.* 17.
Hunderachenartige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

11. MESEMBRYANTHEMUM *felinum*.
M. acaule, foliis punctatis oblongis ſubtus convexis, apice dentatis, dentibus acuminatis, flore ſeſſili. W.
M. (*felinum*) acaule, foliis ſubtus ſemi-cylindricis ciliatis, ciliis longis. *Haworth Meſembr. p.* 161. *n.* 35. *
M. (*ringens*) ſubacaule, foliis ciliato-dentatis punctatis. *Sp. pl.* 698. *Roy. lugdb.* 293.
Meſembryanthemum ringens β. felinum. *Sp. pl.* 298.
M. rictum felinum repraeſentans. *Dill. elth.* 240. *t.* 87. *f.* 220. *Knorr. del.* 1. *t. G. b. n.* 1.
Ficoides afra, folio triangulari enſiformi craſſo brevi ad margines laterales multis majoribus ſpinis aculeato. *Mart. cent.* 30. *t.* 30.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 125.
Katzenrachenförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

Diverſiſſima a praecedente: foliis *punctatis*, *ſubtus convexis*, *nec apice triquetris*, dentibus *ad apicem acuminatis longioribus*, floreque *ſeſſili*, *qui et luteus eſt ut in praecedente*. W.

*12. MESEMBRYANTHEMUM *tigrinum*.

M. acaule, foliis maculatis oblongis ſubtus convexis apice ciliato-dentatis, flore ſeſſili. W.

M. (*tigrinum*) acaule foliis maculatis ciliatisque, ciliis longiſſimis. *Haworth Meſembr. p.* 164. *n.* 36.*

Getiegerte Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *magna lutea*. W.

*12. MESEMBRYANTHEMUM *murinum*.

M. ſubacaule, foliis punctatis oblongis baſi ſubtus convexis, apice triquetris, trifariam dentatis, flore ſubſeſſili. W.

M. (*murinum*) ſubacaule, foliis punctatis baſi ſemicylindricis attenuatis, apice triquetrisque trifariam denticulatis, floribus ſubſeſſilibus. *Haworth Meſembr. p.* 165. *n.* 37.

Mauſezahnartige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Corolla *parva lutea*. W.

14. MESEMBRYANTHEMUM *albidum*.

M. acaule, foliis triquetris integerrimis. *Sp. pl.* 699. *Mill. dict. n.* 45. *Haworth Meſembr. p.* 156. *n.* 32. *

M. foliis robuſtis albicantibus. *Dill. elth.* 243. *t.* 189. *f.* 232.

Ficoides africana, folio triangulari enſiformi glauco craſſo, flore amplo aureo. *Bradl. ſucc.* 5. *p.* 20. *t.* 43.

Ficoides africanum triangulari robuſtiſſimo folio. *Herm. prodr.* 172.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 126.

Weiſsblättrige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

15. MESEMBRYANTHEMUM *bellidiflorum*.

M. acaule, foliis triquetris linearibus impunctatis apice trifariam dentatis. *Sp. pl.* 690. *Hort. cliff.* 218. *n.* 13. *Roy. lugdb.* 283. *Mill. dict. n.* 9. *Knorr. del.* 1. *tab. n.* 1. *G. a. Haworth Meſembr. p.* 143. *n.* 27. *

Meſembryanthemum bellidiflorum. *Dill. elth.* 244. *t.* 189. *f.* 233.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 106.

[redacted]




IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

6″

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

Maſsliebartige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Variat corollis purpureis, rubicundis et albis. W.

* * *Subacaulia, caule breviſſimo.*

*16. MESEMBRYANTHEMUM *limpidum.*
M. ſubacaule, foliis ſcabrido-punctatis obovato-lanceolatis planis, pedunculis fructiferis reflexis, calycinis laciniis inaequalibus ſpathulatis. W.
M. (*limpidum*) foliis oppoſitis ſpathulatis obtuſis ſcabridis, papulis oblongis, foliolis calycinis oblongis obtuſis medio coarctatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 183. *Haworth Meſembr. p.* 116. *n.* 3.
Meſembryanthemum cuneifolium. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 488. *Collect.* 2. *p.* 319. *
Keilblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙
Corolla *magna rubicunda.* W.

17. MESEMBRYANTHEMUM *Tripolium.*
M. ſubcauleſcens foliis impunctatis oblongis planis, calycibus pentagonis, laciniis calycinis ovatis aequalibus. W.
M. foliis alternis lanceolatis planis impunctatis, caulibus laxis ſimplicibus, calycibus pentagonis. *Sp. pl.* 690. *Hort. cliff.* 217. *n.* 11. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 283. *Mill. dict. n.* 8. *Kniph. cent.* 8. *n.* 70. *Haworth Meſembr. p.* 122. *n.* 12. *
M. tripolii folio, flore argenteo. *Dill. elth.* 230. *t.* 179. *f.* 220.
Ficoides africanum procumbens tripolii ſucculento folio, flore candido. *Bradl. ſucc.* 5. *p.* 14. *t.* 47.
Ficoides africanum, Meſembryanthemum ſ. Ficus aizoides major procumbens, tripolii folio magis ſucculento denticulis fimbriato. *Pluk. mant.* 77. *t.* 329. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 105.
Aſterblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂
Corolla *mediocris alba.* W.

18. MESEMBRYANTHEMUM *dolabriforme.*
M. ſubacaule, foliis punctatis triquetro-carinatis, carina apice dilatata biloba. W.
M. acaule, foliis dolabriformibus punctatis. *Sp. pl.* 699. *Hort. cliff.* 219. *n.* 19. *Roy. lugdb.* 284. *Mill. dict. n.* 41. *Kniph. cent.* 1. *n.* 51. *Curt. mag.* 32.

M. (*dolabriforme*) foliis dolabriformibus punctatis, caule erecto. *Haworth Meſembr. p.* 366. *n.* 38.
M. folio dolabriformi. *Dill. elth.* 248. *t.* 191. *f.* 237.
Ficoides capenſis humilis, foliis cornu cervi referentibus, petalis luteis, noctiflora. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 11. *t.* 10.
β. M. (*dolabriformoides*) foliis ſubdolabriformibus punctatis, caule deflexo. *Haworth Meſembr. p.* 168. *n.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 125.
Hobelblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

19. MESEMBRYANTHEMUM *difforme.*
M. ſubacaule, foliis punctatis lanceolatis ſemiteretibus margine difforme cordatis, baſi connatis. W.
M. acaule, foliis difformibus punctatis connatis. *Sp. pl.* 699. *Roy. lugdb.* 287. *Mill. dict. n.* 42. *et ic. t.* 176. *f.* 2. *Haworth Meſembr. p.* 169. *n.* 40.
M. foliis difformibus flore luteo. *Dill. elth.* 252. *t.* 194. *f.* 241. 242.
Ficoides Meſembryanthemum craſſimo et valde ſucculento folio nigris punctis notato. *Pluk. alm.* 148. *t.* 325. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 126.
Ungeſtaltete Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

20. MESEMBRYANTHEMUM *calamiforme.*
M. ſubacaule, foliis impunctatis adſcendentibus ſubteretibus acutis, baſi connatis, floribus octogynis pedunculatis. W.
M. acaule, foliis ſubteretibus adſcendentibus impunctatis connatis, floribus octogynis. *Sp. pl.* 690. *Mill. dict. n.* 7. *et ic. t.* 176. *Haworth Meſembr. p.* 140. *n.* 24.*
M. calamiforme. *Dill. elth.* 229. *t.* 186. *f.* 228.
Ficoides capenſis humilis, cepaeae folio, flore ſtramineo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 10. *f.* 19.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 105.
Federkielartige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Folia quamvis baſi connata recta, tamen ſaepe horizontaliter patentia, apice recurva, ſuperficie punctato-ſcabrida.

*21. MESEMBRYANTHEMUM *digitatum.*
M. ſubacaule, foliis alternis teretibus obtuſis, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 181.

Fingerförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *lutea.* W.

* * * *Cauleſcentia aphylla.*

*22. MESEMBRYANTHEMUM *minimum.*
M. caule erecto clavato aphyllo maculato, apice pubeſcente, flore pedunculato. W.
M. (*minimum*) planta carnoſa obconica truncata maculata minima, maculis confluentibus. *Haworth Meſembr. p.* 126. *n.* 14.*
Kleinſte Zaſerblume. W.
Habitat - - - - ♄
Flos *luteus breve pedunculatus.* W.

* * * * *Cauleſcentia foliis planis.*

23. MESEMBRYANTHEMUM *pinnatifidum.*
M. foliis planis oblongis pinnatifidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 193, *Curt. mag.* 67.
M. foliis pinnatifidis. *Lin. ſuppl.* 260. *Haworth Meſembr. p.* 112. *n.* 1.*
Gefiederte Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b, ſpei. ⊙ (v. v.)
Caulis *herbaceus dichotomus craſſitie fili groſſioris depreſſus ſanguineus.* Folia *oppoſita oblonga lyrata ſ. pinnatifida.* Lobi laterales *utrinque tres obtuſi, ſinubus patulis obtuſis, non coſtam attingentibus.* Lobus terminalis *impar major acutior.* Baſis *foliorum hinc dilatata, tanquam orta e ſtipula lata.* Flores *axillares ramorum ſolitarii pedunculati parvi flavi.* Pedunculus *deflexus folio brevior.* Petala *lanceolata.* Fructus *turbinatus pentagonus, vertice plano articulato tamquam quinquevalvi. Tota planta adpreſſa micis veſicularibus, verſus autumnum tota rubra. Planta pulchra et in hoc genere valde ſingularis.*

24. MESEMBRYANTHEMUM *cordifolium.*
M. foliis oppoſitis petiolatis cordatis, calycibus quadrifidis, caule tereti. *Ait. Kew.* 2. *p.* 182. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 487. *Collect.* 2. *p.* 294.* *Smith. ſpicil. bot.* 1. *p.* 5. *t.* 6.*
M. foliis cordatis obtuſis, caulibus proſtratis. *Lin. ſuppl.* 260. *Gloxin. obſ. bot. p.* 22. *t.* 1. *f. a. Haworth Meſembr. p.* 192. *n.* 49.*

Herzblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Caules *herbacei proſtrati pedales, utrinque ſulco exarati.* Folia *oppoſita, oppoſitionibus remotis, petiolata cordata obtuſa pollicaria.* Flores *laterales alterni ſolitarii pedicellati longitudine foliorum purpurei.* Germina *majuſcula.* Calyx *foliolis oppoſitis, majoribus ovatis, reliquis minoribus.*

25. MESEMBRYANTHEMUM *cryſtallinum.*

M. foliis alternis ovatis papuloſis, floribus ſeſſilibus, calycibus late ovatis acutis retuſis. *Lin. ſuppl.* 259. *Haworth Meſembr. p.* 113. *n.* 2. *

M. foliis alternis ovatis papuloſis undulatis. *Sp. pl.* 688. *Hort. cliff.* 216. *n.* 1. *Hort. upſ.* 127. *Roy. lugdb.* 281. *Gouan. hort.* 248. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 4. *n.* 50.

M. cryſtallinum plantaginis folio undulato. *Dill. elth.* 231. *t.* 180. *f.* 221.

Ficoides africana folio plantaginis undulato micis argenteis adſperſo. *Bradl. ſucc.* 5. *t.* 14. *f.* 48.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 110.

Eisartige Zaſerblume. W.

Habitat in Graecia *prope* Athenas. ☉ (v. v.)

Caulis *primum erectus, digitalis foliis oppoſitis.* Rami *horizontales longiſſimi oppoſiti proſtrati alterne ramoſi.* Foliis *alternis.*

Calyx *formatur ſolummodo e tribus laciniis, reliquae duae tam parvae, ut ab his tribus latis excludantur.* Lin. ſuppl.

Corolla *alba.* W.

*26. MESEMBRYANTHEMUM *humifuſum.*

M. foliis amplexicaulibus ſpathulatis carinatis, papulis conicis ſcabris, petalis mutiſſimis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 179.

Geſtreckte Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Corolla *alba.* W.

27. MESEMBRYANTHEMUM *papuloſum.*

M. foliis oppoſitis diſtinctis ovato-ſpathulatis, papulis ſubgloboſis, calycibus angulatis quinquefidis, ramis angulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 182.

M. foliis oppoſitis ſpathulato-oblongis papuloſis, floribus pedunculatis, calycibus linearibus. *Lin. ſuppl.* 259.

Meſembryanthemum Aitonis. *Iacq. hort.* 3. *p.* 8. *t.* 7.
Blaſige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂

Caules *et* Rami *depreſſi teretes papuloſi, ut omnes plantae partes una cum calyce, apice dichotomi.* Folia *oppoſita amplexicaulia fere connata ſpathulato-oblonga obtuſiuſcula.* Flores *ex dichotomiis ſolitarii erecti pedunculati, pedunculis filiformibus deflexis.* Calyx *laciniis inaequalibus lineari-ſubulatis.* Corolla *vix calyce longior lutea.* Capſulae *depreſſae nudae.*

Differt a M. cryſtallino, cui papulis cryſtallinis ſimillimum, caule *graciliore,* foliis *oppoſitis anguſtiorbus,* laciniis *calycinis ſubulatis nec ovatis latiſſimis,* corolla *multo minori lutea, quae in M. cryſtallino magna alba.*

Corolla *eſt rubicunda ſecundum Aitonium.* W.

*28. MESEMBRYANTHEMUM *ſeſſiliflorum.*

M. foliis planis ſpathulatis caulibusque papuloſis, ramis divaricatis, floribus ſeſſilibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 193.
Stiellosblütige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙

Corolla *lutea.* W.

*29. MESEMBRYANTHEMUM *glabrum.*

M. foliis amplexicaulibus diſtinctis ſpathulatis glaberrimis, pedunculis longitudine foliorum, calycibus hemiſphaericis, *Ait. Kew.* 2. *p.* 193.
Glattblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙

Corolla *lutea.* W.

*30. MESEMBRYANTHEMUM *Helianthoides.*

M. foliis ſpathulatis planis laevibus, pedunculis longiſſimis, calycibus baſi planis angulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 193.
Sonnenblumenartige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙

Corolla *lutea.* W.

31. MESEMBRYANTHEMUM *pomeridianum.*

M. foliis planiuſculis lato-lanceolatis laevibus ſubciliatis diſtinctis, caule pedunculis germinibusque hirtis. *Sp. pl.* 698. *Lin. dec.* 23. *t.* 13. * *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 489.
Ficoides ſ. Ficus aizoides africana major, flore flavo, folio plano latiore. *Herm. lugdb.* 25. *Seb. muſ.* 1. *p.* 29. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 122.

Ranunkelblütige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙

Nova e ſeminibus enata primo anno 1762, *adolevit et floruit.* Caulis *ſubdichotomus herbaceus palmaris teres, pilis patulis confertis albis.* Folia *ſpathulata ſ. lanceolata, petiolo baſi dilatato, diſtincta laevia ſubcarnoſa, margine imprimis petiolorum ſubciliato internodiis longiora patentia, prima terna, reliqua oppoſita.* Pedunculus *terminalis caule longior hirtus uti caulis.* Floris *calyx reliquis major, ſubquinquepartitus, baſi albo-villoſus, laciniis lanceolato-foliaceis corolla longioribus patulis, baſin verſus interius fuſco-membranaceis.* Corolla *ſulphurea multiplex, petalis linearibus acutis numeroſiſſimis, intimis ſetaceis umbilicum floris obtegentibus inſtar cancelli.* Stamina *lutea.* Styli 12 *totidemque fructus loculamenta.* Rami *e ſingulis alis, primo ſimiles, unde dichotomia planta, ſed debilis. Floret horis pomeridianis ab* 1-6 *niſi pluvia moneat corollam citius claudi, aut flos aetate provectior diutius expandatur.*

*32. MESEMBRYANTHEMUM *pallens.*

M. foliis oppoſitis amplexicaulibus diſtinctis oblongo-lanceolatis acutis obtuſe carinatis, papulis minutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 182. *Haworth Meſembr. p.* 197. *n.* 52.

Rinnenblättrige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Corolla *alba.* W.

33. MESEMBRYANTHEMUM *expanſum.*

M. foliis ovato-lanceolatis diſtinctis oppoſitis alternisve remotis, caule divaricato laxo procumbente. W.

M. foliis planiuſculis lanceolatis impunctatis patentibus diſtinctis, oppoſitis alternisque remotis. *Sp. pl.* 697. *Mill. dict. n.* 36. *Knorr. del.* 2. *t. M.* 3. *Haworth Meſembr. p.* 195. *n.* 50.

M. tortuoſum, foliis ſempervivi expanſis. *Dill elth.* 234. *t.* 182. *f.* 223.

Ficoides capenſis folio lato acuto, flore albo intus luteo. *Pet. gaz. t.* 78. *f.* 10.

Ficoides africana procumbens, foliis planis conjugatis lucidis. *Bradl. ſucc.* 5. *p.* 7. *t.* 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 104.

Ausgebreitete Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Flores *pentagyni.* Corolla *alba.* W.

34. MESEMBRYANTHEMUM *tortuoſum.*

M. foliis oblongo-ovatis connatis ſubpapilloſis confertis, calycibus triphyllis bicornibus, caule divaricato laxo procumbente. W.

M. foliis planiuſculis oblongo-ovatis ſubpapilloſis confertis connatis, calycibus triphyllis bicornibus. *Sp. pl.* 697. *Mill. dict. n.* 38. *Kniph. cent.* 8. *n.* 69. *Haworth Meſembr. p.* 196. *n.* 51. *

M. foliis planis oppoſitis ovatis acuminatis connatis integerrimis. *Hort. cliff.* 217. *n.* 10. *

M. tortuoſum foliis ſempervivi congeſtis. *Dill. elth.* 233. *t.* 181. *f.* 222.

Ficoides capenſis procumbens oleae folio, flore albo medio candido. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 7. *t.* 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 121.

Gedrehte Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)

Calycis *foliola* 3 *expanſa*, 2 *cornuta.* Corolla *calyce brevior.* Piſtillum *tetragynum.*

Corolla *flaveſcens.* W.

* * * * * *Cauleſcentia, foliis ſubtus convexis.*

85. MESEMBRYANTHEMUM *apetalum.*

M. foliis amplexicaulibus diſtinctis linearibus ſupra planis, internodiis longioribus papuloſis, papulis oblongis, floribus pedunculatis, calycibus quinquefidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 180.

M. foliis lineari-ſublanceolatis ſubtus muricatis, caulibus proſtratis. *Lin. ſuppl.* 258.

Meſembryanthemum copticum. *Iacq. hort.* 3. *p.* 7. *t.* 6.

Kleinblütige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙

Caules *herbacei proſtrati teretes rubentes, punctis obſoletis papuloſis nitentibus, ut tota planta, obtecti.* Folia *oppoſita linearia parumque lanceolata ſucculenta, ſupra canaliculata, ſubtus ſemicylindrica, papulis ſubmuricata obtuſa.* Pedunculi *breves papuloſi uniflori.* Calyx *foliolis inaequalibus ſubulato-cylindricis.* Petala 24 *alba diſtantia ſetacea breviſſima, quaſi totidem filamenta absque antheris, germini incumbentia.* Filamenta *ſubulata, petalis ſimillima, ſed breviora.* Antherae *fuſceſcentes.* Germen *inferum orbiculatum magnum convexum ſupra laeve.* Styli 5 *aproximati breves.* Stigmata *recurva.*

36. MESEMBRYANTHEMUM *copticum.*
M. foliis ſemiteretibus papuloſis diſtinctis, floribus ſeſſilibus axillaribus, calycibus quinquefidis. *Sp. pl.* 688.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 100.
Coptiſche Zaſerblume. W.
Habitat in Aegypto. ⊙

Statura et magnitudo M. nodiflori. Caulis *trichotomus herbaceus.* Folia *oppoſita ſemiteretia papuloſa, ramulos terminantia, nulla in internodiis, longitudine internodiorum.* Flores *ſeſſiles ſolitarii in divaricatura ramorum.* Calyx *quinquefidus, corolla longior.* Capſula *turbinata retuſa quinquangularis, angulis ciliatis compreſſis.* Semina *ſubrotunda ſubcochleata ſtriata.*

Corolla *alba.* W.

*37. MESEMBRYANTHEMUM *ciliatum.*
M. foliis oppoſitis connatis ſemiteretibus, ſtipulis membranaceis reflexis laceris ciliiformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 179.
Gefranzte Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.
Corolla *alba.* W.

*38. MESEMBRYANTHEMUM *caducum.*
M. foliis filiformibus ſemiteretibus diſtinctis, papulis ovatis, floribus lateralibus ſeſſilibus, terminalibus pari foliorum cinctis. *Ait. Kew.* 2. *p* 179.
Hinfällige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ⊙

39. MESEMBRYANTHEMUM *geniculiflorum.*
M. foliis ſemiteretibus papuloſis diſtinctis, floribus ſeſſilibus axillaribus, calycibus quadrifidis. *Sp. pl.* 688. *Mill. dict. n.* 3. *Haworth Meſembr. p.* 214. *n.* 59. *
M. ramis undique papilloſis folio craſſioribus. *Hort. cliff.* 218. *n.* 22. *Roy. lugdb.* 285.
M. capenſe geniculiflorum neapolitanum creditum *Dill. elth.* 271. *t.* 205. *f.* 261.
Ficoides neapolitana, flore candido *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 291. *Bradl. ſucc.* 5. *t.* 17. *f.* 34.
Ficoides capenſe, folio tereti, flore albido. *Petiv. gaz. t.* 78. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 101.
Winkelblütige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Calyx *quadrifidus.* Styli *quatuor.* Fructus *quadrilocularis.*

Corolla *albido-flaveſcens.* W.

*40. MESEMBRYANTHEMUM *clavatum.*

M. foliis ſubteretibus impunctatis diſtinctis, pedunculis terminalibus aggregatis clavatis. W.

M. foliis ſubteretibus impunctatis diſtinctis, pedunculis clavatis, calycibus quadrifidis. *Iacq. hort. Schoenbr.* 1. *p.* 56. *t.* 108. *

Keulenſtielige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Pedunculi *craſſi clavati in ramorum apice* 3-5 *aggregati.* Calyx *ſubaequalis quadrifidus.* Corolla *alba, petalis linearibus tenuiſſimis.* Styli *quatuor.* W.

41. MESEMBRYANTHEMUM *noctiflorum.*

M. foliis ſemicylindricis impunctatis diſtinctis, floribus pedunculatis terminalibus ſolitariis, calycibus clavatis. W.

M. foliis ſemicylindricis impunctatis diſtinctis, floribus pedunculatis, calycibus quadrifidis. *Sp. pl.* 689. *Mill. dict. n.* 4. *Knorr. del.* 1. *t. G* 8. *Haworth Meſembr. p.* 251. *n.* 72. *

M. foliis ſubulatis ſemicylindricis laevibus vix connatis apice recurvis. *Hort. cliff.* 220. *n.* 28. *Roy. lugdb.* 286.

M. noctiflorum flore intus albo extus phoeniceo odoratiſſimo. *Dill. elth.* 273. *t.* 206. *f.* 262.

Ficoides, ſeu Ficus aizoides africana erecta arboreſcens lignoſa, flore radiato, primo purpureo, dein argenteo, interdiu clauſo, nocte aperto. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 291.

β. M. (*ſtramineum*) foliis ſemiteretibus falcatis caule arboreſcente, floribus extus ſtramineis. *Haworth Meſembr. p.* 252. *n.* 73.

M. noctiflorum, flore intus candido extus ſtramineo odoratiſſimo. *Dill. elth.* 254. *t.* 206. *f.* 263.

Ficoides africana arboreſcens, folio tereti, flore candido nocte aperto, interdiu clauſo. *Boerh. lugd.* 1. *p.* 291.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 102.

Nächtliche Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Calyx *huic quadrifidus.* Flores *incarnato-albi, noctu fragrantes.* Styli *quatuor.* Fructus *quadrilocularis.*

42. MESEMBRYANTHEMUM *umbellatum.*

M. foliis ſubulatis ſcabrido-punctatis connatis, apice pa-

tulo, caule erecto, corymbo trichotomo. *Sp. pl.* 689. *Mill. dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 3. *n.* 63. *Haworth Meſembr. p.* 336. *n.* 107. *

M. fruteſcens, floribus albis umbellatis. *Dill. elth.* 277. *t.* 208 *f.* 266.

Ficoides africana erecta teretifolia, floribus albis umbellatis. *Herm. par.* 166. *t.* 166. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 12. *t.* 34. *Pluk. phyt. t.* 117. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 104.

Doldentragende Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

43. MESEMBRYANTHEMUM *bicolorum.*

M. foliis ſubulatis punctatis laevibus diſtinctis, caule fruteſcente, corollis bicoloribus. *Sp. pl.* 695. *Mill. dict. n.* 28. *et. ic.* 177. *f.* 1. *Curt. mag.* 59.

M. (*coccineum*) foliis ſemicylindrico-compreſſis carinatis obtuſis, pedunculis ſubbracteatis baſi laevigatis petalis coccineis. *Haworth Meſembr. p.* 247. *n.* 71. *

Ficoides ſ. Ficus aizoides africana minor erecta, triangulari folio viridi, flore intus aureo, foris purpureo. *Herm. lugdb.* 250. *t.* 249. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 507. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 4.

β. M. (*bicolorum*) foliis ſubtriquetris ſubulatis ſcabridopunctatis, pedunculis nudis papuloſo-ſcabridis, corollis luteis. *Haworth Meſembr. p.* 241. *n.* 70. *

M. tenuifolium fruticeſcens flore croceo. *Dill. elth.* 267. *t.* 202. *f.* 258.

Ficoides capenſis fruteſcens, folio tereti punctato, petalis luteis. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 8. *t.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 118.

Zweyfarbige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Corollae *extus purpureae intus flavae, apice extus purpureae*. Calyx *tuberculatus.*

44. MESEMBRYANTHEMUM *tuberoſum.*

M. foliis ſubulatis papuloſis diſtinctis apice patulis, radice capitata. *Sp. pl.* 693. *Hort. cliff.* 216. *n.* 4. * *Roy. lugdb.* 282. *Mill. dict. n.* 21. *Haworth Meſembr. p.* 271. *n.* 86. *

M. fruticeſcens, radice ingenti tuberoſa. *Dill. elth.* 275. *t.* 207. *f.* 264.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 112.

Knollige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)
Flores *parvi pallide purpurei.* W.

45. MESEMBRYANTHEMUM *tenuifolium.*
M. foliis ſubfiliformibus glabris diſtinctis internodio longioribus, caulibus procumbentibus. *Syſt. veg.* 390.
M. foliis ſemiteretibus ſubulatis glabris diſtinctis internodio longioribus. *Hort. cliff.* 220. *n.* 26. *Hort. upſ.* 128. *Roy. lugdb.* 286. *Sp.* 2. *p.* 693. *Mill. dict. n.* 22. *Haworth Meſembr. p.* 239. *n.* 68.
M. tenuifolium procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Dill. elth.* 264. *t.* 201. *f.* 256.
Ficoides capenſis humilis teretifolia, flore coccineo. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 13. *t.* 9.
Ficoides africana minor procumbens, folio tenuiore viridi, flore coccineo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 507. *ſ.* 12. *t.* 8. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 112.
Dünnblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Caules *lignoſi. procumbentes.* Rami *ex ſingulis alis ſuperioribus.* Flores *coccinei, ſpecioſi multis petalis, medio die, ſole illuſtrante, expanſi, diutius durantes.* Folia *glaberrima.*

46. MESEMBRYANTHEMUM *ſtipulaceum.*
M. foliis ſubtriquetris compreſſis incurvis punctatis diſtinctis congeſtis: baſi marginatis. *Sp. pl.* 693. *Hort. cliff.* 220. *n.* 29. *Roy. lugdb.* 287. *Mill. dict.* 23. *Haworth Meſembr. p.* 255. *n.* 77. *
M. fruteſcens, flore purpureo rariore. *Dill. elth.* 279. *t.* 209. *f.* 267, 268.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 113.
Steifſtielige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Caulis *florens rigidus, ſubgriſeus.* Folia *linearia, carnoſa, lateribus valde compreſſa et punctis pellucidis adſperſa, incurva, ſupra planiuſcula, mucronata.* Flores *ſubcorymboſi, purpurei,* Staminibus *luteis.*

47. MESEMBRYANTHEMUM *corniculatum.*
M. foliis triquetro - ſemicylindricis ſcabrido - punctatis, ſupra baſin linea elevata connatis. *Sp. pl.* 676. *Mill. dict. n.* 35.
M. (*corniculatum*) foliis imbricatis longis aequalibus,

m[illegible]busque punctatis, baſi ſemicylindricis, apice ſemicylindrico-triquetris. *Haworth Meſembr. p.* 226. *n.* 26.*
M. foliis corniculatis longioribus. *Dill. elth.* 262. *t.* 199. *f.* 253. 254.
Ficoides capenſis folio triangulari, flore luteo intus pallido. *Petiv. gaz. t.* 77. *f.* 10.
β. M. (*diverſiphyllum*) foliis ramorum connatis inaequalibus, ſcabrido-punctatis, ſemicylindrico-triquetris, caule proſtrato elongato, petalis ſubtus rubris *Haworth Meſembr. p.* 228. *n.* 63.*
M. foliis corniculatis brevioribus. *Dill. elth.* 261. *t.* 198. *f.* 252.
Ficoides africana reptans, folio triangulari craſſo longiſſimo, flore intus luteo extus aurantio. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 18. *t.* 40.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 121.
Hornförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. v.)
Flores *decagyni.*

48. MESEMBRYANTHEMUM *loreum.*
M. foliis ſemicylindricis recurvis congeſtis baſi interiore gibbis connatis, caule pendulo. *Sp. pl.* 694. *Mill. dict. n.* 30.
M. loreum. *Dill. elth.* 264. *t.* 200. *f.* 255.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 115.
Riemenartige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃
Flores rariſſime prodiere apud Engelb. Gother, unde patuit diſtinctam a. M. corniculato plantam eſſe. Flos *ex alis foliorum infimis rami, pedunculo brevi;* Calyce *aequali mediocri;* Corolla *purpurea, petalis lanceolato-linearibus.* Staminibus *albidis.*

49. MESEMBRYANTHEMUM *veruculatum.*
M. foliis triquetro-cylindricis acutis connatis arcuatis impunctatis diſtinctis. *Sp. pl.* 696. *Hort. cliff.* 220. *n.* 24. *Hort. upſ.* 123. *Roy. lugdb.* 285. *Mill. dict. n.* 33. *Kniph. cent.* 10. *n.* 62. *Haworth Meſembr. p.* 260. *n.* 79.
M. foliis veruculiformibus, floribus mellinis umbellatis. *Dill. elth.* 268. *t.* 203. *f.* 259.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 123.
Bogigblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Folia *ſubtriquetro-cylindrica pellucida, apice purpuraſcentia.* Flores *adoratiſſimi conferti parvi flavi.* Corolla *vix calyce longior, petalis apice ſubbidentatis.* Stamina *parva;* Filamentis *baſi villoſis.*

*50. MESEMBRYANTHEMUM *echinatum.*
M. foliis oblongo-ovatis ſubtriquetris gibbis ramentaceo-hiſpidis, laciniis calycinis foliiformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 194. *Haworth Meſembr. p.* 288. *n.* 91.*
α. flore luteo.
β. flore albo.
Stachliche Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Variat flore luteo et albo. W.

*51. MESEMBRYANTHEMUM *viridiflorum.*
M. foliis ſemicylindraceis papuloſo-piloſis, calycibus quinquefidis hirſutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 196. *Haworth Meſembr. p.* 199. *n.* 53.*
Grünblütige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *laete viridis* W.

52. MESEMBRYANTHEMUM *ſplendens.*
M. foliis ſubteretibus impunctatis recurvis diſtinctis congeſtis, calycibus digitiformibus terminalibus. *Sp. pl.* 689. *Mill. dict. n.* 5. *Haworth Meſembr. p.* 209. *n.* 56.*
M. foliis confertis ſplendentibus, flore pallido. *Dill. elth.* 270. *t.* 204. *f.* 260.
Ficoides capenſis fruteſcens, foliis teretibus confertis glaucis, flore albo. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 7. *t.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 103.
Glänzende Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Caulis *punctis albidis in ramis non ultimis.* Folia *triquetro-teretiuſcula, apice patula acuta, axillaria vero incurva.* Corolla *flaveſcenti-albida.* Calyces *erecti digitiformes mutici.*

53. MESEMBRYANTHEMUM *villoſum.*
M. foliis pubeſcentibus connatis impunctatis, caule piloſo. *Sp. pl.* 692. *Hort. cliff.* 217. *n.* 6.* *Roy. lugdb.* 282. *Mill. dict. n.* 16. *Haworth Meſembr. p.* 222. *n.* 61.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 109.
Behaarte Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *lineari-ſemiteretia canaliculato-plana opaca, margine, verſus baſin imprimis, villis adſperſa.* Caulis *pubeſcens villis vix exſtantibus.* Flores *non vidi.* Flores *rubicundi.* W.

54. MESEMBRYANTHEMUM *micans.*
M. foliis ſubcylindricis papuloſis diſtinctis caule ſcabro. *Sp. pl.* 696. *Hort. cliff.* 220. *n.* 30.* *Roy. lugdb.* 287 *Mill. dict. n.* 37. *Kniph. cent.* 7. *n.* 58. *Knorr. del.* 1. *t. G.* 5. *Haworth Meſembr. p.* 268. *n.* 84.
M. micans, flore phoeniceo, filamentis atris. *Dill. elth.* 292. *t.* 215. *f.* 282.
Ficoides capenſis tereti folio flore croceo. *Petiv. gaz. t.* 3. *f.* 9.
Ficoides capenſis folio tereti argenteo, petalis perplurimis aurantiacis. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 9. *t.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 119.
Schimmernde Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*55. MESEMBRYANTHEMUM *groſſum.*
M. foliis ſubcylindricis confertis papuloſis, caudice baſi incraſſato, ramis diffuſis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 191.
Dickſtielige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *lutea.* W.

* * * * * * *Cauleſcentia, foliis teretibus.*

56. MESEMBRYANTHEMUM *nodiflorum.*
M. foliis alternis teretiuſculis obtuſis baſi ciliatis. *Sp. pl.* 687. *Hort. upſ.* 129. *Mill. dict. n.* 1. *Forſk. aegypt. p.* 98.
Kali craſſulae minoris foliis. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 7.
Kali neapolitanum aizoides repens. *Col. ecphr.* 2. *p.* 72. *t.* 73.
Kali II. *Alp. aegypt.* 125. *t.* 127.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 99.
Knotenblütige Zaſerblume. W.
Habitat in Aegypto, Neapoli *locis arenoſis editis, quae ab aeſtu maris adſperguntur.* ⊙
Corolla *alba.* W.

57. MESEMBRYANTHEMUM *capillare.*
M. foliis connatis teretibus papuloſis, caule erecto, ramulis unifloris filiformibus glabris. *Lin. ſuppl.* 260.
Haarblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. *Thunberg.*

*58. MESEMBRYANTHEMUM *laeve*.
M. foliis cylindraceis obtuſis amplexicaulibus laevibus, calycibus quinquefidis, laciniis oblongis obtuſis. *Ait, Kew. p.* 187. *Haworth Meſembr. p.* 254. *n.* 75.
Weiſsſtielige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *purpurea*. W.

*59. MESEMBRYANTHEMUM *brachiatum*.
M. caulibus foliisque cylindricis papuloſis, ramis trichotomis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 191. *Haworth Meſembr. p.* 254. *n.* 74.
Weitäſtige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *lutea*. W.

*60. MESEMBRYANTHEMUM *brevifolium*.
M. foliis cylindraceis obtuſiſſimis papuloſis patentibus, ramis diffuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 188. *Haworth Meſembr. p.* 274. *n.* 87. *
Kurzblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *purpurea*. W.

61. MESEMBRYANTHEMUM *hiſpidum*.
M. foliis cylindricis papuloſis diſtinctis, caule pedunculisque hiſpidis, calyce glabro papuloſo. W.
M. foliis cylindricis papuloſis diſtinctis, caule hiſpido. *Sp. pl.* 691. *Mill. dict. n.* 15. *et ic. t.* 176. *f.* 3. *Kniph. cent.* 3. *n.* 62.
M. caule hiſpido. *Hort. cliff.* 217. *n.* 7. * *Roy. lugdb.* 282.
M. foliis diſtantibus cylindricis, caule hirto, calycibus glabris papuloſis, ſtaminibus purpuraſcentibus. *Haworth Meſembr. p* 277. *n.* 88. *
M. piloſum micans, flore ſaturate purpureo. *Dill. elth.* 289. *t.* 214. *f.* 278.
Ficoides afra fruticoſa, caule lanugine argentea ornato, folio tereti parvo longo, guttulis argenteis quaſi ſcabro, flore violaceo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 291.
β. Meſembryanthemum hiſpidum pallidum. *Haworth Meſembr. p.* 279. *
M. piloſum micans, flore purpureo pallidiore. *Dill. elth.* 290. *t.* 214. *f.* 279. 280.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 108.
Borſtige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Pedunculus ... *le deorſum ſcaber, magis viſu, quam tactu.* Calyx *muticus.* Flos *odoratus ſimillimus M. barbati (a quo forte olim ortum) demta barba foliorum, ſed cauli inſperſa.*

*62. MESEMBRYANTHEMUM *ſtriatum.*

M. foliis cylindricis papuloſis diſtinctis, caule pedunculisque hiſpidis, calyce lanuginoſo. W.

M. (*ſtriatum*) foliis cylindraceis, caule hiſpido, pedunculis calycibusque lanuginoſis. *Haworth Meſembr. p.* 280. *n.* 89. *

Meſembryanthemum hiſpidum. *γ. Sp. pl.* 691.

M. piloſum micans, flore purpureo ſtriato. *Dill. elth.* 291. t. 215. *f.* 281.

Ficoides ſ. Ficus azoides africana folio longo tenui, flore aurantio. *Brad. ſucc.* 4. *p.* 13. *t.* 35.

Ficus aizoides teretifolia, foliis cryſtallino rore eleganter conſperſis, floribus dilute roſeis. *Volk. heſp.* 221. *t.* 224. *f.* 2.

Geſtreifte Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄.

63. MESEMBRYANTHEMUM *barbatum.*

M. foliis ſubovatis papuloſis diſtinctis apice barbatis. *Hort. cliff.* 216. *n.* 5. * *Hort. upſ.* 127. *Roy. lugdb.* 282. *Mill. dict. n.* 13. *ic. t.* 176. *f.* 3. *Kniph. cent.* 10. *n.* 60. *

M. foliis ſubovatis papuloſis diſtinctis apice barbatis ramulis prolixis recumbentibus, calycibus pentaphyllis glabris. *Haworth Meſembr. p.* 293. *n.* 92. *

M. radiatum, ramulis prolixis recumbentibus. *Dill. elth.* 245. *t.* 190. *f.* 234.

Ficoides capenſis teretifolia apicibus hirtis. *Petiv. gaz. t.* 77. f. 6.

Ficoides capenſis fruteſcens, folio tumido, extremitate ſtellata, flore purpureo. *Bradl. ſucc.* 1. *p.* 6. *t.* 5. *et* 15.

Ficus aizoides, folio tereti in villos radiatos abeunte flore rubro. *Volk. heſp. p.* 222. *t.* 224. *f.* 6.

β. M. (*hirſutum*) ramulis hirſutis, foliis ſemicylindrico-turgidis apice barbatis, baſi ciliatis ſcabrido-papuloſis, calycibus ſex-vel ſeptemphyllis inaequalibus. *Haworth Meſembr. p.* 297. *n.* 93. *

M. radiatum humile, foliis minoribus. *Dill. elth.* 246. *t.* 235. *Willich. obſ. n.* 56.

γ. M. (*denſum*) ſubacaule, foliis denſiſſime imbricatis connatis ſemicylindricis, ſupra concavis apice barbatis, calycibus hexaphyllis ſubaequalibus hiſpidis. *Haworth Meſembr. p.* 302. *n.* 94. *

M. radiatum humile, foliis majorbus. *Dill. elth.* 248. *t.* 190. *f.* 236.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 107.

Bärtige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Calycis *foliola apice barbata, aeque ac folia plantae demonſtrant* Perianthii *ortum.* Petala *minima interiora, quae cingunt ſtamina alba. Varietas* β. *hybrida forte differt ab* α. Calyce *hexaphyllo nec pentaphyllo.* Stylis Loculiis*que* 6, *nec* 5 *ſ.* 8. Pedunculis *hiſpidis pilоſis nec laevibus.* Foliorum *oppoſitionibus imbricatis, nec remotis.*

* * * * * * * *Cauleſcentia, foliis triquetris.*

64. MESEMBRYANTHEMUM *falcatum.*

M. foliis ſubacinaciformibus incurvis punctatis diſtinctis, ramis teretibus. *Sp. pl.* 694. *Hort. cliff.* 219. *n.* 19. * *Roy. lugdb.* 285. *Knorr. del.* 2. *t. M.* 4. *Haworth. Meſembr. p.* 360. *n.* 118. *

M. falcatum minimum, flore purpureo parvo. *Dill. elth.* 288. *t.* 213. *f.* 276.

Ficoides afra, folio triangulari enſiformi breviſſimo, flore dilute purpuraſcente filamentoſo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 290. *Bradl. ſucc.* 5. *p. t.* 42.

Sichelblättrige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

65. MESEMBRYANTHEMUM *glomeratum.*

M. foliis teretiuſculis compreſſis punctatis diſtinctis, caule paniculato multifloro. *Sp. pl.* 694. *Mill. dict. n.* 26. *Haworth Meſembr.* 356. *n.* 117. *

M. falcatum minus, flore carneo minore. *Dill. elth.* 281. *t.* 213. *f.* 274.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 114.

Knaulblättrige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Caulis *diffuſus paniculatus.* Folia *angulis obtuſis trigona glauca, punctis diaphanis.* Ramulorum *rudi-*

menta ex alis, foliis confertiſſimis incurvis. Calyx *longius pedunculatus*; Germine *ſubverrucoſo, punctis eminentibus obſoletis.* Laciniis *calycinis apice membranaceis ſub apice ſpina patula.* Corolla *purpurea M. deltoidis.*

*66. MESEMBRYANTHEMUM *reptans.*
M. foliis triquetris acutis ſcabris, caule reptante. *Ait. Kew.* 2. *p.* 185. *Haworth Meſembr. p.* 348. *n.* 113. *
Kriechende Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Corolla *purpurea.* W.

*67. MESEMBRYANTHEMUM *deflexum.*
M. foliis triquetris acutis glaucis, punctis obſoletis ſcabriuſculis, laciniis calycinis interioribus membranaceis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 187. *Haworth Meſembr. p.* 347. *n.* 112. *
Niedergebeugte Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄
Petala *pallide-purpurea valde anguſta.* W.

*68. MESEMBRYANTHEMUM *auſtrale.*
M. foliis ſubtriquetris punctulatis connatis obtuſiuſculis, caule tereti repente, pedunculis obtuſe ancipitibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 187. *Haworth Meſembr.* 349. *n.* 114.
Südliche Zaſerblume. W.
Habitat in Nova Zeelandia. ♃
Corolla *purpurea.* W.

69. MESEMBRYANTHEMUM *ſpinoſum.*
M. foliis tereti-triquetris punctatis diſtinctis, ſpinis ramoſis. *Sp. pl.* 693. *Hort. cliff* 216. *n.* 3. * *Roy. lugdb.* 281. *Haworth Meſembr. p.* 338. *n.* 108. *
M. fruticeſcens, ramis triacanthis. *Dill. elth.* 276. *t.* 208. *f.* 265.
Ficoides africana, aculeis longiſſimis et foliolis naſcentibus e foliorum alis. *Tournef. act.* 1705. *p.* 316. *Bradl. ſucc.* 41. *t.* 39.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 111.
Dornige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄. (v. v.).
Corolla *purpurea.* W.

70. MESEMBRYANTHEMUM *craſſifolium.*
M. foliis ſemicylindricis impunctatis connatis, apice tri-

quetris, caule repente ſemicylindrico. *Sp. pl.* 693. *Hort. cliff.* 217. *n.* 9.* *Roy. lugdb.* 283. *Mill. dict. n.* 24. *Knorr. del.* 2. *t. M.* 4. *Haworth Meſembr. p.* 350. *n.* 115.*

M. craſſifolium repens flore purpureo. *Dill. elth.* 266. *t.* 201. *f.* 257.

Ficoides africana reptans, folio triangulari viridi, flore ſaturate purpureo. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 16. *t.* 38.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 114.

Dickblättrige Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

*71. MESEMBRYANTHEMUM *molle.*

M. foliis triquetris connatis erectis glaucis impunctatis, ramis ſemiteretibus, pedunculis axillaribus compreſſis. *Ait. Kew.* 2 *p.* 192. *Haworth Meſembr. p.* 261. *n.* 80.*

Weiche Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Flores *lutei.* W.

72. MESEMBRYANTHEMUM *glaucum.*

M. foliis triquetris acutis punctatis diſtinctis, calycinis foliolis ovato-cordatis. *Sp. pl.* 696. *Hort. cliff.* 220. *n.* 27. *Roy. lugdb.* 183. *Mill. dict. n.* 34. *Haworth Meſembr. p.* 329. *n.* 104.*

M. ſcabrum, flore ſulphureo convexo. *Dill. elth.* 256. *t.* 196. *f.* 248.

Ficoides africana fruteſcens, folio tringulari breviori glauco. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 507. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 3.

Ficoides afra, caule lignoſo, erecto, folio triangulari enſiformi ſcabro, flore luteo magno. *Bradl. ſucc.* 4. *p.* 15. *t.* 37.

Ficoides ſ. Ficus aizoides africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo. *Herm. lugdb.* 247. *t.* 248.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 120.

Meergrüne Zaſerblume. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

Folia *mucronata., rore glauca, punctis ſparſis non ſcabra, niſi carina.*

*73. MESEMBRYANTHEMUM *ſpectabile.*

M. foliis triquetris acutis connatis arcuatis punctatis glaucis laevibus, caule adſcendente. W.

M. (*ſpectabile*) foliis perfoliatis longiſſimis glaucis punctatis integerrimis triquetris apice ſubulatis, caule lignoſo

adſcendente. *Haworth Meſembr. p.* 385. *n.* 126. * *Curt. mag.* 396.
Anſehnliche Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Flores *magni coccineo-purpurei.* Pedunculi *longi uniflori ſolitarii terminales, medio bracteis binis connatis inſtructi.* W.

74. MESEMBRYANTHEMUM *emarginatum.*
M. foliis ſubulatis congeſtis ſubſcabris, calycibus ſpinoſis, petalis emarginatis. *Sp. pl.* 692. *Haworth Meſembr. p.* 340. *n.* 109. *
M. purpureum ſcabrum, ſtaminibus expanſis. *Dill. elth.* 259. *t.* 197. *f.* 250.
Ficoides capenſis triangulari folio acuto, flore purpureo. *Petiv. gaz. t.* 77. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 100.
Ausgerandete Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

75. MESEMBRYANTHEMUM *aureum.*
M. foliis cylindrico-triquetris punctatis diſtinctis piſtillis atropurpureis. *Syſt. nat. ed.* 10. *p.* 1060. *Curt. mag.* 262. *Haworth Meſembr. p.* 333. *n.* 106. *
Goldfarbene Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Corolla *crocea.* W.

76. MESEMBRYANTHEMUM *ſerratum.*
M. foliis ſubulatis triquetris punctatis diſtinctis angulo carinali retrorſum ſerratis. *Sp. pl.* 696. *Hort. cliff.* 218. *n.* 15. *Roy. lugdb.* 284. *Mill. dict. n.* 31.
M. foliis ſubulatis triquetris punctatis diſtinctis, angulo carinali tetrorſum ſerrato, flore acetabuliformi luteo. *Haworth Meſembr. p.* 381. *n.* 124. *
M. ſerratum flore acetabuliformi luteo. *Dill. elth.* 249. *t.* 192. *f.* 238.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 119.
Geſägte Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

77. MESEMBRYANTHEMUM *ſcabrum.*
M. foliis ſubulatis diſtinctis, ſubtus undique punctato-muricatis, calycibus muticis. *Sp. pl.* 692. *Hort. cliff.* 219. *n.* 20. * *Hort. upſ.* 129. *Mill. dict. n.* 17. *Haworth Meſembr. p.* 345. *n.* 111. *

M. purpureum ſcabrum, ſtaminibus collectis. *Dill. elth.* 260. *t.* 197. *f.* 251.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 109.
Scharfblättrige Zaſerblume. W.
Habiat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*78. MESEMBRYANTHEMUM *bracteatum.*
M. foliis ſubacinaciformibus punctatis, apice recurvo, bracteis amplexicaulibus lato-ovatis carinatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 185. *Haworth Meſembr. p.* 319. *n.* 101.*
M. uncinatum ſcabrum, petalis purpureis circumactis. *Dill. elth.* 258. *t.* 197. *f.* 249.
Beblätterte Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

79. MESEMBRYANTHEMUM *uncinatum.*
M. articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis ſubtus dentatis. *Sp. pl.* 692. *Hort. cliff.* 218. *n.* 16. *Roy. lugdb.* 284. *Mill. dict. n.* 18.
M. articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis brevibus punctatis triquetris, ſubtus diacanthis. *Haworth Meſembr. p.* 309. *n.* 96. *
M. perfoliatum, foliis minoribus diacanthis. *Dill. elth.* 250. *t.* 193. *f.* 239.
Ficoides afra, folio triangulari glauco perfoliato breviſſimo apice ſpinoſo. *Bradl. ſucc.* 3. *p.* 8. *t.* 27. 26. *Burm. afr. t.* 26. *f.* 3.
β. M. (*perfoliatum*) articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis punctatis glaucis triquetris, ſubtus triacanthis. *Haworth Meſembr. p* 307. *n.* 95. *
M. perfoliatum, foliis majoribus triacanthis. *Dill. elth.* 251. *t.* 193. *f.* 240.
Ficoides africana fruteſcens perfoliata, folio triangulari glauco punctato. *Bradl. ſucc.* 5. *p.* 13. *t.* 46.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 110.
Hackenförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Corolla *purpurea.* W.

80. MESEMBRYANTHEMUM *pugioniforme.*
M. foliis alternis confertis ſubulatis triquetris longiſſimis impunctatis. *Sp. pl.* 699. *Hort. cliff.* 216. *n.* 2. * *Hort. upſ.* 129. *Roy. lugdb.* 281. *Mill. dict. n.* 46. *Haworth Meſembr. p.* 387. *n.* 227. *
M. folio pugioniformi, flore aureo ſtramineo. *Dill. elth.* 280. *t.* 210. *f.* 269.

Ficus capenſis caryophylli folio, flore aureo ſpecioſo. *Bradl. ſucc.* 2. *p.* 5. *t.* 14.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 127.
Dolchförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. ſpei. ♄

Caules *apice ramoſi, ramis ternis.* Folia *ex apice ramorum conferta, ad exortum ramulorum florentium apice uncinata.* Pedunculi *longi.* Flores *decagyni, in hoc genere maximi.*

*81. MESEMBRYANTHEMUM *aequilaterale.* †
M. foliis ſubconnatis acutis glabris arcuatis confertis aequilateri-triquetris caule, angulato repente. W.
M. (*aequilaterum*) foliis confertis ſubconnatis longis obſolete punctatis ſubaequilateri-triquetris integerrimis, caule angulato ſubradicante proſtrato. *Haworth Meſembr. p.* 390. *n.* 128. *
Gleichſeitige Zaſerblume. W.
Habitat in Nova Hollandia. ♄.
Flores *non vidit Clariſſ. Haworth.* W.

82. MESEMBRYANTHEMUM *filamentoſum.*
M. foliis aequilateri-triquetris acutis ſubpunctatis connatis, angulis ſcabris, ramis hexagonis. *Sp. pl.* 694. *Haworth Meſembr. p.* 380. *n.* 123. *
M. falcatum majus, flore purpureo mediocri. *Dill. elth.* 285. *t.* 212. *f.* 273.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 115.
Fädige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

Folia *punctata vix connata.* Flores *ſeſſiles pentagyni.* Corollae *miſerae parvae, obſolete violaceae, petalis ſubulatis nec lanceolatis.*

83. MESEMBRYANTHEMUM *acinaciforme.*
M. foliis acinaciformibus impunctatis connatis, angulo carinali ſcabris, petalis lanceolatis. *Sp. pl.* 695. *Hort. cliff.* 219. *n.* 18. *Roy. lugdb.* 284. *Mill. dict. n.* 19. *Kniph. cent.* 10. *n.* 59. *Haworth Meſembr. p.* 397. *n.* 131. *
M. acinaciforme flore ampliſſimo purpureo. *Dill. elth.* 282. *t.* 211. *f.* 270. *et. t.* 212. *f.* 271.
Sebelförmige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

84. MESEMBRYANTHEMUM *forficatum.*
M. foliis acinaciformibus obtuſis impunctatis connatis apice

ſpinoſis, caule ancipiti. *Sp. pl.* 695. *Jacq. hort.* 1. p. 9. t. 26.* *Haworth Meſembr. p.* 394. 130.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 117.
Scheerenblättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)
Caulis *debilis.* Corolla *purpurea.*

85. MESEMBRYANTHEMUM *edule.*
M. foliis aequilatetri-triquetris acutis ſtrictis impunctatis connatis, carina ſubſerratis, caule ancipiti. *Sp. pl.* 695. *Mill. dict. n.* 27. *Haworth Meſembr. p.* 392. *n.* 126.
M. falcatum majus, flore amplo luteo. *Dill elth.* 283. *t.* 212. *f.* 272.
Ficoides ſ. Ficus aizoides africana major procumbens triangulari folio, fructu maximo eduli. *Herm. lugdb.* 244. *t.* 245. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 506. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 117.
Genieſsbare Zaſerblume. W.
Habitat in arenoſis maritimis. Cap. b. ſpei. ♄
Folia *craſſitie digiti nitida recta triquetra, aequilatera longa baſi connata, carina cartilaginea ſcabra.*

86. MESEMBRYANTHEMUM *deltoides.*
M. foliis deltoidibus triquetris dentatis impunctatis diſtinctis. *Sp. pl.* 690. *Hort. cliff.* 218. *n.* 14.* *Roy. lugdb.* 284. *Mill. dict. n.* 11. *Knorr. del.* 1. *t. G. b. n.* 1.
M. foliis deltoidibus triquetris, dorſo et lateribus muricatis, impunctatis diſtinctis. *Haworth Meſembr. p.* 364. *n.* 120.*
M. deltoides et dorſo et lateribus muricatis minus. *Dill. elth.* 255. *t.* 195. *f.* 246.
Ficus aizoides africana erecta, folio triangulari breviuſculo fimbriato, floribus roſeis odoratis. *Volk. heſp.* 223. *t.* 224. *f.* 5.
β. M. deltoides et dorſo et lateribus muricatis majus. *Dill. elth.* 244. *t.* 196. *f.* 247. *Knorr. del.* 1. *t. G.* 5. *b. n.* 2.
γ. M. (*euleſcens*) foliis albidis deltoidibus, lateribus minime dentatis, angulo carinali integris. *Haworth Meſembr. p.* 367. *n.* 121.*
M. deltoides non dorſo, ſed lateribus muricatis. *Dill. elth.* 253. *t.* 195. *f.* 243. 244.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 107.
Deltablättrige Zaſerblume. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

Pedunculi *uniflori diphylli.* Corollae *dilute purpureae odoratae, non calyce longiores.* Stamina *erecta in conum, alba;* Antheris *flavis.*

995. AIZOON.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 861.

Cal. 5-partitus. *Petala* o. *Capſ.* ſupera, 5-locularis, 5-valvis.

1. AIZOON *canarienſe.*

A. foliis cuneiformi-ovatis, floribus ſeſſilibus. *Hort. upſ.* 127. *Mill. dict. n.* 1. *Kniph. cent.* 1. *n.* 1.

A. foliis obverſe ovatis. *Hort. cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 221.

Veſlingia Heiſteri. *Fabric. helmſt. p.* 363.

Glinus cryſtallinus. *Forskaehl. fl. aegypt. p.* 95. *n.* 97. *et ic. t.* 14.

Ficoides procumbens, portulacae folio. *Niſſ. act.* 1711. *p.* 422. *t.* 13. *f.* 1.

Kali aizoides canarienſis procumbens. *Pluk. alm.* 202. *t.* 303. *f.* 4. *Volk. norib.* 236. *t.* 236.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 130.

Canariſches Immergrün. W.

Habitat in Canariis. ☉ (v. v.)

2. AIZOON *perfoliatum.*

A. tomentoſum, foliis obovatis connatis cryſtallino-punctatis, floribus pedunculatis. *Lin. ſuppl.* 261.

Durchwachſenes Immergrün. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

3. AIZOON *Glinoides.*

A. foliis ſubrotundo-cuneiformibus piloſis, floribus ſeſſilibus, calycibus hirſutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 196.

A. hirſutum herbaceum procumbens, foliis ovatis, floribus ſeſſilibus diſtinctis. *Lin. ſuppl.* 261.

Glinusartiges Immergrün. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

4. AIZOON *ſecundum.*

A. hirſuto-canum herbaceum procumbens, foliis ovatis, floribus ſeſſilibus imbricatis ſecundis. *Lin. ſuppl.* 261.

Einſeitiges Immergrün. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei.

5. AIZOON *rigidum.*
A. fruticoſum procumbens tomentoſum, foliis ovatis, floribus ſeſſilibus remotis. *Lin. ſuppl.* 261.
Steifes Immergrün. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

6. AIZOON *hiſpanicum.*
A. foliis lanceolatis, floribus ſeſſilibus. *Sp. pl.* 700. *Mill. dict. n.* 2.
Ficoidea hiſpanica annua, folio longiore. *Dill. elth.* 143. *t.* 117. *f.* 143.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 131.
Spaniſches Immergrün. W.
Habitat in Hiſpania. ⊙ (v. v.)

7. AIZOON *fruticoſum.*
A. fruticoſum erectum glabrum, foliis lanceolatis, floribus ſeſſilibus. *Lin. ſuppl.* 261.
Strauchartiges Immergrün. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄

8. AIZOON *paniculatum.*
A. hirſutum, foliis lanceolatis, floribus ſeſſilibus, ramis erectis. *Lin. ſuppl.* 261.
Riſpenſtieliges Immergrün. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei.

9. AIZOON *lanceolatum.*
A. foliis lanceolatis, floribus paniculatis. *Murr. ſyſt. veg.* 14. *p.* 471.
Aizoon paniculatum. *Sp. pl.* 700. *Mill. dict. n.* 3.
A. foliis lanceolatis ſubtus hirſutis. *Roy. lugdb.* 221.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 131.
Lanzettenförmiges Immergrün. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♂

10. AIZOON *ſarmentoſum*
A. foliis linearibus filiformibus, panicula dichotoma, floribus ſolitariis pedunculatis. *Lin. ſuppl.* 260.
Kriechendes Immergrün. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei

Caules *proſtrati ſarmentoſi pedales.* Folia *linearia oppoſita remota laevia, baſi approximata latiuſcula perſiſtente.* Flores *verſus ſummitatem caulis alterni axillares, pedunculo unifloro longitudine foliorum, pubeſcentes.*

996. SPIRAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 862.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Capſ.* polyſpermae.

* *Fruticoſae.*

1. SPIRAEA *laevigata.*

S. foliis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus, racemis compoſitis. *Mant.* 244. *Willd. arb.* 370.

S. (*altaica*) foliis oblongis integerrimis ſeſſilibus, racemis terminalibus compoſitis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 37. *t.* 23.* *itin.* 2. *app. p.* 739. *n. III. tab. T.*

S. (*altaienſis*) foliis lanceolatis integerrimis glabris, ad baſin anguſtatis, ſeſſilibus, floribus racemoſis, racemis ſimplicibus. *Laxm. Nov. Act. Petrop. Vol. XV. p.* 555. *t.* 29. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 657.

Glatte Spierſtaude. W.

Habitat in Sibiriae *alpibus* Altaicis. ♄ (v. v.)

Frutex *ramis teretibus.* Folia *alterna, ſeſſilia, lanceolata, integerrima, obtuſiuſcula, mucronata, laeviſſima.* Racemi *terminales, ſolitarii, erecti, compoſiti e racemulis alternis, erectis,* Bractea *parva ſuffultis.* Flores *pedicello longiores, albi, alterni.* Stamina *corollis longiora.*

2. SPIRAEA *ſalicifolia.*

S. foliis oblongis ſerratis glabris, racemis decompoſitis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 197. *Willd. arb.* 370. *

S. foliis lanceolatis obtuſis ſerratis nudis, floribus duplicato-racemoſis. *Hort. cliff.* 191. *Hort. upſ.* 131. *Roy. lugdb.* 277. *Gmel ſib.* 3. *p.* 188. *n.* 47. *t.* 39. *Roth. germ. I.* 215. *II.* 550. *Hoffm. germ.* 137. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 428. *n.* 1. *Kniph. cent.* 3. *n.* 91. *Weig. obſ.* 31. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 36. *t.* 21. * *Wangenh. amer.* 119.

α. *carnea* foliis lanceolatis, racemis ſubſpicatis, petalis carneis, cortice ramorum luteſcente. *Ait. l. c.*

S. caulibus fruticoſis, foliis ovato-lanceolatis undique ſerratis glabris, racemis duplicatis terminalibus. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 136.

S. Theophraſti forte. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 80.

Frutex ſpicatus, foliis ſerratis ſalignis. *Bauh. pin.* 475.

Spiraea ſalicis folio longiore ſerrato, floribus rubris.

Amm. ruth. 265. *Tournef. inſt.* 618. *Du Ham arb.* 2. *t.* 75.

β. *alpeſtris*, foliis lanceolatis obtuſis ſimpliciter ſerratis caneſcentibus, racemis ſubſpicatis breviſſimis, petalis carneis. W.

Spiraea ſalicifolia β. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 36. *t.* 22.

S. ſalicis folio breviore latiuſculo crenato, floribus rubris. *Amm. ruth. p.* 188. *t.* 28.

γ. *paniculata*, foliis lanceolatis, racemis paniculatis divaricatis, petalis albis, cortice ramorum rubro. *Ait. Kew.* 2. *p.* 198.

S. (*alba*) foliis lanceolatis acutis apice ſerratis, floribus duplicato-racemoſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 430

S. (*alba*) caulibus fruticoſis, foliis cuneato-lanceolatis, ſuperne ſerratis glabris, racemis duplicatis terminalibus. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 137.

S. foliis lanceolatis acute ſerratis, floribus paniculatis, caule fruticoſo. *Mill. dict. ic.* 171. *t.* 257. *f.* 2.

δ. *latifolia*, foliis ovato-oblongis, racemis paniculatis, petalis albis, cortice ramorum rufeſcente. *Ait. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 657.

Weidenblättrige Spierſtaude. W.

Habitat in Sibiria, Tartaria β. *in alpibus* Sibiriae, γ *et* δ *in* America *boreali.* ♄ (v. v.)

3. SPIRAEA *calloſa.*

S. foliis lanceolatis acutis ſerratis ſubvilloſis, panicula decompoſita ſubfaſtigiata. *Thunb. jap.* 209. *

S. (*japonica*) fruticoſa, caule pubeſcente, foliis lanceolatis acutis ſerratis nudis, corymbo terminali compoſito. *Lin. ſuppl.* 262.

Japaniſche Spierſtaude. W.

Habitat in Japonia, ♄

Differt a S. tomentoſa: foliis *villoſis, nec tomentoſis, floribus paniculatis*; *a S. ſalicifolia* :foliis *manifeſte petiolatis ellipticis acutioribus longioribus*, ſerraturis *foliorum remotis*, panicula *faſtigiata nec ſpicata*, foliis *ſubtus*, caule *et* pedunculis *villoſis*. Thunb. l. c.

4. SPIRAEA *tomentoſa.*

S. foliis lanceolatis inaequaliter ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus duplicato-racemoſis. *Mill. dict. n.* 5. *Du Ham. arb.* 6. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 433. *Wangenh. amer.* 118. * *Willd. arb.* 371. *

Ulmaria pentacarpos, integris ſerratis foliis parvis ſub-

tus incanis, virginiana. *Pluk alm.* 393. *t.* 321. *f.* 5. *Raj. ſuppl.* 330. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 323.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 658.
Filzige Spierſtaude. W.
Habitat in Philadelphia. *Kalm.* ♄ (v. v.)

Differt a praecedenti: Foliis *magis profunde et inaequaliter ſerratis, ſubtus valde tomentoſis adeoque caſſis,* Racemo *terminali compoſito denſiori longiori,* Floribus *demum magis rubris, et* Corollis *octuplo minoribus.* Fructus *villoſi.*

5. SPIRAEA *argentea.*
S. fruticoſa, racemis compoſitis, foliis ſericeis cuneiformibus lineatis, apice ſerratis ſubplicatis. *Lin. ſuppl.* 261.
Silberglänzende Spierſtaude. W.
Habitat in Nova Granada. *Mutis.* ♄

Frutex *ramis ſtriatis erectis, ramulis brevibus.* Folia *alterna petiolata lanceolata cuneiformia utrinque albo-ſericea lineata apice ſerrata.* Racemi *compoſiti terminales ramulis longiores.* Flores *reliquis ſpeciebus minores pentagyni, germinibus villoſis.*

*6. SPIRAEA *alpina.*
S. foliis lineari-lanceolatis denticulatis glaberrimis, corymbis lateralibus. W.
S. foliis lanceolatis ſerrulatis glabris, corymbis terminalibus. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 35. *t.* 20. *
Spiraeae crenatae varietas. *Georgi itin. p.* 217.
Alpen-Spierſtaude. W.
Habitat in Sibiriae *alpinis ſylvaticis frigidis* Transbaicalenſibus *et circa lacum* Baical. ♄

7. SPIRAEA *hypericifolia.*
S. foliis obovatis integerrimis, umbellis ſeſſilibus. *Hort. upſ.* 131. *Mill. dict. n.* 3. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 434. *Wangenh. amer.* 119. *Willd. arb.* 372. *
S. foliis integerrimis, pedunculis ſimplicibus. *Hort. cliff.* 190. *Roy. lugdb.* 277.
S. hypericifolio non crenato. *Tournef. inſt.* 618. *Du Ham. arb.* 3.
Pruno ſylveſtri affinis canadenſis. *Bauh. pin.* 517. *Pluk. alm.* 408. *t.* 218. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 659.
Johanniskrautblättrige Spierſtaude. W.
Habitat in Canada. ♄ (v. v.)

8. SPIRAEA *chamaedrifolia.*

S. foliis obovatis apice inciſo-dentatis, corymbis pedunculatis. *Willd. arb.* 372. *

S. foliis ovatis inciſo-ſerratis glabris, umbellis pedunculatis. *Sp. pl.* 701. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 432.

S. foliis oblonge ovatis, ſupra ſaepe crenatis, pedunculis ſimplicibus. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 189.

Spiraea chamaedryos foliis. *Amm. ruth.* 269.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 659.

Gamanderblättrige Spierſtaude. W.

Habitat in Sibiria, Hungaria. ♄ (v. v.)

*9. SPIRAEA *ulmifolia.*

S. foliis ovato-lanceolatis duplicato-dentatis, corymbis pedunculatis. *Willd. arb.* 372. *

S. (*ulmifolia*) fruticoſa, foliis ovatis acutis planis duplicato-dentatis, corymbis florum terminalibus. *Scop. carn. n.* 600. *t.* 22.

Spiraea chamaedrifolia. *Iacq. hort.* 2. *t.* 140.

S. (*betulifolia*) foliis lato-ovatis ſerratis, corymbis terminalibus compoſitis faſtigiatis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 33. *t.* 16.

S. foliis ovatis crenatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 189.

Rüſterblättrige Spierſtaude. W.

Habitat in Carniolia, Sibiria. ♄ (v. v.)

Diverſiſſima a praecedente, foliis *ovato-lanceolatis groſſe duplicato-dentatis, nec obovatis apice tantum inciſis,* floribus *majoribus,* cauleque *altiore.* W.

10. SPIRAEA *crenata.*

S. foliis obovatis acutis apice dentatis trinerviis, corymbis confertis pedunculatis. W.

S. foliis oblongiuſculis apice ſerratis, corymbis lateralibus. *Mill. dict. n.* 4. *Gouan. illuſtr.* 31? *Gmel. it.* 1. *p.* 112. *Kniph. cent.* 11. *n.* 94. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 35. *t.* 19. *

S. hiſpanica, hyperici folio crenato. *Barr. rar.* 1376. *t.* 564?

S. hyperici folio ampliore, modo integro modo dentato. *Amm. ruth.* 270.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 660.

Gekerbte Spierſtaude. W.

Habitat in Sibiria, Hungaria. (v. ſ.)

Folia *ovato-oblonga, alia apic crenata ſ. ſerrata,*

alia integerrima. Corymbi *terminales, perfectiſſimi, albi, totum fruticem ſua copia niveum reddentes.*

Varietas hiſpanica mihi diverſa videtur. Differt haec a S. chamaedifolia, qua cum ſaepius confuſa: foliis *apice ſerratis, trinerviis, nec apice inciſis venoſis,* corymbis *confertioribus ſubcapitatis,* floribus *parum minoribus.* W.

11. SPIRAEA *triloba.*

S. foliis ſubrotundis ſubcordatis obtuſe-lobatis dentatis, umbellis pedunculatis. W.

S. foliis lobatis crenatis, umbellis terminalibus. *Mant.* 244. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 33. *t.* 17.*

S. ramoſiſſima, parvo ſubrotundo opuli folio. *Amm. ruth.* 271.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 661.

Dreylappige Spierſtaude. W.

Habitat in Sibiriae *alpibus* Altaicis. *D. Laxmann.* ♄

Frutex *ramis teretibus.* Folia *alterna, pitiolata, ſubrotunda, lobata, obtuſa, crenata, laevia.* Umbellae *terminales, ſolitariae: Pedunculis numeroſis, uniflo-ris, aequalibus.* Flos *pedunculatus, praeterea unus alterne ex alis foliorum ſummis.* Stamina *corollis breviora.*

*12. SPIRAEA *thalictroides.*

S. foliis obovatis obtuſis ſubtrilobis, umbellis lateralibus ſeſſilibus. W.

S. (*thalictroides*) foliis oblongis lobatis, umbellis ſeſſilibus. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 34. *t.* 18.*

Spiraea aquilegifolia. *Pall. itin.* 3. *app.* 834. *n.* 94. *tab. P. fig.* 3.

S. foliis variis per faſciculos congeſtis. *Amman. ruth. p.* 188.

Thalictrumartige Spierſtaude. W.

Habitat in alpibus Davuricis Sibiriae. ♄

Folia *ſubtus glauca ſubtiliſſime trinervia. Habitus S. hypericifoliae ſed* foliis *diſtinctiſſima.* W.

13. SPIRAEA *opulifolia.*

S. foliis ovatis trilobis ſerratis, corymbis pedunculatis. W.

S. foliis lobatis ſerratis, corymbis terminalibus. *Syſt. veg.* 393. *Willd. arb.* 374.*

S. foliis inciſis angulatis: floribus corymboſis. *Hort.*

cliff. 190. *Gron. virg.* 55. *Roy. lugdb.* 277. *Mill. dict. n.* 2. *Willich. obſ. n.* 37. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 436. *Wangenh. amer.* 119.
S. opuli folio. *Tournef. inſt.* 618. *Du Ham. arb.* 5.
Evonymus virginiana, ribeſii folio, capſulis eleganter bullatis. *Comm. hort.* 1. *p.* 169. *t.* 87.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 661.
Schneeballblättrige Spierſtaude. W.
Habitat in Virginia, Canada. (v. v.)]
Trigyna, arborea.

14. SPIRAEA *ſorbifolia.*
S. foliis pinnatis; foliolis uniformibus ſerratis caule fruticoſo, floribus paniculatis. *Sp. pl.* 702. *Mill. dict. n.* 6. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 190. *t.* 46. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 436. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 38. *t.* 24.* *Willd. arb.* 375.*
S. foliis pinnatis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 352.*
S. ſorbi folio tenuiter crenato, floribus in thyrſo albis. *Amm. ruth.* 186.
β. *alpina* caule ſuffruticoſo, floribus corymboſis duplo majoribus. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 34. *t.* 25.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 662.
Ebereſchenblättrige Spierſtaude. W.
Habitat in Sibiriae *orientalis et* Camtſchatcae *uliginoſis, varietas* β. *ad lacum* Baical. ♄ (v. v.)

* * *Herbaceae.*

15. SPIRAEA *Aruncus.*
S. foliis ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus dioicis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 192. *Crantz. auſtr. p.* 109. *Scop. carn. n.* 601. *Pollich. pal. n.* 479. *Kniph. cent.* 3. *n.* 89. *Hoffm. germ.* 173. *Roth. germ. I.* 216. *II.* 551.
S. foliis bipinnatis, floribus hermaphroditis maſculisque. *Gouan. illuſtr.* 31.
Filipendula dioica, foliis duplicato-pinnatis, pinnis quinquefoliis, trifoliis et ſimplicibus. *Hall. helv. n.* 1134.
Aruncus. *Hort. cliff.* 463. *Roy. lugdb.* 278. *Gron. virg.* 121.
Barba caprae floribus oblongis. *Bauh pin.* 163.
Barba caprae. *Cam. hort.* 26. *t.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 132.
Geisbart-Spierſtaude. W.
Habitat in Auſtriae, Alvorniae, Germaniae *montanis; in* Pyrenaeis. ♃ (v.v.)

Vidit hanc plantam ſemper polygamo - monoicam. *Gouan. l. c.* R.

Trigyna. Capſula *ſubdiſperma.*

16. SPIRAEA *Filipendula.*

S. foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus corymboſis. *Mat. med.* 128. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 191. *n.* 52. *Crantz. auſtr. p.* 109. *n.* 3. *Scop. carn. n.* 602. *Pollich. pal. n.* 480. *Fl. dan. t.* 935. *Ludw. ect. t.* 60. *Blackw. t.* 467. *Kniph. cent.* 3 *n.* 90. *Hoffm. germ.* 174. *Roth. germ. I.* 216. *II.* 552.

Filipendula foliis pinnatis, minimis intermixtis, extrema trilobata. *Hall. helv. n.* 1136

Filipendula foliis pinnatis: foliolis uniformibus. *Hort. cliff.* 191. *Fl. ſuec.* 404., 439. *Roy. lugdb.* 277.

Filipendula vulgaris. *Bauh. pin* 163.

Filipendula. *Cam. epit.* 608.

β. Filipendula minor. *Bauh. pin.* 167. *prodr.* 85.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 133.

Knollige Spierſtaude. W.

Habitat in Europae *paſcuis et ſylvis.* ♃ (v. v.)

17. SPIRAEA *Ulmaria.*

S. foliis pinnatis ſubtus tomentoſis, impari majore trilobo, lateralibus indiviſis, corymbis proliferis. W.

S. foliis pinnatis: impari majore lobato floribus cymoſis. *Fl. lapp.* 201. *Hort. cliff.* 191. *Fl. ſuec.* 405, 440. *Mat. med.* 129 *Roy. lugdb.* 277. *Oed. dan. t.* 547. *Crantz. auſtr. p.* 109. *Scop. carn n.* 603. *Pollich. pal. n.* 481. *Ludw. ect.* 23. *Kniph. cent.* 1. *n.* 84. *Hoffm. germ.* 174. *Roth. germ. I.* 216. *II.* 553.

Filipendula foliis pinnatis, pinnis acute ſerratis, minimis intermiſtis, extrema trilobata maxima. *Hall. helv. n.* 1135.

Ulmaria. *Cluſ. pann.* 700. *Blackw. t.* 465.

Barba caprae floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.

Regina prati. *Dod. pempt.* 57.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 135.

Sumpf-Spierſtaude. W.

Habitat in Europae *pratis uliginoſis, umbroſis.* ♃ (v. v.)

*18. SPIRAEA *digitata.* W.

S. foliis pinnatis ſubtus tomentoſis, impari majore ſeptemlobo, lateralibus quinquelobis, corymbo ramoſo coarctato. W.

S. (*palmata*) herbacea, foliis pinnatis, impari palmato multifido, floribus cymoſis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 40. *t.* 27.* *itin.* 3. *app.* 735. *n.* 95. *tab. Q. fig.* 1.
S. folio impari majore multifido. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 192.
Ulmaria foliis profunde laciniatis. *Amman. ruth.* 74.
Fingerblättrige Spierſtaude. W.
Habitat in ſubalpinis humidis Srbiriae *orientalis.* ♃
Similis ſequenti, tamen diſtincta: foliis *ſubtus tomentoſis*, laciniis *acuminatis*, floribus *albis in corymbo coarctato ramoſo.* W.

19. SPIRAEA *lobata.*
S. foliis pinnatis, glabris, impari majore ſeptemlobo, lateralibus trilobis, corymbis proliferis. W.
Spiraea lobata. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 472. *Iacq. hort.* 1. *p.* 38. *t.* 88.
S. (*palmata*) foliis pinnatis, impari lateralibusque lobabatis biſerratis, floribus cymoſis. *Lin. ſuppl.* 262.
S. (*palmata*) foliis pinnato-ternatis, foliolo impari quinquelobo-palmato. *Syſt. veg. ed.* 13. *p.* 393.
Houttüyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 137.
Rothblütige Spierſtaude. W.
Habitat in America *boreali?* ♃ (v. v.)
Statura et facies S. Ulmariae. Radix *odorata*, Herba *inodora.* Folia *fere S. Ulmariae, foliolis lobatis.* Flores *rubri.* Fructus *S. Filipendulae nec contortus ſed rectus.*

*20. SPIRAEA *camtſchatica.*
S. foliis quinquelobis, petiolis auriculatis, caule hirſuto, corymbis proliferis. W.
S. herbacea, foliis ſimpliciter palmatis, petiolis appendulatis, caule hirſuto, floribus cymoſis. *Pall. roſſ.* 1. *p.* 41. *t.* 28.*
S. foliis multifidis angulatis, fructibus erectis hiſpidis, petiolis appendiculatis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 192.
Camtſchatiſche Spierſtaude. W.
Habitat in Camtſchatca *et* Beringii *inſula.* ♃
Petiolus *appendicibus ſubrotundis foliaceis ſuperne eſt inſtructus. Affinis videtur ſequenti.* W.

*21. SPIRAEA *palmata.*
S. foliis palmatis ſerratis, panicula ſupradecompoſita. *Thunb. jap.* 212.
Fünflappige Spierſtaude. W.
Habitat in Japonia. ♃

Caulis *herbaceus ſtriatus erectus totus glaber.* Folia *alterna petiolata palmata inciſo-quinqueloba vel ſeptemloba glabra, ſubtus pallida venoſo-reticulata palmaria.* Lobi *oblongi acuminati acute et duplicato-ſerrati.* Petiolus *ſtriatus, folio quadruplo brevior.* Flores *terminales albi vel rubri paniculati.* Panicula *ſupradecompoſita. Hanc floribus rubris tetragynam inveni. Differt a S. opulifolia, cui* foliis *proxime accedit*: foliis *quinque-vel ſeptemlobatis*, ſerraturis *acutis*, panicula *decompoſita*, caule *herbaceo.* Thunb. l. c.

22. SPIRAEA *trifoliata.*

S. foliis ternatis ſerratis ſubaequalibus, floribus ſubpaniculatis. *Sp. pl.* 702. *Mill. dict. n.* 7. *et ic. t.* 256.

Filipendula foliis ternatis. *Hort. cliff.* 191, *Hort. upſ.* 131. *Roy. lugdb.* 277. *Gron. virg.* 55.

Ulmaria major trifolia, flore amplo pentapetalo, virginiana. *Pluk. alm.* 393. *t.* 236. *f.* 5. *Raj. ſuppl.* 330.

Ulmaria virginiana trifolia, floribus candidis amplis longis et acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 323.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 137.

Dreyblättrige Spierſtaude. W.

Habitat in Virginia, Canada. ♃ (v. v.)

POLYGYNIA.

997. ROSA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 863.

Petala 5. *Cal.* urceolatus, 5-fidus, carnoſus, collo coarctatus. *Sem.* plurima, hiſpida, calycis interiori lateri affixa.

* *Germinibus ſubgloboſis.* (†)

*1. ROSA *berberifolia.*

R. germinibus globoſis pedunculisque aculeatis, caule aculeis ſubgeminatis uncinatis, foliis ſimplicibus ſubſeſſilibus. W.

(†) *Tubus calycis, germinis inferi formam in Roſis mentiens, dicitur a Linnaeo perperam germen. Terminum non mutavi, quum Botanophilis hujus ſenſus pateat.* W.

R. (*berberifolia*) ſpinis recurvatis, foliis ſimplicibus ſeſſilibus, ſpinae geminae interjectis. *Pall. Nov. Act. petrop.* 10. *p.* 379. *t.* 10. *f.* 5. *

R. (*ſimplicifolia*) foliis ſimplicibus. *Saliſb. prod. ſtirp. hort. ad Chapel allerton. p.* 359. * *Juſſ. gen. ed Uſt.* 372.

Einfachblättrige Roſe. W.

Habitat in Perſia *boreali.* ♄

Caulis *pubeſcens aculeis validis uncinatis ſubgeminatis.* Folia *ab omnibus hucusque cognitis Roſis diſtincta, ſimplicia ovata breviſſime petiolata dentata glauca.* Pedunculi *in ramulis terminales breves uniflori pubeſcentes aculeisque aliquot obſiti.* Germen *globoſum aculeis numeroſis tectum.* Petala *obovata flava macula punicea ad baſin notata.* W.

2. ROSA *lutea.*

R. germinibus globoſis pedunculisque glabris, calycibus petiolisque ſpinuloſis, aculeis ramorum rectis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 200. *Willd. arb.* 303. *

R. (*Eglanteria*) germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſparſis rectis, petiolis ſcabris, foliolis acutis. *Sp. pl.* 703. *Scholl. barb. n.* 399. *Moench haſſ. n.* 418. *Kniph. cent.* 7. *n.* 77. *Leyſ. hall. n.* 489. *Hoffm. germ.* 174. *Roth. germ. I.* 217. *II.* 553. *Retz. obſ.* 1. *p.* 20.

R. (*lutea*) caule aculeato, foliis pinnatis, foliolis ovatis ſerratis utrinque glabris; pedunculis breviſſimis. *Mill. dict. n.* 11.

R. (*lutea*) calycibus ſemipinnatis, germinibus globoſis pedunculisque glabris: foliolis ovatis glabris ſerratis, ſerraturis petiolisque villoſis glanduloſis: caule aculeato. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 344.

R. (*chlorophylla*) foliis obovatis duplicat[illegible] glanduloſis glutinoſis nitide-virentibus, peti[illegible]atis, ſtipulis ſerraturis glanduloſis, pedunculis g[illegible], germinibus ſubgloboſis glabris, laciniis calycinis ſemipinnatis glanduliferis. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 69.

Roſa foetida. *Allion pedem. n.* 1792.

Roſa lutea. *Dalech. hiſt.* 126. *Lob. ic.* 2. *p.* 209. *Tabern. hiſt.* 1495. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 47.

R. lutea ſimplex. *Bauh. pin.* 483. *Du Ham. arb.* 36. *Beſl. eyſt. vern.* 6. *t.* 5. *f.* 1.

β. Roſa bicolor. *Iacq. hort.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *et* 3. *p.* 1.

R. (*punicea*) calycibus integris, germinibus globoſis glanduloſis, pedunculis glabris, foliolis ovatis glabris ſer-

ratis, ſerraturis petiolisque glanduloſis, floribus bicoloribus. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 347.
Roſa punicea. *Corn. canad.* 11.
R. ſylveſtris auſtriaca flore phoeniceo. *Park. theatr.* 1019.
Gelbe Roſe. W.
Habitat in Germania, Anglia. ♄ (v. v.)
Flores *flavi.* Folia *odoratiſſima.*

*3. ROSA *ſulphurea.*

R. germinibus globoſis, petiolis cauleque aculeatis, aculeis caulinis duplicibus majoribus, minoribusque numeroſis, foliis ovalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 201. *Willd. arb.* 305. *
R. (*glaucophylla*) foliolis obovatis, ſimpliciter ſerratis eglanduloſis pubeſcentibus glaucis, petiolis aculeatis, ſtipulis laceratis ſerratis, ſerraturis glanduloſis, pedunculis glabris, germinibus hemiſphaericis glanduloſis, laciniis calycinis ſemipinnatis glanduliferis. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 69.
R. lutea multiplex. *Bauh. pin.* 483. *Du Ham. arb.* 37. *Hort. angl. p.* 66. *t.* 18. *Knorr. del.* 1. *t. R. Du Roi. harbk.* 2. p. 346.
R. flava pleno flore. *Cluſ. cur. poſt.* 6.
Schwefelgelbe Roſe. W.
Habitat in Oriente. ♄ (v. v.)

*4. ROSA *blanda.*

R. germinibus globoſis glabris, caulibus adultis pedunculisque laevibus inermibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 202.
Hudſonsbay-Roſe. W.
Habitat in Terra Nova *et ſinu* Hudſonis. ♄ (v. ſ.)
Caules *adulti laeves inermes, juniores ſeu primi anni aculeis rectis ſubreflexis tenuibus armati.* Rami *teretes inermes nitidi rubicundi.* Folia *pinnata.* Foliola *plerumque ſeptem oblonga argute et ſubaequaliter ſerrata glabra.* Petioli *glabri, perumque una alterave ſpinula armati.* Ait. l. c.

5. ROSA *cinnamomea.*

R. germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſtipularibus, petiolis ſubinermibus. *Sp. pl.* 703. *Mill. dict. n.* 21. *Leers. herb. n.* 381. *Hoffm. germ.* 174. *Roth. germ. I.* 217. *II.* 554.
R. calycibus integris: germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſtipularibus: petiolis villo-

ſis, foliolis ſubrotundis villoſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 348.

R. (*collincola*) foliolis ovalibus obtuſis pubeſcentibus eglanduloſis, ſubtus cinereis, petiolis ſubaculeatis, pedunculis ſubſolitariis glaberrimis, germinibus globoſis glaberrimis, laciniis calycinis ſubulatis apice ſaepe foliaceis pubeſcentibus erectis. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 70.

R. (*majalis*) germinibus globoſis, pedunculis petiolisque inermibus, caule aculeis geminis axillaribus, calycibus integris ſpathulatis. *Hermann Diſſ. de Roſa p.* 8. *n.* 3. *Retz. obſ.* 3. *p.* 33. *

R. (*foecundiſſima*) germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, aculeis axillaribus ovato-oblongis ſubtus villoſis. *Roth. germ. I.* 218. *II.* 557. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 343.

R. minor rubello flore, quae vulgo a Menſe Majo, majalis dicitur. *C. Bauh. pin.* 483. *Rupp. jen.* 139.

R. odore cinnamomi ſimplex. *Bauh. pin.* 438. *Du Ham. arb.* 33.

R. cinnamomea, floribus ſubrubentibus, ſpinoſa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 39.

R. ſaxatilis flore ruberrimo. *Cam. epit.* 99.

β. R. (*fluvialis*) germinibus globoſis, pedunculis petiolisque inermibus, caule aculeis ſparſis, foliolis ovatis acutis, calycibus linearibus inciſis. *Retz. prod. ſcand. ed* 2. *n.* 619. *Fl. dan. t.* 868.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 665.
Zimmt-Roſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

6. ROSA *arvenſis.*

R. germinibus ſubgloboſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule repente petiolisque aculeatis, floribus ſubſolitariis. W.

R. germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis, floribus cymoſis. *Mant.* 245. *Hudſ. angl* 192. *Scholl. barb. n.* 400 *Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. I.* 217. *II.* 554.

R. (*Herporhodon*) caulibus plerisque repentibus, aculeis ſparſis recurvis, foliolis ſeptenis ovatis glabris, petiolis aculeatis, pedunculis hiſpidis, germinibus ſubgloboſis glabris, ſegmentis calycinis ſubpinnatifidis, ſtylis pubeſcentibus longitudine ſtaminum. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 71.

R. (*ſylveſtris*) germinibus ovatis glabris, pedunculis ſcabris, calycis foliolis ovatis ſubintegris tenuique mucrone terminatis, ſtylis elongatis, caule petiolisque aculeatis. *Roth. catalect.* 1. *p.* 59. * *Herm. diſſ. Roſa. p.* 10. *n.* 5. *Pollich. pal. n.* 485.

R. ſpinis recurvis, foliis glabris ſeptenis, calycibus tomentoſis, ſegmentis ſubpinnatis, tubis longis barbatis. *Hall. helv. n.* 1102.

R. ſpinoſiſſima. *Oed. dan. t.* 398.

R. aruenſis candida. *Bauh. pin.* 484.

R. ſylveſtris altera minor, flore albo. *Raj. angl.* 3. *p.* 455.

R. canpeſtris repens alba. *Bauh. pin.* 484.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 665.

Feld-Roſe. W.

Habitat in Anglia, Suecia, Helvetia, Germania, Dania. ♄ (v. v.)

7. ROSA *pimpinellifolia.*

R. germinibus globoſis pedunculisque glabris, caule aculeis ſparſis rectis, petiolis ſcabris, foliolis obtuſis. *Sp. pl.* 703. *Pall. it.* 2. *p.* 517. *Hoffm. germ.* 176. *Willd. arb.* 308. *Retz. obſ.* 4. *p.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 666.

Pimpinellenblättrige Roſe. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

8. ROSA *ſpinoſiſſima.*

R. germinibus globoſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatiſſimis. *Sp. pl.* 705. *Pollich. pal. n.* 487. *Scholl. barb. n.* 401. *Mill. dict. n.* 2. *Leers. herb. n.* 384. *Grim. fl. iſen. nov. Act. A. N. C. tom.* 3. *app. p.* 323. *Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. I.* 217. *II.* 555.

R. ſpinis rectis, confertis, foliis novenis, glabris, pinnis et petiolis ſubſpinoſis. *Hall. helv. n.* 1106.

R. germinibus globoſis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeis confertis. *Crantz auſt. p.* 84.

R. calycibus integris: germinibus globoſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatiſſimis: foliolis lanceolato-ovatis ſerratis glabris. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 339.

R. caule petiolisque aculeatis calycis foliolis indiviſis. *Fl. ſuec.* 407. 442.

R. campeſtris ſpinoſiſſima, flore albo odorato *Bauh. pin.* 483.

R. campeſtris odora. *Cluſ. hiſt.* 1. p. 116.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 5. p. 666.
Vielſtachliche Roſe. W.
Habitat in Germaniae, Helvetiae *collibus.* ♄ (v. v.)

Caulis *aculeis ſubulatis, rectis, horizontalibus, confertiſſimis, inaequalibus.* Foliola *minuta, obovata, nonena.* Petioli *inermes.* Pedunculi *nunc inermes, nunc aculeati.* Fructus *globoſus, maturus niger!* Germina *baſi ſaepius aculeata.* Petala *alba, baſi flaveſcentia.*

Varietas *R. pimpinellifoliae ſecundum Hallerum.*

*9. ROSA *parviflora.*

R. germinibus depreſſo-globoſis pedunculisque hiſpidis, petiolis pubeſcentibus ſubaculeatis, caule glabro, aculeis ſtipularibus rectis, foliolis ellipticis, floribus ſubgeminatis. *Willd. arb.* 309. *

R. (*parviflora*) caule aculeis rectis ſtipularibus, foliis pinnatis, foliolis elliptico lanceolatis, ſimpliciter ſerratis glabris, petiolis ſubaculeatis, ſtipulis ſerratis, pedunculis hiſpidis, germinibus globoſis hiſpidis, foliolis calycinis hiſpidis. *Ehrh. Beitr.* 4. p. 21.

R. (*carolina*) calycibus ſubintegris petalis longioribus, germinibus globoſis, pedunculisque ſubhiſpidis, caule aculeis rectis ſtipularibus, petiolis glabris, foliis ovatis ſerratis glabris. *Du Roi. harbk.* 2. p. 355.

R. (*penſylvanica*) germinibus globoſis hiſpidis, aculeis ſtipularibus geminis, foliolis ovatis acutis medio ſerratis, ſubtus albicantibus, flore pleno. *Wangenh. amer. p.* 113.

Roſa humilis. *Marſh. arb.* 285.
Kleinblumige Roſe. W.
Habitat in America *boreali.* ♄ (v. v.)

Haec binis ſequentibus eſt ſimillima, differt vero: caule *bipedali*, petiolis *ſuperne piloſis,* floribus *geminatis. R. lucida vero eſt diſtincta:* caule 4-*ſ.* 5-*pedali,* petiolis *glabris*, foliis *nitidis*, floribus *geminatis. Denique R. carolina eſt diverſa:* caule 5-*ſ.* 6-*pedali,* foliis *opacis nunquam nitidis, magis lanceolatis, et* floribus *corymboſis.* W.

*10. ROSA *lucida.*

R. germinibus depreſſo-globoſis pedunculisque ſubhiſpidis, petiolis glabris ſubaculeatis, caule glabro, aculeis ſtipularibus rectis, foliolis oblongo-ellipticis nitidis glabris, floribus ſubgeminatis. *Willd. arb.* 310. *

R. (*lucida*) foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis obtu-

ſiuſculis groſſe ſerratis glaberrimis nitidis, petiolis ſubaculeatis glabris, corymbis paucifloris, pedunculis ſubhiſpidis, germinibus depreſſo-globoſis ſubhiſpidis, foliolis calycinis integris. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 11.

R. carolina fragrans, foliis mediotenus ſerratis. *Dill. elth.* 325. *t.* 245. *f.* 316.

Glänzende Roſe. W.

Habitat in America *boreali.* ♄ (v. ſ.)

11. ROSA *carolina.*

R. germinibus globoſis pedunculisque ſubhiſpidis, petiolis piloſis ſubaculeatis, caule glabro, aculeis ſtipularibus ſubuncinatis, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus corymboſis. *Willd. arb.* 311. *

R. germinibus globoſis hiſpidis, pedunculis ſubhiſpidis, caule aculeis ſtipularibus, petiolis aculeatis. *Sp. pl.* 703. *Wangenh. amer.* 112. *t.* 31. *f.* 71.

R. germinibus globoſis pedunculisque hiſpidis, petiolis aculeatis, caule glabro, aculeis ſtipularibus, foliis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 203. (*excluſis varietatibus*).

R. (*corymboſa*) foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis acutis argute ſerratis, ſubtus pubeſcentibus glaucis, petiolis ſubaculeatis piloſis, corymbis multifloris planis, pedunculis pubeſcentibus apice ſubhiſpidis, germinibus globoſis ſubhiſpidis, foliolis calycinis integris. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 21.

R. (*virginiana*) calycibus integris petalis longioribus, germinibus globoſis hiſpidis, pedunculis glabris, petiolis carinatis villoſis, foliolis ovatis glabris, floribus umbellatis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 353.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 667.

Caroliniſche Roſe. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄ (v. v.)

Caulis *laevis. Aculei ſtipulares, duo.* Folia *foliolis 7, oblongo-ovatis, glabris, ſerratis, ſubtus pallidioribus. Petiolis aculeatis.* Pedunculi *plures, ramoſi, inermes, adſperſi pilis glanduloſis.* Calycis *foliola indiviſa ſubtus hiſpida.* Petala *obcordata, rubicunda.* Flos *ſerotinus.*

12. ROSA *villoſa.*

R. germinibus globoſis pedunculisque hiſpidis, caule aculeis ſparſis, petiolis aculeatis, foliis tomentoſis. *Sp. pl.* 704. *Mill. dict. n.* 3. *Leers. herb. n.* 385. *Pollich pal n.* 483. *Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. I.* 217. *II.* 556. *Retz. obſ.* 1. *p.* 19.

R. ſpinis rectis, foliis quinis tomentoſis, pinnis rotundis, ſpinoſis. *Hall. helv. n.* 1105.

R. calycibus ſemipinnatis: germinibus globoſis pedunculisque hiſpidis: caule petiolisque aculeatis: foliolis ovatis tomentoſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 341.

R. foliis utrinque villoſis, fructu ſpinoſo. *Flor. ſuec.* 2. *p.* 1295. *

R. pomo ſpinoſo, folio et caule hirſuto. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 38. *Hall.* R.

R. ſylveſtris pomifera major. *Bauh. pin.* 484. *Du Ham. arb.* 42.

β. R. (*molliſſima*) germinibus ſubglobosis glabris pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, foliis tomentoſis. *Willd. prod. n.* 1237.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 667.

Weichhaarige Roſe. W.

Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Caulis *laevis, aculeis ſub genicula* 2. *ſ.* 4. *approximatis.* Folia *obtuſa, tomentoſa.* Pedunculi *hiſpidi.* Germina *hiſpida.* Petala *rubra.*

*13. ROSA *rugoſa.*

R. germinibus globoſis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatis, foliis ſubtus tomentoſis. *Thunb. jap.* 213.

Runzliche Roſe. W.

Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus.* Rami *teretes ſubtomentoſi aculeati, aculeis majoribus minoribusque denſiſſimis patentibus albis.* Folia *pinnata cum impari quadrijuga.* Foliola *ovata obtuſa cum acumine ſerrata, ſupra viridia rugoſa, ſubtus tomentoſa venoſo-rugoſa pollicaria.* Petiolus *tomentoſus aculeatus, aculeis ſparſis patulis albis.* Calyx *intus tomentoſus extus hirſutus.* Germen *globoſum. Differt facile ab omnibus Roſae ſpeciebus:* Foliolis *obtuſis cum acumine rugoſis tomentoſis.* Ramis *maxime aculeato-hiſpidis.* Thunb. l. c.

*14. ROSA *provincialis.*

R. germinibus ſubrotundis, pedunculis petiolisque hiſpidis, aculeis ramorum ſparſis ſubreflexis, foliolis ovatis ſubtus villoſis, ſerraturis glandulosis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 204. *Willd. arb.* 314. *

R. (*provincialis*) calycibus ſemipinnatis, germinibus

globoſis, pedunculis petioliſque hiſpidis, foliis ovato-acuminatis ſubtus villoſis, ſerraturis glanduloſis. *Du harbk.* 2. *p.* 349.

β. foliis floribusque duplo minoribus. W.

Roſa provinicalis varietas. *Curt. mag.* 407.

Roſe de Champagne. *Hortulan.*

Provencer Roſe. W.

Habitat in Bohemia, Italia, Hiſpania, Gallia. ♄ (v. v.)

Varietas β. differt caule foliis et floribus duplo minoribus, ceterum convenit ſtructura omnium partium. W.

** *Germinibus ovatis.*

15. ROSA *centifolia.*

R. germinibus ovatis pedunculiſque hiſpidis. caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus. *Sp. pl.* 704. *Mat. med. p.* 128. *Mill. dict. n.* 14. *Kniph. cent.* 1. *n.* 75. *Knorr. del.* 1. *t. R. Regn. bot. Willd. arb.* 315. *

R. crule aculeato pedunculis hiſpidis, calycibus ſemipinnatis glabris. *Sp. pl.* 1. *p.* 91.

R. calycibus ſemipinnatis: germinibus ovatis pedunculiſque hiſpidis: caule hiſpido aculeato: petiolis glanduloſis: foliolis ovatis ſerratis ſubtus piloſis. *Du Roi harbk.* 2. *p.* 367.

R. multiplex media. *Bauh. pin.* 482. *Du Ham. arb.* 15.

R. centifolia batavica. 11. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 114.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 669.

Garten-Roſe. W.

Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Flos *quaſi tornatus.*

Varietates numeroſiſſimae in omnibus hortis coluntur. W.

16. ROSA *gallica.*

R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hiſpido-aculeatis. *Sp. pl.* 704. *Gmel. tub. p.* 148. *Blackw. t.* 82. *Regn. bot. Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. I.* 218. *II.* 359. *Willd. arb.* 315.

R. (*auſtriaca*) germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, petiolis medioque caule aculeatis. *Crantz. auſtr. p.* 86. R.

R. calycibus ſemipinnatis: germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis; caule petiolisque hiſpido-aculeatis: foliolis ovatis ſubtus villoſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 363.

R. rubra multiplex. *Bauh. pin.* 481. *Du Ham. arb.* 2. *t.* 53.
R. rubra flore ſemipleno. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 34.
β. Roſa *gallica, verſicolor.*
R. praeneſtina variegata plena. *Mill. dict. t.* 221. *f.* 2.
R. verſicolor. *Bauh. pin.* 481.
Roſa praeneſtina alba et verſicolor. *Bauh. pin.* 2. *p.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 669.
Zucker-Roſe. W.
Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Caulis *laevis ſ. parum aculeatus.* Pedunculi *hiſpidi.* Folia *ſupra nuda, ſubacuta, ſubtus vix tomentoſa.* Germen *ovatum, baſi hiſpidum.* Flores *rubri ſ. albi.*

*17. ROSA *damaſcena.*

R. calycibus ſemipinnatis, germinibus ovatis turgidis pedunculisque hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, foliolis ovatis acuminatis ſubtus villoſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 369. *Ait. Kew.* 2. *p.* 205. *Willd. arb.* 316. *Retz. obſ.* 3. *p.* 33.
Damaſcener Roſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄ (v. v.)

18. ROSA *ſempervirens.*

R. germinibus ovatis calycibus pedunculisque hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, floribus ſubumbellatis, bracteis lanceolatis reflexis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 205.
R. germinibus globoſis pedunculisque hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, floribus ſubumbellatis. *Sp. pl.* 704. *Mill. dict. n.* 9. *Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. I.* 218. *II.* 556.
R. caule aculeato, foliis quinis glabris perennantibus. *S. pl.* 1. *p.* 92.
R. germinibus globoſis pedunculisque hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, foliolis lanceolatis ſubcarnoſis perennantibus. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 358.
R. ſempervirens Iungermanni. *Cluſ. hiſt.* 2. *app. alt. Dill. elth.* 326. *t.* 246. *f.* 318.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 868.
Immergrüne Roſe. W.
Habitat in Germania. ♄ (v. v.)

19. ROSA *pumila.*

R. germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, petiolis cauleque aculeato, foliis ſubtus glaucis, ſerraturis glanduloſis fructibus pyriformibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 206.

R. germinibus ovatis, petiolis pedunculisque hiſpidis, caule ſuperne aculeatiſſimo. *Lin. ſuppl.* 262. *Iacq. auſt.* 2. *p.* 59. *t.* 198. *Allion. pedem. n.* 1802.
R. ſylveſtris pumila rubens. *Bauh. pin.* 483.
Roſa VI. pumila. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 117.
Niedrige Roſe. W.
Habitat in Auſtira, Italia. ♄ (v. ſ.)

Ramuli *aculeis copioſiſſimis, qui in caulibus decidunt. Fructus magni pyriformes.*

*20. ROSA *turbinata.*

R. germinibus turbinatis pedunculisque piloſis, petiolis villoſis, aculeis ſparſis recurvis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 206.
R. (*campanulata*) caule aculeis recurvis, foliis villoſis, petiolis aculeatis, pedunculis hiſpidis, calyce hiſpido, tubo campaniformi. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 97.
R. inapertis floribus, alabaſtro craſſiore, francofurtenſis quibusdam. *Tournef. inſt. p.* 639. ?
Roſa francofurtana. *Munchh. hausv.* 5. *p.* 24.
Kreiſelförmige Roſe. W.
Habitat in Europa. ♄

21. ROSA *rubiginoſa.*

R. germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, petiolis cauleque aculeatis, aculeis recurvis, foliolis ovatis ſubtus glanduloſo-piloſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 206. *Willd. arb.* 317.
R. germinibus globoſis aculeatisque, aculeis recurvis, foliis ſubtus rubiginoſis. *Mant.* 564. *Iacq. auſt.* 1. *p.* 31. *t.* 50. *Hoffm. germ.* 174. *Roth. germ. I.* 218. *II.* 558. *Retz. obſ.* 1. *p.* 20.
R. caule aculeis ſparſis recurviuſculis, foliis pinnatis ſubtus glanduloſo-hiſpidis rubiginoſis, foliolis ovatis duplicato-ſerratis, petiolis aculeatis, pedunculis glanduloſo-hiſpidis, germinibus ovatis ſubhiſpidis, foliolis calycinis ſemipinnatis. *Ehrh. Beitr.* 4. *p.* 22.
R. (*Eglanteria*) calycibus ſemipinnatis, germinibus globoſis glabris, pedunculis petiolisque hiſpidis glanduloſis, caule aculeis ſparſis curvis, foliolis ſubrotundis ſerraturis glanduloſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 336.
Roſa Eglanteria. *Mill. dict. n.* 4. *Gouan. hort.* 245. *Herm. diſſ. de Roſa p.* 17. *n.* 12.
Roſa ſuavifolia. *Lightfoot ſcot.* 262. *Fl. dan. t.* 870.
R. ſpinis aduncis, foliis ſubtus rubiginoſis. *Hall. helv. n.* 1103.

R. ſylveſtris foliis odoratis. *Bauh. pin.* 483.
R. ſylveſtris odorata. *Dod. pempt.* 187.
R. eglanteria. *Tabern. ic.* 1087.
R. foliis odoratis Eglantina dicta. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 41.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 664.
Wein-Roſe. W.
Habitat in apricis Europae. ♄ (v. v.)

Ramis *laeves, ſed aculei ſparſi majores recurvi.* Folia *ſepteno-pinnata ovata acuta ſparſa, ſubtus atomis reſinoſis purpuraſcentibus.* Petioli *hiſpidi, aculeis minutis recurvis, uti Bracteae glandulis minutis pedicellatis.* Germen *ſubgloboſum, rarius aculeolis praeſertim baſi.* Penduculus *aculeis minutiſſimis.* Flos *purpureus.*

*22. ROSA *muſcoſa.*

R. germinibus ovatis, calycibus pedunculis petiolis ramulisque hiſpidis glanduloſo-viſcoſis, ſpinis ramorum ſparſis rectis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 207. *Willd. arb.* 318.
R. (*muſcoſa*) calycibus ſemipinnatis, germinibus ovatis, pedunculis foliorumque ſerraturis hiſpido-viſcidis, caule petiolisque aculeatis, foliolis ovatis ſerratis glabris. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 368. *Curt. mag.* 69.
R. rubra plena ſpinoſiſſima, pedunculo muſcoſo. *Mill. ic.* 148. *t.* 221. *f.* 1.
R. provincialis ſpinoſiſſima pedunculo muſcoſo. *Hort. angl.* 66. *t.* 18.
Moos-Rose. W.
Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Hybrida ſine dubio proles, an a R. provinciali orta? W.

*23. ROSA *moſchata.*

R. germinibus ovatis pedunculisque villoſis, caule petiolisque aculeatis, foliolis oblongis acuminatis glabris, paniculis multifloris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 207. *Willd. arb.* 819.
R. foliolis quinis ovatis ſerratis acutis laevibus, floribus corymboſis, calycibus oblongis, laciniis integris. *Desfont. fl. atlant.* 1. *p.* 400. *
R. calycibus ſemipinnatis glanduloſis, germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, foliolis ovatis acuminatis glabris, floribus corymboſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 365.
R. (*Opſoſtemma*) caulibus erectis, foliolis ellipticis acu-

minatis glabris, coſta pubeſcente, petiolis aculeatis, corymbis multifloris, pedunculis hiſpidis, germinibus ovatis hiſpidis, laciniis calycinis ſemipinnatis ſubglanduloſis hiſpidis, longitudine petalorum, ſtylis pubeſcentibus longitudine ſtaminum. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 72.
R. moſchata minor flore ſimplici. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 45.
Biſam-Roſe. W.
Habiat in ſepibus Barbariae. ♄ (v. v.)
Colitur a Tunetanis. Oleum eſſentiale odoratiſſimum e petalis deſtillatione obtinent. Desfont. l. c.

*24. ROSA *rubrifolia.*
R. germinibus ovatis pedunculisque glabris glauceſcentibus, petiolis aculeatis, caule aculeis ſparſis uncinatis, foliolis oblongis argute ſerratis glabris, floribus ſubcorymboſis. W.
R. (*rubrifolia*) petiolis ſpinoſis, foliolis 7-9 glabris acutis, germinibus umbellatis glabris, calycibus foliaceis. *Villars. delph.* 3. *p.* 549.
Rothblättrige Roſe. W.
Habitat in montibus Delphinatus, Helvetiae, Salisburgae. ♄ (v. ſ.)
Foliorum *venae ſubtus rubrae.* Caulis pedunculi *et* germina *rore glauco tecta.* W.

*25. ROSA *lagenaria.*
R. germinibus obovatis glabris, pedunculis petiolisque glanduloſo-hiſpidis, caule inermi, foliolis ovalibus glabris. W.
R. (*lagenaria*) germinibus oblongis collo attenuatis, foliolis novenis ellipticis ſerratis, fructibus ſubcymoſis pendulis. *Villars. delph.* 3. *p.* 553.
Keulenfrüchtige Roſe. W.
Habitat in montibus Delphinatus, Helvetiae. ♄ (v. ſ.)
Sequentibus affinis, ſed germine *obovato aliisque notis diſtincta, a R. pumila diverſa:* foliis *ſubtus non glaucis*, petiolis caule*que inermibus.* W.

26. ROSA *alpina.*
R. germinibus ovatis glabris, pedunculis petiolisque hiſpidis, caule inermi. *Gmel ſib.* 3. *p.* 177. *Iacq. auſtr. t.* 279. *Willd. arb.* 320. *Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. II.* 559.
R. inermis, foliis ſeptenis glabris, calycis ſegmentis indiviſis. *Hall. helv. n.* 1107.

R. (*inermis*) germinibus ovatis, caule pedunculisque glabris inermibus, petiolis ſcabris. *Turra. diar. Act. p.* 128.

R. (*inermis*) caule inermi, pedunculis hiſpidis, calycis foliolis indiviſis, fructibus oblongis. *Mill. dict. n.* 6.

R. (*rupeſtris*) germinibus glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque inermibus. *Crantz. auſtr. p.* 85. *n.* 6. R.

R. campeſtris, ſpinis carens, biflora. *Bauh. pin.* 484.

R. [illegible] flore ſimplici non ſpinoſo. *Bauh. hiſt. p.* 39.

R. [illegible]oſa. *Hall. opuſ.* 218.

Houtt[illegible] Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 670.

Alpen-Roſe. W.

Habitat in alpibus Helvetiae. ♄ (v. v.)

Folia *glabra*. Calyces *ſimplices*. Petala *obcordata biloba*.

*27. ROSA *pyrenaica*.

R. germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis coloratis, petiolis hiſpido-aculeatis, calycibus omnino foliofis. *Gouan. illuſt.* 31. *t.* 19. *

Roſa hiſpida. *Krock. ſileſ. n.* 783.

Pyrenäiſche Roſe. W.

Habitat in Pyreneicis, Helveticis, Sileſiacis *alpibus*. ♄ (v. ſ.)

28. ROSA *pendulina*.

R. inermis, germinibus oblongis, pedunculis petiolisque hiſpidis, caule ramisque glabris, fructibus pendulis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 208. *Willd. arb.* 322.

R. germinibus ovatis glabris, pedunculis cauleque hiſpidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis. *Sp. pl.* 705. *Du* Roi. *harbk.* 2. *p.* 371.

R. ſanguiſorbae majoris folio, fructu longo pendulo. *Dill. elth.* 325. *t.* 245. *f.* 317.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 671.

Hängende Roſe. W.

Habitat in America *boreali*. ♄ (v. v.)

*29. ROSA *montana*.

R. germinibus oblongis pedunculisque hiſpidis, petiolis aculeatis, caule aculeis ſtipularibus uncinatis, foliolis glabris obovatis glanduloſo-ſerratis. W.

R. (*montana*) petiolis aculeatis, foliis ſeptenis ſubrotundis, germinibus hiſpidis, calycibus piſtillisque perſiſtentibus villoſis. *Villars. delph.* 3. *p.* 547. *

Habitat in montibus Delphinatus, Helvetiae ♄ (v. ſ.)

Petiolus *aculeatus pilisque glanduliferis raris praecipue baſin verſus obſitus.* Foliola *orbiculato-obovata glabra concoloria duplicato-ſerrata, ſerraturis glanduloſis.* Caulis *glaber aculeis plerumque gemini uncinatis ſub foliorum ortu.* Petala *obcordata alba.* W.

*30. ROSA *multiflora.*

R. germinibus ovatis pedunculisque inermibus villoſis, caule petiolisque aculeatis. *Thunb. jap.* 214.

Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruticoſus erectus ramoſus.* Rami *teretes purpurei aculeati glabri erecti.* Aculei *ſparſi recurvi.* Folia *alterna petiolata pinnata.* Foliola *oppoſita, rarius alterna ſeſſilia ovata ſerrata, ſupra viridia glabra, ſubtus pallida villoſa.* Petioli *villoſi aculeati, aculeis ſparſis minutis recurvis.* Flores *terminales paniculati, magnitudine florum Rubi.* Panicula *decompoſita patens.* Pedunculi *et* Pedicelli *villoſi inermes.* Calyx *valde hirſutus villo albo, imprimis margine.* Corolla *alba.* Germen *villoſum ovatum inerme. Differt optime ab omnibus aliis Roſis:* floribus *parvis paniculatis,* pedunculis *villoſis.* Thunb. l. c.

31. ROSA *canina.*

R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Mat. med.* 129. *Pollich. pal. n.* 186. *Fl. dan. t.* 555. *Ludw. ect. t.* 70. *Blackw. t.* 8. *Kniph. cent.* 7. *n.* 76. *Hoffm. germ.* 176. *Roth. germ. I.* 218. *II.* 560. *Willd. arb.* 321.

R. ſpinis aduncis, foliis ſeptenis, calycibus tomentoſis, ſegmentis pinnatis et ſemipinnatis, tubis breviſſimis. *Hall. helv. n.* 1101.

R. calycibus ſemipinnatis villoſis, germinibus ovatis pedunculisque glabris: petiolis ſubhiſpidis: foliolis ovatis mucronatis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 359.

R. caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis. *Fl. ſuec.* 406, 441.

R. ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483.

R. canina vulgo dicta. *Dod. pempt.* 187.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 670.

Hecken-Roſe. W.

Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Caulis *laevis: internodiis aculeis* 2 *alternis.* Petioli

aculeati. Folia *acutiuſcula, nuda.* Pedunculi *glabri.* Germen *glabrum.* Petala *biloba, incarnata.* Bracteae 2 *oppoſitae, ciliatae.*

*32. ROSA *collina.*

R. germinibus ovatis ſubglabris, pedunculis petiolisque glanduloſo-hirſutis, caule aculeato. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 474. *Iacq. auſt.* 2. *t.* 197. *Hoſt. ſynop.* 280.

Hügel-Roſe. W.

Habitat in collibus Auſtriae. ♄ (v. ſ.)

Folia *ſubtus villoſa.* W.

*33. ROSA *parvifolia.*

R. germinibus ovatis ſubglabris, pedunculis glanduloſis, petiolis cauleque tenuiſſime aculeatis, foliolis rugoſis ſubtus villoſiuſculis ovatis glanduloſo-ſerratis. W.

R. (*parvifolia*) aculeis rectis minutis, foliis rugoſis glanduloſis, ſubtus villoſis, petiolis aculeatis, pedunculis glanduloſis, calycis tubo ovato nudiuſculo. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 97.

Burgunder Roſe. W.

Habitat in Europa. ♄ (v. v.)

Frutex *pygmaeus.* Flores *parvi.* Foliola *quina parva ovata acuta.* W.

34. ROSA *ſemperflorens.*

R. germinibus oblongis pedunculisque hiſpidis, caule petiolisque aculeato-hiſpidis, foliis ſubternatis aculeatis. W.

R. (*ſemperflorens*) caule aculeato, foliis ſubternis, pedunculisque ſubunifloris aculeatis hiſpidis, calycis foliolis integris. *Curt. mag.* 284.

R. (*ſinica*) germinibus ſubgloboſis glabris, pedunculis aculeatis hiſpidis, caule petiolisque aculeatis, calycinis foliolis lanceolatis ſubpetiolatis. *Syſt. veg.* 394.?

Immerblütige Roſe. W.

Habitat in China. ♄ (v. v.)

Flores *ſaturate rubri.* Calycis *laciniae apice foliaceae, unica reliquis majore.* Germina *et* Pedunculi *interdum at rarius glabri.* W.

*35. ROSA *chinenſis.*

R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, petiolis cauleque aculeatis, foliolis ovato-lanceolatis ſubternatis ſerrulatis glabris. W.

R. (*chinenſis*) germinibus ovatis, pedunculis, foliolisque utrinque glabris, ramis petiolisque aculeatis. *Iacq. obſ. 3. p. 7. t. 55.* *
Chineſiſche Roſe. W.
Habitat in China. ♄
Valde affinis praecedenti; an varietas? W.

36. ROSA *indica.*
R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule ſubinermi, petiolis aculeatis. *Sp. pl.* 705.
R. ſubinermis, foliolis quinis ſubtus tomentoſis: impari majori, ſtipulis obſoletis. *Sp. pl.* 1. *p.* 402.
R. cheuſan glabra, juniperi fructu. *Petiv. gaz.* 57. *t.* 35. *f.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 671.
Indiſche Roſe. W.
Habitat in China. ♄
Rami *inermes; rarius armati una alterave ſpina tenuiſſima verſus folia vel in petiolis.* Folia *pinnata: foliolis quinis, ſubtus tomentoſis, ſupra glabris, ſerratis: extimo duplo majore.* Pedunculi *longi, nudi, ſimplices.* Calyx *inciſus, laevis.* Fructus *magnitudine Sorbi aucupariae.*

*37. ROSA *longifolia.* W.
R. germinibus ovatis glabris, pedunculis glanduloſo-ſubaculeatis, caule ſubinermi, petiolis aculeatis, foliolis glabris ovatis acuminatis. W.
Langblättrige Roſe. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Caulis *forte magnus, glaber absque aculeis, videtur itaque ex toto inermis, ramis pedalibus.* Folia *pinnata:* Foliolis *quinis ovatis acuminatis utrinque glabris remote ſimpliciter ſerratis, lateralibus ſesquiuncialibus, terminali biunciali.* Petiolus *pilis glanduliferis ſparſis ſuperne inferne, uno alterove aculeo uncinato obſitus.* Flores *magnitudine R. caninae ſubcorymbſi.* Pedunculi *pilis apice glanduliferis hiſpidi.* Germen *oblongum glabrum.* Calycis *foliola apice foliacea acuminata dentata externe glabriuſcula, interne tomentoſa. A praecedente mihi diverſa videtur.* W.

*38. ROSA *bracteata.*
R. germinibus obovatis, pedunculis bracteatis, ramulisque villoſis, caule petiolisque aculeatis, foliolis glabris ſubrotundis crenatis ſubaculeatis. W.

R. (*bracteata*) germinibus pyriformibus ſericeis bracteatis, caule ſericeo aculeato, foliis pinnatis aculeatis, foliolis ovatis crenatis glabris ſubaculeatis, floribus ſolitariis. *Wendl. obſ. p.* 50. *
Bebläuterte Roſe. W.
Habitat in China. ♄ (v. v.)

Caulis *villoſus aculeis ſparſis rectis.* Folia *pinnata, foliolis quinis ſeu ſeptenis ſubrotundo-ellipticis ſubcoriaceis obtuſis crenatis glabris, ſuperne nitidis.* Flores *fragrantes terminales ſolitarii.* Pedunculus *breviſſimus bracteis lanceolatis germen obovatum tegentibus ſericeo-villoſis, obſitus.* Calycis *foliola indiviſa ovato-lanceolata acuminata ſericeo-villoſa.* Petala *albo-flaveſcentia obcordata.* I.

39. ROSA *alba.*

R. germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatis. *Mat. med.* 129. *Mill. dict. n.* 16. *Crantz. auſtr. p.* 85. *n.* 5. *Willd. arb.* 322. *Knorr. del:* 1, *t. R.* 6. *Roth. germ. I.* 219. *II.* 561. *Retz.* 3. *p.* 34. *Hoffm. germ.* 176.

R. caule aculeato, pedunculis hiſpidis, calycibus ſemipinnatis glabris. *Sp. pl.* 1. *p.* 492.

R. calycibus ſemipinnatis: germinibus ovatis glabris: pedunculis hiſpidis: caule petiolisque villoſis aculeatis: foliolis ovatis ſubtus villoſis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 361.

R. alba vulgaris major. *Bauh. pin.* 482. *Du Ham. arb.* 16.

R. ſativa. 1. *Dod. pempt.* 186.

β. R. alba flore pleno. *Beſl. eyſt. vern.* 6. *t.* 3. *f.* 1. *Blackw. t.* 73. *Kniph. cent.* 3. *n.* 76.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 672.
Weiſse Roſe. W.
Habitat in Europa, Auſtria. ♄ (v. v.)

998. RUBUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 864.

Cal. 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* compoſita acinis monoſpermis.

* *Fruteſcentes.*

*1. RUBUS *roſaefolius.*

R. foliis quinato-pinnatis ternatisque utrinque viridi-

bus, caule petioliſque aculeatis, floribus ſolitariis. *Smith. ic. ined. faſc. 3. p. 60 t. 60.* *

Roſenblättrige Himbeere. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

Foliola *ovato-lanceolata utrinque viridia ſubpiloſa.* Pedunculi *ſolitarii in ramorum apice foliis oppoſiti.* W.

*2. RUBUS *pinnatus.* W.

R. foliis quinato-pinnatis ternatisque rugoſis, utrinque glabris, caule petiolis pedunculisque aculeatis, racemo terminali. W.

Gefiederte Himbeere. W.

Habitat - - - - ♄ (v. ſ.)

Rami *villoſi virides aculeis uncinatis obſiti.* Folia *quinato-pinnata, ſuperiora ternata.* Foliola *ovato-lanceolata viridia utrinque glabra rugoſo-venoſa argute duplicato-ſerrata, ut petioli ſubtus, ad coſtam mediam aculeta.* Racemus *terminalis ſimplex.* Pedunculi *villoſi valde aculeati.* Calycis *villoſi petalis longiores. Affinis videtur ſequenti, ſed flores hermaphroditi, et racemus terminalis.* W.

*3. RUBUS *auſtralis.* †

R. fruticoſus dioicus, foliis ternatis quinato-pinnatisque, caule petioliſque aculeatis racemis axillaribus ſimplicibus. *Forſt. prodr. n.* 224.

Südliche Himbeere. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

4. RUBUS *Idaeus.*

R. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. ſuec.* 408, 446. *Mat. med. p.* 130. *Crantz. auſtr. p.* 81. *Willd. arb.* 323. *Pollich. pal. n.* 488. *Scop. carn. n.* 611. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 376. *Hoffm. germ.* 177. *Blackw. t.* 289. *Knorr. del.* 2. *t. R.* 1. *Roth. germ. I.* 219. *II.* 562.

R. caule erecto hiſpido, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 204. *Hort. cliff.* 192. *Hort. upſ.* 133. *Roy. lugdb.* 273.

R. caule ſpinoſo, ſubrecto, foliis quinatis et ternatis, ſubtus tomentoſis, fructibus hirſutis. *Hall. helv n.* 1108.

R. idaeus ſpinoſus. *Bauh pin.* 479. *Du Ham. arb.* 9.

β. Rubus idaeus fructu albo. *Bauh. pin.* 479. *Du Ham. arb.* 10.

γ· Rubus idaeus laevis. *Bauh. pin.* 479.
R. (*glaber*) foliis ternatis, ſubtus tomentoſis, caule glabro. *Mill. dict. n.* 4. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 673.
Gemeine Himbeere. W.
Habitat in Europae *lapidoſis.* ♄ (v. v.)

5. RUBUS *occidentalis.*

R. foliis ternis ſubtus tomentoſis, caule aculeato, petiolis teretibus. *Sp. pl.* 706. *Kalm. it.* 2. *p.* 283. *Mill. dict.n.* 5. *Willd. arb.* 324.
R. caule ſuberecto leviter aculeato, foliis ternatis, fructu nigro. *Gron. virg.* 2. *p.* 78.
R. idaeus, fructu nigro, virginianus. *Dill. elth.* 327. *t.* 287. *f.* 319.
R. americanus magis erectus, ſpinis rarioribus, ſtipite caeruleo. *Pluk. alm.* 325.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 675.
Schwarze Himbeere. W.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♄ (v. v.)

Caulis *teres, laevis, aculeis recurvis, nebula caerulea obductus.* Petioli *teretes aculeis recurvis.* Folia *ternata intermedio pedicellato, ovata, inciſo-ſerrata, ſubtus albo-tomentoſa.* Racemus *terminalis.* Fructus *niger; variat etiam fructu rubro, magis acido et grato quam R. idaei.* Differt *imprimis a R. idaeo cui ſimillimus:* Foliis *ſaepius ternis, quamvis lateralia foliola ſaepe duo evadant et tum ternatis, nec pinnatis:* Foliolis *lateralibus ſaepius angulatis:* Aculeis *alternis, recurvis, nec ſparſis et confertis.* Petioli *etiam aculeati, ſed primo intuitu nebula caerulea caulis dignoſcitur.*

*6. RUBUS *triphyllus.*

R. foliis ternatis ſubtus tomentoſis, foliolis ovatis inciſis dentatis, ramis petiolis pedunculisque villoſis aculeatisque. *Thunb. jap.* 215.
Dreyblättrige Himbeere. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *ſuffruticoſus glaber aculeatus.* Rami *debiles flexuoſo-erecti aculeati villoſi.* Folia *petiolata ternata.* Foliola *obovata ſubangulata inciſa dentata, dentibus magnis ſubſetiferis, ſupra glabra, ſubtus tomentoſo-alba.* Petioli *et* Pedunculi *villoſi aculeato-hiſpidi.* Flo-

res in ramulis terminales ſubpaniculati. Calyces *tomentoſi hiſpidi.* Thunb. l. c.

*7. RUBUS *tomentoſus.* W.

R. foliis ternatis obovatis acutis inaequaliter dentatis utrinque tomentoſis, lateralibus ſubinciſis. W.

Filzige Himbeere. W.

Habitat in Germania, Helvetia. ♄ (v. f.)

Rami *glabri ſtriati aculeis uncinatis ſparſis obſiti.* Folia *ternata utrinque tomentoſa mollia.* Foliola *lateralia obovata acuta groſſe inaequaliter dentata, latere exteriore ſublobata; terminale obovatum acutum baſi integerrimum.* Aculei *parvi in petiolis, coſta foliorum et pedunculis.* Flores *albi in apice ramorum paniculati.* Calycis *foliola tomentoſa reflexa.* Petala *obovata calyce duplo longiora. A R. fruticoſo eſt diverſiſſimus nec cum R. occidentali convenit, ſub quo nomine ſpecimen accepi.* W.

8. RUBUS *hiſpidus.*

R. foliis ternatis nudis, caulibus petiolisque hiſpidiſſimis, ſtrigis rigidulis. *Syſt. veg.* 395. *Mill. dict. n.* 7.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 675.

Vielſtachliche Himbeere. W.

Habitat in Canada. *Kalm.* ♄

Caules *viticulis longis, procumbentibus lignoſis, una cum petiolis adſperſi ſetis regidis.* Folia *ternata, nuda, inciſo-ſerrata; intermedio pedicellato;* Pedunculi *etiam hiſpidi.*

9. RUBUS *parvifolius.*

R. foliis ternatis ſubtus tomentoſis, caule hirto petiolisque aculeis recurvis. *Sp. pl.* 707.

R. moluccanus parvifolius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 88. *t.* 47. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 676.

Kleinblättrige Himbeere. W.

Habitat in India. *Osbeck.* ♄

Caules *fruticoſi, teretes, tomentoſi aculeis reflexis copioſis.* Folia *ſubtus albo-tomentoſa, venoſa, petiolis ſubtus recurvato-aculeatis.* Calyces *tomentoſi, in racemum digeſti.*

*10. RUBUS *ſanctus.*

R. foliis ternatis ſimplicibusque ſubtus tomentoſis, caule petiolisque aculeis recurvis. *Schreb. dec. p.* 15. *t.* 8. *

R. creticus triphyllus, flore parvo. *Tournef. cor.* 43.

Heilige Himbeere. ♄
Habitat in Creta, Tauria, Paläſtina. ♄

11. RUBUS *jamaicenſis.*

R. foliis quinatis ternatisve ſubtus tomentoſis, caule petiolis foliisque pubeſcentibus recurvato-aculeatis, paniculis diffuſis. *Swartz obſ.* 205.

R. foliis ternatis ſubtus tomentoſis, caule petiolis foliisque pubeſcentibus recurvato-aculeatis. *Mant.* 75.

R. aculeatus, foliis digitato-quinatis ſerratis, ſubtus argenteis. *Brown. jam.* 342.

R. foliis longioribus ſubtus molli lanugine obductis et incanis, flore et fructu minoribus. *Sloan. jam.* 2. *p.* 109. *t.* 213. *f.* 1. *Raj. dendr.* 76.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 676.
Weſtindiſche Himbeere. W.
Habitat in Jamaica *proximisque.* ♄

Differt a R. parvifolio: Caule *non incano, ſed in junioribus laeviter pubeſcente, alias nudo.* Caulis *ut in R. fruticoſo.* Folia *ternata, ſupra laevia, ſubtus albo-tomentoſa, inciſo-ſerrata.* Aculei *in caule, petiolis et coſta foliorum.*

Differt a R. fruticoſo: Foliis *inciſo-ſerratis,* Coſtis *aculeatis*, Paniculis *terminalibus diffuſis.* Floribus *et* Baccis *parvis.* Swartz l. c.

12. RUBUS *caeſius.*

R. foliis ternatis ſubnudis: lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Hort. cliff.* 192. *Fl. ſuec.* 410, 445. * *Roy. lugdb.* 273. *Mill. dict. n.* 2. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 375. *Scop carn. n.* 612. *Pollich. pal. n.* 489. *Willd. arb.* 325. *Hoffm. germ.* 177. *Roth. germ. I.* 219. *II.* 563.

R. caule aculeato proſtrato, foliis ternatis. *Hall. helv. n.* 1110.

R. repens, fructu caeſio. *Bauh. pin.* 479.
R. minor. *Dod. pempt.* 742.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 677.
Kriechende Himbeere. W.
Habitat in Europae *dumetis.* ♄ (v. v.)

Folia *ſubtus non tomentoſa, quamvis ſaepe pubeſcentia.* Caulis *inter ſtrigoſitatem adſperſus aculeis tenuiſſimis.*

13. RUBUS *fruticoſus.*

R. foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque

aculeatis. *Fl. ſuec.* 409, 444. * *Mill. dict. n.* 1. *Scop. carn. n.* 613. *Pollich. pal. n.* 490. *Kniph. cent.* 5. *n.* 77. *Willd. arb.* 326. *Hoffm. germ.* 177. *Roth. germ. I.* 220. *II.* 564.

R. caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *Hort. cliff.* 192. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273.

R. caule ſpinoſo, ſerpente, foliis quinatis et ternatis, ſubtus tomentoſis, baccis laevibus. *Hall. helv. n.* 1109.

R. foliis ternatis et quinatis, coſta ſpinoſa, fructu nigro et laevi. *Crantz auſt. p.* 82. *n.* 2.

R. foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 372.

R. vulgaris ſ. Rubus fructu nigro. *Bauh. pin.* 479. *Du Ham. arb.* 1. *Blackw. t.* 45.

Rubus. *Cam. epit.* 751.

β. R. vulgaris major, fructu albo. *Raj. angl.* 3. *p.* 467.

γ. R. flore albo pleno. *Magn. hort.* 175.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 677.

Strauchartige Himbeere. W.

Habitat in ſepibus praeſertim maritimis Europae. ♄ (v. v.)

Caulis *ſubangulatus, longiſſimus.* Folia *vel utrinque viridia; vel ſubtus alba et tomentoſa.*

*14. RUBUS *villoſus.*

R. foliis quinatis ellipticis acuminatis argute ſerratis utrinque villoſis, caulibus petiolisque aculeatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 210.

Haarige Himbeere. W.

Habitat in America *boreali.* ♄

15. RUBUS *canadenſis.*

R. foliis digitatis denis quinis ternatisque, caule inermi. *Sp. pl.* 707. *Mill. icon. t.* 223.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 679.

Canadiſche Himbeere. W.

Habitat in Canada, *Kalm.*

Caulis *ſubpurpureus.* Foliola *lanceolata, utrinque nuda, tenuiſſima, argute, ſerrata.* Bracteae *lanceolatae.* Stipulae *lineares, aculeatae.*

16. RUBUS *odoratus.*

R. foliis ſimplicibus palmatis, caule inermi multifolio multifloro. *Hort. cliff.* 192. * *Hort. upſ.* 133. *Roy.*

lugdb. 274. *Mill. dict. n.* 6. *et ic. t.* 223. *Willd. arb.* 326.

R. foliis quinquelobis inaequaliter ſerratis: caule inermi multifolio multifloro. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 379.

R. odoratus. *Corn. canad.* 149. *t.* 159. *t.* 150. *Du Hamel. arb.* 14.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 679.

Wohlriechende Himbeere. W.

Habitat in Canada. ♄ (v. v.)

17. RUBUS *moluccanus.*

R. foliis ſimplicibus cordatis ſublobatis, caule aculeato decumbente. *Sp. pl.* 707. *Thunb. jap.* 219.

Rubus moluccanus latifolius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 88. *t.* 47. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 680.

Moluccaniſche Himbeere. W.

Habitat in Amboina. ♄

Flores *paniculati.* Petala *calyce breviora.* Germina *hirſuta.* Styli *ſtaminibus longiores.* Folia *ſubtus tomentoſa.*

18. RUBUS *microphyllus.*

R. fruticoſus, aculeatus glaber, foliis ſimplicibus cordatis ovatis obtuſis ſublobatis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Lin. ſuppl.* 263.

R. (*palmatus*) foliis cordatis palmato-trilobis glabris, caule petiolisque aculeatis. *Thunb. jap.* 217. *

Ki Itſigo. *Kaempf. amoen.* 787.

Lappige Himbeere. W.

Habitat in Japonia. ♄

Similis R. parvifolio, ſed ille tomento caneſcit et habet folia ſemper ternata ſubtus alba. Caules *glaberrimi teretes rarius aculeati.* Folia *parva petiolata cordata obtuſa ſubtriloba ſerrata inermia.* Petioli *et* Pedunculi *inermes.* Flores *parvi magnitudine Potentillae.*

*19. RUBUS *inciſus.*

R. foliis ſimplicibus cordatis inciſis glabris, caule erecto aculeato. *Thunb. jap.* 217.

Eingeſchnittene Himbeere. W.

Habitat in Japonia. ♄

Caulis *fruteſcens erectiuſculus glaber purpureus aculeatus, aculeis ſparſis patentibus.* Rami *cauli ſimiles,*

aculeis frequentibus. Folia *e gemma plura petiolata cordata ovata rotundata raro acuta inciſa ſublobata ſerrata nervoſa, nervis elevatis, utrinque glabra, inermia pollicaria.* Petioli *glabri recurvato-aculeati patentes longitudine foliorum.* Pedunculi *capillares inermes et aculeati glabri longitudine petiolorum.* Flores *axillares pedunculati ſolitarii.* Calyx *extus glaber, intus albo-tomentoſus.* Thunb. l. c.

20. RUBUS *japonicus.*

R. fruticoſus inermis glaberrimus, foliis ſimplicibus cordatis oblongis acuminatis duplicato-ſerratis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Lin. ſuppl.* 263.

R. foliis ſimplicibus cordatis oblongis ſerratis, caule inermi ſuffruticoſo. *Mant.* 245.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 680.

Japaniſche Himbeere. W.

Habitat in Japonia. ♄

Frutex *humilis.* Caulis *erectus. laevis, angulatus, parce ramoſus.* Folia *alterna, petiolata, ſimplicia, ovata, ſ. ovato-oblonga, acuminata, acuta, duplicato-ſerrata, utrinque laevia.* Pedunculus *filiformis, longitudine corollae, terminalis, ſolitarius.* Flos *magnitudine Fragariae:* Petalis *ſubrotundis, albis.* Calyx *parvus.*

Frutex *inermis glaberrimus.* Folia *valde acuminata exacte duplicato-ſerrata.* Petala *calyce multo majora.* Suppl. l. c.

21. RUBUS *corchorifolius.*

R. fruticoſus aculeatus tomentoſus, foliis ſimplicibus oblongis cordatis ſerratis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Lin. ſuppl.* 263.

R. (*villoſus*) foliis ſimplicibus cordatis acutis aculeatis, caule erecto petiolisque aculeatis. *Thunb. jap.* 218. *

Corchorusblättrige Himbeere. W.

Habitat in Japonia *inter* Miaco *et* Jedo. ♄

Frutex *in caule, petiolis et raro ſub foliis aculeatus.* Caulis, Folia *ſubtus,* Petioli, Pedunculi, Calycesque *tomento cani.* Petala *calyce vix longiora.*

*22. RUBUS *elongatus.*

R. foliis ſimplicibus cordatis acuminatis duplicato-crenatis ſubtus tomentoſis, caule aculeato, calycibus obtuſis. *Smith. ic. ined. faſc.* 3. *p.* 62. *t.* 62. *

Langriſpige Himbeere. W.

Habitat in Java. ♄

Paniculae *ramis elongatis flexuoſis paucifloris.* Pedunculis *ſubgeminatis.* W.

*23. RUBUS *pyrifolius.*

R. foliis ſimplicibus ovalibus acuminatis ſerratis nudis, caule aculeato paniculato, petalis minutis. *Smith. ic. ined. faſc.* 3. *p.* 61. *t.* 61.

Birnenblättrige Himbeere. W.

Habitat in Java. ♄

Panicula *ampla e corymbis compoſita.* Petala *calyce quadruplo breviora.* W.

* * *Herbacei.*

*24. RUBUS *pedatus.*

R. foliis pedato-quinatis inciſis, pedunculis filiformibus medio bracteatis, calycibus glabriuſculis. *Smith. ic. ined. faſc.* 3. *p.* 63. *t.* 63.

Anemonenartige Himbeere. W.

Habitat in Americae *borealis tractu occidentali.* ♃

Facies *a Rubis aliena ob folia pedata, convenit potius habitu cum Anemonis et Helleboris.* W.

25. RUBUS *ſaxatilis.*

R. foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. *Fl. ſuec.* 411, 447. *Iacq. vind.* 245. *Oed. dan. t.* 134. *Mill. dict. n.* 8. *Crantz. auſtr. p.* 82. *Scop. carn. n.* 614. *Pall. it.* 1. *p.* 72. *Willd. arb.* 327. *Hoffm. germ.* 177. *Roth. germ. I.* 220. *II.* 565.

R. caule herbaceo, foliis glabris, ternatis, acinis paucissimis. *Hall. helv. n.* 1111.

R. caule repente annuo, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 206. *Roy. lugdb.* 274.

R. ſaxatilis alpinus. *Cluſ. pann.* 115. 116.

Chamaerubus ſaxatilis. *Bauh. pin.* 480.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 138.

Stein-Himbeere. W.

Habitat in Europae *collibus lapidoſis.* ♃ (v. v.)

26. RUBUS *arcticus.*

R. foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 412. 448. * *Mat. med.* 130. *Mill. dict. n.* 9. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 179. *n.* 22. *Flor. dan. t.* 488. *Willd. arb.* 327.

R. caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t.* 5. *f.* 2. *Hort. cliff.* 292. *Roy. lugdb.* 274.

R. humilis, flore purpureo. *Buxb. cent. 5. p. 13. t. 26. mala.*
R. trifolius humilis non ſpinoſus, ſapore et odore fragariae, fructu rubro polycocco. *Amm. ruth.* 185.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 139.
Nordiſche Himbeere. W.
Habitat in Bothnia Sueciae, Sibiria, Canada. ♃ (v. v.)

*27. RUBUS *trifidus.*
R. foliis ſimplicibus inciſo-trifidis glabris, caule inermi. *Thunb. jap.* 217.
Dreytheilige Himbeere. W.
Habitat in Japonia *prope* Quana. ♃
Fructus *ruber edulis grati ſaporis.* Caulis *herbaceus flexuoſo erectus teres ſubſimplex purpureus glaber.* Folia *petiolata cordata ſubrotunda trifida utrinque glabra fere palmaria, lobi inciſi inaequaliter ſerrati.* Flores *e gemma cum foliis pedunculati ſolitarii, pedunculo ſimplici, rarius bifido.* Petioli *et* Pedunculi *villoſi digitales.* Calyx *albo-tomentoſus.* Thunb. l. c.

*28. RUBUS *ſtellatus.*
R. foliis ſimplicibus cordatis trilobis, rugoſo-venoſis, caule inermi unifloro erecto, petalis lanceolatis. W.
R. foliis ſimplicibus lobatis: caule inermi erecto unifloro, laciniis calycinis lanceolatis acutis. *Smith. ic. ined. faſc.* 3. *p.* 64. *t.* 64. *
Sternförmige Himbeere. W.
Habitat in Americae *borealis tractu occidentali.* ♃
Flos *purpureus ut in R. arctico.* W.

*29 RUBUS *geoides.*
R. foliis ſimplicibus ternatisque obtuſis ſerratis nudis, foliolo impari maximo. *Smith. ic. ined. faſc.* 1. *p.* 19. *t.* 19.
Geumartige Himbeere. W.
Habitat in freto Magellanico. ♃
Caules *herbacei breviſſimi depreſſi.* Folia *petiolata plerumque ternata, foliolis irregulariter ſerratis obtuſis, utrinque glaberrimis ſubtus venoſis, impari maximo cordato emarginato.* Petioli *ſubvilloſi.* Flores *ſolitarii hermaphroditi, pedunculis brevibus craſſiſſimis pubeſcentibus, petalis ſubrotundis. A R. Dalibarda differt:* foliis *ternatis glabris ſerratis potius quam crenatis,* pedunculis *brevibus craſſis nec filifor-*

mibus longiſſimis, petalis *ſubrotundis nec lanceolatis.* Smith l. c.

30. RUBUS *Chamaemorus.*

R. foliis ſimplicibus lobatis, caule inermi unifloro *Fl. ſuec.* 414, 449. *Mat. med.* 130. *Mill. dict. n.* 10. *Gunn. norv. n.* 6. *Lightf. ſcot.* 1. *p.* 266. *t.* 13. *Retz. obſ.* 1. *p.* 20.

R. caule bifolio unifloro, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1. *Hort. cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 279.

R. paluſtris humilis. *Tournef. inſt.* 615.

Chamaerubus foliis ribes. *Bauh. pin.* 480.

Morus norvegica. *Till. aboenſ.* 47. *t.* 150. *Fl. dan. t.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 140.

Sumpf-Himbeere. W.

Habitat in Sueciae, Sibiriae, Daniae *paludibus uliginoſis, turfoſis, frequens.* ♃ (v. ſ.)

Herba *dioica*: Radix *et Maris et Faeminae unita ſub terra in monoicam, obſervante D. C. Solandro.*

31. RUBUS *Dalibarda.*

R. foliis ſimplicibus cordatis indiviſis crenatis, ſcapo aphyllo unifloro. *Sp. pl.* 708. *Mill. dict. n.* 11. *Smith. ic. ined. faſc.* 1. *p.* 20. *t.* 20. *

Dalibarda repens. *Sp. pl.* 1. *p.* 401.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 141.

Trockene Himbeere. W.

Habitat in Canada. *Kalm.* ♃

Radix *repens.* Stolones *repentes, herbacei.* Folia (*Violae*) *cordata, obtuſa, crenata, venoſa, pilis raris adſperſa, ſubtus nuda.* Petioli *piloſi, longitudine foliorum.* Scapi *nudi ſ. aphylli, piloſi, longitudine foliorum, uniflori.* Calyx 5-*partitus.* Corolla *alba.* Semina 5, *ovata, nuda.* Stamina *longitudine corollae. Anne* Flores *maſculi et feminei in eadem planta?* Habitus *ſuadet conjunctionem cum Rubo, imprimis Chamaemoro, vel utraque diſtinguenda a Rubis.*

999. FRAGARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 865.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* ſeminum ovatum, baccatum, deciduum.

1. FRAGARIA *veſca.*

F. calyce fructus reflexo, pubeſcentia petiolorum patentiſſima, pedunculorum adpreſſa. W.

F. flagellis reptantibus. *Hort. cliff.* 192. *Hort. upſ.* 133. *Fl. ſuec.* 414, 450. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 180. *Scop. carn. n.* 625. *ſub* Potentilla. *Pollich. pal. n.* 491. *Ludw. ect. t.* 136. *Blackw. t.* 77. *Kniph. cent.* 3. *n.* 38. *Knorr. del.* 1. *t. E.* 1. *Hoffm. germ.* 178. *Roth. germ. I.* 221. *II.* 568.

F. (*vulgaris*) calyce fructus reflexo, pubeſcenti pedunculi adpreſſa. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 21.

F. foliis ternatis: flagellis reptantibus. *Hall. helv. n.* 1112.

F. flagellis reptans, fructu eduli. *Crantz. auſtr. p.* 81. *n.* 16.

F. vulgaris. *Bauh. pin.* 326. *Fl. lapp.* 209. *Gron. virg.* 56.

β. F. fructu albo. *Bauh. pin.* 326. *Gmel. l. c.*

F. ferens fraga alba. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 394.

γ. F. bis fructum ferens. *Bauh. pin.* 327.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 142.

Wilde Erdbeere. W.

Habitat in Europae *ſylvis ſiccis ſterilibus.* ♃ (v. v.)

Folia *utrinque pubeſcentia, ſerratura terminalis proximis paullo longior.* Ehrh. l. c.

*2. FRAGARIA *elatior.*

F. calyce fructus reflexo, pubeſcentia pedunculorum et petiolorum patentiſſima. W.

F. (*elatior*) calyce fructus reflexo, pubeſcentia pedunculi patentiſſima. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 23.

Fragaria veſca β. pratenſis. *Sp. pl* 709.

F. ſcabra flore foemineo, fructu purpureo moſchato. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 185. *t.* 8.

F. fructu parvi pruni magnitudine. *Bauh. pin.* 327.

Fraga fructu magno. *Beſl. eyſt. vern. O.* 7. *t.* 8. *f.* 5.

Fragaria et Fraga. *Lob. ic.* 1. *t.* 697. *Dod. pempt.* 672.

β. F. (*muricata*) caule erecto ſuffruticoſo, foliis hirſutis. *Sp. pl.* 709.

F. arborea flore herbaceo. *Zanon. hiſt.*

F. major veſca flore herbaceo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 186.

Garten-Erdbeere. W.

Habitat in America? ♃ (v. v.)

Folia *utrinque pubeſcentia, ſerratura terminalis proximis paullo longior.* Ehrh. l. c.

*3. FRAGARIA *virginiana.*

F. calyce fructus patente, pubeſcentia petiolorum erecta, pedunculorum adpreſſa, foliis ſupra glabriuſculis. W.

F. (*virginiana*) calyce patente, foliis ſupra fere glabris, ſerraturis acuminatis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 24.
Fragaria veſca δ. virginiana. *Ait. Kew.* 2. *p.* 211.
F. (*virginiana*) foliis oblongo-ovatis ſerratis inferne incanis, calycibus longioribus, fructu ſubrotundo. *Mill. dict.*
F. glabra, fructu coccineo majore, ſeminibus in cortice loculoſo altius depreſſis, virginiana. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 181. *t.* 5.
F. virginiana fructu coccineo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 186.
Virginiſche Erdbeere. W.
Habitat in Virginia, Carolina. ♃ (v. v.)
Serratura *foliorum terminalis proximis ſubaequat.* Ehrh. l. c.

*4. FRAGARIA *grandiflora.*

F. calyce fructus erecto, pubeſcentia pedunculorum et petiolorum erecta, foliis ſupra glabriuſculis. W.
F. (*grandiflora*) calyce fructus erecto, foliis obtuſe ſerratis ſupra fere glabris. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 25.
Fragaria veſca ε. ananas. *Ait. Kew.* 2 *p.* 212.
F. foliis ovatis crenatis nervoſis, calycibus maximis. *Mill. ic.* 192. *t.* 288.
F. flore ampliſſimo, fructu ananae ſaporem et odorem referente. *Du Ham arb.* 1. *p.* 183. *t.* 6.
Ananas-Erdbeere. W.
Habitat in Surinamo. ♃ (v. v.)
Serraturae *foliorum ovatae, terminalis proximis brevior.* Ehrh. l. c.

*5. FRAGARIA *chiloenſis.*

F. calyce fructus erecto, pubeſcentia petiolorum et pedunculorum patentiſſima, foliis utrinque villoſis. W.
F. (*chiloenſis*) calyce fructus erecto, foliis crenato-ſerratis, utrinque pubeſcentibus. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 26.
F. (*chilenſis*) fructu maximo, foliis carnoſis hirſutis. *Molin. chil. ed germ. p.* 112.
Fragaria veſca γ. chiloenſis. *Sp. pl.* 709.
F. chiloenſis fructu maximo, foliis carnoſis hirſutis. *Dill. elth.* 145. *t.* 120. *f.* 146.
F. pubeſcens flore ampliſſimo, fructu maximo chiloenſis. *Du Hamel.* 1. *p.* 176. *t.* 3.
Chiliſche Erdbeere. W.
Habitat in America *auſtrali.* ♃
Serraturarum *latitudo longitudinem ſuperat.* Ehrh. l. c.

*6. FRAGARIA *collina.*

F. calyce fructus erecto, pubeſcentia pedunculorum erecta, petiolorum patentiſſima, foliis utrinque pubeſcentibus. W.

F. (*collina*) calyce fructus erecto, foliis acute ſerratis utrinque pubeſcentibus. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 26.

F. fructu majori candicante oblongiuſculo. *Volk. norimb. p.* 172.

F. foliis hiſpidis. *Bauh. pin. p.* 327. *Mapp. alſat.* 110. *Rupp. jen. ed. Hall.* 108.

Fraga minor ſ. nigra. *Thal. herc.* 43.

Fraga partim rubra partim candida. *Trag. hiſt.* 500.

Harte Erdbeere. W.

Habitat in collibus ſterilibus ſiccis Germaniae, Helvetiae. ♃

Serraturae *ovato-lanceolatae, extima proximis brevior.* Ehrh. l. c.

7. FRAGARIA *monophylla.* †

F. calyce fructus patente dentato, pubeſcentia petiolorum et pedunculorum erecta, foliis ſimplicibus. W.

F. foliis ſimplicibus. *Syſt. nat.* 13. *p.* 349. *Uſt. neue Annalen* 8. *Stück. p.* 40. *t.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 145.

Einblättrige Erdbeere. W.

Habitat - - - - ♃ (v. ſ.)

Miſit D. Anton. Nic. Ducheſne. *An varietas F. veſcae? folium enim primum ternatum eſt, ſed* Scapus *longior;* Petala *minora;* Calyces *inciſi. Vide* Ducheſne *monograph. Fragariae.*

Folia *utrinque pubeſcentia groſſe ſerrata, ſerratura terminalis magnitudine reliquarum.* W.

8. FRAGARIA *ſterilis.*

F. petalis obcordatis calycis longitudine, receptaculo ſicco, pubeſcentia petiolorum et pedunculorum patentiſſima, caule decumbente. W.

F. caule decumbente, ramis floriferis laxis. *Pollich. pal. n.* 492. *Neck. gallob. p.* 223. *Moench. haſſ. n.* 430. *Doerr. naſſ. p.* 111. *Hoffm. germ.* 178. *t.* 6.

F. caule proſtrato, foliis ternatis, retuſis, ſericeis. *Hall. helv. n.* 1113.

F. caule decumbente repente. *Roy. lugdb.* 274. *Dalib. pariſ.* 14. *Sauv. monſp.* 177. *Hudſ. angl.* 195.

F. ſterilis. *Bauh. pin.* 327.
Comarum fragarioides. *Roth. germ. I.* 224. *II.* 577.
F. ſterilis ampliſſimo folio et flore, petalis florum cordatis. *Vaill. pariſ.* 55. *t.* 10. *f.* 1.
F. ſterilis ſ. minime veſca hirſuta minime incana. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 186. ſ. 2. *t.* 19. *f.* 5.
F. ſylveſtris minime veſca ſ. ſterilis. *Lob. ic.* 698.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 145.
Trockene Erdbeere. W.
Habitat in Anglia, Helvetia, Germania. ♃ (v. ſ.)

Surculi *craſſi, depreſſi, tecti* Stipulis *lanceolatis, ferrugineis.* Folia *ternata, obovata, ſerrata, retuſa, laxiora, piloſa, ſericea, ſubtus albida: petiolis valde piloſis.* Caulis *floriferi filiformes, decumbentes, laxi, foliis raris minoribus.* Flores *ſolitarii, pedunculati, albi.* Flagella *nulla.*

1000. POTENTILLA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 866.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5. *Semina* ſubrotunda, nuda, receptaculo parvo exſucco affixa.

* *Foliis pinnatis.*

1. POTENTILLA *fruticoſa.*

P. foliis pinnatis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 193. *Fl. ſuec.* 416, 451. *Roy. lugdb.* 275. *Hudſ. angl.* 195. *Kalm. it.* 2. *p.* 263. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 180. *n.* 26. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 153. *Kniph. cent.* 6. *n.* 71. *Willd. arb.* 235.
Pentaphylloides rectum fruticoſum eboracenſe. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 193 *ſ.* 2. *t.* 93. *f.* 5. *Hortul. angl.* 54. *t.* 54. *Du Ham. arb.* 2. *t.* 20.
Pentaphylloides rectum fruteſcens. *Walth. hort.* 95. *t.* 17.
Pentaphylloides fruticoſa elatior, minus hirſuta. *Amm. ruth.* 88. *n.* 114. *t.* 17.
β. Pentaphylloides fruticoſa humilior lanuginoſa et incana. *Amm. ruth.* 89. *n.* 115. *t.* 18. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 147.
Strauchartiges Fingerkraut. W.
Habitat in Eboraco Angliae, Oelandia *auſtrali,* Sibiria. ♄ (v. v.)

2. POTENTILLA *Anſerina.*

P. foliis interrupte pinnatis ſericeis, foliolis argute ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. W.

P. foliis pinnatis-ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. lapp.* 210. *Fl. ſuec.* 415, 452. *Hort. cliff.* 193. *Mat. med.* 131. *Roy. lugdb.* 275. *Gunn. norv. n.* 38. *Pollich. pal. n.* 493. *Scop. carn. n.* 615. *Flor. dan. t.* 544. *Hoffm. germ.* 178. *Roth. germ. I.* 221. *II.* 559.

Fragaria caule repente, foliis pinnatis ſerratis, tomentoſis, petiolis longis unifloris. *Hall. helv. n.* 1125.

Fragaria Anſerina. *Crantz auſtr. p.* 71.

Argentina. *Blackw. t.* 6. *Dodon. pempt.* 600.

Potentilla. *Bauh. pin.* 321. *Cam. epit.* 758.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 148.

Gänſerich-Fingerkraut. W.

Habitat in Europae *paſcuis argilloſis.* ♃ (v. v.)

3. POTENTILLA *ſericea.*

P. foliis bipinnatifidis multijugis utrinque tomentoſis, ſegmentis parallelis, approximatis, caule decumbente. W.

P. foliis bipinnatis utrinque tomentoſis: ſegmentis parallelis aproximatis, caulibus decumbentibus. *Sp. pl.* 710.

P. foliis pinnatis hirſutis, pinnis tredecim ovatis crenatis decurrentibus. *Hall. goett.* 2. *p.* 106.

P. foliis duplicato-pinnatis: pinnulis linearibus integerrimis brevibus. *Gmel. mſſ.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 149.

Seidenartiges Fingerkraut.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Habitus *foliorum P. Anſerinae argenteae, quamvis minima. Caulis vero et fructificationes P. vernae.* Radix *ſquamis foliorum ruderibus nigris veſtita.* Folia *pinnata ex* 13 *circiter foliolis ovatis, tomentoſis, ſericeis, pectinato-pinnatifidis, et parallelis.* Pedunculi *piloſi.* Caules *foliis duplo ſ. triplo longiores, decumbentes absque ſarmentis, nec repentes, in medio folio unico minori magisque divaricato inſtructi, teretes, apice* Floribus *aliquot luteis, alternis, pedunculatis.*

Folia *accedunt magis ad P. Anſerinam, quam ad multifidam. A P. multifida eſt diverſa:* foliis *radicalibus pinnatis ſexjugis, nec quadrijugis, laciniis rum breviſſimis approximatis,* petiolis *longis valde villoſis.* W.

4. POTENTILLA *multifida.*

P. foliis bipinnatifidis quadrijugis ſuperne glabris, ſubtus tomentoſis, ſegmentis diſtantibus; caule decumbente. W.

P. foliis bipinnatis: ſegmentibus integerrimis diſtantibus ſubtus tomentoſis, caule decumbente. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 182. *n.* 30. *Kniph. cent.* 2. *n.* 62.

Fragaria foliis ſubtus tomentoſis, pinnatis, pinnis primis pinnatis, ultimis ſimplicibus. *Hall. helv. n.* 1125.

Pentaphylloides ſupina minor, foliis alatis hirſutis varie diſſectis. *Amm. ruth. p.* 92. *n.* 117.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 150.

Vielſpaltiges Fingerkraut. W.

Habitat in Sibiria, Tataria, Cappadocia, Helvetia. ♃ (v. v.)

Habitus *multa indicat affinia cum P. argentea.* Folia *ex ſeptem foliolis: ſegmentis linearibus ſ. lanceolatis, quinis ſ. ſummum ſeptenis, alternis, at in impari oppoſitis, a ſe invicem hiantibus ſive apice remotis, ſubtus tomentoſis.*

*5. POTENTILLA *verticillaris.*

P. foliis pinnatis ſubtus tomentoſis, foliolis linearibus margine revolutis geminatis, terminali trifido, caule erectiuſculo. W.

Potentilla verticillaris. *Stephan. in litt.*

Potentilla multifida. *Pall. itin.* 3. *p.* 194. *not.*

Pentaphylloides humile, foliis anguſtiſſimis. *Amm. ruth. p.* 86. *n.* 113. *t.* 16.

Wirtelblättriges Fingerkraut. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Diſtinctiſſma ab omnibus hucusque cognitis Potentillis: foliis *ſimpliciter pinnatis, foliolis geminatis ut in nonnullis Aſtragalis et Phacis, unde foliola quaſi verticillata.* Foliola *ceterum ſunt anguſta linearia ſuperne viridia villoſa inferne niveo-tomentoſa.* Calyces Pedunculi *ut et* caulis *tomentoſo-villoſi.* Corolla *lutea.* W.

6. POTENTILLA *fragarioides.*

P. foliis pinnatis ternatisque: extimis majoribus, flagellis reptantibus. *Sp. pl.* 710.

P. foliis pinnatis ternatisque hirſutis utrinque et viridibus: lobulis acceſſoriis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 182. *n.* 31. *t.* 34. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 151.

Erdbeerartiges Fingerkraut. W.
Habitat in Sibiria. ♃

Facies *Fragariae ſterilis.* Radix *ſubtuberoſa.* Folia *ſericea petiolis piloſis, pinnata ex* 3. 5. *vel* 7. Foliolis *ovatis, oppoſitis, ſerratis, baſi quo propioribus eo minoribus.* Stolones *decumbentes.*

*7. POTENTILLA *ruthenica.* W.

P. foliis radicalibus pinnatis, caulinis ternatis, foliolis ovatis dentatis, petalis calyce brevioribus. W.
Pentaphylloides erectum fragariae folio. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 193. *ſ.* 2. *t* 20. *f.* 2.
Ruſſiſches Fingerkraut. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Saepius hanc plantam ſub nomine praecedentis ſpeciei in hortis vidi. Caulis *erectus pedalis bipedalisque dichotomo-ramoſus.* Folia *radicalia ſeu caulina inferiora pinnata e foliolis quinis obovatis profunde dentatis, binis ſuperioribus ſeſſilibus baſi decurrentibus, binis inferioribus breve petiolatis.* Folia *caulina longe petiolata ternata, foliolis oblongo-obovatis profunde dentatis.* Stipulae *oblongae margine exteriore dentatae.* Pedunculi *uniflori in dichotomia caulis ſolitarii.* Petala *flava ſubrotunda calyce minora.* W.

8. POTENTILLA *rupeſtris.*

P. foliis pinnatis alternis: foliolis quinis ovatis crenatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 193. *It. wgoth.* 63, 76. *Fl. ſuec.* 2. *p.* 453. *Pall. it.* 2. *p.* 655. *Iacq. auſtr. t.* 114. *Scop. carn n.* 616. *Gouan. illuſtr.* 32. *Crantz. auſtr. p.* 72. *ſub* Fragaria. *Pollich. pal. n.* 494. *Kniph. cent.* 11. *n.* 88. *Doerr. naſſ. p.* 186. *Hoffm. germ.* 178. *Roth. germ. I.* 222. *II.* 570.
Fragaria foliis pinnatis, pinnis ſeptenis, ſubrotundis, ſerratis. *Hall. helv. n.* 1127.
Pentaphylloides erectum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 398. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 192. *ſ.* 2. *t.* 20. *f.* 1.
Quinquefolium fragiferum. *Bauh. pin.* 326. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 107. *n.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 151.
Felſen-Fingerkraut. W.
Habitat ad latera montium Weſtrogothiae, Sibiriae, Germaniae. ♃ (v. v.)

Flores *albi.* Folia *quina, ſeptena, novena. Gou. l. c.*

9. POTENTILLA *bifurca.*

P. foliis pinnatis ſubaequalibus: foliolis oblongis ſubbifidis: extimis confluentibus. *Sp. pl.* 711. *Gmel. it.* 1. *p.* 149. *t.* 27. *f.* 1.

Pentaphylloides orientale ſupinum, foliis alatis bifidis vel trifidis. *Tournef. cor.* 21.

Pentaphylloides repens foliis pinnatis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 30. *t.* 49. *f.* 1.

Pentaphylloides ſupinum minus folio glabro non ſerrato. *Amm. ruth.* 116.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 152.

Spaltblättriges Fingerkraut. W.

Habitat in Sibiria, Armenia. ♃ (v. ſ.)

10. POTENTILLA *pimpinelloides.*

P. foliis pinnatis, foliolis ſubrotundis dentatis aequalibus, caule erecto. *Sp. pl.* 711.

Pentaphylloides orientale erectum, folio et facie pimpinellae. *Tournef. cor.* 21. *Buxb. cent.* 1. *p.* 30. *t.* 48.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 152.

Bibernellblättriges Fingerkraut. W.

Habitat in Armeniae *ſaxoſis.* ♃ (v. ſ.)

Planta *ſexuncialis erecta.* Folia *longe petiolata pinnata* 6-8-*juga, foliolis ſubrotundis groſſe dentatis.* Stipulae *profunde* 3-*ſ.* 4-*partitae, laciniis lineari-lanceolatis acuminatis.* W.

*11. POTENTILLA *cicutariaefolia.* W.

P. foliis pinnatis glabriuſculis, foliolis oblongo-cuneiformibus profunde dentatis, ſummis confluentibus, caule erecto, W.

Pentaphylloides orientale erectum, foliis alatis Geranii cicutariae folio facie. *Tournef. cor.* 21.

Schierlingartiges Fingerkraut. W.

Habitat in Galatia. ♃ (v. ſ.)

Radix *lignoſa ſimplex multiceps.* Caulis 4-*ſ.* 5-*uncialis erectus.* Folia *petiolata pinnata glabra, venis et petiolis pubeſcentibus.* Foliola 4-*ſ.* 5-*juga oblonga profunde dentata, ſumma baſi decurrentia.* Stipulae *apice dentatae nervoſae.* Corymbus *terminalis dichotomus.* Folia *iis Erodii cicutarii ſimillima. Differt a praecedente,* foliorum *forma, et ſummis confluentibus, denique* corymbo *dichotomo.* W.

12. POTENTILLA *penſylvanica.*

F. foliis decuſſive pinnatis, ſummis ternatis, foliolis profunde dentatis, caule erecto pubeſcente. W.

P. foliis inferioribus pinnatis, ſuperioribus ternatis: foliolis inciſo-ſerratis, caule erecto pubeſcente. *Mant.* 76. *Iacq. hort. t.* 189. *Gmel. ſib.* 3. *t.* 34. *f.* 1.

Pentaphylloides canadenſe, foliis agrimoniae. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 40.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 153.

Penſylvaniſches Fingerkraut. W.

Habitat in Canada, Sibiria. ♃ (v. v.)

Folia Radicalia *pinnata: foliolis oblongis, obtuſiuſculis, ſerrato-dentatis, lineatis, mollibus, villoſis: extimis tribus connatis majoribus; interioribus minoribus alternis.* F. Caulina *ſubdigitata, ſeptena, ut P. recta, ſed pinnatifida.* Petala *vix calyce majora.* Habitus *P. rectae.* H. V.

Planta ſibirica magis eſt glabra; ſed foliorum florumque ſtructura eadem ac in americana. W.

13. POTENTILLA *ſupina.*

P. foliis pinnatis, foliolis oblongis profunde dentatis, caule decumbente dichotomo, pedunculis axillaribus ſolitariis. W.

P. foliis pinnatis, caule dichotomo decumbente. *Hort. cliff.* 193. *Hort. upſ.* 133. *Roy. lugdb.* 275. *Reyg. ged.* 1. *p.* 133. *n.* 2. *Gmel. it.* 1. *p.* 149. *t.* 27. *f.* 2. *Crantz. auſtr. p.* 73. *ſub* Fragaria. *Pollich, pal. n.* 495. *Hoffm. germ.* 178. *Roth. germ. I.* 222. *II.* 571.

Pentaphyllum alpinum minus ſupinum. *Pluk. alm.* 285. *t.* 106. *f.* 7.

Pentaphyllum ſupinum quorundam, potentillae facie. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 107.

Pentaphylli ſpecies flore luteo enneaphyllos hirſuta. *Ambroſ. phyt. t.* 414.

Quinquefolio fragifero affinis. *Bauh pin.* 326.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 153.

Niedriges Fingerkraut. W.

Habitat in Sibiria, Germania, Auſtria. ⊙ (v. v.)

* * *Foliis digitatis.*

14. POTENTILLA *recta.*

P. foliis ſeptenatis quinatisque foliolis lanceolatis groſſe dentatis, petalis obcordatis calyce majoribus, caule erecto. W.

P. foliis ſeptenatis lanceolatis ſerratis utrinque ſubpiloſis, caule erecto. *Sp. pl.* 711. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. auſtr. t.* 383. *Doerr. naſſ. p.* 186. *Scop. carn. n.* 618. *Hoffm. germ.* 179. *Roth. germ. I.* 222. *II.* 571.

Fragaria caule erecto, foliis quinis et ſeptenis, acute ſerratis. *Hall. helv. n.* 1121.

Fragaria foliis ſeptenis quinatisque, ſerratis utrinque piloſis: caule erecto corymboſo. *Crantz. auſtr. p.* 79.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboſo. *Hort. upſ.* 133. * *Roy. lugdb.* 275.

Quinquefolium rectum luteum. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium alterum vulgare. *Dod. pempt.* 116.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 154.

Gerades Fingerkraut. W.

Habitat in Italia, Narbona, Helvetia, Auſtria, Germania *ad muros et ad agrorum margines.* ♃ (v. v.)

Folia *utrinque piloſa; at adulta fere nuda.*

Folia *radicalia et inferiora caulina ſeptenata, ſuperiora quinata, ſumma ternata utrinque pilis raris obſita, interdum fere glabra.* Petala *magna obcordata pallide flava ad albidum colorem vergentia, calyce majora.* W.

*15. POTENTILLA *obſcura.* W.

P. foliis ſeptenatis quinatisque, foliolis lanceolatis groſſe dentatis, petalis obcordatis longitudine calycis, caule erecto. W.

Dunkeles Fingerkraut. W

Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Similis praecedenti, ſed caulis *et* folia *magis villoſa,* Petala *flava longitudine calycis.* W.

*16. POTENTILLA *piloſa.* W.

P. foliis quinatis, foliolis obovatis groſſe dentatis, petalis ſubretuſis calyce minoribus, caule erecto. W.

Potentilla hirta. *Allion. pedem. n.* 1478. *t.* 71. *quoad figuram.*

Behaartes Fingerkraut. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♃ (v. v.)

Differt a binis praecedentibus quibus habitu ſimilis: foliis *quinatis nec ſeptenatis. foliolis obovatis, praecipue in foliis radicalibus,* petalis *obtuſis leviſſime retuſis, nec obcordatis, calyce brevioribus. Ceterum* Corolla *flava et* caulis, folia, calycesque *pilis ſparſis tecti.* W.

17. POTENTILLA *argentea.*

P. foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *Mill. dict. n.* 3. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 184. *n.* 37. *Scop. carn. n.* 619. *Pollich. pal. n.* 496. *Kniph. cent.* 11. *n.* 86. *Roth. germ. I.* 222. *II.* 572. *Hoffm. germ.* 179.

P. foliis digitatis, caule erecto corymboſo. *Fl. ſuec.* 417, 454.

P. foliis digitatis inciſo-ſerratis, caule erecto. *Hort. cliff.* 193.

Fragaria caule erecto, foliis quinatis, apice ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Hall. helv. n.* 1124.

Fragaria foliis quinatis cuneiformibus et cuneiformiter inciſis, ſubtus tomentoſis: caule firmo erecto. *Crantz. auſtr. p.* 73.

Quinquefolium petraeum majus. *Tabern.* 122. R.

Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin.* 325.

Pentaphyllum minus. *Cam. epit.* 760.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 155.

Silberblättriges Fingerkraut. W.

Habitat in Europae *ruderatis.* ♃

*18. POTENTILLA *geranioides.* W.

P. foliis quinatis, foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus, caule decumbente. W.

Quinquefolium orientale humifuſum, tenuiſſime laciniatum. *Tournef. cor.* 21.

Storchſchnabelblättriges Fingerkraut. W.

Habitat in Armenia. ♃ (v. ſ.)

Radix *craſſitie pennae anſerinae multiceps.* Caules *decumbentes tri-ſ. quadriunciales.* Folia *fere Geranii diſſecti vel columbini, radicalia quinata viridia villoſa, praeſertim ſubtus.* Foliola *profunde pinnatifida, laciniis linearibus.* Folia *caulina ternata, foliolis ut in folio radicali. Affinis P. multifidae, ſed* foliis *quinatis ſubtus non tomentoſis diverſa.* W.

19. POTENTILLA *intermedia.*

P. foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule erectiuſculo ramoſiſſimo. *Mant.* 76.

Fragaria caule ſuberecto, foliis quinis et ſeptenis ſerratis obtuſis. *Hall. helv. n.* 1120. (*excluſis ſynonymis.*)

Quinquefolium montanum luteum erectum hirſutum. *Bauh. pin.* 325. *prodr.* 139. *Raj. eur.* 213.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 156.
Mittleres Fingerkraut. W.
Habitat in Helvetia, Delphinatu, Hungaria. ♃ (v. ſ.)

Media inter P. argenteam *et* norvegicam; *verbo, eſſet* P. norvegica, *ſi non Radix eſſet perennis, et folia ſubradicalia quinata. Ceterum folia inferiora alterna, ſuperiora oppoſita.* Foliola *obovata, inciſo-ſerrata, non tomentoſa, ſerraturis novem.* F. caulina *ternata, paniculae oppoſita.* H. U.

20. POTENTILLA *hirta.*

P. foliis ſeptenatis quinatisque cuneiformibus inciſis piloſis, caule erecto hirto. *Sp. pl.* 712. *Mattuſch. ſil.* 1. *n.* 364. *Kniph. cent.* 4. *n.* 65. *Hoffm. germ.* 179.
Quinquefolium rectum minus, anguſtioribus foliis, monſpelienſe. *Raj. eur.* 213.
Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum. *Magnol. monſp.* 216. (*non C. Bauh.*)
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 156.
Haariges Fingerkraut. W.
Habitat Monſpelii; *inque* Pyrenaeis *et* Sileſia. ♃ (v. v.)

Folia *radicalia* 5. *ſ.* 7; *Caulina, omnia alterna, ſublinearia, dentibus* 3. *ſ.* 5. Caulis, Pedunculi *et* Calyces *valde piloſi.*

Foliola *inciſo-dentata, in ſpontanea planta duplo anguſtiora, quam in culta.* W.

*21. POTENTILLA *inclinata.*

P. foliis inferioribus quinatis lanceolatis dentatis ſubtus caneſcentibus, caulinis ternatis, caule adſcendente, petalis calycis longitudine. W.
P. (*inclinata*) tota hirſuta, foliis quinis ſenisve, caulinis ternatis oblongis, caule aſſurgente ſubdichotomo. *Villars. delph.* 3. *p.* 567. *t.* 45. *
Aufwärtsſteigendes Fingerkraut. W.
Habitat in Delphinatu. ♃ (v. ſ.)

Accedit ad P. hirtam et ad P. opacam et tenet medium inter has. A P. hirta diverſa: foliolis *non profunde inciſis ſubtus caneſcentibus nec pilis longis obſitis,* caule *adſcendente,* ramis *magis divaricatis. A P. opaca vero:* foliis *minoribus rarius ſeptenis et ſubtus caneſcentibus,* caule *dichotomo. Cum P. verna nullam habet ſimilitudinem. Figura Clariſſ. Villarſii non optima.* W.

22. POTENTILLA *ſtipularis.*

P. foliis ſeptenatis ſeſſilibus ſtipulae dilatatae inſidentibus. *Sp. pl.* 712. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 185. *t.* 37. *f.* 2.

P. foliis novenis palmatis apice ſerratis. *Hall. goett.* 2. *p.* 106.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 157.

Scheidenblättriges Fingerkraut. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Caulis *adſcendens, filiformis, laevis, apice diviſus.* Stipulae *amplexicaules, ſolitariae, emarginatae.* Foliola 8 *ad* 9. *lineari-lanceolata, ſubſerrata, glabra, ex emarginatura ſtipulae pendentia abſque petiolo.*

Folia *caulina, excepto infimo, quod breve petiolatum, in ſtipulis ſeſſilia.* Foliola *lineari-cuneiformia apice tri-ſ. quinquedentata.* Petala *flava obcordata.* W.

23. POTENTILLA *opaca.*

P. foliis radicalibus ſeptenatis quinatisque lineari-cuneiformibus dentatis, petalis retuſis calycis longitudine, caulibus filiformibus decumbentibus hirtis. W.

P. foliis radicalibus quinatis cuneiformibus ſerratis, caulinis ſuboppoſitis, ramis filiformibus decumbentibus. *Amoen. acad.* 4. *p.* 274.* *Hudſ angl.* 196. *Pollich. pal. n.* 498. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 91. *Collect.* 1. *p.* 33.* *Hoffm. germ.* 179. *Roth. germ. I.* 223. *II.* 573.

Fragaria (*rubens*) foliis quinatis anguſtis cuneiformibus et cuneiformiter ſerratis, piloſis, caulibus filiformibus rubentibus. *Crantz. auſtr. p.* 75. *n.* 7.

Quinquefolium minus repens lanuginoſum luteum. *Bauh. pin.* 325.

Quinquifolium IV, flavo flore 2. ſpecies. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 106. *f.* 106.

Quinquefolio ſimilis enneaphyllos hirſuta. *Bauh. pin.* 325. *prodr.* 139.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 157.

Schattenliebendes Fingerkraut. W.

Habitat in Auſtria, Helvetia, Baldo, Germania. ♃ (v. v.)

Similis ſequenti, tamen diverſa, caulibus *decumbentibus longioribus rubris pilis patentiſſimis hirtis,* foliis *anguſtioribus profunde dentatis non pubeſcentibus, ſed hirtis,* pedunculis *longioribus,* corollis *minoribus tantum verſus meridiem apertis alio tempore clauſis.* W.

24. POTENTILLA *verna.*

P. foliis quinatis obovatis dentatis pubeſcentibus, petalis obcordatis calyce majoribus, caulibus declinatis. W.

P. foliis radicalibus quinatis acute ſerratis retuſis, caulinis ternatis, caule declinato. *Fl. ſuec.* 419, 455. *Pallas it.* 1. *p.* 147. *Scop. carn. n.* 621. *Allion. pedem n.* 1481. *t.* 24. *f.* 2. *Kniph. cent.* 8. *n.* 78. *Pollich. pal. n.* 497. *Hoffm. germ.* 179. *Roth. germ. I.* 233. *II.* 573.

Fragaria caule decumbente, foliis pinnatis ſerratis ſubhirſutis. *Hall. helv. n.* 119.

Potentilla foliis quinatis inciſis, caule aſſurgente. *Fl. lapp.* 212. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.

Fragaria foliis ternatis quinatisque ſubtus canis, caulinis ternatis. *Crantz. auſtr. p.* 74. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 1.

Quinquefolium minus repens luteum. *Bauh. pin.* 325.

Pentaphyllum ſ. Quinquefolium minus. *Tabern. ic* 123.

β. P. (*filiformis*) caule proſtrato, foliis quinatis et ſeptenis oblongis ſerratis, caulinis ternatis ſtipulatis, pedunculis ſubradicalibus elongatis. *Vill. delph.* 3. *p.* 564.

P. (*ſalisburgenſis*) foliis hirſutis inciſo-ſerratis obtuſis, radicalibus quinatis, caulinis ternatis caule adſcendente compreſſo paucifloro, calycibus ſubdentatis. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 490. *Collect.* 2. *p.* 68. *

γ. P. (*rubens*) foliis quinatis et ſeptenatis, caule ſuberecto, petalis cordatis aureis maculatis. *Vill. delph.* 3. *p.* 566.

Quinquefolium minus repens aureum. *Bauh. pin.* 325.

δ. Potentilla ſubacaulis. *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 491. *Collect.* 2. *p.* 145. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 158.

Frühlings Fingerkraut. W.

Habitat in Europae *et* Aſiae *borealis paſcuis ſiccis, frigidioribus.* ♃ (v. v.)

Variat macula *ad baſin petalorum fulva et nulla tali.*

Planta *ratione loci natalis admodum varians. Nec limites invenio, licet numeroſa ſpecimina comparaverim, quibus apte diſtingantur omnes varietates; una enim ſenſim in alteram tranſiit. P. ſalisburgenſis ab Haenke in Iacquini collectariis deſcripta, non niſi magnitudine, a P. filiformi eſt diverſa, quae iterum cum aliis varietatibus convenit. P. ſubacaulis ejusdem*

Botanici a ſpeciminibus ſibiricis eſt diverſa, P. ſubacaulis Linnaei foliis tantum gaudet ternatis minutiſſimis, et eſt forte ſola hujus ſpeciei varietas a climate boreali orta. W.

25. POTENTILLA *aurea.*

P. foliis radicalibus quinatis, foliolis cuneiformibus ciliatis apice quinquedentatis, caulinis ternatis ſubſeſſilibus, petalis obcordatis calyce majoribus, caule adſcendente. W.

P. foliis radicalibus quinatis ſerratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato. *Amoen. acad* 4. *p.* 316.* *Iacq. vind.* 245. *Oed. dan. t.* 114. *Mattuſch. ſil. n.* 366. *Hoffm. germ.* 179.

Fragaria caule reclinato, foliis quinis ſerratis. *Hall. helv. n.* 1122. *t.* 21.

Fragaria foliis radicalibus quinatis ſplendentibus, ora argentea, petalis maculatis. *Crantz. auſtr. p.* 77. *n.* 9.

P. foliis margine ſericeis acute ſerratis, caule declinatio. *Ger. prov.* 468.

Quinquefolium 3, aureo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 105.

Quinquefolium alpinum ſplendens, aureo flore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 398. *Hall.*

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Bauh. pin.* 325.

β. Varietas flore pleno. *Hall. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 159.

Goldfarbiges Fingerkraut. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Auſtriae, Daniae, Sileſiae. ♃ (v. ſ.)

Planta *a P. verna primo intuitu diſtinguenda*: foliolis *cuneiformibus apice tantum* 3-*ſ.* 4-*dentatis*; pilis *ad foliorum marginem et coſtam mediam arcte adpreſſis nitidis*, caule *adſcendente.* W.

*26. POTENTILLA *aſtracanica.*

P. foliis radicalibus quinatis oblongis dentatis, ſummis tripartitis, corollis calyce majoribus, caule adſcendente. W.

P. foliis radicalibus et caulinis infimis quinatis, caulibus dichotomis villoſis, baſi procumbentibus. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 92. *Miſc.* 2. *p.* 349 *

Aſtracaniſches Fingerkraut. W.

Habitat ad Aſtracan. ♃ (v. ſ.)

Tota planta pubeſcens. Differt ab affinibus nempe P. recta, obſcura et piloſa, foliis *caulinis ſuperioribus tripartitis apice tantum dentatis, ſummis integerrimis, et* caule *adſcendente.* Petala *ſunt pallide flava. In figura bona Iacquini pictor perperam corollam monopetalam pinxit.* W.

27. POTENTILLA *canadenſis.*

P. foliis quinatis villoſis, caule adſcendente hirſuto. *Sp. pl.* 713.

Quinquefolium canadenſe humilius. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 188.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 160.

Canadiſches Fingerkraut. W.

Habitat in Canada. *Kalm.*

Habitus *Fragariae.* Folia *radicalia quinata: foliolis obovatis, acute ſerratis, ſupra pubeſcentibus, ſubtus villoſis albo-ſericeis, petiolis valde albo-hirſutis.* Caulis *digitalis, ramoſus, rarioribus foliis.* Corollae *luteae. Similis* P. vernae, *a qua differt Foliis valde piloſis, argute ſerratis, ſubrotundis et caule valde hirſuto.*

28. POTENTILLA *alba.*

P. foliis quinatis apice conniventi-ſerratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirſutis. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276. *Iacq. auſtr. t.* 115. *Mattuſchk. ſil. n.* 367. *Kniph. cent.* 8. *n.* 77. *Hoffm. germ.* 179. *Roth. germ. I.* 223. *II.* 574.

Fragaria (*alba*) petiolis et foliis quinatis, caule procumbente fere altioribus. *Crantz. auſtr. p.* 82. *n.* 2.

Quinquefolium album. *Hall. helv. it.* 70.

Quinquefolium album majus alterum. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium album minus. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium Tragi. *Trag.* 507.

Pentaphyllum majus, flore albo. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 105.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 160.

Weiſses Fingerkraut. W.

Habitat in alpibus Stiriae, Auſtriae, Pannoniae; *in ſylvis* Germaniae. ♃ (v. v.)

29. POTENTILLA *cauleſcens.*

P. foliis quinatis apice conniventi-ſerratis caulibus multifloris decumbentibus, receptaculis hirſutis, petalis obovatis. W.

P. foliis quinatis apice conniventi-ſerratis, caulibus multifloris decumbentibus, receptaculis hirſutis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 317. * *Iacq. auſtr. t.* 220.
Fragaria foliis ovatis, acute ſerratis, oris ſericeis, pappo diſci longiſſimo. *Hall. helv. n.* 1123.
Quinquefolium album majus. *Bauh. prodr.* 139. caulefcens. *Bauh. pin.* 325. *Hall. opuſc.* 263. *n.* 50. 47.
Quinquefolium album minus alterum. *Bauh. pin.* 325.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 161.
Vielſtieliges Fingerkraut. W.
Habitat in alpinis Helvetiae, Auſtriae, Stiriae, Horto Dei. ♃ (v. ſ.)

Calyces *hirſuti, purpurei.*

Foliola *cuneiformia apice argute ſerrata, dente terminali reliquis breviore.* Corymbus *terminalis multiflorus.* Petala *obovata alba.* W.

*30. POTENTILLA *cluſiana.*

P. foliis quinatis apice conniventi-ſerratis, caulibus multifloris decumbentibus, receptaculis hirſutis, petalis ſubrotundis. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 478. *Iacq. auſtr. t.* 116. *Hoſt. ſynop.* 285.
Quinquefolium ſecundum minus albo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 105.
Cluſiſches Fingerkraut. W.
Habitat in Auſtriae *alpibus.* ♃ (v. ſ.)

Simillma praecedenti, tamen diſtincta: Foliis *apice* 3-ſ. 5-*dentatis, dentibus aequalibus,* corymbo 5-ſ. 10-*floro, nec* 20-*floro,* petalis *ſubrotundis, denique* ſtatura *minori.* W.

*31. POTENTILLA *lupinoides.* W.

P. foliis quinatis utrinque ſericeo-villoſis, foliolis obovatis apice obtuſe dentatis, petalis calycis longitudine, receptaculis lanatis. W.
Potentilla valderia. *Villars delph.* 3. *p.* 572. * (*excluſis ſynonymis.*)
Feigbohnenblättriges Fingerkraut. W.
Habitat in Delphinatus *alpibus.* ♃ (v. ſ.)

Toto coelo a P. valderia diſtincta, ut ex ſpecimine mecum a Claſſ. Villars communicato vidi. Differt a P. valderia: foliis *utrinque ſericeo villoſis, nec ſubtus tomentoſis,* foliolis *apice tantum dentatis,* ſtatura *duplo minori. A P. caulefcenti diverſa,* foliis *utrinque ſericeo-villoſis,* foliolis *obovatis,* petalis *longitudine ca-*

lyeis, ſtatura *minorii*, *a P. nitida*: foliis *quinatis*, *pilis non tam denſis ac nitidis*, caule *multifloro altiore et* petalorum *magnitudine*. W.

32. POTENTILLA *nitida*.

P. foliis ſubternatis tomentoſis conniventi-tridentatis, caulibus unifloris, receptaculis lanatis. *Syſt. veg.* 398.

P. foliis quinatis tomentoſis conniventi-tridentatis, caulibus unifloris, receptaculis lanatis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 316. * *Sp. pl.* 2. *p.* 714. *Iacq. auſtr.* 5. *t.* 25.

Heptaphyllum argenteum alpinum trifoliatum ſabaudum. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 20. *t.* 9.

Trifolium alpinum argenteum perſici flore. *Bauh. pin.* 328. *Pon. bald.* 222. *Raj. hiſt.* 615.

Comaroides alpina argentea perſici flore. *Segv. ver.* 1. *p.* 497.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 162.

Glänzendes Fingerkraut. W.

Habitat in Baldo, Auſtria. ♃ (v. ſ.)

Folia *ternata eſſe monet D. Turre*; *habeo unum alterumve exemplar ſiccum foliis infimis tantum quinatis.* Cultura *determinabit folia radicalia.*

33. POTENTILLA *valderia*.

P. foliis ſeptenatis obovatis ſerratis tomentoſis, caule erecto, petalis calyce brevioribus, receptaculis lanatis *Sp. pl.* 714. *Allion. pedem n.* 1454. *t.* 24. *f.* 1.

Quinquefolium pyrenaicum, folio ſubtus argenteo. *Tournef. inſt.* 297.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 262.

Valdenſiſches Fingerkraut. W.

Habitat in alpibus Valderianis *et* Vinadenſibus. ♃ (v. ſ.)

Folia radicalia *ſeptena*: *foliolis obovatis*, *conniventiſerratis*, *ſubtus valde tomentoſis.* Caulis *erectus paucis foliis ternatis.* Flores *dichotomi*, *corymboſi*, *conferti.* Petala *alba*, *calyce breviora.*

34. POTENTILLA *reptans*.

P. foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Mat. med.* 131. *Neck. gallob. p.* 222. *Pall. it.* 1. *p.* 205. *Pollich. pal. n.* 499. *Scop. carn. n.* 622. *Blackw. t.* 454. *Ludw. ect. t.* 116. *Kniph. cent.* 7. *n.* 73. *Hoffm. germ.* 180. *Roth. germ. I.* 223. *II.* 575.

Fragaria foliis quinatis ſerratis, petiolis unifloris, caule reptante. *Hall. helv. n.* 118.

Fragaria Pentaphyllum. *Crantz. auſtr. p.* 80.
Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patenti-ſerratis, caule repente. *Hort. cliff.* 194. *Gron. virg.* 163.
Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.
Quinquefolium majus luteum. *Fuchſ. hiſt.* 624.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 163.
Gemeines Fingerkraut. W.
Habitat in Europae *apricis argilloſis.* ♃ (v. v.)

*** *Foliis ternatis.*

35. POTENTILLA *monſpelienſis.*

P. foliis ternatis, caule ramoſo erecto, pedunculis ſupra genicula enatis. *Hort. upſ.* 134. * *Mill. dict. n.* 7.
Pentaphylloides majus erectum, flore luteo. *Moriſ hiſt.* 2. *p.* 193. *ſ.* 2. *t.* 20. *f.* 2.
Pentaphylloides fragariae folio. *Magn. monſp.* 304.
Fragaria ſterilis alpina cauleſcens. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 42.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 164.
Franzöſiſches Fingerkraut. W.
Habitat Monſpelii. ⊙ (v. v.)
Foliola *ovata, obtuſe et aequaliter ſerrata.*

36. POTENTILLA *norvegica.*

P. foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. *Sp. pl.* 715. *Fl. dan.* 171. *Hoffm. germ.* 180. *Retz. obſ.* 1. *p.* 20.
Fragaria foliis ternatis hirſutis, caulinis tripartitis, ſtipulis ovato lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1115?
P. foliis ternatis, caule corymboſo erecto. *Fl. ſuec.* 420, 457. *
P. foliis ternatis inciſis, caule diffuſo. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 475.
Quinquefolium hirſutum luteum paucioribus laciniis. *Loeſel. pruſſ.* 218. *t.* 70.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 164.
Norvegiſches Fingerkraut. W.
Habitat in Norvegiae, Sueciae, Boruſſiae, Canadae, Sibiriae *agris.* ⊙ (v. v.)
Foliola *lanceolata, ſerrata, dentata.*

37. POTENTILLA *nivea.*

P. foliis ternatis inciſis ſubtus tomentoſis, caule adſcendente. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 458. * *Gunn. norv. n.* 512. *t.* 3. *f.* 1.

P. foliis ternatis utrinque hirſutis, infra candidis, foliolis ovatis ſerratis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 183. *t.* 36. *f.* 1.
P. foliis ampliter crenatis ſubtus tomentoſis. *Hall. goett.* 2. *p.* 108.
Fragaria ſterilis, folio ſubtus argenteo. *Amman. ruth. n.* 111.
β. Potentilla leucophylla. *Pall. itin.* 3. *p.* 194.
Fragaria ſterilis procumbens, foliis betonicae inſtar ſerratis. *Amm. ruth. n.* 109. *t.* 14. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 165.
Schneeweiſses Fingerkraut. W.
Habitat in alpibus Lapponiae, Sibiriae. ♃ (v. ſ.)

Structurâ *P. vernae, ſeu folia P. argenteae, at terna et latiora, magisque hirſuta, ſubtus tomentoſa nivea.* Corolla *lutea.*

*38. POTENTILLA *ſpecioſa.* W.

P. foliis ternatis ellipticis obtuſis dentatis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo. W.
Fragaria cretica fruticoſa, folio ſubtus argenteo. *Tournef. cor.* 21.
Prächtiges Fingerkraut. W.
Habitat in Creta. ♄ (v. ſ.)

Caulis *fruticoſus humilis, ramis craſſitie pennae cygneae brunneis, cortice rimoſo ſua ſponte decidente tectis.* Folia *magnitudine et ſigura Fragariae veſcae ſuperne pubeſcentia, ſubtus niveo-tomentoſa.* Petioli *albo-tomentoſi.* Stipulae *lanceolato-acuminatae ſcarioſae.* Corymbi *longe pedunculati, foliis binis alternis remotis ſimplicibus inſtructi.* Pedunculi *valde tomentoſi.* Calyx *tomentoſus magnitudine corollae albae.* W.

*39. POTENTILLA *tridentata.*

P. foliis ternatis cuneiformibus apice trifidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 216. *t.* 9. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 59.*
P. (*retuſa*) foliis ternatis hirtis apice retuſo tridentato. *Retz. prodr. fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 642. *Fl. dan.* 799.
Dreyzähniges Fingerkraut. W.
Habitat in Groenlandia, Terra Nova. ♃ (v. ſ.)

Corolla *flava.* W.

40. POTENTILLA *grandiflora.*

P. foliis ternatis dentatis utrinque ſubpiloſis, caule decumbente foliis longiore. *Sp. pl.* 715. *Mill. dict. n.* 8.

Fragaria foliis ternatis, ſericeis, caule declinato, petalis calycem ſuperantibus. *Hall. helv. n.* 1114. *t.* 21.
P. foliis ternatis dentatis utrinque ſubvilloſis et viridibus ovatis ſerratis obtuſis. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 183. *n.* 32. *t.* 35. *f.* 1. 2.
P. foliis ternatis dentatis, caule ſuperne dichotomo, petalis calyce duplo longioribus. *Ger. prov.* 409.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 166.
Groſsblütiges Fingerkraut. W.
Habitat in Helvetia, Sibiria, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Folia *utraque pagina concoloria, nec inferiori argentea.* Caules *pedales, adſcendentes: rufeſcentes.* Corolla *magna flava. Planta ſibirica occurrit quandoque foliis nonnullis quinatis.* W.

41. POTENTILLA *ſubacaulis.*

P. foliis ternatis dentatis utrinque tomentoſis ſcapo decumbente. *Sp. pl.* 715. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 183. *n.* 34. *t.* 36. *f.* 2.
P. (*frigida*) foliis ternatis ſerratis hirſutis, petalis ovatis vix calyce longioribus. *Vill. delph.* 3. *p.* 563.
P. foliis radicalibus ternatis dentatis utrinque tomentoſis, caulibus ſubfolioſis. *Ger. prov.* 469. *Garid. aix.* 190. *t.* 37.
Fragaria ſterilis molli lanugine pubeſcens. *Amm. ruth.* 84. *n.* 110.
Fragaria ſterilis ſylveſtris ſericea ſ. incana. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 187.
Fragariae affinis ſericea incana. *Bauh. pin.* 327. *prodr.* 139.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 166.
Kurzſtieliges Fingerkraut. W.
Habitat in Sibiria, Gallia *auſtrali*, Granada, Galloprovinciae *rupe victoriae.* ♃ (v. ſ.)

Folia *ternata, rugoſa, denſe tomentoſa, piloſa, coriacea, cuneiformia, obtuſa, dentata.* Stipulae *latae, piloſae.* Caulis *ſ. Scapus decumbens, foliis ſaepe longior, biflorus ſ. uniflorus.* Corolla *maxima, lutea; petalis emarginatis, baſi flavis.* Stamina *lutea.*

Omnia ſynonyma, excepto Villarſii, Gmelini et Ammanni, videntur ad varietates P. vernae pertinere etiam ſibirica planta, forte nil niſi climate mutata P. verna eſt? W.

1001. TORMENTILLA.

Gen. plant. ed. Reich. n. 691.

Cal. 8-fidus. *Petala* 4. *Sem.* ſubrotunda, nuda, receptaculo parvo exſucco affixa.

1. TORMENTILLA *erecta.*

T. caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 716. *Pall. it.* 2. *p.* 655. *Pollich. pal. n.* 500. *Blackw. t.* 445. *Ludw. ect. t.* 174. *Fl. dan. t.* 589. *Kniph. cent. n.* 93. *Knorr. del.* 2. *t. T.* 1. *Hoffm. germ.* 180. *Roth. germ. I.* 220. *II.* 566,

Tormentilla. *Cam. epit.* 685. *Fl. lapp.* 213. *Fl. ſuec.* 421, 459. *Mat. med.* 132. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 267.

Fragaria tetrapetala, foliis caulinis ſeſſilibus, quinatis. *Hall. helv. n.* 1117.

Fragaria tormentilla officinarum. *Crantz. auſtr. p.* 80.

Potentilla Tormentilla erecta. *Scop. carn. n.* 620.

Potentilla (*ſylveſtris*) caule erectiuſculo, foliis ternis ſeſſilibus: corollis tetrapetalis. *Neck. gallob. p.* 222.

Tormentilla ſylveſtris. *Bauh pin.* 326.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 168.

Aufrechte Tormentill. W.

Habitat in Europae *paſcuis ſiccis.* ♃ (v. v.)

2. TORMENTILLA *reptans.*

T. caule repente, foliis petiolatis. *Sp. pl.* 716. *Hudſ. angl.* 197. *Hoffm. germ.* 180. *Roth. germ. I.* 220. *II.* 567.

Pentaphyllum minus viride, flore aureo tetrapetalo, radiculas in terram e geniculis dimittens. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 190.

Pentaphyllum reptans alatum, foliis profundius ſerratis. *Plot. oxf.* 6. §. 7. *t.* 9. *f.* 5.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 169.

Liegende Tormentill.

Habitat in Angliae, Germaniae *nemoribus umbroſis.* ♃ (v. v.)

Tormentillae non differunt a Potentillis niſi numero partium conſtanti. W.

1002. GEUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 867.

Cal. 10-fidus. Petala 5. *Sem.* ariſta geniculata.

1. GEUM *virginianum.*

G. floribus erectis, ariſtis uncinatis nudis, foliis caulinis ternatis, ſuperioribus lanceolatis petalis calyce brevioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 217.

G. floribus erectis, fructu globoſo: ariſtis uncinatis nudis, foliis ternatis. *Sp. pl.* 716. *Hort. cliff.* 195. *Gron. virg.* 56. *Mill. dict. n.* 6. *Willich. illuſt.* 175.

G. foliis inferioribus quinatis, pinnis rhomboidalibus rariter inciſis, ſuperioribus ternatis, ſtipulis oblongis, amplis, laciniatis, confluentibus, ſeminibus piloſis ariſta nuda. *Murray. comm. nov. Goett. Tom.* 5. *p.* 32. *t.* 32.

Geum canadenſe. *Iacq. hort.* 2. *p.* 82. *t.* 175.

Geum carolinianum. *Walt. carol.* 150. *

Caryophyllata virginiana, albo flore minore, radice inodora. *Herm. par.* 111. *t.* 111.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 170.

Weiſses Geum. W.

Habitat in Virginia, Carolina. ♃ (v. v.)

Differt a G. urbano ſimillimo: Petalis albis calyce brevioribus; Floribus floreſcentibus nutantibus; Pedunculis verſus florem incraſſatis; Seminibus piloſis; Foliis radicalibus ſubbipinnatis.

*2. GEUM *ſtrictum.*

G. floribus erectis, ariſtis uncinatis nudis, foliis caulinis pinnatis, foliolis ſtipulisque inciſo-fiſſis, petalis calyce longioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 217.

G. (*canadenſe*) floribus erectis, ſeminibus hirſutis, ariſtis nudis, foliis omnibus pinnatis, pinnis cuneiformibus inciſis. *Murr. Comment. goett.* 5. *p.* 33. *t.* 4. *B.*

G. (*aleppicum*) floribus erectis, fructibus oblongis hirſutis, ariſtis uncinatis nudis, foliis pinnatis cauleque hirſutis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 93. *Collect.* 1. *p.* 88. *

Steifes Geum. W.

Habitat in America *boreali.* ♃ (v. v.)

3. GEUM *urbanum.*

G. floribus erectis, ariſtis uncinatis nudis, foliis caulinis ternatis, radicalibus lyrato-pinnatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 218.

G. floribus erectis, fructibus globoſis villoſis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. ſuec.* 423, 460. *Mat. med.* 132. *Roy. lugdb.* 276. *Gmel. ſib.* 3. *p.* 188. *Crantz. auſtr. p.* 69. *Pollich. pal. n.* 501. *Blackw. t.* 253. *Ludw. ect. t.* 36. *Kniph. cent.* 9. *n.* 42. *Flor. dan. t.* 672. *Hoffm. germ.* 181. *Roth. germ. I.* 224: *II.* 576.

G. foliis pinnatis, pinna ultima trilobata, floribus patulis, tubis aduncis. *Hall. helv. n.* 1130.

G. foliis inferioribus quinatis, ſuperioribus ternatis, ſupremis ſimplicibus, ſtipulis ſubrotundis diſtinctis trilobis, ſeminibus hiſpidis, ariſta nuda. *Murray. in nov. comm. Goett.* 5. *p.* 33. *t.* 4. *A.*

Caryophyllata urbana. *Scop. carn. n.* 628.

Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.

Caryophyllata. *Dod. pempt.* 137.

β. G. (*intermedium*) foliis interrupte-pinnatis, floribus ſubnutantibus, calycibus patentibus (nec conniventibus, nec reflexis) petalis ſubrotundo-obovatis unguiculatis, germinibus piloſis, ariſta nuda uncinata, ſtylo piloſo, fructu pedicellato. *Ehrh. Beitr.* 6. *p.* 143.

Caryophyllata vulgaris majore flore. *Bauh. pin.* 321. *Mapp. alſ.* 58.

Caryophyllata montana ſimilis vulgari. *Camm. hort.* 35.

Caryophyllata ſylveſtris. *Fuchs. hiſt.* 385.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 171.

Gemeines Geum. W.

Habitat in Europae *umbroſis.* ♃ (v. v.)

Folia *radicalia lyrata in hac, et ſtipulae dentatae.*

*4. GEUM *japonicum.*

G. floribus erectis, fructibus hirſutis, ariſtis nudis, foliis ſubtrilobis. *Thunb. jap.* 220.

Japaniſches Geum. W.

Habitat in Japonia. ♃

Caulis *teres flexuoſus erectus hirſutus pedalis et ultra, apice parum et rarius ramoſus.* Rami *alterni breviſſimi ſubtomentoſi.* Folia *alterna petiolata ſubrotunda triloba vel ſubquinqueloba dentata villoſa mollia pollicaria.* Petiolus *tomentoſus folio paullo brevior.* Stipulae *binae foliaceae ovatae inciſo-dentatae petiolo breviores.* Flores *terminales in caule et ramis ſolitarii.* Calyx *decemfidus, laciniis alternis minoribus.* Petala *longitudine calycis.* Semina *ovata pilis griſeis hirta*

ariſtata. Ariſtae *ſubulatae uncinatae reflexae glabrae.* Thunb. l. c.

5. GEUM *rivale.*

G. floribus nutantibus, petalis longitudine calycis, ariſtis plumoſis medio tortis. W.

G. floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis tortis. *Hort. cliff.* 195, *Fl. ſuec* 424, 461. *Roy. lugdb.* 576. *Mat. med.* 132. *Fl. lapp.* 216. *Mill. dict. n.* 2. *Fl. dan. t.* 722. *Kniph. cent.* 1. *n.* 36. *Hoffm. germ.* 181. *Roth. germ. I.* 224. *II.* 576.

G. foliis pinnatis, pinnis acutis, extrema maxima trilobata, floribus conniventibus: nutantibus. *Hall. helv. n.* 1129.

Geum nutans. *Crantz. auſtr. p.* 70.

Caryophyllata rivalis. *Scop. carn. n.* 629.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.

Caryophyllata ſeptentrionalium. *Lob. ic.* 694.

β. G. (*hybridum*) flore nutante, calyce folioſo, corollam polypetalam excedente. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 94. *Miſc.* 2. *p.* 33. *

Anemone dodecaphylla. *Krock. ſileſ.* 2. *p.* 235. *t.* 20.

Caryophyllata montana flore pleno prolifero, folio hederae terreſtris. *Breyn. cent. p.* 130. *t.* 60.

Caryophyllata prolifera floſculis ele ntiſſimis. *Loeſel. pruſſ.* 37. *t.* 6.

Caryophyllata montana tertia. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 104.

Caryophyllata aqutica floribus plenis magis nutantibus. *Cam. epit.* 726.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 172.

Waſſer-Geum. W.

Habitat in Europae *pratis ſubhumidis.* ♃ (v. v.)

Seminum ariſtae apex in hac piloſus, in antecedentibus nudus.

*6. GEUM *pyrenaicum.* W.

G. floribus nutantibus, petalis calyce longioribus, ariſtis piloſis baſi tortis. W.

Caryophyllata pyrenaica ampliſſimo folio et rotundiore, nutante flore. *Tournef. inſt.* 295.

Pyrenäiſches Geum. W.

Habitat in Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Caulis *erectus ſesquipedalis villoſus.* Folia *radicalia pinnata utrinque pilis tecta, pinna terminalis* 3-4-*uncialis ſubrotunda cordata ampliſſima ſubtriloba.* Fo-

lia *caulina cuneiformia inciſo dentata acuminata.* Stipulae *oblongae profunde dentatae.* Petala *ſubrotunda calyce majora.* Semina *villoſo-lanata.* Ariſta *ſupra baſin torta pilis raris tecta, apice nuda. Affine G. rivali, ſed magnitudine foliorum radicalium, et ariſtae fabrica diverſum. An varietas?* W.

*7. GEUM *atlanticum.*

G. villoſum, foliis inferioribus pinnatis, pinnula terminali cordata maxima, caule ſubunifloro, fructibus hirſutis, ariſtis contortis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 408.

Atlantiſches Geum. W.

Habitat in monte Atlas *prope* Tlemſen. ♃

Planta *tota villoſa.* Caulis *pedalis ſeu ſesquipedalis et ultra ſimplex uniflorus.* Folia *radicalia petiolata pinnata, pinnulis* 3-5 *quandoque* 7, *remotis ſubrotundis aut ovatis crenato-dentatis, terminalis cordata obtuſa maxima, caulina inferiora obovata, ſuperiora inaequaliter lobata aut laciniata, laciniis acutis.* Stipulae *magnae ovatae inciſae.* Flos *G. montani.* Petala *lutea.* Semina *villoſa.* Ariſta *contorta nunc glabra nunc ſubvilloſa. Affine G. montano, differt* foliolis *paucioribus remotioribus,* caule *altiore,* ariſtis *contortis nec barbatis.* Desfont. l. c.

*8 GEUM *potentilloides.*

G. caule ſubbifloro, ariſtis rectis nudis, calycibus fructus erectis, foliis pinnatis dentatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 219.

Geum Laxmanni. *Gaert. ſem.* 1. *p.* 352. *t.* 74.

Caryophyllata (*potentilloides*) foliis interrupte pinnatis hirſutis ceſpitoſis, ſcapis declinatis ſubtrifloris. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 395.

Dryas (*geoides*) pentapetala, foliis pinnatis, pinnis extimis confluentibus. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 481. *Pall. it.* 3. *app. n.* 92. *t. Y. f.* 1. * *Iacq. hort.* 3. *p.* 38. *t.* 68. *Falk. ruſſ. t.* 11.

Fingerkrautartiges Geum. W.

Habitat in Sibiriae *rupeſtribus a montibus* Altaicis *usque ultra* Jeniſeam. ♃ (v. v.)

9. GEUM *montanum.*

G. caule unifloro, ariſtis rectis villoſis, foliis pinnatis, piloſis, foliolo extimo maximo ſubrotundo, inferioribus ſenſim minoribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 218.

G. flore inclinato ſolitario, fructu oblongo, ariſtis villo-

ſis rectis. *Sp. pl.* 717. *Mill. dict. n.* 4. *Crantz. auſtr. p.* 70. *n.* 2. *Iacq. auſtr.* 4. *p.* 38. *t.* 373. *Mattuſch. ſil. n.* 372.

G. foliis pinnatis, extrema maxima, rotunde cordata. *Hall. helv n.* 1131.

Caryophyllata montana. *Scop. carn. n.* 630.

Caryophyllata alpina lutea. *Bauh. pin.* 322.

Caryophyllata alpina. *Pon. bald.* 342.

Caryophyllata montana. *Cam. epit.* 727.

β. Caryophyllata alpina minor. *Bauh. pin.* 322. *prodr.* 139.

Caryophyllata alpina minima, flore aureo. *Barr. rar.* 588. *t.* 399.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 173.

Berg-Geum. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Auſtriae, Sileſiae, Delphinatus. ♃ (v. ſ.)

Folia hirſuta. Flos patens. Caulis uniflorus. Petala lutea, emarginata.

Flos *erectus. Crantz. Scop. l. c.*

10. GEUM *reptans.*

G. caulibus unifloris, ariſtis rectis villoſis, foliis pinnatis inciſis piloſis, flagellis reptantibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 219.

G. foliis uniformibus inciſis: alternis minoribus, flagellis reptantibus. *Sp. pl.* 717.

G. foliis pinnatis, trilobatis, inciſis, flagellis folioſis. *Hall. helv. n.* 1132.

Caryophyllata alpina, apii folio. *Bauh. pin.* 322.

Caryophyllata alpina tenuifolia incana, flore luteo longius radicata. *Barr. rar.* 589. *t.* 400. *Bocc. muſ.* 160. *t.* 128.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 174.

Kriechendes Geum. W.

Habitat in Helvetia *et valle* Barſilionenſi. ♃ (v. ſ.)

Caules *uniflori, vix foliis longiores.*

11. GEUM *anemonoides.* W.

G. caule unifloro, ariſtis rectis villoſis, foliis pinnatis glabris, foliolis cuneiformibus apice dentatis. W.

Dryas anemonoides. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 92. *nota* 2. *t. E. e. f.* 4.*

Dryas (*pentapetala*) floribus pentapetalis, foliis pinna

tis. *Sp. pl.* 717. *Amoen. acad.* 2. *p.* 353. * *Gmel. ſib.* 3. *p.* 187. *n.* 43.

Caryophyllata (*kamtſchatica*) foliis radicalibus pinnatis glabris, ſcapo ſubnudo unifloro. *Lamarck. encyclp.* 1. *p.* 395. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 175.

Anemonenartiges Geum. W.

Habitat in Kamtſchatca. ♃ (v. ſ.)

1003. DRYAS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 868.

Cal. ſimplex 8-fidus. *Petala* 8. *Sem.* caudata, piloſa.

1. DRYAS *octopetala.*

D. floribus octopetalis, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 215. *Fl. ſuec.* 426, 462. *Hort. cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 279. *Segu. ver.* 512. *Gmel. ſib. p.* 188. *Scop. carn. n.* 631. *Moench. haſſ. n.* 428. *Hoffm. germ.* 181. *Roth. germ. I.* 221. *II.* 568.

D. floribus octopetalis, foliis ovatis, ſubtus albiſſimis. *Hall. helv n.* 1133.

Geum (*chamaedrifolium*) flore erecto octopetalo, fructu oblongo, ariſtis lanigeris. *Crantz. auſtr. p.* 70. *n.* 4.

Chamaedrys 3 ſ. montana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 351.

Leucas; Chamaedrys alpina. *Oed. dan. t.* 51.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 175.

Alpen-Dryade. W.

Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis, Auſtriacis, Sabaudicis, Hibernicis, Sibiricis, Germanicis. ♃ (v. ſ.)

Petala 10, 6, *plerumque* 8, *raro* 5. Crantz. l. c.

Caulis *proſtratus ramoſus.* Folia *petiolata oblonga profunde dentata, ſuperne viridia glabra rugoſo-venoſa, ſubtus niveo-tomentoſa.* Petioli *villoſi.* Pedunculi *uniflori nudi adſcendentes.* Corolla *alba calyce major.* *Dryas differt a Geo calyce ſimplici octophyllo, hinc Dryas pentapetala Linnaei et D. geoides Pallaſii ob calycem duplicem Geis adnumeravi.* W.

1004. COMARUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 869.

Cal. 10-fidus. *Petala* 5, calyce minora. *Recept.* ſeminum ovatum, ſpongioſum, perſiſtens,

1. COMARUM *paluſtre.*

Comarum. *Fl. lapp.* 214. *Fl. ſuec.* 422, 463. *Hort. cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 276. *Pollich. pal. n.* 502. *Pall. it. p.* 72. *Fl. dan. t.* 636. *Kniph. cent.* 9. *n.* 24. *Hoffm. germ.* 182. *t.* 7.
C. foliis pinnatis, petalis calyce minoribus. *Roth. germ. I.* 224. *II.* 578.
Fragaria foliis pinnatis, petalis lingulatis minimis. *Hall. helv. n.* 1128.
Fragaria paluſtris. *Crantz. auſtr. p.* 73. *u.* 4.
Potentilla paluſtris. *Scop. carn. ed.* 2. *p.* 617.
Quinquefolium paluſtre rubrum. *Bauh. pin.* 325.
Pentaphyllum paluſtre. *Cord. hiſt.* 95.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 178.
Sumpf Comarum. W.
Habitat in Europae *et* Aſiae *uliginoſis* ♃ (v. v.)

1005. CALYCANTHUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 870.

Cal. 1-phyllus, urceolatus, ſquarroſus, foliolis, coloratis. *Cor.* 0. *Styli* plurimi Stigmate glanduloſo. *Sem.* plurima, caudata, intra calycem ſucculentum.

1. CALYCANTHUS *floridus.*

C. laciniis calycinis interioribus lanceolatis. W.
C. petalis interioribus longioribus. *Sp. pl.* 718. *Willd. arb.* 51.* *Du Roi. harbk. ed.* 2. 1. *p.* 190.
α. *oblongatus* foliis oblongis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 220.
Buttneria anemones flore. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 114. *t.* 45.
Baſteria foliis ovatis oppoſitis, floribus lateralibus, caule fruticoſo ramoſo. *Mill. dict. et ic. t.* 60.
Beureria petalis coriaceis oblongis, calycis foliolis reflexis. *Ehret. pict. t.* 13.
Frutex corni foliis, floribus inſtar anemones ſtellatae, pe-

talis craſſis rigidis colore ſordide rubente, cortice aromatico. *Cateſb. car.* 1. *p.* 46. *t.* 46.

β. *ovatus* foliis ſubrotundo-ovatis. *Ait. l. c.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 681.
Caroliniſche Kelchblume. W.
Habitat in Carolina. ♄ (v. v.)
A Cateſbaeo in Europam introductus.

2. CALYCANTHUS *praecox.*
C. laciniis calycinis interioribus ſubrotundo-ovatis. W.
C. petalis interioribus minutis. *Sp. pl.* 718. *Ait. Kew.* 2. *p.* 220. *t.* 10.
Abai ſ. Robai. *Kaempf. amoen.* 878. *t.* 879.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 682.
Japaniſche Kelchblume. W.
Habitat in Japonia. ♄ (v. ſ.)

Ignota mihi, videtur praecedentis generis, ſed diverſae ſpeciei, quod floreat ante folia, quodque petala interiora lutea minora flori adſcribantur.

Diſtincta a praecedente: foliis *multo majoribus ovato-lanceolatis acuminatis*, praecocitate *floris*, laciniis *calycinis interioribus ſubrotundo-ovatis*, ſtaminibus *quinque*. W.

Claſſis XIII.

P O L Y A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

* *Monopetali.*

1054. SWARTZIA. *Cal.* 4-partitus. *Petalum* planum laterale. *Legumen.*
1006. MARCGRAVIA. *Cal.* 6-phyllus, imbricatus. *Cor.* 1-petala, clauſa. *Bacca* multilocularis, multivalvis.
1007. TERNSTROEMIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* rotata, limbo campanulato, 5-partito. *Bacca* exſucca bilocularis.

* *Tripetali.*

1008. TRILIX. *Cal.* 3-phyllus. *Bacca* 5-locularis, polyſperma.

† *Sterbeckia lateriflora, Tetracerae nonnullae.*

* *Tetrapetali.*

1023. MAMMEA. *Cal.* 2-phyllus. *Bacca* 1-locularis. *Sem.* calloſa.
1015. PAPAVER. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 1-locul. coronata.
1014. CHELIDONIUM. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua.*
1027. SPARRMANNIA. *Cal.* 4-phyllus. *Capſ.* pentagona quinquelocularis, loculis diſpermis.
1010. CAPPARIS. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* pedicellata, corticoſa.
1011. ACTAEA. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 1-locularis. *Sem.* gemino ordine.
1026. CALOPHYLLUM. *Cal.* 4-phyllus. *Drupa* globoſa. *Nucleus* ſubgloboſus.
1025. GRIAS. *Cal.* 4-fidus. *Drupa* 1-ſperma. *Nucleus* 8 ſulcatus.

† *Vallea ſtipularis, Legnotis elliptica, Cleome Chelidonii, felina, Tetracera nitida.*

* *Pentapetali.*

1044. STERBECKIA. *Capſ.* cylindracea corticoſa. *Semina* imbricata in pulpa nidulantia.
1043. LOASA. *Capſ.* ſemi-infera, 1-locularis, ſemitrivalvis, polyſperma.
1042. MENTZELIA. *Capſ.* infera, 1-locular. 3-valvis, polyſperma.
1049. VALLEA. *Capſ.* ſupera 4-ſ. 5-angularis unilocularis polyſperma.
1050. BONNETIA. *Capſ.* ſupera 3-locularis 3-valvis polyſperma. *Cal.* 5-partitus.
1036. LEGNOTIS. *Capſ.* ſupera 3-locularis 3-valvis. *Sem.* ſolitaria. *Cal.* 5-fidus.
1046. FREZIERA. *Bacca* exſucca 3-locularis. *Cal.* 5-phyllus.
1034. MARILA *Capſula* 4-locularis 4-valvis polyſperma. *Cal.* 5-phyllus.
1048. CISTUS. *Capſ.* ſubrotunda. *Cal.* 5-phylli foliola 2 minora.
1038. LEMNISCIA *Pericarp.* 5-loculare. *Cal.* 5-dentat. *Nectarium* cyathiforme.
1037. MYRODENDRUM. *Pericarp.* 5-loculare. *Cal.* 5-dentat. *Nectarium* o.
1052. CORCHORUS. *Capſ.* ſub 5-locularis. *Cal.* 5-phyllus, longitudine corollae, deciduus.
1018. SARRACENIA. *Capſ.* 5-locularis. *Stigma* clypeatum. *Cal.* exter. 3-phyllus, ſuper. 5-phyllus.
1028. TILIA. *Capſ.* 5-locul. coriacea, 1-ſperma. *Cal.* deciduus.
1022. AUBLETIA. *Capſ.* echinata 10-locularis polyſperma. *Cal.* coloratus.
1024. OCHNA. *Baccae* 5 in receptaculo carnoſo. *Petala* unguibus elongatis.
1039. ASCIUM. *Bacca* unilocularis polyſperma. *Cal.* 5-phyllus.
1031. GREWIA. *Drupa* 4-loba 4-locularis. *Cal.* 5-phyllus.
1017. MUNTINGIA. *Bacca* 5-locularis, umbilicata. *Cal.* partitus.
1035. ELAEOCARPUS. *Drupa* nuce criſpa. *Petala* lacera.

1033. MICROCOS. *Drupa* nuce triloculari. *Petala* linearia.

† *Delphinium Conſolida*, *Aiacis*, *Aconiti*, *Laetia completa*.

* *Hexapetali.*

1016. [illegible]MONE. *Cal.* 3-phyllus. *Capſ.* 1-locularis, ſemivàlvis.

1045. LAGERSTROEMIA. *Cal.* 6-fidus. *Stam.* 6, exteriora majora. *Capſ.* 6-locul. polyſperma.

1041. ALANGIUM. *Cal.* 6-10-dentatus ſuperus. *Petala* 6-ſ. 10. *Bacca* corticoſa 2-3-ſperma.

1047. THEA. *Cal.* 5-ſ. 6-phyllus. *Petala* 6 ſ. 9. *Capſ.* 3-locularis. *Sem.* ſolitaria.

1040. LECYTHIS. *Cal.* 6-phyllus. *Stam.* nectario lingulato connata. *Capſ.* circumſciſſa.

† *Ternſtroemia meridionalis.*

* *Octopetali.*

1012. SANGUINARIA. *Cal* 2-phyllus. *Capſ.* 2-valvis, polyſperma.

* *Enneapetali.*

1013. PODOPHYLLUM. *Cal.* 3-phyllus. *Bacca* 1-locularis, coronata.

† *Thea.*

* *Decapetali.*

1020. BIXA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-petala, duplex. *Capſ.* 2-valvis.

† *Alangium decapetalum.*

* *Polypetali.*

1019. NYMPHAEA. *Bacca* multilocul. corticoſa. *Cal.* magnus.

* *Apetali.*

1051. PROCKIA. *Cal.* 3-phyllus. *Peric.* 5-loculare.

1032. MAERUA. *Cal.* 4-fidus tubo nectarifero. *Peric.* pedicellatum.

1009. LUDIA. *Cal.* 4-ſ. 9-partitus. *Pericarp.* uniloculare polyſpermum.

1021. SLOANEA. *Cal.* 5-9 fidus. *Peric.* echinatum 3-6 loculare 3-6 valve. *Semina* arillata.

T 2

[redacted]






**IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)**

6″

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503


2.8
2.5
3.2
2.2
3.6
2.0
1.8


1.0

1030. RYANIA *Cal.* 5-phyllus. *Pericarp.* uniloculare polyſpermum. *Semina* arillata.

1029. LAETIA. *Cal.* 5-phyllus. *Peric.* 1-loculare, 3-valve, polyſpermum.

1053. SEGUIERIA. *Cal.* 5-phyllus. *Peric.* 1-ſpermum, alatum.

† *Crataeva Marmelos, Tetracera ſarmentoſa.*

DIGYNIA.

1057. FOTHERGILLA. *Cal.* integerrimus. *Cor.* nulla. *Capſ.* 2-locularis. *Sem.* bina.

1056. CURATELLA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Capſ.* 2-partita, 2-ſperma.

1055. PAEONIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* polyſperma. *Sem.* colorata.

1058. TRICHOCARPUS. *Cal.* 4-ſ. 5-partitus. *Cor.* o. *Capſ.* ſetoſa polyſperma.

1059. LACIS. *Cal.* o. *Cor.* o. *Capſula* 2-valvis polyſperma.

† *Tetracera laevis.*

TRIGYNIA.

1061. DELPHINIUM. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala: ſupremo petalo cornuto. *Nectar* 2-fidum, ſeſſile.

1062. ACONITUM. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala: ſupremo galeato. *Nectar.* 2, pedicellata.

1060. HOMALIUM. *Cal.* 6-7-partitus. *Cor.* 6-7-petala. *Stamina* per tria aggregata.

† *Reſeda Luteola. Corchorus aeſtuans.*

TETRAGYNIA.

1063. WINTERA. *Cal.* integer. *Cor.* 6-petala. *Baccae* 4, 4-ſpermae.

1067. CIMICIFUGA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* nectariis, 4, urceolatis. *Capſ.* 4. *Sem.* ſquamoſa.

1066. WAHLBOMIA. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* 4-petala. *Peric.* 4, roſtrata.

1064. TETRACERA. *Cal.* 6-phyllus. *Capſ.* 4, monoſpermae. *Stamina* dilatata utrinque antherifera.

1065. CARYOCAR. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Drupa* nucibus 4.

† *Elaeocarpus Dicera.*

PENTAGYNIA.

1068. AQUILEGIA. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Nectaria* 5, inferne cornuta.
1069. NIGELLA. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* 8, ſuperne 2-labiata.
1070. REAUMURIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala: nectariis 10, adnatis, ciliatis. *Capſ.* 5-locularis, polyſperma.

† *Aconita et Delphinia nonnulla.*

POLYGYNIA.

1091. HYDRASTIS. *Cal.* nullus. *Cor.* 3-petala. *Bacca* compoſita acinis 1-ſpermis.
1082. ATRAGENE. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala major: interior polypetala. *Sem.* plurima, criſtata.
1083. CLEMATIS. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-petala. *Sem.* plurima, ariſtata.
1084. THALICTRUM. *Cal.* nullus. *Cor.* 4-5-petala. *Sem.* plurima, ſubmutica, nuda.
1088. ISOPYRUM. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala, decidua. *Nectaria* 5. *Capſ.* polyſpermae.
1089. HELLEBORUS. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala, perſiſtens. *Nectaria* plura. *Capſ.* polyſpermae.
1090. CALTHA. *Cal.* nullus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* plurimae. *Nectaria* nulla.
1081. ANEMONE. *Cal.* nullus. *Cor.* 6-petala. *Sem.* plurima.
1076. MICHELIA. *Cal.* truncatus. *Cor.* 8-petala. *Baccae* 4-ſpermae, glomeratae.
1087. TROLLIUS. *Cal.* nullus. *Cor.* 14-petala. *Nectaria* linearia. *Capſ.* polyſpermae.
1079. XYLOPIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Capſulae* 1-ſ. 2-ſpermae in receptaculo hemiſphaerico.
1080. UNONA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Baccae* moniliformes 2-ſpermae in receptaculo hemiſphaerico.
1077. UVARIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Baccae* polyſpermae recept. longo affixae.
1078. ANNONA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Bacca* cortice imbricato polyſperma.
1073. LIRIODENDRUM. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 6-petala. *Samarae* plurimae lanceolatae imbricatae.

1074. MAGNOLIA. *Cal.* 3-phyllus. *Cor.* 9-petala. *Capſ.* glomeratae, 2-valves. *Sem.* pendula.

1075. NELUMBIUM. *Cal.* 4-5-phyllus. *Cor.* polypetala. *Nuces* monoſpermae receptaculo immerſae.

1071. DILLENIA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, *Capſ.* plures, connatae: *Recept.* carnoſo.

1086. RANUNCULUS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Sem.* plurima. *Petala* ungue nectarifero.

1072. ILLICIUM. *Cal.* 6-phyllus. *Pet.* 27. *Capſulae* 1-ſpermae in orbem.

1085. ADONIS. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-ſ. 10-petala. *Sem.* plurima, angulata, corticata.

† *Nigellae nonnullae.*

MONOGYNIA.

1006. MARCGRAVIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 871.

Cor. 1-petala, calyptriformis. *Cal.* 6-phyllus, imbricatus. *Bacca* multilocularis, polyſperma.

1. MARCGRAVIA *umbellata.*

M. foliis ovato-oblongis acuminatis venoſis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 39.

M. umbellata. *Sp. pl.* 719. *Iacq. amer.* 156. *t.* 96. * *Swartz. obſ.* 205. *

M. ſcandens, fructu radiatim poſito. *Plum. gen.* 7. *ic.* 173.

M. ſcandens, foliis caulinis ſubrotundis ad margines glandulatis, ramorum integris ovatis alternis diſtiche poſitis, floribus umbellatis terminalibus. *Brown. jam.* 244. *t.* 26.

Phyllitidi ſcandenti affinis major, folio craſſo ſubrotundo. *Sloan. jam.* 15. *hiſt.* 1. *p.* 74. *t.* 28. *f.* 1. *mala.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 1.

Doldenblütige Marcgravie. W.

Habitat in Americae *calidioris montoſis.* ♄ (v. ſ.)

Folia alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima. Umbella *ſimplex pedunculis numeroſis, in orbem poſitis, aequalibus, horizontaliter patentibus.* Flores *adſcendentes, nudi, corolla calyceque caducis.* Diſcus *umbellae conſtans glandulis nectariferis, ſeſſilibus, ſaepius quinis, erectis, forma corollae ringentis galeae ſ. ſupremi petali aconiti, ore ambitum reſpicientibus.* Receptaculum *poſt caſum floris integrum, nec quinquelobum.*

*2. MARCGRAVIA *coriacea.*

M. foliis ellipticis obtuſis coriaceis aveniis. *Vahl. eclog.* 2. *p.* 39. *

Lederartige Marcgravie. W.

Habitat in Cajenna. ♄

Rami *glabri, cortice cinereo, punctis raris adſperſi, inferne teretes, ſuperne ſubtetragoni.* Folia *breviter petiolata* 4-*ſ.* 5-*pollicaria utrinque glabra, laevia, margine parum reflexa. Pedicelli verſus ſummitatem pedunculi communis verticillati* 17 *vel* 18

patentiſſimi bipollicares aequales teretes verſus florem incraſſati, e punctis frequentiſſimis ſparſis tuberculati. Flores *adſcendentes.* Vahl l. c.

1007. TERNSTROEMIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 872.

Cor. 1-petala rotata, limbo campanulato 5-ſ. 6-partito. *Cal.* quinquepartitus. *Antherae* apice craſſae. *Bacca* exſucca bilocularis.

1. TERNSTROEMIA *meridionalis.*

T. foliis obovatis emarginatis integerrimis, pedunculis axillaribus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 60.

T. foliis obovatis integerrimis, pedunculis terminalibus. *Swartz. prodr.* 81. *obſ. bot.* 207.*

Ternſtroemia meridionalis. *Lin. ſuppl.* 264.

Mittägige Ternſtrömie. W.

Habitat in Jamaica, Nevis, Dominica, Nova Granada. ♄

Arbor *ramis determinatis, ramulis ſimplicioribus rigidulis, cortice cinereo.* Folia *alterna ſubpetiolata coriacea perennia ovalia obtuſa ſubemarginata, margine ſubrecurvata integerrima avenia.* Stipulae *nullae.* Pedunculi *axillares groſſiores compreſſo-ancipites foliis dimidio breviores cernui.* Calyx *rigidus fere cartilagineus.* Corolla *ſaepius quinquepartita rarius ſexpartita alba, primo globoſa, dein campanulata.* Bacca *ſicca, quia matura caſu absque valvulis rumpitur, atque adeo conſtantem nullam valvularum ſtructuram retinet.* Semina *ſanguinea ſericea.*

*2. TERNSTROEMIA *iptica.*

T. foliis ellipticis acutis integerrimis pedunculis lateralibus. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 61.* *Swartz. prodr.* 81.

Elliptiſche Ternſtroemie. W.

Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. ſ.)

Folia *potius obtuſa quam acuta dicenda.* W.

*3. TERNSTROEMIA *punctata.*

T. foliis oblongis integerrimis ſubemarginatis margine punctatis, pedunculis axillaribus. *Swartz. prodr.* 81.

Taonabo (*punctata*) foliis ovato-oblongis emarginatis, fructu majore. *Aubl. guj.* 1. *p.* 571. *t.* 228.*

Punctirte Ternſtrömie. W.

Habitat in Gujanae *ſylvis montis* Serpent *dicti.* ♄

*4. TERNSTROEMIA *japonica.*
T. foliis ovato-lanceolatis apice ſerrulatis, pedunculis lateralibus.
T. (*japonica*) foliis acuminatis excifis. *Thunb. Act. ſoc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
Cleyera japonica. *Thunb. jap.* 224.*
Mokokf. *Kaempf. amoen.* 873. *t.* 774.
Japaniſche Ternſtrömie. W.
Habitat in Japonia. ♄

*5. TERNSTROEMIA *dentata.*
T. foliis oblongis acuminatis dentato-ſerratis, pedunculis axillaribus lateralibusque. *Swartz. prodr.* 81.
Taonabo (*dentata*) foliis ovato-oblongis denticulatis, floribus flaveſcentibus, fructu minore. *Aubl. guj.* 1. *p.* 569. *t.* 227. *
Gezähnte Ternſtrömie. W.
Habitat in Gajanae *ſylvis.* ♄ (v. f.)

1008. TRILIX.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 873.

Cor. 3-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Bacca* 5-locularis, polyſperma.

1. TRILIX *lutea.*
T. lutea. *Mant.* 247.
Iacquinia. *Mutis mſſ.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 3.
Gelbe Trilix. W.
Habitat Carthagenae *Americes.* ♄
Frutex *biorgyalis, ramoſiſſimus.* Rami *teretes, ſcabriuſculi.* Folia *alterna, petiolata, ſubpeltata, cordato-ovata, ſerrata, acuminata, venoſa, pubeſcentia.* Petioli *teretes, glabri.* Flores *lutei* (*non a corolla, ſed ab antheris*). Pedunculi *plerumque terminales: Pedicellis alternis, unifloris, teretibus, pubeſcentibus.*

*1009. LUDIA.

Juſſ. gen. pl. ed. Uſteri 379.

Cal. 4-7-partitus. *Cor.* o. *Styl.* 3-4-fidus. *Bacca* ſicca 1-locularis polyſperma.

*1. LUDIA *heterophylla.*
L. foliis obovatis nitidis venoſis, junioris fruticis mini-

mis dentato-ſpinoſis, fruticis adulti majoribus integerrimis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 586. *

α. adulta foliis obovatis integerrimis. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 466. *f.* 1.

β. junior foliis orbiculatis acuminato-dentatis Malpighiae cocciferae. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 466. *f.* 2.

Verſchiedenblättriger Aenderling. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

*2. LUDIA *myrtifolia.*

L. foliis ovatis integerrimis venoſis, ſtylo incurvo. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 586. * *illuſt. gen. t.* 466. *f.* 3.

Myrtenblättriger Aenderling. W.

Habitat in inſula Borbonia. ♄

*3. LUDIA *ſeſſiliflora.*

L. foliis ovato-oblongis acutiuſculis, floribus ſubſeſſilibus, ſtylo ſuperne trifido. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 586.*

Ludia tuberculata. *Iacq. hort. Schoenb.* 1. *p.* 59. *t.* 112. *

Stielloſblütiger Aenderling. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

In hac ſpecie eſt calyx 4-*fidus et* bacca *trilocularis, ſeminibus ſolitariis.* W.

1010. CAPPARIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 876.

Cal. 4-phyllus, coriaceus. *Petala* 4. *Stam.* longa. *Bacca* corticoſa, 1-locularis, pedunculata.

* *Stipulis ſpineſcentibus.*

1. CAPPARIS *ſpinoſa.*

C. pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis ſubrotundis obtuſis glabris, capſulis ovalibus. W.

C. pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. *Mat. med.* 133. *Hall. helv. n.* 1077. *Blackw. t.* 417. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 179. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 622. *Ludw. ect. t.* 107. *Desfont. fl. atlant. I. p.* 403. *

C. aculeata. *Hort. cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 476. *Gron. orient.* 154.

C. retuſo folio. *Lobel. ic.* 635.

C. ſpinoſa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 63.

C. ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *Bauh. pin.* 480.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 4.
Gemeine Capper. W.
Habitat in Europae *auſtralis et* Orientis *ruderatis, muris.* ♄ (v. ſ.)

*2. CAPPARIS *ovata.*
C. pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis ſubrotundo-ovatis acutis glabris, capſulis ovalibus. W.
Capparis ovata. *Desfont. fl. atlant.* 1. *p.* 404.
Capparis ſpinoſa. β. *Sp. pl.* 720.
C. ſicula duplicata ſpina, folio acuto. *Bocc. ſic.* 79. *t.* 42. *f.* 3.
Capparis. *Dod pempt.* 745.
C. folio acuto. *Bauh. pin.* 460. *Lob. ic.* 634.
Eyförmige Capper. W.
Habitat in Sicilia, Hiſpania *et* Africa *boreali.* ♄

*3. CAPPARIS *aegyptia.*
C. pedunculis ſolitariis unifloris, ſtipulis ſpinoſis, foliis rotundo-cuneiformibus apice mucronatis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 598.*
Aegyptiſche Capper. W.
Habitat in Aegypto. ♄
Rami *teretes.* Spinae *recurvae aureae.* Folia *parva ſemiuncialia glauca petiolata ſubrotundo-cuneiformia evidenter mucronata.* Corolla *albida.* Fructus *triuncialis.* Lamarck. l. c.

*4. CAPPARIS *tomentoſa.*
C. ſpinoſa, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, foliis ovato-oblongis tomentoſis, ſiliquis ſphaericis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 599.*
Filzige Capper. W.
Habitat ad Senegal. ♄
Rami *griſei tomentoſi.* Spinae *ſtipulares geminae incurvae.* Folia *uncialia vel ſesquiuncialia ovato-oblonga obtuſa utrinque tenui pube tecta.* Fructus *ſphaericus.* Lamarck. l. c.

*5. CAPPARIS *acuminata.* W.
C. pedunculis unifloris geminatis, ſtipulis ſpinoſis, foliis ovatis acuminatis ſubtus ferrugineo-tomentoſis. W.
Langſpitzige Capper. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)
Rami *teretes flexuoſi, juniores ferrugineo tomento*

levi tecti. Spinae *ſtipulares geminae rectae.* Folia *petiolata alterna ſesquiuncialia et unciam lata, ſubrotundo-ovata valde acuminata, ſuperne glabra, ſubtus tomento ferrugineo obducta.* Pedunculi *petiolo longiores* 2 *ſ.* 3 *axillares.* Calyx *tomentoſus.* Petala *ciliata.* Stamina *corolla longiora.* W.

Capparis pyrifolia. Lamarck. encycl. 1. *p.* 599. *forte non ab hac diverſa, tamen folia juniora albo-tomentoſa, ſeniora glabra, et formam eorum ovato-lanceolatam dixit. An varietas noſtrae?* W.

6. CAPPARIS *zeylanica.*

C. pedunculis ſolitariis unifloris, ſtipulis ſpinoſis, foliis ovatis utrinque acutis. *Fl. zeyl.* 210. *Loureiro cochin.* 403.

C. zeylanica, duplicatis ſpinis, folio acuto. *Pet. muſ.* 625.

C. ſpinoſa, foliis oblongis. *Burm. zeyl.* 53. *ind.* 118.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 5.

Zeylaniſche Capper. W.

Habitat in Zeylona. ♄

7. CAPPARIS *horrida.*

C. arborea, ſtipulis aculeatis, ramis flexuoſis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis glabris, floribus axillaribus binis. *Lin. ſuppl.* 264.

Steifſtachliche Capper. W.

Habitat in Coromandelia. ♄ (v. ſ.)

Arbor *rigida, ramis flexuoſis, aculeis binis ſtipularibus, ab exortu foliorum rubicundis rigidis.* Folia *petiolata baſi ovata ſenſim attenuata ſpinula terminata.* Pedunculi *bini axillares uniflori.*

Pedunculi 2 *ſ.* 3, *in hac ſpecie ſupra-axillares.* W.

*8. CAPPARIS *erythrocarpos.*

C. pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis oblongis acuminatis mucronatis, pericarpiis hexagonis. W.

C. (*erythrocarpos*) pedunculis ſolitariis unifloris, ſtipulis ſpinoſis, foliis ovatis obtuſis, pericarpiis hexagonis. *Gmel. ſyſt. nat. p.* 806. *Iſert. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol.* 9. *p.* 339. *t.* 9. *mala.*

Eckige Capper. W.

Habitat in Guinea. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Rami *divaricati teretes.* Spinae *ſtipulares geminae*

reflexae. Folia *alterna petiolata oblonga acuminata mucronata glabra, pilis raris ſtellatis praeſertim ad coſtam mediam ſubtus tecta*. Pedunculi *ſolitarii axillares*. Fructus *oblongus hexagonus*. W.

9. CAPPARIS *ſepiaria*.

C. pedunculis umbellatis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis ovatis emarginatis. *Sp. pl.* 720.

Arbuſcula baccifera ſcandens ſpinoſa, foliis buxi pallidioribus. *Pluk. alm.* 27. *t.* 338. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 6.

Hecken-Capper. W.

Habitat in India. ♄

Rami *teretes, lignoſi*. Spinae *ſtipulares, geminae, recurvae, breves, nigrae*. Folia *ſubpetiolata, ovata, nuda, integerrima, emarginata*. Umbellae *terminales, ſimplices, multiflorae: Pedunculo communi, brevi*.

*10. CAPPARIS *citrifolia*.

C. ſpinoſa, floribus ad apices ramorum umbellatis, foliis ovato-oblongis glabris coriaceis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 599. *

Citronenblättrige Capper. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. ſ.)

*11. CAPPARIS *corymboſa*.

C. floribus corymboſis terminalibus, ſtipulis ſpinoſis, foliis ovalibus ſubtus pubeſcentibus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 599. *

Doldentraubige Capper. W.

Habitat ad Senegal. ♄

* * *Inermes*.

*12. CAPPARIS *mariana*.

C. pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis nullis, foliis cordato-ovatis. *Iacq. hort. ſchoenb.* 1. *p.* 57. *t.* 109. *

C. (*cordifolia*) pedunculis ſolitariis unifloris, foliis cordatis petiolatis, junioribus tomentoſo-farinoſis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 602. *

Latroniſche Capper. W.

Habitat in inſulis Marianis. ♄

Habitu ſimilis C. ſpinoſae, ſed diverſa: caule *inermi*, foliis *ovatis baſi cordatis*. Floris *figura eadem ac in C. ſpinoſa*. W.

*13. CAPPARIS *panduriformis.*

C. pedunculis unifloris ad apices ramorum aggregatis, foliis oblongis panduriformibus. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 603.*

Geigenblättrige Capper. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

Rami *teretes glabri punctati.* Folia *alterna breve petiolata quadriuncialia, et ſesquiunciam lata panduriformia ovata glabra.* Pedunculi *uniflori breves in apice ramorum fere racemoſi.* Lamarck. l. c.

14. CAPPARIS *Baducca.*

C. pedunculis unifloris, foliis perennantibus ovato-oblongis determinate confertis nudis. *Sp. pl.* 720. *Mill. dict. n.* 2.

C. inermis foliis ovato-oblongis per ſpatia confertis perennantibus. *Hort. cliff.* 204.*

Baducca. *Rheed. mal.* 6. *p.* 105. *t.* 57. *R. j. dendr.* 1630. *Burm. ind.* 118.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 8.

Malabariſche Capper. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Folia *utrinque glabra, venis obſolete reticulata, imprimis ſubtus.*

Pedunculi *uniflori terminales et laterales.* Flores *magnitudine C. ſpinoſae.* W.

*15. CAPPARIS *toruloſa.*

C. pedunculis ſubbifloris teretibus terminalibus, foliis lanceolato-ovalibus, ſubtus albido-punctatis, ſiliquis teretibus linearibus toruloſis. *Swartz. prodr.* 81.

Breynia arboreſcens, foliis ovatis utrinque acuminatis, ſiliqua toroſa longiſſima. *Brown. jam.* 246.

Knotige Capper. W.

Habitat in Jamaica. ♄

*16. CAPPARIS *longifolia.* †

C. pedunculis - -, foliis lineari-lanceolatis, ſubtus farinoſo-punctatis. *Swartz. prodr.* 81. *Pluk. phytog. t.* 327. *f.* 6.

Langblättrige Capper. W.

Habitat in Jamaica. ♄

17. CAPPARIS *frondoſa.*

C. pedunculis umbellatis, foliis paſſim confertis. *Sp. pl.* 1674.

C. pedunculis ſubumbellatis, foliis ad intervalla frondoſis. *Iacq. amer.* 162. *t.* 104.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 6.
Buſchige Capper. W.
Habitat Carthagenae *et in* Domingo *in ſylvaticis.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)
Folia *lato-lanceolata.*

18. CAPPARIS *ferruginea.*
C. pedunculis umbellatis, foliis perſiſtentibus lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus octandris. *Amoen. acad.* 5. *p.* 398. * *Swartz. obſ.* 208. *
C. octandra. *Iacq. amer.* 160. *t.* 100. *mala.*
Crataeva fruticoſa, foliis ſingularibus oblongis utrinque acutis ſubtus quaſi villoſis, floribus octandris, racemis comoſis alaribus. *Brown. jam.* 247. *t.* 28. *f.* 1. *bona.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 7.
Roſtfarbene Capper. W.
Habitat in fruticetis littoribus maris proximis Jamaicae. ♄ (v. ſ.)

19. CAPPARIS *grandis.*
C. arborea mitis, foliis ovatis acutis glabris, corymbis terminalibus, fructu globoſo. *Lin. ſuppl.* 263.
Groſse Capper. W.
Habitat in Zeylona. *Koenig.* ♄
Arbor *magna cava.* Folia *alterna ovata integerrima acuta venoſa glabra.* Stipulae *nullae.* Corymbi *terminales, fructiferi in racemum elongati.* Flores *luteo-albidi.* Fructus *majores globoſi.*

*20. CAPPARIS *jamaicenſis.*
C. pedunculis multifloris, foliis oblongis obtuſis emarginatis ſubtus tomentoſis, corollis campanulatis. W.
C. pedunculis multifloris, foliis oblongis emarginatis ſubtus tomentoſis, corollis ſemierectis. *Iacq. amer.* 160. *t.* 101. *
Weſtindiſche Capper. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*21. CAPPARIS *odoratiſſima.*
C. pedunculis multifloris, foliis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus ſquamoſo-punctatis. W.
C. pedunculis racemoſis, foliis ellipticis perennantibus ſubtomentoſe punctatis. *Iacq. hort. ſchoenb.* 1. *p.* 57. *t.* 110. *
Wohlriechende Capper. W.

Habitat ad Caracas. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Folia *oblongo-lanceolata baſi attenuata rotundata, apice acuta.* Flores *magnitudine Myrti communis.* Petala *violacea.* Stamina *corolla parum longiora.* Tomentum *foliorum in Capparide hac ut in C. ferruginea et aliis, non eſt tomentum, ſed e ſquamis parvis adpreſſis ut in Hippophaë, nonnullis Ciſti ſpeciebus, et paucis aliis vegetabilibus eſt compoſitum; hinc folia harum plantarum potius ſquamata nuncupanda.* W.

*22. CAPPARIS *verrucoſa.*

C. pedunculis multifloris, foliis oblongis acutis utrinque nudis, fructu verrucoſo. *Iacq. amer.* 159. *t.* 99. *

Warzige Capper. W.

Habitat in ſylvis et fruticetis Carthagenae. ♄

Habitu *convenit cum* C. Cynophallophora, *at folia ſemper oblonga et acuta.* Glandulas *in axillis habet nullas.* Flos *ſtructurae ejusdem, at vix odorus.* Petala *habet candidiſſima et patentiſſima,* Glandulas *nectareas planas puncto umbilicatas,* Stamina *pollicaria corollam haud admodum ſuperantia.* Fructus *eſt ſiliqua oblonga teres nitida tota verrucoſa viridis ſesquipollicaris bivalvis; pulpa alba.* Iacq. l. c.

*23. CAPPARIS *ampliſſima.*

C. pedunculis unifloris terminalibus axillaribusque, foliis ellipticis glabris obtuſiuſculis, fructibus obovato-ellipticis teretibus. W.

C. (*ampliſſima*) inermis, foliis ovalibus glabris venoſis, floribus ſolitariis axillaribus et terminalibus, ſtaminibus corolla longioribus, fructu obovato. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 600. *

C. alia arboreſcens lauri foliis, fructu oblongo-ovato. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 73. *f.* 2.

Anſehnlichſte Capper. W.

Habitat in Hiſpaniola. ♄.

24. CAPPARIS *Cynophallophora.*

C. pedunculis multifloris terminalibus, foliis ellipticis obtuſis glabris, glandulis axillaribus, fructibus cylindraceis toruloſis. W.

C. pedunculis multifloris terminalibus, foliis ovalibus obtuſis perennantibus, glandulis axillaribus. *Syſt. nat. ed.* 13. *p.* 358. *Mill. dict. n.* 3. *Swartz. obſ.* 209. *

C. pedunculis multifloris, axillis glanduloſis, foliis oblongis utrinque nitidis. *Iacq. amer.* 158. *t.* 98. *

C. (*flexuoſa*) pedunculis congeſtis terminalibus, foliis perſiſtentibus oblongis obtuſis glabris, ramis flexuoſis. *Sp. pl.* 722. *Swartz. obſ.* 211.
C. arboreſcens, lauri foliis, fructu longiſſimo. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 73. *f.* ..
Moriſonia flexuoſa. *Amoen. acad.* 5. *p.* 398.
Breynia fruticoſa, foliis oblongis obtuſis. *Brown. jam.* 246. *t.* 27. *f.* 1.
Cynophallophorus ſ. Penis caninus caribaeorum arbor, foliis ſubrotundis clavos pulpiferos phalloides pro ſiliquis gerens. *Pluk.* 126. *t.* 172. *f.* 4.
Acaciae affinis arbor ſiliquoſa, folio ſubrotundō ſingulari, flore ſtamineo albido, ſiliqua tereti ventricoſa interiore tunica mucoſa miniata. *Sloan. jam.* 1538. *hiſt.* 2. *p.* 59. *Raj. dendr.* 102.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 9.
Langſchotige Capper. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ. c. fr.)
Fructus *ſiliquoſus, bivalvis.*

*25. CAPPARIS *ſaligna.*
C. foliis lineari-lanceolatis inferne dilatatis utrinque obtuſis glabris, fructu tereti toruloſo. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 66.
Weidenartige Capper. W.
Habitat in inſula St. Crucis. ♄
Rami *teretes glabri, cortice cineraſcente, flexuoſi.* Folia *petiolata alterna lineari-lanceolata tripollicaria, ſuperne ſemiunguem lata, baſin verſus latiora, rarius undique ejusdem latitudinis, integerrima mucronata, baſi rotundata vel ſubcordata venoſa glabra.* Petiolus *brevis.* Glandulae *ſaepe in axillis foliorum.* Pedunculi *terminales ſolitarii* 2-ſ. 3-*flori.* Pedicelli *unguiculares.* Calycis *foliola rotundata coriacea.* Filamenta *numeroſa longiſſima capillaria glabra.* Germen *lineari-oblongum truncatum.* Bacca 2-3-*pollicaris glabra craſſitie pennae cygneae obtuſa, inter ſingula ſemina coarctata.* Pedicellus *fructu longior.* Semina 4 *vel* 5. Vahl. l. c.

26. CAPPARIS *pulcherrima.*
C. racemis erectis terminalibus, foliis ovato-lanceolatis obtuſis, baccis ſubrotundis. W.
C. pedunculis racemoſis, foliis oblongis obtuſis, fructibus baccatis. *Sp. pl.* 1674. *Jacq. amer.* 163. *t.* 106.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 11.
Schönſte Capper. W.
Habitat Carthagenae *Americes in declivibus montium.* ♄
Baccae *ſubrotundae.*

*27. CAPPARIS *tenuiſiliqua.*
C. racemis erectis terminalibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, fructibus cylindricis teretibus. W.
C. (*tenuiſiliqua*) racemis ſimplicibus erectis, fructibus ſiliquoſis, foliis diciduis. *Iacq. amer.* 162. *t.* 105. *
Dünnfrüchtige Capper. W.
Habitat in Carthagena Americes. ♄

28. CAPPARIS *linearis.*
C. pedunculis ſubracemoſis, foliis linearibus. *Sp. pl.* 1674. *Iacq. amer.* 161. *t.* 102.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 12. *t.* 9.
Linienblättrige Capper. W.
Habitat Carthagenae *Americes in arenoſis collibus.* ♄

29. CAPPARIS *Breynia.*
C. pedunculis racemoſis, foliis perennantibus oblongis, calycibus pedunculisque tomentoſis, floribus octandris. *Syſt. nat.* 13. *p.* 359. *Mill. dict. n.* 9. *Swartz. obſ.* 210. *
C. (*Breynia*) pedunculis ſubumbellatis, foliis ovali-oblongis acutis ſubtus ſcabris, fructibus tomentoſis. *Iacq. amer.* 161. *t.* 103.
Capparis Cynophallophora. *Sp. pl. ed.* 1. *p.* 503.
C. inermis, foliis ovalibus alternis perennantibus. *Hort. cliff.* 204.
Breynia foliis oblongo-ovalibus. *Roy. lugdb.* 476. *Sp. pl.* 1. *p.* 503.
Breynia elaeagni foliis *Plum. gen.* 40. *Breyn. ic.* 13. *c. fig.*
Breyniae affinis arbor octandra. *Loefl. it.* 207. *
β. C. (*ſiliquoſa*) pedunculis unifloris compreſſis, foliis perſiſtentibus lanceolato-oblongis acuminatis ſubtus punctatis. *Sp. pl.* 721.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 12.
Breyniſche Capper.
Habitat in fruticetis ſiccis Jamaicae *verſus mare.* ♄
Flores *polyandri.* R.

30. CAPPARIS *haſtata.*
C. pedunculis multifloris, foliis haſtato-lanceolatis nitidis. *Sp. pl.* 722. *Iacq. amer.* 159. *t.* 174. *f.* 56.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. p. 13.
Spontonblättrige Capper.
Habitat Carthagenae *in ſylvis.* ♄

1011. ACTAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 877.

Cor. 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca* 1-locularis. *Sem.* ſemiorbiculata.

1. ACTAEA *ſpicata.*

A. racemo ovato, fructibus baccatis. *Sp. pl.* 722.
α. Actaea *ſpicata nigra.*
Actaea. *Hort. cliff.* 209. *Fl. ſuec.* 431, 464. *Hort. upſ.* 138. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. pariſ* 152. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 181. *Crantz. auſtr. p.* 142. *Gunn. norv. n.* 27. *Scop. carn. n.* 633. *Pall. it.* 1. *p.* 50. *Pollich. pal. n.* 503. *Flor. dan. t.* 589. *Blackw. t.* 565. *Hoffm. germ.* 182. *Roth. germ. I.* 228. *II.* 584.
A. foliis circumſerratis, duplicato-pinnatis, pinnula extrema trilobata. *Hall. helv. n.* 1076.
A. caule inermi. *Fl. lapp.* 217.
Aconitum bacciferum. *Bauh. pin.* 183.
Chriſtophoriana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 86.
β. Actaea *ſpicata alba.*
A. racemo ovato, fructibus niveis, radice tuberoſa. *Mill. dict. n.* 2.
Aconitum baccis niveis. *Corn. canad.* 76. *t.* 77.
Chriſtophoriana americana racemoſa baccis niveis et rubris. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 8. *ſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7.
γ. Actaea *ſpicata rubra.*
A. baccis rubris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 221
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 181.
Aehrentragendes Chriſtophskraut. W.
Habitat in nemoribus Europae, β. γ. Americae. ♃ (v. v.)
Petala *rhombea, plano-membranacea.*

2. ACTAEA *racemoſa.*

A. racemis longiſſimis, fructibus ſiccis. *Mat. med.* 135. *Willich. in Nov. act. A. N. C. p.* 107. *Mill. dict. n.* 3.
Actaea racemis longiſſimis. *Gron. virg.* 59.
Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata. *Dill. elth.* 79. *t.* 67. *f.* 78.

Chriſtophorianae facie herba ſpicata. *Pluk. amalth.* 54. *t.* 383. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 184.
Traubentragendes Chriſtophskraut. W.
Habitat in Florida, Virginia, Canada. ♃ (v. v.)
Petala craſſa, gibba, minima, pedicellata, acumine ſetaceo-acuminata, calycis foliolis plura.

*3. ACTAEA *japonica.*

A. ſpicis longiſſimis, foliolis inciſis palmatis diviſis. *Thunb. jap.* 221. *
Japaniſches Chriſtophskraut. W.
Habitat in Japonia. ♄

Planta *herbacea tota glabra.* Folia *petiolata ternata.* Foliola *ſimplicia cordata inciſa quinqueloba vel ſeptemloba, lobis inciſis, ſerrata, ſubtus pallida, palmam lata et longa.* Petiolus *et petioluli ſtriati longiores.* Flores *ſpicati.* Spica *longiſſima palmaris usque ſpithamaea.* Calyx *et* Corolla *caducae.* Germen *oblongum glabrum.* Stylus *nullus.* Thunb. l. c.

1012. SANGUINARIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 878.

Cor. 8-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* ovata, 1-locularis.

1. SANGUINARIA *canadenſis.*

Sanguinaria. *Hort. cliff.* 202. *Gron. virg.* 57. *Mill. dict. n.* 1. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 13.
S. minor, flore ſimplici. *Dill. elth.* 335. *t.* 252. *f.* 326.
Chelidonium majus canadenſe acaulon. *Corn. canad.* 212. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 257. *ſ.* 3. *t.* 11. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1887.
Ranunculus virginienſis albus. *Park. theat.* 327. *Raj. ſuppl.* 314.
β. Sanguinaria major, flore ſimplici. *Dill. elth.* 335. *t.* 252. *f.* 325.
γ. Sanguinaria major, flore pleno. *Dill. elth.* 335. *t.* 252. *f.* 320.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 185.
Canadiſches Blutkraut. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃ (v. v.)

Folium *radicale tenerrime in ſinu fovet et amplecti-*

tur infantiam floris, more Oſmundae Lunariae, et eſt Folium unicum cucullatum et Scapus *uniflorus e ſingula gemma radicis bivalvi.* Stamina *meae vix habuere* Antheras *polliniferas; an dioica?* Lacteſcens *ſucco fulvo Chelidonii.*

1013. PODOPHYLLUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 879.

Cor. 9-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Bacca* 1-locularis, coronata ſtigmate.

1. PODOPHYLLUM *peltatum.*
P. foliis peltatis lobatis *Sp. pl.* 723.
Podophyllum. *Hort. cliff.* 202. *Hort. upſ.* 137. *Gron. virg.* 57. *Roy. lugdb.* 480. *Trew. ehret. t.* 29. *Mill. dict.*
Anapodophyllum canadenſe. *Cateſb. car.* 1. *p.* 24. *t.* 24.
Aconitifolia humilis, flore albo unico campanulato fructu cynosbati. *Mentz. pug. t.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 187.
Schildblättriger Entenfuſs. W.
Habitat in America *ſeptentrionali.* ♃ (v. v.)

2. PODOPHYLLUM *diphyllum.*
P. foliis binatis ſemicordatis. *Sp. pl.* 723. *Barton. Act. Soc. Amer.* 3 *p.* 334. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 188.
Zweyblättriger Entenfuſs. W.
Habitat in Virginia. *Collinſon.* ♃

An Sanguinariae *ſpecies? cum* Folium *unicum binatum et* Scapus *aphyllus radicalis et* Capſula *oblonga.* Flores *non vidi, ſub Podophylli ſpecie miſſum.*

1014. CHELIDONIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 880.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 1-locularis, linearis.

1. CHELIDONIUM *majus.*
C. pedunculis umbellatis. *Mat. med.* 134. *Mill. dict. n.* 1. *Pollich. pal. n.* 504. *Regn. bot. Scop. carn. n.* 634. *Hoffm. germ.* 183. *Blackw. t.* 91. *Ludw. ect. t.*

132. *Kniph. cent.* 8. *n.* 27. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 23. *Roth. germ. I.* 228. *II.* 582.

C. lobis foliorum ſubrotundis. *Hall. helv. n.* 1059.

C. pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 202. *Fl. ſuec.* 430, 465. *Hort. upſ.* 137. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. pariſ.* 152.

C. floribus ex ſiliquis breviſſimis, ſ. ch. pedunculis umbellatis, caule piloſo. *Crantz. auſtr. p.* 141.

C. majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.

C. majus. *Fuchſ. hiſt.* 865.

β. C. majus, foliis quernis, *Bauh. pin.* 144. *Crantz. l. c.* β. *Kniph. cent.* 8 *n.* 26.

C. (*laciniatum*) foliis quinquelobatis, lobis anguſtis, acute laciniatis. *Mill. dict. n.* 2. *ic. t.* 92.

C. majus, folio laciniato. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 203.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 189.

Gemeines Schoellkraut. W.

Habitat in Europae *ruderatis.* ♃ (v. v.)

*2. CHELIDONIUM *japonicum.*

C. pedunculis unifloris, foliis petiolatis pinnatis ovatis. *Thunb. jap.* 221.

Japaniſches Schoellkraut. W.

Habitat in Japonia.

Caulis *herbaceus ſtriatus glaber debilis erectus.* Folia *alterna petiolata pinnata cum impari.* Foliola 3 *vel* 5 *oppoſita, breviſſime petiolata ovato-oblonga acuta inciſa inaequaliter ſerrata, ſerraturis acutis ciliatis, glabra, ſubtus pallida, pollicaria et ſesquipollicaria, pinna ultima ſemper majori.* Petiolus *cauli ſimilis digitalis.* Flores *axillares ſolitarii pedunculati.* Pedunculus *uniflorus capillaris longitudine fere foliorum.* Calyx *diphyllus glaber.* Corolla *calyce paullo longior lutea.* Stamina *numeroſa corolla quadruplo breviora.* Thunb. l. c.

3. CHELIDONIUM *Glaucium.*

C. pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus ſinuatis, caule glabro. *Oed. dan. t.* 585. *Mill. dict. n.* 3. *Kniph. cent.* 4. *n.* 17. *Knorr. del.* 1. *t. R.* 19. *Regn. bot. Hoffm. germ.* 183. *Roth. germ. I.* 228. *II.* 583.

Glaucium foliis radicalibus ſemipinnatis, caulinis amplexicaulibus. *Hall. helv. n.* 1060.

Glaucium (*flavum*) caule glabro, ſiliquis cornutis deflexis. *Crantz. auſtr. p.* 141.

Glaucium luteum. *Scop. carn.* 2. *n.* 63.
Chelidonium glabrum, pedunculis unifloris. *Hort. upſ.* 137. *Roy. lugdb.* 473. *Dalib. pariſ.* 152.
C. pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 201. *Gron. virg.* 57.
Papaver corniculatum luteum. *Bauh. pin.* 171.
Papaver corniculatum, flavo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 91.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 191.
Groſsblütiges Schoellkraut. W.
Habitat in Angliae, Helvetiae, Galliae, Italiae, Virginiae *arenoſis.* ♃ (v. v.)

Planta *glauca.* Caulis *laevis.* Folia *ſcabriuſcula: radicalibus pinnatifidis; caulinis ſolum lobatis.* Flores *flavi.* Siliquae *ſcabrae, diſſepimento in loculamenta, uti ſequentes, diſtinctae.*

Variat corolla rubra. W.

4. CHELIDONIUM *corniculatum.*

C. pedunculis unifloris, foliis ſeſſilibus pinnatifidis, caule hiſpido. *Sp. pl.* 724. *Mill. dict. n.* 4.
C. hiſpidum, pedunculis unifloris. *Hort. upſ.* 137. *Sauv. monſp.* 286.
Glaucium (*phoeniceum*) caule hiſpido, ſiliquis cornutis rectis. *Crantz. auſtr. p.* 141.
Glaucium hirſutum, flore phoeniceo. *Tournef. inſt.* 254.
Papaver corniculatum phoeniceum hirſutum. *Bauh. pin.* 171.
Papaver cornutum, phoeniceo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 91.
β. Papaver corniculatum phoeniceum glabrum. *Bauh. pin.* 171.
Chelidonium glabrum. *Mill. dict n.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 193.
Rothes Schoellkraut. W.
Habitat in Hungaria, Bohemia, Auſtria, Monſpelii. ☉ (v. v.)

Planta *viridis.* Folia *omnia pinnatifida.* Flores *rubro-lutei.* Siliquae *hiſpidae.*

5. CHELIDONIUM *hybridum.*

C. pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule laevi, ſiliquis trivalvibus. *Sp. pl.* 724. *Mill dict. n.* 6. *Kniph. cent.* 10. *n.* 19.
Papaver caule ramoſo, foliis linearibus pinnatifidis, capſulis ſulcatis. *Hort, upſ.* 136. *Sauv. monſp.* 252.
Papaver corniculatum violaceum. *Bauh. pin.* 172.
Papaver corniculatum, violaceo flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 92.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 194.

Feinblättriges Schoellkraut. W.
Habitat in Europa *auſtraliore.* ☉ (v. v.)
Stigmata. 3.

1015. PAPAVER.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 881.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capſ.* 1-locularis, ſub ſtigmate perſiſtente poris dehiſcens.

* *Capſulis hiſpidis.*

1. PAPAVER *hybridum.*

P. capſulis ſubglobofis toroſis hiſpidis, caule folioſo multifloro. *Sp. pl.* 725. *Mill. dict. n.* 2. *Scholl. barb. n.* 418. *Hoffm. germ.* 183. *Roth. germ. I.* 226. *II.* 580.
P. foliis ternato-pinnatifidis, capſulis ſulcatis hiſpidis. *Hort. cliff.* 210.
P. caule ramoſo, foliis lineari-pinnatifidis, capſulis ſulcatis hiſpidis. *Hort. upſ.* 136.
Argemone capitulo breviore. *Bauh. pin.* 172.
Argemone capitulo hirſuto rotundo torulis canaliculato. *Moriſ. hiſt.* 2. p. 278. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 9. *Lob. ic.* 276.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 195.
Kleiner Mohn. W.
Habitat in Europa *auſtraliore.* ☉ (v. v.)

2. PAPAVER *Argemone.*

P. capſulis clavatis hiſpidis, caule folioſo multifloro. *Sp. pl.* 725. *Mill. dict. n.* 3. *Scop. carn. n.* 636. *Pollich. pal. n.* 405. *Hoffm. germ.* 183. *Roth. germ. I.* 227. *II.* 580.
P. capſulis hiſpidis oblongo-turbinatis ſulcatis. *Fl. ſuec.* 429, 466. *Dalib. pariſ.* 152. *Gron. orient.* 158.
P. foliis pinnatifidis, fructu oblongo turbinato hiſpido. *Neck. gallob. p.* 229.
P. foliis hiſpidis pinnatis, pinnis lobatis, capſulis ellipticis hiſpidis. *Hall. helv. n.* 1061.
P. foliis ternato-pinnatis, fructu angulato. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 419. *Sauv. monſp.* 252.
Argemone capitulo longiore. *Bauh. pin.* 172. *Lob. ic.* 276.

Argemone capitulo tenuiore longiore hirſuto. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 278. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 10.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 196.
Acker-Mohn. W.
Habitat in Europae *campis arenoſis.* ⊙ (v. v.)

Folia tripartita pinnatifida. Pedunculi ſcabri. Calyces capſulaeque piloſae.

3. PAPAVER *alpinum.*

P. capſula hiſpida, ſcapo unifloro nudo hiſpido, foliis bipinnatis. *Mill. dict. n.* 4. *Iacq. auſtr. t.* 83. *Scop. carn. n.* 637.

P. caule nudo, unifloro, foliis pinnatis, pinnis integris et diviſis, capitulis ſubrotundis hiſpidis. *Hall. helv. n.* 1062.

P. alpinum ſaxatile, coriandri folio. *Segu. ver.* 1. *p.* 416. *t.* 4. *f.* 4.

P. Burſeri. *Crantz. auſtr. p.* 158. *t.* 6. *f.* 4. *ſec. Hall. et Iacq.* R.

Argemone alpina, foliis ſcandicis, lutea. *Bauh. pin.* 173. *prodr.* 93. *Burſ. IX.* 58.
Argemone alpina, coriandri folio. *Bauh. pin.* 172.
Argemone minor Penae. *Dalech. hiſt.* 1714.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 197.
Alpen-Mohn. W.
Habitat in Helvetia, *Schneeberg* Auſtriae, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Calyx *hirſutus.* Petala *alba baſi flava.* Capſ. *ovata ſtigmatibus* 5.

4. PAPAVER *nudicaule.*

P. capſulis hiſpidis, ſcapo unifloro nudo hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato-ſinuatis. *Hort. cliff.* 136. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 180. *Gunn. norv. n.* 578. *Kniph. cent.* 10. *n.* 68. *Flor. dan. t.* 41. *Ait. Kew.* 2. *p.* 224.

P. erraticum, nudicaule flore flavo odorato. *Dill. elth.* 202. *t.* 224. *f.* 291.

P. erraticum, luteo flore, capite oblongo hiſpido, et laevi. *Amm. ruth.* 61. *n.* 81.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 198.
Nacktſtieliger Mohn. W.
Habitat in Sibiria. ♂ (v. v.)

Pedunculi *et* Calyces *piloſi. Nimis affine* P. alpino

et variat corolla alba et lutea; an cultura ſolum diverſum?

Variat flore albo. Ait. l. c.

* * *Capſulis glabris.*

5. PAPAVER *Rhoeas.*

P. capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Mat. med.* 134. *Pollich. pal. n.* 507. *Crantz. auſtr. p.* 137. *n.* 1. *Pallas itin.* 3. *p.* 546. *Scop. carn. n.* 638. *Ludw. ect. t.* 17. *Blackw. t.* 2. *et* 560. *Kniph. cent.* 5. *n.* 63. *et* 64. *Knorr. del.* 1. *t. R.* 14. *Hoffm. germ.* 183. *Roth. germ. I.* 227. *II.* 581.

P. foliis ſemi-pinnatis, hiſpidis, fructu ovato glabro. *Hall. helv. n.* 1064.

P. foliis bipinnatifidis alternis, fructu glabro ovato. *Neck. gallob. p.* 229.

P. foliis pinnatifidis hiſpidis, fructu ovato. *Hort. cliff.* 201. *Fl. ſuec.* 428, 468. *Roy. lugdb.* 478. *Dalib. pariſ.* 151.

P. caule multifloro folioſo hiſpido, foliis pinnatifidis, capſulis laevibus. *Hort. upſ.* 136. *Sauv. monſp.* 252. *Gron. orient* 157.

P. erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.

P. rhoeas prius. *Dalech. hiſt.* 439.

β. P. erraticum, pleno flore. *Bauh. pin.* 171. *Knorr. del. t. R.* 12. 13.

γ. P. erraticum minus. *Bauh. pin.* 171.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 198.

Wilder Mohn. W.

Habitat in Europae *arvis, agris.* ☉ (v. v.)

Pili in caule patentes ſunt.

Varietas *habetur caule ſimpliciſſimo, capſula oblonga, flore albo.* Hall. Crantz. R.

6. PAPAVER *dubium.*

P. capſulis oblongis glabris, caule multifloro ſetis adpreſſis, foliis pinnatifidis inciſis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 467. *Pollich. pal. n.* 506. *Hoffm. germ.* 184. *Roth. germ. I.* 227. *II.* 581.

P. foliis hiſpidis pinnatis, pinnis lobatis, fructu ovato laevi. *Hall. helv. n.* 1063.

P. capſulis oblongis, caule multifloro, ſetis adpreſſis, foliis pinnatifidis inciſis. *Crantz. auſtr. p.* 140. *cum* P. argemone *conjungit.* R.

P. erraticum, capite longiſſimo glabro. *Tournef. inſt.* 238. *Rupp. jen.* 2. *p.* 71. *ed. Hall. p.* 79.
Argemone capitulo longiore glabro. *Moriſ. bleſ.* 233. *hiſt.* 2. *p.* 279. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 11.
β. Papaver dubium. *Iacq. auſtr.* 1. *p.* 17. *t.* 25.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 200.
Saat-Mohn. W.
Habitat inter ſegetes Europae *ſeptentrionalioris.* ⊙ (v. v.)

Papaver *Iacquini in flor. auſtr. t.* 25. *pictum*, Petala *crenata eaque tantum non ſemper alba habet; apud nos vero* P. dubium *petala conſtanter rubra, et ſemper integra gerit.* De la Chenal in *Act. Helv.* VIII. *p.* 145. *n.* 25.

7. PAPAVER *ſomniferum.*

P. calycibus capſulisque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Mat. med. p.* 134. *Mill. dict. n.* 8. *et* 9. *Hall. helv. n.* 1065.
P. caule multifloro, foliis ſimplicibus glabris inciſis caulinis. *Hort. upſ.* 135.
P. foliis ſimplicibus glabris inciſis. *Hort. cliff.* 200. *Roy. lugdb.* 879.
P. nigrum et album offic. *Crantz. auſtr. p.* 138. *Blackw. t.* 482. 483. *Regn. bot.*
P. hortenſe, ſemine albo. *Bauh. pin.* 170.
β. P. hortenſe, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 170.
γ. P. criſtatum, floribus et ſemine album. *Bauh. pin.* 171.
δ. P. criſtatum, floribus rubris, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 171.
ε. P. flore pleno, album. *Bauh. pin.* 171.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 200.
Garten-Mohn. W.
Habitat in Europae *auſtralioris ruderatis.* ⊙ (v. v.)

Caulis, Folia, Calyces, Capſulae glabra. Stigmata 10.

8. PAPAVER *cambricum.*

P. capſulis glabris oblongis, caule multifloro laevi, foliis pinnatis inciſis. *Hudſ. angl.* 203. *Mill. dict. n.* 5.
P. foliis pinnatis, fructu acuminato. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 479.
P. cambricum perenne, flore ſulphureo. *Dill. elth.* 300. *t.* 223. *f.* 290.

Argemone cambro-britannica lutea, capite longiore glabro. *Moriſ. hiſt. 2. p. 297. ſ. 3. t. 14. f. 12.*
P. erraticum pyrenaicum, flore flavo. *Bauh. pin.* 171. *prodr.* 92. *Burſ. IP.* 45.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 204.
Engliſcher Mohn. W.
Habitat in Cambriae *ſeptentrionalis nemoroſis*, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)
Stigmata 5 *ſ.* 6 *diſtincta. Capſula oblonga, inferne anguſtior, apice ſubroſtrata.*

9. PAPAVER *orientale.*

P. capſulis glabris, caulibus unifloris ſcabris folioſis, foliis pinnatis ſerratis. *Hort. upſ.* 136. *Mill. dict. n.* 7. *Knorr. del. t. R.* 14. *a.*
P. foliis pinnatis, fructu globoſo. *Roy. lugdb.* 279.
P. orientale hirſutiſſimum, flore magno. *Tournef. cor.* 17. *itin.* 3. *p.* 127. *t.* 127. *Comm. rar.* 34. *t.* 34.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 205.
Orientaliſcher Mohn W.
Habitat in Oriente. ♃ (v. v.)
Stigmata 16. Setae *in caule ſparſae, cauli adpreſſae, baſi prominula aſperae.*

1016. ARGEMONE.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 882.

Cor. 6-petala. *Cal.* 3-phyllus. *Capſ.* ſemivalvis.

1. ARGEMONE *mexicana.*

A. capſulis ſexvalvibus, foliis ſpinoſis. *Sp. pl.* 727.
A. capſulis quinquevalvibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 727. *Mill. dict. Kniph. cent.* 5. *n.* 16.
Argemone. *Hort. cliff.* 201. *Hort. upſ.* 135. *Roy. lugdb.* 479. *Brown. jam.* 244. *Merian. ſurin.* 24. *t.* 24.
Papaver ſpinoſum. *Bauh. pin.* 171. *prodr.* 93. *t.* 92. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 93.
Papaver ſpinoſum luteum, foliis albis venis notatis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 277. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 207.
Mexicaniſche Argemone. W.
Habitat in Mexico, Iamaica, Caribaeis, *nunc in* Europa *auſtrali.* ☉ (v. v.)

2. ARGEMONE *armeniaca.*

A. capſulis trivalvibus. *Sp. pl.* 727.
Papaver orientale, hypecoi folio, fructu minimo. *Tournef. cor.* 17.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 208.
Armeniſche Argemone. W.
Habitat in Armenia.

3. ARGEMONE *pyrenaica.*

A. capſulis quadrivalvibus, caule nudo. *Sp. pl.* 728.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 208.
Pyrenäiſche Argemone. W.
Habitat in Pyrenaeis. *Tournef.*

Haec *ſemiquadrivalvis, uti ſpecies ſecunda ſemitrivalvis, et prima ſemiquinquevalvis.* Hae *ſpecies vel ſub diſtincto genere ſimul tradendae, vel etiam ad genus papaverinum amandandae omnes. Hujus habitus plurimum accedit Papaveri alpino.*

1017. MUNTINGIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 884.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Bacca* 5-locularis, 1-polyſperma.

1. MUNTINGIA *Calabura.*

M. Calabura. *Sp. pl.* 728. *Iacq. amer.* 166. *t.* 107. *Mill. dict. Swartz. obſ.* 211. *
M. pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 203. *
M. fruticoſa villoſa, foliis ſerratis oblongis uno latere brevioribus. *Brown. jam.* 245.
M. folio ſericeo molli, fructu majori. *Plum. gen.* 41. *ic.* 205.
Calabura alba. *Plum. alm.* 75. *mant* 34. *t.* 152. *f.* 4.
Loti arboris folio anguſtiore, rubi flore, fructu polyſpermo umbilicato. *Sloan. jam.* 162. *hiſt.* 2. *p.* 80. *t.* 194. *Raj. dendr.* 32.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 15.
Weſtindiſche Muntingie. W.
Habitat in Jamaicae *collibus calcareis ſubalpinis.* ♄
Flores *axillares, bini, albi.*

1018. SARRACENIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 885.

Cor. 5-petala. *Cal.* duplex, 3-phyllus et 5-phyllus. *Capſ.* 5-locularis. *Stylus* ſtigmate clypeatus.

1. SARRACENIA *flava.*

S. foliis erectis tubulatis, valva collo contracto, apice plana erecta. *Walt. carol.* 153.

S. foliis ſtrictis. *Sp. pl.* 729. *Mill. dict. n.* 2.

Sarracena foliis rectis. *Hort. cliff.* 497. *Gron. virg.* 164.

Sarracena foliis longioribus et anguſtioribus. *Catesb. car.* 2. *p.* 69. *t.* 69.

Coilophyllum virginianum, longiore folio erecto, flore luteo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 533.

Bucanephyllum elatius virginianum ſ. Limonio congeneris altera ſpecies elatior, foliis triplo longioribus. *Pluk. alm.* 72. *amalth.* 46. *t.* 152. *f.* 3. *(mala) t.* 376. *f.* 5. *bona.*

Thuris limpidi folium. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 307. *Dalech. hiſt.* 1754. *Lob. adv.* 430.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 210.

Gelbe Sarracene W.

Habitat in Americae *ſeptentrionalis udis.* ♃

*2. SARRACENIA *minor.* †

S. foliis minoribus tubulatis erectis, valva concava nutante. *Walt. carol.* 153.

Kleine Sarracene. W.

Habitat in Carolinae *udis.* ♃

*3. SARRACENIA *rubra.* †

S. foliis erectis tubulatis, valva plana erecta. *Walt. carol.* 152.

Rothe Sarracene. W.

Habitat in Carolinae *udis.* ♃

4. SARRACENIA *purpurea.*

S. foliis cucullatis ventricoſis patulis arcuatis. *Walt. carol.* 152.

S. foliis gibbis. *Sp. pl.* 728. *Hort. cliff.* 427. *Gron. virg.* 164. *Mill. dict. n.* 1. *et ic.* 161. *t.* 241.

Sarracena foliis brevioribus latioribus. *Catesb. car.* 2. *p.* 70. *t.* 70.

Coilophyllum virginianum, breviore folio, flore purpuraſcente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 533.
Bucanephyllum americanum, limonio congener dictum. *Pluk. alm.* 71. *amalth.* 46. *t.* 376. *f.* 6.
Limonium peregrinum, foliis forma floris ariſtolochiae. *Bauh. pin.* 192.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 209.
Purpurfarbene Sarracene. W.
Habitat in Americae *ſeptentrionalis udis.* ♃ *P. Collinſon.* (v. ſ.)

Folia *ſeſſilia, cucullata: tubo ventricoſo, ſenſim ampliato: fauce contractiuſcula, margine antice dilatata.* Limbus *reniformis, patulus, emarginatus.* Venter *antice carina membranacea, ſemielliptica, binervi. Sic Metamorphoſis folii Nymphaeae in folium* Sarraceniae, *ut ipſa aquam pluvialem excipiens et retinens extra aquas creſcat; mira Naturae providentia!*

1019. NYMPHAEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 886.

Cor. polypetala. *Cal.* 4-ſ. 5-phyllus. *Bacca* multilocularis, loculis polyſpermis.

1. NYMPHAEA *lutea.*

N. foliis cordatis integerrimis, lobis approximatis, calyce pentaphyllo petalis longiore. *Ait. Kew.* 2. *p.* 227.
N. foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphyllo. *Fl. lapp.* 218. *Fl. ſuec.* 426, 469. *Hort. cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. pariſ.* 150. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 184. *Crantz. auſtr. p.* 142. *Hoffm. germ.* 184. *Scop. carn. n.* 639. *Gunn. norv. n.* 451. *Pollich. pal. n.* 508. *Flor. dan. t.* 603. *Blackw. t.* 497. 499. *et* 500. *Kniph. cent.* 3. *n.* 66. *Knorr. del.* 2. *tab. N.* 1. *Roth. germ. I.* 229. *II.* 588.
N. calyce pentaphyllo, petalis majori, fructu conico. *Hall. helv. n.* 1066.
N. foliis cordato-ovatis, calycibus pentaphyllis orbiculatis: petalis ſubcuneatis. *Neck. gallob. p.* 228.
N. lutea major. *Bauh. pin.* 183.
N. lutea. *Cam. epit.* 635.
β. N. *minima* petiolis baſi ſemiteretibus, ſuperne ancipitibus, ſtigmate dentato. W.

Nymphaea lutea β. pumila. *Timm. in Magazin für die Naturkunde Mecklenburgs.* 3. *p.* 256. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 211.
Gelbe Seeroſe. W.
Habitat ad Europae *littora, ſub dulci aqua.* β. *in ducatu* Megapolitano. ♃ (v. v.)

Varietas β, *eſt forte diſtincta ſpecies, differt a vulgari,* flore *magnitudine Ranunculi acris,* ſtigmate *dentato,* et petioli *forma.* W.

*2. NYMPHAEA *advena.*

N. foliis cordatis integerrimis, lobis divaricatis, calyce hexaphyllo petalis longiore. *Ait. Kew.* 2. *p.* 226.
N. floribus flavis. *Gronov. virg. ed.* 1. *p.* 164.
Dreyfarbige Seeroſe. W.
Habitat in America *boreali.* ♃

Petioli *ſemiteretes plerumque ſupra aquam eriguntur* Folia *cordato-oblonga verſus apicem magis anguſtata, quam in N. lutea.* Pedunculus *teres.* Calyx *hexaphyllus;* foliola *ſubrotunda obtuſa concava:* tria exteriora *patentia extus viridia, intus ſordide purpuraſcentia, diametro unciali;* tria interiora *duplo majora ſuberecta, extus flava, intus ſordide purpuraſcentia.* Petala *circiter* 13, *lateribus receptaculi ſimplici ſerie inſerta, ſubcuneiformia, obtuſe rotundata patenti-reflexa, luteo-flavicantia, tres lineas lata.* Filamenta *numeroſiſſima, multiplici ſerie receptaculo inſerta linearia, lineam lata, vix ſemiunciam longa, primum erecta, dein reflexa flava, medio rubra.* Antherae *lineares, binae in ſingulo filamento, marginibus adnatae.* Germen *columnare, profunde ſulcatum, angulis* (13) *extantibus, flavum.* Stigma *peltatum leviter umbilicatum flavum, radiis* 13 *rotatum, margine profunde* 13-*dentatum, dentibus obtuſis ſuperne viridibus.* Ait. l. c.

3. NYMPHAEA *alba.*

N. foliis cordatis integerrimis, lobis imbricatis rotundis, calyce tetraphyllo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 227.
N. foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Mat. med. p.* 135. *Mill. dict. n.* 2. *Crantz. auſtr. p.* 142. *Pollich. pal. n.* 509. *Hoffm. germ.* 184. *Scop. carn. n.* 640. *Fl. dan. t.* 602. *Blackw. t.* 498, 499. *Knorr. del.* 2. *t. N.* *Roth. germ. I.* 230. *II.* 589.
N. calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Fl. lapp.* 219.

Fl. ſuec. 427. 470. *Hort. cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480. *Dalib. pariſ.* 150.

N. calyce quadrifido, petalis minori, fructu ſphaerico. *Hall. helv n.* 1067.

N. foliis cordato-orbiculatis, petalis ovatis calycem aequantibus: fructu truncato. *Neck. gallob. p.* 227.

N. alba major. *Bauh. pin.* 193.

N. alba. *Cam. epit.* 634.

β. N. alba minor. *Besl. eyſt. vern. ord.* 7. *t.* 3. *f.* 1. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 513.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 212.

Weiſse Seeroſe. W.

Habitat in Europae *aquis dulcibus.* ♃ (v. v.)

*4. NYMPHAEA *odorata.*

N. foliis cordatis integerrimis emarginatis, lobis divaricatis, acumine obtuſo, calyce tetraphyllo. *Ait Kew.* 2. *p.* 227.

N. alba flore pleno odorato. *Gron. virg. ed.* 1. *p.* 57. *ed.* 2. *p.* 81.

N. alba minor. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 184. *t.* 71. (*excluſo ſynonymo Moriſoni.*)

Wohlriechende Seeroſe. W.

Habitat in America *boreali inque* Sibiria *orientali.* ♃

Omnino diverſa a N. alba minore Moriſoni et aliorum, quae a N. alba, nil niſi magnitudine differt. Ait. l. c.

*5. NYMPHAEA *ſtellata.* W. †

N. foliis cordatis integerrimis, lobis divaricatis, acutis, calyce acuto tetraphyllo petalis acutis longiore. W.

Citambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 53. *t.* 27.

Sternförmige Seeroſe. W.

Habitat in Malabariae *aquis.* ♃

6. NYMPHAEA *Lotus.*

N. foliis cordatis dentatis glaberrimis, lobis approximatis, calyce tetraphyllo. W.

N. foliis cordatis dentatis. *Fl. zeyl.* 194. *Haſſelq. it.* 471.

N. foliis amplioribus profunde crenatis ſubtus areolatis. *Brown. jam.* 243?

N. indica, flore candido, folio in ambitu ſerrato. *Sloan. jam.* 120. *hiſt.* 1. *p.* 252? *Raj. ſuppl.* 630?

Lotus aegyptia. *Alp. aegypt.* 103. *exot.* 214. *t.* 215. 216. 218. 220. 222. 226.

Ambel. *Rheed. mal* 11. *p.* 51. *t.* 26.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 213.
Aegytipſche Seeroſe. W.
Habitat in Indiae, Aegypti, Hungariae *aquis.* ♃ (v. v.)

Dentes *foliorum acuminati: Planta americana ſub eodem nomine a Botanicis indicata, videtur differre.* W.

*7. NYMPHAEA *pubeſcens.* W.

N. foliis reniformibus dentatis ſubtus pubeſcentibus, lobis rotundis, calyce tetraphyllo. W.
N. indica foliis amplis eleganter ad ambitum crenatis, ſubtus fulva lanugine tecta, flore albo ſimplici. *Pluk. alm.* 267.
Rauhe Seeroſe. W.
Habitat in India *orientali.* ♃ (v. ſ.)

Folia *ſex uncias et ultra longa, octo vel decem uncias lata reniformia, nec cordata, lobis rotundata, margine profunde et acute dentata, ſuperne ſcabra, ſubtus pilis denſis breviſſimis fuſceſcentibus tecta.* Petiolus *pubeſcens, videtur in ſicco ſpecimine ſemi-teres.* Flos *ut in Nymphaea alba.* Calyx *tetraphyllus viridis obtuſus.* Petala *numeroſa.* W.

1020. BIXA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 887.

Cor. 10-petala. *Cal.* 5-dentatus. *Capſ.* hiſpida, bivalvis.

1. BIXA *Orellana.*

Bixa. *Hort. cliff.* 211. *Mat. med.* 135. *Roy. lugdb.* 477. *Brown. jam.* 254. *Mill. dict.*
Orleana ſ. Orellana folliculis lappaceis. *Pluk. alm.* 272. *t.* 209. *f.* 4. *Comm. hort.* 1. *p.* 65. *f.* 33.
Arbor mexicana, fructu caſtaneae, coccifera. *Bauh. pin.* 419.
Urucu. *Sloan. jam.* 150. *hiſt.* 2. *p.* 52. *t.* 181. *f.* 1. *Piſ. braſ.* 133.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 9.
Gemeiner Orleanbaum. W.
Habitat in America *calidiore, ad foſſas et fontes.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

1021. SLOANEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 888.

Cor. 0. *Cal.* 1-phyllus 5-9-fidus. *Antherae* filamentis infra apicem adnatae. *Capſ.* echinata 3-6-locularis, 3-6-valvis. *Semina* 2 arillo baccato.

1. SLOANEA *dentata.*

S. foliis ovatis, ſtipulis cordato-triangularibus ſerratis. *Swartz. prodr.* 82. *obſerv.* 213.*
S. foliis cordato-ovatis denticulatis, ſtipulis ſerratis. *Sp. pl.* 730.
Sloanea Plumierii. *Aubl. guj.* 1. *p.* 536.*
Sloanea. *Hort. cliff.* 210?
S. amplis caſtaneae foliis, fructu echinato. *Plum. gen.* 49. *ic.* 244.
Caſtanea foliis oblongo-ovatis ſerratis, fructu rotundo maximo echinato. *Mill. dict.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 12.
Gezähnte Sloanie. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄

*2. SLOANEA *Maſſoni.*

S. foliis cordato-ellipticis, ſtipulis linearibus,* calyce quinquepartito, ſetis capſulae longiſſimis. *Swartz. prodr.* 82.
Maſſoniſche Sloanie. W.
Habitat in inſulis Caribaeis. ♄

*3. SLOANEA *ſinemarienſis.*

S. foliis ſubrotundo ovatis integerrimis, capſulis ovatis ſetoſis ex apice dehiſcentibus. *Swartz. prodr.* 82.
S. (*ſinemarienſis*) foliis ſubrotundis integerrimis, fructu parvo aculeis hiſpido. *Aubl. guj. p.* 534. *t.* 212.*
Sinemarienſiſche Sloanie. W.
Habitat in inſulis Caribaeis *et ſylvis* Gujanae. ♄

Sloanea (emarginata) foliis oblongis integerrimis emarginatis Sp. pl. 731. *eſt planta valde dubia, forte nullibi obvia, cujus deſcriptionem Clariſſ. Linnaeus ex icone Cateſbaei concinnavit, ſed planta hujus Auctoris eſt Achras Sapota.* W.

*1022. AUBLETIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 889.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5 petala. *Capſula* echinata multilocularis.

***1. AUBLETIA** *Tibourbou.*

A. foliis cordato-lanceolatis ſerratis ſubtus hirſutis, capſulis ſetoſis. W.

Apeiba (*Tibourbou*) foliis acute-ſerratis hirſutis. *Swartz. prodr.* 82. *Ait. Kew.* 2. *p.* 228.

Apeiba (*Tibourbou*) foliis cordatis ovato-oblongis acutis ſerrulatis, ſubtus hirſutis rufeſcentibus, fructu magno compreſſo hiſpido. *Aubl. guj.* 1. *p.* 538. *t.* 213. *

Sloanea. *Loefl. itin.* 511. *

Apeiba. *Marcg. braſ.* 123. *t.* 124. *Raf. hiſt.* 1643.

Braunhaarige Aubletie. W.

Habitat in collibus Gujanae *et* Cajennae *inque inſula* Tabago. ♄ (v. ſ.)

***2. AUBLETIA** *Petoumo.*

A. foliis oblongis ſubcordatis ſerrulatis ſubtus incanis, capſulis ſetoſis. W.

Apeiba (*Petoumo*) foliis ellipticis acutis ſerrulatis ſubtus incanis. *Swartz. prodr.* 82.

Apeiba (*Petoumo*) foliis ovatis ſubtus incanis, floribus racemoſis luteis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 543. *t.* 215. *

Graue Aubletie. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

***3. AUBLETIA** *aſpera.*

A. foliis oblongis ſubcordatis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, capſulis muricatis. W.

Apeiba (*aſpera*) foliis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, fructu compreſſo. *Swartz. prodr.* 82.

Apeiba (*aſpera*) fructu rotundo compreſſo leviter echinato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 545. *t.* 216. *

Scharffrüchtige Aubletie. W.

Habitat in Cajenna. ♄

***4. AUBLETIA** *laevis.*

A. foliis oblongo-obovatis acuminatis integerrimis glabris, petalis obtuſis, capſulis ſcabris. W.

Apeiba (*laevis*) foliis integerrimis utrinque glabris, fructu aſpero depreſſo. *Swartz. prodr.* 83.

Apeiba (*glabra*) floribus vireſcentibus, fructu aſpero. *Aubl. guj. 1. p. 541. t. 214.* *
Glatte Aubletie. W.
Habitat in Cajenna. ♄

1023. MAMMEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1586.

Cor. 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Bacca* maxima, 4-ſperma.

1. MAMMEA *americana.*

M. foliis obtuſiſſimis ſtriatis, pedunculis brevibus, baccis tetraſpermis. *Vahl. eclog. 2. p. 40.*
M. ſtaminibus flore brevioribus. *Sp. pl. 731. Mill. dict. n. 1. Iacq. amer. 268. t. 181. f. 82.*
M. foliis ovalibus nitidis, fructu ſubrotundo ſcabro. *Brown. jam. 248.*
Mammei magno fructu, perſicae ſapore. *Plum. gen. 44. ic. 170.*
Mamay. *Bauh. hiſt. 1. p. 172. Dalech. hiſt. 1836. Laet. amer. 356.*
Malus perſica maxima, foliis rotundis ſplendentibus glabris, fructu maximo ſcabro rugoſo. *Sloan. jam. 179. hiſt. 2. p. 123. t. 217. f. 3.*
Arbor indica mamei dicta. *Bauh. pin. 417. Raj. hiſt. 1665.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. p. 16.
Genieſsbare Mammei. W.
Habitat in Hiſpaniola, Jamaica. ♄

Arbor *alta, pyramidalis, ramis ſcabris.* Folia *oppoſita, oblonga, obtuſa.* Fructus *fulvus, magnitudine capitis infantis, gratiſſimus, ſed cortex et pulpa ſeminum propria amariſſima. Ad polygamiam monoeciam.* Iacq.

*2. MAMMEA *humilis.*

M. foliis acutis, pedunculis petiolo longioribus, baccis triſpermis. *Vahl. eclog. 2. p. 40.* *
Niedrige Mammei. W.
Habitat in inſula Montſerrat. ♄

Eandem forte eſſe plantam ac Rheedia lateriflora Linnaei, credit Clariſſ. Vahl. l. c. W.

1024. OCHNA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 891.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Baccae* 1-ſpermae, receptaculo ſubrotundo magno affixae.

1. OCHNA *ſquarroſa.*

O. pedunculis multifloris, corollis octopetalis. W.

O. racemis lateralibus. *Sp. pl.* 731. *Fl. zeyl.* 209. * *Roxb. corom.* 1. *p.* 62. *t.* 89. *

Japotapita cinnamomi folio, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 123. *t.* 56.

β. Arbor africana, ſubrotundo folio margine denticulis acutis aſpero, floribus pentapetalis atropurpureis. *Pluk. alm.* 41. *t.* 263. *f.* 1. 2.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 2. *p.* 21.

Sparrige Ochna. W.

Habitat in India, β. *in* Africa. ♄ (v. ſ.)

Racemi *perſiſtunt ſquarroſi infra folia a caſu pedicellorum et fructificationum.*

Si planta Plukenetii ad hoc genus pertineat, erit ſpecies diſtincta; differt enim, quoad iconem foliis obtuſis, et corollis pentapetalis, ut et colore petalorum rubro, qui flavus eſt in O. ſquarroſa. W.

*2. OCHNA *parvifolia.*

O. pedunculis unifloris. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 33.

Evonymus (*inermis*) foliis alternis ovatis ſerratis. *Forſk. deſcr.* 204. *

Kleinblättrige Ochna. W.

Habitat in Arabia *felici.* ♄

Refert O. ſquarroſam, demta magnitudine foliorum et infloreſcentia. Frutex *ramis teretibus glabris, cortice cinereo punctato.* Folia *tantummodo in ramulis petiolata oblonga ſerrulata baſi integerrima venoſa nitida unguicularia.* Pedunculi *ad latera ramulorum ſolitarii uniflori, ſuperne ſenſim incraſſati purpurei folio longiores.* Vahl. l. c.

1025. GRIAS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 892.

Cor. 4-petala. *Cal.* 4-fidus. *Stigma* ſeſſile, cruciatum. *Drupa* nucleo octoſulcato.

1 GRIAS *cauliflora.*

G. cauliflora. *Sp. pl.* 732. *Swartz. obſ.* 215. *
Calophyllum foliis tripedalibus obovatis, floribus per caulem et ramos ſparſis. *Brown. jam.* 245.
Palmis affinis Malus Perſica maxima, caudice non ramoſo, foliis longiſſimis, flore tetrapetalo pallide luteo, fructu ex arboris trunco. *Sloan. jam.* 179. *hiſt.* 2. *p.* 123. *t.* 217. *f.* 1. 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 24.
Stammblütige Grias. W.
Habitat in Jamaicae *uliginoſis ſubalpinis.* ♄

Arbor *ſaepe* 50-*pedalis.* Rami *terminales ſimplices breves vel nulli.* Folia *brevius petiolata pendula longiſſima* 2-3-*pedalia, baſi cuneata oblongo-attenuata integerrima venoſa rugoſa glabra conſiſtentia.* Flores *caulini pedunculati.* Pedunculi *breviſſimi ſquamoſi multiflori.* Pedicelli *breves conferti uniflori.* Corollae *magnae albidae.* Swartz. l. c.

1026. CALOPHYLLUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 1587.

Cor. 4-petala. *Cal.* 4-phyllus, coloratus *Drupa* globoſa.

1. CALOPHYLLUM *Inophyllum.*

C. foliis ovalibus. *Sp. pl.* 732. *Fl. zeyl.* 101. *
Arbor indica, mali medicae amplioribus foliis. *Pluk. alm.* 41. *t.* 147. *f.* 3.
Bintangor maritima. *Rumph. amb.* 2. *p.* 211. *t.* 71.
Ponna ſ. Ponna-maram. *Rheed. mal.* 4. *p.* 76. *t.* 38. *Raj. hiſt.* 1525.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 25.
Groſses Schönblatt. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

Ex hac arbore venit Reſina Tacamahaca dicta; quae in inſulis Borboniae, Madagaſcariae colligitur. Lamarck. encycl. 1. p. 457.

2. CALOPHYLLUM *Calaba.*

C. foliis ovatis obtuſis. *Sp. pl.* 730. *Fl. zeyl.* 201. * *Iacq. amer.* 269. *t.* 165.* *Swartz. obſ.* 216. *

C. foliis ovatis obtuſis: ſtriis parallelis transverſis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 476.

Inophyllum flore quadrifido. *Burm. zeyl.* 130. *t.* 60.

Arbor altiſſima foliis oblongis nitidiſſimis nervoſis. *Brown. jam.* 372.

Mali perſicae Mammeae dictae folio arbor. *Sloan. cat.* 180.

Tſierou-ponna. *Rheed. mal.* 4. *p.* 81. *t.* 39.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 28.

Kleines Schönblatt. W.

Habitat in Indiis. ♄ (v. ſ.)

Ad Polygamiam Monoeciam. Iacq.

Poſſideo tantum americanam varietatem, aſiatica eſt forte diverſa. W.

1027. SPARRMANNIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 893.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* 4-petala reflexa. *Nect.* plura toruloſa. *Capſ.* angulata 5-locularis echinata.

1. SPARRMANNIA *africana.*

S. africana. *Linn. ſuppl.* 265. *Thunb. Nov. pl. gen.* 5. *p.* 89.* *Retz. obſ.* 5. *p.* 25. *n.* 65. *t.* 3. (*ſynonymum, patria et deſcriptio vero ad Lageſtroemiam pertinent.*)

Africaniſche Sparrmannie. W.

Habitat in Cap. b. ſpei *ſylvis* Elſeboſch, Houtniquas, *inque lateribus montium ad* Lange Kloof. ♄

Frutex *ramis erectis alternis piloſis teretibus.* Folia *alterna longe petiolata dependentia cordata ovata ſublobata ſerrata acuminata novemnervia utrinque hiſpida.* Petioli *teretes piloſi.* Stipulae *laterales ſubulatae piloſae erectae.* Pedunculi *oppoſitifolii petiolis longiores erecti piloſi terminati in umbellam more Geraniorum, involucro polyphyllo ſubulato breviſſimo.* Pedicelli *piloſi.* Calyces *piloſi ſimpliciſſimi non ariſtati.* Petala *arcte reflexa flava.* Nectaria *lutea.* Stamina *atropurpurea.* Piſtillum *ſtaminibus multo longius luteum.* Capſula *echinata fuſca.* Semina *nigra.*

Flores ante floreſcentiam pedunculis deflexis, ſub flo-

reſcentia eriguntur pedunculi, at flores nutant, peracta floreſcentia eriguntur flores pro germine maturando, eodem modo ac in Dodecatheo.

Herba ſimilis Triumfettis ſ. Commerſoniae exactius, pedunculus et infloreſcentia Geraniorum, fructus Hibiſci, at aculeatus ut in Geis, inde quaſi a pluribus generibus compoſita.

1028. TILIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 894.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-partitus. *Capſula* coriacea globoſa, 5-locularis, 5-valvis, baſi dehiſcens, monoſperma.

1. TILIA *europaea.*

T. floribus nectario deſtitutis. *Mat. med. p.* 136. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 179. *Crantz. auſtr. p.* 96. *Pollich. pal. n.* 510. *Ludw. ect. t.* 48. *Fl. dan. t.* 553. *Kniph. cent.* 10. *n.* 87. *Knorr. del.* 1. *t. L.* 11. *Roth. germ. I.* 229. *II.* 587. *Willd. arb.* 387.

Tilia. *Hort. cliff.* 204. *Fl. ſuec.* 432, 471. *Phil. bot.* 259.* *Roy. lugdb.* 477. *Dalib. pariſ.* 153.

T. foliis cordato-lanceolatis, ſpongiolis ad nervorum angulos ſeſſilibus. *Hall. helv. n.* 1030.

α. T. (*grandifolia*) foliis cordatis acuminatis ſerratis ſubhirſutis, fructu quadriloculari. *Hoffm. germ.* 184.

T. foliis acuminatis ſerratis ſubhirſutis, fructibus quadrangularibus ſubpiloſis. *Mill. dict. n.* 2. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 461.

T. platyphyllos. *Scop. carn. n.* 641.

T. femina, folio majore. *Bauh. pin.* 426. *Blackw. t.* 469.

T. urbana. *Geſn. tab. III.*

β. T. montana, maximo folio. *Bauh. pin.* 426.

γ. T. femina, folio minore. *Bauh. pin.* 326.

T. (*parvifolia*) foliis cordatis acuminatis inaequaliter ſerratis, fructu quinqueloculari. *Hoffm. germ.* 185.

T. (*cordata*) foliis cordatis acuminatis inaequaliter ſerratis, fructibus quinquelocularibus tomentoſis. *Mill. dict. n.* 1. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 466.

T. ulmi folia. *Scop. carn. n.* 642.

δ. T. ulmi folio, ſemine hexagono. *Raj. angl.* 3. *p.* 473.

ε. T. foliis molliter hirſutis, viminibus rubris, fructu tetragono. *Raj. angl. 3. p. 473. Du Ham. arb. 4.*

ζ. T. bohemica, foliis minoribus glabris, fructu oblongo utrinque acuminato minimo coſtulato. *Till. piſ.* 165. *t.* 49 *f.* 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 31.
Gemeine Linde. W.
Habitat in Europae *pratis.* ♄ (v. v.)

2. TILIA *americana.*

T. floribus nectario inſtructis, foliis profunde cordatis argute ſerratis glabris. *Ait. Kew.* 2. *p.* 229.
T. floribus nectario inſtructis. *Sp. pl.* 733. *Mill. dict. n.* 3.
Tilia caroliniana. *Wangenh. amer.* 56. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 469.
T. foliis majoribus mucronatis. *Gron. virg.* 58.
T. ampliſſimis glabris foliis, noſtrati ſimilis. *Pluk. mant.* 181.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 35.
Schwarze Linde. W.
Habitat in Virginia, Canada. ♄ (v. v.)

*3. TILIA *pubeſcens.*

T. floribus nectario inſtructis, foliis baſi truncatis obliquis denticulato-ſerratis ſubtus pubeſcentibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 229.
Tilia caroliniana. *Mill. dict. n.* 4.
Tilia americana. *Wangenh. amer.* 55.
Feinbehaarte Linde. W.
Habitat in Carolina. ♄ (v. ſ.)

*4. TILIA *alba.*

T. foliis profunde cordatis ſubſinuatis dentatis, ſubtus tomentoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 230. *Willd. arb.* 389. * *Waldſtein et Kitaibel pl. hung. t.* 3.
T. (*tomentoſa*) foliis cordatis acutis ſerratis, ſubtus tomentoſis. *Moench. weiſſenſt.* 136.
Tilia americana. *Du Roi. harbk.* 2. *p.* 467.
Weiſse Linde. W.
Habitat in Hungaria. ♄ (v. v.)

Folia *ſubtus nivea.* Flores *ut in T. americana ſed minores. Clariſſ. Aiton, patriam hujus Americam eſſe, dixit, ſed a nullo peregrinatore indicata eſt. Amicus meus Clariſſ. Kitaibel ſylvas hujus ſpeciei in Hun-*

garia nuper detexit, et mecum ſpecimina communicavit, iis examuſſim ſimillima, quae ex hortis noſtris accepi; hinc de origine americana hujus valde dubito. W.

1029. LAETIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 895.

Cor. 5-petala ſ. 0. *Cal.* 5-phyllus. *Fructus* 1-locularis, trigonus. *Semina* arillo pulpoſo.

1. LAETIA *apetala.*
L. floribus apetalis, pedunculis ſubtrifloris axillaribus, foliis oblongis obtuſis ſerrulatis nitidis. W.
L. floribus apetalis. *Sp. pl.* 733. *Iacq. amer.* 167. *t.* 108. * *Swartz. obſ.* 219.
Guidonia Laetia. *Loefl. it.* 190.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 37.
Dreyblütige Lätie. W.
Habitat in America. ♄

*2. LAETIA *Guidonia.*
L. floribus apetalis, pedunculis unifloris terminalibus, foliis oblongis acuminatis ſerratis pubeſcentibus. *Swartz. prodr.* 83.
Guidonia foliis ovatis utrinque porrectis alternis quandoque crenatis, racemis laxis alaribus. *Brown. jam.* 249.
Einblütige Lätie. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*3. LAETIA *Thamnia.*
L. floribus apetalis, pedunculis multifloris ſubdiviſis axillaribus, foliis oblongis acutis ſubcrenatis nitidis. *Swartz prodr.* 83.
Thamnia foliis ovatis leviſſime crenatis laete virentibus nitidis alternis, petiolis brevibus, pedunculis geniculatis. *Brown. jam.* 245.
Vielblütige Lätie. W.
Habitat in Jamaica. ♄

4. LAETIA *completa.*
L. floribus corollatis, foliis ovatis obtuſis ſerratis rugoſis glabris. W.
L. floribus petaloideis completis. *Sp. pl.* 733. *Iacq. amer.* 167. *t.* 183. *f.* 60.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 38.
Vollkommene Lätie. W.
Habitat in America. ♄
Laetiae apetalae Ludiis ſunt affines, ſed differunt fructus ſtructura. W.

*1030. RYANIA.
Vahl. eclog. 1. *p.* 51.

Cal. 5-phyllus, perſiſtens, coloratus. *Cor.* 0. *Stigmata* 4. *Bacca* ſuberoſa unilocularis polyſperma.

*1. RYANIA *ſpecioſa.*
R. ſpecioſa. *Vahl. eclog.* 1. *p.* 51. *t.* 9. *
Prächtige Ryanie. W.
Habitat in inſula Trinitatis. ♄
Arbor *ramis ſubcineraſcentibus.* Folia *alterna petiolata oblonga acuminata integerrima venoſa glabra, coſta media ſubtus pulverulenta.* Pedunculi *uniflori axillares.* Flores *ſpecioſi.* W.

1031. GREWIA.
Gen. pl. ed. Schreb. n. 896.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-peta... *Nectar.* ſquamae 5. *Drupa* quadriloba 4-locularis. *Nuce* 1-2-ſperma.

1. GREWIA *occidentalis.*
G. foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis dentatis glabris, pedunculis ſolitariis uniſloris. W.
G. foliis ſubovatis, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1367. *Mill. dict. n.* 1. *Willich. obſ. n.* 94. *Kniph. cent.* 9. *n.* 48.
G. corollis acutis. *Hort. cliff.* 433. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 276. *t.* 108.
Ulmifolia arbor africana baccifera, floribus purpureis. *Pluk. alm.* 393. *t.* 237. 1.
Ulmi facie arbuſcula aethiopica, ramulis alatis, floribus purpuraſcentibus. *Comm. hort.* 1. *p.* 165. *t.* 85. *Seb. theſ.* 1. *p.* 46. *t.* 26. *f.* 3. *Raj. dendr.* 13.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 261.

Africaniſche Grewie. W.
Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ (v. v.)

*2. GREWIA *populifolia.*

G. foliis orbiculatis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 33. *

Chadara tenax. *Forſk. deſcr. p.* 105. *n.* 23. *

Pappelblättrige Grewie. W.

Habitat in Arabia *felici.* ♄

Affinis quam maxime G. occidentali, habitus *vero laxior*, folia *orbiculata Populi tremulae dependentia*, pili *ſtellati ſubtus.* Vahl. l. c.

3. GREWIA *orientalis.*

G. foliis ovatis crenatis utrinque ſcaberrimis, pedunculis axillaribus trifloris. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 34.

G. foliis ſublanceolatis, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1367. *Fl. zeyl.* 324. *

G. corollis obtuſis. *Roy. lugdb.* 467. *Hort. cliff.* 433.

Pai-paraea. *Rheed. mal.* 5. *p.* 91. *t.* 46. *Raj. hiſt.* 1624.

Frutex baccifer malabaricus, fructu plano rotundo piloſo tetragono. *Pluk. alm.* 275. *t.* 50. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 262.

Oſtindiſche Grewie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Folia *obtuſiuſcula baſi utrinque ſaepe triglanduloſa, crenata, ſubtus punctis numeroſiſſimis, quibus inſident pili ſtellati.* Petioli, Pedunculi, Rami *ſuperne*, Calycesque *intenſe piloſi.* Vahl. l. c.

Poſſideo varietatem vel ſpeciem ex India orientali foliis *duplo longioribus quinque uncialibus, quae praeter magnitudinem a vulgari differt:* foliis *baſi cordatis*, ſtipulis *lineari-ſubulatis petiolo multo longioribus, denique* petalis *linearibus fere longitudine calycis.* W.

4. GREWIA *Mallococca.*

G. foliis cordatis ovato-oblongis crenatis ſcabris, pedicellis axillaribus trifloris, fructu tetracocco. *Lin. ſuppl.* 409. *Forſt. prod. n.* 327.

Mallococca crenata. *Forſt. gen. n.* 39. *Forſt. Nov. Act. Upſ.* 3. *p.* 179. *

Rauhfrüchtige Grewie. W.

Habitat in locis inſulae Tongatabu *atque in montoſis inſulae* Huaheine. ♄

Difficile differentia eruitur, qua a praecedente dignoſcatur.

*5. GREWIA *laevigata.*

G. foliis ellipticis acuminatis utrinque laevibus baſi integerrimis, pedunculis trifloris. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 34.*

Glatte Grewie. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Differt ab inſequente: foliis *longioribus baſi integerrimis eglanduloſis,* pedunculis *trifloris longis.* Vahl. l. c.

*6. GREWIA *glanduloſa.*

G. foliis ovato-lanceolatis acuminatis utrinque laevibus, baſi glanduloſis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 34.

Drüſige Grewie. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

Rami *ſcabriuſculi.* Folia *ovato-lanceolata acuminata acuta glabra utrinque laevia crenata, crenis* 3-5, *baſi proximis glanduloſis.* Petiolus *brevis.* Flores *axillares ſolitarii breviſſimi pedunculati.* Fructificatio *ut in reliquis.* Vahl. l. c.

*7. GREWIA *hirſuta.*

G. foliis lanceolato-ovatis mollibus, calycibus piloſiſſimis, pedunculis trifloris. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 34.*

Rauhe Grewie. W.

Habitat in ſummitate montium Indiae *orientalis.* ♄ (v. ſ.)

Facili negotio diſtinguitur a reliquis, foliis *molliſſimis lanceolato-ovatis.* Vahl. l. c.

*8. GREWIA *excelſa.*

G. foliis oblongis ſubtus tomentoſis incanis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 35.

Chadara (*arborea*) foliis ovatis ſerratis glabris. *Forſk. deſcr.* 105.*

Hohe Grewie. W.

Habitat in Arabia *felici.* ♄

Folia *inaequaliter obtuſe ſerrata, ſupra laevia nervoſo-venoſa, ſubtus incana.* Pedunculi *axillares ſaepe ſolitarii triflori pedicellati ungulati.* Vahl. l. c.

9. GREWIA *aſiatica.*

G. foliis cordato-ſubrotundis ſubtus canis, pedunculis axillaribus ſubquaternis petiolo longioribus. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 35.*

G. foliis cordatis. *Mant.* 122. *Sonnerat. itin.* 2. *p.* 191 *t.* 138. *
Houttuyn Lin. Pfl, Syſt. 2. *p.* 263.
Aſiatiſche Grewie. W.
Habitat in Suratte. ♄

Arbor *ramis vix tomentoſis.* Stipulae *lanceolatae.* Folia *alterna petiolata cordata ſubrotunda acutiuſcula quinquenervia vix lobata ſubtus tomentoſa magnitudine Mali.* Petioli *teretes tomentoſi foliis quintuplo breviores.* Pedunculi *axillares ſaepius quaterni trifidi triflori foliis dimidio breviores.* Petala *calyce non majora.* Baccae *parvae acidae.*

10. GREWIA *tiliaefolia.*

G. foliis cordato-ſubrotundis utrinque glabris, pedunculis petiolo brevioribus. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 35. *
Microcos (*lateriflora*) pedunculis axillaribus confertis dichotomis. *Sp. pl.* 734. *Fl. zeyl.* 208. *
Hamdamanias. *Herm. zeyl.* 3.
Lindenblättrige Grewie. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

Similis G. aſiaticae, diverſa vero: foliis *duplo majoribus obtuſe ſerratis,* petiolis *vix incraſſatis,* ſtipulis *ſemicordatis nec ſubulatis,* pedunculis *petiolo dimidio brevioribus, minime vero duplo longioribus,* floribus *duplo minoribus.* Vahl. l. c.

*11. GREWIA *velutina.*

G. foliis ovalibus utrinque molliſſimis ſubtus incanis, pedunculis axillaribus ſubternis trifloris. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 35. *
Chadara (*velutina*) foliis alternis ovato-acutis ſerratis velutinis baſi obliquis. *Forſk. deſcr.* 106. *
Weichblättrige Grewie. W.
Habitat in Arabia *felici.* ♄

A G. hirſuta differt: ramis foliisque *minime piloſis, ſed tomento tenuiſſimo albidis, imprimis ſubtus, demum* ſerraturis *minutioribus. A G. Mallocca differt:* foliis *molliſſimis.* Vahl. l. c.

*1032. MAERUA.

Vahl. ſymb. 1. *p.* 36.

Cal. 4-fidus tubo nectarifero. *Cor.* o. *Stigma* ſeſſile. *Drupa?*

*1. MAERUA *uniflora.*

M. pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris, nectariis diviſis. *Vahl. ſymb.* 1, *p.* 36. *
Maerua craſſifolia. *Forſk. deſcr.* 104. *
Einblumige Märua. W.
Habitat in Arabia *felici.*

*2. MAERUA *racemoſa.*

M. floribus racemoſis, nectariis integris, foliis retuſis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 36. *
Traubentragende Märua. W.
Habitat in Arabia *felici.* ♄

Folia *minus craſſa quam in priori.* Habitus, Calyx, Germen, Stylus *et* Stigma *ut in praecedente ideoque hujus generis, quamvis nectario integro gaudet.* Vahl l. c

1033. MICROCOS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 897.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Nectar.* o. *Drupa* nuce triloculari.

1. MICROCOS *paniculata.*

M. panicula terminali. *Sp. pl.* 733. *Fl. zeyl.* 207. *
Grewia (*Microcos*) foliis ovato-oblongis, floribus paniculatis. *Syſt. veg.* 689.
Microcos foliis alternis oblongis acuminatis. *Burm. zeyl.* 159. *t.* 74.
Schageri Cottam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 105. *t.* 56.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 264.
Riſpentragende Microcos. W.
Habitat in India *orientali.* ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri, juniores tomentoſi.* Folia *alterna oblonga acuminata, apice ſerrata, baſi obliqua, trinervia venoſa, venis partialibus horizontalibus, ſubtus tomentoſa.* Panicula *terminalis bracteata.* W.

*1034. MARILA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 1756.

Cor. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* ſimplex. *Capſ.* 4-locularis polyſperma.

*1. MARILA *racemoſa.*
M. racemoſa. *Swartz. prodr.* 84.
Traubige Marile. W.
Habitat in inſulis Montſerrat *et* Chriſtopher Americes. ♄

1035. ELAEOCARPUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 898.

Cor. 5-petala, lacera. *Anthera* apice 2-valvi. *Cal.* 5-phyllus. *Drupa* nucleo criſpo.

1. ELAEOCARPUS *ſerratus.*
E. foliis alternis lanceolato-ellipticis ſerratis, racemis axillaribus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 67.
E. ſerrata. *Sp. pl.* 754. *Retz. obſ.* 4. *p.* 27. *
Elaeocarpus. *Fl. zeyl.* 206.
Elaeocarpus foliis lauri ſerratis, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 39. *t.* 40.
Ganitrus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 60. *t.* 101.
Perin-Kara. *Rheed. mal.* 4. *p.* 51. *t.* 24. *Raj. hiſt.* 1546. *dendr.* 42.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 40.
Geſägter Ganiterbaum. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ.)

Rumphius *plures ſpecies commemorat.* Stamina *in Zeylanica* 20, *in Javanica* 8, *in Burmanniana* 16, 20 *a me viſa. In nupero ſpecimine vidi vel aliam ſpeciem vel varietatem, cui*

Calyx 5-*partitus, acutus.* Petala 3, *unguiculata, calyce longiora, lacera ramentis capillaribus.* Filamenta 8, *brevia.* Antherae *columnares, dehiſcentes apice bivalvi.* Germen *ſuperum, ſubgloboſum.* Stylus *filiformis, longitudine ſtaminum.* Stigma *ſimplex.*

Rami *teretes cicatriſati glabri.* Folia *petiolata tripollicaria obtuſe ſerrata glabra nervoſo-venoſa.* Racemi *axillares.* Flores *diſtantes.* Vahl l. c.

2. ELAEOCARPUS *dentatus.*
E. foliis alternis oblongis ſuperne dentato-ſerratis, race-

mis axillaribus, floribus monogynis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 67.

E. (*ſerratus*) monogynus, foliis alternis oblongis ſerratis, racemis axillaribus. *Lin. ſuppl.* 266. (*excluſo ſynonymo Syſt. veg.*)

Dicera (*dentata*) monogyna, foliis oblongis acuminatis dentatis, racemis ſimplicibus axillaribus laxis. *Forſt. prod. n.* 226. *Forſt. gen.* 40. *n.* 1.

Gezähnter Ganiterbaum. W.

Habitat in No[illegible]ndia. ♄

Rami *teretes* [illegible]*ati glabri.* Ramuli *pubeſcentes.* Folia *petiolata* [illegible]*erna bipollicaria, ſuperne remote dentato-ſerrata baſi acuta, utrinque glabra, excepto in coſta, ſupra nervoſa ſubtus ſubvenoſa.* Petioli *villoſi.* Vahl l. c.

3. **ELAEOCARPUS** *Dicera.*

E. foliis oppoſitis ovatis duplicato-ſerratis, racemis compoſitis, floribus tetragynis. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 67. *

E. tetragynus, foliis oppoſitis ovatis duplicato-ſerratis, racemis lateralibus oppoſitis. *Lin. ſuppl.* 266.

Dicera (*ſerrata*) foliis oppoſitis cordato-ovatis inaequaliter ſerratis, racemis lateralibus compoſitis. *Forſt. prod. n.* 227. *Forſt. gen.* 40. *n.* 2.

Viergriffliger Ganiterbaum. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

Structura *floris convenit cum E. dentato, at differt:* ſtylis *quatuor,* fructu *baccato quadriloculari: loculis diſpermis.*

*4. **ELAEOCARPUS** *integrifolius.*†

E. foliis alternis ovato-oblongis obtuſis integerrimis, racemis axillaribus ſimplicibus, floribus quadrifidis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 597. *

Ganitrum oblongum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 163. *t.* 102. *

Ungezähnter Ganiterbaum. W.

Habitat in inſula Mauritii. ♄

5. **ELAEOCARPUS** *copalliferus.*

E. foliis integerrimis, panicula terminali. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 67. *

E. (*copalliferus*) foliis integris. *Retz. obſ.* 4. *p.* 27. *

Vateria indica. *Sp. pl.* 734. *Fl. zeyl.* 204.

Paenoe. *Rheed. mal.* 4. *p.* 33. *t.* 15.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 48.

Copaltragender Ganiterbaum. W.
Habitat in Zeylona. ♄

Calycem *non ſuperum invenio, ut habet Celeb. Retzius, tamen eandem eſſe eum noſtra, omnino perſuaſus ſum.* Vahl l. c.

*1036. LEGNOTIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 900.

Cal. 5-fidus. *Cor.* 5-petala receptaculo inſerta lacera. *Capſ.* 3-locularis.

*1. LEGNOTIS *elliptica.*

L. foliis ellipticis, floribus pedicellatis. *Swartz. prodr.* 84.
Elliptiſche Saumblume. W.
Habitat in Jamaica. ♄ (v. ſ.)

Folia *oblonga acuminata integerrima,* Flores *bini vel ſolitarii axillares pedunculati.* Pedunculi *uniflori.* W.

*2. LEGNOTIS *Caſſipourea.*

L. foliis ovatis, floribus ſeſſilibus. *Swartz. prod.* 84.
Caſſipourea gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 529. *t.* 211. *
Sitzende Saumblume. W.
Habitat in locis paludoſis Gujanae. ♄

*1037. MYRODENDRUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 901.

Cal. 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Stigma* 5-lobum. *Pericarp.* 5-loculare, loculis monoſpermis.

*1. MYRODENDRUM *amplexicaule.* W.

Houmiri balſamifera. *Aubl. guj. p.* 564. *t.* 225. *
Stielumfaſſender Balſambaum. W.
Habitat in Cajenna, Gujana. ♄

Arbor *procera.* Folia *alterna lanceolata acuta, ſeſſilia amplexicaulia crenata venoſa utrinque glabra.* Flores *terminales albi parvi corymboſi.* W.

*1038. LEMNESCIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 902.

Cal. 5-dentatus. *Cor.* 5-petala. *Nectarium* cyathiforme ſtaminiferum. *Capſula?* 5-locularis, loculis 1-ſpermis.

*1. LEMNESCIA *floribunda*. W.
Vantanea gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 572. *t.* 229.*
Vielblütige Lemneſcie. W.
Habitat in Gujana. ♄
Folia *alterna oblonga acuminata integerrima venoſa.* Flores *coccinei ſpecioſi, in corymbo multifloro terminali.* W.

*1039. ASCIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 903.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 4-locularis, loculis diſpermis.

*1. ASCIUM *violaceum*.
A. violaceum. *Vahl eclog. p.* 41.*
Norantea gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 554. *t.* 220.*
Violette Becherblume. W.
Habitat in ſylvis paludoſis Gujanae *et in inſula* Trinitatis. ♄
Arbor *altiſſima* 80-*pedalis.* Folia *alterna obovata, breve petiolata, coriacea, reticulato-venoſa, integerrima, emarginata mucronata glabra.* Racemus *terminalis ſecundus.* Flores *parvi violacei,* Bractea *pedicellata aſcidiformi coccinea magna, ſuffulti.* W.

1040. LECYTHIS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 904.

Cor. 6-petala. *Cal.* 6-phyllus. *Nectarium* lingulatum, ſtaminiferum. *Pericarp.* circumſciſſum, polyſpermum.

1. LECYTHIS *Ollaria.*
L. foliis ſeſſilibus cordato-ovatis ſubintegerrimis. *Syſt. veg.* 410. *Loefl. it.* 189.
Jacapucaya. *Margr. braſ.* 128. *Piſ. braſ.* 135.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. p. 43.
Herzblättriger Topfbaum. W.
Habitat in Braſilia, Cumana. ♄
Folia *alterna, ſeſſilia. Flos Fructusque ſingulares.* Natura *fructu ollas producit, ut in Cucurbita et Creſcentia lagenas.*

2. LECYTHIS *minor.*
L. foliis petiolatis lanceolatis ſerratis. *Syſt. veg.* 410. *Iacq. amer.* 168. *t.* 109.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 45.
Sägeblättriger Topfbaum. W.
Habitat Carthagenae Americes *in ſylvis.* ♄

*3. LECYTHIS *grandiflora.*
L. foliis petiolatis oblongis acutis integerrimis, racemis axillaribus terminalibusque petiolo multoties longioribus petalis obtuſis. W.
L. (*grandiflora*) foliis ovatis, florum pedunculis craſſis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 712. *t.* 283. *
Groſsblütiger Topfbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*4. LECYTHIS *amara.*
L. foliis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis, racemis axillaribus terminalibusque petiolo duplo longioribus, petalis acutis. W.
L. (*amara*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, fructu parvo, nucleo amaro. *Aubl. guj.* 2. *p.* 716. *t.* 286. *
Bitterer Topfbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*5. LECYTHIS *Zabucajo.*
L. foliis petiolatis lanceolatis acuminatis integerrimis, racemo terminali, petalis acutis. W.
L. (*Zabucajo*) foliis lanceolato-oblongis acuminatis, fructu magno, nucleo eduli. *Aubl. guj.* 2. *p.* 718. *t.* 288. (*excluſis ſynonymis.*)
Eſsbarer Topfbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*6. LECYTHIS *Idatimon.*
L. foliis petiolatis oblongis acutis integerrimis, racemis axillaribus, pedunculis glanduloſis, petalis obtuſis. W.
L. (*Idatimon*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, fructu parvo quadriloculari. *Aubl. guj.* 2. *p.* 721. *t.* 289. *

β. L. (*lutea*) foliis lanceolatis oblongis acuminatis, flore parvo. *Aubl. guj.* 2. *p.* 721.
Drüſiger Topfbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*7. LECYTHIS *parviflora.*
L. foliis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis, racemis paniculatis terminalibus, petalis acutis. W.
L. (*parviflora*) foliis ovato-lanceolatis acuminatis, fructu parvo biloculari, operculo cum appendice lignoſa intus producta. *Aubl. guj.* 2. *p.* 717. *t.* 287. *
Kleinblütiger Topfbaum. W.
Habitat ad fluviorum ripas Gujanae. ♄

*8. LECYTHIS *bracteata.* W. †
L. foliis petiolatis elliptico-obovatis acuminatis integerrimis, racemis lateralibus, calyce bracteato, cortice fructus duplici. W.
Couroupita gujanenſis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 708. *t.* 282. *
Beblätterter Topfbaum. W.
Habitat in Cajenna. ♄
Diſtincta a reliquis: Bracteis *binis ad baſin calycis, et* cortice *fructus duplici.* W.

*1041. ALANGIUM.

Juſſ. gen. pl. ed. Uſteri 358.

Cal. 6-f. 10-dentatus ſuperus. *Cor.* 6-f. 10-petala. *Bacca* corticoſa 2-3-ſperma.

1. ALANGIUM *decapetalum.*
A. floribus decapetalis, ramis ſpineſcentibus. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 61.
A. (*decapetalum*) ſpinoſum, foliis alternis oblongis, baccis glabris ſubtriſpermis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 173. *
Grewia (*ſalvifolia*) foliis oblongis integerrimis, floribus axillaribus pluribus pedicellatis, petalis recurvis linearibus. *Lin. ſuppl.* 409. *
Baccifera indica, fructu rotundo umbilicato, ceraſi magnitudine, dicocco. *Raj. hiſt.* 1497.
Angolam. *Rheed. mal.* 4. *p.* 39. *t.* 17.
Zehnblättriges Alangium. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Rami *teretes glabri ſparſi, ſuperne vix villoſi, apice in ſpinam deſinentes.* Folia *petiolata tripollicaria la-*

to-lanceolata membranacea venoſa, ſubtus pallidiora ſubtrinervia, ſecundum nervos rare piloſa, utrinque acuta integerrima. Pedunculi *axillares plerumque terni ſemiunguiculares tomentoſi, ſuperne ſub germine annulati articulati.* Calyces *et* Petala *extus tomentoſa.* Bacca *magnitudine nucis Coryli; lineis aliquot elevatis, farinoſo-ſubvilloſa.* Vahl l. c.

*2. ALANGIUM *hexapetalum.*

A. floribus hexapetalis, ramis inermibus. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 62.

A. (*hexapetalum*) inerme, foliis ovato-lanceolatis alternis, baccis tomentoſis monoſpermis. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 173.*

Prunifera indica, arbor fructu umbilicato corticoſo perſici ſimili. *Raj. hiſt.* 1483.

Arbor baccifera maderaſpatana. *Pluk. amalth.* 24. *t.* 870. *f.* 1?

Kara-Angolam. *Rheed. mal.* 4. *p.* 55. *t.* 26.

Sechsblättriges Alangium. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Differt a praecedente: foliis *latioribus in acumine longiori productis et notis indicatis, caeterum ſatis ſimile.* Vahl l. c.

1042. MENTZELIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 907.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* infera, cylindrica, polyſperma.

1. MENTZELIA *aſpera.*

M. caule ramoſo, pedunculis axillaribus, petalis crenatis obtuſis. W.

Mentzelia. *Hort. cliff.* 492. *Amoen. acad.* 5. *p.* 398.* *Loefl. it.* 223. *Mill. dict. n.* 1.

M. foliis et fructibus aſperis. *Plum. gen.* 41. *ic.* 174. *f.* 1.

M. ſetis uncinatis munita, foliis lobatis, fructibus ſeſſilibus ſingularibus ad divaricationes ramorum. *Brown. jam.* 249.

Onagra americana, folio betonicae, fructu hiſpido. *Tournef. inſt.* 302.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 216.

Scharfe Mentzelie. W.
Habitat in America.

*2. MENTZELIA *hiſpida*. W.

M. caule dichotomo, pedunculis unifloris in caulis dichotomiis, petalis integerrimis cuſpidatis. W.
Mentzelia (*aſpera*) foliis ovato-lanceolatis biſerratis inciſis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Cavan. ic.* 1. *p.* 51. *t.* 70. * (*exclufis ſynonymis.*)
Rauhe Mentzelie. W.
Habitat in Mexico. ♃
Diverſiſſima a praecedente. W.

1043. LOASA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 908.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus. *Capſ.* ſemiinfera, 1-locularis, ſemitrivalvis, polyſperma.

1. LOASA *hiſpida*.

L. hiſpidiſſima, foliis alternis bipinnatifidis, laciniis calycinis margine revolutis, corolla reflexa. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 554. *
L. hiſpida. *Syſt. nat. ed.* 13. *p.* 364.
L. urens. *Iacq. obſ.* 2. *p.* 15. *t.* 38.
Loaſa. *Adanſ. fam.* 2. *p.* 501?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7 *p.* 218. *t.* 53. *B.*
Brennende Loaſe. W.
Habitat in Peru. ☉
Petala *flava*. Nectaria *alba punctis rubris viridibusque*. Filamenta *in* 5 *faſciculos interſtitia nectariorum occupantia*. Stamina *primum erecta, demum reflexa*. *Affinitate* Mentzeliae *accedit*. Iacq.

*2. LOASA *contorta*.

L. ſcandens, foliis oppoſitis petiolatis ſubruncinatis, capſula oblonga contorta nutante. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 554. * *illuſt. gen. t.* 426. *f.* 2.
Gedrehte Loaſe. W.
Habitat in Peru.

*3. LOASA *acanthifolia*.

L. foliis oppoſitis pinnatifidis, ſuperioribus ſeſſilibus, calyce reflexo, petalis apice bidentatis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 555. *

Ortiga chilienſis urens Acanthi folio. *Feuill. peruv.* 2. *p.* 757. *t.* 43.
Bärenklaublättrige Loaſe. W.
Habitat in Chili.

*4. LOASA *grandiflora.*

L. hiſpida, foliis oppoſitis alternisque cordato-ovatis lobatis, petalis planiuſculis, flore maximo. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 555. *
Groſsblütige Loaſe. W.
Habitat in Peru.

*5. LOASA *chenopodifolia.*

L. foliis ſubovatis inciſo-dentatis, racemis laxis folioſis terminalibus, floribus cernuis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 556. *
Gänſefuſsblättrige Loaſe. W.
Habitat in Peru.

*6. LOASA *nitida.*

L. proſtrata, foliis cordato-lobatis dentatis, ſupra nitidis, ſuperioribus ſeſſilibus, pedunculis axillaribus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 556. *
Glänzende Loaſe. W.
Habitat in rupibus Limae. ☉

*1044. STERBECKIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 909.

Cal. 3-ſ. 5-phyllus. *Cor.* 3-ſ. 5-petala. *Capſula* corticoſa non dehiſcens leguminiformis polyſperma. *Semina* imbricata in pulpa nidulantia.

*1. STERBECKIA *lateriflora.* W.

Singana gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 574. *t.* 230. *
Seitenblütige Sterbeckie. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Frutex *ſcandens.* Folia *ſuboppoſita petiolata elliptica acuminata integerrima venoſa glabra.* Pedunculi *multiflori breviſſimi laterales.* Flores *albi parvi.* W.

1045. LAGERSTROEMIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 910.

Cor. 6-petala. *Cal.* 6-fidus, campanulatus. *Stam.* multa: horum 6 exteriora craſſiora. *Capſ.* 4-ſ. 6-locularis polyſperma.

1. LAGERSTROEMIA *indica.*

L. petalis criſpis, panicula terminali, foliis ſubrotundo-ovatis acutis glabris. W.

L. foliis ovatis, calycibus nudis laevibus. *Retz. obſ.* 5. *p.* 25. *et p.* 20. *

L. indica. *Sp. pl.* 734. *Thunb. jap.* 224. * *Loureiro cochin.* 415. * *Curt. mag.* 405.

Tſiin-kin. *Rumph. amb.* 7. *p.* 61. *t.* 28.

Sibi. *Kaempf. amoen.* 855.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 18.

Chineſiſche Lagerſtrömie. W.

Habitat in China, Cochinchina, Japonia. ♄ (v. f.)

Arbor *Punicae magnitudinis.* Folia *oppoſita, interdum alterna, ſubſeſſilia, oblonga, integerrima, glabra: floralia ſubrotunda.* Thyrſus *terminalis, laxus, pedicellis trifidis ſ. trifloris.* Flores *incarnati: Petalis longe unguiculatis, 6, meſenterii inſtar criſpis.*

***2. LAGERSTROEMIA** *Reginae.*

L. petalis undulatis, panicula terminali, foliis oblongis glabris. W.

Lagerſtroemia Reginae. *Roxb. corom.* 1. *p.* 46. *t.* 65. *

L. (*Flos Reginae*) foliis ovato-oblongis, calycibus rugoſis tomentoſis. *Retz. obſ.* 5. *p.* 25. * *et* 1. *p.* 20. *

Adambea glabra. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 39.

Alcea indica arborea, pericarpio carnoſo in plura loculamenta partito. *Raj. hiſt.* 1902.

Adamboe. *Rheed. mal.* 4. *p.* 45. *t.* 20. 21.

Prächtige Lagerſtrömie. W.

Habitat in ſylvis Calcuttae, Javae. ♄

***3. LAGERSTROEMIA** *hirſuta.* W.

L. petalis planis, panicula corymboſa terminali, foliis oblongis pubeſcentibus. W.

Adambea hirſuta. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 39.

Alcea indica arborea elatior, pericarpio craſſo ſubaſpero. *Raj. hiſt.* 1902.

Katou-Adamboe. *Rheed. mal.* 4. *p.* 47. *t.* 22.
Behaarte Lagerſtrömie. W.
Habitat in montoſis Malae *et* Poigae *provinciis* Malabariae. ♄

4. LAGERSTROEMIA *Münchhauſia.* W.

L. petalis planis, racemo ſubcompoſito terminali, foliis ovatis glabris. W.
Münchhauſia ſpecioſa. *Mant.* 243. *Murr. prod. in praef. c. ic. Münchh. hausv.* 5. *p.* 357. *t.* 356.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 303.
Schöne Lagerſtrömie. W.
Habitat in China. ♄

Arbuſcula *ramis teretibus laevibus.* Folia *alterna petiolata ovata ſeu ovato-oblonga acuminata integerrima glabra ſubtus pallidiora.* Racemus *terminalis compoſitus erectus.*

*5. LAGERSTROEMIA *parviflora.*

L. petalis planis, pedunculis axillaribus trifloris, foliis oblongis obtuſis ſcabris. W.
Lagerſtroemia parviflora. *Roxb. corom.* 1. *p.* 48. *t.* 66.*
Kleinblütige Lagerſtrömie. W.
Habitat in montoſis Indiae. ♄

*1046. FREZIERA.

Eroteum. Gen. pl. ed. Schreb. n. 1757.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Stylus* trifidus. *Bacca* exſucca 3-locularis polyſperma.

*1. FREZIERA *Theaeoides.*

F. foliis ovato-lanceolatis ſerrato-dentatis, floribus axillaribus ſolitariis.
Eroteum Theaeoides. *Swartz. prod.* 85.
Theeartige Freziere. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*2. FREZIERA *undulata.*

F. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ſerratis, floribus confertis axillaribus.
Eroteum undulatum. *Swartz. prod.* 85. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 61. *
Wellenblättrige Freziere. W.

Habitat in India *occidentali.* ♄ (v. ſ.)

Ob conformem denominationem generis Erodii in claſſe Monadelphia, mutavit amiciſſimus mihi Clariſſ. Swartz nomen, in litteris ad me datis. W.

1047. THEA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 911.

Cor. 6-ſ. 9-petala. *Cal.* 5-ſ. 6-phyllus. *Capſ.* 3-cocca.

1. THEA *Bohea.*

T. floribus hexapetalis. *Sp. pl.* 734. *Hort. cliff.* 204. *Mat. med.* 136. *Amoen. acad.* 7. *p.* 239. *t.* 4. *Hill. exot. t.* 22. *Blackw. t.* 352. *Thunb. jap.* 225.

α. *laxa*, foliis elliptico-oblongis rugoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 230.

Thee. *Kaempf. jap.* 605. *t.* 606.

Thee frutex. *Bart. act.* 4. *p.* 1. *t.* 1. *Bont. jav.* 87 *t.* 88. *Barr. rar.* 128. *t.* 904. *Letſom. diſſ. lugdb.* 1769. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Thee ſinenſium. *Breyn. cent.* 111. *t.* 112. *ic.* 17. *t.* 3. *Bocc. muſ.* 114. *t.* 94.

Chaa. *Bauh. pin.* 147.

Evonymo affinis arbor orientalis nucifera, flore roſeo. *Pluk. alm.* 139. *t.* 88. *f.* 6.

β. *ſtricta*, foliis lanceolatis planis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 231. *Houttuyn Lin. Pſl. Syſt.* 4. *p.* 19.

Brauner Thee. W.

Habitat in Japonia, China. ♄ (v. v.)

Folia *alterna, elliptica, conſiſtentia, laevia, obtuſiuſcula, obtuſe ſerrata: Petiolis brevibus, ſubtus teretibus, gibbis.* Stipulae *nullae.*

Nobis attulit vivam primus Car. Guſt. Ekeberg, navis ad Chinenſes gubernator, d. 3. *Octob.* 1763. *Obtinetur, ſi ſemina, ad navis receſſum e China, in nave terrae mandentur, ut in itinere ſerius germinent.*

Perfidi Chinenſes ſaepe pro Theae frutice offerunt Camelliam, *qua leviter verſatus absque floribus facile ſeducitur, non obſervatis attente petiolis. Multi oſtenderunt alium fruticem pro Thea, ſed, ni fallor, nullus vivam habuit in Europa ante me.*

2. THEA *viridis.*

T. floribus enneapetalis. *Sp. pl.* 735. *Hill. exot. t.* 22.

T. cantonienſis. *Loureiro cochin.* 414. *
T. ſinenſis. *Blackw. t.* 351. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 22.
Grüner Thee. W.
Habitat in China. ♄

Folia hujus longiora, illius breviora.

Florum *libram integram aliquando accepi; eſſe Theam viridem ex Hillio didici.* Stylos 3 *conglutinatos eſſe, nec ſimplicem. Io. Coakly Letſom.*

1048. CISTUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 913.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus: foliolis duobus minoribus. *Capſula.*

* *Exſtipulati fruticoſi.*

1. CISTUS *capenſis.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovato-lanceolatis petiolatis trinerviis denticulatis utrinque nudis. *Sp. pl.* 736. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 68. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 23.
Capiſche Ciſtenröſe. W.
Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

Differt a ſequentibus foliorum denticulis.

Rami *teretes, pilis rarioribus adſperſi purpuraſcentes.* Folia *tripollicaria remota, ſuperiora ſeſſilia, baſi non connata; inferiora baſi in petiolum breviſſimum attenuata acuta ſubtriplinervia, nervis verſus medium evaneſcentibus, utrinque glabra, margine denticulata, pilis longis ciliata, praeſertim ſuprema. Petioli diſtincti.* Stipulae *nullae.* Pedunculi *terminales trifidi, pedunculis partialibus trifloris.* Calycis *foliola cordata acuminata hirſuta denticulata ciliata, juniora hirſutiſſima.* Corolla *flava.* Vahl l. c.

2. CISTUS *villoſus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovatis petiolatis hirtis. *Syſt. veg.* 412. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 408. *
C. piloſus. *Lin. ſpec. pl.* 2. *p.* 737. *Mill. dict. n.* 1.
C. mas, folio rotundo hirſutiſſimo. *Bauh. pin.* 464.
C. mas major, folio rotundiore. *I. B. Du Ham. arb.* 1. *p.* 167. *t.* 64.

C. mas matthioli. *Dalech. hiſt.* 222.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 23.
Rauhe Ciſtenroſe. W.
Habitat in Italia, Hiſpania *et* Africa *boreali* ♄

Folia *petiolata, rugoſa, utrinque viridia et pubeſcentia.* Pedunculi *uniflori cum geniculo.*

3. CISTUS *populifolius.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis cordatis laevibus acuminatis petiolatis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 474. *Mill. dict. n.* 15. *Cavan. ic.* 3. *p.* 8. *t.* 215. *

C. Ledon, foliis populi nigrae, major. *Bauh. pin.* 467.
Ledum latifolium 2. majus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 78.
β. Ciſtus Ledon, foliis populi nigrae, minor. *Bauh. pin.* 467.
Ledum latifolium 2. minus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 78.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 24.
Pappelblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Luſitania, Hiſpania. ♄ (v. v.)

Planta *ramis et foliis piloſa, etiam piloſiſſima calycibus; adultior ramis et foliis nudus eſt.* Petala *alba absque macula margine purpuraſcentia.* Stam. *lutea.* Calyces *ante explicationem triquetri.*

4. CISTUS *laurifolius.*

C. futeſcens exſtipulatus, foliis ovato-lanceolatis petiolatis trinerviis ſupra glabris, ſubtus tomentoſis, petiolis baſi connatis, pedunculis nudis multifloris. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 16. *

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis oblongo-ovatis petiolatis trinerviis ſupra glabris: petiolis baſi connatis. *Mill. dict. n.* 11.
Ciſtus Ledon, foliis laurinis. *Bauh. pin.* 467.
Ciſtus Ledon latifolium creticum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 9.
Ledon latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 77. *hiſp.* 156.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 25.
Lorbeerblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄ (v. v.)

Caulis *arboreſcens ramis piloſis.* Folia *lanceolata trinervia, acuta, rugoſa, utrinque viridia, vix manifeſte piloſa.* Petioli *baſi purpuraſcentes, ſaepe diſtincti.* Flores *albi.*

Folia *ſubtus tomentoſa.* W.

*5. CISTUS *vaginatus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis oblongis piloſis ſubtus reticulato-rugoſis, petiolis baſi coalitis vaginantibus ſulcatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 232. *Iacq. hort. ſchoenb.* 3. *p.* 17. *t.* 282. *

C. (*ſymphytifolius*) fruticoſus exſtipulatus, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis ſupra villoſis, petiolis baſi vaginantibus connatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 15. *

Scheidentragende Ciſtenroſe. W.

Habitat in inſula Teneriffa. ♄ (v. v.)

Folia *ſubtus trinervia reticulato-venoſa.* Petioli *connati.* Corolla *purpurea.* W.

*6. CISTUS *Ledon.*

C. fruticoſus exſtipulatus, foliis ſubſeſſilibus lanceolatis nervoſis connatis ſupra glabris, floribus corymboſis erectis, pedunculis calycibusque villoſo-ſericeis. *Lamarck. encyl.* 1. *p.* 17. *

C. ladanifera Monſpelienſium. *Bauh. pin.* 467. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 168. *t.* 66.

Ledum Matthioli. *Dalech. hiſt.* 230.

Ladanum. *Tabern. ic.* 1064

Mittländiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Gallia *auſtrali.* ♄ (v. v.)

7. CISTUS *ladaniferus.*

C. fruticoſus exſtipulatus, foliis ſubſeſſilibus connatis lanceolato-linearibus ſupra glabris ſubtus tomentoſis, pedunculis bracteatis unifloris, capſulis decemloculari-bus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 16. *

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis lanceolatis ſupra laevibus: petiolis baſi coalitis vaginantibus. *Hort. cliff.* 205. *Sauv. monſp.* 147, 150. *Mill. dict. n.* 6.

α. *undulatus*, foliis undulatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 282.

C. ladanifera hiſpanica incana. *Bauh. pin.* 467.

Ciſtus Ledon 1. anguſtifolius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 77.

β. *planifolius* foliis planis. *Ait. l. c.*

Ciſtus Ledon flore macula nigricante notato. *I. B. Comm. hort.* 1. *p.* 39. *t.* 20.

Ciſtus ladanifera hiſpanica ſalicis folio, flore candido. *Tournef. inſt.* 260.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 26.

Ladanum Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpaniae, Luſitaniae *collibus.* ♄ (v. v.)

Corolla *alba*, *magnitudine Papaveris ſomniferi*. Germen *torulis* 10. Stigma *ſeſſile absque ſtylo*.

8. CISTUS *monſpelienſis*.

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus utrinque villoſis trinerviis. *Hort. cliff.* 205. *Hort. upſ.* 144. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monſp.* 147.

C. ladanifera ſ. Ledon monſpelienſium anguſto folio nigricans. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 10.

Ciſtus Ledon foliis oleae, ſed anguſtioribus. *Bauh. pin.* 467.

Ciſtus oleaefolius. *Mill. dict. n.* 10.

Ledon narbonenſe. *Lob. ic. p.* 119.

Ledon 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 79.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 27.

Franzöſiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in G. Narbonenſi *et* Regno Valentino. ♄ (v. ſ.)

Folia *ſuprema baſi latiora, reliqua linearia, ſubtus reticulata trinervia.* Racemus *longe pedunculatus, ſaepe bifidus.* Corollae *albae.*

*9. CISTUS *laxus*.

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovato-lanceolatis undulatis denticulatis glabris, ſummis hirtis, foliolis calycinis ſubrotundo-cordatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 233.

C. (*hirſutus*) fruticoſus exſtipulatus, foliis ſeſſilibus oblongis obtuſis hirſutis, pedunculis multifloris, capſulis parvis calyce maximo et pyramidali tectis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 17. *

Ledon IV. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 78.

Schlaffäſtige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania, Luſitania. ♄

Affinis videtur C. capenſi, at Flos *albus*. W.

10. CISTUS *ſalvifolius*.

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovatis petiolatis utrinque hirſutis. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monſp.* 150. *Mill. dict. n.* 8. *Scop. carn. n.* 643. *Willd. arb.* 62. *Cavan. ic.* 2. *p.* 31. *t.* 137. *

C. ſubarboreſcens exſtipulatus, foliis oppoſitis petiolatis oblongo-ovatis rugoſis ſubcrenulatis utrinque hirſutis, pedunculis florum longiſſimis ante antheſin nutantibus. *Iacq. Collect.* 2. *p.* 120. *t.* 8. *

C. fruticoſus, foliis petiolatis, ovatis, rugoſis, ſerratis. *Hall. helv. n.* 1021.

C. femina, folio ſalviae. *Bauh. pin.* 464.
C. femina. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 70.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 28.
Salbeyblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Italia, Sicilia, Narbona, Helvetia, Carniolia. ♄ (v. v.)

Folia *ovata, obtuſa, avenia, minus mollia.* Pedunculi *laterales, ſolitarii, uniflori, foliis longiores.* Flores *albi.*

*11. CISTUS *heterophyllus.*

C. exſtipulatus, foliis ovato-lanceolatis baſi vaginantibus, margine revolutis, calycibus pedunculisque hirſutis ſubunifloris. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 411. *t.* 104.
Verſchiedenblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in collibus incultis Algeriae. ♄

Frutex *bipedalis erectus ramoſiſſimus.* Rami *juniores villoſi incani teretes.* Stipulae *nullae.* Folia *oppoſita ovato-oblonga ſeu elliptica, ſuperne laeviuſcula, inferne pallidiora, margine revoluta nervoſa, nervis transverſis villoſis, villis breviſſimis.* Petioli *breves connati baſi vaginantes.* Flores *terminales,* 1, 2, 3 *aut* 4 *pedunculati.* Pedunculi *hirſuti folioſi plerumque uniflori, nodulo interſecti foliola* 2 *lanceolata emittente.* Calyx *villoſus 5-phyllus, foliolis ovato-oblongis ſubaequalibus, duobus interioribus acutis.* Corolla *magna roſea.* Capſula *ſubrotunda villoſa, 5-locularis. Varietatem poſſideo diſtinctam, foliis rotundatis. Eadem planta ſaepe folia inferiora rotunda aut ſubrotunda, ſuperiora lanceolata profert, unde nomen C. heterophylli. Affinis C. incano.* Desfont. l. c.

12. CISTUS *incanus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ſpathulatis tomentoſis rugoſis: inferioribus baſi vaginantibus connatis. *Hort. cliff.* 205. *Hort. upſ.* 143. *Roy. lugdb.* 475. *Mill. dict. n.* 2.
C. mas anguſtifolius. *Bauh. pin.* 464.
C. mas 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 69. *hiſp.* 137.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 29.
Beſtäubte Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania, G. Narbonenſi. ♄ (v. v.)

Rami *villoſi.* Folia *minime nervoſa in mucronem deſinentia, diſco parum flexuoſa, deſinunt baſi in Petiolos coalitos vaginantes, vel potius obovato-ſpathula-*

ta, inferioribus magis connatis et fere vaginantibus. Calyces *piloſi foliolis ſubcordatis.* Petala *purpurea. emarginata ſ. obcordata, integerrima, concava.*

13. CISTUS *creticus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ſpathulato-ovatis rugoſo-venoſis ſcabris, petiolatis, petiolis diſtinctis, pedunculis unifloris, calycinis foliolis acuminatis. W.

C. arboreſcens exſtipulatus foliis ſpathulato-ovatis petiolatis enerviis ſcabris, calycinis lanceolatis. *Mat. med. p.* 137. *Mill. dict. n.* 9. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 95. *Collect.* 1. *p.* 80. *

C. fruticoſus exſtipulatus, foliis ſpathulato-ovatis petiolatis rugoſis hirtis margine undulatis, pedunculis brevibus unifloris, foliis calycinis mucronatis villoſis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 13. *

C. ladanifera cretica. *Tournef. cor.* 19. *it.* 1. *p.* 30. *Buxb. cent.* 3. *p.* 34. *t.* 64. *f.* 1.

Ciſtus Ledon cretenſe. *Bauh. pin.* 467. *non ſynonyma*

Ladanum creticum. *Alp. exot.* 89. *t.* 88.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 29.

Cretiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Creta, Syria. ♄ (v. v.)

Flores *purpurei.*

*14. CISTUS *parviflorus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovatis acutis tomentoſis rugoſo-venoſis petiolatis, petiolis baſi vaginantibus, calycibus villoſis acuminatis. W.

C. (*parviflorus*) fruticoſus exſtipulatus, foliis petiolatis ovatis acutis tomentoſis, pedunculis villoſis ſubunifloris. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 14. *

Ciſtus mas creticus breviori folio, parvo flore. *Tournef. cor.* 19.

Kleinblumige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Creta. ♄ (v. ſ.)

Similis praecedenti, ſed petiolis *baſi in vaginam breviſſimam connatis*, foliis *tomentoſis acutis*, calycibus *villoſis*, corollis*que minoribus diverſus.* W.

15. CISTUS *albidus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovato-lanceolatis tomentoſis incanis ſeſſilibus ſubtrinerviis. *Sauv. monſp.* 150. *Mill. dict. n.* 7. *Gouan. monſp.* 225. *Ger. prov.* 398. *Garid. aix.* 114.

C. mas, folio oblongo incano. *Bauh. pin.* 464.
C. mas 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 68.
C. mas 4. monſpelienſis, folio oblongo albido. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 31.
Weiſsliche Ciſtenroſe. W.
Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania. ♄ (v. v.)

Differt a C. incano, *cui ſimillimus*, Ramis *tomentoſis nec piloſis*; Foliis *pallidioribus, mollibus, horizontalibus, ſeſſilibus, minime petiolatis aut vaginantibus, lanceolatis, ſubtrinerviis.* Calyces *non hirti foliolis exterioribus longioribus, lateribus reflexis.* Pedunculi *ex apice ramorum, plures, foliis vix longiores.* Petala *purpurea, non emarginata, margine ſubcrenata, planiuſcula.*

*16. CISTUS *ſericeus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovatis tomentoſis trinerviis, inferioribus petiolatis, ſupremis ſeſſilibus, pedunculis hirtis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 37. *
C. latifolius magno flore. *Barrel. ic.* 1315.
Seidenartige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄

Caulis *bi-ſ. tripedalis.* Rami *teretes denſe tomentoſi incano-albi.* Folia *molliſſima obtuſa plana ſubpollicaria, quatuor ſuprema ſeſſilia, baſi ſubcordata, reliqua, in petiolum brevem deſinentia.* Pedunculus *ex apice ramorum ſolitarius erectus ſpithamaeus incanus, totus obſitus uti pedicelli pilis longis purpuraſcentibus.* Pedicelli *verſus ſummitatem patentes, inferiores triflori, ſuperiores uniflori.* Calyx *pilis mollibus ſericeis hirſutiſſimus.* Foliola interiora 3 *ovata intus glaberrima*; exteriora *lanceolata ad baſin calycis.* Petala *purpurea baſi macula flava.* Filamenta *purpurea.* Antherae *flavae.* Vahl l. c.

*17. CISTUS *hybridus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis ovatis petiolatis incanis, ramis ſquamoſis, pedunculis elongatis hirtis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 37. *
Baſtard Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄

Frutex *altitudine C. halimifolii.* Rami *teretes apice angulati incani, ſquamis flaveſcentibus tecti fere ut in*

C. ſquamato et halimifolio. Folia *omnia petiolata ovalia plana, juniora undulata utrinque incana, ſupra oculo armato minutiſſime punctata, nervoſa fragilia ſemipollicaria.* Racemus *terminalis.* Calycis *foliola exteriora caduca.* Corolla *purpurea.* Germen *villoſum.* Rami *et* Folia *C. halimifolii,* Pedunculus *et* Calyx *antecedentis. A praecedente dignoſcitur,* foliis *omnibus petiolatis albidioribus,* ramis *flavo-ſquamoſis.* Vahl l. c.

18. CISTUS *criſpus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis lanceolatis pubeſcentibus trinerviis undulatis. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monſp.* 147. *Mill. dict. n.* 16. *Kniph. cent.* 5. *n.* 23.
C. fruticoſus exſtipulatus, foliis lanceolatis undulatis trinerviis pubeſcentibus, floribus ſubſeſſilibus. *Cavan. ic.* 2. *p.* 57. *t.* 174. *
C. mas, foliis chamaedryos. *Bauh. pin.* 464.
C. ladanifera. *Blackw. t.* 197.
C. mas 5. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 69.
C. mas foliis undulatis et criſpis. *Tournef. inſt.* 259. R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 32.
Krauſe Ciſtenroſe. W.
Habitat in Luſitania. ♄ (v. v.)

Ramuli, pedunculi et calyces tenui lana adſperſi. Flores *purpurei.* Calyces *lanceolati.*

*19. CISTUS *formoſus.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis lanceolato-obovatis trinerviis hirtis, pedunculis calycibusque piloſis, petalis emarginatis. W.
Ciſtus formoſus. *Curt. mag.* 264.
Schöne Ciſtenroſe. W.
Habitat in Luſitania. ♄

Petala *flava baſi macula atroſanguinea notata. Planta ceterum ſequenti ſimillima.* W.

20. CISTUS *halimifolius.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis lanceolato-obovatis trinerviis incanis pedunculis calycibusque glabris, petalis ſubretuſis, foliolis duobus calycinis linearibus. W.
C. arboreſcens exſtipulatus, foliolis duobus calycinis linearibus. *Hort. cliff.* 205. *Roy. lugdb.* 475. *Sauv. monſp.* 147. *Mill. dict. n.* 17. *Cavan. ic. rar.* 2. *p.* 31. *t.* 138?

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis lanceolatis incanis, pedunculis virgatis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 38. *
C. femina, portulacae marinae folio latiore obtuſo. *Bauh. pin.* 465.
C. folio halimi 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 71.
C. halimi minoris folio. *Barrel. ic.* 287.
β. C. femina portulacae marinae folio anguſtiore mucronato. *Bauh. pin.* 465.
C. halimi folio 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 71.
γ. Ciſtus fruticoſus erectus, foliis oppoſitis ſeſſilibus utrinque incanis. *Mill. ic. t.* 290.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 32.
Meldenartige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Luſitaniae, Hiſpaniae *maritimis.* ♄ (v. ſ.)
Flores *lutei.*

*21. CISTUS *elongatus.*

C. arboreſcens exſtipulatus: foliis lanceolatis incanis, pedunculo elongato diphyllo, calycibusque racemoſis hirſutis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 38. *
Verlängerte Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Dignoſcitur a reliquis, pedunculis *diphyllis absque tomento, ſubtus modo piloſis, a C. halimifolio*, foliolis *floralibus alternis.* Vahl l. c.

22. CISTUS *libanotis.*

C. arboreſcens exſtipulatus, foliis linearibus revolutis, floribus umbellatis. *Sp. pl.* 739.
C. fruticoſus exſtipulatus, foliis linearibus margine revoluſis, floribus ſubumbellatis, calyce triphyllo. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 17.
C. anguſto libanotidis folio, flore ſingulari. *Barr. ic.* 294.
Ciſtus Ledon anguſtis foliis. *Bauh. pin.* 467.
Ciſtus Ledon, foliis Rorismarini ſubtus incanis. *Bauh. pin.* 467.
Ledon VIII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 80.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 33.
Rosmarinblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. *Loefling.* ♄ (v. ſ.)

Frutex *habitu Roſmarini.* Caulis *nudus, purpuraſcens.* Folia *oppoſita, exſtipulata, ſeſſilia, linearia, ſed utrinque revoluta, laevia, marginibus baſeos hir-*

ſuta, internodiis longiora, ad apices ramorum approximata. Folia floralia ſ. ſuprema breviora, ovata, plana. Pedunculi *terminales, foliis longiores*: Floribus *aliquot luteis.* Calyces *ovati, viſcidi.*

** * Exſtipulati ſuffruticoſi.*

23. CISTUS *umbellatus.*

C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſitis linearibus, floribus umbellatis. *Sp. pl.* 739.
C. foliis linearibus non ſtipulatis, caule florali umbellato lignoſo. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 160. *Dalib. pariſ.* 158.
Ciſtus Ledon foliis thymi. *Bauh. pin.* 467.
Ledon X. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 81.
Houttuyn Lin Pfl. Syſt. 7. *p.* 219.
Doldenblütige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Gallia, Hiſpania. ♄
Umbellae pedunculatae ſunt.

24. CISTUS *Laevipes.*

C. ſuffruticoſus adſcendens exſtipulatus, foliis alternis faſciculatis filiformibus glabris, pedunculis racemoſis. *Amoen acad.* 4. *p.* 475. *Iacq. hort. t.* 158. *Cavan. ic.* 2. *p.* 56. *t.* 173. *
C. ſuffruticoſus procumbens, foliis alternis confertis inaequalibus ſetaceis. *Ger. prov.* 394. *t.* 14.
C. humilis maſſiliotica, camphoratae tenuiſſimis foliis glabris. *Pluk. alm.* 107. *t.* 84. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 220.
Glattſtrunkige Ciſtenroſe. W.
Habitat Monſpelii. ♄ (v. v.)
Ex ſingulis foliorum alis faſciculus foliorum minor. Flores *lutei.*

25. CISTUS *calycinus.*

C. ſuffruticoſus erectus exſtipulatus, foliis linearibus, pedunculis unifloris, calycibus triphyllis. *Mant.* 565.
Ciſtus Fumana variet. A. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 414. *t.* 105.
C. (*ericoides*) exſtipulatus, caule fruticoſo erecto, foliis alternis imbricatis ſemicylindricis brevibus. *Cavan. ic.* 2. *p.* 56. *t.* 172. *
C. humilis ſ. Chamae-Ciſtus ericae folio, luteus et elatior. *Bauh. pin.* 466. *Pluk. alm.* 107. *t.* 83. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 221.

Heidekrautertige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

Fruticulus *pedalis, erectus; ramis oppoſitis, rubeſcentibus.* Folia *oppoſita, linearia, laevia, ſubtus obtuſe carinata: ex axillis foliola conferta.* Pedunculi *terminales, ſolitarii, uniflori, vix foliis longiores.* Calyx *triphyllus, laevis, aequalis.* Corolla *pentapetala, patens, flava, vix margine rubro.* Stamina 16, *breviſſima, lutea, omnia fertilia.* Piſtillum *album.* Stylus *breviſſimus.* Stigma *verrucoſum.*

Obſ. *Similis Fumanae.*

Clariſſ. Desfontaines hunc cum ſequente conjunxit. W.

26. CISTUS *Fumana.*

C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis alternis linearibus margine ſcabris, pedunculis unifloris. *Sp. pl.* 740. *Iacq. auſtr. t.* 252. *Fabric. helmſt. p.* 196. *Scop. carn. n.* 644. *Crantz. auſtr. p.* 102. *Kniph. cent.* 9. *n.* 22. *Hoffm. germ.* 185. *Roth. germ. I.* 228. *II.* 584.

C. foliis duris, linearibus, confertis, petiolis unifloris, calycibus glabris. *Hall. helv. n.* 1032.

C. caule procumbente, foliis alternis. *Fl. ſuec.* 435, 474.

C. minor, brevi vermiculatoque folio Hiſpanicus. *Barr. ic.* 285. *Hall.*

Helianthemum foliis linearibus ſaepius alternis non ſtipulatis, pedunculis unifloris, caule lignoſo. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 18.

C. fruticoſus procumbens, foliis aciformibus nudis, floribus auriculatis. *Sauv. monſp.* 46.

Chamae-Ciſtus 6. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 75.

β. Chamae-Ciſtus, ericae folio, luteus humilior. *Bauh. pin.* 666.

Helianthemum tenuifolium glabrum, per humum ſparſum, luteo flore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 18.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 221.

Dünne Ciſtenroſe. W.

Habitat in Gallia, Gotlandia, Helvetia. ♄ (v. ſ.)

Stamina *circiter* 16. *antherifera et totidem exteriora caſtrata.* Folia *laevia, margine ſpinulis ſcabris aliquot minutiſſimis.*

27. CISTUS *canus.*

C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſi-

tis obovatis villoſis ſubtus tomentoſis, floribus ſubumbellatis. *Sp. pl.* 740. *Iacq. auſt. t.* 277. *Scop. carn. n.* 647. *Allion. pedem. n.* 1664. *t.* 45.
C. exſtipulatus, foliis oppoſitis, incanis nudis. *Crantz auſtr. p.* 100.
C. foliis ovatis ſubtus incanis, aliis nudis; caule procumbente. *Sauv. monſp.* 148.
Chamae Ciſtus foliis myrti minoris incanis. *Bauh. pin.* 466.
Chamae Ciſtus foliis myrti tarentinae canis et cinereis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 18.
Chamae Ciſtus 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 74.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 222.
Graue Ciſtenroſe. W.
Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania. ♄ (v. ſ.)
Folia *ovalia ſ. obovata, obtuſa, ſupra pallide cinera-ſcentia, ſubtus tomentoſo-cana.* Umbella *terminalis, 4-flora.*

*28. CISTUS *ſcabroſus.*
C. ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis ovatis piloſo-ſcabris trinerviis, calycibus triphyllis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 236.
Rauhe Ciſtenroſe. W.
Habitat in Italia, Luſitania. ♄
Caules *decumbentes teretes, pilis brevibus ſtellatis denſe adſperſi ſcabri.* Rami *breves.* Folia *ſubpetiolata trinervia uncialia.* Flores *terminales ſubpaniculati.* Calyx *triphyllus: foliola ovato-lanceolata acuminata, extus pubeſcentia pilis ſtellatis et villo longo aequalia quadrilinearia.* Petala *obovata ſubretuſa, calyce fere duplo longiora, intenſe flava, baſi lutea.* Ait. l. c.

*29. CISTUS *cinereus.*
C. ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis ovatis acutis canis, calycibus obtuſis, racemis paniculatis. W.
C. exſtipulatus ſuffruticoſus, foliis oppoſitis ſubtomentoſis ovato-acutis, floribus racemoſis, racemis ſubternis terminalibus. *Cavan. ic.* 2. *p.* 33. *t.* 141.
Aſchfarbene Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄
Affinis videtur praecedenti, diverſus tamen: foliis *evidenter petiolatis venoſis,* calycinis *foliolis tribus ovatis obtuſis, binis linearibus,* petalis *integerrimis. C. polyanthos huic habitu ſimillimus, ſed eſt ſtipulatus.* W.

*30. CISTUS *ocymoides.*

C. foliis obovatis trinerviis, ramulorum utrinque incanis apice reflexis, calycibus racemoſis pedunculisque glaberrimis. *Vahl. ſymb. 3. p. 68.* *

C. (*ocymoides*) ſubfruticoſus exſtipulatus, foliis petiolatis dorſo carinatis incanis minimis, pedunculis ramoſis umbellato-paniculatis. *Lamarck encycl. 2. p. 18.* *

C. folio ſampſuci Cluſii cui macula in flore. *Bauh. hiſt. 2. p. 6.*

C. folio ſampſuci. *Cluſ. hiſt. 1. p. 72.*

β. ramis laxe villoſis. *Lamarck l. c.*

C. (*ſampſucifolius*) fruticoſus exſtipulatus, foliis ovato-oblongis carinatis ſeſſilibus, pedunculis elongatis ramoſo-paniculatis. *Cavan. ic. 1. p. 65. t. 96.* *

Baſilienkrautartige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Murcia, Baetica. ♄

31. CISTUS *italicus.*

C. ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis hiſpidis: inferioribus ovatis; ſuperioribus lanceolatis, ramis patentibus. *Sp. pl. 740.*

Helianthemum, ſerpilli folio villoſo, flore pallido, italicum. *Barr. rar. 510. t. 366.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 223.

Italiäniſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Italia. ♄

Frutex *Caule erecto, ſpithamaeo: Ramis oppoſitis, longioribus, patentibus, ſubdeflexis, rufis.* Folia *oppoſita, exſtipulata, utrinque adſperſa pilis ſtrigoſis, raris, ſubgeminis et ſubciliata: inferiora petiolata, ovata; ſuperiora ſubſeſſilia.* Racemus *terminalis.* Calyces *hiſpidi.* Corolla *pallida petalis vix emarginatis,* An *varietas C. cani?*

32. CISTUS *marifolius.*

C. ſuffruticoſus exſtipulatus divaricatus, foliis ovatis acutis oppoſitis petiolatis planis ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis. W.

C. ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis oblongis petiolatis planis ſubtus incanis. *Sp. pl. 741. Cavan. ic. 2. p. 34. t. 143.* *

Helianthemum luteum, thymi durioris folio. *Barr. rar. 521. t. 441.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 223.

Marumblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat Maſſiliae, Veronae *inque* Hiſpania. ♄
Variat Foliis lanceolatis ſupra glabris, et ovalibus ſupra ſubpiloſis, ſemper Folia ſubtus denſe tomentoſa et incano-alba.

*33. CISTUS *origanifolius.*
C. ſuffruticoſus exſtipulatus adſcendens, foliis ovatis obtuſis oppoſitis petiolatis planis utrinque piloſis, racemis ſecundis. W.
C. (*origanifolius*) ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis petiolatis ovatis utrinque piloſis. *Lamarck encycl. 2. p. 21. * Cavan. ic. 3. p. 31. t. 262. f. 1.* *
Doſtenblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄
Corollae *flavae vix calyce majores duplo minores, quam in praecedente.* Racemi *ſecundi geminati pedunculati piloſi ut caulis.* Folia *ſeniora utrinque piloſa viridia, juniora albida.* W.

*34. CISTUS *mollis.*
C. ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis ſubrotundo-ovatis obtuſis petiolatis planis utrinque tomentoſis mollibus. W.
C. (*mollis*) ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis oppoſitis ſuborbiculatis valde tomentoſis. *Cavan. ic. 3. p. 32.* *
Weiche Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄
Caules *ſuffruticoſi rubentes diffuſi ſemipedales ramoſi tomentoſi.* Folia *ſuborbiculata oppoſita petiolata mollia tomentoſa, nervis obliteratis.* Stipulae *nullae.* Flores *racemoſi, racemis terminalibus ſolitariis.* Corolla *triplo major quam in praecedenti.* Cavan. l. c.

*35. CISTUS *dichotomus.*
C. ſuffruticoſus exſtipulatus dichotomus, foliis ovatis acutis glabris margine revolutis oppoſitis petiolatis, floribus racemoſis. W.
C. (*dichotomus*) ſuffruticoſus exſtipulatus dichotomus, foliis ovatis oppoſitis glabris, floribus racemoſis. *Cavan. ic. 3. p. 32. t. 263. f. 1.* *
Gabeläſtige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄
Folia *parva facie Thymi Piperellae, breve petiolata glabra margine revoluta.* Racemi *tenues pauciflori.* Flores *ſaturate flavi vix magnitudine Spergulae nodoſae.* W.

36. CISTUS *anglicus.*

C. ſuffruticoſus exſtipulatus procumbens, foliis oppoſitis oblongis revolutis piloſis, floribus racemoſis. *Mant.* 245.

Ciſtus hirſutus. *Hudſ. angl.* 232.

Helianthemum alpinum, folio piloſellae minoris Fuchſii. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 18. *Seguier. ver. p.* 196.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 224.

Engliſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in quibusdam Angliae *locis.* ♄

Caulis *vix ſemipedalis, obliquus, totus ſcaber.* Folia *oppoſita, lanceolata (Hyſſopi), ſcabriuſcula, nec laevia, utrinque viridia.* Flores *racemoſi, albi, nutantes, ſub antheſi erecti.*

*37. CISTUS *vinealis.* W.

C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis petiolatis oblongis obtuſis ſubtus incano-tomentoſis, floribus racemoſis. W.

C. caulibus duris procumbentibus, foliis ellipticis hirſutis, inferne cum calycibus tomentoſis. *Hall. helv. n.* 1035.

Weinbergs Ciſtenroſe. W.

Habitat in Germaniae *vineis, inque* Helvetia. ♄ (v. v.)

Hanc ſpeciem prope Kelme, Rulsdorf et Schmon haud procul Halae Saxonum legi, et pro C. marifolio antea habui, ſed a C. marifolio diverſiſſima foliorum forma, ramis procumbentibus totoque habitu. Linnaeus vero in deſcriptione C. marifolii hunc cum C. marifolio confundere videtur. A C. oelandico abunde diſtinctus foliis ſubtus tomentoſis albis. W.

38. CISTUS *oelandicus.*

C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſitis oblongis utrinque glabris: petiolis ciliatis, petalis emarginatis. *Sp. pl.* 741. *Iacq. auſtr. t.* 399.

C. caulibus duris procumbentibus, foliis conjugatis, ellipticis, ſubhirſutis, petiolis confertis unifloris, calycibus tomentoſis. *Hall. helv. n.* 1034. *Iacq.*

C. ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis oppoſitis oblongis utrinque glabris, petiolis ciliatis, petalis emarginatis. *Gouan. monſp.* 263. *illuſtr. p.* 32.

C. alpeſtris. *Iacq. vind.* 248. *Scop. carn. n.* 645. *t.* 23.

C. (*alpeſtris*) ſuffruticoſus, procumbens, exſtipulatus,

foliis oppoſitis ciliatis, calycibus laevibus. *Crantz auſtr. p.* 103. *t.* 6. *f.* 1.

C. (*Seguieri*) exſtipulatus, foliis caulinis inferioribus ovatis oppoſitis revolutis, ſuperioribus expanſis. *Crantz auſtr. p.* 104.

C. caule procumbente, foliis oblongis utrinque glabris, ſtipulis nullis. *Fl. ſuec.* 434. * 473. *

C. ſuffruticoſus procumbens, foliis nudis oppoſitis viridibus, floribus ſubumbellatis, calycibus hirſutis. *Ger. prov.* 396.

Helianthemum alpinum ſerpillifolio nigricante et hirſuto. *Segu. veron.* 3. *p.* 195. *t.* 6. *f.* 2.

Chamae-Ciſtus II. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 73.

C. helianthemos, flore parvo luteo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 224.

Oelandiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in rupibus Galliae, Oelandiae, Helvetiae, Auſtriae. ♄ (v. ſ.)

Calyx *lineatus pubeſcens.*

*39. CISTUS *alternifolius.*

C. ſuffruticoſus exſtipulatus, foliis alternis, pedunculis lateralibus terminalibusque ſolitariis unifloris. *Vahl ſymb.* 1. *p.* 38.

C. (*braſilienſis*) ſubfruticoſus exſtipulatus, foliis alternis ovato-oblongis villoſis ſeſſilibus, pedunculis unifloris. *Lamarck encycl.* 2. *p.* 22. *

Wechſelblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Braſilia. ♄

Fruticulus *erectus; ramis teretibus villoſis, cortice fuſco.* Folia *alterna exſtipulata ſeſſilia oblonga erecta plana integerrima utrinque villoſa, ſiccitate nigricantia unguicularia.* Pedunculi *verſus apicem ſolitarii, interdum bini vel terni uniflori in axillis foliorum inferiorum ramorum patentes, folio duplo longiores villoſi, apice parum craſſiores, folia duo caduca ad apicem linearia.* Calyces *ovati acuti hirſuti.* Calyx *et* Inflorescentia *C. ſalicifolii at fruticoſus.* Vahl l. c.

*** *Exſtipulati herbacei.*

*40. CISTUS *globularifolius.*

C. exſtipulatus perennis, caule ſimplici ſubnudo, foliis radicalibus petiolatis ſpathulatis obtuſis. *Lamarck encycl.* 3. *p.* 22.

Helianthemum luſitanicum globulariae folio. *Tournef. inſt.* 250.
Kugelblumenartige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Luſitania. ♃

Radix *perennis magna lignoſa multiceps.* Folia *petiolata ſpathulata apice rotundata et obtuſa trinervia pubeſcentia interdum fere glabra.* Caulis 4-ſ. 6-*uncialis ſimplex glabriuſculus* 2 *ſ.* 3 *paribus foliorum diſtantium parvorum et acutorum inſtructus.* Flores *ut in ſequenti.* Lamarck l. c.

41. CISTUS *Tuberaria.*

C. exſtipulatus perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentoſis; caulinis glabris lanceolatis; ſummis alternis. *Sp. pl.* 741. *Cavan. ic.* 1. *p.* 65. *t.* 67. *
C. perennis, foliis humi adpreſſis villoſis; ſummis glabris. *Sauv. monſp.* 149.
C. folio plantaginis. *Bauh. pin.* 465.
Helianthemum Tuberaria. *Mill. dict. n.* 10.
Helianthemum, plantaginis folio, perenne. *Buxb. cent.* 3. *p.* 33. *t.* 63.
Tuberaria noſtras. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 12.
Tuberaria major. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 225.
Stumpfblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Galloprovincia, Hiſpania, Piſis. ♃

*42. CISTUS *plantagineus.* W.

C. herbaceus exſtipulatus, foliis lanceolatis utrinque attenuatis trinerviis hirtis, racemis ebracteatis, petalis denticulatis. W.
Ciſtus ſerratus. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 416. (*excluſo ſynonymo Cavanilliano.*)
C. (*lanceolatus*) ſuffruticoſus, foliis lanceolatis trinerviis piloſis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 62?
Helianthemum creticum annuum lato Plantaginis folio, flore aureo. *Tournef. cor.* 18.
Wegetrittblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Creta et Africa *boreali.* ☉ (v. ſ.)

Caulis *pedalis vel ſesquipedalis pilis longis rectis adſperſus.* Folia *radicalia oblonga acuminata in petiolum attenuata tri-vel quinquenervia utrinque hirta, ſuperne pilis ſimplicibus ſparſis adpreſſis, inferne pilis copioſioribus ſtellatis tecta.* Folia *caulina oppoſita lanceolata utrinque attenuata ſeſſilia trinervia ſes-*

qui vel biuncialia hirta, pilisque ut in foliis radicalibus ſed copioſioribus obſita. Stipulae *nullae niſi in ſummo pare foliorum, quae ſemiunciales lineares hirtae.* Racemi *bini in apice caulis ut videtur ſecundi.* Pedunculi *longiſſimi filiformes.* Bracteae *nullae.* Calyx *pentaphyllus, piloſus, foliolis lanceolatis, binis exterioribus parum brevioribus et obtuſioribus.* Corolla *flava immaculata Helianthemi, petalis denticulatis.* W.

*43. CISTUS *ſerratus.*

C. herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis lanceolatis trinerviis hirtis viſcoſis, radicalibus obovatis, racemis ebracteatis, petalis ſerratis. W.

C. (*ſerratus*) herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis lanceolatis ovatis trinerviis, petalis ſerratis. *Cavan. ic.* 2. *p.* 57. *t.* 175. *f.* 1. *

Geſägte Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania. ⊙

Petala *flava, baſi macula magna nigra notata. A praecedente diſtinctus:* ſtatura *triplo minori*, foliis *obtuſis viſcoſis*, petalis *baſi maculatis. A C. guttato diverſus:* foliis *viſcoſis*, petalis *ſerratis baſi maculatis nec tantum punctatis.* W.

44. CISTUS *guttatus.*

C. herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis oblongis trinerviis hirtis, radicalibus obovatis, racemis ebracteatis, petalis integris. W.

C. herbaceus exſtipulatus, foliis oppoſitis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. *Hudſ. angl.* 204.

C. annuus, foliis radicalibus oppoſitis lanceolatis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. *Sauv. monſp.* 148.

C. foliis oblongo-acuminatis non ſtipulatis, caule florali racemoſo. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 181. *Dalib. pariſ.* 158.

C. flore pallido, punicante macula inſignito. *Bauh. pin.* 465.

Helianthemum guttatum. *Mill. dict. n.* 18.

Helianthemum flore maculoſo. *Col. ecphr.* 2. *p.* 78. *t.* 77.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 226.

Getüpfelte Ciſtenroſe. W.

Habitat in G. Narbonenſi, Italia, Anglia. ⊙ (v. v.)

Caulis *erectus, ut tota planta pilis patentibus.* Folia *ſeſſilia, oppoſitionibus* 3 *ſ.* 4. Racemus *filiformis*

ſaepe ebracteatus; deflorati flores penduli; Flos *et* Fructus *erecti.* Petalorum *baſis macula rubra.* Calyx *foliolis 2 patulis.*

45. CISTUS *canadenſis.*

C. herbaceus exſtipulatus, foliis omnibus alternis lanceolatis, caule adſcendente.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 227.

Canadiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Canada. *Kalm.* ♃

Facies *C. Helianthemi, ſed Folia alterna.*

* * * * *Stipulati herbacei.*

*46. CISTUS *punctatus.* W.

C. herbaceus erectus pubeſcens ſtipulatus, racemo terminali, foliis oppoſitis oblongis, inferioribus obovatis. W.

Punctirte Ciſtenroſe. W.

Habitat - - - - ⊙ (v. ſ.)

Planta *annua digitalis facie C. guttati.* Caulis *erectus ſtrictus ramis erectis oppoſitis ſimplicibus caule brevioribus.* Folia *oppoſita ut omnes partes tenui pube induta, petiolata, inferiora obovata obtuſa, ſuperiora oblonga acutiuſcula.* Stipulae *lineari-lanceolatae.* Racemus *elongatus terminalis.* Pedunculi *uniflori erecti.* Bractea *ovato-lanceolata parva non ad baſin pedunculorum ſed intermedia.* Calycis *foliola bina linearia reliquis minora patula.* W.

47. CISTUS *ledifolius.*

C. herbaceus erectus glaber ſtipulatus, floribus axillaribus, pedunculis erectis calyce brevioribus. W.

C. herbaceus erectus glaber ſtipulatus, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, folio ternato oppoſitis. *Hort. upſ.* 144. *Sauv. monſp.* 178. *Mill. dict. n.* 20. *ſub Helianthemo.*

C. ſtipulis quaternis, foliis oblongis, caule erecto. *Hort. cliff.* 475.

C. ledi folio. *Bauh. pin.* 465.

C. annuus, foliis ledi. *Lob. ic.* 2. *p.* 118.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7 *p.* 227.

Porſtblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Monſpelii. ⊙ (v. v.)

Calyx corolla longior: foliolis 3 erectis, 2 patulis. Capſulae *longitudine calycis.*

48. CISTUS *ſalicifolius.*

C. herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, floribus axillaribus, pedunculis horizontalibus calyce longioribus. W.

C. herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, floribus racemoſis erectis: pedicellis horizontalibus. *Hort. upſ.* 144. *Cavan. ic.* 2. *p.* 35. *t.* 144. *

C. ſtipulis quaternis, foliis ſubovatis ſubtus tomentoſis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 206.

C. folio ſalicis. *Bauh. pin.* 465. *Lob. ic.* 2. *p.* 118.

C. annuus 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 76.

Helianthemum ſalicifolium et fugacium. *Mill. dict. n.* 21. *et* 19.

Helianthemum annuum humile, foliis ovatis, flore fugaci. *Segu. ver.* 3. *p.* 297. *t.* 6. *f.* 3. *opt.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 228.

Weidenblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Luſitania, Hiſpania. ☉ (v. ſ.)

Capſulae *calyce longiores.*

49. CISTUS *niloticus.*

C. herbaceus ſtipulatus erectus, ſubtomentoſus, floribus racemoſis ſolitariis ſeſſilibus oppoſitifoliis. *Mant.* 246.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 229.

Nil Ciſtenroſe. W.

Habitat in Aegypto. ☉ (v. ſ.)

Caulis *ſublignoſus, pedalis, erectus, teres, ſubtomentoſus.* Rami *radicales adſcendentes, breviores; Caulini verſus ſummitatem, alterni, erecti, pauci.* Folia *oppoſita, petiolata, elliptica, patula, ſubtomentoſa, venoſa, articulis longiora.* Stipulae *quaternae, enſiformes, folio dimidio breviores, perſiſtentes.* Racemus *terminalis, erectus, ſtrictus.* Flores *alterni, ſubſeſſiles, ſolitarii, oppoſitifolii folio cum ſtipulis* 2, *caulinis ſimili.* Flos *petalis luteis.* Calyx *pentaphyllus, erectus: foliolis interioribus* 3 *trinerviis, acuminatis; exterioribus* 2 *linearibus, brevioribus, patulis.*

Simillimus Ciſto ledifolio, *ſed multoties major, nec laevis.*

50. CISTUS *aegyptiacus.*

C. herbaceus erectus ſtipulatus, foliis lineari-lanceolatis petiolatis, calycibus inflatis corollis majoribus. *Sp. pl.* 742. *Iacq. obſ.* 3. *p.* 17. *t.* 68. *.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 229.

Aegyptiſche Ciſtenroſe. W.
Habitat in Aegypto. *B. Juſſieus.* ⊙ (v. v.)

Calycis *folia exteriora 2 parva; interiora 3 conniventia in veſicam ovatam inflatam, nec deniſcentia ante maturitatem fructus.* Petala 5, *lanceolata lutea, breviſſima, incluſa.* Stamina 10, *parva.* Calycis *valvulae majores 4-nerviae: nervis elevatis ciliatis.*

* * * * * *Stipulati ſuffruticoſi.*

51. CISTUS *ſquamatus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis obtectis ſquamis orbiculatis. *Sp. pl.* 743. *Loefl. it.* 67. *Cavan ic.* 2. *p.* 32. *t.* 139. *

C. humilis, floribus compactis in verticillos, minoris halimi foliis. *Barr. ic.* 328. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 76. *t.* 64.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 229.

Schuppige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania *collibus aridis.* ♄ (v. ſ.)

Suffrutex Ramis erectiuſculis, inferne tetragonis. Folia *ovali-lanceolata, craſſiuſcula, petiolata, oppoſita aut tria utrinque.* Stipulae *minutiſſimae, racemoſae, marceſcentes, ſeſſiles. Pedunculi teretes, conferti.* Planta *tota obtecta ſquamis orbiculatis, centro depreſſis.*

52. CISTUS *Lippii.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectus, foliis alternis oppoſitisque lanceolatis ſcabris, ſpicis ſecundis. *Mant.* 245. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 39.

C. (*ſtipulatus*) fruticoſus, foliis confertis tomentoſis ovalibus breviter petiolatis, margine revolutis. *Forſk. deſcr.* 100.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 230.

Lippiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Aegypto. ♄ (v. ſ.)

Caulis *erectus, teres, pubeſcens, albicans, bifidus ſ. parce ramoſus.* Rami *infra bifurcaturam caulis, laterales, ſimplices, albi.* Folia *paſſim alterna paſſimque oppoſita, petiolata, elliptico-lanceolata, obtuſiuſcula, ſcabra, patentia, ſubtus caneſcentia.* Stipulae *anguſto-lanceolatae, erectae, longitudine petiolorum.* Racemi *oppoſitifolii, ſecundi, erecti ſ. inclinati.* Flores *ſeſſiles, conferti.* Calyx *ovatus: foliolis alternis, linearibus.* Petala *ovata, flava, vix calyce ma-*

jora. Stamina *ſaepius* 10, *petalis breviora.* Germen *pubeſcens.* Fructus *obtuſi, calyce tecti, in ſpica ſeſſiles, ſecundi, ſubrotundi.*

Planta [illegible] *ramis foliisque utrinque caneſcentibus.* Folia *juniora axillarum revoluta.* Stipulae *ſetaceae.* Calyces *piloſi ſericei.* Vahl l. c.

*53. CISTUS *ſeſſiliflorus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectus, foliis alternis oppoſitisque linearibus canis margine revolutis, ſpicis ſecundis. W.

C. (*ſeſſiliflorus*) fruticoſus ſtipulatus, foliis oppoſitis alternisque linearibus cinereis margine revolutis, racemis ſecundis, capſulis exſertis pubeſcentibus. *Desfont. fl. atlant.* 1. *p.* 427. *t.* 106. *

Aehrenblütige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Africae *borealis collibus aridis prope* Maſcar. ♄

Frutex *pedalis vel bipedalis erectus ramoſiſſimus.* Folia *ſubpetiolata linearia obtuſiuſcula caneſcentia breviſſime tomentoſa, margine ſubtus revoluta, inferiora oppoſita, media et ſuperiora alterna.* Sipulae *parvae lineares.* Flores *ſeſſiles parvi racemoſi ſecundi.* Bracteae *minutae lineari-lanceolatae.* Calyx *pubeſcens.* Corolla *flava calyce paullo longior.* Capſula *ſubrotunda pubeſcens calyce longior.* Desf. l. c.

*54. CISTUS *ellipticus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectus, foliis oppoſitis ellipticis canis margine revolutis, ſpicis ſecundis. W.

C. (*ellipticus*) ſtipulatus cinereus fruticoſus, foliis oppoſitis ellipticis, racemis ſecundis, floribus ſeſſilibus, capſulis exſertis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 418. *t.* 107. *

Elliptiſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Atlante *prope* Mayane Algeriae. ♄

Caulis *fruticoſus ramoſus erectus pedalis vel bipedalis.* Rami *pubeſcentes lanugine breviſſima.* Folia *oppoſita breviter petiolata elliptica margine ſubtus reflexa cinereo-candida, villis breviſſimis denſiſſimis ſtellatis utrinque obtecta.* Stipulae *quaternae parvae lineares.* Flores *racemoſi ſecundi parvi ſeſſiles.* Petala *flava calyce paullo longiora.* Capſula *ſubrotunda pubeſcens exſerta.* Desfont. l. c.

55. CISTUS *ſurrejanus.*

C. ſuffruticoſus procumbens ſtipulatus, foliis ovato-ob-

longis ſubpiloſis, petalis lanceolatis. *Sp. pl.* 743. *Hudſ. angl.* 233.
Helianthemum ſurrejanum. *Mill. dict. n.* 15.
Helianthemum vulgare, petalis florum peranguſtis, *Dill. elth.* 177. *t.* 145 *f.* 174.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 230.
Schmalblumige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Angliae *comitatu* Surrejano *prope* Croydon. ♄
Petalis *anguſtis lanceolatis ab omnibus diſtinctus.* W.

*56. CISTUS *polyanthos.*
C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis inferioribus ſubtus incanis, caulinis utrinque viridibus ciliatis calycibus hiſpidis, racemis paniculatis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 420. *t.* 108. *
Vielblumige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Africae *borealis arenoſis prope* Mascar. ♄
Caules *ſuffruticoſi.* Rami *plures ex eodem caeſpite pedales teretes villoſi tuberculoſo aſperi.* Folia *oppoſita petiolata, inferiora ovata obtuſa minora ſubtus candida tomentoſa, media et ſuperiora ovato-oblonga ſeu lanceolata utrinque viridantia margine ciliata obtuſa, ſubtus venoſa.* Stipulae 4 *petiolatae lineari-lanceolatae obtuſiuſculae petiolo longiores.* Pedunculi *filiformes.* Flores *racemoſi, racemis paniculatis erectis ante floreſcentiam revolutis.* Flores *parvi pedicellati, pedicellis capillaribus.* Bracteae *lineares pedicello breviores.* Calyx *villis albidis mollibus numeroſis patentibus hirſutus.* Corolla *flava calyce longior.* Capſula *parva apice villoſa.* Desf. l. c.

*57. CISTUS *glaucus.*
C. ſuffruticoſus ſtipulatus adſcendens, foliis tomentoſis glaucis margine revolutis, inferioribus ovatis, ſummis lanceolatis, racemis ſecundis. W.
C. (*glaucus*) caule ſuffruticoſo ſtipulato, foliis ovatis glaucis margine revolutis, floribus racemoſis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 31. *t.* 261. *
Meergrüne Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania. ♄
Petala *flava calyce majora ſubrotunda, margine crenulata.* W.

58. CISTUS *nummularius.*
C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis inferioribus orbiculatis,

ſuperioribus ovatis. *Sp. pl.* 743. *Cavan. ic.* 2. *p.* 34. *t.* 142. * *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 423. *

C. humilis ſ. Chamae-Ciſtus nummulariae folio. *Magn. monſ.* 293.

Helianthemum nummularium. *Mill. dict. n* 12.

Helianthemum ad nummulariam accedens. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 20.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 231.

Rundblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat Monſpelii, *inque* Hiſpania *et* Africa *boreali.* ♄

*59. CISTUS *canarienſis.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, foliis oppoſitis alternisque pubeſcentibus glaucis, oblongo-obovatis acutis, racemis ſecundis. W.

C. (*canarienſis*) ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, foliis ſubovatis alternis et oppoſitis, racemis erectis. *Iacq. ic.* 1. *t.* 97. (*ſed foliorum color male expreſſus.*) *Iacq. miſc.* 2. *p.* 339. *

Canariſche Ciſtenroſe. W.

Habitat in Canariis *in* Fuerta ventura. ♄ (v. ſ.)

Pili *parvi ſtellati denſe tegunt utramque paginam foliorum, inde toto planta glauca et folia juniora mollia.* W.

60. CISTUS *ſerpillifolius.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis oblongis, calycibus laevibus. *Sp. pl.* 743. *Sauv. monſp.* 148.

Chamae-Ciſtus repens ſerpillifolia lutea. *Bauh. pin.* 466.

Chamae-Ciſtus ſerpilli folio nigricante et hirſuto, flore aureo odorato. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 17.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 231.

Quendelblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in alpibus Europae *auſtralioris.* ♄

*61. CISTUS *violaceus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus adſcendens, foliis oppoſitis ſubtomentoſis linearibus obtuſis baſi attenuatis margine revolutis, calycibus laevibus. W.

C. (*violaceus*) ſuffruticoſus ſtipulatus foliis oppoſitis linearibus ſubtomentoſis, calycibus laevibus violaceis. *Cavan. ic.* 2. *p.* 38. *t.* 147. *

Violette Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania. ♄

Racemi *longi erecti.* Calyx *laevis violaceo-ruber.* Petala *alba.* W.

*62. CISTUS *linearis.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus adſcendens ſubtomentoſus, foliis linearibus obtuſis petiolatis margine revolutis, calycibus laevibus. W.

C. (*linearis*) ſuffruticoſus ſtipulatus ſubtomentoſus, foliis linearibus, floribus racemoſis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 8. *t.* 216. *

Linienblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania. ♄

Calyx *laevis ſtriatus violaceus.* Petala *alba. Valde affinis praecedenti, differt vero:* Foliis *evidenter petiolatis baſi non attenuatis triplo longioribus uncialibus,* Calycinis *foliolis binis minoribus acutioribus nec obtuſis,* Petalis *obovatis et toto habitu.* W.

*63. CISTUS *laevis.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectus, foliis linearibus ſeſſilibus glabris margine revolutis carinatis, calycibus laevibus. W.

C. (*laevis*) ſuffruticoſus ſtipulatus laevis, foliis linearibus brevibus oppoſitis, margine revoluto. *Cavan. ic.* 2. *p.* 35. *t.* 145. *f.* 1. *

Glatte Ciſtenroſe. W.

Habitat in collibus Hiſpaniae. ♄

Caulis *erectus.* Folia *linearia ſeſſilia glabra, margine revoluta, coſta media inferne protuberante, apice acuta, inferiora conferta breviora, ſuperiora patentiuſcula.* Stipulae *lineares.* Calycis *foliola bina breviora ſubulata.* Corolla *calyce major ſaturate flava.* W.

*64. CISTUS *ſtrictus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectus, foliis canis lineari-ſubulatis margine revolutis, racemis ſecundis, calycibus glabris. W.

C. (*ſtrictus*) ſtipulatus, caule ſuffruticoſo erecto, ramis oppoſitis ſtrictis, foliis ſubulatis canis. *Cavan. ic.* 3. *p.* 32. *t.* 263. *f.* 2. *

Steife Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania *in monte* Palomera. ♄

Caulis *ſuffruticoſus erectus ſemipedalis, ramis pluribus oppoſitis ſtrictis, tomento brevi cano obductis.* Folia *oppoſita ſubſeſſilia anguſtiſſima, limboque ita re-*

voluto ut ſubulata appareant, caneſcentia, apice pilis paucis terminata. Stipulae *ſubulatae ſubrubentes.* Calyx *glaber ſtriatus.* Corolla *alba calyce major.* Cavan. l. c.

65. CISTUS *glutinoſus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis linearibus oppoſitis alternisque, pedunculis villoſis glutinoſis. *Mant.* 246. *Ger. prov.* 394.

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis minimis obovatis, limbo revoluto, pedunculis villoſis glutinoſis, capſulis dehiſcendo patulis. *Cavan. ic.* 2. *p.* 36. *t.* 145. *f.* 2. *

Chamae-Ciſtus incanus, tragorigani folio hiſpanicus. *Barr. rar.* 513. *t.* 415.

Helianthemum thymi folio incano. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 232.

Klebrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Europa *auſtrali.* ♄

Caulis *ſuperne pubeſcenti-viſcidus.* Folia *ſuperiora ſemper alterna magisque villoſa.* Racemus *pauciflorus, villoſo-glutinoſus.* Petala *parva, lutea.*

Petala *calyce minora.* W.

66. CISTUS *thymifolius.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, foliis linearibus oppoſitis breviſſimis congeſtis. *Sp. pl.* 743. *Sauv. monſp.* 148.

Chamae-Ciſtus luteus, thymi folio, oliganthes. *Barr. ic.* 444.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 232.

Thymianblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in G. Narbonenſi, Hiſpania. ♄ (v. ſ.)

67. CISTUS *piloſus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus erectiuſculus, foliis linearibus ſubtus biſulcatis incanis, calycibus laevibus. *Sp. pl.* 744. *Sauv. monſp.* 147. *Mill. dict. n.* 1. *Allion. ped. n.* 1672. *t.* 45. *f.* 1. 2.

C. ſuffruticoſus erectus, foliis majoribus petiolatis revolutis ſubtus incanis, caeteris linearibus. *Ger. prov.* 395.

Chamae Ciſtus foliis thymi incanis. *Bauh. pin.* 466.

Chamae-Ciſtus 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 74.

β. Ciſtus ſtipulis quaternis, foliis lineari-ovalibus incanis, calycibus tomentoſis. *Sauv. monſp.* 148.

Helianthemum flore albo, folio anguſto hirſuto. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 17.

γ. Ciſtus foliis villoſis lanceolatis, axillis folioſis, ſtipulis ſubulatis. *Sauv. monſp.* 148.

Helianthemum ſampſucifolium. *Mill. dict. n.* 7.

Helianthemum ſ. Ciſtus humilis, folio ſampſuci, capitulis valde hirſutis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 20.

δ. Ciſtus foliis minoribus et incanis. *Bauh. pin.* 466. *Ger.*

C. omnino candicans, flore nunc albo nunc pallido. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 16.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 232.

Behaarte Ciſtenroſe. W.

Habitat in Gallia. ♄ (v. ſ.)

Caules *erectiuſculi.* Bracteae *ſolitariae, ad latera pedicellorum. Gouan.* Flores *albi.*

Ad hanc ſpeciem facile omnes ſpecies parvas albo flore, etiam C. appenninum refert Gerard.

*68. CISTUS *lavandulifolius.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis lanceolato-linearibus tomentoſis, calycibus racemoſis tomentoſis ſecundis pendulis. *Vahl. ſymb.* 1. *p.* 39. *

C. (*lavandulaefolius*) ſuffruticoſus erectus ſtipulatus, foliis lanceolatis margine revolutis ſubincanis, racemis incurvis terminalibus, floribus confertis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 25. * *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 417. *

C. (*ſyriacus*) ſuffruticoſus exſtipulatus erectus, foliis lanceolatis ad oras revolutis, floribus racemoſis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 96. *Collect.* 1. *p.* 98. *

C. folio lavandulae Cluſii forte idem cum Helianthemo recto. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 5.

C. folio ſpicae. *Bauh pin.* 465.

C. lavendulae latifoliae facie. *Barrel. ic.* 288.

C. folio lavandulae. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 72.

β. Ciſtus lavandulaefolius. *Iacq. Collect. ſuppl. p.* 115. *t.* 10. *f.* 2 *

Lavendelblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpaniae, Maſſiliae, Tuneti *et* Syriae *collibus aridis.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

69. CISTUS *racemoſus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis linearibus, calycibus racemoſis ſecundis nervoſo-angulatis glabris. *Vahl ſymb.* 1. *p.* 39. *

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis lanceolato-linearibus ſubtus tomentoſis. *Mant.* 76. *Cavan. ic.* 2. *p.* 33. *t.* 140. *

C. lavandulae folio, thyrſoides. *Barr. rar. ic.* 293.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 7. *p.* 233.

Traubige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania. ♄ (v. ſ.)

Caulis *ſtatura Rosmarini, vix tomentoſus.* Folia *linearia ſ. anguſto-lanceolata, ſubtus leviſſime tomentoſa, longiuſcula.* Stipulae *lineares.* Racemi *longiſſimi, terminales, ſecundi.* Calyces *angulati, laeves.*

Differt a C. lavandulifolio: foliis *anguſtioribus brevioribus minus tomentoſis absque mucrone in apice, nec faſciculo foliorum in axillis,* calycibus *minoribus glabris ex nervis elevatis angulatis.* Vahl l. c.

*70. CISTUS *ciliatus.*

C. ſuffruticoſus procumbens ſtipulatus, ramis tomentoſis, foliis anguſto-lanceolatis villoſis, calycibus membranaceis, angulis ciliatis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 421. *t.* 109. *

Gefranzte Ciſtenroſe. W.

Habitat in collibus aridis arenoſis Africae *borealis prope* Caſſam. ♄

Caules *ſuffruticoſi decumbentes baſi ramoſi pedales.* Rami *tomentoſi incani teretes ſimplices.* Folia *oppoſita breviſſime petiolata anguſto-lanceolata, ſuperne hirſuta, ſubtus caneſcentia tomentoſa margine revoluta.* Stipulae 4 *lineares petiolo longiores.* Flores *racemoſi terminales ante floreſcentiam revoluti.* Bracteae *lineari-lanceolatae.* Calyx *anguloſus, angulis elevatis obliquis fuſcis glanduloſis piloſis, foliola* 2 *exteriora minuta linearia.* Corolla *roſea paullo major quam in C. Helianthemo.* Capſula *ſubrotunda calyce tecta.* Desfont. l. c.

*71. CISTUS *anguſtifolius.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus diffuſus, foliis lanceolatis, calycibus hirſutis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 500. *Iacq. hort.* 3. *t.* 53.

Schmalblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat - - - ♄ (v. ſ.)

Folia *oppoſita breviter petiolata lanceolata acutiuſcula aſpera.* Petala *flava ad baſin fulva.* Capſula *ovata hirſuta.* W.

72. CISTUS *Helianthemum.*

C. ſuffruticoſus procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis ſubpiloſis. *Sp. pl.* 744. *Scop. carn. n.* 649. *Pollich. pal. n.* 511. *Hoffm. germ.* 185. *Fl. dan. t.* 101. *Kniph. cent.* 12. *n.* 27. *Roth. germ. I.* 229. *II.* 586.

C. ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 206. *Fl. ſuec.* 433, 472.

C. foliis conjugatis, ellipticis hirſutis, integerrimis, petiolis unifloris ſubhirſutis. *Hall. helv. n.* 1033.

C. ſtipulatus, foliis ſubhirſutis, ellipticis, obtuſe acuminatis. *Crantz. auſtr. p.* 100.

Helianthemum Chamae-Ciſtus. *Mill. dict. n.* 1.

Helianthemum germanicum. *Tabern.* 1062.

Chamae-Ciſtus vulgaris, flore luteo. *Bauh. pin.* 465. *Loeſ. pruſſ* 43. *t.* 8.

Flos ſolis, Panax chironium. *Cam. epit.* 501.

β. Ciſtus grandiflorus. *Scop. carn. n.* 648. *t.* 25. *

γ. flore albo. *Ait. Kew.* 2. *p.* 239.

δ. flore rubro.

C. (*roſeus*) ſuffruticoſus exſtipulatus procumbens, foliis oppoſitis oblongis ad oras revolutis, utrinque ſubinc-nis. *Murr. ſyſt. ed.* 14. *p.* 498. *Iacq. hort.* 3. *t.* 6 *Allion. ped. n.* 1675. *t.* 45. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 234.

Gemeine Ciſtenroſe. W.

Habitat in Europae *paſcuis ſiccis.* ♄ (v. v.)

Petala ſuborbiculata, integerrima, flava, annulo receptaculum ambiente ſaepius fulvo. Racemus *ante floreſcentiam nutans.* Folia *pilis raris adſperſa.*

Variat valde, altitudine caulis, foliis glabris et pubeſcentibus, atque floris colore. W.

*73. CISTUS *mutabilis.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis glabris planis. *Iacq. ic.* 1. *t.* 99. *Miſc.* 2. *p.* 340. *

Veränderliche Ciſtenroſe. W.

Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Differt a praecedente: foliis *planis*, caule *altiore et quod frigore deſtruatur. Variat corollis pallide flavis et roſeis.* W.

*74. CISTUS *foetidus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis hirſutis ſcabris. *Iacq. ic.* 1. *t.* 98. *Miſc.* 2. *p.* 341. *

Stinkende Ciſtenroſe. W.

Habitat - - - - ♄ (v. v.)

Odor totius plantae foetidus Bryoniae. Corolla C. Helianthemi alba. W.

*75. CISTUS *croceus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus pubeſcens, villis breviſſimis ſtellatis, foliis ellipticis obtuſis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 422. *t.* 110. *

Ciſtus humilis. *Cluſ. hiſp.* 151.

Helianthemum induſtrieſcens folio Majoranae incano. *Tournef. inſt.* 249.

Majoranblättrige Ciſtenroſe. W.

Habitat in Hiſpania *et* Atlante *prope* Tlemſen. ♄ (v. ſ.)

Frutex *pedalis.* Rami *plures ex eodem ceſpite ſimplices erecti teretes tomentoſi caneſcentes.* Folia *oppoſita petiolata, inferne caneſcentia, margine revoluta, utrinque pubeſcentia, villis confertiſſimis breviſſimis ſtellatis, inferiora minora ſubrotunda, media elliptica obtuſa, ſuperiora lanceolata acutiuſcula.* Stipulae 4 *ſubulatae petiolo paullo longiores.* Racemi *ante floreſcentiam convoluti.* Bracteae *lanceolatae pubeſcentes longitudine pedicellorum.* Calyx *pubeſcens anguloſus flaveſcens.* Corolla *magnitudine C. Helianthemi crocea.* Desfont. l. c.

Affinis C. glauco, ſed diſtinctus, foliorum *forma,* caule *duro fruteſcente,* petalis *croceis integerrimis.* W.

76. CISTUS *hirtus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis ovatis, calycibus hiſpidis. *Sp. pl.* 744. *Kniph. cent.* 12. *n.* 28. *Cavan. ic.* 2. *p.* 37. *t.* 146. *

C. foliis lanceolato-linearibus integerrimis ſubtus incanis. *Gron. orient.* 196.

C. foliis oblongo-linearibus margine revolutis. *L. Monier. obſ.* 229. *Sauv. monſp.* 148.

Ciſtus Ledon roriſmarini foliis ſubtus incanis. *Bauh. pin.* 467.

Helianthemum, anguſto ſerpilli folio, villoſum, flore aureo, italicum. *Barrel. rar.* 411. *t.* 483.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 235.
Rauhkelchige Ciſtenroſe. W.
Habitat in Hiſpania, Narbona. ♄ (v. ſ.)

77. CISTUS *apenninus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus patulus, foliis lanceolatis hirtis. *Sp. pl.* 744.
Helianthemum germanicum et apenninum. *Mill. dict. n.* 2. *et* 4.
Helianthemum album germanicum. *Tabern. icon.* 1062.
Helianthemum ſaxatile, foliis et caulibus incanis oblongis, floribus albis. *Mentz. pug.* 8. *f.* 3. *Dill. elth.* 170.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 236.
Apenniniſche Ciſtenroſe. W.
Habitat in Apenninis, Italiae *montibus.* ♄

Folia *ſupra viridia hirta, ſubtus incana.* Flores *albi.* Frutex *pedalis ramoſo-patulus.*

78. CISTUS *polifolius.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, foliis oblongo-ovatis incanis, calycibus laevibus, petalis ſerratis. *Sp. pl.* 745. *Hudſ. angl.* 234.
C. humilis alpinus durior, polii noſtratis folio candicante. *Pluk. alm.* 107. *t.* 23. *f.* 6.
Chamae-Ciſtus montanus, polii folio. *Raj. angl.* 4. *p.* 274. *t.* 274. *f.* 2.
Helianthemum montanum, polii folio incano, flore candido. *Dill. elth.* 175. *t.* 145. *f.* 172.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 236.
Poleyblättrige Ciſtenroſe. W.
Habitat in aeſtuario Sabrinae Anglorum *ad* Brentdown. ♄ (v. ſ.)

Flores *albi.*

79. CISTUS *arabicus.*

C. ſuffruticoſus ſtipulatus procumbens, foliis linearibus pedunculorum alternis, ramulorum confertis. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 62. *t.* 85.
C. ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis alternis lanceolatis planis laevibus. *Sp. pl.* 745. *Amoen. acad.* 4. *p.* 275. * *Cent.* 39. *Desf. fl. atl.* 1. *p.* 419.*
Helianthemum creticum linariae folio, flore croceo. *Tournef. cor.* 18.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 237.

Arabiſche Ciſtenroſe. W.
Habitat in Arabia, Creta *et* Africa *boreali.* ♄ (v. ſ.)

Rami *aphylli procumbentes demum adſcendentes, ſaepe pedales teretes glabri tenues.* Ramuli *a baſi usque copioſi pollicares alterni diſtantes patentiſſimi, inferiores ſteriles, ſupremi floriferi ſimpliciſſimi elongati cinerei pubeſcentes.* Folia *in ramulis ſterilibus conferta bilinearia declinata linearia rigidiuſcula avenia obtuſiuſcula, ultima tomento ſubcinerea.* Stipulae *minutae ovatae.* Folia *ramorum floriferorum latiora et longiora pubeſcentia.* Stipulae *lanceolatae.* Racemus *terminalis* 3-*ſ.* 4-*florus ebracteatus.* Pedicelli *diſtantes piloſo-ſubviſcoſi verſus apicem, ſub flore parum craſſiores.* Calyx *piloſus ſubviſcoſus, foliola interiora trinervia, interſtitiis membranaceis, exteriora lanceolata.* Vahl l. c.

Ciſtorum hiſtoria maxime omnium obſcura ob varietatum copiam, illuſtrabitur ſi determinent autoptae in ſingulis:

1. *Caudicem arboreſcentem, fruticuloſum, annuum ſ. perennem.*
2. *Caulem erectum ſ. decumbentem.*
3. *Folia oppoſita ſ. alterna: cum figura eorundem.*
4. *Stipulas binas ſ. nullas.*
5. *Pedunculum uniflorum ſ. multiflorum: nudum ſ. bracteatum.*
6. *Petalorum figuram.*
7. *Capſulas* 5-*loculares ſ.* 3-*valves.*
8. *Calycem aequalem ſ. inaequalem.*

1049. VALLEA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 914.

Cal. 3-ſ. 4-phyllus. *Petala* 4 ſ. 5 trifida. *Stigma* 4-ſ. 5-fidum. *Capſ.* 2-locularis polyſperma.

1. VALLEA *ſtipularis.*

V. ſtipularis. *Lin. ſuppl.* 266. *Mutis amer. v.* 7. *t.* 10.
Herzblättrige Vallea. W.
Habitat in Nova Granada *ſub temperie frigida.* ♄

Arbor *biorgyalis.* Folia *alterna petiolata cordata integerrima ſubtus ſubtomentoſa.* Petioli *foliis brevio-*

res. Stipulae *ſeſſiles reniformes amplexicaules integerrimae majuſculae.* Panicula *trifaria ramorum terminalis.* Flores *ſanguinei.*

Numerus partium fructificationis communiter quaternarius, variat quinario.

*1050. BONNETIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 915.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 5-petala. *Capſ.* 3-locularis 3-valvis polyſperma.

*1. BONNETIA *paluſtris.*

B. paluſtris. *Vahl eclog.* 2. *p.* 42. *
Mahurea paluſtris. *Aubl. guj.* 1. *p.* 558. *t.* 222. *
Stumpfe Bonnetie. W.
Habitat in locis paludoſis Cajennae, Gujanae. ♄

Arbor *quindecimpedalis.* Folia *alterna petiolata elliptica obtuſa integerrima reticulato-venoſa glabra.* Racemus *terminalis.* Pedunculi *ſubgeminati.* Flores *purpurei.* W.

1051. PROCKIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 916. *et* 1609.

Cal. 3-phyllus praeter foliola 2 baſeos. *Cor.* 0. *Bacca* 5-angularis, polyſperma.

1. PROCKIA *Crucis.*

P. foliis cordato-ovatis dentatis, pedunculis terminalibus ſubracemoſis. W.
P. crucis. *Sp. pl.* 745. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 69. *t.* 64. *
Prockia. *Brown.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 34.
Weſtindiſche Prockie. W.
Habitat in inſula St. Crucis. ♄

Frutex *Ramis teretibus.* Folia *alterna, petiolata, ovata, acuminata, ſerrata, glabra.* Stipulae *lineares.* Flores *nonnulli, terminales, alterni, pedicellati: Bracteis linearibus.*

*2. PROCKIA *ſerrata.*

P. foliis oblongo-ovatis ſerratis acuminatis, pedunculis lateralibus aggregatis unifloris.

Lightfootia ſerrata. *Swartz prod.* 83. *Vahl ſymb.* 3 *p.* 69.
Sägeblättrige Prockie. W.
Habitat in inſula Montſerrat. ♄ (v. ſ.)

*3. PROCKIA *theaeformis.*

P. foliis lanceolato-ellipticis ſerratis obtuſiuſculis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis unifloris.
Lightfootia theaeformis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 69. *
Theeförmige Prockie. W.
Habitat in inſula Borboniae. ♄

*4. PROCKIA *integrifolia.*

P. foliis ſubcoriaceis oblongis obovatisque emarginatis ſubintegerrimis, pedunculis ſubaggregatis unifloris.
Lightfootia integrifolia. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 70.*
Ganzblättrige Prockie. W.
Habitat in inſula Mauritii. ♄

Lightfootia Swartzii a Prockia non differt, niſi ſtigmate ſeſſili; nota haud ſufficiens pro charactere generico. W.

1052. CORCHORUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 917.

Cor. 5-petala. *Cal.* 5-phyllus, deciduus. *Capſ.* plurivalvis, loculamentoſa.

1. CORCHORUS *olitorius.*

C. capſulis oblongis ventricoſis, foliorum ſerraturis infimis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 213. *Hort. upſ.* 147. *Gron. orient.* 170. *Mill. dict. n.* 1.
C. foliorum infimis ſerraturis maximis reflexis *Hort. cliff.* 209. *Roy. lugdb.* 498.
C plinii. *Bauh. hiſt.* 317.
Corchorus. *Comm. hort.* 47. *t.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 238. *t.* 54. *f.* 1.
Gemüſeartiger Corchorus. W.
Habitat in Aſia, Africa, America. ⊙ (v. v.)

Caulis *laevis, viridis.* Stipulae *ſimplices baſi rubrae.* Folia *trinervia, ovata dentibus ſetaceis.* Capſulae *fuſiformes,* 5-*loculares, ſulcatae, ſubquinque dentatae ſ. obtuſae.*

2. CORCHORUS *trilocularis.*

C. capſulis trilocularibus trivalvibus triquetris: angulis bifidis ſcabris, foliis oblongis: ſerraturis infimis ſetaceis. *Mant.* 77. *Iacq. hort.* 173. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 63.
C. aeſtuans. *Forsk. deſcr.* 101.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 240.
Dreyfächriger Corchorus. W.
Habitat in Arabia. *Forskaehl.* ⊙ (v. v.)

Caules *laeves, erecti, pedales, teretes, virides.* Stipulae *ſetaceae, parvae.* Folia *alterna, petiolata, lineata, nuda, ſubtus ſcabra, lanceolata, undato-ſerrata dentibus ſetaceis.* Pedunculi *ſuboppoſitifolii, breves, bifidi ſ. biflori.* Calyces *angulati.* Petala *anguſta lutea.* Capſulae *lineares, triquetro-priſmaticae, ſcabrae, angulis linea ſtriatis, apice obtuſae.*

3. CORCHORUS *tridens.*

C. capſulis linearibus teretiuſculis ſcabris, foliorum ſerraturis infimis ſetaceis. *Mant.* 566.
C. americanus, anguſto barbato folio. *Pluk. phyt. t.* 127. *f.* 4. *Burm. ind.* 123. *t.* 37. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 240.
Dreyzähnige Corchorus. W.
Habitat in India.

Caulis *laevis, viridis.* Stipulae *tripartitae, ſetaceae.* Folia *lineata, lanceolata, undato-ſerrata dentibus ſetaceis.* Capſulae *lineares, ſcabrae.* Styli 3, *divaricatiſſimi, bifidi.*

4. CORCHORUS *aeſtuans.*

C. capſulis oblongis trilocularibus trivalvis ſexſulcatis ſexcuſpidatis, foliis cordatis: ſerraturis infimis ſetaceis. *Mant.* 565. *Iacq. hort. t.* 85. *Mill. dict. n.* 2.
C. capſulis oblongis ſexſulcatis ſexcuſpidatis foliis, cordatis infimis ſerraturis ſetaceis. *Loefl. it.* 224. *n.* 112. *β.* *Sp. pl.* 2. *p.* 746.
Alcea cibaria ſ. Corchorus americana, carpini foliis, ſextuplici capſula longiore. *Pluk. phyt.* 127. *f.* 3.
Triumfetta ſubvilloſa, foliis rotundioribus undulatis atque dentatis, proſtremis in ſetas inermes. *Brown. jam.* 232. *t.* 25. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 241.
Heiſser Corchorus. W.
Habitat in America *calidiore.* ♄

Caulis *ſcabriuſculus, purpuraſcens, ramis divaricatis.* Stipulae *ſetaceae.* Folia *trinervia, cordato-ovata: dentibus ſetaceis.* Capſulae *lineares, 6-angulares, angulis compreſſis: paribus approximatis.* Styli 3, *bifidi.* Capſulae *dentes terminales divaricatiſſimi.*

*5. CORCHORUS *acutangulus.*

C. capſulis priſmatico-cuneatis acutangulis tridentatis, foliis ovatis baſi ſubuniſetoſis, petiolis hiſpidis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 104. *

Lyſimachia non pappoſa meliſſophylla maderaſpatenſis. *Pluk. phytog. t.* 44. *f.* 1.

Scharfeckiger Corchorus. W.

Habitat in India *orientali.* ♄ (v. f.)

Caulis *ramoſus ut petioli hiſpidus.* Folia *alterna longe petiolata ovata obtuſa dentata, dente infimo ad unum latus tantum quandoque acuminato ſetaceo, trinervia venoſa ſcabriuſcula.* Stipulae 2 *ſetaceae.* Flores *flavi parvi plerumque geminati axillares.* Capſulae *baſi attenuatae 5-angulares angulis binis acutioribus et magis prominentibus.* W.

*6. CORCHORUS *faſcicularis.*

C. capſulis oblongis ſubſeſſilibus piloſis mucronatis ſubgeminis, foliis lanceolato-oblongis glabris, ſerraturis aequalibus. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 69.

C. (*faſcicularis*) capſulis conoideis lanatis faſciculatis ſubſeſſilibus, foliis oblongo-ellipticis petiolatis baſi muticis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 105. *

Euphraſiae affinis indiana meliſſae turcicae foliis alternis, capſulis pubeſcentibus trifariam junctis. *Pluk. amalth.* 85. *t.* 439. *f.* 6.

Büſchliger Corchorus. W.

Habitat in India *orientali.* ♄

Rami *teretes glabri.* Folia *petiolata oblonga anguſta, utrinque glabra pollicaria obtuſa, ſerraturis infimis non ſetaceis.* Stipulae *ut in congeneribus.* Fructus *gemini vel terni ſubſeſſiles ad latus folii, vix unguiculares, piloſo-cinerei trivalves.* Vahl l. c.

7. CORCHORUS *capſularis.*

C. capſulis ſubrotundis depreſſis rugoſis, foliorum ſerraturis infimis ſetaceis. *Fl. zeyl.* 214. * *Mill. dict. n.* 3. *Kniph. cent.* 4. *n.* 21.

C. foliorum infimis ſerraturis minoribus. *Hort. cliff.* 210. *Roy. lugdb.* 478.

Alcea olitoria ſ. Corchorus americanus, praelongis foliis, capſula ſtriata ſubrotunda brevi. *Pluk. alm.* 18. *t.* 55. *f.* 4.
Gaza ſativa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 212. *t.* 78. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7 *p.* 242.
Rundfrüchtiger Corchorus. W.
Habitat in India. ☉

Calyx *foliolis concavis, incurvatis, extus punctatis, corolla brevioribus.* Petala *emarginata.*

*8. CORCHORUS *ſcandens.*

C. foliis ovatis ſetaceo-ſerratis oppoſitis, caule ramisque flexuoſo-ſcandentibus. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
Kletternder Corchorus. W.
Habitat in Japonia.

Caulis *teres ſcandens ramoſus.* Rami *oppoſiti ſimiles divaricati.* Folia *oppoſita breviſſime petiolata, baſi rotundata ovata acuminata ſerrata ſerraturis ſetigeris, pollicaria.* Flos *in ramulis terminalis ſolitarius flavus.* Thunb. l. c.

*9. CORCHORUS *ſerratus.*

C. foliis oblongis ſerratis cuſpidatis, ramis glabris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
Geſägter Corchorus. W.
Habitat in Japonia.

Caulis *erectus glaber ramoſus.* Rami *teretes purpurei glabri erecti.* Folia *alterna petiolata oblonga ſerrata, ſerraturis magnis apice ſetaceis, cuſpidata, ſupra tenuiſſime villoſo-ſcabra, ſubtus glabra bipollicaria patula.* Thunb. l. c.

10. CORCHORUS *hirſutus.*

C. capſulis ſubrotundis lanatis, foliis ovatis obtuſis tomentoſis aequaliter ſerratis. *Sp. pl.* 747. *Mill. dict. n.* 8. *Iacq. amer.* 165.
C. fruteſcens, foliis ellipticis tomentoſis crenatis, capſulis ovato-oblongis lanuginoſis umbellatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 105 *
C. americanus lanuginoſus, folio chamaedryos, ſiliqua tricapſulari lanuginoſa et ſubaſpera. *Breyn. prod.* 3. *p.* 56.
Guazuma frutex chamaedryfolia, fructu lanuginoſo, major et minor. *Plum. gen.* 36. *ic.* 104.

[redacted]





IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503


2.8
2.5
3.2
2.2
3.6
2.0
1.8


1.1
1.0

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 242.
Zottiger Corchorus. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ.)

*11. CORCHORUS *japonicus.*

C. capſulis rotundis glabris, foliis duplicato-ſerratis. *Thunb. jap.* 227. *
α. flore ſimplici.
Teito vulgo Jamma Buki. *Kaempf. amoen.* 844.
β. flore pleno.
Jamma Buki altera. *Kaempf. amoen.* 845.
Corchorus flore pleno e Japonia. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 245. *t.* 45. *f.* 2.
Japaniſcher Corchorus. W.
Habitat in Japonia *juxta* Nagaſaki. ♄

*12. CORCHORUS *flexuoſus.*

C. foliis duplicato-ſerratis cuſpidatis, caule flexuoſo. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 335.
Geknieter Corchorus. W.
Habitat in Japonia.
Caulis *teres a foliis decurrentibus ſubangulatus flexuoſus glaber erectus bipedalis.* Folia *alterna petiolata oblique cordata ovata cuſpidata duplicato-ſerrata villoſa patula bipollicaria.* Flores *in ramis terminales lutei.* Thunb. l. c.

13. CORCHORUS *hirtus.*

C. capſulis oblongis cauleque piloſis, foliis oblongis aequaliter ſerratis. *Sp. pl.* 747.
C. folio ulmi, major. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 303. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 243.
Rauher Corchorus. W.
Habitat in America *meridionali.*

14. CORCHORUS *ſiliquoſus.*

C. capſulis linearibus compreſſis bivalvibus, foliis lanceolatis aequaliter ſerratis. *Mill. dict. n.* 7. *Kniph. cent.* 4. *n.* 22. *Swartz. obſ.* 219. * *Iacq. hort.* 3. *p.* 34. *t.* 59.
C. folio ulmi minor. *Plum. ſpec.* 7. *ic.* 103. *f.* 1.
C. Coreta. *Amoen. acad.* 5. *p.* 398. *
Corchoro affinis chamaedryos folio, flore ſtamineo, ſeminibus atris quadrangulis duplici ſerie diſpoſitis. *Sloan. jam.* 50. *hiſt.* 1. *p.* 145. *t.* 94. *f.* 1. *Raj. ſuppl.* 516.

Coreta foliis minoribus ovatis crenatis, floribus ſingularibus. *Brown. jam.* 147.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 244.
Schotenbringender Corchorus. W.
Habitat in America *meridionali.* ♃ (v. ſ.)

Caulis *fere fruticoſus, erectus, paniculatus, ſubpubeſcens.* Folia *lanceolata ſ. ovato-oblonga, ſerraturis aequalibus absque dente elongato ad baſin.* Pedunculi *uniflori, lateriflori, absque bracteis.* Germina *hirta.* Siliquae *bivalves, compreſſae.* Flores Vernales *apetali, tetrandri, calyce 4-phyllo.* Autumnales 5-*petali, polyandri, calyce 5-phyllo.*

1053. SEGUIERIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 918.

Cal. 5-phyllus. *Cor.* 0. *Capſ.* 1-ſperma: ala magna terminata, alulisque lateralibus.

1. SEGUIERIA *americana.*
S. americana. *Sp. pl.* 747.
Seguieria aculeata. *Iacq. amer.* 170. *Loefl. it.* 191.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 35.
Americaniſche Seguierie. W.
Habitat in America *meridionali, e. g.* Carthagenae *ad vias.* ♄

Folia *alterna, petiolata, elliptica, emarginata.* Aculei *juxta folium, recurvi.* Flores *racemoſi, albi, foetidi.*

*1054. SWARTZIA.

Rittera. Gen. pl. ed. Schreb. n. 919.

Cal. 4-phyllus. *Petalum* 1 laterale planum. *Legumen* uniloculare bivalve. *Semina* arillata.

*1. SWARTZIA *ſimplicifolia.*
S. foliis ſimplicibus, petalo ſubrotundo ovato calyce majore, polyandra.
Rittera ſimplex. *Vahl. ſymb.* 2. *p.* 60. *
Poſſira (*ſimplex*) foliis ſimplicibus oblongis. *Swartz. prod.* 82.
Einfachblättrige Swartzie. W.
Habitat in inſulis Caribaeis. ♄

*2. SWARTZIA *grandiflora.* †

S. foliis ſimplicibus oblongo-ovatis, pedunculis ſubtrifloris, petalo ſubrotundo reniformi maximo, leguminibus oblongis.

Rittera grandiflora. *Vahl eclog.* 2. *p.* 37. * *Vahl plant. amer. dec.* 1. *t.* 9.

Groſsblütige Swartzie. W.

Habitat in inſula Trinitatis. ♄

Tam multa ſimilia habet haec ſpecies cum S. ſimplicifolia, ut limites infallibiles tradere fere nequeam, ambae autem inter ſe collatae differre videntur. Folia quidem in S. grandiflora anguſtiora magis acuminata et conſiſtentia tenuiora, petioli apex dente obſcuro, nullo modo autem per petiolum decurrente, pedunculi plerumque triflori tantum, petala majora. Sed notae hae omnes nimis levidenſes ſunt pro ſpecie indubitabili ſtabilienda. Characteres certiores forte petendi a petalo et legumine, cum vero in ſpecimine meo S. ſimplicifoliae parum bono, prior et poſterior plane deſideratur, neceſſitas me cogit aliis relinquere ulterius inquirere, num ſpecies diverſae revera ſint, nec ne. Vahl l. c.

*3. SWARTZIA *dodecandra.*

S. foliis ſimplicibus, floribus dodecandris, petalo oblongo longitudine calycis.

Rittera dodecandra. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 60. *t.* 34. *

Zwölffädige Swartzie. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

*4. SWARTZIA *triphylla.*

S. foliis ternatis, petiolis marginatis.

Poſſira triphylla. *Swartz prod.* 82.

Poſſira arboreſcens. *Aubl. guj.* 2. *p.* 934. *t.* 355. *

Rittera. *Schreb. gen. pl. n.* 919.

Dreyblättrige Swartzie. W.

Habitat in Gujana, Cajenna. ♄

*5. SWARTZIA *pinnata.*

S. foliis pinnatis, petiolo communi tereti. W.

Rittera (*pinnata*) foliis pinnatis. *Vahl eclog.* 2. *p.* 38. *

Gefiederte Swartzie. W.

Habitat in inſula Trinitatis. ♄

*6. SWARTZIA *alata.* W.

S. foliis pinnatis, petiolo communi alato. W.

Swartzia. *Schreb. gen. pl. n.* 1227.

Tounatea gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 550. *t.* 218. *
Geflügelte Swartzie. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄

Rittera et Swartzia Schreberi eſt unum genus, hinc ſuaſu Clariſſ. Vahl nomen Swartziae ſervavi, in memoriam amici aeſtumatiſſimi et Botanici holmienſis celeberrimi. W.

DIGYNIA.

1055. PAEONIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 920.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5. *Styli* 0. *Capſ.* polyſpermae.

1. PAEONIA *officinalis.*
P. foliis decompoſitis nudis, foliolis lobatis, lobis lato-lanceolatis, capſulis rectiuſculis tomentoſis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 35. *
P. foliolis oblongis. *Hort. cliff.* 212. *Hort. upſ.* 149. *Mat. med.* 137. *Sauv. monſp.* 307. *Scop. carn. n.* 650. *Regn. bot.*
P. radice glanduloſa, foliis duplicato-pinnatis, pinnis ellipticis et trilobis. *Hall. helv. n.* 1187.
P. femina. *Mill. dict. n.* 2. *Kniph. cent.* 6. *n.* 69. *Knorr. del.* 1. *t. R.* 3. *et. t. R.* 2. *flore pleno.*
P. communis ſ. femina. *Bauh. pin.* 323.
P. femina. *Fuchſ. hiſt.* 202. *Blackw. t.* 65. *Matth.* 915. *Lob. ic.* 682. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 12. *p.* 455. *t.* 1. *f.* 7. 13. 15.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 245.
Gemeine Paeonie. W.
Habitat in nemoribus montium Idae, Helvetiae. ♄ (v. v.)

Flores explicati regulares, ſed aeſtivatione omnino irregulares ſunt.

2. PAEONIA *corallina.*
P. foliis biternatis, foliolis ovatis integris nudis, capſulis recurvatis tomentoſis. *Retz. obſ.* 3. *p.* 34. *
P. (*integra*) foliis biternatis, foliolis integris ovatis, corolla regulari integerrima. *Murr. comment. goett.* 1784. *et* 1785. *p.* 92.
Paeonia officinalis β. *Sp. pl.* 747.

P. folio nigricante ſplendido, quae mas. *Bauh. pin.* 323. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 12. *p.* 454. *t.* 1. *f.* 1.
P. mas. *Lob. ic.* 684. *Blackw. t.* 245.
P. mas flore purpureo. *Besl. eyſt. vern. ord. VI. f.* 10.
Ganzblättrige Paeonie. W.
Habitat in Europa *auſtrali*, Sibiria. ♃ (v. v.)

*3. PAEONIA *albiflora*.
P. foliis biternatis, foliolis ovato-lanceolatis integris nudis, capſulis recurvatis glabris. W.
P. (*albiflora*) foliis ternatis, foliolis lobatis nitentibus, germinibus ternis glabris. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 90. *t.* 84. *
P. lacteo flore, foliis utrinque viridantibus et ſplendentibus. *Amman. ruth.* 77. *n.* 103. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 184.
Weiſse Paeonie. W.
Habitat in Sibiria *transbaicalenſi*. ♃ (v. ſ.)
Folium *biternatum*, *foliolis tribus utrinque lateralibus baſi ſaepius cohaerentibus*. W.

*4. PAEONIA *humilis*.*
P. foliis biternatis, foliolis tripartito-laciniatis ſubtus ſubvilloſis, capſulis erectiuſculis piloſis. *Retz. obſ.* 2. *p.* 35. *
P. tenuis laciniata ſubtus pubeſcens flore purpureo. *Bauh. pin.* 323. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 12. *p.* 455. *t.* 1. *f.* 8.
P. hiſpanica ſemine nata ſive II. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 279.
P. pumila foemina. *Lob. ic.* 683.
Niedrige Paeonie. W.
Habitat in Hiſpania. ♃ (v. v.)
Dignoſcitur, licet P. officinali ſimilis ſit, caule *humiliore*, foliis *ſubtus pubeſcentibus*, capſulis *pubeſcentibus nec villoſis*. W.

5. PAEONIA *anomala*.
P. foliis biternatis, foliolis multipartitis nudis, laciniis lanceolatis, capſulis depreſſis glabris. W.
P. calyce folioſo, capſulis glabris depreſſis. *Mant.* 247.
P. fructibus quinque glabris patentibus. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 184. *t.* 72.
P. (*laciniata*) foliis biternatis, foliolis acute laciniatis, germinibus glabris. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 93. *t.* 85. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 247.
Unregelmäſsige Paeonie. W.
Habitat in omni Sibiria. ♃ (v. v.)
Differt a praecedenti Foliis *anomalis ſ. inaequaliter diviſis*; Calycis *foliolis apice lanceolatis longitudine*

corollae vel ultra; Germinibus *glabris, plerumque quinis.*

*6. PAEONIA *hybrida.*

P. foliis biternatis, foliolis multipartitis nudis, laciniis linearibus, germinibus pubeſcentibus. W.

P. (*hybrida*) foliis ternato-multifidis, laciniis linearibus, germinibus pubeſcentibus. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 94. *t.* 86. *

Baſtard Paeonie. W.

Habitat - - - - ♃

Planta *teſte Clariſſ. Pallas in horto Petropolitano e ſeminibus P. tenuifoliae eadem areola cum P. anomala creſcentis orta, et quae nunquam ſemina perfecta dedit.* W.

7. PAEONIA *tenuifolia.*

P. foliis biternatis, foliolis multipartitis nudis, laciniis lineari-ſubulatis, capſulis tomentoſis. W.

P. foliolis linearibus multipartitis. *Lin. dec.* 9. *t.* 5. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 185. *t.* 73. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 95. *t.* 87. *

P. laciniis foliorum linearibus. *Zinn. goett.* 127.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 248.

Feinblättrige Paeonie. W.

Habitat in Ucrania, Sibiria. ♃ (v. v.)

Folia *in caule plurima, nec tantum* 3 *ſ.* 4. *ut in P. officinali.* Germina 3, *purpuraſcentia, veſtita pilis purpureis, nec albis P. officinalis.*

Fructus 2 *ſ.* 3. *Gmel.*

Piſtilla 3 *in omnibus Paeoniis plerumque vidi.* W.

1056. CURATELLA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 921.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 4. *Styli* 2. *Capſ.* 2-partita: loculis diſpermis.

1. CURATELLA *americana.*

C. americana. *Sp. pl.* 748. *Aubl. guj.* 1. *p.* 579. *t.* 232. *

Curatella. *Loefl. it.* 260. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 36.

Americaniſche Curatelle. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄

Statura Coccolobae. Folia *alterna, ſubſeſſilia, oblonga.*

1057. FOTHERGILLA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 922.

Cal. truncatus, integerrimus. *Cor.* 0. *Germen* bifidum. *Capſ.* 2-locularis. *Sem.* ſolitaria, oſſea.

1. FOTHERGILLA *alnifolia.*

F. alnifolia. *Lin. ſuppl.* 267. *Willd. arb.* 113. *
F. Gardeni. *Syſt. veg.* 13. *p.* 418.
α. foliis obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 241.
β. foliis acutis. *Ait. l. c.*
F. Gardeni. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 100. *Collect.* 1. *p.* 79. *
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 37.
Elſenblättrige F hergille. W.
Habitat in Ca. na. ♄ (v. v.)

Arbuſcula *Foliis fructuque Hamameli ſimilis*, Flore *diverſiſſima. D. Garden.*

Arbor *facie et foliis Betulae Alni.* Folia *alterna petiolata cuneiformia integra apice ſerrata, ſerraturis majoribus paucioribus, ſupra viridia, ſubtus cana, juniora ſubtus albido-tomentoſa.* Flores *ſpicati terminales congeſti, quaſi in capitulum oblongum, albi.* Capſulae *magnae o tae hirſutiſſimae acutae biloculares.* Valvulae *aperiuntur in cuſpides quatuor dum ſemina matura ſunt.* Flores *primo vere e gemmis terminalibus ante folia proveniunt.* Suppl.

*1058. TRICHOCARPUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 923.

Cal. 4-ſ. 5-partitus. *Cor.* 0. *Styl.* 2 bifidi. *Capſ.* ſetoſa 1-locularis, 4-valvis polyſperma.

***1. TRICHOCARPUS** *laurifolia.* W.

Ablania gujanenſis. *Aubl. guj* 1. *p.* 585. *t.* 234. *
Lorbeerblättrige Haarfrucht. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Arbor 50-*pedalis.* Folia *ſparſa coriacea oblonga acuta integerrima venoſa glabra petiolata.* Corymbi *pauciflori ſubdichotomi laterales.* W.

*1059. LACIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 924.

Cal. 0. *Cor.* 0. *Styli* 2. *Capſ.* 1-locularis bivalvis polyſperma.

*1. LACIS *fluviatilis.*

Mourera fluviatilis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 562. *t.* 233.*
Waſſer-Schlitzblatt. W.
Habitat in fluviis Gujanae. ♃

Radix *repens.* Caulis *herbaceus ſimplex aſper.* Folia *alterna ſeſſilia utrinque glabra atro-viridia ampla profunde ſinuata, laciniis pinnatifido-ſinuatis, margine criſpa, venoſa.* Aculeus *ſolitarius carnoſus rigidus in venarum folii axillis.* Racemus *terminalis ſimplex.* Pedunculus *communis ſemiteres.* W.

TRIGYNIA.

*1060. HOMALIUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 925.

Cal. 6-7-partitus. *Cor.* 6-7-petala. *Stamina* 21 per tria aggregata. *Capſ.* unilocularis polyſperma.

*1. HOMALIUM *racemoſum.*

H. foliis ſerratis, racemis axillaribus terminalibusque, floribus pedunculatis. *Swartz. prod.* 86.
Homalium racemoſum. *Jacq. amer.* 170. *t.* 183. *f.* 72.
Traubiges Homalium. W.
Habitat in Martinica, Jamaica. ♄

*2. HOMALIUM *Racoubea.*

H. foliis dentatis coriaceis, racemis terminalibus, floribus ſubſeſſilibus. *Swartz. prod.* 86.
Racoubea gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 590. *t.* 236. *
Aehrenblütiges Homalium. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

Genus *Blackwelliae affine, tamen* petalorum *numero cum laciniis calycinis aequali et* ſtaminibus *per tria aggregatis diſtinctum.* W.

1061. DELPHINIUM.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 924.

Cal. 0. *Petala* 5. *Nectarium* bifidum, poſtice cornutum. *Siliquae* 3 ſ. 1.

* *Unicapſulares.*

1. DELPHINIUM *Conſolida.*

D. nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. *Hort. cliff.* 212. *Fl. ſuec.* 440; 476. *Mat. med.* 138. *Roy. lugdb.* 482. *Dalib. pariſ.* 158. *Crantz. auſtr. p.* 131. *Scop. carn. n.* 651. *Pollich. pal. n.* 512. *Fl. dan.* 683. *Ludw. ect. t.* 54. *Kniph. cent.* 2. *n.* 20. *Blackw. t.* 26. *Knorr. del.* 1. *t. R.* 17. *Hoffm. germ.* 186. *Roth. germ. I.* 230. *II.* 589.

D. uniſiliquum, caule brachiato diffuſo, floribus ſparſis. *Hall. helv. n.* 1203.

D. nectariis acuminatis ſubcurvatis pedunculo longioribus, foliis lineari-pinnatifidis. *Neck. gallob. p.* 233.

Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142. *Tabernaem.* 62.

Conſolida regalis. *Cam. epit.* 521.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 249.

Feld-Ritterſporn. W.

Habitat in agris Europae *reſtibilibus.* ⊙ (v. v.)

Variat *flore pleno.* R.

2. DELPHINIUM *Ajacis.*

E. nectariis monophyllis, caule ſimplici. *Hort. cliff.* 213. *Hort. upſ.* 150. *Roy. lugdb.* 482. *Mill. dict. n.* 2. *Hoffm. germ.* 186.

D. uniſiliquum, caule recto ſpicato. *Hall. helv. n.* 120.

Conſolida regalis hortenſis, flore majore et ſimplici et minore. *Bauh. pin.* 142.

Conſolida regalis flore majore et multiplici. *Bauh. pin.* 142.

Flos regius. *Dod. pempt.* 252.

Delphinium ſativum. *Riv. t.* 123.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 250.

Garten-Ritterſporn. W.

Habitat in Helvetia *ad maceries.* ⊙ (v. v.)

Dic quibus in terris inſcripti nomine Regum
Naſcantur flores, et phyllida ſolus habeto.

Ecce ſuos gemitus foliis inſcripſit et Aia. Virg. eclog.
Variat *flore pleno et ſemipleno. Riv.*

3. DELPHINIUM *aconiti.*

D. nectariis monophyllis antice quadridentatis, capſulis ſolitariis, ramulis unifloris. *Mant.* 77. *Vahl ſymb.* 1. *p.* 40. *t.* 13.
D. orientale annuum, flore ſingulari. *Tournef. cor.* 30.
Aconitum (*monogynum*) unicapſulare nectario unico, caule foliisque multifidis villoſis, flore pallide violaceo. *Forsk. cat. pl. conſt. p.* 27. *n.* 248.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 251.
Eiſenhutartiger Ritterſporn. W.
Habitat in Dardanellis. *Forskaehl.* ⊙

Statura *D. ſegetum ſ. peregrini, corollis Aconiti.* Caulis *pedalis, paniculatus, ramoſus, caneſcens, pubeſcens.* Folia *pedato-multifida, linearia, caneſcentia: ſumma tantum tripartita.* Flores *terminales, ſolitarii, pedunculati, parvi, lividi, intus pupuraſcente virideque varii.* Nectarium exterius, *tubuloſum, reliquis longius, apice obtuſiſſimum, baſi elongatum, ut labium anterius horizontale in medio collocetur.* Nect. interius *baſi utrinque lobo obtuſo amplectitur ſtamina, ſed antice et ſuperius ſpatio ab exteriore prominet dentibus quatuor ſubaequalibus, margine linea purpuraſente inſcriptis: apex hujus intra exteriorem, obtuſiſſimus, craſſiuſculus, recurvatus collo coarctato.* Petala *inferiora* 4, *ovato-lanceolata, aequalia, vireſcentia lateribus purpuraſcentibus.* Stamina *longitudine petalorum purpuraſcentia.* Germen *unicum.* H. U.

* * *Tricapſulares.*

4. DELPHINIUM *ambiguum.*

D. nectariis monophyllis, corollis hexapetalis, capſulis ternis, foliis multipartitis *Sp. pl.* 749. *Mill. dict. n.* 3.
D. elatius, ſimplici flore. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 206.
Conſolida regalis, flore minore. *Bauh. pin.* 142.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 252.
Zweifelhafter Ritterſporn. W.
Habitat in Mauritania. ⊙

Statura *D. Ajacis, ſed magis caneſcens.* Rami *divaricati in caule ſimplici.* Corollae *caeruleae, extus virides.* Nectarium *monophyllum, bifidum lobis acutiuſculis.* Calcar *ſaepe apice bidentatum.* Differt a *D.*

monogynis numero capſularum; a D. trigynis Nectario interiore monophyllo ſ. calcare interiore non bipartito; adeoque Staphiſagriae genere ſeparari nequeunt. Piſtilla *variant in eadem planta* 1, *et* 3, *ut vix conſtans numerus.*

5. DELPHINIUM *peregrinum.*

D. nectariis diphyllis, corollis enneapetalis, foliis multipartitis, obtuſis. *Sp. pl.* 749. *Hort. cliff.* 213. *Mill. dict. n.* 4. *Allion. pedem. n.* 1508. *t.* 25. *f.* 3. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 426. *

D. nectariis diphyllis, floribus ſolitariis, foliis multipartitis: foliolis linearibus acuminatis. *Allion. nic.* 200. *taur.* 71. *

Conſolida regalis latifolia, parvo flore. *Bauh. pin.* 142. *prodr.* 74. *t.* 74. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 466. *ſ.* 12. *t.* 4. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 252.

Fremder Ritterſporn. W.

Habitat in Italia, Sicilia, Melita, Palaeſtina. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *ſimplex: Ramis virgatis, nudis, ſtrictis.* Folia *D. Ajacis facie.* Bracteae *ſubulatae.* Corolla *caerulea, praeter Nectaria et quatuor petala inferiora, habet praeterea Petala* 2 *lateralia ſubrotunda, unguibus longis affixa, quae deflectuntur verſus petala exteriora ſ. infima, et iis incumbunt.* Nectaria *nulla habent labella deflexa.* Capſulae *ternae.*

6. DELPHINIUM *grandiflorum.*

D. nectariis diphyllis: labellis integris, floribus ſubſolitariis, foliis compoſitis lineari-multipartitis. *Sp. pl.* 749. *Mill. dict. n.* 6. *ic. t.* 250. *f.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *t.* 78.

D. nectariis diphyllis labellis integris, floribus ſubſolitariis, foliis compoſitis lineari-multipartitis. *Hort. upſ.* 150. * *Sp. pl. ed.* 2. *p.* 749.

D. luſitanicum glabrum, aconiti folio. *Rolof. hort.* 61. *t.* 3.

D. elatius ſubincanum perenne, floribus amplis azureis. *Amm. ruth.* 175. *Mill. dict. t.* 119.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 253.

Groſsblütiger Ritterſporn. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Capſulae incanae ſunt.

*7. DELPHINIUM *intermedium.*

D. nectariis diphyllis, labellis ovatis bifidis, laciniis ova-

tis, foliis tripartitis, laciniis trifidis inciſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 243.
Delphinium elatum. *Mattuſch. enum. ſtirp. ſileſ. p.* 182.
D. nectariis diphyllis, labellis integris, floribus ſpicatis, foliis palmatis multifidis glabris. *Mill. ic. p.* 79. *t.* 119.
β. Aconitum lycoctonum flore Delphinii II. ſileſiacum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 94.
Aconitum coeruleum hirſutum, flore conſolidae regalis. *Bauh. pin.* 183.
Mittlerer Ritterſporn. W.
Habitat in Sileſiae *montibus.* ♃ (v. v.)
Folia *radicalia quinqueloba, lobis inciſo-dentatis, laciniis oblongis. Varietas* α. *eſt glabra,* β. *vero foliis ſubtus pubeſcentibus.* W.

8. DELPHINIUM *elatum.*
D. nectariis diphyllis, labellis ovatis emarginatis, laciniis breviſſimis inaequalibus, foliis ſubpeltatis tripartitis, laciniis multifidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 244.
D. nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis inciſis, caule recto. *Hort. upſ.* 151. * *Kniph. cent.* 6. *n.* 35.
D. nectariis diphyllis, foliis peltatis multipartitis acutis. *Hort. cliff.* 213.
D. triſiliquum, foliis ſemiquinquelobis, acute ſerratis, petiolis interioribus quaternis, barbatis. *Hall. helv. n.* 1201.
D. perenne, aconiti folio ampliori, floribus caeruleis. *Amm. ruth.* 174. *Hall. goett.* 93. *Gmel. ſib.* 4. *t.* 77.
Aconitum caeruleum glabrum flore conſolidae regalis. *Bauh. pin.* 183.
Aconitum lycoctonum flore Delphinii II. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 95.
Lycoctonum flore Delphinii. *Dod. pempt.* 441.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 254.
Hoher Ritterſporn. W.
Habitat in Sibiria, Helvetia. ♃ (v. v.)
Folia *radicalia profunde quinquepartita, laciniis trifidis inciſis linearibus.* W.

*9. DELPHINIUM *hybridum.*
D. nectariis diphyllis, labellis ovatis bifidis, laciniis breviſſimis inaequalibus, foliis tripartitis, laciniis trifidis linearibus utrinque pubeſcentibus. W.
Delphinium hybridum. *Stephani in litteris.*
Baſtard Ritterſporn. W.

Habitat in Sibiria. (v. ſ.)

Folia *utrinque, ut tota planta, pubeſcentia quinquepartita, laciniis trifidis linearibus.* Folia *caulina tripartita, laciniis anguſtiſſimis, intermedia trifida, lateralibus bifidis. Simillimum praecedenti, ſed totum pubeſcens, et flores duplo minores. An varietas?* W.

*10. DELPHINIUM *exaltatum.*

D. nectariis diphyllis, labellis oblongis bifidis, laciniis lanceolatis aequalibus, foliis tripartitis, laciniis trifidis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 244.

D. nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis trilobis inciſis, caule erecto. *Mill. ic. p.* 167. *t.* 250. *f.* 2.

Americaniſcher Ritterſporn. W.

Habitat in America *boreali.* ♃ (v. ſ.)

Maxime affine D. urceolato, differt vero: foliis *glabris planis,* caule *glabro purpureo.* Ait. l. c.

Folia *tripartita, laciniis trifidis lanceolatis.* W.

*11. DELPHINIUM *urceolatum.*

D. nectariis diphyllis, labellis oblongis bifidis, laciniis lanceolatis aequalibus, foliis pelt . o-concavis tripartitis pubeſcentibus, laciniis trifidis. W.

D. (*urceolatum*) nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis palmatis urceolatis. *Jacq. ic. rar.* 1. *t.* 101. *collect.* 1. *p.* 153.

Hohlblättriger Ritterſporn. W.

Habitat - - - - ♃ (v. ſ.)

Folia *baſi ſuperne concava et ſubtus pubeſcentia, ceterum forma praecedentis.* W.

12. DELPHINIUM *puniceum.*

D. nectariis diphyllis, labellis oblongis bifidis, laciniis lanceolatis aequalibus, germinibus pedunculisque villoſis, foliis tripartitis, laciniis multifidis. W.

D. labellis bipartitis piloſis, nectarii cornu recto, foliis multipartitis, bracteis calycinis nullis. *Lin. ſuppl.* 267.

Delphinium puniceum. *Pall. itin.* 3. *p.* 96.

Rothbrauner Ritterſporn. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

Differt ab omnibus reliquis ſpeciebus fuſco-rubente colore florum ut in Veratro nigro.

In omnibus D. elato ſimillima, ſed differt: Caule, Petiolis *et* Pedunculis *pubeſcentibus;* Petalis *corollae aequalibus,* Corolla *magis regulari quam in D. elato,*

labellis profunde partitis rectis, Cornu *recto laevi longitudine pedicellorum*, Bractea *ſubulata utrinque ad baſin corollae nulla. Primum credidi varietates eſſe, poſtea vero comparatis partibus vidi differentias.*
Bracteas in omnibus floribus h[illegible]*us ſpeciei a me examinatis vidi.* W.

13. DELPHINIUM *Staphiſagria.*
D. nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis: lobis obtuſis. *Mat. med.* 138. *Regn. bot.*
D. nectariis diphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis: lobis obtuſis. *Hort. cliff.* 213. *Hort. upſ.* 150. *Roy. lugdb.* 482. *Sauv. monſp.* 214. *Sp. pl.* 2. *p.* 750. *Mill. dict. n.* 8. *Scopoli. carn. n.* 652.
Staphiſagria. *Bauh. pin.* 324. *Dod. pempt* 366. *Blackw. t.* 265.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 255.
Scharfer Ritterſporn. W.
Habitat in Iſtria, Dalmatia, Calabria, Apulia, Creta, Galloprovincio. ♂ (v. ſ.)
Foliorum *lobi trifidi.* Nectarii *cornu breviſſimum, obtuſum.*
Varietas *foliis albo-venoſis differt* Foliis *inciſis*, 7-*partitis, laciniis acuminatis*; Corollae *calcari non obſoleto, ſed longitudine pedicelli.*

14. DELPHINIUM *pentagynum.*
D. nectariis diphyllis, labellis cuneiformibus inaequalibus bifidis, laciniis cuneatis, foliis multipartitis linearibus, piſtillis quinis. W.
D. piſtillis quinis, foliis multifariam decompoſitis, caule ſuperne pubeſcente, floribus heptapetalis. nectario gemello. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 427. *t.* 111.
D. calcaribus internis bifidis, capſulis quinis, foliis palmato-multifidis glabris. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 262. *
D. luſitanicum glabrum Aconiti folio. *Tournef. inſt.* 426.
Fünfgriffliger Ritterſporn. W.
Habitat inter ſegetes Algeriae *inque* Luſitania. ⊙
Caulis *pedalis vel tripedalis ramoſus erectus laeviter flexuoſus, ſuperne pubeſcens lanugine breviſſima denſa.* Folia *D. Ajacis leviſſime pubeſcentia aut glabra, radicalia circumſcriptione rotunda, longe petiolata, caulina flabelliformia multifariam decompoſita, laciniis linearibus inaequalibus acutis divergentibus.*

Petioli *baſi vaginantes.* Flores *racemoſi ſinguli pedicellati, pedicellis pubeſcentibus erectis, bracteola ſubulata duplo triplove longioribus.* Foliola *bina alterna conformia, infra ſinguli pedicelli apicem.* Calyx *nullus.* Corolla *magnitudine D. Ajacis caerulea.* Germina 5 *rarius* 3 *villoſa.* Styli *et* Capſulae *totidem polyſpermae.* Desfont. l. c.

1062. ACONITUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 928.

Cal. 0. *Petala* 5, ſupremo fornicato. *Nectaria* 2, pedunculata, recurva. *Siliquae* 3 ſ. 5. (†)

* *Corollis flavis vel albis.*

1. ACONITUM *Lycoctonum.*

A. cuculli calcare ſpirali, labio ovato emarginato, corollae galea conica elongata, foliis palmatis pubeſcentibus, laciniis trifidis dentatis. W.

A. foliis palmatis multifidis villoſis. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 188. *t.* 81. *Scop. carn. n.* 653. *Pall. it.* 1. *p.* 72. *Iacq. auſtr. t.* 380. *Blackw. t.* 563. *Kniph. cent.* 5. *n.* 4. *Crantz. auſtr. p.* 131. *n.* 3. *Mattuſch. ſil. n.* 384. *Gunn. norv. n.* 14. *Roth. germ. I.* 231. *II.* 590. *Koelle Aconit.* 23. * *Hoffm. germ.* 188.

A. foliis hirſutis, ſemitrilobis, lobis duplicato-trifidis. *Hall. helv. n.* 1200.

A. foliis peltatis multifidis, petalo ſupremo cylindraceo. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 213. *Fl. ſuec.* 441, 476. *Roy. lugdb.* 482.

A. lycoctonum luteum. *Bauh. pin.* 183.

A. lycoctonum, flore luteo. *Besl. eyſt. aeſt.* 25. *f.* 2.

Napellus flore luteo. *Riv. t.* 487.

Aconitum II. *Cam. epit.* 827.

A. lycoctonum vulgare flore luteo. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 94.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 257.

(†) *Nectarium Aconiti eſt cucullus pedunculatus cujus baſis ſurſum ſpectans eſt calcar, et cujus apex eſt labium. Forma vero cuculli in diverſis ſpeciebus diverſe obſervatur et characteres non ſpernendos ſuppeditat.* W.

Wolfs-Eiſenhut. W.
Habitat in alpibus Galliae, Helvetiae, Sileſiae, Auſtriae, Italiae. ♃ (v. v.)

*2. ACONITUM *japonicum.* †
A. foliis trifido-palmatis, laciniis inciſis obtuſis. *Thunb. jap.* 231.
Japaniſcher Eiſenhut. W.
Habitat in Japonia. ♃

Caulis *teres glaber herbaceus.* Folia *petiolata palmato-trifida, lobi laterales bifidi, medius trifidus, omnes obtuſi inciſo-dentati, dentibus rotundatis cum acumine.* Florum *racemus brevis. Differt ab A. Lycoctono:* foliis *tantum profunde trifidis,* laciniis *inciſis obtuſis rotundato-dentatis.* Thunb. l. c.

3. ACONITUM *pyrenaicum.*
A. cuculli calcare recto obtuſo, labio ſpathulato emarginato, galea conica, foliis digitato-quinquepartitis, laciniis tripartito-dentatis cuneiformibus. W.
A. foliis multipartitis: laciniis linearibus incumbentibus ſquarroſis. *Hort. upſ.* 152. * *Mill. dict. n.* 8. *Pall. it.* 2. *p.* 316. *Koelle Aconit.* 24. *
A. pyrenaicum luteum, foliorum ſegmentis ſibi invicem incumbentibus. *Raj. europ.* 367.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 260.
Pyrenäiſcher Eiſenhut. W.
Habitat in Sibiria, Tataria, Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)
Racemus ante antheſin nutat.

*4. ACONITUM *ochroleucum.* W.
A. cuculli calcare arcuato obtuſo, labio lanceolato emarginato, galea conica elongata, foliis ſubtus pubeſcentibus, palmato-quinquelobis, laciniis tripartitis inciſo-dentatis. W.
Aconitum flore albo. *Stephan. litt.*
Gelbweiſſer Eiſenhut. W.
Habitat in Sibiria *ad* Caucaſum. ♃ (v. ſ.)

Caulis *teres pubeſcens.* Folia *radicalia petiolata ampla ſuperne glabra, ſubtus tenuiſſime pubeſcentia, palmato-quinqueloba, laciniis trifidis inciſo-dentatis, dentibus lanceolatis.* Folia *caulina ſubpeltata parva breve petiolata.* Racemus *terminalis ſimplex, alii racemi pedunculati ex ſupremis foliorum axillis ſolitarii.* Corollae *galea ſeſſilis conica elongata medio an-*

guſtata apice obtuſa, inferne dilatata acuminata. Petala *bina inferiora oblonga obtuſa ciliata.* Cuculli *calcar anguſtum arcuato - uncinatum apice obtuſum, labium lanceolatum rectum obtuſum emarginatum.* Piſtilla *tria.* Flores *ex toto pubeſcentes ochroleuci.* Habitu *A. ſeptentrionali ſimile.* W.

5. ACONITUM *Anthora.*

A. cuculli calcare refracto uncinato, labio adſcendente obcordato, galea conica rotundata, foliis multifidis, laciniis linearibus. W.

A. floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Mat. med. p.* 139. *Mill. dict. n.* 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 190. *Iacq. auſtr. t.* 382. *Scop. carn. n.* 655. *Ludw. ect. t.* 104. *Blackw. t.* 562. *Kniph. cent.* 4. *n.* 1. *bot. Koelle Aconit.* 24. *

A. foliorum laciniis linearibus diſtinctis ubique ejusdem latitudinis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upſ.* 152. *Roy. lugdb.* 483.

A. foliis hirſutis, ſemitrilobis, lobis duplicato - trifidis. *Hall. helv. n.* 1199.

A. ſalutiferum ſ. Anthora. *Bauh. pin.* 184.

Anthora ſ. Antithora. *Cam. epit.* 837. *Riv. t.* 486. *Mill. ic. t.* 12.

Anthora vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 98.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 7. *p.* 266.

Feinblättriger Eiſenhut. W.

Habitat in alpibus Pyrenaeis, Helveticis, Taurinis, Allobrogicis. ♃ (v. v.)

*6. ACONITUM *album.*

A. cuculli calcare uncinato obtuſo, labio breviſſimo reflexo bifido, galea conica late unguiculata, foliis tripartitis, laciniis ovato - cuneiformibus trifidis dentatis. W.

A. (*album*) floribus pentagynis, foliis glabris tripartitis, laciniis acute inciſis, petali ſupremi ungue lateralibus longiore. *Ait. Kew.* 2. *p.* 240.

Aconitum orientale. *Mill. dict.*

A. lycoctonum orientale flore magno albo. *Tourneſ. cor.* 30.

Weiſser Eiſenhut. W.

Habitat in Oriente. ♃ (v. v.)

Habitu *A. variegato haud diſſimile.* W.

** *Corollis coeruleis.*

*7. ACONITUM *ſeptentrionale.*

A. cuculli calcare revoluto, labio ſpathulato ſubemarginato, galea conica elongata, foliis palmatis pubeſcentibus, laciniis trifidis divaricatis dentatis. W.
Aconitum ſeptentrionale. *Koelle Aconit.* 22.
Aconitum Lycoctonum *a.* flore coeruleo. *Lin. ſyſt. veg. ed. R.* 2. *p.* 615. *Stroem. föndm.* 1. *p.* 67. *Gunn. norv. n.* 14. *ß. Gort. ingr.* 84. *Fl. dan. t.* 123. *Fabr. it. nörv.* 119.
A. Lycoctonum floribus pallide purpureis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 189.
Calceolus lapponum ſ. Braſſica rangiferorum. *Scheff. lapp.* 360.
Nördlicher Eiſenhut. W.
Habitat in Norvegia, Suecia, Ruſſia, Sibiria. ♃ (v. ſ.)
Simillimum A. Lycoctono, ſed altius, foliorum *dentes longiores et acutiores*, corollarum *galeae longiores*, nectaria *magis obliqua.* Koelle. l. c.

8. ACONITUM *Napellus.*

A. cuculli calcare recto obtuſo, labio lanceolato adſcendente bifido, galea convexa, foliis nitidis quinquepartitis, laciniis tripartitis inciſis linearibus. W.
A. foliorum laciniis linearibus ſuperne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. ſuec.* 442, 477. *Gron. virg.* 165. *Mat. med.* 138. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 189. *itin.* 1. *p.* 8. *Hoffm. germ.* 187. *Koelle Aconit.* 14. *c. icone.*
A. caule ſimplici, ſpica denſa, petiolis unifloris, caſſidis mucrone brevi. *Hall. helv. n.* 1197.
A. coeruleum ſ. Napellus 1. *Bauh. pin.* 183.
A. lycoctonum VI. Napellus vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 96.
Napellus verus. *Lob. hiſt.* 387.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 258.
Wahrer Eiſenhut. W.
Habitat in alpibus Praegratenſibus, Helvetiae, *inque* Suecia, Sibiria. ♃ (v. ſ.)
Caulis *ſimpliciſſimus firmus, inferne denſe foliosus.* Spica *florum terminalis brevis denſe compacta, ſerius ad baſin ſubracemoſa, ramulis e ſummorum foliorum axillis brevibus paucifloris.* Pedunculi *uniflori.* Galea *humilius fornicata, antrorſum breviter roſtrata, tandem glabra, cum reliquis petalis ſaturatiſſime atroviolacea.* Folia *petiolata digitato - quinquepartita,*

ſegmentis anguſtis lineari-lanceolatis laciniatis, laciniis remote dentatis, dentibus linearibus, ſupra ex nigro ſaturate viridia, ſubtus pallide aquoſe virentia, utrinque nuda laevia nitida. Koelle l. c.

*9. ACONITUM *neomontanum.*

A. cuculli calcare adunco obtuſo, labio lanceolato revoluto bifido, galea convexa, foliis nitidis digitato-quinquepartitis, laciniis lato-lanceolatis breviſſime dentatis, pedunculis glabris. W.

Aconitum neomontanum. *Koelle Aconit.* 16.

A. (*neomontanum*) caule elongato, ſpica racemoſo-ramoſa, galea humili breviter roſtrata, foliis palmato-quinquepartitis, ſegmentis profunde inciſis latioribus. *Hoffm. germ.* 187.

Aconitum Napellus. *Roth. germ. I.* 231. *II.* 591. *Iacq. auſt.* 4. *p.* 42. *t.* 381.

Aconitum. *Act. holm.* 1739. *p.* 41. *t.* 2.

A. purpureum ſeu Napellus 3. *Bauh. pin.* 183. *Rivin. t.* 488.

A. lycoctonum V. neubergenſe. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 96.

Neubergiſcher Eiſenhut. W.

Habitat alpeſtribus ſylvaticis, Carinthiae, Carnioliae, *inque montoſis* Germaniae. ♃ (v. v.)

Caulis *elongatus firmus*, *ſpica florum longa laxa inferne racemoſo-ramoſa, pedunculis unifloris.* Flores *ſaturate violacei, galea humili fornicata antrorſum breviter roſtrata et ipſa tandem glabra.* Folia *in inferiore caule laxius ſparſa petiolata ampla ſubpalmato-quinquepartita, ſegmentis lateſcentibus, profunde inciſo-laciniatis, laciniis lato-lanceolatis dentatis, dentibus brevibus latiuſculis acutis, ſupra ſaturate viridia, ſubtus pallida aquoſe virentia, utrinque nuda laevia nitentia.* Koelle l. c.

*10. ACONITUM *tauricum.*

A. cuculli calcare adunco obtuſo, labio lanceolato revoluto bifido, galea convexa, foliis nitidis digitato-quinquepartitis, laciniis lanceolatis trifido-inciſis, pedunculis pubeſcentibus. W.

A. (*tauricum*) caule ſubſimplici, racemo florum brevi compacto, galea humili breviter roſtrata, antrorſum repando-ſubfornicata, foliis nitentibus quinquepartitis, ſegmentis oblongis latiuſculis laciniatis, laciniis remote inciſo-dentatis. *Wulffen in Iacq. Collect.* 2

p. 112. * *Iacq. ic. rar.* 3. *t.* 492. *Koelle Aconit.* 15. * *Hoffm. germ.* 187.
A. violaceum ſ. Napellus 2. *Bauh. pin.* 183.
A. Napello ſimile, ſed minus, coeruleum, praecocius. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 656.
A. lycoctonum IV. tauricum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 95.
Behaarter Eiſenhut. W.
Habitat in alpeſtribus apricis Taureri Malnizenſis *et* Radſtadienſis, *inque* Hungaria. ♃ (v. v.)
Simillimum praecedenti, differt vero: galea *obtuſiore,* laciniis *foliorum latioribus profundioribus,* pedunculisque *pubeſcentibus. In hortis ramoſius.* W.

*11. ACONITUM *volubile.*
A. cuculli calcare adunco obtuſo, labio obcordato adſcendente, foliis opacis quinquepartitis, laciniis cuneiformibus trifidis dentatis, caule volubili. W.
Aconitum volubile. *Koelle Aconit.* 21. * *Pall. hort. demidof.*
Windender Eiſenhut. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)
Ab omnibus cognitis et a binis praecedentibus affinibus ſatis diſtinctum caule volubili. W.

*12. ACONITUM *cernuum.*
A. cuculli calcare ſubadunco obtuſo, labio lanceolato emarginato, galea convexa, racemo nutante, foliis opacis digitato-quinquepartitis, laciniis trifidis inciſo-dentatis. W.
Aconitum cernuum. *Koelle Aconit.* 17.
A. lycoctonum coma nutante. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 97.
Hängender Eiſenhut. W.
Habitat in alpinis rupeſtribus abruptis Taureri Naſſfeldenſis *et* Radſtadienſis. ♃ (v. ſ.)
Folia *opaca nunquam nitida.* Racemus *non ſemper compoſitus, ante perfectam vero floreſcentiam nutans, deinde vero cernuus.* W.

13. ACONITUM *variegatum.*
A. cuculli calcare adunco obtuſo, labio oblongo emarginato adſcendente, galea conica, foliis nitidis tripartitis, laciniis trifidis cuneiformibus dentatis. W.
A. floribus pentagynis, foliorum laciniis ſemipartitis ſuperne latioribus. *Syſt. veg.* 419. *Koelle Aconit.* 18. * *Hoffm. germ.* 188.

A. foliis multifidis: laciniis ſemipartitis ſuperne latis. *Hort. cliff.* 214. *Hort. upſ.* 151. *Roy. lugdb.* 482. *Sp. pl.* 2. *p.* 750.
A. caeruleum minus ſ. Napellus minor. *Bauh. pin.* 183.
A. caeruleum parvum. *Dod. pempt.* 441. *Dalech. hiſt.* 1743.
A. lycoctonum X. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 97.
Lycoctonum coeruleum parvum facie Napelli. *Lob. hiſt.* 386.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 261.
Bunter Eiſenhut. W.
Habitat in Italiae, Bohemiae, Carnioliae *montibus.* ♃ (v. ſ.)
Racemus *ſubſimplex.* Pedunculi *inferiores longiſſimi.* W.

14. ACONITUM *Cammarum.*
A. cuculli calcare adunco obtuſo, labio lanceolato recto acute emarginato, galea conica elongata, foliis opacis quinquepartitis, laciniis oblongo-cuneiformibus trifidis dentatis. W.
A. floribus ſubpentagynis, foliorum laciniis cuneiformibus inciſis acutis. *Sp. pl.* 751. *Mill. dict. n.* 9. *Koelle Aconit.* 17. * *Iacq. auſt.* 5. *p.* 11. *t.* 424. *Hoffm. germ.* 188. *Roth. germ. II.* 592. *Blackw. t.* 561.
A. caule ramoſo, paniculato, petiolis multifloris, caſſidis mucrone longo. *Hall. helv. n.* 1198.
A. caeruleo-purpureum, flore maximo ſ. Napellus 4. *Bauh. pin.* 183.
A. lycoctonum IX. judenbergenſe. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 97.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 262.
Langhelmiger Eiſenhut. W.
Habitat in Stiria, Taurero. ♃ (v. ſ.)
Corollae *galea mucrone elongato.*
Folia *ſuperiora ſubſeſſilia.* W.

15. ACONITUM *uncinatum.*
A. floribus ſubpentagynis, foliis multilobis, corollarum galea longius extenſa. *Sp. pl.* 750. *Koelle Aconit.* 22.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 264.
Hakenförmiger Eiſenhut. W.
Habitat in Philadelphia. ♃
Folia *triloba ſ. quinqueloba, angulato-dentata, nuda.* Flores *caerulei, ſingulares, apice galeae uncinato, recto et longius, quam ipſe unguis galeae, extenſo.*

Haec americana flore fere A. Cammari, ſed foliis propior A. Napello.

TETRAGYNIA.

1063. WINTERA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 929.

Cal. 3-lobus. *Petala* 6. ſ. 12. *Germina* clavata. *Styli* 0. *Baccae* 4 ſ. 8 obovatae.

1. WINTERA *aromatica.*

W. pedunculis axillaribus aggregatis ſubtrifloris, floribus tetragynis. W.

W. (*aromatica*) pedunculis aggregatis terminalibus. *Forſt. Commentat. goett.* 9. *p.* 34. *t.* 7. *

Drymis (*Winteri*) pedunculis aggregatis terminalibus, piſtillis quatuor. *Lin. ſuppl.* 269. *Forſt. gen. n.* 42. *Forſt. Act. upſ.* 3. *p.* 181. * *Medicinal. obſerv.* 5. *p.* 41. *t.* 1. *Miller faſc.* (*figura pulcherrima.*)

Periclymenum rectum foliis laurinis, cortice aromatico acri. *Act. angl.* 1693. *n.* 204. *p.* 922. *t.* 1.

Gewürzhafte Wintere. W.

Habitat in Freti Magellanici *vallibus ſoli expoſitis.* ♄

Arbor ſempervirens. Ex hac cortex Winteranus Officinarum verus, diverſiſſimus a Canella alba officinali figura, qualitatibus et vi.

2. WINTERA *granadenſis.*

W. pedunculis axillaribus trifloris elongatis, floribus octogynis. W.

Drymis (*granadenſis*) pedunculis axillaribus elongatis trifidis, piſtillis octo. *Lin. ſuppl.* 269.

Dreyblumige Wintere. W.

Habitat in Nova Granada. *Mutis.* ♄

Hanc ſolam varietatem praecedentis a climate calidiori cauſſatam eſſe puto. Rami *longiores.* Folia *oblonga ſubtus magis glauca et fere albida longiora.* Pedunculi *axillares ſolitarii bini ſ. terni filiformes elongati, foliis tamen breviores, ſupra medium trifidi.* Pedicelli *uniflori.* Calyx *praecedentis.* Petala *ut in praecedente ſed 12 magis oblonga, unde flores majores, interiora exterioribus minora.* Stamina *praecedentis.*

Germina 8, *a quo numero flores rarius variant.* Baccae *totidem ac piſtilla.* Semina *ſubbina nitida. Corticis ſapor idem cum praecedente.*

3. WINTERA *axillaris.*

W. pedunculis axillaribus congeſtis unifloris, floribus tetragynis. *Forſt. prod. n.* 229.

Drymis (*axillaris*) pedunculis ternis axillaribus, piſtillo unico. *Lin. ſuppl.* 270. *Forſt. gen. n.* 42. *Forſt. Act. upſ.* 3. *p.* 182. *

Südſee-Wintere. W.

Habitat in Novae Zeelandiae *nemoribus.* ♄

Sapor totius plantae et inprimis corticis acerrimus eſt et pungens. Floret menſe Novembri. Proxima affinitas Micheliis.

Cur Linnaeus junior hanc monogynam fecit, non video. Forſt. l. c.

1064. TETRACERA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 930.

Cal. 5-ſ. 6-phyllus. *Cor.* 4-ſ. 5-petala. *Filamenta* ſuperne dilatata utrinque antherifera. *Capſulae* 4 latere dehiſcentes. *Semen* baſi arillatum.

* *Floribus monogynis.*

1. TETRACERA *ſarmentoſa.*

T. foliis oblongis ſerratis ſcabris, floribus monogynis. *Vahl ſymb.* 3 *p.* 70.

Delima ſarmentoſa. *Sp. pl.* 736. *Fl. zeyl.* 205.* *Amoen. acad.* 1. *p.* 403. *Burm. ind. p.* 122. *t.* 37. *f.* 1.

Frutex indicus ſarmentoſus, foliis hiſpidis rigidis. *Burm. zeyl.* 101.

Piripu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 101. *t.* 54.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 17.

Kletternder Raſpelſtrauch. W.

Habitat in Zeylona. ♄

Calycis *foliola ſaepe* 6. Capſula *ovata attenuata glabra, longitudinaliter altero latere dehiſcens.* Semen 1 *parvum nigrum, arillo denticulato inferne cinctum.* Vahl l. c.

*2. TETRACERA *tomentoſa*. W.

T. foliis ovatis acuminatis dentatis ſuperne glabris ſubtus tomentoſis, floribus monogynis. W.

Tigarea (*dentata*) foliis ovato-oblongis acuminatis, ſubtus tomentoſis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 920. *t.* 351. *

Filziger Raſpelſtrauch. W.

Habitat in ſylvis Gujanae, Cajennae. ♄

*3. TETRACERA *aſpera*. W.

T. foliis ſubrotundis ſubrepandis ſcabris, floribus monogynis. W.

Tigarea (*aſpera*) foliis ſubrotundis undulatis, floribus racemoſis. *Aubl. guj.* 2. *p.* 918. *t.* 350. *

Rhinium. *Schreb. gen. n.* 1545.

Scharfer Raſpelſtrauch. W.

Habitat in ſylvis Gujanae *et* Cajennae. ♄

*4. TETRACERA *Doliocarpus*. W. †

T. foliis oblongis acuminatis apice dentatis, pedunculis axillaribus unifloris, floribus monogynis. W.

Doliocarpus caule ſcandente, foliis ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris. *Roland. Act. holm.* 1756. *p.* 249. *t.* 9. *

Giftiger Raſpelſtrauch. W.

Habitat in Surinamo. ♄

*5. TETRACERA *ſtricta*. W. †

T. foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus terminalibus monogynis, caule ſtricto. W.

Doliocarpus caule ſtricto, foliis deflexis ovato-lanceolatis dentatis, floribus terminalibus. *Roland. Act. holm.* 1756. *p.* 249. *

Aufrechter Raſpelſtrauch. W.

Habitat in Surinamo. ♄

*6. TETRACERA *Calinea*. W.

T. foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis multifloris lateralibus, floribus monogynis. W.

Calinea ſcandens. *Aubl. guj.* 1. *p.* 556. *t.* 221. *

Seitenblütiger Raſpelſtrauch. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*7. TETRACERA *obovata*. W.

T. foliis obovatis integerrimis glabris, pedunculis ſubcorymboſis lateralibus, floribus monogynis. W.

Soramia gujanenſis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 552. *t.* 219. *

Mappia. *Schreb. gen. n.* 1755.

Doldentraubiger Raſpelſtrauch. W.
Habitat in Gujana *ad ripas fluvii* Sinemari. ♄

8. TETRACERA *nitida.

T. foliis lanceolato-oblongis ſcabris integerrimis, floribus monogynis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 70. *
Glänzender Raſpelſtrauch. W.
Habitat in inſula Trinitatis? ♄

** *Floribus ſubtetragynis.*

9. TETRACERA *Euryandra.

T. foliis oblongis obtuſis laevibus integerrimis, floribus trigynis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 71.
Euryandra ſcandens. *Forſt. prod. n.* 228. *Forſt. gen. n.* 41.
Dreygriffliger Raſpelſtrauch. W.
Habitat in Nova Caledonia. ♄
Folia *petiolata ſubtus pallidiora bipollicaria et ultra.* Vahl l. c.

10. TETRACERA *volubilis.*

T. foliis ſcaberrimis ſerratis, floribus tetragynis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 71. *
Tetracera. *Hort. cliff.* 214. * *Mill. dict.*
Petraea floribus ſpicatis, ſcabris lauri foliis. *Amm. hort.* 581.
Fagus americana, ulmi ampliſſimis foliis, capſulis bigemellis. *Pluk. amalt.* 87.
Arbor americana convolvulacea platyphyllos barbadenſibus dicta, foliis ſerratis. *Pluk. alm.* 48. *t.* 146. *f.* 1.?
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 58.
Windender Raſpelſtrauch. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄.

11. TETRACERA *laevis.

T. foliis oblongis laevibus ſubintegerrimis acuminatis, floribus terminalibus. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 71. *
Glatter Raſpelſtrauch. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Folia *petiolata alterna baſi attenuata apice acuminata, ſuperne d[illegible]us nonnullis obſolete ſerrata, bi-ſ. tripollicaria [illegible] utrinque glabra.* Petiolus *breviſſimus.* Ped[illegible] *terminales ſolitarii vel gemini pollicares.* Flores *ſubracemoſi, pedicellis uni-ſ. biſloris.* Calyx *foliolis* 6 *ſubrotundis.* Stylos *tantum* 2 *obſervavi*

ſubulatos. Capſulae *quatuor unguiculares ſubrotundae ventricoſae mucronatae glaberrimae nitidae.* Semen *unicum parvum nigrum nitidum, arillo albido margine denticulato ad medium fere tectum.* Vahl l. c.

*12. TETRACERA *alnifolia.* W.
T. foliis oblongis acutis ſubintegerrimis ſubtus ſcabriuſculis: panicula terminali. W.
Elſenblättriger Raſpelſtrauch. W.
Habitat in Guinea. ♄ (v. ſ.)

Rami *teretes glabri.* Folia *alterna petiolata coriacea oblonga baſi attenuata apice rotundata acuta, margine plerumque integerrima interdum ad apicem dente uno alterove obſoleto inſtructa, venoſa, venulis parallelo-reticulatis, ſuperne nitida glabra inferne ſcabriuſcula.* Calyx *tetraphyllus.* Corolla *videtur pentapetala.* Filamenta *apice parum dilatata.* Antherae *in utroque latere.* Capſulae 4 *monoſpermae.* Semen 1 *nigrum arillo albido ex toto tectum.* Panicula *ſimplex terminalis.* Pedunculi *triflori.* W.

Aſſa indica Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 4. *p.* 40. *t.* 26. *f.* 1. *videtur hujus generis ſpecies.* W.

1065. CARYOCAR.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 931.

Cal. 5-partitus. *Pet.* 5. *Styli* ſaepius 4. *Drupa* nucleis 4 ſulcis reticulatis.

1. CARYOCAR *nuciferum.*
C. foliis ternatis. W.
C. nuciferum. *Mant.* 247.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 60.
Nuſstragender Caryocar. W.
Habitat in Berbices *et* Eſſequebo. ♄

Arbor *procera.* Folia *ternata.*

Calyx Corolla*que purpurea.* Drupa *magnitudine capitis.* Nuclei *eſculenti amygdali ſaporis. Allamand.*

*2. CARYOCAR *butyroſum.* W. †
C. foliis quinatis utrinque glabris. W.
Pekea (*butyroſa*) fructu laevi, foliis digitatis utrinque glabris. *Aubl. guj.* 1. *p.* 594. *t.* 238. *
Rhizobolus. *Schreb. gen. n.* 932.
Caſtanea peruviana. *Cluſ. exot.* 129.

Glatter Caryocar. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

*3. CARYOCAR *tomentoſum.* W. †
C. foliis quinatis ſubtus tomentoſis. W.
Pekea (*tuberculoſa*) foliis digitatis ſubtus tomentoſis. *Aubl. guj.* 1. 597. *t.* 239.
Filziger Caryocar. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄

Totum Pekeae genus huc pertinere videtur, forte etiam Saouari Aubletii. W.

*1066. WAHLBOMIA.

Thunb. Act. holm. 1790.

Cal. 4-phyllus. *Corolla* 4-petala. *Fructus* oblongus. *Styli* perſiſtentes.

*1. WAHLBOMIA *indica.*
W. indica. *Thunb. Act. holm.* 1790. *p.* 203. *t.* 9. *
Indiſche Wahlbomie. W.
Habitat in Java. ♄

Rami *alterni teretiuſculi cinereo-villoſi erecto patuli.* Folia *alterna petiolata elliptico-ovata acuminata, inferne integra, ſuperne ſerrata, ſupra viridia, ſubtus pallidiora, parum villoſa patentia digitalia.* Petioli *breves vix unguiculares.* Flores *in ramulis terminales ſubumbellati.* Umbella *ſimplex et compoſita ſubquadriflora.* Petioli *et* Pedicelli *filiformes villoſi patuli.* Thunb. l. c.

Tetraceris affinis et vix ſeparanda, auctoritate tantum Illuſt. Thunbergii diſtinxi, qui fructum mihi ignotum forte examinavit. W.

1067. CIMICIFUGA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 933.

Cal. 4-phyllus. *Cor.* nectariis 4, urceolatis. *Capſ.* 4. *Sem.* ſquamoſa.

1. CIMICIFUGA *foetida.*
C. foetida. *Syſt. nat. ed.* 12. *p.* 659.

Actaea (*Cimicifuga*) racemis paniculatis, fructibus quadricapſularibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 722. *Amoen. acad.* 2. *p.* 54. *Amoen. acad.* 7. *t.* 6. *f.* 2. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 181. *t.* 70.
Thalictroides foetidiſſimum, criſtophorianae facie. *Amm. ruth.* 102.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 265.
Stinkendes Wanzenkraut. W.
Habitat in Sibiria, ♃
Simillima *Actaeae racemoſae.* Variat *omnium maxime numero* Calycis, Corollae, Piſtillorum, *ut neque ſexus conſtans ſit, neque proportio.*

P E N T A G Y N I A.

1068. A Q U I L E G I A.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 934.

Cal. 0. *Petala* 5. *Nectaria* 5, corniculata, inter petala. *Capſ.* 5, diſtinctae.

1. AQUILEGIA *viſcoſa.*
A. nectariis incurvis: caule ſubnudo ſubunifloro viſcoſo-piloſo, foliis ſubtrilobis. *Mant.* 77. *Gouan. monſp.* 267. *
A. caule ſubnudo ſubunifloro, foliis ternatis, foliolis petiolatis ſubtrilobis. *Gouan. illuſtr.* 33. *t.* 19. R.
A. montana flore parvo Thalictri folio. *Bauh. prodr.* 75. *pin.* 144. *huc pertinet monente De la Cheval in Act. Helv. VIII. p.* 146. *t.* 5. R.
A. viſcoſa. *Magn. monſp.* 24. *hort.* 21.
A. hirſuta, flore viſcoſo. *Tournef. inſt.* 428.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 267.
Klebrige Akeley. W.
Habitat Monſpelii, *nec alibi etiamnum obſervata.* ♃ (v. ſ.)
Planta *tota pilis glandulosis, ſeſquipalmaris.* Folia *radicalia tripartita, laciniis trilobis;* caulina 1 ſ 2 *ternata: foliolis lanceolatis.* (Nectaria *incurva. Gouan.* R.)

2. AQUILEGIA *vulgaris.*
A. nectariis incurvis. *Hort. upſ.* 152. *Mat. med.* 159.

Fl. ſuec. 2. *n.* 478. *Crantz. auſtr. p.* 130. *Scop. carn. n.* 656. *Pollich. pal. n.* 513. *Fl. dan. t.* 695. *Ludw. ect. t.* 181. *Blackw. t.* 409. *Kniph. cent.* 5. *n.* 15. *Knorr. del.* 1. *tab. A.* *Hoffm. germ.* 188. *Roth. germ.* I. 231. II. 592.

Aquilegia. *Hort. cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 482. *Dalib. pariſ.* 160.

A. foliis trilobatis, lobis petiolatis tripartitis, ſubrotundis, obtuſe dentatis. *Hall. helv. n.* 1195.

A. perigoniis et piſtillis pubeſcentibus, nectariis incurvis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 145.

A. (*ſylveſtris*) foliis compoſitis alternis ternatis: nectario incurvo. *Neck. gallob. p.* 234.

A. ſylveſtris. *Bauh. pin.* 144.

β. hortenſis ſimplex. *Bauh pin* 144.

γ. A. hortenſis multiplex, flore magno. *C. B.* 144.

δ. A. hortenſis multiplex, flore inverſo. *C. B.* 144.

ε. A. flore roſeo multiplici. *C. B.* 144.

ζ A. degener vireſcens. *Bauh. pin.* 144.

η. A. *vulgaris ſpecioſa*, nectariis coeruleis apice luteis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 247.

A. (*bicolor*) perigoniis et piſtillis glabris, nectariis incurvis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 146.

ϑ. A. *vulgaris daurica*, foliis ſubtus pubeſcentibus, flore minori. W.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 268.

Gemeine Akeley. W.

Habitat in Europae *nemoribus ſaxoſis*, η. *et* ϑ. *in* Sibiria. ♃ (v. v.)

Sibirica *varietas* η. *conſtans, humilior, coerulea nectariorum oris albis.* Viſcoſa *monſpelienſis e ſeminibus Gouani enatis nil ab A. vulgari differebat. Syſt. Veg. p.* 420.

3. AQUILEGIA *alpina.*

A. nectariis rectis petalo lanceolato brevioribus. *Mill. dict. n.* 2. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 185.

A. foliis trilobatis, lobis tripartitis linearibus, caule paucifloro. *Hall. helv. n.* 1196.

A. (*alpina*) perigoniis et piſtillis pubeſcentibus, nectariis fere rectis. *Ehrh. Beitr.* 7. *p.* 146.

A. montana, magno flore. *Bauh. pin.* 144. *prodr.* 75. *Burſ. VII.* 108. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 484. *Raj. hiſt.* 707.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 269.

Alpen-Akeley. W.
Habitat in Helvetia. ♂ (v. ſ.)

Folia *duplicato-ternata, parva: foliolis multifidis: lobis ſublinearibus, obtuſis, facie et teneritudine ſequentis. Nectarii cornicula erectiuſcula, brevia, petalis dimidio breviora. Petala lanceolata, longiſſima.*

Nectaria *curva eſſe, ut in A. vulgari, et* Foliorum *lacinias lineares, nec rotundas; habitare in* Helvetiae *dictione Aquilegienſi. Haller.*

An de A. viſcoſa *loquitur Hallerus?* R.

4. AQUILEGIA *canadenſis.*

A. nectariis rectis, ſtaminibus corolla longioribus. *Hort. upſ.* 153. *Mill. dict. n.* 3. *et ic. t.* 47. *Kniph. cent.* 11. *n.* 8.

A. corolla ſimplici, nectariis fere rectis. *Gron. virg.* 59.

A. pumila praecox canadenſis. *Corn. canad.* 60. *t.* 60. *Lob. ic.* 96.

A. praecox canadenſis, flore externe rubicundo: medio luteo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 457. *ſ.* 12. *t.* 2. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 270.
Canadiſche Akeley. W.
Habitat in Virginia, Canada, Dauria. *Pall. itin.* 3. *p.* 330. ♃ (v. v.)

*5. AQUILEGIA *viridiflora.*

A. nectariis rectis, apice incraſſato ſubinflexo, ſtaminibus corollam ſubaequantibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 248. *Pall. Act. petrop.* 1779. *p.* 260. *t.* 11. *

A. nectariis rectis conniventibus, petalo lanceolato aequalibus. *Murr. comment. goett.* 1780. *p.* 8. *t.* 2. * *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 102. *Collect.* 1. *p.* 35. *

A. nectariis rectis petalo rugoſo longioribus. *Retz. obſ.* 3. *p.* 34. *

β. nectariis coeruleſcentibus. W.
Grünblütige Akeley. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)

1069. NIGELLA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 935.

Cal. 0. *Petala* 5. *Nectar.* 5, trifida, intra corollam. *Capſ.* 5, convexae.

* *Pentagynae.*

1. NIGELLA *damaſcena.*
N. floribus involucro folioſo cinctis. *Hort. cliff.* 215. *Hort. upſ.* 153. *Roy. lugdb.* 481. *Mill. dict. n.* 2. *et ic. t.* 187. *f.* 2. *Blackw. t.* 558. *Kniph. cent* 10. *n.* 66. *Curt. mag.* 22. *Hoffm. germ.* 188. *Roth. germ. I.* 231. *II.* 593.
N. flore foliis nidulato. *Crantz. auſtr. p.* 133.
N. anguſtifolia, flore majore ſimplici caeruleo. *Bauh. pin.* 145.
Melanthium ſylveſtre. *Matth. dioſc.* 529.
β. Nigella flore majore pleno caeruleo. *Bauh. pin.* 145. *Knorr. del.* 1. *t. S.* 21.
γ. Nigella caule humiliore, pedunculo brevi, petalis albis minoribus. W.
Nigella coarctata. *Hortulan.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 271.
Garten-Nigelle. W.
Habitat inter ſegetes Europae *auſtralis.* ⊙ (v. v.)
Involucrum *approximatum flori*, 5-*phyllum*, *flore longius.* Corolla *ſaepius multiplicata.*

2. NIGELLA *ſativa.*
N. piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis. *Hort. upſ.* 154. *Mat. med.* 139. *Boehm. lipſ.* 173. *Mill. dict. n.* 5. *et. ic. t.* 187. *f.* 1. *Ludw. ect. t.* 80. *Kniph. cent.* 7. *n.* 63. *Hoffm. germ.* 189. *Roth. germ. I.* 232. *II.* 594.
N. flore minore ſimplici candido. *Bauh. pin.* 145.
Melanthium ſativum. *Cam. epit.* 551.
Nigella flore minore pleno et albo. *Bauh. pin.* 146.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 272.
Gemeine Nigelle. W.
Habitat in Germania, Aegypto, Creta. ⊙ (v. v.)

2. NIGELLA *arvenſis.*
E. piſtillis quinis, petalis integris, capſulis turbinatis. *Sp. pl.* 753. *Scop. carn. n.* 657. *Pollich. pal. n.* 514. *Hoffm. germ.* 189. *Roth. germ. I.* 232. *II.* 574.

N. flore foliis nudo, piſtillis corollam aequantibus. *Hort. cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 481. *Dalib. pariſ.* 160. *Boehm. lipſ.* 174.
N. flore nudo, ſiliquarum cornubus longiſſimis. *Hall. helv. n.* 1194.
N. flore foliis nudo. *Crantz. auſtr. p.* 132. *n.* 1.
N. arvenſis cornuta. *Bauh. pin.* 145.
Melanthium ſylveſtre alterum. *Cam. epit.* 553.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 6. *p.* 274.
Acker-Nigelle. W.
Habitat in Germaniae, Galliae, Italiae *agris.* ⊙ (v. v.)
Hujus Capſula inferne anguſtior, praecedentis inferne ventricoſior, ſuperne utraque contra.
Styli *et* Germina *quinque, ſex, ſeptem. Pollich. l. c.* R.

** * Decagynae.*

4. NIGELLA *hiſpanica.*
N. piſtillis denis corollam aequantibus. *Hort. upſ.* 154. *Sauv. monſp.* 253. *Mill. dict. n.* 6. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 430. *t.* 112. *
N. latifolia, flore majore ſimplici coeruleo. *Bauh. pin.* 145. *prodr.* 75. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 516. *ſ.* 12. *t.* 18. *f.* 8.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 275.
Spaniſche Nigelle. W.
Habitat in Hiſpania, Monſpelii. ⊙ (v. v.)

5. NIGELLA *orientalis.*
N. piſtillis denis corolla longioribus. *Hort. cliff.* 215. * *Hort. upſ.* 153. *Roy. lugdb.* 481. *Mill. dict. n.* 7.
N. chalepenſis lutea, corniculis longioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 516. *ſ.* 12. *t.* 18. *f.* 10. *Raj. app.* 525.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 275.
Orientaliſche Nigelle. W.
Habitat circum Alepum. ⊙ (v. v.)

1070. REAUMURIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 936.

Cal. 5-phyllus. *Pet.* 5. *Capſ.* 5-locularis, 5-valvis, polyſperma. *Sem.* lanata.

1. REAUMURIA *vermiculata.*
R. foliis ſubulatis ſemiteretibus. W.
R. vermiculata. *Sp. pl.* 754. *Forsk. deſcr.* 101. * *La-*

marck. illuſt. gen. t. 489. *f.* 1. *Desfont. fl. atlant.* 1. *p.* 431. *

Sedum ſiculum vermiculatum, flore ſaxifragae albae, ſemine villoſo. *Bocc. ſicc. t.* 6. *f.* 7. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 481. *ſ.* 12. *t.* 9. *f.* 6.

Sedum minus arboreſcens vermiculatum. *Lob. ic.* 380.

Sedum minus fruticoſum. *Bauh. pin.* 284.

Kali vermiculatum, albo et amplo ſedi roſei flore. *Barr. ic.* 888.

Kali arabicum primum genus. *Rauw. it.* 37. *t.* 37. *Bauh. pin.* 289.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 276.

Pfriemförmige Reaumürie. W.

Habitat in Aegypti, Syriae, Siciliae *litoribus. De Roque.* ⊙

Statura *Salſolae ſ. Tamariſci.* Folia *ſparſa, linearia, carnoſa, ſubtus convexa, acuta, ſeſſilia, patentia, punctis roridis adſperſa.* Flores *terminales, ſeſſiles inter folia, verſus apicem majora.* Corollae *albae: Lamina ciliata, lateribus petalorum utrinque adnexa, conſtituit nectarium.* Flores *inferi ſunt.*

Capſula 1-*locularis*, 5-*valvis. Forskaehl. l. c.*

*2. REAUMURIA *hypericoides.* W. †

R. foliis ellipticis planis. W.

Reaumuria. *Lamarck. illuſt. gen. t.* 489. *f.* 2.

Hypericum (*alternifolium*) floribus pentagynis, calycibus foliaceis, caule herbaceo, foliis alternis ovatis acutis. *Billard. pl. ſyriac. dec.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *

Johanniskrautartige Reaumürie. W.

Habitat in aridis juxta Syriae *deſertum.* ♃

Neque nectaria neque ſemina lanata in deſcriptione indicavit Clariſſ. Billardiere, tamen habitus idem cum Reaumuria vermiculata. W.

Affinitas huic generi eſt maxima cum Hypericis, et ab hoc nectarii praeſentia, ſeminibusque lanatis differre videtur. W.

P O L Y G Y N I A.

1071. D I L L E N I A.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 939.

Cal. 5 - phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* polyſpermae, connatae, pulpa repletae.

*1. DILLENIA *ſcandens.*

D. foliis lanceolatis integerrimis mucronatis caule ſcandente. W.

Dillenia humilis. *Donn cat. hort. cantab.* 64.

Rankende Dillenie. W.

Habitat in Nova Hollandia. ♄ (v. ſ.)

Frutex *quadripedalis ſcandens, ramis teretiuſculis, junioribus pubeſcentibus.* Folia *alterna petiolata biuncialia et ultra lanceolata utrinque attenuata, integerrima, apice mucronata, venoſa, ſuperne glabra, ſubtus pilis ſparſis tecta.* Flores *ſubſeſſiles ſolitarii terminales magnitudine fere Magnoliae glaucae.* Calycis *foliola ovato - lanceolata magna ſericeo - villoſa.* W.

*2. DILLENIA *integra.*

D. foliis oblongo - obovatis obtuſis ſubſerrulatis obtuſis, pedunculis unifloris. W.

D. (*integra*) foliis obovatis obtuſis ſubintegris, pedunculis unifloris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 1. *p.* 199. *t.* 18. *

Ganzblättrige Dillenie. W.

Habitat in Zeylona. ♄

Arbor *ramis alternis rugoſis fuſcis glabris.* Folia *alterna petiolata obovata obtuſa, a medio ad apicem ſerrulata, ſerraturis obſoletis vixque manifeſtis, utrinque glabra coriacea, ſupra viridia, ſubtus pallidiora, reticulato - venoſa, ſubſpithamaea, palmam lata.* Petioli *ſemiteretes canaliculati villoſi pollicares.* Flores *in ultimis ramulis terminales ſubſolitarii pedunculati.* Thunb. l. c.

3. DILLENIA *ſpecioſa.*

D. foliis oblongis rotundato - acutis denticulatis, pedunculis unifloris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 1. *p.* 200.

Dillenia indica. *Sp. pl.* 745. *Hort. cliff.* 221.

Syalita. *Rheed. mal.* 3. *p.* 39. *t.* 38. 39. *Raj. hiſt.* 1707.

Malva roſea malabarica, Syalitá dicta. *Pluk. mant.* 124. *Burm. ind.* 124.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 61.
Prächtige Dillenie. W.
Habitat in Malabaria, Java. ♄
Arbor *excelſa, ramis craſſis rugoſis cinereis glabris.* Folia *alterna petiolata oblongo-rotundata obtuſa cum acumine, undato-denticulata, ſupra glabra, ſubtus obſcura, fuſceſcentia, ſubpedalia, palmam lata.* Petiolus *craſſus brevis vix pollicaris.* Flores *terminales in ramulis ſolitarii pedunculati.* Thunb. l. c.

*4. DILLENIA *elliptica.*
D. foliis elliptico-ovatis acutis ſerratis, pedunculis unifloris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 1. *p.* 200.
Songium. *Rumph. amb.* 2. *p.* 140. *t.* 45.
Elliptiſche Dillenie. W.
Habitat in Amboina, Celebe. ♄
Folia *alterna petiolata elliptica acuminata, argute ſerrata venoſa, venis oppoſitis parallelis.* Flores *terminales ſolitarii pedunculati.* Thunb. l. c.

*5. DILLENIA *ſerrata.*
D. foliis elliptico-ovatis acutis ſerratis, pedunculis trifloris. *Thunb. Act. Soc.* Lin. *Lond.* 1. *p.* 201.
Sangius. *Rumph. amb.* 2. *p.* 142. *t.* 46.
Geſägte Dillenie. W.
Habitat in Java, Celebe. ♄
Folia *alterna petiolata elliptica acuta, argute ſerrata venoſa, venis ſuboppoſitis et alternis parallelis.* Flores *in pedunculis lateralibus terni, pedicellati.* Thunb. l. c.

*6. DILLENIA *pentagyna.*
D. foliis oblongis utrinque acutis ſerratis, pedunculis unifloris aggregatis lateralibus, floribus pentagynis. W.
Dillenia pentagyna. *Roxb. corom.* 1. *p.* 21. *t.* 20. *
Fünfgriffige Dillenie. W.
Habitat in montibus Coromandeliae. ♄
Folia *alterna petiolata pedalia et ultra ſemipedem lata, oblonga utrinque acuta, argute ſerrata utrinque glabra, parallelo-venoſa, venis ſuboppoſitis.* Petioli *biunciales canaliculati baſi dilatati.* Pedunculi *uniflori aggregati* 4, 6, *vel* 9 *e gemmulis lateralibus in ramis praeteriti anni.* Calycis *foliola ſubrotunda ob-*

tuſa corolla duplo breviora. Corolla *flava hujus generis minima, magnitudine Calthae, petalis lanceolatis.* Stamina *numeroſa, quorum decem quadruplo reliquis longiora.* Styli *quinque.* W.

*7. DILLENIA *retuſa.*

D. foliis obovatis remote dentatis, apice truncatis, pedunculis unifloris. W.

D. (*retuſa*) foliis obovatis truncatis ſerratis, pedunculis unifloris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 1. *p.* 200. *t.* 19.

Abgeſtutzte Dillenie. W.

Habitat in Zeylonae *ſylvis.* ♄

Arbor *ramis alternis rugoſis fuſcis glabris.* Folia *alterna approximata petiolata obovata, inferne attenuata integra, ſuperne remote ſerrata, ſerraturis obſoletis, apice truncata ſubretuſa coriacea utrinque glabra, venoſa, venis parallelis alternis, ſurſum curvatis, inter venas tenuiſſime reticulata, patentia, palmam fere lata et duplo longiora.* Petioli *ſemiteretes canaliculati baſi hirſuti vix pollicares.* Flos *terminalis ſolitarius pedunculatus.* Thunb. l. c.

Folia *remote dentata baſi et apice integerrima, apice truncata.* W.

*8. DILLENIA *dentata.*

D. foliis ſubrotundis, repando - dentatis, pedunculis multifloris. W.

D. (*dentata*) foliis ovatis retuſis dentatis, pedunculis trifloris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 1. *p.* 201. *t.* 20. *Vahl.* [illegible] 3. *p.* 72.

Wormi[illegible] petiolis triquetris alternis, latere ſuperiore t[illegible] ſtriatis. *Rottb. in Nov. Act. Hafn.* 2, *p.* 532. *t.*

Arbor zeylanica fructu acido. *Burm. zeyl.* 30.

Ghodhapara. *Herm. zeyl.* 49. *Lin. fl. zeyl.* 612.

Rundblättrige Dillenie. W.

Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

Arbor *ramis alternis rugoſis cinereis glabris.* Folia *alterna petiolata ovata obtuſiſſima ſeu emarginato-retuſa inferne integerrima, ſuperne ad apicem dentata coriacea venoſa, venis ſuboppoſitis parallelis, ſurſum directis, utrinque glabra, ſupra viridia ſubtus obſcuriora palmaria.* Petioli *angulati glabri folio paulo breviores.* Flores *in ramis terminales racemoſi ſubterni.* Pedicelli *alterni glabri ſemipollicares.* Thunb. l. c.

Pedunculi *ſaepe 4-8-flori, baſi ramoſi.* Vahl l. c. Folia *ſubrotundo-elliptica repando-dentata, apice obtuſiſſima et dentibus majoribus inſtructa.* W.

1072. ILLICIUM.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 940.

Cal. 6-phyllus. *Petala* 27. *Capſ.* plures in orbem digeſtae, bivalves, 1-ſpermae.

1. ILLICIUM *aniſatum.*

I. petalis interioribus lineari-ſubulatis. W.

I. floribus flaveſcentibus. *Sp. pl.* 664. *Mat. med. p.* 140. *Thunb. jap.* 235. * *Loureiro cochin.* 432. *

Somo vulgo Skimmi. *Kaempf. amoen.* 880. *t.* 881.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 65.

Aechter Sternanis. W.

Habitat in Japonia, China. ♄

2. ILLICIUM *floridanum.* †

I. petalis interioribus lanceolatis. W.

I. floribus rubris. *Mant.* 395. *Ellis act. angl.* 1770. *vol.* 60. *p.* 524. *t.* 12.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 69.

Unächter Sternanis. W.

Habitat in Florida. ♄ (v. ſ.)

Flores *rubri.* Fructus *odoratiſſimi.*

1073. LIRIODENDRON.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 941.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 9. *Samarae* imbricatae in ſtrobilum.

1. LIRIODENDRON *Tulipifera.*

L. foliis trilobis truncatis, calyce triphyllo. W.

L. foliis lobatis. *Hort. cliff.* 223. *Hort. upſ.* 154. *Gron. virg.* 60. *Roy. lugdb.* 494. *Kalm. it.* 2. *p.* 322. *Trew. ehr. t.* 10. *Buttn. cun.* 229. * *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 374. *Wangenh. amer.* 32. *t.* 13. *f.* 32. *Willd. arb.* 173.

Tulipifera Liriodendron. *Mill. dict.*

Tulipifera arbor virginiana. *Herm. lugdb.* 612. *t.* 613.

Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio; media laci-

cinia velut abſciſſa. *Pluk. alm.* 379. *t.* 117. *f.* 15. *et t.* 248. *f.* 7. *Cateſb. car.* 1. *p.* 48. *t.* 48. *Raj. hiſt.* 1798. *Du Ham. arb. tom.* 2. *t.* 102.

β. Tulipifera caroliniana, foliis productioribus magis angulofis. *Pluk. alm.* 379. *t.* 68. *f.* 3.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 70.

Virginiſcher Tulpenbaum. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄ (v. v.)

*2. LIRIODENDRON *Coco.* †

L. foliis ovatis, calyce triphyllo. W.

L. (*Coco*) foliis ovatis nitidis, floribus ſolitariis, calycibus triphyllis, corollis hexapetalis. *Loureiro cochin.* 424. *

Wohlriechender Tulpenbaum. W.

Habitat in Cochinchina, China. ♄

*3. LIRIODENDRON *Figo.* †

L. foliis lanceolatis, calyce monophyllo ſpathaceo. W.

L. (*Figo*) foliis incurvis reflexis, floribus ſolitariis, calycibus ſpathaceis, corollis hexapetalis. *Loureiro cochin.* 424. *

Krummblättriger Tulpenbaum. W.

Habitat in China. ♄

4. LIRIODENDRON *Liliifera.* †

L. foliis oblongo-lanceolatis, calyce nullo. W.

L. foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 755. *Burm. ind.* 124. *Loureiro cochin.* 424. *

Sampacca montana. *Rumph. amb.* 2. *p.* 204. *t.* 69.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 73.

Vielblütiger Tulpenbaum. W.

Habitat in Amboinae *montibus.* ♄

1074. MAGNOLIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 942.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 9. *Capſ.* 2-valves, imbricatae. *Sem.* baccata, pendula.

1. MAGNOLIA *grandiflora.*

M. foliis perennantibus oblongis, petalis obovatis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 251. *Willd. arb.* 188.

M. foliis lanceolatis perennantibus. *Sp. pl.* 755.

α. elliptica foliis oblongo-ellipticis coriaceis, floribus ſubcontractis. *Ait. l. c.*
M. foliis lanceolatis perſiſtentibus, caule erecto arboreo. *Mill. dict. n. 2. et ic. t. 172.*
M. altiſſima, flore ingenti candido. *Cateſb. car. p. 80 t. 80.*
M. maximo flore, foliis ſubtus ferrugineis. *Trew, ehr. t. 33.*
M. altiſſima, laurocerasi folio, flore ingenti candido. *Amoen. angl. t. 14.*
β. obovata, foliis obovato-oblongis, floribus expanſis. *Ait. l. c.*
γ. lanceolata, foliis oblongo-lanceolatis apice flexis, floribus ſubcontractis. *Ait. l. c.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. p. 75.
Groſsblütige Magnolie. W.
Habitat in Florida, Carolina. ♄ (v. v.)
Folia *coriacea, antiquiora purpuraſcenti-pubeſcentia.* Corolla *omnium arborum facile maxima. Munchh. L. B.*

*2. MAGNOLIA *Plumieri.*
M. foliis perennantibus ovato-ſubrotundis utrinque glabris. *Swartz. prod. 87.*
M. ampliſſimo flore albo, fructu coeruleo. *Plum. gen. 38 ic. t. 161.*
Plumierſche Magnolie. W.
Habitat in inſulis St. Lucia, Martinica, Guadeloupe. ♄

3. MAGNOLIA *glauca.*
M. foliis ellipticis obtuſis ſubtus glaucis, petalis obovatis. W.
M. foliis ovato-oblongis ſubtus glaucis. *Sp. pl. 755. Mill. dict. n. 1. Du Roi. harbk. 1. p. 399. Wangenh. amer. 60. t. 19. f. 46. Willd. arb. 189.*
α. latifolia, foliis deciduis. *Ait. Kew. 2. p. 251.*
M. foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff. 222. Gron. virg. 61. Kalm. it. 2. p. 324.*
M. laurifolio ſubtus albicante. *Dill. elth. 207. t. 168. f. 205. Cateſb. car. 1. p. 39. t. 39. Trew. ehr. t. 9.*
Tulipifera virginiana, laurinis foliis averſa parte rore caeruleo tinctis, coni-baccifera. *Pluk. alm. 379. t. 68. f. 4.*
Laurus tulipifera, baccis calyculatis. *Raj. hiſt. 1690. et 1798. n. 4.*

β. longifolia, foliis perennantibus. *Ait. l. c.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. p. 77.
Graue Magnolie. W.
Habitat in Virginia, Penſylvania, Carolina. ♄ (v. v.)
Folia *ſubtus albido-coeruleſcentia.*

*4. MAGNOLIA *obovata.*
M. foliis obovatis acutis reticulato-venoſis, petalis oblongis obtuſis. W.
M. (*obovata*) foliis obovatis ſubtus parallelo-nervoſis reticulatis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 336.
M. (*purpurea*) floribus hexapetalis, petalis extus purpureis. *Curt. mag.* 390. *
Magnolia glauca β. *Thunb. jap.* 237.
Mokkwurea. *Kaempf. amoen.* 845. *Banks icon. Kaempf. t.* 43. 44.
Rothe Magnolie. W.
Habitat in Japonia, China. ♄
Folia *obovato-oblonga integerrima glabra, ſubtus parallelo-nervoſa et tenuiſſime reticulata, nervis villoſis, palmaria usque pedalia.* Thunb. l. c.
Folia *non ſunt nervoſa, ſed reticulato-venoſa.* W.

*5. MAGNOLIA *tomentoſa.*
M. foliis ovatis acutis ſubtus tomentoſis, petalis oblongis obtuſis. W.
M. (*tomentoſa*) foliis ellipticis ſubtus tomentoſis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 336.
Magnolia glauca α. *Thunb. jap.* 236. *
Kobus. *Bancks. ic. Kaempf. t.* 42.
Filzige Magnolie. W.
Habitat in Japonia. ♄
Folia *elliptico-lanceolata acuta petiolata integerrima, ſupra glabra, ſubtus ſericeo-tomentoſa palmaria. Pedunculi breves reflexi ſulcati craſſi tomentoſi.* Thunb. l. c.

6. MAGNOLIA *acuminata.*
M. foliis ovato-oblongis acuminatis. *Sp. pl.* 756. *Willd. arb.* 189.
M. foliis ovato-lanceolatis acuminatis annuis, petalis obtuſis. *Mill. dict. n.* 4.
M. flore albo, folio majore acuminato haud albicante. *Cateſb. car.* 3. *p.* 15. *t.* 15. *Gron. virg.* 61. *Kalm. it.* 2. *p.* 324.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 79.

Zugeſpitzte Magnolie. W.
Habitat in Penſylvania. ♄ (v. ſ.)

Folia *utrinque viridia dimidio anguſtiora.* Lignum *flavum. Munchhauſ.*

7. MAGNOLIA *tripetala.*

M. foliis lanceolatis, petalis exterioribus dependentibus. *Sp. pl.* 756.

M. (*umbrella*) foliis lanceolato - ovatis umbellatim confertis patentiſſimis, petalis exterioribus dependentibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 644. *

M. foliis lanceolatis ampliſſimis, petalis exterioribus dependentibus. *Mill. dict. n.* 3.

M. ampliſſimo flore albo, fructu coccineo. *Cateſb. car.* 2. *p.* 61. *t.* 61.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 80.

Dreyblättrige Magnolie. W.
Habitat in Carolina, *rarius in* Virginia. ♄

Flores *magnitudine M. grandiflorae, fragrantiſſimi.* Folia *umbellatim poſita,* 30 *pollices longa. Munchh.*

*8. MAGNOLIA *auriculata.*

M. foliis ſpathulato - ovatis acutis baſi cordatis, petalis unguiculatis. W.

M. (*auriculata*) foliis obovatis baſi attenuatis auriculatis. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 645. *

M. (*Fraſeri*) foliis obovato - lanceolatis baſi auriculatis. *Walt. carol.* 159. *c. icone.*

M. (*pyramidata*) foliis ovalibus oblongis acuminatis baſi auriculatis, ſtrobilo oblongo ovato. *Bartram. itin. ed. germ.* 390.

Geöhrte Magnolie. W.
Habitat in Carolina *et* Georgia, Americes. ♄

Foliis *a reliquis diſtinctiſſima, quae ſpathulato-ovata acuta, baſi cordato-ſagittata.* W.

*1075. NELUMBIUM.

Juſſ. gen. pl. ed. Uſteri p. 76.

Cal. 4-ſ. 5-phyllus. *Cor.* polypetala *Nuces* monoſpermae ſtylo perſiſtenti coronatae, receptaculo truncato immerſae.

1. NELUMBIUM *ſpecioſum.* W.

N. foliis peltatis orbiculatis integerrimis, pedunculis petiolisque muricatis, corolla polypetala. W.

Nymphaea (*Nelumbo*) foliis peltatis undique integris. *Sp. pl.* 730. *Hort. cliff.* 203. *Fl. zeyl.* 193. *Lerche in Nov. Act. A. N. C.* 5. *app. p.* 191. *Loureiro cochin.* 416. * *Thunb. jap.* 223.
Nymphaea indica Faba aegyptia dicta, flore incarnato. *Herm. par.* 205. *t.* 205.
Nymphaea fabifera, indiae paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis ſpinoſis, flore roſeo purpureo. *Pluk. alm.* 267. *t.* 322. *f.* 1. *opt.*
Umbilicus aquaticus maximus chinenſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 620. *S.* 15. *t.* 4.
Taratti. *Rumph. amb.* 6. *p.* 168. *t.* 73.
Bem-Tamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 61. *t.* 31.
β. Tamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 59. *t.* 30.
γ. Nymphaea foliis orbiculatis peltatis ſubtus radiatis. *Brown. jam.* 243.
Nymphaea (*Nelumbo*) foliis peltatis undique integris, calyce quadrifido, corolla multiplici alba, loculis monoſpermis. *Walt. carol.* 155.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 214.
Prächtige Nelumbo. W.
Habitat in Chinae, Indiae, Perſiae *aquis*. ♃
Varietas β. habet petiolos pedunculos*que glabros*, calycis*que ſtructura eſt ignota, an ſpecies diſtincta? Varietas γ. etiam differre videtur quum* pedunculi *et* petioli *non muricati*, *et* calyx *quadrifidus ſit*, *qui tetraphyllus in planta chinenſi*. W.

*2. NELUMBIUM *luteum*. W. †
N. foliis peltatis orbiculatis integerrimis, pedunculis petiolisque glabris, corolla polypetala. W.
Nymphaea Nelumbo β. *Sp. pl.* 730. *Bartr. itin. ed. germ.* 390.
Nymphaea affinis glandifera virginiana umbilicato folio, flore luteo pleno. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 514. *Raj. ſuppl.* 631.
Nymphaea glandifera virginiana lacteſcens, minori umbilicato folio, pediculo laevi, flore amplo luteo-palleſcente. *Pluk. alm.* 267.
Gelbe Nelumbo. W.
Habitat in Virginiae, Carolinae, Floridae *fluviis*. ♃
Ulterius ab autoptis ut ſequentia examinandum. W.

*3. NELUMBIUM *pentapetalum*. W. †
N. foliis peltatis orbiculatis integerrimis, calyce pentaphyllo, corolla pentapetala. W.

Nymphaea (*pentapetala*) foliis peltatis undique integris, calyce pentaphyllo, corolla magna pentapetala alba, loculis pericarpii monoſpermis. *Walt. carol.* 155.
Fünfblättrige Nelumbo. W.
Habitat in Carolina. ♃

*4. NELUMBIUM *reniforme*. W. †
N. foliis reniformibus, corolla polypetala. W.
Nymphaea (*reniformis*) foliis reniformibus, corollis polypetalis, loculis monoſpermis. *Walt. carol.* 155.
Nierenblättrige Nelumbo. W.
Habitat in Carolina. ♃

Nelumbii genus habitu Nymphaeae eſt proximum, ſed piſtilli ſtructura eſt longe alia. Plerique Botanici crediderunt partem centralem floris Nelumbii eſſe germen unicum cum ſtigmate ſeſſili; at pars illa centralis eſt receptaculum obverſe conicum apice truncatum et foveis excavatum. In qualibet fovea obſervatur germen unicum cum ſtylo brevi. Poſt floreſcentiam receptaculum, reſpectu ſpeciei, evadit ſpongioſum, ſuberoſum vel lignoſum et germina numeroſa mutantur in nuces ſtylo perſiſtenti inſtructae. Nelumbium itaque differt a Nymphaea numero piſtillorum receptaculo inſidentium atque fructu; eſt illi affinitas aliqua quoad fructus ſtructuram cum Fragaria. W.

1076. MICHELIA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 943.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 15. *Baccae* multae, 4-ſpermae.

1. MICHELIA *Champaca*.
M. foliis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 144. *Oſb. it.* 93.
Sampacca. *Rumph. amb.* 2. *p.* 199. *t.* 67. 68.
Champacam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 31. *t.* 19. *Raj. hiſt.* 1641. *Burm. ind.* 124.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 81.
Wohlriechende Michelie. W.
Habitat in India. ♄
Flores *lutei, ſuaveolentiſſimi.*

2. MICHELIA *Tſiampaca*.
M. foliis lanceolato-ovatis. *Mant.* 78.
M. evonymoides. *Burm. ind.* 124.
Sampacca ſylveſtris. *Rumph. amb.* 2. *p.* 202. *t.* 68.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 82.
Geruchloſe Michelie. W.
Habitat in India. ♄
Flores *albicantes ſ. luteſcentes, minus olentes.* Folia *latiora ſeu lanceolato-ovata, petiolata, et etiamnum tenella, more ſalicum, pube ſericea.*

1077. UVARIA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 944.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 6. *Baccae* numeroſae, pendulae, 4-ſpermae.

1. UVARIA *zeylanica.*
U. foliis lanceolatis acuminatis, pedunculo unifloro ſolitario, petalis ſubrotundis obtuſis aequalibus. W.
U. foliis integerrimis. *Sp. pl.* 756. *Mat. med. p.* 140.
Uvaria. *Fl. zeyl.* 224. *
Funis muſarius. *Rumph. amb.* 4. *p.* 78. *t.* 42.
Narum-panel. *Rheed. mal.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *Raj. hiſt.* 1636.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 84.
Zeylaniſcher Traubenbaum. W.
Habitat in India. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*2. UVARIA *lanceolata.*
U. foliis lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis, ramis virgatis. *Swartz. prod.* 87.
Arbor foliis ovatis glabris utrinque acuminatis, floribus umbellulatis, umbellulis ſparſis. *Brown. jam.* 370.
Lanzettenblättriger Traubenbaum. W.
Habitat in Jamaica. ♄

*3. UVARIA *ceraſoides.*
U. foliis lanceolatis acutis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis unifloris ſolitariis, petalis ovatis acutis aequalibus. W.
Uvaria ceraſoides. *Roxb. corom.* 1. *p.* 30. *t.* 33. *
Kirſchartiger Traubenbaum. W.
Habitat in Indiae *orientalis montibus.* ♄
Baccae *monoſpermae atro-rubrae.* W.

*4. UVARIA *ſuberoſa.*
U. foliis oblongis acutis glabris, pedunculis unifloris ſolitariis, petalis tribus interioribus lanceolatis. W.

Uvaria ſuberoſa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 31. *t.* 34. *
Korkrindiger Traubenbaum. W.
Habitat in India *orientali.* ♄.
Cortex *ſuberoſus rimoſus.* Folia *breviſſime petiolata, baſi inaequalia.* Corollae *petala tria exteriora ovata viridia duplo interioribus breviora, tria interiora lanceolata albida.* Baccae *atro-rubrae monoſpermae.* W.

*5. UVARIA *tomentoſa.*
U. foliis oblongis acutis tomentoſis, pedunculis unifloris ſolitariis, petalis tribus interioribus ovatis. W.
Uvaria tomentoſa. *Roxb. corom.* 1. *p.* 31. *t.* 35. *
Filziger Traubenbaum. W.
Habitat in Indiae *orientalis montibus.* ♄
Petala *tria exteriora lineari-ſubulata, interioribus triplo breviora vireſcentia; interiora ovata acutiuſcula rufeſcentia.* Baccae *tetraſpermae magnitudine figura et colore Pruni minoris.* W.

*6. UVARIA *odorata.*
U. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis unifloris ſolitariis, petalis lineari-lanceolatis longiſſimis. W.
U. (*odorata*) foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, petalis lanceolato-linearibus acutis planis longiſſimis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 589. *
Cananga. *Rumph. amb.* 2. *p.* 195. *t.* 65.
Wohlriechender Traubenbaum. W.
Habitat in Java *et* China. ♄

*7. UVARIA *monoſperma.*
U. foliis ellipticis acuminatis ſubtus ferrugineis, pedunculis unifloris aggregatis, petalis ovatis acutis. W.
U. (*monoſperma*) foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, petalis ovatis acutis, capſulis monoſpermis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 590. *
Cananga Ouregou. *Aubl. guj.* 1. *p.* 608. *t.* 244. *
Einſamiger Traubenbaum. W.
Habitat in ſylvis remotis Gujanae. ♄.
Capſulae *nec Baccae monoſpermae ellipticae, affinis Xylopiae, ſed capſula neque tetragona neque bivalvis.* W.

*8. UVARIA *lutea.*
U. foliis oblongis acutis nitidis, pedunculis trifloris ſolitariis, petalis ovatis obtuſis. W.

Uvaria lutea. *Roxb. corom.* 1. *p.* 32. *t.* 36. *
U. (*coriacea*) foliis lanceolato-ellipticis acuminatis planis, pedunculis oppoſitifoliis ſubbifloris, petalis oblongis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 72.?
Gelber Traubenbaum. W.
Habitat in Indiae *orientalis montibus.* ♄

Folia *coriacea nitida breve petiolata.* Pedunculi *uni-bi-vel triflori ſolitarii foliis oppoſiti.* Petala *rufeſcentia.* Baccae *oblongae baſi attenuatae luteae hexaſpermae magnitudine Pruni ſpinoſae. Uvaria coriacea Clariſſ. Vahlii ab hac non differre videtur.* W.

*9. UVARIA *ligularis.*

U. foliis ovatis acutis, pedunculis multifloris ſolitariis, petalis linearibus acutis longiſſimis. W.
U. (*ligularis*) foliis ovatis acutis integerrimis, petalis linearibus. *Lamarck encycl.* 1. *p.* 590.
Cananga ſylveſtris anguſtifolia. *Rumph. amb.* 2. *p.* 198. *t.* 66. *f.* 2.
Langblumiger Traubenbaum. W.
Habitat in Amboina. ♄

Accedit quoad petalorum formam ad U. odoratam. W.

*10. UVARIA *longifolia.*

U. foliis lanceolatis margine undulatis, pedunculis umbellatis, petalis lanceolatis acutis. W.
U. (*longifolia*) foliis petalisque lanceolatis, umbellis lateralibus ſubpedunculatis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 72. *
U. (*longifolia*) foliis longis anguſto-lanceolatis acutiſſimis margine undulatis, floribus lateralibus umbellatis, petalis acutis. *Lamarck. encycl.* 1. *p.* 590. *
Sonnerat. itin. 2. *p.* 233. *t.* 131. *
Langblättriger Traubenbaum. W.
Habitat in India *orientali.* ♄

11. UVARIA *japonica.*

U. foliis oblongis acuminatis ſerratis, pedunculis unifloris ſolitariis, petalis ſubrotundis. W.
U. foliis ſerratis. *Sp. pl.* 756. *Thunb. jap.* 237. *
Frutex viſcoſus procumbens, folio telephii vulgaris aemulo, fructu racemoſo. *Kaempf. amoen.* 476. *t.* 477.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 87.
Japaniſcher Traubenbaum. W.
Habitat in Japonia. ♄

Ab omnibus diſtincta: caule *ſcandente,* foliis *ſerratis et* receptaculo *fructuum magno.* W.

1078. ANNONA.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 945.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 6. *Bacca* polyſperma, ſubrotunda, cortice ſquamato.

1. ANNONA *muricata.*

A. foliis ovali-lanceolatis glabris acutis, fructibus muricatis, petalis ovatis, interioribus obtuſis brevioribus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 252.

A. foliis ovali-lanceolatis glabris n[illegible]anis, pomis muricatis. *Hort. cliff.* 222. * *Gro[illegible] virg.* 61. *Roy. lugdb.* 494. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 10. *t.* 5. *Merian. ſur. t.* 14. *Swartz. obſ.* 220. *

A. foliis oblongo-ovatis nitidis, fructibus ſpinis mollibus tumentibus obſitis. *Brown. jam.* 254.

A. indica latifolia, fructu ſquamoſo aſpero. *Pluk. alm.* 31. *t.* 134. *f.* 2.

A. indica fructu conoide viridi ſquamis veluti aculeato. *Pluk. alm.* 32. *t.* 135. *f.* 2.

A. maxima, foliis latis ſplendentibus, fructu maximo viridi conoide: tuberculis ſ. ſpinulis innocentibus aſpero. *Sloan. jam.* 203. *hiſt.* 2. *p.* 166. *t.* 225.

Anona. *Comm. hort.* 1. *p.* 133. *t.* 69. *Merian. ſurin.* 14. *t.* 14.

Guanabanus fructu molliter aculeato. *Plum. gen.* 43. *t.* 143. *f.* 1.

Araticu Ponhe. *Marcgr. braſ.* 93.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 89.

Stachlicher Flaſchenbaum. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄ (v. ſ.)

Cor. 3-*petala, extus ſcabra:* Nectarii *petala* 3, *minora, extus alba laevia, intus rubra.* Fructus *cordatus, muricatus aculeis recurvis, non eſculentus.*

Varietas hujus ſpeciei in Jamaica mihi obvia: foliis *inodoris,* floribus *majoribus fulvis,* fructibus *ſphaericis mucronatis.* Swartz. l. c.

*2. ANNONA *tripetala.*

A. foliis ovatis acutis ſubtus pubeſcentibus, floribus tripetalis, petalis lanceolatis coriaceis tomentoſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 252. *Wendl. obſ.* 24. *t.* 3. *f.* 24.

A. (*Cherimolia*) foliis ovalibus mollibus ſubtus pubeſcentibus, junioribus tomentoſo-ferrugineis, pedunculis tomentoſis flore ſubbrevioribus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 124. *

A. foliis ovatis acutis, flore albido ungue purpureo, fructu coniformi tuberoſo nigricante. *Trew. Ehret. p.* 16. *t.* 49.
Guanabanus Perſeae folio, flore intus albo, exterius virescente, fructu nigricante ſquamato, vulgo Cherimolia. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 24. *t.* 17.
Dreyblättriger Flaſchenbaum. W.
Habitat in Peru. ♄ (v. v.)

3. ANNONA *ſquamoſa.*
A. foliis oblongis acutis glabris, fructibus obtuſe ſquamoſis, petalis exterioribus lanceolatis, interioribus minutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 253.
A. foliis oblongis ſubundulatis, fructibus obtuſe ſubſquamatis. *Sp. pl.* 757. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 13. *t.* 6. *f.* 1. *Mill. dict. n.* 3. *Swartz. obſ.* 221. *
A. indica, fructu ex viridi-luteo, cortice ſquamato aſpero, nucleis nigricantibus parvis. *Pluk. alm.* 31. *t.* 134. *f.* 3.
A. foliis oblongo-ovatis undulatis venoſis, floribus tripetalis fructibus mammillatis. *Brown. jam.* 256.
Annona tuberoſa. *Rumph. amb.* 1. *p.* 138. *t.* 46.
Annona foliis odoratis minoribus, fructu conoide ſquamoſo parvo dulci. *Sloan. jam.* 205. *hiſt.* 2. *p.* 168. *t.* 227. *Raj. dendr.* 77.
Atamaram. *Rheed. mal.* 3. *p.* 21. *t.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 95. *t.* 12. *f.* 2.
Schuppiger Flaſchenbaum. W.
Habitat in America *meridionali.* ♄
Fructus *ſubovatus papillis ſubimbricatis obtuſis.*

*4. ANNONA *paludoſa.*
A. foliis oblongis acuminatis tomentoſis ſubtus rufeſcentibus, fructibus muricato-ſquamoſis, petalis ſubrotundo-ovatis acutis interioribus brevioribus. W.
A. (*paludoſa*) foliis villoſis ſupra viridibus, ſubtus rufeſcentibus, fructu luteo tuberculato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 611. *t.* 246. *
Guanabanus fructu turbinato minori luteo. *Barrer. aequin.* 53.
Moraſt-Flaſchenbaum. W.
Habitat in pratis paludoſis Gujanae. ♄

5. ANNONA *reticulata.*
A. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, fructibus

ovatis reticulato-areolatis, petalis exterioribus lanceolatis, interioribus minutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 253.

A. foliis lanceolatis, fructibus ovatis reticulato-areolatis. *Sp. pl.* 757. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 14. *t.* 6. *f.* 2. * *Swartz. obſ.* 222. *

A. foliis oblongis undulatis venoſis, fructibus areolatis. *Brown. jam.* 256.

Anona maxima foliis oblongis anguſtis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro in areolas angulares diſtincto. *Sloan. jam.* 264. *hiſt.* 2. *p.* 167. *t.* 226. *Cateſb. car.* 2. *p.* 86. *t.* 86. *Raj. dendr.* 77.

Anona maram. *Rheed. mal.* 3. *p.* 23. *t.* 30. 31.

Guanabanus fructu aureo et molliter aculeato. *Plum. gen.* 43.

β. A. (*mucoſa*) foliis oblongis, fructibus areolatis, corollis extimis monopetalis. *Iacq. obſ.* 1. *p.* 16. *

Anona. *Rumph. amb.* 1. *p.* 136. *t.* 45.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 98.

Netzfrüchtiger Flaſchenbaum. W.

Habitat in America *meridionali.* ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*6. ANNONA *longifolia.*

A. foliis lanceolatis acuminatis, fructibus ſubrotundis punctatis et reticulato-areolatis, petalis ovato-lanceolatis, interioribus minoribus. W.

A. (*longifolia*) fructu rubro punctato et reticulato. *Aubl. guj.* 1. *p.* 615. *t.* 248. *

Langblättriger Flaſchenbaum. W.

Habitat in Gujana. ♄

*7. ANNONA *punctata.*

A. foliis oblongis acuminatis, fructibus globoſis ſtellato-punctatis glabris, petalis ovatis acutis, interioribus duplo minoribus. W.

A. (*punctata*) fructu laevi punctato carne rubeſcente. *Aubl. guj.* 1. *p.* 614. *t.* 247. *

Punktirter Flaſchenbaum. W.

Habitat in ſylvis Gujanae. ♄

8. ANNONA *hexapetala.*

A. foliis elliptico-oblongis acutis glabris, petalis ſpathulatis aequalibus acutis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 253.

A. floribus hexapetalis. *Lin. ſuppl.* 270.

Sechsblättriger Flaſchenbaum. W.

Habitat in China *et* India *orientali.* ♄

Arbor *ſimillima pluribus Annonis.* Folia *elliptica*

glabra. Calyx *triphyllus minutus.* Petala *ſex aequalia oblonga.* Fructus *mihi ignotus.*

9. ANNONA *paluſtris.*

A. foliis oblongis obtuſiuſculis glabris, fructibus areolatis, petalis exterioribus majoribus ſubrotundis. W.

A. foliis oblongis obtuſiuſculis glabris, fructibus areolatis. *Sp. pl.* 757. *Swartz. obſ.* 223. *

A. uliginoſa, foliis nitidis ovatis, fructibus areolatis odoratis. *Brown. jam.* 256.

A. foliis oblongis obtuſis glabris, fructu rotundo cortice glabro. *Mill. dict.*

Anona aquatica, foliis laurinis atro-virentibus, fructu minore conoide luteo, cortice glabro in areolas diſtincto. *Sloan. jam.* 205. *hiſt.* 2. *p.* 169. *t.* 228. *f.* 1. *Raj. dendr.* 78.

Anona americana juxta fluviorum ripas innaſcens pyriformi fructu. *Pluk. alm.* 32. *t.* 240. *f.* 6.

Guanabanus paluſtris fructu laevi viridi. *Plum. mſſ.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 3. *p.* 102.

Sumpf-Flaſchenbaum. W.

Habitat in America *ad aquas.* ♄ (v. ſ.)

10. ANNONA *glabra.*

A. foliis lanceolato-ovatis, fructibus conoidibus glabris. *Sp. pl.* 758. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 62.

Anona maxima, foliis latis, fructu maximo luteo conoide: cortice glabro. *Cateſb. car.* 2. *p.* 64. *t.* 64.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 103.

Glatter Flaſchenbaum. W.

Habitat in Carolina. ♄

11. ANNONA *triloba.*

A. foliis ellipticis acutis glabris, floribus pendulis campanulatis, calycibus ovatis, petalis pluribus ovalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 254.

A. foliis lanceolatis, fructibus trifidis. *Sp. pl.* 758. *Mill. dict. n.* 8. *et ic. t.* 35. *Du Roi. harbk.* 1. *p.* 59.

Anona fructu luteſcente levi ſcrotum arietis referente. *Cateſb. car.* 2. *p.* 85. *t.* 85. *Trew. ehr. t.* 5. *Du Ham. arb.* 1. *p.* 56. *t.* 19.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 103.

Dreylappiger Flaſchenbaum. W.

Habitat in Carolina. ♄

12. ANNONA *aſiatica.*

A. foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis. *Hort. cliff.*

222. * *Fl. zeyl.* 225. * *Roy. lugdb.* 494. *Mill. dict. n.* 7. *Vahl. ſymb.* 3. *p.* 73.
A. (*glabra Keſchta*) foliis ellipticis, fructu glabro. *Forsk. deſcr.* 102. * *Icon. tab.* 15.
A. ſylveſtris. *Burm. zeyl.* 21.
Guanabanus fructu purpureo. *Plum. ſpec.* 43. *ic.* 143. *f.* 2.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 105.
Aſiatiſcher Flaſchenbaum. W.
Habitat in Zeylona. ♄ (v. ſ. ſ. fl.)

*13. ANNONA *Ambotay.*
A. foliis oblongo - ovatis acuminatis ſubtus tomentoſis rufeſcentibus, petalis ovatis acutis ſubaequalibus. W.
A. (*Ambotay*) foliis amplis ſubtus villoſis et rufeſcentibus. *Aubl. guj.* 1. *p.* 616. *t.* 249. *
Braunhaariger Flaſchenbaum. W.
Habitat in ſylvis Gujanae. ♄
Frutex *octopedalis.* Folia *octopollicaria coriacea oblongo - ovata acuminata venoſa, venis margine arcuato - confluentibus, ſuperne viridia glabra, inferne tomento rufeſcente induta.* Petioli *breves ut ramuli juniores flexuoſi, tomentoſi.* Pedunculi *uniflori ſolitarii axillares vix longitudine petioli.* Flos *parvus vireſcens.* Fructus *ignotus.* W.

14. ANNONA *africana.*
A. foliis lanceolatis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 222. *Roy. lugdb.* 494. *Mill. dict. n.* 6.
Guanabanus fructu ſubcoeruleo. *Plum. gen.* 43.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 105.
Africaniſcher Flaſchenbaum. W.
Habitat in America. ♄

*15. ANNONA *pygmaea.* †
A. foliis lanceolatis acutis, petalis oblongis acutis interioribus longioribus. W.
Annona pygmaea. *Bartram itin. ed. germ. p.* 21. *t.* 1.
Zwerg - Flaſchenbaum. W.
Habitat in Florida. ♄
Frutex *pedalis, ramis depreſſis.* Folia *alterna lanceolata acuta baſi in petiolum attenuata venoſa glabra.* Pedunculi *uniflori axillares ſolitarii nutantes.* Corolla *campanulata magnitudine A. ſquamoſae, petalis oblongis acutis apice reflexis, interioribus longioribus.* Fructus *ignotus.* W.

*16. ANNONA *obovata*. W.

A. foliis obovatis obtuſiuſculis, fructu oblongo glabro, petalis obovatis obtuſis exterioribus majoribus. W.

Annona grandiflora. *Bartram itin. ed. germ. p.* 20. *tab.* 2.

Groſser Flaſchenbaum. W.

Habitat in Florida. ♄

Folia *obovata obtuſiuſcula breve petiolata glabra.* Flos *ſolitarius terminalis nutans albus duplo major quam in A. muricata,* petalis *obovatis, interioribus brevioribus.* Fructus *oblongo - obovatus glaber.* W.

*17. ANNONA *grandiflora*.

A. foliis ovato - oblongis, fructu elliptico ſcabriuſculo, petalis pubeſcentibus oblongis interioribus brevioribus. W.

A. (*grandiflora*) foliis ovato - oblongis petiolatis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 73.

A. (*grandiflora*) foliis ovato - lanceolatis glabris maximo flore. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 126. *

Groſsblütiger Flaſchenbaum. W.

Habitat in Madagaſcaria *et inſula* Borboniae. ♄

Rami *glabri punctati.* Folia *petiolata alterna palmaria parum attenuata acuta, venoſo - reticulata, utrinque glabra, ſupra nitida.* Petiolus *breviſſimus rugoſus.* Calycis *foliola tomentoſa ovata unguicularia.* Pedunculi *breves axillares vel laterales ſolitarii uniflori.* Petala *exteriora bipollicaria, pollicem lata coriacea oblonga, baſi parum anguſtiora, extus villis denſis adpreſſis cinerea, intus glabra, excepto margine cinereo.* Vahl l. c.

*18. ANNONA *amplexicaulis*.

A. foliis cordato - oblongis amplexicaulibus. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 73.

A. (*amplexicaulis*) foliis cordato - oblongis acutis diſtichis amplexicaulibus. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 127. *

Herzblättriger Flaſchenbaum. ♄

Habitat in Madagaſcar *et in inſula* Mauritii. ♄

Rami *teretes glabri, cortice cinereo rimoſo.* Folia *alterna amplexicaulia cordato - oblonga ſenſim attenuata, dodrantalia et ultra bifaria venoſo - reticulata acutiuſcula, ſubtus in ſpecimine ſicco purpureo - violacea.* Pedunculi *axillares breves uniflori ſolitarii.* Flores *pollicares vel parum ultra.* Petala *exteriora lanceolata obtuſa.* Vahl l. c.

1079. XYLOPIA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 946.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 6. *Capſulae* ſubmonoſpermae tetragonae bivalves. *Semina* arillata.

1. XYLOPIA *muricata.*

X. foliis lanceolatis acuminatis, ſubtus ſtrigoſis, apice barbatis, pedunculis multifloris, fructibus muricatis. W.

X. pedunculis multifloris, fructibus muricatis. *Sp. pl.* 1367.

Xylopicrum fruticoſum, foliis ovatis acuminatis productis alternis, capſulis punctatis, floribus confertis ad alas. *Brown. jam.* 250. *t.* 6. *f.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 259.

Bärtiges Bitterholz. W.

Habitat in Jamaica. ♄ (v. ſ.)

***2. XYLOPIA** *fruteſcens.*

X. foliis lanceolatis acuminatis, ſubtus ſericeis, apice glabris, pedunculis ſubmultifloris, fructibus glabris. W.

X. (*fruteſcens*) foliis lanceolatis ſubtus candicantibus villoſis, capſulis rubris quadragonis. *Aubl. guj.* 1. *p.* 602. *t.* 242. * (*exclusis ſynonymis.*)

Ibira. *Piſ. braſ.* 145.

Strauchartiges Bitterholz. W.

Habitat in Gujana, Braſilia. ♄ (v. ſ.)

Simillima praecedenti, ſed diſtincta; foliis *anguſtioribus ſubtus albicantibus ſericeo-villoſis, nec ſtrigoſis, apice glabris, nec faſciculo pilorum inſtructis, fructibus glabris.* Pedunculi *ſunt uni- vel multiflori.* W.

3. XYLOPIA *glabra.*

X. foliis oblongo-ovatis glabris, pedunculis unifloris ſubgeminatis, fructibus glabris. W.

X. pedunculis ſubunifloris, fructibus glabris. *Sp. pl.* 1367.

Xylopicrum foliis amplioribus nitidis ovatis, petiolis brevibus, fructibus glabris. *Brown. jam.* 251.

Xylopicron arbor barbadenſibus lignum amarum nominata. *Pluk. alm.* 395. *t.* 238. *f.* 4.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 260.

Glattes Bitterholz. W.
Habitat in Jamaica *et* Barbados. ♄

1080. UNONA.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 947.

Cal. 3-phyllus. *Petala* 6. *Baccae* 2-vel 3-ſpermae articulato-moniliformes.

1. UNONA *diſcreta.*
U. foliis lanceolatis ſubtus ſericeis. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 63.
Unona diſcreta. *Lin. ſuppl.* 270.
Weidenblättrige Unone. W.
Habitat in Surinamo. *C. G. Dalberg.* ♄
Arbor *ramis virgatis anguſtis flexilibus.* Folia *bifaria alterna petiolata liguſtrina glabra integerrima digitalia.* Petioli *breviſſimi.* Pedicelli *baccarum intra corollam umbellati.* Flos *Annonae ſed fructus diverſus purpureus ſapidus aromaticus, qui diſtinguit genere uti in Theobroma et Abroma.*
Rami *pubeſcentes.* Folia *ſesquipollicaria valde attenuata anguſta ſalicina vix petiolata.* Vahl l. c.

*2. UNONA *tomentoſa.* W. †
U. foliis lanceolatis tomentoſis. W.
Desmos (*cochinchinenſis*) foliis lanceolatis tomentoſis, floribus ſolitariis clauſis. *Loureiro cochin. p.* 431. *
Filzige Unone. W.
Habitat in Cochinchinae *dumetis.* ♄

*3. UNONA *diſcolor.*
U. foliis ovato-oblongis utrinque glabris. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 63. *t.* 63. *
Desmos (*chinenſis*) foliis ovato-lanceolatis glabris, floribus ſolitariis patentibus. *Loureiro cochin.* 431?
Verſchiedenfarbige Unone. W.
Habitat in India *orientali.* ♄
Folia *petiolata alterna tripollicaria, pollices 2 lata, baſi rotundata, apice parum acuminata, obtuſiuſcula integerrima membranacea, utrinque glabra, ſubtus glauca, tenella ſubtus villoſo-ſericea.* Vahl l. c.

*4. UNONA *concolor.* W. †
U. foliis oblongis acuminatis utrinque glabris concoloribus, pedunculis bifloris. W.
Uvaria zeylanica. *Aubl. guj.* 1. *p.* 605. *t.* 243. * (*excluſis ſynonymis.*)

Gleichfarbige Unone. W.
Habitat in Gujanae *ſylvis.* ♄
Unonae genus ad Uvariam amandavit Clariſſ. Swartz obſ. p. 224, *ſed fructus moniliformis eſt nota, qua facile Unona a congeneribus diſtinguitur.* W.

1081. ANEMONE.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 948.

Cal. 0 *Petala* 6-9. *Sem.* plura.

* *Hepaticae flore ſubcalyculato.*

1. ANEMONE *Hepatica.*

A. foliis trilobis integerrimis. *Mat. med.* 140. *Scop. carn. n.* 658. *Pollich. pal. n.* 515. *Hoffm. germ.* 189. *Fl. dan. t.* 610. *Ludw. ect. t.* 140. *Roth. germ. I.* 235. *II.* 602.
Hepatica. *Hort. cliff.* 223. *Fl. ſuec.* 445, 480. *Hort. upſ.* 155. *Gron. virg.* 61. *Roy. lugdb.* 487. *Hall. helv. n.* 1156. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 567. *Mill. dict. n.* 1. — 5. *Blackw. t.* 207. *Knorr. del.* 1. *t. L.* 13. *Crantz. auſtr. p.* 121.
Trifolium hepaticum, flore ſimplici et pleno. *Bauh. pin.* 339.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 280.
Dreylappige Anemone. W.
Habitat in Europae *nemoribus lapidoſis.* ♃ (v. v.)

* * Pulſatillae *pedunculo involucrato, ſeminibus caudatis.*

2. ANEMONE *patens.*

A. pedunculo involucrato, foliis digitatis multifidis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 195. *Pall. itin.* 2. *p.* 31. *Reyg. ged.* 1. *p.* 141. *n.* 2. *Mattuſch. ſil. n.* 390. *Hoffm. germ.* 189. *Roth. germ. II.* 603.
Pulſatilla patens. *Mill. dict. n.* 4.
Pulſatilla folio anemones ſecundae ſ. ſubrotundo. *Bauh. pin.* 94. *prodr.* 94.
Pulſatilla polyanthos violacea, anemones folio. *Breyn. cent.* 132. *Helw. pulſ.* 52. *t.* 2. 3.
Pulſatilla, anemones folio diſſecto lanuginoſo, flore majore dilute luteo patente. *Amm. ruth.* 104.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 282.
Ausgebreitete Anemone. W.

Habitat in Tobolſko Sibiriae, Luſatia *inferiore*, Gedani, Sileſia. ♃ (v. ſ.)

Folia *radicalia ternato-digitata: Foliolis ſeſſilibus, laciniatis, acuminatis: foliolo intermedio tripartito; lateralibus bipartitis.* Scapus *uniflorus, foliis brevior.* Involucrum *remotum, villoſum.* Corolla *alba, ſubtus villoſa.* Stamina *lutea.*

*3. ANEMONE *cernua.*

A. pedunculo involucrato, foliis pinnatis, flore cernuo. *Thunb. jap.* 238.

Hängende Anemone. W.

Habitat juxta Jedo *in* Japonia. ♃

Scapus *tomentoſus medio involucratus uniflorus apice geniculatus.* Folia *radicalia petiolata pinnata digitalia;* Pinnae *oppoſitae profunde inciſae, pinnulae alternae ſubſerratae acutae villoſae, imprimis ſubtus. Differt ab A. vernali:* flore *cernuo,* foliorum *pinnis pluribus magis inciſis.* Thunb. l. c.

4. ANEMONE *vernalis.*

A. pedunculo involucrato, foliis pinnatis, foliolis tripartitis obtuſis glabriuſculis, flore erecto. W.

A. pedunculo involucrato, foliis pinnatis, flore erecto. *Oed. dan. t.* 29. *Pollich. pal. n.* 516. *Mattuſch. ſil. n.* 391. *Reyg. ged.* 2. *p.* 95. *Hoffm. germ.* 189. *Roth. germ. I.* 235. *II.* 603.

A. tubis caudatis, involucris multifidis, foliis pinnatis, pinnis latis lobatis. *Hall. helv. n.* 1147. *t.* 21.

Anemone ſulphurea. *Allion. ped. n.* 1921.

Pulſatilla vernalis. *Mill. dict. n.* 3.

Pulſatilla foliis ſimpliciter pinnatis; foliolis lobatis, flore erecto. *Fl. ſuec.* 438, 483.

Pulſatilla involucro piloſo nitido. *Fl. lapp.* 223.

Pulſatilla, apii folio, vernalis, flore majore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94. *Helw. pulſ.* 63. *t.* 9.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 284.

Frühlings-Anemone. W.

Habitat in Sueciae, Helvetiae, Germaniae *ſylvis ſteriliſſimis.* ♃ (v. v.)

*5. ANEMONE *Halleri.*

A. pedunculo involucrato, foliis pinnatis, foliolis tripartitis acuminatis villoſis, flore erectiuſculo. W.

Anemone Halleri. *Allion. pedem. n.* 1922. *t.* 80. *f.* 2.

A. (*Halleri*) foliis pinnatis, foliolis multifidis. *Villars. delph.* 3. *p.* 725.

A. tubis caudatis, involucris multifidis, foliis hirſutis pinnatis, pinnis acute lobatis. *Hall. helv. n.* 1148.
Hallerſche Anemone. W.
Habitat in alpibus Valleſiae, Sabaudiae, Delphinatus. ♃ (v. f.)
Similis A. vernali, ſed diverſa: foliis *valde villoſis,* pinnis *profunde trifidis,* laciniis *lanceolatis acuminatis.* W.

6. ANEMONE *Pulſatilla.*

A. pedunculo involucrato: petalis rectis, foliis bipinnatis. *Sp. pl.* 759. *Mat. med.* 141. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 195. *Pollich. pal. n.* 517. *Mattuſch. ſil. n.* 392. *Fl. dan. t.* 153. *Ludw. ect. t.* 119. *Kniph. cent.* 1. *t.* 4. *Knorr. del* 2. *t. A.* 7. *Hoffm. germ.* 190. *Roth. germ. I.* 235. *II.* 603.
A. tubis caudatis, involucris unifoliis multifidis, foliis linearibus hirſutis, pinnis tri- et quinquepartitis. *Hall. helv. n.* 1146.
A. caule involucrato, flore nutante, limbo erecto. *Crantz. auſtr. p.* 123. *n.* 6.
A. ſeminibus caudatis, petalis lanceolatis, rectis; foliis bipinnatis. *Scopl carn. ed.* 1. *p.* 568. *ed.* 2. *n.* 665.
Pulſatilla vulgaris. *Mill. dict. n.* 1.
Pulſatilla foliis decompoſitis pinnatis, flore nutante: limbo erecto. *Hort. cliff.* 223. *Fl. ſuec.* 446, 481. *Roy. lugdb.* 487. *Dalib. pariſ.* 160. *Sauv. monſp.* 254.
Pulſatilla folio craſſiore et majore flore. *Bauh. pin.* 177. *Helw. pulſ.* 62. *t.* 8.
Pulſatilla. *Cam. epit.* 398.
β. flore minori paluſtris. *Bauh. pin.* 176. *Hall.* R.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 284.
Violette Anemone. W.
Habitat in campis ſylveſtribus exaridis collibusque apricis Europae *borealis.* ♃ (v. v.)
Datur *varietas floribus albis. Gmel. Hall.* R.

7. ANEMONE *pratenſis.*

A. pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. *Sp. pl.* 760. *Reyg. ged.* 2. *p.* 95. *Mattuſch. ſil. n.* 393. *Fl. dan. t.* 611 *Kniph. cent.* 1. *n.* 3. *Hoffm. germ.* 190. *Roth. germ. I.* 235. *II.* 604.
A. caule involucrato, flore pendulo limbo reflexo. *Crantz. auſtr. p.* 123. *n.* 7.

Pulſatilla foliis decompoſitis pinnatis, flore pendulo: limbo reflexo. *Hort. cliff.* 223. * *Fl. ſuec.* 447, 482. *Roy. lugdb.* 487. *Sauv. monſp.* 254.
Pulſatilla pratenſis. *Mill. dict. n.* 2.
Pulſatilla flore minore nigricante. *Bauh. pin.* 177. *Helw. pulſ.* 66. *t.* 12.
Pulſatilla vulgaris, ſaturatiore flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 246.
Pulſatilla flore clauſo obſoleto: petalis reflexis. *Helw. pulſ.* 64. *t.* 11.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 286.
Wieſen-Anemone. W.
Habitat in Scaniae, Germaniae *campis pratenſibus apricis aridis.* ♃ (v. v.)
Diſtincta ſpecies a praecedenti.

* * * Anemones *caule folioſo, Seminibus caudatis.*

8. ANEMONE *alpina.*

A. foliis caulinis ternis connatis ſupradecompoſitis glabriuſculis, foliolis pinnatifidis obtuſis, ſeminibus hirſutis caudatis. W.
A. foliis caulinis ternis connatis ſupradecompoſitis multifidis, ſeminibus hirſutis caudatis. *Sp. pl.* 760. *Iacq. auſtr. t.* 85. *Mattuſch. ſil. n.* 394. *Hoffm. germ.* 190. *Roth. germ. I.* 235. *II.* 605.
A. foliis triplicato-pinnatis, acute circumſerratis, caulinis ternatis, tubis caudatis. *Hall. helv. n.* 1149.
A. burſeriana. *Scop. carn. n.* 664.
A. caule involucrato, ſeminibus piloſis, caudatis. *Grantz. auſtr. p.* 105. *n.* 8. *t.* 3. *f.* 2.
A. ſylveſtris 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 245.
A. flore candido. *Thal. herc. p.* 15.
Pulſatilla flore albo. *Bauh. pin.* 177. *Lob. ic.* 182. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 419.
β. Anemone alpina alba major. *Bauh. pin.* 176. *prodr.* 94. *Burſ. IX.* 80.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 287.
Alpen-Anemone. W.
Habitat in alpibus Styriacis, Helveticis, Auſtriacis, Sileſiacis, Hercynicis. ♃ (v. v.)

Folia *caulina baſi lanata.* Involucri *folia ſupradecompoſita, uti radicalia.* Flos *magnitudine flore Tulipae, albus, extus ſubviolaceus pubeſcens.*

9. ANEMONE *apiifolia.*

A. foliis caulinis ternis connatis ſupradecompoſitis villoſis, foliolis pinnatifido-dentatis acuminatis, ſeminibus hirſutis caudatis. W.

Anemone apiifolia. *Wulffen in Iacq. miſc.* 2. *p.* 77. *t.* 4. * *Scop. carn. n.* 663. *Hall. helv. n.* 1149. *β.*

A. (*apiifolia*) foliis caulinis ternis connatis ſupradecompoſitis multifidis tenuiſſimis ſubtus piloſiſſimis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 510.

A. (*myrrhidifolia*) foliis triangulariter decompoſitis, laciniis confluentibus, petalis acutis, tubis rectis. *Villars. delph.* 3. *p.* 727. *

A. (*ſulphurea*) pedunculo involucrato, foliis triplicato-pinnatis piloſis planis acute inciſis, ſeminibus caudatis. *Mant.* 78.

A. ſylveſtris tertia. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 245.

Pulſatilla lutea apii hortenſis folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 411.

Pulſatilla lutea paſtinacae ſylveſtris folio. *Bauh. pin.* 177.

Pulſatilla tertia alpina. *Dalech. hiſt.* 851.

Pulſatilla lutea. *Camer. epit.* 393. *Geſn. ic. aen.* 18.

Selleryblättrige Anemone. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Delphinatus, Sabaudiae, Carnioliae. ♃ (v. ſ.)

Differt ab A. alpina ut A. Halleri ab A. vernali. W

* * * * Anemoides *caule folioſo, ſeminibus ecaudatis.*

10. ANEMONE *coronaria.*

A. foliis radicalibus ternato-decompoſitis, dentibus mucronatis, involucro folioſo, ſeminibus lanatis. W.

A. foliis radicalibus ternato-decompoſitis, involucro folioſo. *Sp. pl.* 760. *Haſſelq.* 477. *Hill. anat.* 12. *Mill. dict. n.* 5.

Pulſatilla foliis decompoſitis ternatis. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upſ.* 155. *Roy. lugdb.* 487.

Anemone tenuifolia, ſimplici flore. *Bauh. pin.* 174. *n.* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

β. A. tenuifolia multiplex rubra. *Bauh. pin.* 176.

Anemone. *Cam. epit.* 386.

γ. A. anguſtifolia multiplex, mutata florum facie quotannis nova. H. R. P. *Mill. dict. t.* 31.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 2. *p.* 288.

Gemeine Anemone. W.

Habitat in Oriente, Conſtantinopoli *allata.* ♃ (v. v.)

11. ANEMONE *hortenſis.*

A. foliis radicalibus digitatis, laciniis trifidis, caulinis ternis lanceolatis connatis ſubdiviſis, ſeminibus lanatis. W.

A. foliis digitatis, ſeminibus lanatis. *Sp. pl.* 761. *Mill. dict. n.* 6.

A. ſeminibus lanatis, foliis radicalibus trilobatis et multifidis, caulinis ovato-lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1152.

A. foliis digitatis: lobis inciſis: petalis lanceolatis numeroſis. *Ger. prov.* 380.

Pulſatilla foliis digitatis. *Hort. cliff.* 224.

Anemone hortenſis latifolia. *Bauh. pin.* 176.

A. geranii rotundo folio, purpuraſcens. *Bauh. pin.* 173.

A. hortenſis latifolia 3. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 249.

Anemone 1. *Dod. pempt.* 434.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 289.

Schöne Anemone. W.

Habitat in Italia, Helvetia. ♃ (v. v.)

Involucrum *foliolis lanceolatis.* Petala 9, *lineata, extus pubeſcentia.*

12. ANEMONE *palmata.*

A. foliis cordatis trilobis, involucris triphyllis trifidis, corollis ſubdecapetalis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 73. *

A. foliis rotundatis lobatis crenatis, involucro multifido, petalis exterioribus villoſis majoribus. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 432. *

A. foliis cordatis ſublobatis, calyce hexaphyllo colorato. *Sp. pl.* 758.

Pulſatilla foliis palmatis. *Hort. cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 487.

Anemone cyclaminis ſ. malvae folio, lutea. *Bauh. pin.* 173. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 425. *ſ.* 4. *t.* 25. *f.* 3.

A. latifolia flava. *Bauh. pin.* 176.

A. hortenſis latifolia 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 248. *Barr. ic.* 792.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 289.

Schlitzblättrige Anemone. W.

Habitat in Luſitania *ad* Tagum, *inque* Algeria. ♃

Involucrum *triphyllum, foliola ſeſſilia baſi ſubconnata, extrorſum dilatata, glabro-nervoſa trifida, laciniis lineari-lanceolatis lateralibus interdum bifidis.* Vahl l. c.

13. ANEMONE *ſibirica.*

A. caule unifloro, involucro folioſo obtuſo. *Sp. pl.* 763. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 199. *n.* 41.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 290.

Sibiriſche Anemone. W.

Habitat in Sibiria. *D. Gmelin.* ♃

Folia *ſuborbiculata, ternata: foliola inciſo-palmata, ciliata, petiolis hirtis.* Scapus *nudus, piloſus.* Involucrum *ſub flore tripartitum, lobatum, laciniis lanceolatis.* Flos *patens: petalis* 6, *ſubrotundis, fulvis.* Stamina *flava.* Piſtillorum *capitula ſubrotunda, muricata.*

*14. ANEMONE *baldenſis.*

A. foliis biternatis, foliolis tripartitis, laciniis trifidis, involucro folioſo, ſeminibus lanatis ſtylo perſiſtenti breviſſimo. W.

A. foliis biternatis hirſutis. *Mant.* 78. *Allion pedem. n.* 1928. *t.* 44. *f.* 9. *et t.* 67. *f.* 2. *Villars. delph.* 3. *p.* 723. *t.* 49. *

A. (*fragifera*) pedunculo nudo, ſeminibus ſubrotundis lanatis muticis, foliorum laciniis acutis lanceolatis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 510. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 103. *Miſc.* 2. *p.* 55. *

Anemone alpina. *Scop. carn. n.* 662. *t.* 26.

A. ſeminibus lanatis, foliis caulinis ternatis triplicato-trifidis, lobulis lanceolatis acute trifidis bifidisve. *Hall. helv. n.* 1151.

A. alpina alba minor. *Bauh. pin.* 176. *prod.* 94.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 283.

Baldiſche Anemone. W.

Habitat alpibus Taureri-Raſtadienſis, Leontinis, Aquilejenſibus, Penninis, Delphinatus, *inque monte* Baldo *et* Ceniſio. ♃ (v. ſ.)

Semina *ſunt lanata, ſtylo brevi glabro coronata.* Caulis *uniflorus et facies plantae fere ut in A. alpina, ſed abunde diſtincta, foliis ſeminibusque.* W.

15. ANEMONE *ſylveſtris.*

A. caule bifloro folioſo, foliis tripartitis, laciniis trifidis dentatis, ſeminibus ſubrotundis lanatis, ſtigmate perſiſtenti. W.

A. pedunculo nudo, ſeminibus ſubrotundis hirſutis muticis. *Sp. pl.* 761. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 176. *Crantz. auſtr. p.* 123. *n.* 5. *Pollich. pal. n.* 515.

Kniph. cent. 5. n. 12. Hoffm. germ. 190. Roth. germ. I. 236. II. 605.

A. ſeminibus lanatis, foliis digitatis hirſutis, floribus pentapetalis. *Hall. helv. n. 1150.*

A. ſeminibus hirſutis. *It. oel. 112. Fl. ſuec. 449. 484.*

A. ſeminibus ſeta plumoſa terminatis. *Hort. cliff. 224. Roy. lugdb. 224.*

A. ſylveſtris alba major. *Bauh. pin. 176.*

A. ſylveſtris 1. *Cluſ. hiſt. 1. p. 244.*

β. Anemone ſylveſtris alba minor. *Bauh. pin. 176. prod. 93. Burſ. IX. 79. Pollich. l. c.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 291.

Wald-Anemone. W.

Habitat in Germania, Helvetia, *etc.* ♃ (v. v.)

Variat flore viridi, purpureo-viridi et viridi pleno. Gmel. R.

16. ANEMONE *virginiana.*

A. caule multifloro foliolo, foliis tripartitis, laciniis trifidis acuminatis dentatis, petalis acutis, ſeminibus hirſutis, ſtylo perſiſtenti breviſſimo. W.

A. pedunculis alternis longiſſimis, fructibus cylindricis, ſeminibus hirſutis muticis. *Sp. pl. 761. Mill. dict. n. 4.*

A. caule ramoſo, petalis lanceolatis. *Roy. lugdb. 488. Gron. virg. 165.*

A. virginiana tertiae ſimilis, flore parvo. *Herm. lugdb. 645. parad. 18. t. 18.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 292.

Virginiſche Anemone. W.

Habitat in Virginia. ♃ (v. v.)

Caulis *nudus, terminatus*, Foliis *ternis, ternatis, medio trilobo, acuto, ſerrato, lateralibus bipartitis, lobato-ſerratis.* Pedunculus *exit e centro petiolorum, longus, nudus.* Flos *parvus petalis ovatis, viridibus, inſtar calycis cujusdam.* Piſtillorum *capitulum elongatum, cylindricum, reſolvitur in Semina hirſuta. Juxta pedunculi baſin exit caulis ulterius, terminatus pedunculo florifero et foliis duobus oppoſitis et ſic ulterius.*

17. ANEMONE *decapetala.*

A. caule unifloro, flore decapetalo, foliis ternatis lobatis radicalibus. *Mant. 79.*

A. foliis ternatis: foliolis trilobis punctatis, pedunculo

ſimplici, flore unico decapetalo. *Ard. ſpec.* 2. *p.* 27. *t.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 294.
Braſilianiſche Anemone. W.
Habitat in Braſilia. ♃

Statura *A. virginianae, ſed minuta.* Folia *radicalia, ternata, petiolata, petiolulata: foliolis ſubovatis, obtuſis trilobis ſ. inciſis.* Caulis *ſimpliciſſimus, ſemipedalis.* Involucrum *uniflorum, tripartitum, multifidum, lineare, acutum, laeve.* Pedunculus *longitudine involucri, hirtus.* Flos *parvus, albus,* 10-*petalus: petalis lanceolatis, perſiſtentibus: interioribus paullo minoribus.* Stamina *corolla breviora.* Germen *capitatum, conicum, villoſum.* Stigmata *acuminata, laevia.*

*18. ANEMONE *triternata.*

A. foliis ternatis, foliolis cuneatis ſubinciſis, involucris multifidis. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 74. *t.* 65.
Dreymaldreyblättrige Anemone. W.
Habitat in Braſilia. ♃

Folia *radicalia petiolata, ternato-ſupradecompoſita glabra*; foliola *parva vix ſemiunguicularia, bi-ſ. trifida obtuſiuſcula*; laciniis *bi-ſ. tridentatis.* Scapus *digitalis altitudine foliorum uniflorus, ſub involucro et floribus incraſſatus villoſoque incanus, inferne glabriuſculus.* Involucrum *foliis ternis baſi connatis bi-ſ. trifidis: laciniis linearibus.* Corolla *dodecapetala.* Petala *lineari-lanceolata, exteriora parum longiora.* Vahl l. c.

19. ANEMONE *penſylvanica.*

A. caule dichotomo, foliis ſeſſilibus-amplexicaulibus: infimis ternis trifidis inciſis. *Mant.* 247.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 293.
Penſylvaniſche Anemone. W.
Habitat in Canada. *D. Hope.* ♃

Simillima A. dichotomae, *ut incautum fallat, ſed differt*: Foliis *ad primam dichotomiam caulis ternis* (*non binis,*) *ſeſſilibus, magis venoſis, minus horizontalibus.* Flores *toti albi,* (*non ſubtus rubicundi,*) *majores.* Antherae *flavae,* (*non fulvae.*) Fructus *globoſus, ſeminum apicibus ſubulatis,* (*non mucrone minuto recurvo*) *undique exſtantibus.*

20. ANEMONE *dichotoma.*

A. caule dichotomo, foliis ſeſſilibus omnibus oppoſitis

amplexicaulibus trifidis inciſis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 155.* *Gmel ſib.* 4. *p.* 197. *Linn. decur.* 29. *t.* 15. *Mill. dict. n.* 7.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 294.
Gabeläſtige Anemone. W.
Habitat in Canada, Sibiria. ♃ (v. ſ.)
Simillima *praecedenti*, *ſed* Radix *late repens.* Folia *ubique oppoſita*, *horizontalia.* Corollae *ſubtus purpuraſcententes.* Antherae *fulvae.* Semina *nuda*, *ſed mucrone minuto recurvo.*

21. ANEMONE *trifolia.*

A. caule unifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis ovatis dentatis. W.
A. foliis ternatis ovatis integris ſerratis, caule unifloro. *Hort. upſ.* 155. *Hort. cliff.* 224. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. pariſ.* 161. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 199. *n.* 39. *Scop. carn. n.* 659.
A. trifolia, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 412.
A. trifolia. *Dod. pempt.* 436.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 294.
Dreyblättrige Anemone. W.
Habitat in Gallia, Carniolia. ♃ (v. ſ.)

22. ANEMONE *quinquefolia.*

A. caule unifloro, foliis caulinis ternis quinatis, foliis ovatis dentatis. W.
A. foliis quinatis ovalibus ſerratis, caule unifloro. *Sp. pl.* 762.
Ranunculus nemorum, fragariae foliis, virginianus. *Pluk. alm.* 310. *t.* 106. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 295.
Fünfblättrige Anemone. W.
Habitat in Virginia, Canada. *Kalm.* ♃

23. ANEMONE *nemoroſa.*

A. caule unifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis lanceolatis trifido-dentatis, corolla hexapetala. W.
A. ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Hort. cliff.* 224. *Fl. ſuec.* 450, 485. *Mat. med.* 141. *Dalib. pariſ.* 161. *Oed. dan. t.* 549. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 198. *Pollich. pal. n.* 519. *Hoffm. germ.* 190. *Kniph. cent.* 1. *n.* 2. *Pallas it.* 2. *p.* 14. *Roth. germ. I.* 236. *II.* 606.
A. ſeminibus nudis, caule unifloro, foliis caulinis, quin-

quepartitis, lobis tripartitis inciſis. *Hall. helv. n.* 1154.
A. nemoroſa alba. *Crantz. auſtr. p.* 121.
A. ſeminibus acutis, petalis ellipticis, foliis ſerratis. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 567 *n.* 1. *ed.* 2. *n.* 660.
A. foliis tripartito-multifidis, floribus hexapetalis, defloratis cernuis. *Neck. gallob. p.* 235.
A. nemoroſa, flore majore. *Bauh. pin.* 176.
Ranunculus ſylvarum. *Cluſ. hiſt.* 247.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 295.
Buſch-Anemone. W.
Habitat in Europae *aſperis, duris, nemoribus.* ♃ (v. v.)

24. ANEMONE *apennina.*
A. caule unifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis lanceolatis inciſo-dentatis, corolla polypetala. W.
A. ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis lanceolatis numeroſis. *Sp. pl.* 762. *Hudſ. angl.* 237. *Mill. dict. n.* 3.
Ranunculus nemoroſus, flore caeruleo, apennini montis. *Mentz. pug. t.* 8. *f.* 2.
Ranunculus nemoroſus, flore purpureo-caeruleo. *Park. theatr.* 325. *Raj. angl.* 3. *p.* 259.
A. geranii robertiani folio, caerulea. *Bauh. pin.* 174.
A. hortenſis, tenuifolia, ſimplici flore 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 254.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 296.
Apenninen-Anemone. W.
Habitat in Apenninis, Romae, Anglia. ♃ (v. v.)

*25. ANEMONE *reflexa.*
A. caule ſubbifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis ſubtrifidis apice dentatis, petalis lanceolatis obtuſis reflexis. W.
Anemone reflexa. *Stephan. in litt.*
Zurückgebogene Anemone. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Simillima ſequenti, qua cum convenit, foliis florum numero ac colore, *differt vero:* pedunculis *duplo brevioribus vix petiolo longioribus hirtis*, corollis *reflexis*, petalis *multo anguſtioribus.* W.

26. ANEMONE *ranunculoides.*
A. caule ſubbifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis

ſubtrifidis apice dentatis, petalis oblongis obtuſis patentibus. W.

A. ſeminibus acutis, foliolis inciſis, petalis ſubrotundis, caule ſubbifloro. *Hort. cliff.* 125. *Fl. ſuec.* 451, 486. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. pariſ.* 161. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 199. *Pollich. pal. n.* 520. *Roth. germ. I.* 236. *II.* 606. *Fl. dan. t.* 140. *Kniph. cent.* 1. *t.* 5. *Hoffm. germ.* 190.

A. biflora, ſeminibus nudis, foliis caulinis quinquepartitis, lobis tripartitis inciſis. *Hall. helv. n.* 1153.

A. nemoroſa lutea. *Crantz. auſtr. p.* 191.

A. ſeminibus acutis; petalis ſubrotundis, foliis crenatis. *Scop. carn.* 7. *p.* 578. *n.* 2. *ed.* 2. *n.* 661.

Ranunculus nemoroſus luteus. *Bauh. pin.* 178.

Ranunculus phragmites luteus nemoroſus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 413.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt 7. *p.* 297.

Ranunkelartige Anemone. W.

Habitat in Europae *borealis pratis nemoroſis.* ♃ (v. v.)

27. ANEMONE *narciſſiflora.*

A. floribus umbellatis involucratis, foliis radicalibus palmatis inciſo-dentatis. W.

A. floribus umbellatis, ſeminibus depreſſo-ovalibus nudis. *Sp. pl.* 763. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 200. *n.* 42. *Iacq. auſtr. t.* 159. *Crantz. auſtr. t.* 3. *f.* 1. *Mattuſch. ſil. n.* 397. *Hoffm. germ.* 191. *Villars. delph.* 3. *p.* 722. *

A. ſeminibus nudis rotundis planis, foliis ſeptifidis imbricatis, floribus umbellatis. *Hall. helv. n.* 1155.

Ranunculus montanus hirſutus albus altior. *Bauh. pin.* 183. *Hall.*

Ranunculus montanus hirſutus humilior narciſſi flore. *Bauh. pin.* 182.

Ranunculi montani 2, ſpecies altera. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 235.

Ranunculus alpinus narciſſi flore. *Cluſ. pann.* 366. 367. *Hall.*

Caryophyllata alpina quinquefolia. *Bauh. pin.* 322.

β. A. (*faſciculata*) floribus umbellatis congeſtis, foliis multifidis. *Sp. pl.* 763.

Ranunculus orientalis, aconiti lycoctoni folio, flore magno albo. *Tournef. cor.* 20. *itin.* 3. *p.* 92. *t.* 92.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 298. 299.

Narciſſenblütige Anemone. W.

Habitat in alpibus Galliae, Helvetiae, Auſtriae, Sileſiae, Sibiriae, *inque* Cappadocia. ♃ (v. ſ.)

A. faſciculata eſt ſola hujus ſpeciei varietas, differens tantum pedunculis brevioribus, ut patet ex ſpecimine ſicco et icone Tournefortii. W.

*28. ANEMONE *umbellata.* W.

A. floribus umbellatis involucratis, foliis radicalibus tripartitis, laciniis trifidis integerrimis. W.

A. (*faſciculata*) floribus umbellatis congeſtis, foliis tripartitis trifidis. *Vahl. ſymb. 3, p. 74. (excluſo ſynonymo.)*

Ranunculus orientalis Napelli folio lanuginoſo flore albo. *Tournef. cor.* 20.

Doldenblütige Anemone. W.

Habitat in Cappadocia. ♃ (v. ſ.)

Radix *faſciculata.* Folia *radicalia tri-ſ. quinquepartita, laciniis trifidis acutiuſculis integerrimis, pilis longis albis, praeſertim margine inſtructa.* Scapus *ſemipedalis pilis ſparſis longis obſitus.* Involucrum *e foliis ternis tripartitis integerrimis connatis.* Pedunculi 3 *ſ.* 4 *involucro longiores.* Flores *exacte praecedentis.* W.

29. ANEMONE *thalictroides.*

A. floribus umbellatis, foliis caulinis ſimplicibus verticillatis, radicalibus biternatis. *Sp. pl.* 763. *Mill. dict. n.* 8

Ranunculus nemoroſus, aquilegiae foliis, virginianus aſphodeli radice. *Pluk. alm.* 310. *t.* 106. *f.* 4.

β. Thalictrum caule unifloro, ex eodem puncto foliis quatuor ſimplicibus inſtructo. *Gron. virg.* 62.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 299.

Thalictrumartige Anemone. W.

Habitat in Virginia, Canada. ♃

Involucrum *foliolis petiolatis.* Canadenſis *plantae β, a D. Kalmio lectae;* Radix *tuberoſa.* Folia *radicalia petiolis longis, duplicato - ternata; foliolis ſubcordatis, angulatis.* Scapus *foliis paulo altior, terminatus foliis quatuor ſimplicibus, foliolis radicalibus ſimilibus, petiolis longis inſidentibus.* Pedunculi *terminales, conferti, ſ. faſciculati* 1, 2, 3, *ſ.* 5, *ſimplices, uniflori, aequales.* Corollae *albae: petalis ovatis, obtuſis, patentibus.* Stamina *flaveſcentia. Piſtilli capitulum ovatum muricatum.*

1082. ATRAGENE.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 949.

Cal. 0. *Corolla* duplex, petalis numeroſis, exterioribus majoribus. *Sem.* caudata.

1. ATRAGENE *alpina.*

A. ſcandens, foliis biternatis ſerratis acuminatis, petalis exterioribus quaternis, interioribus ſpathulatis. W.

A. foliis duplicato-ternatis ſerratis, petalis exterioribus quaternis. *Sp. pl.* 764. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 194. *Iacq. auſtr. t.* 241. *Willd. arb.* 30. * *Pall. roſſ.* 2. *p.* 69. *t.* 76. *

A. foliis ternatis, foliolis ternatis, foliolis trifoliis acutis. *Hall. helv. n.* 1145.

Clematis foliis compoſitis et decompoſitis: foliolis ternatis ſerratis. *Mill. ic. t.* 284.

Clematis foliis cordatis crenatis indiviſis trilobis ternatisque. *Roy. lugdb.* 487.

Clematis alpina geranifolia. *Bauh. pin.* 300. *prodr.* 135. *Pluk. alm.* 109 *t.* 84. *f.* 7. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 15. *t.* 2. *f. ult.*

Clematis cruciata alpina. *Pon. bald.* 335.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 300.

Alpen-Atragene. W.

Habitat in Baldi, Auſtriae, Sibiriae *alpibus.* ♄ (v. v.)

Folia *biternata, inciſa, radicalia.* Scapi *uniflori.* Petala 4 *exteriora lanceolata, magna; interiora lanceolata, obovata, parva.*

In Iacquini figura corollae ſunt coeruleae, et pili ariſtae ſeminis ſecundi, in Pallaſii vero: corollae majores albae et pili ariſtae diſtichi. Noſtra in hortis culta convenit in flore cum icone Pallaſii, in ſemine cum Iacquiniana figura. W.

*2. ATRAGENE *ochotenſis.* †

A. ſcandens, foliis biternatis ſerratis acutis, petalis exterioribus ſenis, interioribus linearibus. W.

A. (*ochotenſis*) foliis triternatis, petalis exterioribus ſex, interioribus linearibus. *Pall. roſſ.* 2. *p.* 69. *

Ochozkiſche Atragene. W.

Habitat in Sibiria *verſus mare* Ochotenſe. ♄

*3. ATRAGENE *japonica*.

A. erecta, foliis oppoſitis triternatis, foliolis ovatis inciſis. *Thunb. jap.* 239. *

Japaniſche Atragene. W.

Habitat in Japonia. ♄ ♃

Caulis *erectus ſtriato-angulatus ſubdichotomus villoſus bipedalis.* Folia *petiolata oppoſita triternata patentia.* Foliola *ovata acuta inciſa dentata tenuiſſime villoſa, ſubtus pallida, pollicaria.* Petiolus *baſi planus amplexicaulis ſemipollicaris.* Flores *e dichotomiis pauci pedunculati.* Pedunculi *filiformes elongati uniflori.* Petala *plurima ultra viginti ſubaequalia vel interiora paullo breviora ovata obtuſiuſcula, intus purpurea, extus albo-tomentoſa.* Facies *omnino Anemones ſed petala plurima huc referre jubent.* Thunb. l. c.

4. ATRAGENE *capenſis.*

A. erecta, foliis biternatis, foliolis inciſo-dentatis, petalis exterioribus numeroſis. W.

A. foliis ternatis: foliolis inciſis dentatis, petalis exterioribus quinis. *Sp. pl.* 764. *Berg. cap.* 148.

A. foliis ternatis, foliolis inciſis dentatis rigidis, flore incarnato ſemipleno. *Andrews. bot. repoſit. t.* 9. *

Pulſatilla foliis trifidis dentatis, flore incarnato pleno. *Burm. afr.* 148.

Pulſatilla apii folio rigido, flore magno. *Herm. afric.* 18.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 301.

Capiſche Atragene. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♄ ♃

Scapus *ſimplex, ſpithamaeus.* Involucrum *in medio Scapi e* ſtipulis *ventricoſis, ovatis, villoſis, foliaceis,* Folia *ternata, cuneiformia, trifida, acuta, dentata, nuda: intermedio longius petiolato.* Petala *circiter* 20, *alba: horum 6 inferiora latiora, ſubtus villoſa purpuraſcentia.* Seminum *capitulum ovatum, hirſutum.*

5. ATRAGENE *tenuifolia.*

A. erecta, foliis ternato-ſupradecompoſitis, foliolis lineari-filiformibus. *Thunb. jap.* 239. *in nota.*

A. foliis duplicato-pinnatis, pinnulis linearibus integris. *Lin. ſuppl.* 270.

Feinblättrige Atragene. W.

Habitat ad Cap. b. Spei.

6. ATRAGENE *zeylanica.*
A. ſcandens, foliis conjugatis indiviſis. *Thunb. jap.* 239. *in nota.*
A. cirrhis diphyllis, petalis exterioribus quaternis. *Fl. zeyl.* 226. *
Atragene. *Amoen. acad.* 1. *p.* 105.
Clematis zeylanica, floribus obſoletis parvis. *Herm. zeyl.* 35.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 302.
Zeylaniſche Atragene. W.
Habitat in Zeylona. ♄
Cauleſcens et ſcandens.

1083. CLEMATIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 960.

Cal. 0. *Petala* 4, rarius 5. *Sem.* caudata.

* *Scandentes.*

1. CLEMATIS *cirrhoſa.*
C. foliis ſimplicibus, caule cirrhis oppoſitis ſcandente, pedunculis unifloris lateralibus. *Syſt. veg.* 426. *Kniph. cent.* 3. *n.* 28.
C. cirrhis ſcandens, foliis ſimplicibus. *Sp. pl.* 2. *p.* 766. *Hort. cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 487. *Mill. dict. n.* 7.
C. peregrina, foliis pyri inciſis. *Bauh. pin.* 300.
C. altera baetica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 123.
C. peregrina, foliis pyri inciſis: nunc ſingularibus, nunc ternis. *Tournef. cor.* 20.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 303.
Einfachblättrige Waldrebe. W.
Habitat in Baetica, *arbores operiens et deprimens.* ♄ (v. v.)
Cirrhi oppoſiti, a foliis diſtincti. Folia *ſaepius ſimplicia, ſerrata, petiolata, ovata, ex iisdem geniculis caulis plura.* Pedunculi *axillares, uniflori; ſub ſingulo flore calyculus remotus, hemiſphaericus, minutus.*

*2. CLEMATIS *florida.*
C. foliis decompoſitis, foliolis binatis ternatisque, petalis ovatis. *Thunb. jap.* 240. *Ait. Kew.* 2. *p.* 258.
Anemone vel Anemonoides. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 280. *t.* 55. *f.* 1.

Groſsblütige Waldrebe. W.
Habitat in Japonia. ♄ (v. v.)

Caulis *ſcandens ſtriatus purpureus omni parte glaber.* Folia *oppoſita binata vel ternata; pinnae ſeſſiles ovatae acutae integrae, rarius inciſae, villoſae, media majori, unguiculares.* Petioli *baſi perfoliati ſemiteretes horizontaliter patentes digitales.* Flores *ex axillis pedunculati ſolitarii.* Pedunculus *villoſus uniflorus foliis longior.* Corolla *magna ſpecioſa patens, petalis ovatis acuminatis luteſcentibus.* Stamina *lineari-lanceolata purpuraſcentia inaequalia corolla dimidio breviora. Differt a C. Viticella:* foliis *ſemper decompoſitis,* foliolis *acutis,* petalis *ovatis.* Thunb. l. c.

3. CLEMATIS *Viticella.*

C. foliis compoſitis decompoſitisque, foliolis ſublobatis integerrimis, petalis obovatis patentibus. W.

C. foliis compoſitis decompoſitisque: foliolis ovatis ſublobatis integerrimis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Mill. dict. n.* 8. *Scop. carn. n.* 670. *Kniph. cent.* 11. *n.* 30. *Willd. arb.* 64. *

Clematitis caerulea vel purpurea repens. *Bauh. pin.* 300.
Clematitis altera. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 122. *Cam. epit.* 696.
Clematitis caerulea, flore pleno. *Bauh. pin.* 301.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 304.
Italiäniſche Waldrebe. W.
Habitat in Italiae, Hiſpaniae, *ſepibus.* ♄ (v. v.)

Folia *floralia ovata.* Petala *deltoidea, ſ. ſuperne dilatata.*

4. CLEMATIS *Viorna.*

C. foliis compoſitis decompoſitisque, foliolis ovatis trifidisque integerrimis, corollis campanulatis, petalis acuminatis. W.

C. foliis compoſitis decompoſitisque: foliolis quibusdam trifidis. *Sp. pl.* 765. *Gron. virg.* 62. *Mill. dict. n.* 10.

Flammula ſcandens, flore violaceo clauſo. *Dill. elth.* 144. *t.* 118. *f.* 144.

Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis. *Raj. hiſt.* 1928.

Scandens caroliniana planta, viornae folio. *Pet. ſicc.* 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 305.
Glockenblütige Waldrebe. W.
Habitat in Virginia, Carolina. ♄ (v. ſ.)

5. CLEMATIS *criſpa.*

C. foliis pinnatis ternatisque, foliolis ovato-lanceolatis trilobisve integerrimis, corollis campanulatis acuminatis margine undulatis, ariſtis ſeminum ſubulatis nudis. W.
C. foliis ſimplicibus ternatisque; foliolis integris trilobisve. *Sp. pl.* 765. *Mill. dict. n.* 15. *Willd. arb.* 65. *
C. flore criſpo. *Dill. elth.* 86. *t.* 73. *f.* 84.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 306.
Krausblütige Waldrebe. W.
Habitat in Carolina. ♄ (v. v.)

Seminum *ariſtae craſſae ſubulatae non plumoſae, ut in reliquis, ſed pubeſcentes pilis brevibus adpreſſis.* W.

*6. CLEMATIS *calycina.*

C. involucro calycino approximato, foliis ternatis, intermedio tripartito. *Ait. Kew.* 2. *p.* 259. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 75. *
C. (*balearia*) ſcandens, foliis compoſitis tenuiter laciniatis, floribus calyculatis lateralibus, petalis interne guttatis. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 44. *
Gekelchte Waldrebe. W.
Habitat in Minorca ♄ (v. v.)

Folia *ternata, foliolis profunde inciſis, intermedio tripartito.* Pedunculi *uniflori axillares nutantes.* Involucrum *calyciforme ſub corolla, monophyllum bilobum.* Petala *quatuor oblonga externe pubeſcentia, interne pallide flava, ſtriis nonnullis rubicundis notata.* W.

7. CLEMATIS *orientalis.*

C. foliis compoſitis, foliolis cuneiformibus trilobis ſubdentatis acuminatis, petalis interne villoſis. W.
C. foliis compoſitis: foliolis inciſis angulatis lobatis cuneiformibus, petalis interne villoſis. *Sp. pl.* 765. *Mill. dict. n.* 11.
C. orientalis, apii folio, flore e viridi flaveſcente poſterius reflexo. *Tournef. cor.* 20.
Flammula ſcandens, apii folio glauco. *Dill. elth.* 144. *t.* 119. *f.* 145.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 306.
Orientaliſche Waldrebe. W.
Habitat in Oriente. ♄ (v. ſ.)

Flores cernui: petalis recurvatis, ſupra villoſis.

*8. CLEMATIS *glauca*. W.

C. foliis compoſitis, foliolis ovatis ſublobatis obtuſis mucronatis, petalis glabris margine pubeſcentibus. W.

C. foliis compoſitis glaucis, foliolis ovatis ſublobatis, petalis margine tomentoſis. *Willd. arb.* 65. *t.* 4. *f.* 1. *

Meergrüne Waldrebe. W.

Habitat in Sibiria, Oriente. ♄ (v. v.)

Diverſiſſima a praecedente, foliolis *non trilobis acuminatis*, petalis *interne glabris ut et toto habitu.* W.

9. CLEMATIS *hexapetala*.

C. foliis compoſitis, foliolis ovatis ſerratis, pedunculis diphyllis, corolla patente hexapetala. *Lin. ſuppl.* 271.

C. foliis ternatis, foliolis cordato-ovatis crenato-inciſis, pedunculis ramoſis trichotomis diphyllis, floribus polypetalis dioicis. *Forſt. prod. n.* 230.

Sechsblättrige Waldrebe. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

Scandens, *ſimillima reliquis*. Flores *luteſcentes*.

*10. CLEMATIS *triflora*.

C. foliis ternatis, foliolis ovatis ſerratis mucronatis, pedunculis trifloris. *Vahl ſymb.* 3. *p.* 74. *

C. (*mauritiana*) foliis ternatis, foliolis ſubcordatis ſerratis, ſeminum cauda longiſſima plumoſa. *Lamarck. encycl.* 2. *p.* 43. *

Dreyblumige Waldrebe. W.

Habitat in inſula Borboniae. ♄

Corolla *tetrapetala magnitudine C. virginianae*. Petala *oblonga utrinque villoſa*. Semina *purpurea villoſa; cauda longa plumoſa*. Vahl l. c.

11. CLEMATIS *virginiana*.

C. foliis ternatis: foliolis cordatis ſublobato-angulatis ſcandentibus, floribus dioicis. *Amoen. acad.* 4. *p.* 274. * *Willd. arb.* 66. *

C. virginiana pannonicae ſimilis. *Pluk. mant.* 51. *t.* 389. *f.* 4.

C. floridenſis, flore albo odoratiſſimo. *Albin. anat.* 1. *p.* 79. *t.* 7.

C. aquatica trifoliata late ſcandens, floribus albis odoratis. *Gron. virg.* 62. *n.* 270.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 307.

Virginiſche Waldrebe. W.

Habitat in America *ſeptentrionali.* ♄ (v. v.)

Femina gaudet ſtaminibus, ſed antherae polline deſtituuntur.

*12. CLEMATIS *japonica.*

C. foliis ternatis, foliolis elliptico-ovatis ſerratis, floribus cylindricis. *Thunb. jap.* 240.

Japaniſche Waldrebe. W.

Habitat in Japonia. ♄

Caulis *filiformis ſcandens ſtriatus purpureus villoſus.* Folia *e geniculis plura petiolata ternata.* Foliola *breviter petiolata elliptico-oblonga acuminata a medio ad apicem aequaliter ſerrata nervoſa villoſa pollicaria, intermedio majori.* Petiolus *capillaris laxus palmaris.* Flores *e geniculis pedunculati ſolitarii cylindrici purpurei.* Pedunculi *uniflori longitudine foliolorum.* *Differt a C. virginica:* foliolis *utrinque attenuatis nec cordatis,* floribus *cylindricis nec ovatis.* Thunb. l. c.

*13. CLEMATIS *trifoliata.*

C. foliis oppoſitis ternatis glabris, foliolis ovatis repando-dentatis, caule ſcandente. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 337.

Scandens foliis ternatis. *Thunb. jap. p.* 357. *n.* 43.

Dreyblättrige Waldrebe. W.

Habitat in Japonia. ♄

14. CLEMATIS *dioica.*

C. foliis ternatis integerrimis, floribus dioicis. *Amoen. acad.* 6. *p.* 398. * *Mill. dict. n.* 13.

C. ſcandens, foliis quinquenerviis ovatis nitidis pinnato-ternatis. *Brown. jam.* 255.

C. prima ſ. ſylveſtris latifolia, foliis ternis. *Sloan. jam.* 84. *hiſt.* 1. *p.* 199. *t.* 128. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 308.

Weſtindiſche Waldrebe. W.

Habitat in America *calidiore.* ♄

*15. CLEMATIS *indiviſa.* W. †

C. foliis ternatis, foliolis ovatis integerrimis mucronatis, pedunculis axillaribus paniculatis diphyllis.

Clematis integrifolia. *Forſt. prod. n.* 231.

Ungetheilte Waldrebe. W.

Habitat in Nova Zeelandia. ♄

*16. CLEMATIS *paniculata.*

C. foliis quinato-pinnatis, foliolis cordatis ovatis integris. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 337.

Clematis criſpa. *Thunb. jap.* 239.
Clematis Vitalba japonica. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 309. *t.* 55. *f.* 2?
Riſpenblütige Waldrebe. W.
Habitat in Japonia. ♄

Caulis *flexuoſus ſcandens ſtriatus glaber.* Rami *alterni.* Folia *petiolata pinnato - quinata.* Foliola *petiolata cordata ovata acuta indiviſa integerrima glabra inferiora majora, ſuperiora minora.* Petioli *flexuoſi.* Flores *axillares albi.* Pedunculi *triternato-paniculati filiformes.* Thunb. Act. l. c.

17. CLEMATIS *Vitalba.*
C. foliis pinnatis, foliolis ſcandentibus cordatis inciſo-lobatis. W.
C. foliis pinnatis: foliis cordatis ſcandentibus. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Gron. virg.* 62. *Sauv. monſp.* 249. *Gort. gelr.* 315. *Mill. dict. n.* 4. *Iacq. auſtr. t.* 308. *Scop. carn. n.* 669. *Pollich. pal. n.* 521. *Hoffm. germ.* 191. *Roth. germ. I.* 232. *II.* 595. *Willd. arb.* 67. *
C. caule ſcandente, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1142.
C. ſcandens, foliis longe petiolatis pinnatis aut dentatis. *Crantz. auſtr. p.* 126. *n.* 1.
Clematis latifolia integra. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 125.
Clematis tertia. *Cam. epit.* 697.
β. Clematis latifolia dentata. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 125.
Vitalba. *Dod. pemp.* 404.
γ. Clematis ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 300.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 308.
Gemeine Waldrebe. W.
Habitat in ſepibus Europae *auſtralis.* ♄ (v. ſ.)

Petala *coriacea.* Variat *foliolis integris et inciſis.*

*18. CLEMATIS *chinenſis.*
C. foliis quinato - pinnatis, foliolis lanceolatis. *Retz. obſ.* 2. *p.* 18. *t.* 2.
Chinenſiſche Waldrebe. W.
Habitat in China. ♃ ♄ (v. ſ.)

Caules *debiles ſuſtentandi tetragoni vix ſcandentes.* Folia *pinnata, foliolis quinis, paribus longe remotis petiolatis lanceolatis baſi ovatis.* Pedunculi *oppoſiti axillares tri - vel quinqueflori, pedicellis lateralibus bracteolis binis a flore longe remotis inſtructi, termi-*

nali nudo. Flores *parvi tetrapetali, petalis lineari-lanceolatis obſcure purpureis; margine interiore linea tomentoſa pictis.* Pappus *piſtillorum antheris vix brevior.* Retz. l. c.

Valde affinis C. paniculatae, an forte varietas? W.

19. CLEMATIS *Flammula.*

C. foliis inferioribus pinnatis laciniatis, ſummis ſimplicibus integerrimis lanceolatis. *Hort. cliff.* 225. *Roy. lugdb.* 486. *Sauv. monſp.* 249. *Mill. dict. n.* 6. *Knorr. del* 1. *t. C.* 9. *Willd. arb.* 68. *

C. caule ſcandente, foliis pinnatis trilobatis. *Hall. helv. n.* 1143.

C. foliis pinnatis: foliolis alternis; caulinis flexuoſis ſcandentibus. *Ger. prov.* 382.

Clematis ſ. Flammula ſcandens tenuifolia alba. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 127. *Hall.* R.

C. urens 1. 2. *Tabern.* 882. 833. R.

Clematis ſ. Flammula repens. *Bauh. pin.* 300. *Raj. hiſt.* 621.

Flammula. *Dod. pempt.* 403. *Dalech. hiſt.* 1171.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 310.

Scharfe Waldrebe. W.

Habitat in Monſpelii, *inque* Rhetiae *ſepibus.* ♃ ♄ (v. v.)

* * *Erectae.*

20. CLEMATIS *maritima.*

C. foliis pinnatis linearibus, caulibus ſimplicibus hexagonis. *Sp. pl.* 767.

C. maritima repens. *Bauh. pin.* 300. *prodr.* 135. *Allion. nic.* 122. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 310.

Meerſtrands-Waldrebe. W.

Habitat ad litora maris Adriatici, Venetii, Monſpelii. ♃

Planta *perennis.* Caules *e ſarmentis procumbentibus, plures, erectiuſculi, erecti.* Folia *oppoſita, pinnata: foliolis ſaepius* 5 *paribus, remotis, linearibus, rigidiuſculis, ſubſeſſilibus, laevibus, indiviſis ſ. rarius bi-vel trifidis.* Flores *C. rectae.* Varietatem *C. Flammulae ſtatuunt Magnol. et Rajus; meum potius C. rectae judicarem ex ſolo mutatam?*

*21. CLEMATIS *anguſtifolia.*

D. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis obtuſis, inferiori-

bus tripartitis, caulibus ſimplicibus ſtriatis erectis, corollis polypetalis. W.

C. (*anguſtifolia*) erecta, foliis pinnatis recurvis, foliolis lineari-lanceolatis, floribus polypetalis. *Iacq. ic rar.* 1. *t.* 104. *Collect.* 1. *p.* 137. *

Clematis hexapetala. *Pall. itin.* 3. *app. n.* 96. *t. Q. f.* 2.

C. erecta foliis anguſtis, cornu cervi diviſura. *Amman. ruth. n.* 108.

Atragene foliis pinnatis, foliolis ex lineari-lanceolatis ſimplicibus bi-et trifidis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 194.

Schmalblättrige Waldrebe. W.

Habitat in Sibiria *et* Auſtria *littorali.* ♃

Folia *pinnata, foliolis anguſto-lanceolatis obtuſis.* Foliolorum *par baſi proximum, ut et foliola in foliis inferioribus ſunt profunde tripartita.* Corolla *alba hexa-vel octopetala.* W.

22. CLEMATIS *erecta.*

C. foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upſ.* 155. *Roy. lugdb.* 486. *Sauv. monſp.* 249. *Mill. dict. n.* 1. *Iacq. auſtr. t.* 291. *Gmel. it.* 1. *p.* 125. *Scop. carn. n.* 667. *Hoffm. germ.* 191. *Roth. germ. I.* 232. *II.* 596.

C. caule erecto, foliis pinnatis, ovato-lanceolatis. *Hall. helv. n.* 1144.

C. foliis longe petiolatis, integris, caule erecto. *Crantz. auſtr. p.* 126.

Flammula recta. *Bauh. pin.* 300.

Flammula. *Cam. epit.* 698. *Cluſ. hiſt. p.* 124.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 311.

Aufrechte Waldrebe. W.

Habitat in collibus Auſtriae, Pannoniae, Tatariae, Monſpelii, Helvetiae. ♃ (v. v.)

Umbellae erectae et ſtrictae ſunt.

*23. CLEMATIS *ochroleuca.*

C. foliis ſimplicibus ovatis pubeſcentibus integerrimis, floribus erectis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 260.

C. erecta humilis non ramoſa, foliis ſubrotundis, flore unico ochroleuco. *Pluk. mant.* 51. *t.* 379. *f.* 5.

Gelbliche Waldrebe. W.

Habitat in America *boreali.* ♃ (v. v.)

24. CLEMATIS *integrifolia.*

C. foliis ſimplicibus ſeſſilibus ovato-lanceolatis, floribus

cernuis. *Hort. cliff.* 225. *Hort. upſ.* 156. *Roy. lugdb.* 486. *Mill. dict. n.* 2. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 194. *Jacq. auſtr. t.* 363. *Willich. in nov. Act. A. N. C. IV. p.* 107. *Kniph. cent.* 1. *n.* 15. *Hoffm. germ.* 191.

C. (*nutans*) foliis ſeſſilibus integris, caule erecto. *Crantz. auſtr. p.* 124.

C. inclinata. *Scop. carn. n.* 668.

Clematis caerulea erecta. *Bauh. pin.* 300.

Clematis caerulea pannonica. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 123.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 312.

Einfache Waldrebe. W.

Habitat in Hungaria, Tataria. ♃ (v. v.)

Petala *coriacea.*

1084. THALICTRUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 951.

Cal. 0. *Petala* 4. ſ. 5. *Sem.* ecaudata.

1. THALICTRUM *alpinum.*

T. caule ſimpliciſſimo ſubnudo, racemo ſimplici terminali. *Hort. cliff.* 227. *Fl. ſuec.* 457, 491. *Roy. lugdb.* 485. *Mill. dict. n.* 11. *Gunn. norv. n.* 41. *Fl. dan. t.* 11.

T. caule ſubnudo ſimplici, foliolis obtuſis. *Fl. lapp.* 225. *

T. montanum minimum praecox, foliis ſplendentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 14.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 314.

Alpen-Thalictrum. W.

Habitat in alpibus Lapponiae, Arvoniae. ♃ (v. ſ.)

Petala 4, *Stamina* 12, *Piſtilla* 8, *Racemus ſimplex floribus cernuis.*

2. THALICTRUM *foetidum.*

T. caule paniculato filiformi ramoſiſſimo folioſo. *Sp. pl.* 768. *Mill. dict. n.* 8.

T. caule filiformi ramoſiſſimo in paniculam diſperſo ſubjectis foliolis. *Hort. cliff.* 227. * *Roy. lugdb.* 485. *Sauv. monſp.* 251.

Thalictrum ſaxatile. *Villars. delph.* 3. *p.* 714.

T. foliis patulis pubeſcentibus, trilobatis, floribus nutantibus, petalis ſubhirſutis. *Hall. helv. n.* 1140.

T. minimum foetidiſſimum. *Bauh. pin.* 337. *prodr.*

147. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 488. *Burſ. XIX*: 49. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 13. *Pluk. alm.* 367. *t.* 65. *f.* 4.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 314.
Stinkendes Thalictrum. W.
Habitat Monſpelii, *inque* Valleſia, Helvetia. ♃ (v. v.)
Odor *hircoſus.*

3. THALICTRUM *tuberoſum.*
T. floribus pentapetalis, radice tuberoſa. *Sp. pl.* 768. *Hort. cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 486. *Mill. dict. n.* 6. *et ic. t.* 265. *f.* 2.
T. minus, aſphodeli radice, magno flore. *Tournef. inſt.* 271.
T. minus, grumoſa radice, floribus majoribus. *Herm. flor.* 9. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 45.
Ranunculus thalictri folio, aſphodeli radice. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 438. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 13.
Oenanthe hederae foliis. *Bauh. pin.* 163.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 315.
Knolliges Thalictrum. W.
Habitat in Hiſpania, Pyrenaeis. ♃ (v. v.)

4. THALICTRUM *Cornuti.*
T. floribus dioicis, foliolis ovatis trifidis, paniculis terminalibus. *Ait. Kew.* 2. *p.* 262.
T. floribus pentapetalis, radice fibroſa. *Sp. pl.* 768. *Roy. lugdb.* 436.
T. canadenſe. *Corn. canad.* 168.
T. americanum. *Park. theatr.* 265.
T. majus, foliis aquilegiae, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 15.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 316.
Cornutiſches Thalictrum. W.
Habitat in Canada. ♃ (v. ſ.)

5. THALICTRUM *dioicum.*
T. floribus dioicis, foliis ſubrotundis cordatis lobatis, lobis obtuſis, pedunculis axillaribus folio brevioribus *Ait. Kew.* 2. *p.* 262.
T. floribus dioicis. *Sp. pl.* 768. *Mill. dict. n.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 316.
Getrenntes Thalictrum. W.
Habitat in Canada. *Kalm.* ♃ (v. ſ.)
Altitudo vix pedalis. Caulis *rectus.* Flores *tetra-*

petali corollis et ſtaminibus 40 *albis*. Antherae *flaveſcentes*. Foliola *cernua ſunt, qua nota diſtinctiſſima evadit planta ex habitu*. Feminae *ſtyli ſetacei, longiores quam in congeneribus*.

*6. THALICTRUM *elatum*.

T. foliolis ovatis ſubcordatis ſubtrifidis, panicula terminali, floribus erectis, caule teretiuſculo. W.

T. (*elatum*) foliis multipartitis, foliolis cordatis vel ovatis obtuſis inciſis, caule tereti paniculato. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 513. *Iacq. hort.* 3. *t.* 95. *

Hohes Thalictrum. W.

Habitat in Hungaria. ♃ (v. v.)

Habitu accedit ad T. minus, differt vero: ſtatura *majori*, foliolis *latioribus minus profunde inciſis*, floribus *erectis non cernuis*. W.

*7. THALICTRUM *majus*.

T. foliolis ſubrotundis ſubcordatis trifidis ſubtus glaucis, panicula folioſa, floribus cernuis. W.

T. (*majus*) foliis multipartitis, floribus cernuis, ramis floriferis ex iisdem axillis binis vel ternis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 513. *Iacq. auſtr.* 5. *t.* 420. *Hoſt. ſyn.* 306.

Groſses Thalictrum. W.

Habitat in Auſtriae, Pannoniae *ſylvaticis*. ♃ (v. v.)

Simile T. minori differt tamen: foliolis *ſubtus glaucis majoribus, ut magnitudine totius plantae, denique* panicula *folioſa nec aphylla*. W.

*8. THALICTRUM *medium*.

T. foliolis oblongis cuneiformibus acutis trifidis, ſummis indiviſis lanceolatis, floribus erectiuſculis. W.

T. (*medium*) foliis multipartitis, foliolis lanceolatis inciſis, floribus erectis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 513. *Iacq. hort.* 3. *t.* 96.

Mittleres Thalictrum. W.

Habitat in collibus Hungariae. ♃ (v. v.)

A T. minori diverſum: foliolis *cuneiformibus ſummis indiviſis lanceolatis et* floribus *erectiuſculis nunquam revera cernuis*. W.

9. THALICTRUM *minus*.

T. foliolis ſubrotundis trifidis inciſis, floribus cernuis. W.

T. foliis ſexpartitis, floribus cernuis. *Sp. pl.* 769. *Mill. dict. n.* 7. *Scop. carn. n.* 674. *Pollich. pal. n.* 522.

Fl. dan. t. 732. *Iacq. auſtr.* 5. *p.* 9. *t.* 419. *Hoffm. germ.* 192. *Roth. germ. I.* 233. *II.* 597.
T. foliis patulis, imis obtuſe trilobis, ſupremis acutis, panicula diffuſa, floribus nutantibus. *Hall. helv. n.* 1139.
T. alpinum minus ſaxatile, rutae folio, ſtaminibus luteis. *Segu. ver.* 476. *t.* 11. *Hall.* R.
T. caule folioſo, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. *Fl. ſuec.* 454, 489. *It. gotl.* 180. * *Dalib. pariſ.* 454.
T. caule glabro, panicula reclinata, floribus cernuis. *Crantz. auſtr. p.* 107. *n.* 4. R.
T. ſiliqua ſeminis ſtriata, minus. *Moriſ. umb. t.* 8. R.
T. minus. *Bauh. pin.* 335. *Dod. pempt.* 58.
Ruta pratenſis minor. *Tabern. ic.* 55.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 317.
Kleines Thalictrum. W.
Habitat in Europae *pratis.* ♃ (v. v.)
Dignoſcitur apicibus foliorum purpuraſcentibus et Caulis nebula coeruleſcente. Floret *praecocius cum T. aquilegifolio, alpino, purpuraſcente, anguſtifolio et contorto.*

*10. THALICTRUM *rugoſum.* †
T. caule ſtriato, foliis rugoſis venoſis, lobulis obtuſis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 262.
Runzliches Thalictrum. W.
Habitat in America *boreali.* ♃

11. THALICTRUM *ſibiricum.*
T. foliis tripartitis: foliolis ſubreflexis argute inciſis, floribus cernuis. *Sp. pl.* 769.
T. alpinum minus ſaxatile, rutae folio, ſtaminibus luteis. *Segu. ver.* 1. *p.* 476. *t.* 11?
T. orientale minimum fumariae folio. *Tournef. cor.* 20.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 318.
Sibiriſches Thalictrum. W.
Habitat in Sibiria, Armenia. ♃ (v. ſ.)
Habitus Th. minoris ſ. purpuraſcentis, at Foliola *parva, ſextuplo minora, glauca colore Rutae ſ. Fumariae.* Caulis *viridis, maxime paniculatus.* Panicula *ad divaricationes fuſca.* Floret *ſerius, nempe cum T. flavo et dioico.*
Planta ſpontanea eſt duplo minor quam T. minus, hortenſis vero multo major evadit et habitu ad T. medium

accedit, differt vero: foliolis *omnibus tripartis, floribusque cernuis.* W.

*12. THALICTRUM *ſquarroſum.*

T. foliolis trifidis indiviſisque, petiolis amplexicaulibus membranaceis alatis, floribus cernuis. W.
Thalictrum ſquarroſum. *Stephan. in litt.*
Geöhrtes Thalictrum. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Diverſum ab antecedentibus, quibus floribus nutantibus ſimile, petioli *ſtructura.* Folia *ſupradecompoſita ut in omnibus, foliola lateralia plerumque ovata acuta integerrima, terminalia vero et lateralia ſuperiora trifida vel etiam bifida.* Petiolus *baſi valde dilatatus, alis orbiculatis membranaceis margine dentatis. In petiolis partialibus foliorum ſunt et* auriculae *orbiculatae minores dentatae, qua nota facile dignoſcitur.* W.

13. THALICTRUM *purpuraſcens.*

T. foliis tripartitis, caule foliis duplo altiore, floribus cernuis. *Sp. pl.* 769.
T. virginianum elatius glaucum, ſtaminibus purpuraſcentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 324.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 319.
Röthliches Thalictrum. W.
Habitat in Canada. ♃

Habitus Thalictri minoris, at dimidio humilius evadit, ubi illud tripedale. Calyces *purpuraſcentes, ſtaminibus luteis.* Caulis *purpuraſcens, abſque nebula. Differt a T. minori foliolis minime apice purpuraſcentibus. Tempore florendi praecocius cum T. minori, nec cum T. flavo. Flos ut in praecedenti: Petalis* 4, *Staminibus* 14, *Piſtillis* 8.

14. THALICTRUM *anguſtifolium.*

T. foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Hort. cliff.* 226. *Amoen. acad.* 3. *p.* 48. *Roy. lugdb.* 478. *Sauv. monſp.* 250. *Mill. dict. n.* 10. *Pollich. pal. n.* 523. *Kniph. cent.* 5. *n.* 86. *Scop. carn. n.* 676. *Hoffm. germ.* 192. *Roth. germ. I.* 233. *II.* 597.
T. foliis adſcendentibus linearibus; panicula erecta. *Hall. helv. n.* 1137.
T. (*Bauhini*) foliis anguſtiſſimis aeque latis integerrimis. *Crantz. auſtr. p.* 105. *n.* 1. *ſec. Hall.* R.
T. (*anguſtiſſimum*) foliis anguſtis lanceolatis, ultimo ramo dentato. *Crantz. l. c. n.* 2. *Hall.* R.

T. pratenſe, anguſtiſſimo folio. *Bauh. pin.* 337. *prodr.* 146. *t.* 146. *Pluk. alm.* 364. *t.* 65. *f.* 6.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 319.
Schmalblättriges Thalictrum. W.
Habitat in Germania *rarius.* ♃ (v. v.)

Petala 4, *ſtamina* 16, *Piſtilla* 7. Affine *T. flavo.*
Eſt forte ſola T. flavi varietas, vidi enim ſaepius inter caules plantae cultae alios foliis latioribus ad T. flavum accedentibus. W.

15. THALICTRUM *flavum.*

T. caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta. *Hort. cliff.* 226. *Fl. ſuec.* 453, 488. *Roy. lugdb.* 485. *Dalib. pariſ.* 162. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. it.* 1. *p.* 139. *Scop. carn.* 2. *n.* 673. *Pollich. pal. n.* 524. *Kniph. cent.* 5. *n.* 87. *Hoffm. germ.* 192. *Roth. germ. I.* 233 *II.* 598.
T. pratenſe. *Fl. lapp.* 224.
T. foliis erectis, lobis acute trilobis, ſpica adſcendente. *Hall. helv. n.* 1138.
T. foliis triplicato - pinnatis: fructificatione paniculata erecta. *Neck. gallob. p.* 236.
T. nigrius, caule et ſemine ſtriato. *Bauh hiſt.* 3. *p.* 487. *Hall.* R.
T. majus, ſiliqua anguloſa ſ. ſtriata. *Bauh. pin.* 336.
T. magnum. *Dod. pempt.* 58.
β. Thalictrum, *flavum, ſpecioſum.*
T. caule anguloſo, foliis linearibus bifidis, trifidisque, panicula multiplici erecta. *Mill. dict. n.* 2. *Doerr. naſſ. p.* 231.
T. majus flavum, floribus luteis ſ. glauco folio. *Bauh. pin.* 336. *ſtaminibus fulvis.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 319.
Gemeines Thalictrum. W.
Habitat in Europae *ſeptentrionalioris ſubhumidis*, β. *in* Hiſpania. ♃ (v. v.)

Petala 4, *Stamina* 24, *Piſtilla* 10 — 16.
Thalictrum *majus flavum Bauh. potius ad* Th. aquilegifolium *ſpectare. Scop. l. c.* R.

*16. THALICTRUM *nigricans.*

T. caule folioſo ſulcato, floribus corymboſis, foliolis radicalibus cuneiformibus trifidis, caulinis linearibus. W.
T. (*nigricans*) caule folioſo ſulcato, panicula multiplici

erecta, foliolis acutis trilobis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 513 *Iacq. auſt.* 5. *t.* 421.
Schwärzliches Thalictrum. W.
Habitat in Auſtria. ♃ (v. v.)
Simile praecedenti, tamen foliis caulinis diverſum. W.

17. THALICTRUM *ſimplex.*
T. caule folioſo ſimpliciſſimo angulato. *Mant.* 78. *Fl. ſuec.* 2. *p.* 490. *Fl. dan.* 244.
Thalictrum anguſtifolium. *Villars delph.* 3. *p.* 712. * (*excluſis ſynonymis.*)
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 321.
Einfachſtengliges Thalictrum. W.
Habitat in Suecia, Dania, Gallia. ♃ (v. f.)
Differt a T. flavo: Herba *dimidio minore*, Floribus *nutantibus, nec erectis*; Petalis *viridibus, nec albis*; Filamentis 14, *purpuraſcentibus, nec* 17 *albis*; Panicula *rariore*; Foliis *anguſtioribus.* Praeter *ſtipulas inter ramificationem primam foliorum*, ſquamae *nullae, at in* T. flavo *ſquamula utrinque lacera.*
T. anguſtifolium Villarſii eſt T. ſimplex, ut ex ſpeciminibus Clariſſ. auctoris mecum benigne communicatis vidi. W.

18. THALICTRUM *lucidum.*
T. caule folioſo ſulcato, foliis linearibus carnoſis. *Sp. pl.* 770. *Dalib. pariſ.* 162. † *Mill. dict. n.* 4.
T. minus lucidum, libanotidis coronariae foliis. *Pluk. alm.* 363. *t.* 65. *f.* 5.
T. minus alterum pariſienſium, foliis craſſioribus et lucidis. *Tournef. inſt.* 271.
Thalictrum 1, vel pratenſe 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 234.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 321.
Glänzendes Thalictrum. W.
Habitat Pariſiis *et in* Hiſpania. ♃ (v. f.)
Planta, an ſatis diſtincta a T. flavo? videtur temporis filia.

19. THALICTRUM *aquilegifolium.*
T. fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti. *Sp. pl.* 770. *Mill. dict. n.* 3. *Reyg. ged.* 2. *p.* 96. *Gort. ingr.* 87. *Iacq. auſtr. t.* 318. *Scop. carn. n.* 672.
T. ſeminibus triangularibus pendulis, ſtipulis caulinis.

Hort. cliff. 226. *Fl. ſuec.* 452, 487. *Roy. lugdb.* 285.
T. foliis triplicato-pinnatis, patulis, obtuſe trilobatis, ſtipulis ovatis, paniculis umbellatis. *Hall. helv. n.* 1141.
T. fructibus triangularibus, pedicellatis, pendulis. *Crantz. auſtr. p.* 107. *n.* 3.
T. majus, florum ſtaminibus purpuraſcentibus. *Bauh. pin.* 337.
T. majus, folliculis anguloſis, caule laevi. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 487.
β. T. (*atro-purpureum*) fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti ſtricto pluries ramoſo nebuloſo. *Murr. ſyſt. veg. ed* 14. *p.* 513. *Iacq. hort.* 3. *t.* 61.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 321.
Akeleyblättriges Thalictrum. W.
Habitat in Scania, Helvetia, Auſtria, Gedani, Ingria. ♃ (v. v.)
Petala 4, *Stamina* 60, *Piſtilla* 16.
Stamina 56 *ad* 57. Piſtilla 7, 8, 10. *Crantz. l. c.* R.

20. THALICTRUM *contortum.*
T. fructibus pendulis triangularibus contortis, caule ſubancipiti. *Sp. pl.* 770.
T. hybridum ſeminibus contortis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 47.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 322.
Gedrehtes Thalictrum. W.
Habitat in Sibiria. *G. Demidoff.* ♃ (v. v.)
Petala 4, *Stamina* 60, *Piſtilla* 8, *antecedenti ſimile, ſed humilius floribus albis.*
Planta noſtra T. aquilegifolio eſt ſimillima ſed, folia *ſunt glauca*, floresque *albi, at ſemina nullo modo contorta ſed exacte cum iis T. aquilegifolii conveniunt. Numerus vero partium eſt idem ut eum Linnaeus indicavit.* Semina *vero imperfecta ſunt torta.* W.

21. THALICTRUM *petaloideum.*
T. ſcapo ſubumbellato, florum filamentis oblanceolatis coloratis anthera latioribus. *Sp. pl.* 77. *Pall. itin.* 3. *p.* 231.
β. T. (*ſtamineum*) ſtaminum filamentis petaliformibus lanceolatis. *Lin. ſuppl.* 271.
Dichtblütiges Thalictrum. W.
Habitat in Dauria. ♃ (v. ſ.)
Folia *radicalia duo, ſupradecompoſita ut in conge-*

neribus, ſed reliquis longe minora. Foliolis *ovatis, obtuſis, ſaepe trilobis.* Scapus *vix pedalis, ſtriatus, aphyllus, raro unico folio decompoſito et pedunculo laterali.* Flores *fere in umbellam terminalem congeſti.* Calyx *tetraphyllus, deciduus, rotundatus.* Stamina *numeroſa: Filamentis membranaceis, ſuperne magis dilatatis, coloratis, incarnatis Antheris latioribus.* Germina *ſeſſilia.*

T. ſtamineum ab hoc nullo modo eſt diverſum. W.

22. THALICTRUM *ſtyloideum.*

T. foliis tripartito-pinnatis, ſtylis baſi alatis. *Lin. ſuppl.* 271.

Breitgriffliges Thalictrum. W.

Habitat in Sibiria. ♃

Caulis *folio uno alterove.* Folia *radicalia et caulina tripartita, foliolis bipinnatis.* Pinnae *ſubcordatae tri-aut quinquedentatae.* Panicula *terminalis. Species diſtinctiſſima* ſtylis *ſubulatis utrinque baſi in alam ſemiorbicularem verticalem dilatatis.*

*23. THALICTRUM *japonicum.* †

T. ſeminibus laevibus, foliis tripinnatis, pinnulis inciſis ſerratis. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 337.

Didynamiſta Salviae ſimilis. *Thunb. jap.* 364. *n.* 74.

Japaniſches Thalictrum. W.

Habitat in Japonia.

1085. ADONIS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 952.

Cal. 4-phyllus. *Petala* quinis plura absque nectario. *Sem.* nuda.

1. ADONIS *aeſtivalis.*

A. floribus pentapetalis, fructibus ovatis. *Mill. dict. n.* 2. *Pollich. pal. n.* 525. *Schol. barb. n.* 452. *Mattuſch. ſil. n.* 401. *Doerr. naſſ. p.* 34. *Knorr. del* 2. *t. A.* 12. *Kniph. cent.* 5. *n.* 6. *Hoffm. germ.* 192. *Roth. germ. I.* 241. *II.* 623.

A. ſylveſtris, flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus. *Bauh. pin.* 178.

A. flore pallido. *Cam. epit.* 648.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 324.

Sommer-Adonis. W.

Habitat inter ſegetes Europae *auſtralis.* ☉ (v. v.)

Affinis nimium A autumnali. Flores rubri.

Datur *varietas floribus ochroleucis, baſi intus nigra vel violacea macula notatis, quam habet Scholl. l. c.* Petala 5 *ad* 8. R.

2. ADONIS *autumnalis.*

A. floribus octopetalis, fructibus ſubcylindricis. *Hort. upſ.* 156. *Scholl. barb. n.* 463. *Hoffm. germ.* 193. *Roth. germ. I.* 242. *II.* 623.

A. radice annua. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 488. *Dalib. pariſ.* 162. *Sauv. monſp.* 253.

Adonis miniata. *Iacq. auſtr.* 4. *t.* 354.

A. radice annua, flore octopetalo. *Hall. helv. n.* 1158.

A. annua. *Mill. dict. n.* 1.

A. flore majore. *Bauh. pin.* 178.

A. hortenſis, flore minore atro-rubente. *Bauh. pin.* 178.

Flos adonis. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 336.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 324.

Herbſt-Adonis. W.

Habitat inter ſegetes Europae *auſtralis.* ☉ (v. v.)

Flores *atropurpurei.* Planta *uniflora, ramis ſterilibus.*

Cum priori conjungit Crantz. auſtr. p. 11[illegible] R.

*3. ADONIS *flammea.*

A. floribus octopetalis, petalis lanceolatis acutis, fructibus cylindricis, caule hirto. W.

A. floribus octopetalis, calycibus hirſutis, fructibus cylindricis. *Murr. ſyſt. veg. ed.* 14. *p.* 514. *Iacq. auſt.* 4. *t.* 355. *Hoſt. ſynop.* 308.

Brennendrothe Adonis. W.

Habitat inter ſegetes Auſtriae. ☉

Radix *inſipida, quae amara in A. autumnali.* Caulis *hirtus.* Calyx *hirſutus.* Petala *lanceolata acuta, nec oblonga obtuſa, quandoque uno alterove dente inſtructa.* Fructus *cylindricus.* W.

4. ADONIS *vernalis.*

A. flore dodecapetalo: fructu ovato. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 200. *Mill. dict. n.* 3. *et. ic. t.* 14. *Scop. carn. n.* 678. *Pall. it.* 1. *p.* 62. *et it. p.* 388. *Mattuſch. ſil. n.* 402. *Blackw. t.* 504. *Kniph. cent.* 2. *n.* 2. *Hoffm. germ.* 193. *Roth. germ. I.* 242. *II.* 624.

A. radice perenni, flore dodecapetalo. *Hall. helv. n.* 1157. *Hort. cliff.* 231. *Fl. ſuec.* 456, 492. *It. oel.* 73. *Roy. lugdb.* 488. *Sauv. monſp.* 253. *Pollich. pal. n.* 526.

A. (*Helleborus*) perennis, petalis plus octo. *Crantz. auſtr. p.* 110.

A. ſeminibus aequalibus apice craſſioribus, infra apicem ſtylatis, hirſutis. *Gouan. illuſtr.* 33.

A. apennina. *Iacq. auſtr. t.* 44. *ſec. Linneum in Syſt. Veg. p.* 427. R.

Helleborus niger tenuifolius, buphthalmi flore. *Bauh. pin.* 186.

Bupthalmum. *Dod. pempt.* 261.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 7. *p.* 325.

Frühlings-Adonis. W.

Habitat in Oelandiae, Boruſſiae, Bohemiae, Germaniae, Helvetiae, *collibus apricis.* ♃ (v. v.)

Haec Soror A. apenninae, ut A. aeſtivalis eſt A. autumnalis.

5. ADONIS *apennina.*

A. floribus pentdecapetalis, fructu ovato. *Pall. itin.* 2 *p.* 93. *et* 388. *Kniph. cent.* 3. *n.* 2. *Gmel. it.* 1. *p.* 81.

A. ſeminibus angulatis acuminato-mucronatis glabris. *Gouan. illuſtr. p.* 33. R.

Helleborus niger ferulaceus, caule geniculato, flore magno tulipae minoris inſtar. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 1.

Houttuyn Lin. Pſl. Syſt. 7. *p.* 328.

Apenniniſche Adonis. W.

Habitat in Sibiria, Apenninis. ♃ (v. ſ.)

Planta *multiflora; ramis ſcilicet etiam floriferis.*

Difficillime diſtinguuntur plantae 5 *et* 4 *ſimillimae.* Caulis 4 *adſperſus pilis;* 5 *punctis farinoſis pellucidis.* Rami 4 *ex caulis parte inferiore:* 5 *ex alis ſuperioribus.* Pedunculus 4 *breviſſimus;* 5 *longior.* Folia *in* 4 *minus pinnata;* 5 *magis diviſa, latiora, nitidiora.* Calyx *in* 4 *griſeus ſtriatus villoſus concavus;* 5 *luteo-vireſcens, glaber, avenius, planus.* Petala *in* 4 *lanceolata, ſaepius duodecim;* 5 *ovata, imbricata, ſaepius quindecim.* Flos *in* 4 *unicus; in* 5 *plures.* Stamina *in* 5 *valde reflexa.* Planta 5 *diutius aeſtate durat,* 4 *vero vernalis eſt.*

6. ADONIS *filia.*

A. foliis bipinnatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *Lin. ſuppl.* 271.

Mohrrübenblättrige Adonis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Filia *A. capenſis, cui adeo ſimilis, ut ne quidquam differat caule, umbella, calyce, petalis, ſtaminibus.* Folia *umbellatarum (Dauci) pinnata.* Folia *partialia* inferiora *longius petiolata.* Folia *propria pinnatifida.* Pinnae *inaequales.*

7. ADONIS *capenſis.*

A. foliis biternatis, foliolis ſubcordatis. *Lin. ſuppl.* 272.

A. floribus decapetalis, fructibus depreſſis, foliis duplicato-ternatis foliolis ſerratis cordatis. *Sp. pl.* 772. *Berg. cap.* 149.

Actaea trifoliata hirſuta, foliis ſcabris, flore ſulphureo rariore. *Burm. afr.* 147. *t.* 51.

Chriſtophoriana africana ranunculoides, foliis rigidis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 62.

Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo vireſcentibus. *Comm. hort.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *Raj. ſuppl.* 316.

Ranunculus perelegans Franqueville, foliis aculeatis. *Lob. illuſtr.* 135. *

Aſtrantia africana, laſerpitii foliis latioribus rigidis et ſpinoſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 279.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 328.

Capiſche Adonis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃ (v. ſ.)

Folia *biternata, radicalia: foliolis ſubcordatis, ſerratis, rigidis: Petiolis hirtis.* Scapi *aphylli, teretes, piloſi, terminati* Umbella *compoſita.* Involucra *et* Involucella *hexaphylla, lanceolata.* Pedunculi *partiales tres exteriores; tres interiores et unicus centralis uniflorus; reliqui quadriflori.* Calyx 5-*phyllus, ovato-oblongus, concavus, albidus.* Petala 10, *lanceolata, alba, calyce duplo longiora.* Filamenta *multa, linearia, petalis ½ breviora.* Antherae *binae, ovatae, parvae.* Piſtilla *multa, in capitulum congeſta.* Styli *extrorſum flexi, longitudine ſtaminum.* Stigmata *obtuſa.* Foliatio *involuta.*

8. ADONIS *veſicatoria.*

A. foliis biternatis, foliolis ſerratis glabris, floribus decapetalis. *Lin. ſuppl.* 272. *Ait. Kew.* 2. *p.* 264.

Imperatoria ranunculoides africana enneaphyllos, Laſerpitii lobatis foliis rigidis margine ſpinoſis. *Pluk. alm.* 198. *t.* 95. *f.* 2.

Blaſenziehende Adonis. W.

Habitat ad Cap. b. ſpei. ♃

Folia *Afris pro Veſicatoriis adhibentur.*

1086. RANUNCULUS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 953.

Cal. 5-phyllus. *Petala* 5, intra ungues poro mellifero. *Sem.* nuda.

* *Foliis ſimplicibus.*

1. RANUNCULUS *Flammula.*

R. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Hort. cliff.* 228. *Fl. ſuec.* 458, 493. *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. pariſ.* 163. *Pollich. pal. n.* 527. *Reyg. ged.* 1. *p.* 143. *Scop. carn. n.* 682. *Flor. dan. t.* 575. *Hoffm. germ.* 193. *Roth. germ. I.* 237. *II.* 609.

R. foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *Fl. lapp.* 325.

R. caule declinato, foliis elliptico-lanceolatis, ſubſerratis. *Hall. helv. n.* 1182.

R. foliis ſubintegerrimis, calycibus pentaphyllis coloratis: floribus hexapetalis. *Neck. gallob. p.* 238.

R. longifolius paluſtris minor. *Bauh. pin.* 180.

Flammula Ranunulus. *Dod. pempt.* 432.

β. Ranunculus paluſtris, foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 180. *Dodon. pempt.* 433.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 330.

Beiſsender Ranunkel. W.

Habitat in Europae *paſcuis udis.* ♃ (v. v.)

2. RANUNCULUS *reptans.*

R. foliis linearibus, caule repente. *Fl. lapp.* 236. *t.* 3. *f.* 5. *Fl. ſuec.* 459, 495. *Mattuſch. ſil.* 405. *Fl. dan. t.* 108. *Kniph. cent.* 9. *n.* 83. *Hoffm. germ.* 193. *Roth. germ. I.* 237. *II.* 610.

R. caule reptante, foliis linearibus, faſciculatis. *Hall. helv. n.* 1183.

R. flammeus minimus, ſpergulae folio. *Buxb. cent.* 5. *app.* 41.
R. repens, gramineis foliis, e ſingulis geniculis radices agens. *Amm. ruth.* 80. *t.* 13. *f.* 1.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 331.
Feinblättriger Ranunkel. W.
Habitat in Suecia, Ruſſia, Helvetia, Germania *ad ripas lacuum, antecedenti valde affinis et forte varietas.* ♃ (v. ſ.)
Non eſt varietas praecedentis, differt caule *filiformi repente*, foliis *linearibus in petiolum attenuatis integerrimis*, pedunculis *uncialibus unifloris ſolitariis erectis*, floribus *multo minoribus.* W.

3. RANUNCULUS *Lingua.*
R. foliis lanceolatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 228. *Fl. ſuec.* 457. *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. pariſ.* 163. *Scop. carn. n.* 683. *Pollich. pal. n.* 528. *Crantz. auſtr. p.* 120. *n.* 19. *Flor. dan. t.* 755. *Hoffm. germ.* 193. *Roth. germ. I.* 237. *II.* 610.
R. erectus, ramoſus, foliis enſiformibus, ſubſerratis. *Hall. helv. n.* 1181.
R. longifolius paluſtris major. *Bauh. pin.* 34.
R. lanceolatus major. *Tabern. ic.* 48.
β. R. flammeus, latiori plantaginis folio marginibus piloſis. *Pluk. alm.* 312.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 331.
Groſser Ranunkel. W.
Habitat in Europae *borealioris foſſis, aquis limoſis.* ♃ (v. v.)
Caulis *ramoſus, folioſus, ſaepe ſeſquipedalis.* Folia *ſubdenticulata, ſcabra pilis brevibus appreſſis.* Pedunculi *oppoſitifolii uniflori.*

4. RANUNCULUS *nodiflorus.*
R. foliis ovatis petiolatis, floribus ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 228. *Dalib. pariſ.* 164.
R. pariſienſis pumilus, plantaginellae folio. *Pet. gaz.* 40. *t.* 25. *f.* 4. *Vaill. act.* 1719. *p.* 52. *t.* 4. *f.* 4.
β. R. ſiculus, folio rotundo vix ſerrato. *Pet. gaz.* 39. *t.* 24. *f.* 9.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 332.
Knotenblütiger Ranunkel. W.
Habitat Pariſiis *et in* Siciliae *locis paludoſis.* (v. ſ.)
Habitu Limoſellae aquaticae haud diſſimilis. W.

5. **RANUNCULUS** *gramineus.*

R. foliis lanceolato - linearibus indiviſis, caule erecto laeviſſimo paucifloro. *Syſt. veg.* 428. *Mill. dict. n.* 5.
R. foliis lanceolato - linearibus ſeſſilibus, caule erecto, radice bulboſa. *Sp. pl.* 2. *p.* 773. *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489. *Dalib. pariſ.* 163. *Sauv. monſp.* 75.
R. foliis lanceolato - linearibus ſeſſilibus, caule erecto, radice faſciculata. *Ger. prov.* 384.
Ranunculus, gramineo folio, bulboſus. *Bauh. pin.* 181.
β. R. montanus gramineo folio. *Bauh. pin.* 180.
γ. R. montanus, folio gramineo, multiplex. *Bauh. pin.* 181.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 333.
Grasblättriger Ranunkel. W.
Habitat in Galliae *pratis udis.* ♃ (v. ſ.)

Folia *lanceolato - linearia, ſubnervoſa ſ. ſtriata.* Caulis *teres, non ſtriatus.* Flores *lutei* 1, 2, 3, *minime albi.*

Diſtinguendus floribus luteis, radice tuberoſa a R. pyrenaeo, *qui eſt floribus albis, radice bulboſa.*

6. **RANUNCULUS** *pyrenaeus.*

R. foliis linearibus indiviſis, caule erecto ſtriato ſubbifloro. *Mant.* 248. *Iacq. miſcell.* 1. *p.* 154. *t.* 18. *f.* 1. *Villars delph.* 3. *p.* 732.
R. foliis radicalibus lineari - lanceolatis nervoſis, ſcapo unifloro, germinibus uncinatis. *Hohenwarth et Reiner. it.* 1. *p.* 187. *
Ranunculus plantagineus. *Allion. pedem. n.* 1445. *t.* 76. *f.* 1.
R. radicibus faſciculatis: imo caule reticulato, foliis gramineis. *Hall. helv. n.* 1180.
R. foliis linearibus, caule ſubnudo, radice faſciculata comoſa. *Ger. prov.* 384.
R. alpinus pumilus, gramineo folio, flore albo. *Tournef.* 292.
R. pumilus gramineis foliis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 850.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 333.
Pyrenäiſcher Ranunkel. W.
Habitat in Pyrenaeis *inque alpibus* Helvetiae, Delphinatus, Carinthiae. ♃ (v. ſ.)

Radix *ſubbulboſa, obducta reticulo tomentoſo: Radiculis faſciculatis.* Caulis *erectus, filiformis, laevis, digitalis folio uno alterove.* Folia *radicalia et caulina*

linearia, *indiviſa*, *integerrima*, *laevia*, *erecta*, *pollicaria*. Flos *terminalis* 1 *ſ*. 2. *pedunculatus*, *parvus*, *albus*. Fructus *ſubrotundus*. Stamina *ſubrotunda*, *mucronata*.

Allionii icon repraeſentat plantam duplo majorem foliisque latiſſimis. W.

7. RANUNCULUS *parnaſſifolius*.

R. foliis nervoſis, radicalibus ſubrotundo-ovatis ſubcordatis, caulinis ſeſſilibus ovato-lanceolatis. W.

R. foliis ſubovatis nervoſis lineatis integerrimis petiolatis, floribus umbellatis. *Sp. pl.* 774. *Gouan. illuſtr. p.* 34. *Villars delph.* 3. *p.* 733.

R. caule multifloro hirſuto, foliis radicalibus petiolatis ovatis integerrimis ſupra hirſutis, ſubtus nervoſis, calycibus purpureis. *Wulffen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 191. *t.* 9. *f.* 3. * *Hohenwarth et Reiner itin.* 1. *p.* 190. *t.* 5. *

R. radicibus faſciculatis, imo caule reticulato, foliis cordiformibus. *Hall. helv. n.* 1179. *ſec. Gouan.* R.

R. montanus, graminis parnaſſi folio. *Tornef. inſt.* 286.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 334.

Parnaſſienblättriger Ranunkel. W.

Habitat in alpibus Helveticis, Delphinatus, Carinthiae *inque* Pyrenaeis. ♃ (v. ſ.)

Gemma *radicalis promit* Folia *duo*, *lanceolata*, *membranacea*, *ſupra terram eminentia*. Folia *ovata*, *obtuſa*, *coriacea*, *nervoſa*, *integerrima*, *ſupra pubeſcentia*, *imprimis baſi involuta*, *longius petiolata*. Caulis *ſimpliciſſimus*, *indiviſus*, *aphyllus*. Involucrum *terminale*, *diphyllum*. Pedunculi 2 — 4, *uniflori*, *pubeſcentes*. Calyx *purpuraſcens*. Corolla *albida vel purpuraſcens nervis purpureis*.

*8. RANUNCULUS *ophioglоſſoides*.

R. caule ſimplici erecto, foliis nervoſis, inferioribus ovatis ſubcordatis petiolatis, floralibus ſeſſilibus lanceolatis. W.

R. (*ophioglоſſifolius*) foliis integerrimis obtuſis, imis cordatis, caulinis ovato-lanceolatis, ſupremis linearibus, caule erecto. *Villars delph.* 3. *p.* 731. *t.* 49. *

Natterzungenblättriger Ranunkel. W.

Habitat in alpibus Delphinatus. ♃

Accedit ad praecedentem, *differt vero*, *licet foliis*

inferioribus conveniat: foliis *caulinis petiolatis, petiolis dilatatis*, foliis *floralibus lanceolatis*, caule *erecto*, floribus *triplo minoribus luteis, denique radice fuſiformi.* W.

9. RANUNCULUS *amplexicaulis.*

R. foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus, caule multifloro, radice faſciculata. *Hort. cliff.* 229. *Roy. lugdb.* 484. *Sauv. monſp.* 76. *Kniph. cent.* 2. *n* 66.

R. montanus, folio plantaginis. *Bauh. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 444. *ſ.* 4. *t.* 30. *f.* 36.

R. dulcis, foliis latis rapiſtri perfoliatis, floribus albis. *Mentz. pug. t.* 8. *f.* 8.

R. pyrenaeus flore albo. *Cluſ. curr. app. alt.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 334.

Stengelumfaſſender Ranunkel. W.

Habitat in Helvetia, Pyrenaeis, Apenninis. ♃ (v. v.)

10. RANUNCULUS *bullatus.*

R. foliis ovatis ſerratis, ſcapo nudo unifloro. *Sp. pl.* 774. *Hort. cliff.* 229. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 435. *

R. latifolius bullatus, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 181.

R. luſitanicus. *Dod. pempt.* 429.

R. grumoſa radice 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 238.

β. R. latifolius bullatus autumnalis, flore pleno et prolifero. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 247. *ſ.* 4. *t.* 31. *f.* 49. 50. 51.

R. luſitanicus, folio ſubrotundo, parvo flore. *Tournef. inſt.* 286.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 335.

Blaſiger Ranunkel. W.

Habitat in Luſitania, Creta, *inque* Africa *boreali.* ♃

*11. RANUNCULUS *ſalſuginoſus.*

R. foliis ovatis ſubcordatisve apice tri- ſeu quinquedentatis, caule repente. W.

Ranunculus ſalſuginoſus. *Pall. itin. ed. min.* 3. *p.* 173.

R. (*plantaginifolius*) foliis cordato-ovatis, apice vel integris vel tridentatis, flagellis reptantibus. *Murr. comment. goett.* 1777. *p.* 39. *t.* 2. *

R. (*ruthenicus*) foliis ovatis ad apicem paucidentatis, caule repente. *Iacq. hort.* 3. *p.* 19. *t.* 31. *

R. foliis petiolatis ovatis integris aut varie inciſis, pedunculis radicatis nudis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 205.

R. repens flore in caule ſingulari, foliis varie ſectis. *Amman. ruth. p.* 81. *n.* 107. *t.* 13. *f.* 2.

Salz-Ranunkel. W.

Habitat locis ſalſis in Sibiria *transbaicalenſi.* ♃ (v. ſ.)

[redacted]




IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

6"

Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

12. RANUNCULUS *Ficaria.*

R. foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 460, 496. *Hort. cliff.* 228. *Mat. med.* 141. *Roy. lugdb.* 490. *Dalib. pariſ.* 167. *Oed. dan. t.* 499. *Gort. ingr. p.* 88. *Scop. carn. n.* 684. *Pollich. pal. n.* 529. *Ludw. ect. t.* 52. *Kniph. cent.* 1. *n.* 73. *Hoffm. germ.* 194.

R. calycibus triphyllis cucullatis. *Crantz. auſtr. p.* 120.

R. foliis radicalibus glabris cordato-ſubrotundis anguloſis ſ. integerrimis: pedunculis unifloris. *Neck. gallob. p.* 237.

Ficaria. *Hall. helv. n.* 1160. *Blackw. t.* 51.

Ficaria ranunculoides. *Roth. germ. I.* 241. *II.* 622.

Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.

Chelidonium minus. *Fuchſ. hiſt.* 866.

β. Chelidonia rotundifolia major. *Bauh. pin.* 209. *prodr.* 137.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 336.

Feigwarzen-Ranunkel. W.

Habitat in Europae *ruderatis, umbroſis, ſpongioſis.* ♃ (v. v.)

*13. RANUNCULUS *frigidus.* W.

R. foliis radicalibus cuneiformi-ovatis apice quinquedentatis, caulinis ſeſſilibus palmatis. W.

Kalter Ranunkel. W.

Habitat in Sibiriae *alpibus.* ♃ (v. ſ.)

Hunc ſub nomine R. gracilis accepi, cui floris magnitudine et forte colore ſimilis, tamen foliis abunde diſtinctus. Folia *radicalia plura petiolata vix ſemiuncialia ovato-cuneiformia integerrima, apice truncata dentibusque quinque magnis obtuſis inſtructa.* Caulis *erectus uni-vel biflorus.* Folia *caulina bina vel terna alterna remota ſeſſilia baſi cuneiformia profunde quinqueloba, lobis lanceolatis integerrimis acutiuſculis.* Calycis *foliola elliptica obtuſa hirſuta.* Petala *obcordata calyce majora videntur alba in ſpecimine ſicco.* W.

14. RANUNCULUS *Thora.*

R. foliis reniformibus ſubtrilobis crenatis: caulino ſeſſili, floralibus lanceolatis, caule ſubbifloro. *Sp. pl.* 775. *Scop. carn. n.* 685. *Hoffm. germ* 194. *Iacq. auſtr.* 5. *t.* 442. *Villars delph.* 3. *p.* 729.

R. foliis duris, venoſis, reniformibus, rotunde crenatis, convexitate retuſa, acute ſerrata. *Hall. helv.* 1178.

R. foliis inferioribus ſubrotundo-reniformibus, crenatis; floralibus lanceolatis integerrimis, caule inferne nudo. *Jacq. vind.* 249. *obſ.* 1 *p.* 25. *t.* 13.
R. Pthora *Crantz. auſtr. p.* 119. *n.* 17.
Aconitum pardalianches 1, ſ. Thora major. *Bauh. pin.* 184.
Thora major. *Cam. epit.* 825.
Pthora valdenſium. *Lob. ic.* 604. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 239.
β. Aconitum pardalianches alterum, ſ. Thora minor. *Bauh. pin.* 184.
Thora minor. *Cam. epit.* 826.
Limeum pardalianches genus, uno tantum folio. *Dalech. hiſt.* 1738.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 338.
Giftiger Ranunkel. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Auſtriacis *et* Delphinatus. ♃ (v. ſ.)

Calyx *coloratus, reflexus.* Plantae *α. β. conjunguntur ab Hallero, diſtinguuntur a Seguiero.*

* * *Foliis diſſectis et diviſis.*

15. RANUNCULUS *creticus.*

R. foliis radicalibus reniformibus crenatis ſublobatis, caulinis tripartitis lanceolatis integerrimis, caule multifloro. *Sp. pl.* 775. *Mill. dict. n.* 3.
R. foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis tripartitis ſeſſilibus lanceolatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 490.
R. aſphodeli radice, creticus. *Bauh. pin.* 181.
R. creticus latifolius. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 239.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 339.
Candiſcher Ranunkel. W.
Habitat in Creta. ♃ (v. ſ.)

Tota planta hirſuta. Folia *radicalia ampla quatuor uncias longa et quinque uncias lata, reniformia, leviter ſeptemloba, lobis obtuſiſſimis trifidis laciniis obſolete tridentatis.* Caulis *erectus ramoſus ſeſquipedalis et forte ultra, pennae anſerinae craſſior.* Folia *caulina baſi cuneiformiter attenuata profunde tripartita, lobis oblongis obtuſis divaricatis integerrimis vel interdum trifidis.* Corolla *flava magnitudine R. Linguae.* Petala *ſubrotunda.* W.

16. RANUNCULUS *caſſubicus.*

R. foliis radicalibus ſubrotundo-cordatis crenatis; caulinis digitatis dentatis, caule multifloro. *Sp. pl.* 775. *Reyg. ged.* 1. *p.* 143. *n.* 4.

Ranunculus rotundifolius vernus ſylvaticus major vel caſſubicus, folio thorae calthae. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 45.

R. aconitifolius folio rotundo ad radicem praeſtolante. *Loeſel pruſſ.* 225. *t.* 72.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 340.

Caſſubiſcher Ranunkel. W.

Habitat in Caſſubia, Sibiria, Gedani. ♃

Simillimus videtur ſequenti, ſed ſecundum Loeſelii iconem Foliola *caulina ſunt lanceolata dentata, nec linearia integerrima.* W.

17. RANUNCULUS *auricomus.*

R. foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.* 229. *Fl. ſuec.* 462, 498. *Roy lugdb.* 490. *Dalib. pariſ.* 167. *Leyſ. hal.* 487. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 202. *n.* 47. *Crantz. auſtr. p.* 112. *Gort. ingr. p.* 89. *Scop. carn. n.* 687. *Pollich. pal. n.* 530. *Fl. dan. t.* 665. *Kniph. cent.* 2. *n.* 67. *Hoffm. germ.* 194. *Roth. germ. I.* 238. *II.* 611.

R. foliis radicalibus integris et ſemitrilobatis, rotunde crenatis, caulinis multipartitis linearibus integerrimis. *Hall. helv. n.* 1177.

R. rotundifolius vernus ſylvaticus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 341. R.

R. nemoroſus ſ. ſylvaticus, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 178.

Ranunculus 1 ſylveſtris. *Dalech. hiſt* 1028.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 340.

Verſchiedenblättriger Ranunkel. W.

Habitat in Europae *paſcuis humidiuſculis.* ♃ (v. v.)

Flores *nobis menſe Frondeſcentiae apetali, Floreſcentiae di- tripetali, Groſſificationis pentapetali.* Folium *radicale cordatum.*

18. RANUNCULUS *abortivus.*

R. foliis radicalibus cordatis crenatis, caulinis ternatis angulatis, caule ſubtrifloro. *Sp. pl.* 776.

R. foliis radicalibus crenatis, caulinis digitatis petiolatis. *Roy. lugdb.* 490.

R. foliis radicalibus reniformibus crenatis petiolatis; caulinis paucis digitatis ſeſſilibus. *Gron. virg.* 166.
R. virginianus, flore parvo, molliori folio. *Herm. lugdb.* 514.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 341.
Virginiſcher Ranunkel. W.
Habitat in Virginia, Canada.

*19. RANUNCULUS *trilobus*.
R. caule erecto, foliis glabris, caulinis trilobis, pedunculis ſtriatis, ſeminibus compreſſis tuberculoſis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 437. *t.* 113.
Dreylappiger Ranunkel. W.
Habitat in arvis humidis prope Mayane *in* Africa *boreali.* ♃

Radices *fibroſae numeroſae.* Caulis *erectus glaber ſtriatus fere pedalis.* Folia *glabra; radicalia crenata; caulina inferiora et media petiolata, profunde triloba, lobis cuneiformibus, inaequaliter dentatis; ſuperiora laciniata, laciniis anguſto-lanceolatis.* Pedunculi *ſtriati uniflori.* Flores *minimi.* Corolla *lutea.* Semina *in capitulum rotundum aggregata parva compreſſa orbiculata cum acumine, utrinque tuberculoſa. Affinis R. parvifloro, differt:* caule *erecto,* foliis *caulinis glabris profunde trilobis.* Desfont. l. c.

20. RANUNCULUS *ſceleratus*.
R. foliis inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis. *Hort. cliff.* 230. *Fl. ſuec.* 463, 499. *Roy. lugdb.* 490. *Gron. virg.* 63. *Dalib. pariſ.* 167. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 203. *t.* 83. *f. a. Gunn. norv. n.* 84. *Scop. carn. n* 688. *Pollich. pal. n.* 531. *Doerr. naſſ. p.* 193. *Fl. dan. t.* 371. *Hoffm. germ.* 194. *Roth. germ. I.* 238. *II.* 612.
R. foliis levibus, ſemitrilobatis, rotunde ſerratis, fructu ovato. *Hall. helv. n.* 1175.
R. fructu oblongo impatiente. *Crantz auſtr. p.* 111.
R. paluſtris. *Tabern.* 42. *Blackw. t.* 259.
R. paluſtris, apii folio, laevis. *Bauh. pin.* 180.
R. ſylveſtris 1. *Dod. pempt.* 426.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 342.
Blaſenziehender Ranunkel. W.
Habitat ad Europae *foſſas et paludes.* ☉ (v. v.)

21. RANUNCULUS *aconitifolius*.
R. foliis quinquelobis dentatis, lobis acuminatis, inter-

mediis trifidis, floralibus ſummis digitatis ſeſſilibus lanceolatis. W.

R. foliis omnibus quinatis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Hort. cliff.* 229. *Hort. upſ.* 156 *Fl. ſuec.* 2. *n.* 497. *Roy. lugdb.* 490. *Scop. carn. n.* 680. *Pall. itin.* 2. *p.* 568. *Crantz. auſtr. p.* 112. *n.* 4. *Pollich. pal. n.* 532. *Mattuſch. fil. n.* 409. *Hoffm. germ.* 195. *Roth. germ. I.* 238. *II.* 613.

R. caule ramoſo multifloro, foliis venoſis, quinquelobis, lobis rhomboideis, acutis, acute ſerratis. *Hall. helv. n.* 1164.

R. albus, folio denſo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 860.

R. montanus, aconiti folio, albus, flore minore. *Bauh. pin.* 182.

R. montanus 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 236.

β. R. folio aconiti, flore albo multiplici. *Bauh. pin.* 179. *Kniph. cent.* 2. *n.* 65.

R. pleno flore albo. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 236.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 344.

Eiſenhutblättriger Ranunkel. W.

Habitat in alpibus Helvetiae, Galliae, Auſtriae, Sileſiae *inque montibus* Thuringiae. ♃ (v. v.)

Similis *R. platanifolio, ſed* folia *quinquepartita ad petiolum uſque, et* caulis *dimidio brevior. Ioh. Bauh.*

Simillimus ſequenti at diverſus : foliorum *lobis acuminatis, foliorum* floralium *ſummorum laciniis lanceolatis,* corolla *duplo minori. Ceterum conveniunt,* foliis *radicalibus* 5-7-*vel*-9-*lobis, lobis tribus vel quinque intermediis leviter tripartitis,* floribus *albis*. W.

22. RANUNCULUS *platanifolius.*

R. foliis quinquelobis dentatis, lobis obtuſis, intermediis trifidis, floralibus ſummis digitatis ſeſſilibus lineari-ſubulatis. W.

R. foliis palmatis laevibus inciſis, caule erecto, bracteis linearibus. *Mant.* 79. *Oed. dan. t.* 111. *Gouan. illuſtr.* 35.

R. montanus, aconiti folio, flore majore. *Bauh. pin.* 182.

R. montanus albus. *Dalech. hiſt.* 1031.

R. albus flore ſimplici, ſ. batrachium album. *Tabern.* 43. *ex Gouan.* R.

R. albus flore ſimplici. *Lob. ic.* 668. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 859.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 345.
Platanusblättriger Ranunkel. W.
Habitat in Germaniae, Italiae *alpinis, et* Pyrenaeis. ♃ v. ſ.)

Statura *R. aconitifolii, floribus itidem albis, ſed* Folia *non compoſita, verum palmata, minus craſſa, magis inciſa:* Flores *majores.*

*23. RANUNCULUS *ſpicatus.*

R. foliis quinquelobis dentatis, caule ſimplici, ſeminibus ſpicatis. W.

R. foliis radicalibus rotundatis lobatis inciſis, caule ſimplici villoſo paucifloro, ſeminibus longe ſpicatis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 438. *t.* 115.

Aehrenſamiger Ranunkel. W.

Habitat in paludibus Algeriae. ♃

Radices *bulboſae.* Bulbi *numeroſi faſciculati oblongi.* Folia *radicalia petiolata villoſa orbiculata, baſi emarginata inaequaliter lobata, inciſa et crenata, crenulis rotundatis.* Caulis *erectus villoſus, leviter ſtriatus ſimplex, folia bi - aut quadripartita emittens, quandoque aphyllus.* Pedunculi *pauci uniflori.* Calyx *pentaphyllus villoſus.* Corolla *lutea magnitudine R. acris.* Petala 5 *obovata apice rotundata.* Semina *plana marginata in ſpicam denſam cylindraceam ſeſquiuncialem diſpoſita.* Desf. l. c.

24. RANUNCULUS *illyricus.*

R. foliis ſericeo - villoſis ternatis, foliolis trifidis inciſis integerrimis, calyce reflexo. W.

R. foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *It. oel.* 71. *Fl. ſuec.* 471, 500. *Iacq. auſtr. t.* 222. *Pall. itin.* 3. *p.* 584. *Hoffm. germ.* 195. *Roth. germ. I.* 238. *II.* 613.

R. foliis tripartitis: laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Sauv. monſp.* 181.

R. foliis digitato - tripartitis, laciniis lanceolatis, integerrimis, calyce reflexo. *Crantz. auſtr. p.* 113. *n.* 5.

R. lanuginoſus anguſtifolius, grumoſa radice, major et minor. *Bauh. pin.* 181.

R. grumoſa radice 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 240.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 346.

Illyriſcher Ranunkel. W.

Habitat in Oelandia, Hungaria, Narbona, Italia, Auſtria. ♃ (v. v.)

*25. RANUNCULUS *flabellatus.*

R. foliis ſimplicibus dentatis, ternatisque, foliolis laciniatis, caule ſimplici. W.

R. caule ſimplici hirſuto, foliis radicalibus flabelliformibus inciſo-lobatis, caulinis paucis multipartitis, caule ſubunifloro. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 338. *t.* 114. *

Fächerblättriger Ranunkel. W.

Habitat circa Algeriam *in collibus incultis et humidis.* ♃

Simillimus R. aſiatico, differt vero: caule *ſimplici ſubunifloro,* Foliis *primordialibus cuneiformi-ovatis indiviſis inaequaliter dentatis baſi integerrimis,* Calycinis *foliolis ovatis acutis nec lanceolatis,* Corolla *flava,* Capitulo *ſeminum elliptico nec cylindraceo.* W.

26. RANUNCULUS *aſiaticus.*

R. foliis ternatis biternatisque: foliolis trifidis inciſis caule inferne ramoſo. *Sp. pl.* 777. *Mill. dict. n.* 11. *et ic. t.* 216.

R. foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoſo, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230. *Hort. upſ.* 156. *Roy. lugdb.* 490.

R. grumoſa radice, ramoſus. *Bauh. pin.* 181.

R. aſiaticus polyclonos ſ. grumoſa radice 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 241.

β. R. grumoſa radice, flore flavo vario. *Bauh. pin.* 181.

γ. R. grumoſa radice, flore albo. *Bauh. pin.* 181.

δ. R. grumoſa radice, flore albo leviter crenato. *Bauh. pin.* 181.

ε. R. grumoſa radice, flore niveo. *Bauh. pin.* 181.

ζ. R. grumoſa radice, flore phoeniceo minimo ſimplici. *Bauh. pin.* 131.

η. R. aſphodeli radice, flore ſanguineo. *Bauh. pin.* 181.

R. (*ſanguineus*) foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis obtuſis, caule ſimplici. *Mill. dict. n.* 10.

θ. R. aſphodeli radice, flore ſubphoeniceo rubente. *Bauh. pin.* 181.

R. aſphodeli radice, prolifer miniatus. *Bauh. pin.* 181. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 347.

Garten-Ranunkel. W.

Habitat in Aſia *et* Mauritania. ♃ (v. v.)

Caulis *erectus, ramoſus, pubeſcens, teres uti* Pedunculi. Folia *infima ſimplicia, lobata, inciſa, acuta, ſubtus pubeſcentia ut* Petioli, *ſuperiora tripartita et biternata.* Calyx *non reflexus.* Flos *coronarius.*

*27. RANUNCULUS *japonicus.*

R. foliis inciſo-ternatis, lobis inciſis dentatis, cauleque hirſuto. *Thunb. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. *p.* 337.
Ranunculus aſiaticus. *Thunb. jap.* 241.
Japaniſcher Ranunkel. W.
Habitat in Japonia. ♃

Folia *radicalia rotundata, ſuprema fiſſa, laciniis lanceolatis, omnia trifida, laciniis iterum inciſis, dentata acuta utrinque hirſuta.* Petioli *pollicares usque pedales hirſuti.* Caules *ſtriati hirſuti vix folioſi flexuoſi, apice ramoſi in pedunculos.* Thunb. Act. l. c.

28. RANUNCULUS *rutaefolius.*

R. foliis pinnatis ternatisque, foliolis tripartito-multifidis inciſis, caule ſubſimplici, corolla polypetala, radice tuberoſa. W.
R. foliis ſupradecompoſitis, caule ſimpliciſſimo unifolio unifloro, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Mill. dict. n.* 6. *Crantz. auſtr. p.* 113. *n.* 6. *Allion. ped. n.* 1451. *t.* 67. *f.* 1.
R. foliis pinnatim decompoſitis, caule unifloro. *Villars. delph.* 3. *p.* 740. *
R. caule ſubtrifloro, foliis bipinnatis, pinnis ſeſſilibus lateſcentibus lobatis ſubpalmato-multifidis, radice fuſiformi longe undique fibroſa. *Wulffen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 186. *t.* 6. *et* 7. *
R. caule unifloro, foliis imbricatis pinnatis, pinnis lobatis, obtuſe palmatis. *Hall. helv. n.* 1165.
R. rutaceo folio, flore ſuave rubente. *Bauh. pin.* 181. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 448. *ſ.* 4. *t.* 31. *f.* 54.
R. alpinus coriandrifolio. *Pona bald.* 341. *Barr. ic.* 456.
R. folio rutaceo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 414.
R. praecox 1, rutae folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 232. *mala.*
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 347.
Rautenblättriger Ranunkel. W.
Habitat in alpibus Auſtriae, Delphinatus, Helvetiae. ♃ (v. ſ.)
Flos *albus.*

Caulis *plerumque uniflorus et unifolius, tamen ſaepius caule trifloro occurrit teſte Clariſſ. Wulffen; et ego ſpecimen e Sibiria habeo caule ramoſo.* Corolla *eſt ſemper decem vel-octopetala.* W.

29. RANUNCULUS *glacialis.*

R. foliis ternatis; foliolis tripartito-multifidis, caulinis ſeſſilibus, caule ſubtrifloro, calycibus hirſutis. W.

R. calycibus hirſutis, caule bifloro, foliis multifidis. *Fl. ſuec.* 464, 501. *Fl. dan. t.* 19.

R. caule bifloro, calyce hirſuto. *Fl. lapp.* 233. *t.* 3. *f.* 1.

R. caule ſubtrifloro, foliis repetito-trilobatis pulpoſis, calyce hirſuto. *Wulffen in Iacq. Collect.* 1. *p.* 189. *t.* 8. *et t.* 9. *f.* 1. 2.* *Hohenwarth et Reiner it.* 1. *p.* 193. *Hoſt. ſynop.* 311.

R. calycibus hirſute villoſis, caule ſubbifloro, foliis tripartitis, foliolis trifidis, laciniis ſubtrilobatis, lobis ſubacutis. *Schrank. ſalisb.* n. 519. *

R. foliis ternatim decompoſitis, foliolis carnoſis, intermediis ſimplicibus, caule multifloro. *Villars. delph.* 3. *p.* 738. *

R. foliis pulpoſis repetito-trilobatis, calycibus villoſis. *Hall. helv. n.* 1166.

R. montanus purpureus calyce villoſo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 861. *Scheuch. alp.* 139. *t.* 20. *f.* 1. *Tournef. inſt.* 289.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 348.

Gletſcher-Ranunkel. W.

Habitat in ſummis alpibus Lapponiae, Helvetiae, Delphinatus, Auſtriae, Salisburgi. ♃ (v. ſ.)

Figura foliorum in Flora lapponica et Flora danica non eſt optima, ut primo intuitu diverſam eſſe ſpeciem crediderim, ſed ſpecimina ſicca lapponica quae poſſideo, eandem foliorum formam ac alia ex alpibus Europae auſtralioris habent. W.

*30. RANUNCULUS *Seguieri.*

R. foliis tripartitis, lobis multifido-laciniatis acutis, omnibus petiolatis, caule multifloro, calycibus glabris. W.

R. (*Seguieri*) foliis palmatis orbiculatim multifidis, caule proſtrato multifloro. *Villars delph.* 3. *p.* 737. *t.* 49. *

Ranunculus Columnae. *Allion. pedem. n.* 1453. *t.* 67. *f.* 3. 4.

R. (*Columnae*) foliis palmato-quinquepartitis, laciniis cuneiformibus pinnatifido-trifidis quinquefidisve, caule tereti villoſo ramoſo, pedunculis unifloris, radice aſphodeli fibroſa. *Wulffen in Iacq. Collect.* 4. *p.* 345. *

R. alpinus apii folio, flore albo magno. *Ponted. comp.* 117. *Segu. veron.* 1. *p.* 490. *t.* 12. *f.* 2. 3.
R. minor rutaefolio, flore ſimplici, grumoſa radice italicus. *Barr. icon.* 1153.
R. alter ſaxatilis aſphodeli radice. *Colum. ephr.* 312. *t.* 313?
Italiäniſcher Ranunkel. W.
Habitat in alpibus Delphinatus, Italiae, Carnioliae. ♃ (v. ſ.)

Calyx *coloratus glaber* | *apice tantum pilis aliquot inſtructus.* W.

31. RANUNCULUS *nivalis.*

R. foliis quinquelobis integerrimis, caulino ſeſſili digitato, caule unifloro. W.
R. calyce hirſuto, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis: caulinis multipartitis ſeſſilibus. *Fl. lapp.* 232. *t.* 3. *f.* 2. *Fl. ſuec.* 465, 502. *Gunn. norv.* 627. *Retz. obſ.* 2. *p.* 19. *Swartz. Act. holm.* 1789. *p.* 47.
Ranunculus lapponicus. *Fl. dan. t.* 144.
β. Ranunculus idem pygmaeus. *Fl. lapp.* 232. *t.* 3. *f.* 3. *Houttuyn Lin. Pfl. Syſt.* 7. *p.* 349.
Schnee-Ranunkel. W.
Habitat in alpibus Lapponiae, Norvegiae. ♃

Planta tota glaberrima nequit eſſe R. monſpeliacus.

*32. RANUNCULUS *montanus.* W.

R. foliis quinquelobis dentatis, caulino ſeſſili digitato, laciniis lineari-lanceolatis integerrimis, caule unifloro. W.
Ranunculus nivalis. *Iacq. auſtr. t.* 325. 326. *Hoſt. ſyn.* 311.
R. (*nivalis*) foliis radicalibus quinquepartitis orbiculatim multifidis, caulinis palmatis integris ſeſſilibus, caule unifloro. *Villars delph.* 3. *p.* 742.
R. uniflorus, foliis glabris reniformibus ſemiquinquelobis. *Hall. helv. n.* 1168.
R. minimus alpinus luteus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 861. *f. interior.*
Berg-Ranunkel. W.
Habitat in alpibus Helvetiae, Delphinatus, Salisburgi, Auſtriae. ♃ (v. ſ.)

Abunde diſtinctus a praecedente, quocum antea mixtus erat. W.

*33. RANUNCULUS *Gouani.* W.

R. foliis quinquelobis dentatis, caulino ſeſſili palmato, laciniis lanceolatis dentatis, caule unifloro. W.

R. (*pyrenaeus*) foliis radicalibus reniformibus trilobis quinquelobisve, caulino palmato ſeſſili. *Gouan. illuſt.* 33. *t.* 17. *f.* 1. 2. *

Gouaniſcher Ranunkel. W.

Habitat in Pyrenaeis *inque alpibus* Marmaroſienſibus Hungariae. ♃ (v. ſ.)

Accedit ad R. montanum ſed eſt omnibus partibus duplo major, et folio caulino dentato diverſus. W.

34. RANUNCULUS *alpeſtris.*

R. foliis radicalibus ſubcordatis obtuſis tripartitis: lobis trilobatis: caulino lanceolato integerrimo, caule ſubunifloro. *Sp. pl.* 778. *Iacq. auſtr. t.* 110. *Pall. it.* 2. *p.* 568.

R. uniflorus, foliis laevibus, ſemitrilobis, rotundae ſerratis, caulinis lingulatis. *Hall. helv. n.* 1167.

R. foliis ſubrotundis, ſplendentibus, ſemitrifidis, petalis cordatis albis. *Crantz. auſtr. p.* 113. *n.* 7.

R. foliis trilobis: lobis acutis; caule unifloro. *Scop. carn. n.* 1. *p.* 563. *n.* 4. *ed.* 2. *n.* 679.

R. alpinus humilis rotundifolius, flore majore et minore. *Bauh. pin.* 181.

R. alpinus humilis albus, folio ſubrotundo. *Segu. ver.* 1. *p.* 489. *t.* 12. *f.* 1.

R. montani 1 ſpecies 1 et 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 234.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 349.

Alpen-Ranunkel. W.

Habitat in alpibus Auſtriacis, Helveticis. ♃ (v. ſ.)

Folia *ſimilia R. aquatilis natantibus.* Calyx *reflexus, glaber.* Petala *alba, biloba.*

35. RANUNCULUS *lapponicus.*

R. foliis tripartitis lobatis obtuſis, caule ſubnudo unifloro. *Sp. pl.* 778. *Fl. ſuec.* 461. 503. *

R. caule unifolio unifloro, foliis tripartitis *Fl. lapp.* 251 *t.* 3. *f.* 4. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 350.

Lappländiſcher Ranunkel. W.

Habitat in alpibus Lapponicis. ♃ (v. ſ.)

*36. RANUNCULUS *hyperboreus.*

R. foliis profunde trilobis, lobis oblongis divaricatis caule

filiformi r.:?nte. *Rottb. Act. Haf.* 10. *p.* 458. *t.* 4. *f.* 16. *Retz. prod. fl. ſcand. ed. n.* 691. *Fl. dan. t.* 331. Ranunculus Ammanni. *Gunn. norv. n.* 826. (*excluſo ſynonymo Ammanni.*)
R. foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 204. *t.* 836. * (*excluſis ſynonymis Linnaei et Royeni.*)
Nordiſcher Ranunkel. W.
Habitat in Groenlandia, Islandia, Norvegia, *et* Sibiria, *prope* Ircutiam. ♃ (v. ſ.)

A R. lapponico caule *et* foliis *diverſiſſimus, nec ullo modo ſimilis R. ſalſuginoſo, quocum olim conjuxerat Gunnerus.* W.

37. RANUNCULUS *monſpeliacus.* †

R. foliis tripartitis crenatis, caule ſimplici villoſo ſubnudo unifloro. *Sp. pl.* 778. *Sauv. monſp.* 181. †
R. ſaxatilis, magno flore. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 351.
Franzöſiſcher Ranunkel. W.
Habitat Monſpelii.

Videtur differre a R. Gouani. W.

38. RANUNCULUS *penſylvanicus.*

R. calycibus reflexis, caule erecto, foliis ternatis trifidis, inciſis ſubtus piloſis. *Lin. ſuppl.* 272.
Ranunculus canadenſis. *Iacq. ic. rar.* 1. *t.* 105. *Miſc.* 2. *p.* 343. *
Penſylvaniſcher Ranunkel. W.
Habitat in Canada, Penſylvania. ⊙ ♂ (v. v.)

Caulis *erectus ramoſus teres pilis patulis.* Folia *ternata ſublineata, ſubtus uti petioli piloſa.* Foliola *trifida acuta inciſa ſerrataque.* Pedunculi *teretes laeves vagi.* Calyx *reflexus, foliolis ovatis concavis.* Petala *quinque lutea vix calycis magnitudine.* Stamina *parva longitudine corollae.* Germinum *capitulum ovatum corolla longius.* Semina *ovata compreſſa mucronata.*

*39. RANUNCULUS *ternatus.*

R. calycibus reflexis, foliis omnibus ternatis, foliolis trifidis, caule multifloro. *Thunb. jap.* 241.
Dreyblättriger Ranunkel. W.
Habitat in Japonia.

40. RANUNCULUS *bulboſus.*

R. calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto multifloro, foliis compoſitis. *Fl. ſuec.* 469, 504. *Dalib. pariſ.* 165. *Pollich. pal. n.* 533. *Scop. carn. n.* 692. *Hoffm. germ.* 195. *Kniph.cent.* 7. *n.* 74. *Fl. dan. t.* 551. *Roth. germ. I.* 239. *II.* 614.

R. radice ſimplici globoſa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491.

R. radice ſubrotunda, foliis hirſutis, ſeptilobis, lobis petiolatis. *Hall. helv. n.* 1174.

R. calycibus retroflexis, radice ſimplici globoſa. *Crantz. auſtr. p.* 114, *n.* 8.

R. bulboſus. *Lob. ic.* 666. *Fl. lapp.* 429.

R. pratenſis, radice verticilli modo rotunda. *Bauh. pin.* 179.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 351.

Knolliger Ranunkel.

Habitat in Europae *pratis, paſcuis.* ♃ (v. v.)

*41. RANUNCULUS *Philonotis.*

S. calycibus demum reflexis ſetoſis, pedunculis ſulcatis, foliis tripartitis inciſo-lobatis hirſutis, fructu ſubgloboſo. *Retz. prod. fl. ſcand. ed.* 2. *n.* 693. *Retz. obſ.* 6. *p.* 31.

R. (*Philonotis*) radice faſciculata, herba piloſa, caule erecto ramoſo, foliis ternatis, foliolis trilobis, lobis crenato-inciſis, apicibus puncto albo terminatis, pedunculis ſulcatis, calyce reflexo, fructu globoſo, ſeminibus compreſſis acuminatis. *Ehrh. Beitr.* 2. *p.* 145. *Hoffm. germ.* 194.

R. (*hirſutus*) radice fibroſa annua, caule hirſuto, calycibus papilloſo-hiſpidis acuminatis, demum reflexis. *Ait. Kew.* 2. *p.* 268. *Curt. Lond.*

R. rectus, foliis pallidioribus hirſutis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 417. *f.* 3. *Petiv. t.* 33.

R. paluſtris apii folio lanugineſus. *Bauh. pin.* 180.

Rauher Ranunkel. W.

Habitat in Europae *udis.* ☉ (v. v.)

*42. RANUNCULUS *polyrhizos.*

R. foliis radicalibus palmatis, caulinis ſeſſilibus digitatis, caule multifloro, radice faſciculata. W.

Ranunculus polyrhizos. *Stephan in litt.*

Vielwurzlicher Ranunkel. W.

Habitat in Sibiria. ♃ (v. ſ.)

Radix *faſciculata*, Folia *radicalia Ranunculi ſcelerati, triloba, lobis lateralibus bilobis, laciniis obtuſe tridentatis ut folia ipſa cuneiformibus.* Caules *digitales bini vel tres ex una radice erecti vel adſcendentes digitales ſimplices.* Folia *caulina ſeſſilia digitata, baſi cuneiformia, laciniis linearibus obtuſiuſculis integerrimis.* Pedunculi 2, 3 *vel* 4 *longi uniflori teretes non ſulcati tenuiſſime ut caulis pubeſcentes.* Calycis *foliola colorata glabra obtuſa patentia.* Petala *lutea magnitudine R. Flammulae.* Capitulum *ſeminum ſubrotundum.* Semina *ovata compreſſa laevia, ſtigmate obtuſo perſiſtenti coronata.* W.

43. RANUNCULUS *repens.*

R. calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſarmentis repentibus, foliis compoſitis. *Fl. ſuec.* 468, 505. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 206. *Crantz. auſtr. p.* 114. *n.* 9. *Scop. carn. n.* 689. *Pollich. pal. n.* 534. *Blackw. t.* 31. *Hoffm. germ.* 196. *Roth. germ. I.* 239. *II.* 615.

R. caule reptante, radicato, foliis ſemitrilobatis, lobis petiolatis. *Hall. helv. n.* 1173.

R. foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis: medio productiore, caule multifloro. *Hort. cliff.* 230. *Gron. virg.* 166. *Roy. lugdb.* 491.

R. pratenſis repens hirſutus. *Bauh. pin.* 179. *Fl. lapp.* 230.

R. hortenſis 1. *Dod. pempt.* 425.

β. R. dulcis batrachium ſalutiferum. *Tabern.* 51. *Hall.*

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 352.

Kriechender Ranunkel. W.

Habitat in Europae *cultis.* ♃ (v. v.)

44. RANUNCULUS *polyanthemos.*

R. calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis multipartitis. *Fl. ſuec.* 467, 506. *Scholl. barb. n.* 447. *Pollich. pal. n.* 535. *Mattuſch. ſil. n.* 412. *Doerr. naſſ. p.* 194. *Hoffm. germ.* 196. *Roth. germ. I.* 239. *II.* 616.

R. ramoſus multiflorus, foliis ſemiſeptilobis, lobis tridentatis acutis. *Hall. helv. n.* 1171.

R. foliis inferioribus peltatis, tri-quadripartito-multifidis: caulinis linearibus ſubdenticulatis ſeſſilibus. *Neck. gallob. p.* 240.

R. polyanthemos ſimplex. *Lob. ic.* 666.
R. ſylveſtris. *Tabern. ic.* 42. *hiſt.* 117.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 353.
Vielblumiger Ranunkel. W.
Habitat in Europae *borealis graminoſis.* ♃ (v. v.)

Calyce *hirſuto et* Pedunculis *ſulcatis abunde a ſequenti diſtinctus.* W.

45. RANUNCULUS *acris.*

R. calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito multifidis: ſummis linearibus. *Fl. ſuec.* 466, 507. *Dalib. pariſ.* 164. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 206. *n.* 53. *Scop. carn. p.* 690. *Pollich. pal n.* 536. *Hoffm. germ.* 196. *Knorr. del* 1. *t. H.* 1. *Roth. germ. I.* 239. *II.* 616.

R. foliis peltatis quinquangularibus multipartitis: laciniis linearibus, caule multifloro. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492.

R. foliis hirſutis, ſemitrilobatis, lobis lateralibus bipartitis, foliis caulinis ſemitrilobis *Hall. helv. n.* 1160.

R. napellifolius. *Crantz. auſtr. p.* 114. *n.* 10. *t.* 4. *f.* 2. *cum praecedente conjungit.* R.

R. foliis inferioribus tri-quinque et partito-multifidis, ſuperioribus lineari-lanceolatis ſeſſilibus integerrimis. *Neck. gallob. p.* 239.

R. pratenſis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Fl. lapp.* 228.

R. hortenſis. *Dod. pempt.* 426.

β. R. hortenſis erectus, flore pleno. *Bauh. pin.* 179. *Knorr. del.* 1. *t. H.* 2.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 354.
Scharfer Ranunkel. W.
Habitat in Europae *pratis, paſcuis.* ♃ (v. v.)

*46. RANUNCULUS *cappadocicus.* W.

R. calycibus patulis, pedunculo tereti, caule ſubbifido foliis cordatis trilobis dentatis. W.
R. orientalis dulcis Doronici radice. *Tournef. cor* 20.
Cappadociſcher Ranunkel. W.
Habitat in Cappadocia. ♃ (—f.)

Radix *dura craſſitie pennae anſerinae facie Doronici.* Folia *radicalia ſubrotundo-cordata breviſſime triloba, lobis acuminatis dentibus paucis groſſis inſtructis,*

utrinque pili ſpar[illegible] adpreſſi. Folium *caulinum unicum ut radicalia petiolatum, et in pedunculi medio folium parvum ſeſſile lanceolatum integerrimum.* Caulis *ſpithamaeus pilis adpreſſis tectus ſimplex vel ſupra folium bifidus, pedunculis unifloris.* Corolla *flava magnitudine R. polyanthemi.* Capitulum *ſeminum ſubrotundum.* Semina *compreſſa uncinata.* W.

47. RANUNCULUS *lanuginoſus.*

R. calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirſutis, foliis trifidis lobatis crenatis holoſericeis. *Oed. dan. t.* 397. *Reyg. ged.* 2. *p.* 97. *Leers herb. n.* 429. *Mattuſch. ſil. n.* 414. *Doerr. naſſ. p.* 195. *Hoffm. germ.* 196. *Roth. germ. I.* 240. *II.* 617.

R. folioſus ramoſus erectus, foliis ſemitrilobatis, hirſutis, vaginis ſericeis. *Hall. helv. n.* 1172.

R. foliis tripartitis, acute ſinuatis lanuginoſis. *Crantz. auſtr. p.* 118.

R. foliis trilobis, hiſpidis: calycibus patulis, caule multifloro tereti. *Scop. carn.* 1. *p.* 564. *n.* 5. *ed.* 2. *n.* 691.

R. tomentoſus, calycibus retroflexis, foliis radicalibus tripartitis lobis inciſis; caulinis multipartitis ſeſſilibus. *Ger. prov.* 387.

R. foliis radicalibus pinnatis. *Sauv. monſp.* 227.

R. montanus lanuginoſus, foliis ranunculi pratenſis repentis. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.

R. magnus valde hirſutus, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 417.

β. Ranunculus montanus ſubhirſutus, geranii folio. *Bauh. pin.* 182.

R. montanus ſubhirſutus latifolius. *Bauh. prodr.* 96. *t.* 96.

R. nemoroſus hirſutus, foliis caryophyllatae. *Loeſ. pruſſ.* 220. *t.* 71.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 355.

Wolliger Ranunkel. W.

Habitat Monſpelii, *in* Helvetia, Germania, Auſtria, Carniolia, Luſatia. ♃ (v. v.)

Caulis *altus, hirtus, erectus.* Folia *Aconiti ſ. Ran. acris, ſed magis inciſa.* Semina *acuta, compreſſa.* Pedunculi *longi, teretes.* Macula *pallida ad ſinus foliorum, quae tactu craſſiora ſentiuntur.*

48. RANUNCULUS *chaerophyllus.*

R. calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto

unifloro, foliis compoſitis lineari-multifidis. *Sp. pl.* 780. *Guett. ſtamp.* 275. *Dalib. pariſ.* 166. *Villars delph.* 3. *p.* 752.
R. foliis compoſitis, caule ſimplici villoſo ſubnudo unifloro, radice tuberoſa. *Zinn. goett.* 129.
R. grumoſa radice, folio Ranunculi bulboſi. *Bauh. pin.* 181. *prodr.* 96.
R. chaerophyllos, aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 181. *Barr. ic.* 581.
R. montanus leptophyllos, aſphodeli radice. *Col. ecphr* 1. *p.* 312. *t.* 311.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 356.
Kerbelblättriger Ranunkel W.
Habitat in Gallia, Italia. ♃ (v. ſ.)

*49. RANUNCULUS *millefoliatus.*
R. foliis ſupradecompoſitis linearibus, calycibus piloſis, caule ramoſo ſericeo villoſo. *Vahl ſymb.* 2. *p.* 63. *
R. foliis multifariam decompoſitis lineari-ſubulatis, caule ſubaphyllo villoſo paucifloro, calycibus erectis hirſutis. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 441. *t.* 116. *
Feinblättriger Ranunkel. W.
Habitat in regno Tunetano. ♃

50. RANUNCULUS *parvulus.*
R. hirtus, foliis trilobis inciſis, caule erecto ſubunifloro. *Mant.* 79. *Gmel. It.* 2. *p.* 196.
R. foliis radicalibus et caulinis inferioribus trilobis crenatis, ſummis trifidis dentatis, caule bifloro erecto. *Gouan. monſ.* 270. *
R. arvenſis parvus, folio trifido. *Bauh. pin.* 79.
R. ſaxatilis minimus hirſutus. *Bauh. pin.* 182. *prodr.* 96.
R. minimus apulus. *Col. ecphr. t.* 316.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 357.
Kleiner Ranunkel. W.
Habitat Monſpelii, *in* Italia, Ruſſia.

Caulis *ſolitarius, hirtus, filiformis, longitudine digiti ſ. ſemipedalis.* Folia *pauca, petiolata, ſimplicia, trifida, dentata, hirta.* Flos *fere foliis major, luteus.* Calyx *membranaceus, villoſus.*

*51. RANUNCULUS *oxyſpermus.*
R. foliis radicalibus oblongis obtuſis ſinuato-dentatis, caulinis ſeſſilibus digitatis inciſis, ſeminibus ariſtatis. W.

Ranunculus oxyſpermus Marſchallii. *Stephan. in litt.*
Spitzſamiger Ranunkel. W.
Habitat in Sibiria *ad fluvium* Tereck. ⊙(v. ſ.)

Planta *videtur annua.* Folia *radicalia petiolata ovata obtuſa inaequaliter ſinuato-dentata utrinque uti petioli piloſa.* Caulis *erectus pedalis et ultra ramoſus piloſus.* Folia *caulina ſeſſilia digitata, laciniis inferiorum inaequaliter pinnatifidis, ſuperiorum linearibus integerrimis.* Calyx *reflexus.* Corolla *flava magnitudine R. bulboſi.* Capitula *ſeminum elliptica.* Semina *compreſſiuſcula acuta ſubulato-ariſtata, ariſtis erectis.* W.

52. RANUNCULUS *arvenſis.*

R. ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Hort. cliff.* 229. *Flor. ſuec.* 470, 508. *It. oel.* 105. * *Roy. lugdb.* 491. *Dalib. pariſ.* 166. *Oed. dan.* 219. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 205. *Scop. carn. n.* 693. *Pollich. pal. n.* 537. *Kniph. cent.* 12. *n.* 82. *Hoffm. germ.* 196. *Roth. germ. I.* 240. *II.* 618.

R. ſeminibus aculeatis, foliis tripartitis, lobis longe petiolatis, bipartitis et tripartitis, acute inciſis. *Hall. helv. n.* 1176.

R. echinatus. *Crantz. auſtr. p.* 118.

R. arvenſis echinatus. *Bauh. pin.* 179.

R. ſylveſtris 3. *Dod. pempt.* 427.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 358.

Acker-Ranunkel. W.

Habitat in Europae *auſtralioris agris.* ⊙ (v. v.)

53. RANUNCULUS *muricatus.*

R. ſeminibus aculeatis, foliis ſimplicibus lobatis obtuſis glabris, caule diffuſo. *Hort. cliff.* 229. *Hort. upſ.* 157. *Roy. lugdb.* 491. *Sauv. monſp.* 204. *Hoffm. germ.* 196.

R. paluſtris echinatus. *Bauh. pin.* 180. *prodr.* 95. *hiſt.* 3. *p.* 858.

R. creticus echinatus latifolius. *Alp. exot.* 263. *t.* 262.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 359.

Stachelſamiger Ranunkel. W.

Habitat in Europae *auſtralis foſſis humentibus.* ⊙ (v. v.)

54. RANUNCULUS *parviflorus.*

R. ſeminibus muricatis, foliis ſimplicibus laciniatis acu-

tis hirſutis, caule diffuſo. *Sp. pl.* 780. *Hudſ. angl.* 242.
R. hirſutus annuus, flore minimo. *Pluk. alm.* 311. *t.* 55. *f.* 1. *Raj. angl.* 3. *p.* 248. *t.* 12. *f.* 1. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 21.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 359.
Kleinblütiger Ranunkel. W.
Habitat in Europa *auſtrali.* ⊙ (v. v.)
Differt a R. muricato *flore parvo; Caule magis proſtrato; Foliis profunde lacinulatis; Seminibus latere tantum tuberculis, nec aculeis muricatis.*

55. RANUNCULUS *orientalis.*

R. ſeminibus ſpinoſo-ſubulatis recurvis, calycibus reflexis, foliis multifidis. *Sp. pl.* 781.
R. lesbius pulſatillae folio flore magno. *Tournef. cor.* 20.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 360.
Orientaliſcher Ranunkel. W.
Habitat in Oriente. ⊙ (v. ſ.)
Caulis *digitalis ramis tribus vel quatuor unifloris.* Folia *petiolata ſupradecompoſita vel potius ex tribus foliolis parvis irregulariter pinnatis compoſita, pinnulis lineari-oblongis obtuſis.* Calyx *reflexus*, Corolla *ratione plantae magna.* Capitulum *ſeminum ſubrotundum.* Semina *oblonga compreſſa ſubulato-ariſtata, ariſtis uncinatis divaricatis.* W.

56. RANUNCULUS *grandiflorus.*

R. caule erecto bifolio, foliis multifidis; caulinis alternis ſeſſilibus. *Sp. pl.* 781. *Roy. lugdb.* 492.
R. orientalis, aconiti folio, flore maximo. *Tournef. cor.* 25.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 360.
Groſsblütiger Ranunkel. W.
Habitat in Oriente. ♃ (v. ſ.)

57. RANUNCULUS *falcatus.*

R. foliis cuneiformibus tripartitis, laciniis multifidis filiformibus, ſeminibus falcatis, ſcapo nudo unifloro. W.
R. foliis filiformi-ramoſis, ſeminibus falcatis, ſcapo nudo unifloro. *Hort. upſ.* 157. *Sauv. monſp.* 205. *Gron. orient.* 69. *Iacq. vind.* 250. *auſtr. t.* 48. *Hoffm. germ.* 197. *Roth. germ. II.* 618.
R. teſticulatus. *Crantz. auſtr. p.* 119.

Myoſurus foliis ramoſis. *Hort. cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 492.
Melampyrum luteum minimum. *Bauh. pin.* 234.
Ranunculus ceratocephalus, ſeminibus falcatis in ſpicam adactis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 440. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 22.
R. alopecuroides, ajugae foliis. *Boc. ſic.* 28. *t.* 14. *f.* 3.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 360.
Sichelſamiger Ranunkel. W.
Habitat inter ſegetes Europae *auſtralis et* Orientis. ⊙ (v. v.)

*58. RANUNCULUS *polyphyllus.*

R. foliis ſubmerſis oblongis petiolis capillaceis, natantibus cuneiformibus trilobis, emerſis ellipticis, caule erecto. W.
Ranunculus polyphyllus. *Waldſtein et Kitaibel pl. rar. hung.*
Vielblättriger Ranunkel. W.
Habitat in aquis Hungariae. ⊙ (v. ſ.)

Caulis *dodrantalis erectus ſuperne ramoſus*, Folia *ſubmerſa numeroſiſſima totum caulem tegentia oblonga unguicularia petiolo capillari unciali ſuffulta*, Folia *natantia parva unguicularia cuneiformia triloba integerrima petiolo craſſiori ſemiunciali.* Rami *unciales erecti ex aqua prominent, geruntque folia breve petiolata quadri- vel ſexlinearia elliptica utrinque attenuata obtuſa.* Flores *admodum parvi lutei.* W.

59. RANUNCULUS *hederaceus.*

R. foliis ſubrotundis trilobis integerrimis, caule repente. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Dalib. pariſ.* 167. *Gort. gelr.* 325. *Pal. itin.* 2. *p.* 511. *Leers. herborn. n.* 431. *Pollich. pal. n.* 538. *Reich. flor. n.* 1010. *Doerr. naſſ. p.* 195. *Fl. dan. t.* 321. *Weber. ſpicil. fl. goett. p.* 16. *Hoffm. germ.* 197. *Roth. germ. I.* 240. *II.* 619.
R. aquaticus hederaceus luteus. *Bauh. pin.* 180. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 441. *ſ.* 4. *t.* 29. *f.* 29.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 362.
Epheublättriger Ranunkel. W.
Habitat in aquis vadoſis Angliae, Belgii, Germaniae, Sibiriae. ♃ (v. ſ.)

Corolla *parva, petalis albis acutis.* W.

60. RANUNCULUS *aquatilis.*

R. foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis. *Fl. ſuec.* 2. *n.* 509. *Gmel ſib.* 4. *p.* 207. *Crantz. auſtr. p.* 118. *Scop. carn. n.* 681. *Pollich. pal. n.* 539.

R. (*heterophyllus*) foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis reniformi-palmatis. *Hoffm. germ.* 197. *Roth. germ. I.* 240. *II.* 619.

R. fluitans, petiolis unifloris, foliis imis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. helv. n.* 1163.

R. foliis natantibus peltato-multipartitis: immerſis capillaceis; nectariis tubulatis. *Neck. gallob. p.* 242.

R foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus peltatis. *Fl. lapp.* 234. *Roy. lugdb.* 492.

R. aquaticus, folio rotundo et capillaceo. *Bauh. pin.* 180.

R. aquatilis. *Dod. pempt.* 587.

β. R. foliis ſubmerſis capillaceis. *Fl. ſuec.* 1. *n.* 472. *Dalib. pariſ.* 168.

Ranunculus aquatilis *β.* *Roth. germ. II.* 620.

R. foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Hort. cliff.* 232. *Roy. lugdb.* 492.

R. aquaticus albus, circinatis tenuiſſime diviſis foliis. *Pluk. alm.* 311. *t.* 55. *f.* 2.

Millefolium aquaticum cornutum majus. *Bauh. pin.* 141.

γ. R. fluitans, petiolis unifloris, foliis capillaribus, laciniis divergentibus. *Hall. helv. n.* 1162. *Pollich. l. c. β.*

R. (*aquatilis*) foliis omnibus capillaceis, laciniis divergentibus. *Hoffm. germ.* 197. *Roth. germ I.* 241. *II.* 620.

R. aquaticus capillaceus. *Bauh. pin.* 180.

Millefolium aquaticum, foliis abrotani, ranunculi flore et capitulo. *Bauh. pin.* 141.

Ranunculus trichophyllos aquaticus medio luteus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 315. *t.* 316.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 363.

Waſſer-Ranunkel. W.

Habitat in Europae *aquis undoſis, foſſis, rivulis.* ♃ (v. v.)

Variat foliorum forma, tamen a ſequenti diverſiſſimus. W.

*61. RANUNCULUS *fluviatilis.*

R. foliis omnibus dichotomo-capillaceis, caule natante. W.
R. (*fluviatilis*) foliis omnibus capillaceis, laciniis parallelis longiſſimis. *Hoffm. germ.* 197. *Roth. germ. I.* 241. *II.* 621.
Ranunculus peucedanifolius. *Desfont. fl. atl.* 1. *p.* 444.
Ranunculus aquatilis δ. *Sp. pl.* 782.
R. fluitans, petiolis unifloris, foliis longiſſimis, laciniis parallelis. *Hall. helv. n.* 1181. *Fl. dan. t.* 376.
R. foliis omnibus capillaceis circumſcriptione oblongis. *Roy. lugdb.* 492.
R. albus fluitans peucedani folio. *Herm. lugdb.* 517.
Millefolium aquaticum foliis foeniculi, ranunculi flore et capitulo. *Bauh. pin.* 141.
Fluſs-Ranunkel. W.
Habitat in fluviis Europae *et* Africae *borealis.* ♃ (v. v.)
In fluviis et lacubus ſemper foliis longiſſimis dichotomis occurrit, nec ullo modo mutatur. W.

1087. TROLLIUS.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 954.

Cal. 0. *Petala* circiter 14. *Capſ.* plurimae, ovatae, polyſpermae.

1. TROLLIUS *europaeus.*

T. corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum. *Sp. pl.* 782. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 190. *Hall. helv. n.* 1189. *Pall. it.* 3. *p.* 253. *Scop. carn. n.* 694. *Fl. dan. t.* 133. *Kniph. cent.* 4. *n.* 90. *Knorr. del.* 2. *t. T.* 4. *Hoffm. germ.* 198. *Roth. germ. I.* 236. *II.* 608.
T. (*altiſſimus*) flore pedunculato clauſo globoſo. *Crantz. auſtr. p.* 134.
Helleborus flore clauſo erecto petiolato, caule ſimpliciſſimo. *Fl. ſuec.* 474, 510.
Helleborus foliis angulatis multifidis, flore globoſo. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484.
Helleborus caule ſimplici, flore pedunculato. *Fl. lapp.* 226.
Ranunculus montanus, aconiti folio, flore globoſo. *Bauh. pin.* 182.
Ranunculus flore globoſo. *Dod. pempt.* 430.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 364.
Europäiſche Trollblume. W.
Habitat in alpibus et ſubalpinis Sueciae, Germaniae, Angliae. ♃ (v. v.)
Corollae *clauſae flavae.* Nectaria *flava, ipſis ſtaminibus non longiora.* Germina *ſ.* Piſtilla *erecta.*

2. TROLLIUS *aſiaticus.*
T. corolla patula, nectariis ſtamine longioribus. *Sp. pl.* 782. *Mill. dict. n.* 2. *Pall. it.* 2. *p.* 528.
Helleborus aconiti folio, flore globoſo croceo. *Amman. ruth.* 101.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 366.
Aſiatiſche Trollblume. W.
Habitat in Sibiria. ♃ (v. v.)
Parum a praecedente diſtinctus nectariis fulvis ſtamine longioribus; Corollis *ſaturate luteis hiantibus.* Germina *ſ.* Piſtilla *extrorſum flexa quaſi procumbentia.*

1088. ISOPYRUM.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 955.

Cal. 0. *Petala* 5. *Nectaria* 3-fida, tubulata. *Capſulae* recurvae, polyſpermae.

1. ISOPYRUM *fumarioides.*
I. ſtipulis ſubulatis, petalis acutis. *Sp. pl.* 783. *Hort. upſ.* 157. *Mill. dict. n.* 1. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 191. *Willich. obſ. n.* 44. *Kniph. cent.* 12. *n.* 65.
Helleborus fumariae foliis. *Amm. ruth.* 74. *t.* 12.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 367.
Erdrauchartiges Iſopyrum. W.
Habitat in nemoribus Sibiriae. ⊙ (v. v.)
Flores lutei.
Conf. Aquilegiae corniculis, Moſchatellinae foliis, planta puſilla ex inſula cheuſan. *Pluk. amalth.* 2. *p.* 360. *f.* 3.

2. ISOPYRUM *thalictroides.*
I. ſtipulis ovatis, petalis obtuſis. *Sp. pl.* 783. *Scop. carn. n.* 695. *Mill. dict. n.* 2. *Iacq. auſtr. t.* 105. *Mattuſch. ſil. n.* 419. *Crantz. auſtr.* 135. *Hoffm. germ.* 198.
Thalictrum batrachioides, flore albo, italicum. *Bocc. muſ.* 84. *t.* 79. *f.* 1. *

Ranunculus nemoroſus, thalictri folio. *Bauh. pin.* 178. *Raj. hiſt.* 584. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 437. *ſ.* 4. *t.* 28. *f.* 12.
Ranunculus praecox 11, thalictri folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 233.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 368.
Thalictrumartiges Iſopyrum. W.
Habitat in alpibus Italicis, Gratianopoli, *inque agro* Viennenſi, Carnioliae, *locis umbroſis; vernalis.* ♃ (v. ſ.)
Petala *alba.* Germina 1, 2, 3. *Scop. Crantz.* R.

3. ISOPYRUM *aquilegioides.* †

I. ſtipulis obſoletis. *Sp. pl.* 783. *Mill. dict. n.* 3. *Hall. helv. n.* 1190.
Aquilegia montana, flore parvo, thalictri folio. *Bauh. pin.* 144. *prodr.* 75. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 484. *Raj. hiſt.* 707. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 458. *ſ.* 12. *t.* 1. *f.* 5.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 369.
Akeleyartiges Iſopyrum. W.
Habitat in alpibus Helveticis, Tridentinis, Apenninis.
Synonymon *Bauhinorum ad* Aquilegiam viſcoſam *amandat de la Chenal in Act. Helv. tom.* 8. *p.* 146. R.
Planta obſcura. W.

1089. HELLEBORUS.

Gen. plant. ed. Schreb. n. 956.

Cal. 0. *Petala* 5 ſ. plura. *Nectaria* bilabiata, tubulata. *Capſ.* polyſpermae, erectiuſculae.

1. HELLEBORUS *hyemalis.*

H. flore folio inſidente, foliis radicalibus peltatis multifidis, laciniis integerrimis. W.
H. flore folio inſidente. *Hort. cliff.* 227. *Hort. upſ.* 158. *Roy. lugdb.* 484. *Hall. helv. n.* 1191. *Mill. dict. n.* 5. *Crantz. auſtr. p.* 133. *Iacq. auſtr. t.* 202. *Blackw. t.* 576. *Kniph. cent.* 1. *n.* 40. *Hoffm. germ.* 198.
H. ranunculoides praecox tuberoſus, flore luteo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 459. *ſ.* 12. *t.* 2. *f.* 4.
Aconitum unifolium bulboſum. *Bauh. pin.* 183. *Hill. anat. t.* 11.
Aconitum hyemale. *Camer. epit.* 728. R.
Aconitum luteum minus. *Dodon. pempt.* 352. R.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. p. 370.
Winter-Chriſtwurz. W.
Habitat in Lombardia, Helvetia, Italia, Apenninis, Auſtria. ♃ (v. v.)

Scapus *ſimpliciſſimus, vix pollicaris, monophyllus,* Folio *horizontali, terminali.* Flos *unicus, terminalis, ſeſſilis, erectus, luteus.*

*2. HELLEBORUS *ranunculinus.*

H. caule unifloro folioſo ſimplici, foliis palmatis lobis inciſo-dentatis. W.
H. (*ranunculinus*) floribus ſolitariis pedunculatis, foliis digitato-multifidis inciſis. *Smith. ic. ined.* 1. *p.* 37. *t.* 37.
H. niger orientalis Ranunculi folio, flore nequaquam globoſo. *Tournef. cor.* 20.
Trollius humilis flore patulo. *Buxb. cent.* 1. *tab.* 22.
Ranunkelartige Chriſtwurz. W.
Habitat in Cappadocia. ♃ (v. ſ.)

3. HELLEBORUS *niger.*

H. ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. *Hort. upſ.* 157. *Roy. lugdb.* 484. *Mat. med.* 142. *Mill. dict. n.* 3. *Crantz auſtr. p.* 133. *n.* 3. *Iacq. auſtr. t.* 201. *Mattuſch. ſil. n.* 420. *Blackw. t.* 506. 507. *Ludw. ect. n.* 139. *Kniph. cent.* 1. *n.* 41. *Knorr. del.* 1. *t. N.* 6. *Hoffm. germ* 199.
H. ſcapo florifero ſubnudo, petiolo communi bipartito. *Hort. cliff.* 227.
H. nectariis obſubulatis, filamentis ſtaminum duplo brevioribus. *Scop. carn. ed.* 1. *p.* 556. *n.* 2. *ed.* 2. *n.* 696.
H. niger, flore roſeo. *Bauh. pin.* 186. *Hill. anat. t.* 1.
Elleborus niger, legitimus. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 275.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 371.
Schwarze Chriſtwurz. W.
Habitat in Auſtriae, Hetruriae, Apennini *aſperis.* ♃ (v. v.)

Folia conſiſtentia, hyeme perennantia.

Folia *omnia radicalia, coriacea.* Scapus *rudimento, unius folii, aphyllus, bifidus; ramis aphyllis, bifloris bracteatis.* Flores *verticillares, albi.*

4. HELLEBORUS *viridis.*

H. caule bifido, ramis folioſis bifloris, foliis digitatis.

Mill. dict. n. 2. Grim. iſen. in Nov. Act. A. N. C. tom. 5. app. p. 329. Jacq. auſtr. t. 106. Mattuſch. ſil. n. 421. Doerr. naſſ. p. 123. Blackw. t. 509. 510. Kniph. cent. 1. n. 42. Knorr. del. 1. t. N. 5. Hoffm. germ. 199. *Roth. germ. I.* 234. *II.* 600.

H. caule aequali folioſo, foliis radicalibus caulem tandem ſuperantibus. *Hort. cliff.* 227. *Hort. upſ.* 158. *Roy. lugdb.* 484.

H. foliis multipartitis, ſerratis, caule paucifloro. *Hall. helv. n.* 1192.

H. foliis digitatis, flore viridi. *Crantz. auſtr. p.* 134.

H. nectariis obconicis, filamentis ſtaminum triplo brevioribus. *Scop. carn. p.* 556. *n.* 1. *ed.* 2. *n.* 697.

H. niger hortenſis, flore viridi. *Bauh. pin.* 185.

Elleborum nigrum alterum. *Cam. epit.* 941.

Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 373.

Grüne Chriſtwurz. W.

Habitat in montibus Vignenſibus, Euganeis, rel. ♃ (v. v.)

Folia *omnia radicalia.* Scapus *aphyllus bifidus: Ramis folioſis, biſtoris* Flores *nutantes, virides.* Piſtilla 3, *raro* 4, *rariſſime* 5. *Crantz. l. c.* R.

*5. HELLEBORUS *orientalis.*

H. caule multifloro, foliis pedatis ſubtus hirtis. W.

H. caule ſuperne diviſo folioſo et multifloro, foliis duplo altiore, foliis amplis pedato-digitatis ſubtus pubeſcentibus. *Lamarck. encycl.* 3. *p.* 92. *

H. niger orientalis ampliſſimo folio, caule praealto, flore purpuraſcente. *Tournef. cor.* 20.

Wahre Chriſtwurz. W.

Habitat in Oriente. ♃ (v. ſ.)

Eſt verus Helleborus Hippocratis. Similis quodammodo H. viridi, differt vero: caule *ramoſo multifloro,* corolla *viridi-purpuraſcente,* foliolis *foliorum radicalium ellipticis craſſioribus ſubtus ad venas prominentes pilis ſparſis obſitis. Ab H. foetido diverſus* foliis *radicalibus ſubtus hirtis multo majoribus et foliis floralibus trilobis apice dentatis.* W.

6. HELLEBORUS *foetidus.*

H. caule multifloro folioſo, foliis pedatis. *Sp. pl* 784. *Hoffm. germ.* 199. *Roth. germ. I.* 234. *II* 600.

H. caule inferne anguſtato-multifolio multifloro; foliis

caule brevioribus. *Hort. cliff.* 227. *Roy. lugdb.* 484. *Dalib. pariſ.* 169. *Sauv. monſp.* 180. *Mill. dict. n.* 1. *Pollich. pal. n.* 540. *Doerr. naſſ. p.* 123. *Blackw. t.* 57. *Kniph. cent.* 12. *n.* 52. 53. *Regn. bot.*
H. ramoſus, multiflorus, foliis multipartitis ſerratis, ſtipulis ovato-lanceolatis, coloratis. *Hall. helv. n.* 1193.
H. niger foetidus. *Bauh. pin.* 185.
Helleboraſter maximus. *Lob. ic.* 679.
H. foemina. *Sterb. fung.* 372. *t.* 36. *f.* C.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 374.
Stinkende Chriſtwurz.
Habitat in Germania, Helvetia, Gallia. ♃ (v. v.)
Folia *omnia in caule; verſus radicem nulla.*
Folia *floralia ovata integerrima.* W.

*7. HELLEBORUS *lividus.*
H. caule multifloro folioſo, foliis ternatis. *Ait. Kew* 2. *p.* 272. *Curt. mag.* 72.
Helleborus foetidus β. *Sp. pl.* 784.
H. niger trifoliatus. *Aldini hort. farneſ.* 93. *t.* 92. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 460. *ſ.* 12. *t.* 4. *f.* 7.
Schmutzigweiſse Chriſtwurz. W.
Habitat - - - - ♃ (v. ſ.)

8. HELLEBORUS *trifolius.*
H. ſcapo unifloro, foliis ternatis. *Amoen. acad.* 2. *p.* 356. *t.* 4. *f.* 18. *Kalm. it.* 3. *p.* 379. *Lepech. it.* 1. *p.* 190. *Pall. itin.* 3. *p.* 34. *Flor. dan. t.* 566.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 376.
Kleinſte Chriſtwurz. W.
Habitat in Canadae, Sibiriae *ſylvis nemoroſis cum Oxalide, Circaea, etiam in* Islandia. ♃ (v. ſ.)
Scapus *aphyllus.* Flos *minutus, Parnaſſiae ſimilis, albus.*

1090. CALTHA.

Gen. plant. edit. Schreb. n. 957.

Cal. 0. *Petala* 5. *Nectaria* 0. *Capſ.* plures, polyſpermae.

1. CALTHA *paluſtris.*
C. caule erecto. W.

Caltha. *Fl. lapp.* 227. *Fl. ſuec.* 473, 511. *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 484. *Clayt. virg.* 166. *Dalib. pariſ.* 169. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 191. *Hall. helv. n.* 1188. *Crantz. auſtr. p.* 136. *Pollich. pal. n.* 541. *Fl. dan. t.* 668. *Kniph. cent.* 7. *n.* 7. *Knorr. del.* 1. *t. H.* 2. *Hoffm. germ.* 199. *Roth. germ. I.* 234. *II.* 601.
C. paluſtris, flore ſimplici. *Bauh. pin.* 276.
C. (*major*) foliis orbiculatis crenatis, flore majore. *Mill. dict. n.* 1.
Populago paluſtris. *Scop. carn. ed.* 2. *n.* 698.
Populago major. *Tabern. ic.* 750.
β. Populago minor. *Tabern. ic.* 750.
C. (*minor*) foliis orbiculato-cordatis crenatis, flore minore. *Mill. dict. n.* 2.
γ. Caltha paluſtris, flore pleno. *Bauh. pin.* 276. *Tabern.* 751.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 377.
Gemeine Kuhblume. W.
Habitat in humidiuſculis Europae, Aſiae *et* Americae *borealis.* ♃ (v. v.)

*2. CALTHA *natans.* †
C. caule procumbente natante. W.
Caltha natans. *Pall. itin. ed. min.* 3. *p.* 248.
C. caulibus procumbentibus, foliis cordato-reniformibus aequaliter crenatis, floribus puſillis. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 192. *t.* 82. *
Populago flore minore rubello. *Gmel. index Ircut.* 605.
Schwimmende Kuhblume. W.
Habitat in aquis ſtagnantibus Sibiriae *circa urbem* Ircutiam. ♃

Habitus praecedentis ſed omnibus partibus minor, differt: caule *procumbente natante,* petalis *ſubrotundis albis margine rubicundis, externe vireſcentibus,* capſulis *triquetris.* W.

1091. HYDRASTIS.

Gen. pl. ed. Schreb. n. 958.

Cal. 0. *Petala* 3. *Nectaria* 0. *Bacca* compoſita acinis monoſpermis.

1. HYDRASTIS *canadenſis.*
H. canadenſis. *Sp. pl.* 784.

Warnera canadenſis. *Mill. ic.* 190. *t.* 285.
Hydrophyllum verum canadenſium. *Sp. pl.* 1. *p.* 146.
Houttuyn Lin. Pfl. Syſt. 7. *p.* 879.
Canadiſche Hydraſtis. W.
Habitat in Canadae *aquis.* ♃ (v. ſ.)

Simillis Hydrophyllo. Folia *bina, petiolata, baſi emarginata, palmata, ſerrata: lobis utrinque lobulo laterali.*

. p. 146.

ata, baſi
ue lobulo

